

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
ビアラ ホス液 剤（つ づき）				桑	畑地・一年生雑草	春期萌芽前及び夏切後（雑草生育期）	500 ～ 750m/ 〔散布水量 100 ～ 150 m/〕	雑草茎葉散布 〔本剤およびビアラホスを 含む農薬の総使用回数 3 回以内〕	
				公園・ 庭園・ 堤とう ・駐車 場・道 路・運 動場・ 宅地・ のり面 等	一年生雑草	雑草生育期（草丈 30cm以下）	750 ～ 1,000m/ 〔散布水量 100 ～ 150 m/〕		
					多年生雑草				


新登録生育調節剤一覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課

平成4年5月1日～4年10月31日

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物	使用目的	使用時期	使用量	使用方法	登録会社
イナベ ンフィ ド粒剤	箱セリ ード粒 剤	4'-クロロ 2'- (α -ヒ ドロキシベ ンジル)イ ソニコチ ンアニリ ド……4.0%	粒 剤	水 稲	下位節間 短縮によ る倒伏軽 減	移植前日 ～移植当 日	育苗箱(30 ×60×3cm 使用土壌約 5l)1箱 当たり75～ 100g.	育苗箱の苗の上から均一 に散布する 〔本剤およびイナベンフ ィドを含む農薬の総使 用回数2回以内(本剤 は1回)〕	㈱アグロス
ウニコ ナゾー ルP複 合肥料	スミシ ョート 14, コープ ショー ート14, コープ ショー ートA 14	(E)-(S)- 1-(4-クロ ロフェニル) -4,4-ジメ チル-2- (1H-1,2, 4-トリアゾ ール-1-イ ル)ペンタ -1-エン-3 -オール …0.012%	複 合 肥 料	水 稲	節間短縮 による倒 伏軽減	出穂25～ 10日前	7～10 kg/10a	湛水散布 〔本剤およびウニコナゾ ールPを含む農薬の総 使用回数〕	住友化学工 業(株), コー プケミカル (株), 日本耕 土産業(株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適作物	使用目的	使用時期	使用量	使用方法	登録会社
ユニコナゾールP複合肥料	スミシヨート21, コープシヨート21, コープシヨートA21	(E)-(S)-1-(4-クロロフェニル)-4,4-ジメチル-2-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)ペンター-1-エン-3-オール ...0.0080%	複合肥料	水稲	節間短縮による倒伏軽減	出穂25～20日前	10～15 kg/10a	湛水散布 〔本剤およびユニコナゾールPを含む農薬の総使用回数1回〕	住友化学工業(株), コーベケミカル(株), 日本耕土産業(株)



水田除草に一発解答。

効きめに、安全性に、実績が光るフジグラス。



初・中期一発処理除草剤

フジグラス®粒剤

®:「フジグラス」は登録商標です。

●フジグラス粒剤の特長

- ① 幅広い雑草にすぐれた効果を示します。
- ② 多年生の難防除雑草にもよく効きます。
- ③ 処理適期幅が広く、散布に余裕があります。
- ④ 抑草期間が長く、一発処理ができます。
- ⑤ 水稲に安全性が高く、安心して使えます。

●使用薬量

10アール当り 3 kg。

●使用適期

田植後5日～15日(ノビエ2.5葉期)が使用時期ですが、ノビエ2葉期の処理がもっともすぐれた効果を発揮します。



フジグラス普及会
日本農薬株式会社 デュボン ジャパン リミテッド
アイ・シー・アイ・ジャパン株式会社
事務局：日本農薬株式会社 東京都中央区日本橋1丁目2番



水田除草 新時代。