

# 平成4年度水稲作関係 除草剤試験成績概要

財団法人 日本植物調節剤研究協会 技術部

平成4年度水稲作関係除草剤試験成績中央検討会は、平成4年12月9～10日の2日間、植調会館会議室において開催された。なお、ジャンボ剤試験成績中央検討会は、平成4年10月8日植調会館会議室にて開催された。また、適1試験は、平成4年10月9日植調会館にて開催された。これらの成果の概要を報告する。

## 1) 第1次適用性試験(適1)成績について

平成4年度の適1試験は、北海道地域(植調北海道試験地)、東北地域(植調古川試験地)、北陸地域(植調新潟第1試験地)、関東地域(植調研究所)、近畿地域(植調滋賀試験地)、中国地域(植調広島試験地)、九州地域(植調佐賀試験地)の全国7地域で43薬剤(のべ230点)について実施した。その判定結果は、第1表のとおりである。

## 2) 第2次適用性試験(適2)成績について

平成4年度の適2試験は、次のような試験区分で実施した。すなわち、稚苗移植栽培の移植前土壌混和处理(Ⅱ-1, 8剤91点)、移植前後土壌処理(Ⅱ-2, 8剤86点)、移植後土壌処理(Ⅱ-3, 2剤43点)、茎葉兼土壌処理(Ⅱ-4, 4剤34点)、適用時期拡大(Ⅱ-5,

6剤54点)、特殊雑草防除(Ⅱ-6, のべ35剤114点)、湛水直播栽培用(Ⅲ-1, 5剤37点)、乾田直播栽培用(Ⅲ-2, 3剤9点)、畦畔雑草用(Ⅳ, 9剤55点)、耕起前雑草用(Ⅴ, 3剤16点)、初期一発処理剤(Ⅶ-1, 35剤297点)、初・中期一発処理剤(Ⅶ-2, 36剤365点)、長期持続型一発処理剤(Ⅶ-3-1), 9剤53点)、一年生持続型除草剤(Ⅶ-3-2), 2剤28点)、少量散布(Ⅷ, 2剤6点)の総のべ点数が1,288点であった。これら適2試験の判定結果は第2表、使用基準は第3表のとおりである。

## 3) ジャンボ剤適用性試験成績について

平成4年度の適用性試験は、次のような試験区分で実施した。すなわち、稚苗移植栽培の移植前後土壌処理(Ⅱ-2, 5剤87点)、移植後土壌処理(Ⅱ-3, 3剤47点)、適用時期拡大(Ⅱ-5, 1剤22点)、初期一発処理剤(Ⅶ-1, 23剤341点)、初・中期一発処理剤(Ⅶ-2, 15剤231点)の総のべ点数が728点であった。これら適用性試験の判定結果は第3表、使用基準は第5表のとおりである。

第1表 平成4年度水稻作関係除草剤適1試験成績判定結果一覧表

| No | 薬 剤 名・剤 型<br>〔委託者名〕          | 有効成分および<br>含有率 (%)                        | 試験実施場所別総合評価 |    |     |     |    |    |    | 中 央 判 定 結 果<br>〔今後の課題点等〕                             |
|----|------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----|-----|-----|----|----|----|------------------------------------------------------|
|    |                              |                                           | 北海道         | 古川 | 新潟1 | 植調研 | 滋賀 | 広島 | 佐賀 |                                                      |
| 1  | AC-014A 粒<br>〔日本サイアナミッド〕     | 新規 0.2<br>既知 1.5                          | ○           | ◎  | ○   | ○   | ○  | □  | □  | 寒地～温暖地東部○, ノビエ1.5Lまで(初期一発処理剤)                        |
| 2  | AC-014B-1kg 粒<br>〔日本サイアナミッド〕 | 未公開                                       | ○           | ◎  | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  | 全域○, ノビエ2Lまで(初期一発処理剤)                                |
| 3  | AC-014C 粒<br>〔日本サイアナミッド〕     | 新規 0.2<br>既知 1.0<br>既知 2.0                | ◎           | ◎  | ◎   | ◎   | ◎  | ○  | ○  | 全域○, ノビエ2Lまで(初期一発処理剤)                                |
| 4  | AC-014D-1kg 粒<br>〔日本サイアナミッド〕 | 未公開 1.2                                   | ○           | ◎  | ○   | ○   | ○  | □  | △  | 寒地～温暖地東部○, ノビエ1.5Lまで(初期一発処理剤)                        |
| 5  | AC-014E-1kg 粒<br>〔日本サイアナミッド〕 | 新規 0.6<br>既知 21.0                         | ○           | ◎  | ○   | □   | □  | ○  | □  | 全国□, ノビエ2.5Lまで(初・中期一発処理剤)<br>〔効果〕                    |
| 6  | CGM-71 フロアブル<br>〔三菱油化〕       | プレチラクロール 5.0<br>ベンゾフェナップ 20.0             | □           | ◎  | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  | 寒冷地以西○, ノビエ1Lまで<br>(一年生雑草, マツバイ, ホタルイ, ウリカワ, ミズガヤツリ) |
| 7  | CH-904 粒<br>〔中外製薬〕           | CH-900 0.7<br>既知 0.25<br>新規 0.4<br>既知 1.5 | ◎           | ◎  |     |     |    |    |    | 寒地・寒冷地北部◎, ノビエ2.5Lまで(初・中期一発処理剤)                      |
| 8  | CH-940㊦ 粒<br>〔中外製薬〕          | CH-900 0.7<br>既知 0.17<br>新規 0.4<br>既知 1.5 |             |    | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  | 温暖地以西○, ノビエ2.5Lまで<br>(初・中期一発処理剤)                     |
| 9  | CH-906 粒<br>〔中外製薬〕           | CH-900 1.0<br>既知 0.25<br>既知 2.0           | ○           | ◎  |     |     |    |    |    | 寒地・寒冷地北部○, ノビエ2.5Lまで(初・中期一発処理剤)                      |
| 10 | CH-906㊦ 粒<br>〔中外製薬〕          | CH-900 1.0<br>既知 0.17<br>既知 2.0           |             |    | ◎   | ○   | ◎  | ○  | ○  | 温暖地以西○, ノビエ2.5Lまで<br>(初・中期一発処理剤)                     |
| 11 | CH-907 粒<br>〔中外製薬〕           | CH-900 1.0<br>既知 0.3<br>既知 5.0            | ○           | ◎  | ◎   | ◎   | ◎  | ◎  | ○  | 全域○, ノビエ2.5Lまで(初・中期一発処理剤)                            |

| No. | 薬 剤 名・剤 型<br>〔 委 託 者 名 〕             | 有効成分および<br>含有率 (%)                                           | 試験実施場所別総合評価 |        |             |             |        |        |        | 中 央 判 定 結 果<br>〔 今 後 の 課 題 点 等 〕               |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|--------|--------|------------------------------------------------|
|     |                                      |                                                              | 北<br>海<br>道 | 古<br>川 | 新<br>潟<br>1 | 植<br>調<br>研 | 滋<br>賀 | 広<br>島 | 佐<br>賀 |                                                |
| 12  | DEH-112<br>マイクロエマルジョン<br>〔ダウ・エランコ日本〕 | DEH-112 3<br>(成分未公開)                                         | □           | △      |             | □           |        | □      | ○      | 全域□, ノビエ4.5 Lまで(ノビエに対する生育期処理剤)<br>〔混合母剤としての検討〕 |
| 13  | DEH-BAS<br>マイクロエマルジョン<br>〔ダウ・エランコ日本〕 | DEH-112 3<br>BAS-3510(Na) 20                                 | □           | ○      |             | ○           |        | ○      | △      | 全域○, ノビエ4.5 Lまで(一年生雑草, 多年生雑草に対する生育期処理剤)        |
| 14  | DPX-47CGD-1 kg 粒<br>〔ゴルフ普及会: 武田薬品〕   | DPX-47 0.06<br>DPX-84 0.3<br>プレチラクロール 4.5<br>ジメタメトリン 0.6     | ○           | ◎      | ○           | ○           | ◎      | ○      | ○      | 全域○, ノビエ2 Lまで(初期一発処理剤)                         |
| 15  | DPX-47K-1 kg 粒<br>〔クミアイ化学〕           | ベンチオカーブ 15.0<br>メフェナセット 4.5<br>ベンスルフロンメチル 0.3<br>DPX-47 0.06 | ○           | ◎      |             |             |        | ○      | ○      | ○, ノビエ2.5 Lまで(初・中期一発処理剤)                       |
| 16  | DPX-47K①-1 kg 粒<br>〔クミアイ化学〕          | ベンチオカーブ 15.0<br>メフェナセット 3.0<br>ベンスルフロンメチル 0.3<br>DPX-47 0.06 | ○           | ◎      |             |             |        | ○      | ○      | ○, ノビエ2.5 Lまで(初・中期一発処理剤)                       |
| 17  | DPX-47MN-1 kg 粒<br>〔三菱油化〕            | ジメピペレート 15.0<br>ベンスルフロンメチル 0.3<br>DPX-47 0.06<br>ペンフレセート 4.5 | ○           | ◎      | ◎           | □           | ○      | ○      | ○      | 全域○, ノビエ2.5 Lまで(初・中期一発処理剤)                     |
| 18  | DPX-47TD-1 kg 粒<br>〔デュポン・ジャパン〕       | DPX-47 0.06<br>ベンスルフロンメチル 0.3<br>メフェナセット 10<br>ダイムロン 4.5     | ◎           | ◎      | ◎           | ◎           | ◎      | ◎      | ○      | 全域◎, ノビエ2.5 Lまで(初・中期一発処理剤)                     |
| 19  | DPX-47SC 粒<br>〔日本農薬〕                 | エスプロカルブ 7.0<br>ベンスルフロンメチル 0.1<br>DPX-47 0.02                 | ○           | ◎      | ◎           | □           | ○      | ◎      | □      | 全域○, ノビエ2.5 Lまで(初・中期一発処理剤)                     |
| 20  | Hoe-404 粒<br>〔ヘキストジャパン〕              | 未公開 0.08                                                     | □           |        | □           | □           |        | ○      | ○      | 全域□, 一年生雑草, マツバイ, ホタルイ, ウリカワ<br>〔混合母剤としての検討〕   |

| No. | 薬 剤 名 ・ 剤 型<br>〔 委 託 者 名 〕   | 有効成分および<br>含有率 (%)                         | 試験実施場所別総合評価 |        |             |             |        |        |        | 中 央 判 定 結 果<br>( 今 後 の 課 題 点 等 )                       |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------|
|     |                              |                                            | 北<br>海<br>道 | 古<br>川 | 新<br>潟<br>1 | 植<br>調<br>研 | 滋<br>賀 | 広<br>島 | 佐<br>賀 |                                                        |
| 21  | HOK-915D 粒<br>〔 北興化学 〕       | ベンスルフロメチル 0.25<br>ジメピペレート 5.0<br>ジチオピル 0.2 | ◎           | ◎      |             |             |        |        |        | 寒地・寒冷地北部◎, ノビエ2L<br>まで( 初期一発処理剤 )                      |
| 22  | HOK-915D① 粒<br>〔 北興化学 〕      | ベンスルフロメチル 0.17<br>ジメピペレート 5.0<br>ジチオピル 0.2 |             |        | ○           | ○           |        |        | □      | 寒冷地南部～温暖地○, ノビエ2<br>Lまで( 初期一発処理剤 )<br>〔 ノビエの効果( 暖地 ) 〕 |
| 23  | HOK-922 粒<br>〔 北興化学 〕        | 未公開 計 5.07                                 |             |        | ○           | ○           |        | ○      | □      | 寒冷地南部以西○, ノビエ1.5L<br>まで( 初期一発処理剤 )                     |
| 24  | KUH-921-1kg 粒<br>〔 クミアイ化学 〕  | 新規 0.3<br>ベンスルフロメチル 0.3<br>DPX-47 0.06     | □           | ◎      |             | ○           |        | ○      | □      | 全域○, ノビエ3Lまで( 初・中<br>期一発処理剤 )<br>〔 効果 〕                |
| 25  | KUH-922-1kg 粒<br>〔 クミアイ化学 〕  | 新規 0.3<br>新規 0.6                           | □           | ◎      | ○           | ○           | ○      | ○      | △      | 全域○, ノビエ3Lまで( 初・中<br>期一発処理剤 )<br>〔 効果・薬害 〕             |
| 26  | KUH-926①-1kg 粒<br>〔 クミアイ化学 〕 | 新規 0.3<br>ベンスルフロメチル 0.75                   | □           | ◎      |             |             |        |        |        | □, ノビエ3Lまで( 初・中期一<br>発処理剤 )<br>〔 効果 〕                  |
| 27  | KUH-926-1kg 粒<br>〔 クミアイ化学 〕  | 新規 0.3<br>ベンスルフロメチル 0.5                    | □           | ◎      | ○           | ○           | ○      | ○      | △      | 全域○, ノビエ3Lまで( 初・中<br>期一発処理剤 )<br>〔 効果 〕                |
| 28  | MK-243 粒<br>〔 三菱化成 〕         | 未公開( 新規 ) 0.5                              | □           | ◎      | ○           | □           | △      | □      | △      | 全域□, ノビエ2.5Lまで<br>〔 混合母剤としての検討 〕                       |
| 29  | MK-243D 粒<br>〔 三菱化成 〕        | 未公開( 2 種 ) 0.75                            | □           | ◎      |             |             |        |        |        | 寒地, 寒冷地北部○, ノビエ2.5<br>Lまで( 初・中期一発処理剤 )                 |
| 30  | MK-243D① 粒<br>〔 三菱化成 〕       | 未公開( 2 種 ) 0.67                            |             |        | ○           | ○           | □      | ○      | ○      | 寒冷地南部以西○, ノビエ2.5L<br>まで( 初・中期一発処理剤 )                   |
| 31  | MK-243T 粒<br>〔 三菱化成 〕        | 未公開( 2 種 ) 0.8                             | ○           | ◎      | ○           | ○           | ○      | ○      | ○      | 全域○, ノビエ2.5Lまで( 初・<br>中期一発処理剤 )                        |
| 32  | MT-145-1kg 粒<br>〔 三井東圧化学 〕   | 未公開( 新規 ) 3                                | ○           | ○      |             | □           |        |        | △      | □<br>〔 混合母剤としての検討 〕                                    |
| 33  | MT-146-1kg 粒<br>〔 三井東圧化学 〕   | 未公開( 新規 ) 2                                | ○           | ○      |             | □           |        |        | △      | □<br>〔 混合母剤としての検討 〕                                    |

| No. | 薬 剤 名 ・ 剤 型<br>〔 委 託 者 名 〕   | 有効成分および<br>含有率 (%)                                         | 試験実施場所別総合評価 |        |         |             |        |        |        | 中 央 判 定 結 果<br>( 今 後 の 課 題 点 等 )                    |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|-------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------|
|     |                              |                                                            | 北<br>海<br>道 | 古<br>川 | 新潟<br>1 | 植<br>調<br>研 | 滋<br>賀 | 広<br>島 | 佐<br>賀 |                                                     |
| 34  | MT-245-1 kg 粒<br>〔 三井東圧化学 〕  | 未公開<br>新規 (MT-145) 3<br>既知 9                               | ○           | ○      |         | ○           |        |        | △      | 温暖地以北○, ノビエ1 Lまで<br>( 一年生雑草, マツバイ, ホタル<br>イ )       |
| 35  | NC-311DCG 粒<br>〔 日産化学 〕      | ピラゾスルフロンエチル<br>0.07<br>DEH-112 0.6<br>プレチラクロール 1.5         | □           | ◎      | ○       | □           | ○      | □      | △      | 全域○, ノビエ3 Lまで ( 初・中<br>期一発処理剤 )<br>〔 ノビエに対する効果 〕    |
| 36  | NC-311KS-1 kg 粒<br>〔 日産化学 〕  | 未公開 9.21<br>( 既知3種混合 )                                     | ◎           | ◎      | ◎       | ○           | ○      | □      | △      | 全域○, ノビエ1.5 Lまで ( 初期<br>一発処理剤 )<br>〔 効果の確認 ( 暖地 ) 〕 |
| 37  | NC-339 粒<br>〔 日産化学 〕         | 未公開 0.57                                                   | △           | ○      | ○       | ○           | □      | ○      | ○      | 寒冷地以西○, ノビエ2.5 Lまで<br>( 初・中期一発処理剤 )                 |
| 38  | NSK-860 粒<br>〔 徳山曹達 〕        | 未公開 1.55                                                   | □           | ◎      |         |             |        |        |        | 寒地・寒冷地北部○, ノビエ3 L<br>まで ( 初・中期一発処理剤 )               |
| 39  | NSK-860① 粒<br>〔 徳山曹達 〕       | 未公開 1.47                                                   |             |        | ◎       | □           | ○      | ○      | ○      | 寒冷地南部以西○, ノビエ3 Lま<br>で ( 初・中期一発処理剤 )                |
| 40  | TH-913ADE-1 kg 粒<br>〔 武田薬品 〕 | イマズスルフロン 0.9<br>DEH-112 1.8<br>プレチラクロール 4.5<br>ジメタメトリン 0.6 | △           | ◎      | ○       | ○           | □      | ○      | ○      | 寒冷地以西○, ノビエ3 Lまで<br>( 初・中期一発処理剤 )                   |
| 41  | TH-913SN 粒<br>〔 武田薬品 〕       | イマズスルフロン ( TH<br>-913 ) 0.3<br>メフェナセット 3.5<br>ダイムロン 5.0    | ○           | ◎      | ◎       | ◎           | ○      | ◎      | ○      | 全域◎, ノビエ2.5 Lまで ( 初・<br>中期一発処理剤 )                   |
| 42  | TH-913HSK-1 kg 粒<br>〔 武田薬品 〕 | イマズスルフロン 0.9<br>HW-52 15.0<br>ダイムロン 15.0                   | ○           | ◎      | ○       | ○           | ○      | ◎      | ○      | 全域○, ノビエ2 Lまで ( 初期一<br>発処理剤 )                       |
| 43  | SW-921 粒<br>〔 三共 〕           | 未公開 ( 5種 ) 8.2                                             |             | ◎      |         |             | ◎      | ○      | ○      | ○, ノビエ2 Lまで ( 初期一発処<br>理剤 )                         |

注) 判定欄の記号については, ◎; 極めて有望, ○; 有望, □; 可能性あり, △; 再検討, ×; 見込なし, を表わす。

第2表 平成4年度水稻作関係除草剤適2試験成績判定結果一覧表

| 区 分                 | 判 定 | 実 | 実 ・ 継                                                                                    | 継 | 継 ? | 中止 |
|---------------------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----|
| II-1. 移植前土壌混和<br>処理 |     |   | CG-113乳, CGM-71フロアブ<br>ル, CGS-88乳, HOK-913乳,<br>KPP-314フロアブル, KPP-<br>2005フロアブル, RPC-208 |   |     |    |

| 判定<br>区分                     | 実 | 実・継                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 継                                                  | 継? | 中止 |
|------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|----|
| II-1. 移植前土壌混和<br>処理(つづき)     |   | 乳, TCG-128乳.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |    |    |
| II-2. 移植前後土壌処<br>理           |   | CG-113-1kg粒, CGM-71<br>フロアブル, KPP-314粒,<br>KPP-314フロアブル, KPP-<br>2005フロアブル, MO-338-<br>1kg粒, MTS-1フロアブル,<br>MTS-1-1kg粒.                                                                                                                                                                                 |                                                    |    |    |
| II-3. 移植後土壌処理                |   | TSR-121フロアブル.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Y-873-1kg粒.                                        |    |    |
| II-4. 茎葉兼土壌処理                |   | モリネットSM-1kg粒.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DEH-112粒, DEH-112-1<br>kg粒, DEH・BASマイクロエマ<br>ルジョン. |    |    |
| II-5. 適用時期拡大                 |   | NC-311NS粒, NS-177粒,<br>TH-913⑩粒, モリネットSM<br>-1kg粒.                                                                                                                                                                                                                                                      | DEH-112マイクロエマルジョ<br>ン, DEH・BASマイクロエマル<br>ジョン.      |    |    |
| II-6-(1) クログワイ<br>対象         |   | DM-72粒, DPX-84MN粒,<br>NC-326粒, <u>NSK-855フロア<br/>ブル.</u><br>(但し, 連年施用については継続<br>検討)<br><br>DPX-84MN⑩粒, JC-940粒,<br>KUH-883粒, KUH-883⑩粒,<br>NC-311NS粒, NC-311SC<br>⑩粒, NC-329粒, NJM-754<br>粒, NS-177粒, SKH-8602<br>⑩粒.<br>(連年施用についても「実・継」)<br><br>NS-112粒, TH-913⑩粒.<br>(連年施用についても徹底防除に<br>用いる剤として「実・継」) | NC-326⑩粒, NSK-855⑩フ<br>ロアブル.                       |    |    |
| II-6-(2) オモダカ対<br>象          |   | NC-326粒, NSK-855フロア<br>ブル, <u>NSK-855⑩フロアブル.</u><br>(但し, 連年施用については継続<br>検討)<br><br>KUH-883⑩粒, NC-311SC<br>⑩粒, NC-329粒, NS-177<br>粒, SKH-8602⑩粒.<br>(連年施用についても「実・継」)                                                                                                                                     | NC-326⑩粒.                                          |    |    |
| II-6-(5) シズイ対象               |   | JC-940粒, NC-311R粒.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |    |    |
| II-6-(6) エゾノサヤ<br>ヌカグサ対<br>象 |   | DPX-84MN粒, <u>NC-311HW<br/>粒.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |    |    |
| II-6-(7) クサネム対<br>象          |   | BAS-3510(Na)⑩液.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BAS-3510(Na)粒.                                     |    |    |
| II-6-(8) コウキヤガ<br>ラ対象        |   | NC-311CG⑩粒, NC-311S<br>C⑩粒.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |    |    |

| 区 分 判 定            | 実 | 実 ・ 継                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 継                                                                                                                                                                                                                     | 継 ? | 中止 |
|--------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Ⅲ-1. 湛水直播          |   | KUH-883㊦粒, NC-311HW粒, NC-311HW-1kg粒, NC-311SC㊦粒, TH-913HSK-1kg粒.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |     |    |
| Ⅲ-2. 乾田直播          |   | KUH-883㊦粒, KUH-914乳.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUH-911液, KUH-911Aフロアブル                                                                                                                                                                                               |     |    |
| Ⅳ 畦畔雑草             |   | Hoe-86610液, Hoe-866-3H水和, HSW-9106液, Mon-6069水溶, MR-29水溶, MW-851液, ULV-03液.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUH-913液, SUM-302顆粒性水和.                                                                                                                                                                                               |     |    |
| V 耕起前雑草            |   | Hoe-866液, Hoe-86610液.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SUM-302顆粒性水和.                                                                                                                                                                                                         |     |    |
| Ⅶ-1. 初期一発処理剤       |   | DPX-84CG-1kg粒, DPX-84CG㊦-1kg粒, DPX-84M粒, DPX-84M㊦粒, KUH-883粒, KUH-883-1kg粒, KUH-883㊦粒, KUH-883㊦-1kg粒, NC-311CG粒, NC-311CG-1kg粒, NC-311CG㊦粒, NC-311CG㊦-1kg粒, NC-311HW粒, NC-311HW-1kg粒, NSK-855フロアブル, NSK-855㊦フロアブル, SKH-8602㊦粒, SL-498㊦-1kg粒, SL-498-1kg粒, SL-970フロアブル, SW-907粒, TDS-888フロアブル, TDS-888㊦フロアブル, TH-913ADS㊦粒, TH-913HSK-1kg粒, TH-913STフロアブル, TSM-612フロアブル. | DPX-47CGD-1kg粒, DPX-47K-1kg粒, DPX-47K㊦-1kg粒, SW-921粒.                                                                                                                                                                 |     |    |
| Ⅶ-2. 初・中期一発処理剤     |   | DPX-84MN粒, DPX-84MN㊦粒, DPX-84SC-1kg粒, DPX-84SC㊦-1kg粒, DPX-84T粒, DPX-84T-1kg粒, DPX-84TD㊦-1kg粒, KUH-883粒, NC-311SC㊦粒, NC-311SC㊦-1kg粒, NC-311T粒, NC-311T-1kg粒, NC-326㊦粒, NC-329粒, NC-329-1kg粒, TH-913SN粒, TH-913SSC粒.                                                                                                                                                     | CH-904粒, CH-904㊦粒, CH-906粒, CH-906㊦粒, CH-907粒, DJL-367-1kg粒, DPX-47K-1kg粒, DPX-47K㊦-1kg粒, DPX-47SC粒, DPX-47TD-1kg粒, NC-311DCG粒, NC-311DCD粒, NC-343粒, NC-344粒, NC-345粒, NCH-903粒, NSK-860粒, NSK-860㊦粒, TH-913ADE-1kg粒. |     |    |
| Ⅶ-3-(1) 長期持続型一発処理剤 |   | DM-72粒, DPX-84T粒, DPX-84TD㊦粒, NC-311T粒, NC-326粒.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUH-921-1kg粒, KUH-922-1kg粒, KUH-926㊦-1kg粒, KUH-926-1kg粒.                                                                                                                                                              |     |    |
| Ⅶ-3-(2) 一年生持続型除草剤  |   | CG-187粒.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CH-902粒.                                                                                                                                                                                                              |     |    |
| Ⅷ-1. 少量散布法         |   | KUH-883粒.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |     |    |
| Ⅷ-2. 少量散布          |   | CG-113粒.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |     |    |

注: 1) 本年度新規に使用基準の作成されたものは、薬剤名はアンダーラインを記した。

2) 本年度は「継?」および「中止」と判定された薬剤はなかった。

第3表 平成4年度水稻作除草剤ジャンボ剤適用性試験成績判定結果一覧表

| 区 分 判 定              | 実 | 実 ・ 継                                                                                                                                                                                                                                                                   | 継                                                                                                                     | 継 ? | 中止 |
|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| II-2. 移植前後土壌処理       |   | CG-200ジャンボ, MO-338<br>ジャンボ, MTS-1ジャンボ.                                                                                                                                                                                                                                  | CG-199ジャンボ, KPP-<br>2005ジャンボ.                                                                                         |     |    |
| II-3. 移植後土壌処理        |   | AKD-7036ジャンボ.                                                                                                                                                                                                                                                           | Y-873ジャンボ, プロメトリン<br>パック.                                                                                             |     |    |
| II-5. 茎葉兼土壌処理        |   | モリネートSMジャンボ.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |     |    |
| VII-1. 初期一発処理剤       |   | DPX-84CGジャンボ, DPX-<br>84CG㊟ジャンボ, DPX-84M<br>ジャンボ, DPX-84M㊟ジャン<br>ボ, KUH-883ジャンボ, KUH<br>-883㊟ジャンボ, NC-311C<br>CGジャンボ, NC-311CG㊟<br>ジャンボ, NSK-850Dジャン<br>ボ, NSK-850D㊟ジャンボ,<br>SL-496ジャンボ, SL-496<br>㊟ジャンボ, SL-498㊟ジャン<br>ボ, SL-498ジャンボ, SW-<br>918㊟ジャンボ, SW-918ジャ<br>ンボ. | HOK-915Dジャンボ, HOK-<br>915D㊟ジャンボ, KUH-891<br>ジャンボ, KUH-891㊟ジャン<br>ボ, NC-311SSジャンボ, SL<br>-500ジャンボ, TH-913ADS<br>㊟ジャンボ. |     |    |
| VII-2. 初・中期一発処<br>理剤 |   | DPX-84SCジャンボ, DPX-<br>84SC㊟ジャンボ, DPX-84T<br>ジャンボ, DPX-84TD㊟ジャン<br>ボ, NC-311Rジャンボ, NC-<br>311SC㊟ジャンボ, NC-311<br>Tジャンボ.                                                                                                                                                   | NC-326㊟ジャンボ, NSK-<br>860-Aジャンボ, NSK-860<br>-Bジャンボ, NSK-860㊟-A<br>ジャンボ, NSK-860㊟-Bジャ<br>ンボ.                            |     |    |

注: 1) 本年度新規に使用基準の作成されたものは、薬剤名はアンダーラインを記した。

2) 本年度は「継?」および「中止」と判定された薬剤はなかった。

新刊

# 改訂 雑草学用語集

日本雑草学会／編集・発行  
B5判 234頁 定価7,210円(税込)

雑草を研究する上で必須の文献として高い評価を受けてきた旧版を大幅に改訂。雑草学研究に必要な用語はこれ1冊でこと足りるようという編集方針のもとに、第I編 学術用語編では現時点で必要な用語、解説用語を新たに選び直した。さらに第II編 雑草名編では新たに100種を追加し、第III編 除草剤名編では新たな薬剤も加え、わが国で登録されたことのある薬剤すべてを網羅した。

呈内容見本

全国農村教育協会

〒110 東京都台東区台東1-26-6(植調会館) 電話/03-3833-1821 FAX/03-3833-1665



第4表 平成4年度水稲関係除草剤使用基準一覧表

## II-1 移植前土壌混和処理

| II-1 移植の工法、処理と処理    |        |          |    |        |     |    |    |     |   |   |   |        |     | 処理時期          | 使用量・製品 | 砂壌土 | 壤土 | 埴壌土 | 減水深<br>cm/d                              | 使用上の注意 |
|---------------------|--------|----------|----|--------|-----|----|----|-----|---|---|---|--------|-----|---------------|--------|-----|----|-----|------------------------------------------|--------|
| 処理法                 | 地域名    | 作期       | ベ1 | 一年広葉マカ | オキイ | ウカ | ミカ | ハラカ | カ | モ | ヒ | 藻類表層剥離 | 1.5 |               |        | ○   | ○  | ○   | 2                                        |        |
| II-1<br>1. CG-113 乳 | 土壌混和処理 | 北海道      |    | ○      | ○   | ○  |    |     | ○ |   |   |        |     | 30~50<br>ml/a | ○      | ○   | ○  | ○   | * 混和時の水深<br>3-5cm<br><br>** 混和深<br>2-3cm |        |
|                     |        | 東北       |    | ○      | ○   | ○  |    |     | ○ |   |   |        |     |               | ○      | ○   | ○  |     |                                          |        |
|                     |        | 北陸       |    | ○      | ○   | ○  |    |     | ○ |   |   |        |     |               | ○      | ○   | ○  |     |                                          |        |
|                     |        | 関東・東山・東海 | 早  | ○      | ○   | ○  |    | ○   |   |   |   |        |     |               | ●      | ○   | ○  | ○   |                                          |        |
|                     |        |          | 普  | ○      | ○   | ○  |    | ○   |   |   |   |        |     |               | ●      | ○   | ○  | ○   |                                          |        |
|                     |        | 近畿・中国    | 早  | ○      | ○   | ○  |    | ○   |   |   |   |        |     |               |        | ○   | ○  | ○   |                                          |        |
|                     |        |          | 普  | ○      | ○   | ○  |    | ○   |   |   |   |        |     |               | ●      | ○   | ○  | ○   |                                          |        |
|                     |        | 四国       | 早  | ○      | ○   | ○  |    | ○   |   |   |   |        |     |               |        | ○   | ○  | ○   |                                          |        |
|                     |        |          | 普  | ○      | ○   | ○  |    | ○   |   |   |   |        |     |               | ●      | ○   | ○  | ○   |                                          |        |
|                     |        | 九州       | 早  | ●      | ●   | ●  |    | ●   |   |   |   |        |     | 50<br>ml/a    |        | ●   | ●  |     |                                          |        |
|                     | 普      | ○        | ○  | ○      |     |    |    |     |   |   |   |        |     | ○             | ○      |     |    |     |                                          |        |

|                            | 処理法    | 地域名      | 作期 | ベ1 | 一年広葉マカ | オキイ | ウカ | ミカ | ハラ | カ | モ | ヒ | 藻類表層剥離 | 処理時期         | 使用量・製品 | 砂壌土 | 壤土 | 埴壌土 | 減水深<br>cm/d | 使用上の注意                               |  |
|----------------------------|--------|----------|----|----|--------|-----|----|----|----|---|---|---|--------|--------------|--------|-----|----|-----|-------------|--------------------------------------|--|
| II-1<br>2. CGM-71<br>フロアブル | 土壌混和処理 | 北海道      |    | ●  | ●      | ●   | ●  |    | ●  |   |   |   |        | 植代時<br>(~-4) | 75ml/a | ●   | ●  | ●   | 2           | * 混和時の水深<br>3-5cm<br>** 混和深<br>2-3cm |  |
|                            |        | 東北       |    | ●  | ●      | ●   | ●  |    |    |   |   |   |        |              | 50ml/a |     |    | ●   | 1           |                                      |  |
|                            |        | 北陸       |    | ●  | ●      | ●   | ●  | ●  |    |   |   |   |        |              |        | ●   | ●  | ●   | 2           |                                      |  |
|                            |        | 関東・東山・東海 | 早  | ●  | ●      | ●   | ●  |    |    |   |   |   |        |              |        | ●   | ●  | ●   |             |                                      |  |
|                            |        |          | 普  | ●  | ●      | ●   | ●  |    |    |   |   |   |        |              |        | ●   | ●  | ●   |             |                                      |  |
|                            |        | 近畿・中国    | 早  |    |        |     |    |    |    |   |   |   |        |              |        |     |    |     |             |                                      |  |
|                            |        |          | 普  | ●  | ●      | ●   | ●  |    |    |   |   |   |        |              |        | ●   | ●  | ●   | 1.5         |                                      |  |
|                            |        | 四国       | 早  |    |        |     |    |    |    |   |   |   |        |              |        |     |    |     |             |                                      |  |
|                            |        |          | 普  | ●  | ●      | ●   | ●  |    |    |   |   |   |        |              |        | ●   | ●  | ●   |             |                                      |  |
|                            |        | 九州       | 早  |    |        |     |    |    |    |   |   |   |        |              |        |     |    |     |             |                                      |  |
|                            |        |          | 普  |    |        |     |    |    |    |   |   |   |        |              |        |     |    |     |             |                                      |  |

|                        | 処理法    | 地域名      | 作期 | ベ1 | 一年広葉マカ | オキイ | ウカ | ミカ | ハラ | カ | モ | ヒ | 藻類表層剥離 | 処理時期    | 使用量・製品        | 砂壌土 | 壤土 | 埴壌土 | 減水深<br>cm/d | 使用上の注意 |                                                           |
|------------------------|--------|----------|----|----|--------|-----|----|----|----|---|---|---|--------|---------|---------------|-----|----|-----|-------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| II-1<br>3. CGS-88<br>乳 | 土壌混和処理 | 北海道      |    | ○  | ○      | ○   |    |    | ○  |   |   |   |        | 植代時(〜4) | 50〜75<br>ml/a | ○   | ○  | ○   | ○           | 2      | (4) 移植後の深さは避ける<br><br>混和時の水深<br>3〜5cm<br><br>混和深<br>2〜3cm |
|                        |        | 東北       |    | ○  | ○      | ○   |    | ○  | ○  |   |   |   |        |         |               | ○   | ○  | ○   |             |        |                                                           |
|                        |        | 北陸       |    | ○  | ○      | ○   |    | ○  | ○  |   |   |   |        |         |               | ○   | ○  | ○   |             |        |                                                           |
|                        |        | 関東・東山・東海 | 早  | ○  | ○      | ○   |    |    |    |   |   |   |        |         |               |     | ○  | ○   | ○           |        |                                                           |
|                        |        |          | 普  | ○  | ○      | ○   |    | ○  |    |   |   |   |        |         |               |     | ○  | ○   | ○           |        |                                                           |
|                        |        | 近畿・中国    | 早  | ○  | ○      | ○   |    | ●  |    |   |   |   |        |         |               |     | ○  | ○   | ○           |        |                                                           |
|                        |        |          | 普  | ○  | ○      | ○   |    | ○  |    |   |   |   |        |         |               | ○   | ○  | ○   | 1           |        |                                                           |
|                        |        | 四国       | 早  | ○  | ○      | ○   |    | ●  |    |   |   |   |        |         |               |     | ○  | ○   | ○           | 2      |                                                           |
|                        |        |          | 普  | ○  | ○      | ○   |    | ○  |    |   |   |   |        |         |               | ○   | ○  | ○   | 1           |        |                                                           |
|                        |        | 九州       | 早  | ○  | ○      | ○   |    | ●  |    |   |   |   |        |         |               |     | ○  | ○   | ○           | 2      |                                                           |
|                        |        |          | 普  | ○  | ○      | ○   |    | ○  |    |   |   |   |        |         |               | ○   | ○  | ○   | ○           | 1      |                                                           |

## II-1 つづき

|                         | 処理法    | 地域名      | 作期 | バI | 一年広葉マツバ | オクイ | ウカ | ミカサ | ハラタ | カクイ | ササ | ヒメシ | 藻類表層剥離 |  | 処理時期        | 使用量・製品     | 砂壌土 | 壤土 | 植土 | 植土 | 減水深<br>cm/d | 使用上の注意          |
|-------------------------|--------|----------|----|----|---------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|--------|--|-------------|------------|-----|----|----|----|-------------|-----------------|
| II-1<br>4. HOK-913<br>乳 | 土壌混和処理 | 北海道      |    | ●  | ●       | ●   |    |     |     |     |    |     |        |  | 播代時<br>(~4) | 50<br>ml/a |     | ●  | ●  | ●  | 2           | 混和時の水深<br>3-5cm |
|                         |        | 東北       |    | ●  | ●       | ●   |    |     |     |     |    |     |        |  |             |            |     |    | ●  | ●  | 1           |                 |
|                         |        | 北陸       |    | ●  | ●       | ●   |    |     |     |     |    |     |        |  |             |            | ●   | ●  | ●  | ●  | 2           |                 |
|                         |        | 関東・東山・東海 | 早  |    |         |     |    |     |     |     |    |     |        |  |             |            |     |    |    |    |             | 混和深<br>2-3cm    |
|                         |        |          | 普  | ●  | ●       | ●   |    |     |     |     |    |     |        |  |             |            | ●   | ●  | ●  | ●  |             |                 |
|                         |        | 近畿・中国    | 早  |    |         |     |    |     |     |     |    |     |        |  |             |            |     |    |    |    |             |                 |
|                         |        |          | 普  | ●  | ●       | ●   |    |     |     |     |    |     |        |  |             |            |     | ●  | ●  | ●  | 1           |                 |
|                         |        | 四国       | 早  |    |         |     |    |     |     |     |    |     |        |  |             |            |     |    |    |    |             |                 |
|                         |        |          | 普  | ●  | ●       | ●   |    |     |     |     |    |     |        |  |             |            |     | ●  | ●  | ●  |             |                 |
|                         |        | 九州       | 早  |    |         |     |    |     |     |     |    |     |        |  |             |            |     |    |    |    |             |                 |
|                         |        |          | 普  | ●  | ●       | ●   |    |     |     |     |    |     |        |  |             |            |     |    | ●  | ●  |             |                 |

|                             | 処理法    | 地域名      | 作期 | バI | 一年広葉マツバ | オクイ | ウカ | ミカサ | ハラタ | カクイ | ササ | ヒメシ | 藻類表層剥離 |  | 処理時期        | 使用量・製品     | 砂壌土 | 壤土 | 植土 | 植土 | 減水深<br>cm/d | 使用上の注意          |
|-----------------------------|--------|----------|----|----|---------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|--------|--|-------------|------------|-----|----|----|----|-------------|-----------------|
| II-1<br>5. KPP-314<br>フロアフル | 土壌混和処理 | 北海道      |    |    |         |     |    |     |     |     |    |     |        |  | 播代時<br>(~4) | 50ml<br>/a |     |    |    |    |             | 混和時の水深<br>3-5cm |
|                             |        | 東北       |    | ●  | ●       |     |    |     |     |     |    |     |        |  |             |            |     |    | ●  | ●  | 1.5         |                 |
|                             |        | 北陸       |    | ●  | ●       |     |    |     |     |     |    |     |        |  |             |            | ●   | ●  | ●  | ●  | 2           |                 |
|                             |        | 関東・東山・東海 | 早  |    |         |     |    |     |     |     |    |     |        |  |             |            |     |    |    |    |             | 混和深<br>2-3cm    |
|                             |        |          | 普  |    |         |     |    |     |     |     |    |     |        |  |             |            |     |    |    |    |             |                 |
|                             |        | 近畿・中国    | 早  |    |         |     |    |     |     |     |    |     |        |  |             |            |     |    |    |    |             |                 |
|                             |        |          | 普  |    |         |     |    |     |     |     |    |     |        |  |             |            |     |    |    |    |             |                 |
|                             |        | 四国       | 早  |    |         |     |    |     |     |     |    |     |        |  |             |            |     |    |    |    |             |                 |
|                             |        |          | 普  |    |         |     |    |     |     |     |    |     |        |  |             |            |     |    |    |    |             |                 |
|                             |        | 九州       | 早  |    |         |     |    |     |     |     |    |     |        |  |             |            |     |    |    |    |             |                 |
|                             |        |          | 普  |    |         |     |    |     |     |     |    |     |        |  |             |            |     |    |    |    |             |                 |

|                              | 処理法    | 地域名      | 作期 | バI | 一年広葉マツバ | オクイ | ウカ | ミカサ | ハラタ | カクイ | ササ | ヒメシ | 藻類表層剥離 |  | 処理時期        | 使用量・製品      | 砂壌土 | 壤土 | 植土 | 植土 | 減水深<br>cm/d | 使用上の注意          |
|------------------------------|--------|----------|----|----|---------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|--------|--|-------------|-------------|-----|----|----|----|-------------|-----------------|
| II-1<br>6. KPP-2005<br>フロアフル | 土壌混和処理 | 北海道      |    | ●  | ●       | ●   |    |     |     |     |    |     |        |  | 播代時<br>(~4) | 100<br>ml/a |     | ●  | ●  | ●  | 2           | 混和時の水深<br>3-5cm |
|                              |        | 東北       |    | ●  | ●       | ●   |    | ●   |     |     |    |     |        |  |             |             |     |    | ●  | ●  | 1.5         |                 |
|                              |        | 北陸       |    | ●  | ●       | ●   |    | ●   |     |     |    |     |        |  |             |             | ●   | ●  | ●  | ●  | 2           |                 |
|                              |        | 関東・東山・東海 | 早  |    |         |     |    |     |     |     |    |     |        |  |             |             |     |    |    |    |             | 混和深<br>2-3cm    |
|                              |        |          | 普  | ●  | ●       | ●   |    | ●   |     |     |    |     |        |  |             |             | ●   | ●  | ●  | ●  |             |                 |
|                              |        | 近畿・中国    | 早  |    |         |     |    |     |     |     |    |     |        |  |             |             |     |    |    |    |             |                 |
|                              |        |          | 普  | ●  | ●       | ●   |    | ●   |     |     |    |     |        |  |             |             |     | ●  | ●  | ●  | 1           |                 |
|                              |        | 四国       | 早  |    |         |     |    |     |     |     |    |     |        |  |             |             |     |    |    |    |             |                 |
|                              |        |          | 普  | ●  | ●       | ●   |    | ●   |     |     |    |     |        |  |             |             |     | ●  | ●  | ●  |             |                 |
|                              |        | 九州       | 早  |    |         |     |    |     |     |     |    |     |        |  |             |             |     |    |    |    |             |                 |
|                              |        |          | 普  | ●  | ●       | ●   |    |     |     |     |    |     |        |  |             |             |     |    | ●  | ●  |             |                 |

## II-1 つづき

|                        | 処理法    | 地域名      | 作期 | 元I | 一年広葉マ刈 | オ刈 | 刈刈 | ミ刈刈 | ハラ刈効 | 刈刈イ | 刈効 | ヒ刈シ | 藻類表層剥離 | 処理時期        | 使用量・製品     | 砂壌土 | 壤土 | 埴壌土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意          |
|------------------------|--------|----------|----|----|--------|----|----|-----|------|-----|----|-----|--------|-------------|------------|-----|----|-----|----|----------|-----------------|
| II-1<br>7.RPC-208<br>乳 | 土壌混和処理 | 北海道      |    | ●  | ●      | ●  |    |     | ●    |     |    |     |        | 播代時<br>(~4) | 50ml<br>/a |     | ●  | ●   | ●  | 2        | 混和時の水深<br>3-5cm |
|                        |        | 東北       |    | ●  | ●      | ●  |    |     |      |     |    |     |        |             |            |     |    | ●   | ●  |          |                 |
|                        |        | 北陸       |    | ●  | ●      | ●  |    |     |      |     |    |     |        |             |            |     |    | ●   | ●  | 1        | 混和深<br>2-3cm    |
|                        |        | 関東・東山・東海 | 早  | ●  | ●      | ●  |    | ●   |      |     |    |     |        |             |            |     | ●  | ●   | ●  |          |                 |
|                        |        |          | 普  | ●  | ●      | ●  |    | ●   |      |     |    |     |        |             |            | ●   | ●  | ●   | ●  | 2        |                 |
|                        |        | 近畿・中国    | 早  |    |        |    |    |     |      |     |    |     |        |             |            |     |    |     |    | 1        |                 |
|                        |        |          | 普  | ●  | ●      | ●  |    | ●   |      |     |    |     |        |             |            |     | ●  | ●   | ●  |          |                 |
|                        |        | 四国       | 早  |    |        |    |    |     |      |     |    |     |        |             |            |     |    |     |    |          |                 |
|                        |        |          | 普  | ●  | ●      | ●  |    | ●   |      |     |    |     |        |             |            |     | ●  | ●   | ●  |          |                 |
|                        |        | 九州       | 早  | ●  | ●      | ●  |    | ●   |      |     |    |     |        |             |            |     |    | ●   | ●  |          |                 |
|                        |        |          | 普  |    |        |    |    |     |      |     |    |     |        |             |            |     |    |     |    |          |                 |

|                        | 処理法                        | 地域名              | 作期 | 元<br>I | 一年<br>広葉<br>マ刈 | オ刈 | 刈刈 | ミ刈<br>刈 | ハラ<br>効 | 刈刈<br>イ | 刈効 | ヒム<br>シ | 藻類<br>表層<br>剥離 |             | 処理時期       | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壤土<br>1.5 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d     | 使用上<br>の注意   |  |
|------------------------|----------------------------|------------------|----|--------|----------------|----|----|---------|---------|---------|----|---------|----------------|-------------|------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|---------------------|--------------|--|
| II-1<br>8.TCG-128<br>乳 | 土<br>壤<br>混<br>和<br>処<br>理 | 北海道              |    | ○      | ○              | ○  |    |         | ○       |         |    |         |                | 播代時<br>(～4) | 50ml<br>/a | ○              | ○              | ○      | ○      | 2      | 混和時<br>の水深<br>3-5cm |              |  |
|                        |                            | 東北               |    | ○      | ○              | ○  |    | ○       |         |         |    |         |                |             |            | ○              | ○              | ○      | ○      |        |                     |              |  |
|                        |                            | 北陸               |    | ○      | ○              | ○  |    | ○       |         |         |    |         |                |             |            |                | ○              | ○      | ○      | ○      |                     | 混和深<br>2-3cm |  |
|                        |                            | 関東<br>・東山<br>・東海 | 早  | ○      | ○              | ○  |    | ○       |         |         |    |         |                |             |            |                | ○              | ○      | ○      | ○      | 1                   |              |  |
|                        |                            |                  | 普  | ○      | ○              | ○  |    | ○       |         |         |    |         |                |             |            |                | ○              | ○      | ○      | ○      | 2                   |              |  |
|                        |                            | 近畿<br>・中国        | 早  | ○      | ○              | ○  |    | ○       |         |         |    |         |                |             |            |                |                |        |        | ○      | ○                   | 1            |  |
|                        |                            |                  | 普  | ○      | ○              | ○  |    | ○       |         |         |    |         |                |             |            |                | ○              | ○      | ○      | ○      |                     |              |  |
|                        |                            | 四国               | 早  | ○      | ○              | ○  |    |         |         |         |    |         |                |             |            |                |                |        |        |        | ○                   | ○            |  |
|                        |                            |                  | 普  | ○      | ○              | ○  |    | ○       |         |         |    |         |                |             |            |                |                | ○      | ○      | ○      | ○                   |              |  |
|                        |                            | 九州               | 早  |        |                |    |    |         |         |         |    |         |                |             |            |                |                |        |        |        |                     |              |  |
|                        |                            |                  | 普  | ●      | ●              |    |    |         |         |         |    |         |                |             |            |                |                |        |        |        | ●                   | ●            |  |

## II-2 移植前後土壌処理

|                               | 処理法  | 地域名      | 作期 | 元I | 一年広葉マ刈 | オ刈 | 刈刈 | ミ刈刈 | ハラ刈効 | 知刈イ | 枳効 | ヒムシ口 | 藻類表層剥離 |                                       | 処理時期       | 使用量・製品 | 砂壌土 | 壤土 | 埴壌土 | 埴土 | 減水深<br>cm/d | 使用上の注意 |
|-------------------------------|------|----------|----|----|--------|----|----|-----|------|-----|----|------|--------|---------------------------------------|------------|--------|-----|----|-----|----|-------------|--------|
| II-2<br>1.CG-113<br>-1kg<br>粒 | 土壌処理 | 北海道      |    | ○1 | ○      | ○始 |    |     | ○始   |     |    |      |        | 播代後~-4<br>, +0~+5<br>.....<br>(元1 1L) | 100<br>g/a | 1.5    | ●   | ○  | ○   | ○  | 2           |        |
|                               |      | 東北       |    | ○1 | ○      | ○始 |    | ○始  | ○始   |     |    |      |        |                                       |            | ○      | ○   | ○  |     |    |             |        |
|                               |      | 北陸       |    | ○1 | ○      | ○始 |    | ○始  | ○始   |     |    |      |        |                                       |            | ○      | ○   | ○  |     |    |             |        |
|                               |      | 関東・東山・東海 | 早  | ○1 | ○      | ○始 |    |     |      |     |    |      |        |                                       |            | ○      | ○   | ○  |     |    |             |        |
|                               |      |          | 普  | ●1 | ●      | ●始 |    |     |      |     |    |      |        |                                       |            | ●      | ●   | ●  |     |    |             |        |
|                               |      | 近畿・中国    | 早  | ●1 | ●      | ●始 |    |     |      |     |    |      |        | 播代後~-4<br>, +0~+3<br>(元1 1L)          |            | ●      | ●   | ●  | ●   | 1  |             |        |
|                               |      |          | 普  | ●1 | ●      | ●始 |    |     |      |     |    |      |        |                                       |            | ●      | ●   | ●  |     |    |             |        |
|                               |      | 四国       | 早  | ●1 | ●      | ●始 |    |     |      |     |    |      |        |                                       |            | ●      | ●   | ●  |     |    |             |        |
|                               |      |          | 普  | ●1 | ●      | ●始 |    |     |      |     |    |      |        |                                       |            | ●      | ●   | ●  |     |    |             |        |
|                               |      | 九州       | 早  |    |        |    |    |     |      |     |    |      |        |                                       |            |        |     |    |     |    |             |        |
|                               |      | 普        | ●1 | ●  | ●始     |    |    |     |      |     |    |      |        |                                       |            |        | ●   | ●  |     |    |             |        |

## II-2 つづき

|                           | 処理法  | 地域名      | 作期 | ベI | 一年<br>広葉<br>マリイ | オウイ | クカ | ミカツ<br>判 | ヘラモ<br>効 | 知ク<br>イ | オ効 | ヒムシ<br>日 | 藻類<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期 | 使用<br>量・<br>製品    | 砂<br>壤<br>土 | 壤<br>土 | 植<br>壤<br>土 | 植<br>土 | 流水<br>深<br>cm/d | 使用上<br>の注意                |     |  |
|---------------------------|------|----------|----|----|-----------------|-----|----|----------|----------|---------|----|----------|----------------|--|------|-------------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------------|---------------------------|-----|--|
| II-2<br>2.CGM-71<br>フロアブル | 土壌処理 | 北海道      |    | ●  | ●               | ●   | ●  |          | ●        |         |    |          |                |  | +O   | 50~<br>75ml<br>/a |             | ●      | ●           | ●      | 2               | 田植同時散布可能<br>(東北・関東・東山・東海) |     |  |
|                           |      | 東北       |    | ●  | ●               | ●   | ●  |          |          |         |    |          |                |  |      |                   |             |        | ●           | ●      | 1               |                           |     |  |
|                           |      | 北陸       |    | ●  | ●               | ●   | ●  |          |          |         |    |          |                |  |      |                   |             |        | ●           | ●      | ●               |                           | 2   |  |
|                           |      | 関東・東山・東海 | 早  | ●  | ●               | ●   | ●  |          |          |         |    |          |                |  |      |                   |             | ●      | ●           | ●      | ●               |                           | 1.5 |  |
|                           |      |          | 普  | ●  | ●               | ●   | ●  |          |          |         |    |          |                |  |      |                   |             | ●      | ●           | ●      | ●               |                           |     |  |
|                           |      | 近畿・中国    | 早  |    |                 |     |    |          |          |         |    |          |                |  |      |                   |             |        |             |        |                 |                           |     |  |
|                           |      |          | 普  | ●  | ●               | ●   | ●  |          |          |         |    |          |                |  |      |                   |             | ●      | ●           | ●      | ●               |                           |     |  |
|                           |      | 四国       | 早  |    |                 |     |    |          |          |         |    |          |                |  |      |                   |             |        |             |        |                 |                           |     |  |
|                           |      |          | 普  | ●  | ●               | ●   | ●  |          |          |         |    |          |                |  |      |                   |             | ●      | ●           | ●      | ●               |                           |     |  |
|                           |      | 九州       | 早  |    |                 |     |    |          |          |         |    |          |                |  |      |                   |             |        |             |        |                 |                           |     |  |
|                           |      |          | 普  | ●  | ●               | ●   | ●  | ●        |          |         |    |          |                |  |      |                   |             | ●      | ●           | ●      | ●               |                           |     |  |

|                     | 処理法              | 地域名              | 作期 | ベI | 一年<br>広葉<br>マリン | オウイ | クカ | ミカツ | ヘラ効 | 加効<br>イ | オ効 | ヒムシ<br>ロ | 藻類<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期                       | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌<br>土 | 壤<br>土 | 植<br>壌<br>土 | 植<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の注意 |  |
|---------------------|------------------|------------------|----|----|-----------------|-----|----|-----|-----|---------|----|----------|----------------|--|----------------------------|----------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------------|--------|--|
| II-2<br>3.KPP-314 粒 | 土<br>壌<br>処<br>理 | 北海道              |    |    |                 |     |    |     |     |         |    |          |                |  | 植代後～-4<br>、+0～+3<br>(ベ11L) | 300<br>g/a     |             |        | ●           | ●      | 1.5             | (31)   |  |
|                     |                  | 東北               | ●  | 1  | ●               |     |    |     |     |         |    |          |                |  |                            |                |             | ●      | ●           | ●      | 2               |        |  |
|                     |                  | 北陸               | ●  | 1  | ●               |     |    |     |     |         |    |          |                |  |                            |                | ●           | ●      | ●           | ●      | 2               |        |  |
|                     |                  | 関東<br>・東山<br>・東海 | 早  |    |                 |     |    |     |     |         |    |          |                |  |                            |                |             |        |             |        |                 |        |  |
|                     |                  |                  | 普  |    |                 |     |    |     |     |         |    |          |                |  |                            |                |             |        |             |        |                 |        |  |
|                     |                  | 近畿<br>・中国        | 早  |    |                 |     |    |     |     |         |    |          |                |  |                            |                |             |        |             |        |                 |        |  |
|                     |                  |                  | 普  |    |                 |     |    |     |     |         |    |          |                |  |                            |                |             |        |             |        |                 |        |  |
|                     |                  | 四国               | 早  |    |                 |     |    |     |     |         |    |          |                |  |                            |                |             |        |             |        |                 |        |  |
|                     |                  |                  | 普  |    |                 |     |    |     |     |         |    |          |                |  |                            |                |             |        |             |        |                 |        |  |
|                     |                  | 九州               | 早  |    |                 |     |    |     |     |         |    |          |                |  |                            |                |             |        |             |        |                 |        |  |
|                     |                  |                  | 普  |    |                 |     |    |     |     |         |    |          |                |  |                            |                |             |        |             |        |                 |        |  |

|                            | 処理法              | 地域名                      | 作期 | ベI | 一年<br>広葉<br>マリン | オウイ | クカ | ミカツ | ヘラ効 | 加効<br>イ | オ効 | ヒムシ<br>ロ | 藻類<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期 | 使用<br>量・<br>製品            | 砂<br>壌<br>土 | 壤<br>土 | 植<br>土 | 植<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上<br>の注意 |      |
|----------------------------|------------------|--------------------------|----|----|-----------------|-----|----|-----|-----|---------|----|----------|----------------|--|------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|-----------------|------------|------|
| II-2<br>4.KPP-314<br>フロアブル | 土<br>壌<br>処<br>理 | 北海道                      |    |    |                 |     |    |     |     |         |    |          |                |  |      |                           |             |        |        |        |                 |            |      |
|                            |                  | 東北                       |    | ●1 | ●               |     |    |     |     |         |    |          |                |  |      | 植代後～-4<br>+0～+3<br>(ダ11L) | 50<br>ml/a  |        |        | ●      | ●               | 1.5        | (31) |
|                            |                  | 北陸                       |    | ●1 | ●               |     |    |     |     |         |    |          |                |  |      |                           |             | ●      | ●      | ●      | 2               |            |      |
|                            |                  | 関東<br>・東<br>山<br>・東<br>海 | 早  |    |                 |     |    |     |     |         |    |          |                |  |      |                           |             |        |        |        |                 |            |      |
|                            |                  |                          | 普  |    |                 |     |    |     |     |         |    |          |                |  |      |                           |             |        |        |        |                 |            |      |
|                            |                  | 近畿<br>・中<br>国            | 早  |    |                 |     |    |     |     |         |    |          |                |  |      |                           |             |        |        |        |                 |            |      |
|                            |                  |                          | 普  |    |                 |     |    |     |     |         |    |          |                |  |      |                           |             |        |        |        |                 |            |      |
|                            |                  | 四国                       | 早  |    |                 |     |    |     |     |         |    |          |                |  |      |                           |             |        |        |        |                 |            |      |
|                            |                  |                          | 普  |    |                 |     |    |     |     |         |    |          |                |  |      |                           |             |        |        |        |                 |            |      |
|                            |                  | 九州                       | 早  |    |                 |     |    |     |     |         |    |          |                |  |      |                           |             |        |        |        |                 |            |      |
|                            |                  |                          | 普  |    |                 |     |    |     |     |         |    |          |                |  |      |                           |             |        |        |        |                 |            |      |

## II-2 つづき

|                             | 処理法  | 地域名      | 作期 | 元I | 一年広葉マツ | オウゴン | ミナミツ | ハナツ | カウイ | カウイ | ヒムシ | 藻類表層剥離 | 処理時期                      | 使用量・製品      | 砂土 | 壤土 | 埴土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意 |
|-----------------------------|------|----------|----|----|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|--------|---------------------------|-------------|----|----|----|----|----------|--------|
| II-2<br>5.KPP-2005<br>フロアブル | 土壌処理 | 北海道      |    | ●1 | ●      | ●始   |      |     |     |     |     |        | 植代後~-4<br>+0~+3<br>(元I L) | 100<br>ml/a | ●  | ●  | ●  | ●  | 2        | (31)   |
|                             |      | 東北       |    | ●1 | ●      | ●始   | ●始   |     |     |     |     |        |                           |             |    |    | ●  | ●  | 1.5      |        |
|                             |      | 北陸       |    | ●1 | ●      | ●始   | ●始   |     |     |     |     |        |                           |             | ●  | ●  | ●  | ●  | 2        |        |
|                             |      | 関東・東山・東海 | 早  |    |        |      |      |     |     |     |     |        |                           |             |    |    |    |    |          |        |
|                             |      |          | 普  | ●1 | ●      | ●始   | ●始   |     |     |     |     |        |                           |             | ●  | ●  | ●  | ●  |          |        |
|                             |      | 近畿・中国    | 早  |    |        |      |      |     |     |     |     |        |                           |             |    |    |    |    |          |        |
|                             |      |          | 普  | ●1 | ●      | ●始   | ●始   |     |     |     |     |        |                           |             | ●  | ●  | ●  | ●  | 1        |        |
|                             |      | 四国       | 早  |    |        |      |      |     |     |     |     |        | 植代後~-4<br>+0              |             |    |    |    |    |          |        |
|                             |      |          | 普  | ●1 | ●      | ●始   | ●始   |     |     |     |     |        |                           |             | ●  | ●  | ●  | ●  |          |        |
|                             |      | 九州       | 早  |    |        |      |      |     |     |     |     |        |                           |             |    |    |    |    |          |        |
|                             |      |          | 普  | ●  | ●      | ●    |      |     |     |     |     |        |                           |             |    |    | ●  | ●  |          |        |

|                               | 処理法  | 地域名      | 作期 | 元I | 一年広葉マツ | オウゴン | ミナミツ | ハナツ | カウイ | カウイ | ヒムシ | 藻類表層剥離 | 処理時期                      | 使用量・製品     | 砂土 | 壤土 | 埴土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意 |
|-------------------------------|------|----------|----|----|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|--------|---------------------------|------------|----|----|----|----|----------|--------|
| II-2<br>6.MO-338<br>-1kg<br>粒 | 土壌処理 | 北海道      |    | ○1 | ○      |      |      |     |     |     |     |        | 植代後~-4<br>+0~+6<br>(元I L) | 100<br>g/a | ○  | ○  | ○  | ○  | 2        |        |
|                               |      | 東北       |    | ○1 | ○      |      |      |     |     |     |     |        |                           |            | ○  | ○  | ○  | ○  |          |        |
|                               |      | 北陸       |    | ○1 | ○      |      |      |     |     |     |     |        |                           |            | ○  | ○  | ○  | ○  |          |        |
|                               |      | 関東・東山・東海 | 早  | ●1 | ●      |      |      |     |     |     |     |        | 植代後~-4<br>+0~+3<br>(元I L) |            | ●  | ●  | ●  | ●  |          |        |
|                               |      |          | 普  | ●1 | ●      |      |      |     |     |     |     |        |                           |            | ●  | ●  | ●  | ●  |          |        |
|                               |      | 近畿・中国    | 早  | ●1 | ●      |      |      |     |     |     |     |        |                           |            | ●  | ●  | ●  | ●  | 1        |        |
|                               |      |          | 普  | ●1 | ●      |      |      |     |     |     |     |        |                           |            | ●  | ●  | ●  | ●  | 1.5      |        |
|                               |      | 四国       | 早  | ●1 | ●      |      |      |     |     |     |     |        |                           |            | ●  | ●  | ●  | ●  | 1        |        |
|                               |      |          | 普  | ●1 | ●      |      |      |     |     |     |     |        |                           |            | ●  | ●  | ●  | ●  | 1.5      |        |
|                               |      | 九州       | 早  | ○1 | ○      |      |      |     |     |     |     |        | 植代後~-4<br>+0~+6<br>(元I L) |            | ○  | ○  | ○  | ○  | 1        |        |
|                               |      |          | 普  | ○1 | ○      |      |      |     |     |     |     |        |                           |            | ○  | ○  | ○  | ○  | 2        |        |

|                          | 処理法  | 地域名      | 作期 | 元I | 一年広葉マツ | オウゴン | ミナミツ | ハナツ | カウイ | カウイ | ヒムシ | 藻類表層剥離 | 処理時期                      | 使用量・製品      | 砂土 | 壤土 | 埴土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意                        |
|--------------------------|------|----------|----|----|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|--------|---------------------------|-------------|----|----|----|----|----------|-------------------------------|
| II-2<br>7.MTS-1<br>フロアブル | 土壌処理 | 北海道      |    | ○1 | ○      | ○始   |      |     | ○始  |     |     |        | 植代後~-4<br>+0~+5<br>(元I L) | 100<br>ml/a | ○  | ○  | ○  | ○  | 2        | 田植同時<br>散布可能<br>(東北・近畿・中国・四国) |
|                          |      | 東北       |    | ○1 | ○      | ○始   |      |     |     |     |     |        |                           |             | ○  | ○  | ○  | ○  | 2        |                               |
|                          |      | 北陸       |    | ○1 | ○      | ○始   |      |     |     |     |     |        |                           |             | ○  | ○  | ○  | ○  |          |                               |
|                          |      | 関東・東山・東海 | 早  | ○1 | ○      | ○始   |      |     |     |     |     |        |                           |             | ○  | ○  | ○  | ○  |          |                               |
|                          |      |          | 普  | ○1 | ○      | ○始   |      |     |     |     |     |        |                           |             | ○  | ○  | ○  | ○  |          |                               |
|                          |      | 近畿・中国    | 早  | ○1 | ○      | ○始   |      |     |     |     |     |        |                           |             | ○  | ○  | ○  | ○  | 1        |                               |
|                          |      |          | 普  | ○1 | ○      | ○始   |      |     |     |     |     |        |                           |             | ●  | ○  | ○  | ○  | 1.5      |                               |
|                          |      | 四国       | 早  | ○1 | ○      | ○始   |      |     |     |     |     |        | 植代後~-4<br>+0~+6<br>(元I L) |             | ○  | ○  | ○  | ○  | 1        |                               |
|                          |      |          | 普  | ○1 | ○      | ○始   |      |     |     |     |     |        |                           |             | ●  | ○  | ○  | ○  | 1.5      |                               |
|                          |      | 九州       | 早  | ●1 | ●      | ●始   |      |     |     |     |     |        |                           |             | ○  | ○  | ○  | ○  | 1        |                               |
|                          |      |          | 普  | ●1 | ●      | ●始   |      |     |     |     |     |        |                           |             | ○  | ○  | ○  | ○  |          |                               |

## II-2 つづき

|                              | 処理法  | 地域名      | 作期 | 元I | 一年広葉マツ | オシロイ | ウカ | ミカ | ハラ | カク | カク | ヒル | 藻類表層剥離 | 処理時期                  | 使用量・製品  | 砂土 | 壤土 | 植土 | 植土 | 減水深cm/d | 使用上の注意 |
|------------------------------|------|----------|----|----|--------|------|----|----|----|----|----|----|--------|-----------------------|---------|----|----|----|----|---------|--------|
| II-2<br>8.MTS-1<br>-1kg<br>粒 | 土壌処理 | 北海道      |    | ○I | ○      | ○始   |    |    | ○始 |    |    |    |        | 植代後～-4, +0～+5 (元I 1L) | 100 g/a |    | ○  | ○  | ○  | 2       |        |
|                              |      | 東北       |    | ○I | ○      | ○始   |    |    | ○始 |    |    |    |        | 植代後～-4, +0～+6 (元I 1L) |         |    | ○  | ○  | ○  |         |        |
|                              |      | 北陸       |    | ○I | ○      | ○始   |    |    | ○始 |    |    |    |        |                       |         |    | ○  | ○  | ○  |         |        |
|                              |      | 関東・東山・東海 | 早  | ●1 | ●      | ●始   |    |    |    |    |    |    |        | 植代後～-4, +0～+5 (元I 1L) |         |    | ●  | ●  | ●  |         |        |
|                              |      |          | 普  | ●1 | ●      | ●始   |    |    |    |    |    |    |        |                       |         |    | ●  | ●  | ●  |         |        |
|                              |      | 近畿・中国    | 早  | ●1 | ●      | ●始   |    |    |    |    |    |    |        |                       |         |    | ●  | ●  | ●  | 1       |        |
|                              |      |          | 普  | ●1 | ●      | ●始   |    |    |    |    |    |    |        |                       |         |    | ●  | ●  | ●  | 1.5     |        |
|                              |      | 四国       | 早  | ●1 | ●      | ●始   |    |    |    |    |    |    |        |                       |         |    | ●  | ●  | ●  | 1       |        |
|                              |      |          | 普  | ●1 | ●      | ●始   |    |    |    |    |    |    |        |                       |         |    | ●  | ●  | ●  | 1.5     |        |
|                              |      | 九州       | 早  | ●1 | ●      | ●始   |    |    |    |    |    |    |        | 植代後～-4, +0～+6 (元I 1L) |         |    | ●  | ●  | ●  | 1       |        |
|                              |      |          | 普  | ●1 | ●      | ●始   |    |    |    |    |    |    |        |                       |         |    | ●  | ●  | ●  |         |        |

## II-3 移植後土壌処理

|                            | 処理法  | 地域名      | 作期 | 元I   | 一年広葉マツ | オシロイ | ウカ | ミカ | ハラ | カク | カク | ヒル | 藻類表層剥離 | 処理時期       | 使用量・製品  | 砂土 | 壤土 | 植土 | 植土 | 減水深cm/d | 使用上の注意               |
|----------------------------|------|----------|----|------|--------|------|----|----|----|----|----|----|--------|------------|---------|----|----|----|----|---------|----------------------|
| II-3<br>1.TSR-121<br>フロアブル | 土壌処理 | 北海道      |    | ●1.5 | ●      | ●始   |    |    |    |    |    |    |        | +0～元I 1.5L | 50 ml/a |    | ●  | ●  | ●  | 2       | 田植同時散布可能(東北)<br>(33) |
|                            |      | 東北       |    | ●1.5 | ●      | ●始   |    |    |    |    |    |    |        |            |         |    | ●  | ●  | ●  |         |                      |
|                            |      | 北陸       |    | ●1.5 | ●      | ●始   |    |    |    |    |    |    |        |            |         |    | ●  | ●  | ●  |         |                      |
|                            |      | 関東・東山・東海 | 早  | ●1.5 | ●      | ●2   |    |    |    |    |    |    |        |            |         |    | ●  | ●  | ●  |         |                      |
|                            |      |          | 普  | ●1.5 | ●      | ●2   |    |    |    |    |    |    |        |            |         |    | ●  | ●  | ●  |         |                      |
|                            |      | 近畿・中国    | 早  | ●1.5 | ●      | ●始   |    |    |    |    |    |    |        |            |         |    | ●  | ●  | ●  | 1       |                      |
|                            |      |          | 普  | ●1.5 | ●      | ●始   |    |    |    |    |    |    |        |            |         |    | ●  | ●  | ●  | 1.5     |                      |
|                            |      | 四国       | 早  | ●1.5 | ●      | ●始   |    |    |    |    |    |    |        |            |         |    | ●  | ●  | ●  | 1       |                      |
|                            |      |          | 普  | ●1.5 | ●      | ●始   |    |    |    |    |    |    |        |            |         |    | ●  | ●  | ●  | 1.5     |                      |
|                            |      | 九州       | 早  |      |        |      |    |    |    |    |    |    |        |            |         |    |    |    |    |         |                      |
|                            |      |          | 普  | ●1.5 | ●      | ●始   |    |    |    |    |    |    |        |            |         |    |    | ●  | ●  | 1       |                      |

## II-3

2.Y-873-1kg 粒

「継」

## II-4 茎葉兼土壌処理

## II-4

1.DEH-112 粒

「継」

## II-4

2.DEH-112-1kg 粒

「継」

## II-4

3.DEH・BAS マイクロエマルジョン

「継」

|                                | 処理法     | 地域名      | 作期 | 元I   | 一年広葉マツ | オシロイ | ウカ | ミカ | ハラ | カク | カク | ヒル | 藻類表層剥離 | 処理時期                | 使用量・製品  | 砂土 | 壤土 | 植土 | 植土 | 減水深cm/d | 使用上の注意     |
|--------------------------------|---------|----------|----|------|--------|------|----|----|----|----|----|----|--------|---------------------|---------|----|----|----|----|---------|------------|
| II-4<br>4.モリネートSM<br>-1kg<br>粒 | 茎葉兼土壌処理 | 北海道      |    | ○2.5 | ○      | ○3   | ○4 |    | ○4 |    |    |    | ○前     | +15～元I 2.5L         | 100 g/a | ○  | ○  | ○  | ○  | 2       | (1)<br>(8) |
|                                |         | 東北       |    | ○3.5 | ○      | ○3   | ○盛 |    |    |    |    |    |        | +15～元I 3.5L (元I 以降) |         | ○  | ○  | ○  | ○  |         |            |
|                                |         | 北陸       |    | ○3.5 | ○      | ○3   | ○6 |    |    |    |    |    |        |                     |         | ○  | ○  | ○  | ○  |         |            |
|                                |         | 関東・東山・東海 | 早  | ○3   | ○      | ○3   |    | ○3 |    |    |    |    |        | +15～元I 3L           |         | ○  | ○  | ○  | ○  | 1       |            |
|                                |         |          | 普  | ○3   | ○      | ○3   |    | ○3 |    |    |    |    |        |                     |         |    | ○  | ○  | ○  |         |            |
|                                |         | 近畿・中国    | 早  |      |        |      |    |    |    |    |    |    |        | +15～元I 3.5L         |         |    |    |    |    |         |            |
|                                |         |          | 普  | ●3.5 | ●      | ●3   | ●4 | ●3 |    |    |    |    | ●前     |                     |         | ●  | ●  | ●  |    |         |            |
|                                |         | 四国       | 早  |      |        |      |    |    |    |    |    |    |        |                     |         |    |    |    |    |         |            |
|                                |         |          | 普  | ●3.5 | ●      | ●3   | ●4 | ●3 |    |    |    |    | ●前     |                     |         | ●  | ●  | ●  |    |         |            |
|                                |         | 九州       | 早  | ●3   | ●      | ●3   |    |    |    |    |    |    |        | +15～元I 3L           |         |    |    | ●  | ●  |         |            |
|                                |         |          | 普  |      |        |      |    |    |    |    |    |    |        |                     |         |    |    |    |    |         |            |



## II-5 つづき

|                                 | 処理法     | 地域名      | 作期 | バI   | 一年広葉マリイ | オクイ | ウカ | ミカサ | ハラサ | カクイ | カク                       | ヒムシ | 落類表層剥離    |  | 処理時期                | 使用量・製品  | 砂壌土 | 壤土 | 埴土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意                            |
|---------------------------------|---------|----------|----|------|---------|-----|----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|-----------|--|---------------------|---------|-----|----|----|----|----------|-----------------------------------|
| II-5<br>6. モリネートSM<br>-1kg<br>粒 | 茎葉葬土壌処理 | 北海道      |    | ●2.5 | ●       | ●3  | ●4 |     | ●4  |     |                          |     | ●前        |  | +20~+25(バI2.5L)     | 100 g/a | ●   | ●  | ●  | ●  | 2        | (1)<br>(8)<br>(9)<br>(21)<br>(39) |
|                                 |         | 東北       |    | ○3.5 | ○       | ○3  | ○4 | ○3  | ○4  |     | 矢<br>○の<br>葉<br>○1<br>2L |     | ○発生<br>○期 |  | +20~+30<br>(バI5L以降) |         | ○   | ○  | ○  | ○  |          |                                   |
|                                 |         | 北陸       |    | ○3.5 | ○       | ○3  | ○4 | ○3  | ○4  |     |                          |     |           |  |                     |         | ○   | ○  | ○  | ○  |          |                                   |
|                                 |         | 関東・東山・東海 | 早  | ●3   | ●       | ●3  | ●4 | ●3  |     |     |                          |     | ●発生       |  | +20~+30<br>(バI3L)   |         | ●   | ●  | ●  | ●  | 2        |                                   |
|                                 |         |          | 普  | ○3   | ○       | ○3  | ○4 | ○3  |     |     |                          |     | ●期        |  |                     |         | ●   | ●  | ○  | ○  |          |                                   |
|                                 |         | 近畿・中国    | 早  |      |         |     |    |     |     |     |                          |     |           |  | +20~+30             |         |     |    |    |    | 1        |                                   |
|                                 |         |          | 普  | ●3.5 | ●       | ●3  | ●4 | ●3  |     |     |                          |     | ●前        |  |                     |         |     | ●  | ●  | ●  |          |                                   |
|                                 |         | 四国       | 早  |      |         |     |    |     |     |     |                          |     |           |  |                     |         |     |    |    |    |          |                                   |
|                                 |         |          | 普  | ●3.5 | ●       | ●3  | ●4 | ●3  |     |     |                          |     | ●前        |  |                     |         |     | ●  | ●  | ●  |          |                                   |
|                                 |         | 九州       | 早  | ●3   | ●       | ●3  |    | ●3  |     |     |                          |     |           |  |                     |         |     | ●  | ●  | ●  |          |                                   |
|                                 |         |          | 普  |      |         |     |    |     |     |     |                          |     |           |  |                     |         |     |    |    |    |          |                                   |

## II-6-(1) クログワイ対象

II-6-(1)  
1. DM-72 粒 VII-3-(1) 1 参照

II-6-(1)  
2. DPX-84MN 粒 VII-2 11 参照

II-6-(1)  
3. DPX-84MN○ 粒 VII-2 12 参照

|                                                      | 処理法              | 地域名              | 作期 | バI | 一年<br>広葉<br>マツイ | オクイ       | ウカ | ミカサ<br>ツ | ハラサ<br>カ | カクイ<br>イ | カク | ヒムシ<br>ロ | 落類<br>表層<br>剥離 |          | 処理時期                                      | 使用量・<br>製品 | 砂<br>壌<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上<br>の注意   |   |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|----|----|-----------------|-----------|----|----------|----------|----------|----|----------|----------------|----------|-------------------------------------------|------------|-------------|--------|--------|--------|-----------------|--------------|---|
| Ⅱ-6-(1)<br>4. JC-940<br>粒<br><br>Ⅱ-3<br>Ⅱ-6-(5) 1 併用 | 土<br>壌<br>処<br>理 | 北海道              |    |    |                 |           |    |          |          |          |    |          |                |          |                                           |            |             |        |        |        |                 | (40)<br>(42) |   |
|                                                      |                  | 東北               |    |    | ○一<br>年         | ○始        | ○始 |          | ●始       |          |    |          |                | シイ<br>●始 | + 1～<br>オクイ発生始<br>(但し、暖<br>地はオクイ<br>1Lまで) | 300<br>g/a |             | ○      | ○      | ○      | ○               |              | 2 |
|                                                      |                  | 北陸               |    |    | ○生<br>カ         | ○始        | ○始 |          |          |          |    |          |                |          |                                           |            |             | ○      | ○      | ○      | ○               |              |   |
|                                                      |                  | 関東<br>・東山<br>・東海 | 早  |    |                 | ○・カ<br>ヤツ |    |          |          |          |    |          |                |          |                                           |            |             |        |        |        |                 |              | 1 |
|                                                      |                  |                  | 普  |    |                 | ○リ<br>クサ  | ○始 | ○始       |          | ○始       |    |          |                |          |                                           |            |             |        | ○      | ○      | ○               | ○            |   |
|                                                      |                  | 近畿<br>・中国        | 早  |    |                 | ○・マ<br>ツサ |    |          |          |          |    |          |                |          |                                           |            |             |        |        |        |                 |              |   |
|                                                      |                  |                  | 普  |    |                 | ○・マ<br>ツサ | ○始 | ○始       |          | ○始       |    |          |                |          |                                           |            |             |        |        | ○      | ○               | ○            | ○ |
|                                                      |                  | 四国               | 早  |    |                 | ○・マ<br>ツ  |    |          |          |          |    |          |                |          |                                           |            |             |        |        |        |                 |              |   |
|                                                      |                  |                  | 普  |    |                 | ○・マ<br>ツ  | ○始 | ○始       |          | ○始       |    |          |                |          |                                           |            |             |        |        | ○      | ○               | ○            | ○ |
|                                                      |                  | 九州               | 早  |    |                 |           |    |          |          |          |    |          |                |          |                                           |            |             |        |        |        |                 |              |   |
|                                                      |                  |                  | 普  |    |                 |           | ○  | ○始       |          | ○始       |    | ●始       |                |          |                                           |            |             |        |        |        | ○               | ○            |   |

クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することにより、さらに効果が向上する。(東北・関東・東山・東海、近畿~九州)



## II-6-(1) つづき

Ⅱ-6-(1)  
5. KUH-883 粒                      Ⅶ-1 8 および Ⅶ-2 18、Ⅷ-1 1 参照

II-6-(1)  
6. KUH-8830 粒 VII-1 10 および 下記 参照

|                            | 処理方法 | 地域名      | 作期 | 1年<br>広葉<br>マツ | 杉 | カ  | ミカ<br>リ | ハカ<br>リ | カ<br>イ | ナカ<br>リ | ミ<br>シ<br>ロ | 落葉<br>層<br>剥離 |              |              | 処理時期                | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壤<br>土  | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上<br>の注意                |   |   |  |
|----------------------------|------|----------|----|----------------|---|----|---------|---------|--------|---------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|--------|--------|-----------------|---------------------------|---|---|--|
| Ⅱ-6-(1)<br>6.KUH-883◎<br>粒 | 土壌処理 | 北海道      |    |                |   |    |         |         |        |         |             |               |              |              | +5 ~ +20<br>(元1 2L) | 300<br>g/a     |              |        |        |                 | *<br>(26)<br>(34)<br>(41) |   |   |  |
| Ⅶ-1併用                      |      | 東北       |    |                |   |    |         |         |        |         |             |               |              |              |                     |                |              |        |        |                 |                           |   |   |  |
|                            |      | 北陸       |    | ○2             | ○ | ○2 | ○2      | ○2      | ○2     |         | ○始          | ○発<br>生<br>期  | ○前           | ○再<br>生<br>期 |                     |                |              | ○      | ○      | ○               |                           | ○ | 2 |  |
|                            |      | 関東・東山・東海 | 早  | ○2             | ○ | ○2 | ○2      | ○2      |        |         |             |               | ○前           | ○再<br>生<br>期 |                     |                |              | ○      | ○      | ○               |                           | ○ |   |  |
|                            |      |          | 普  | ○2             | ○ | ○2 | ○2      | ○2      |        | ●始      | ○始          | ○発<br>生<br>期  | ○前           | ○再<br>生<br>期 |                     |                |              | ○      | ○      | ○               |                           | ○ |   |  |
|                            |      | 近畿・中国    | 早  | ○2             | ○ | ○2 | ○2      | ○2      |        |         |             |               | ○期           | ○再<br>生<br>期 |                     |                |              | ○      |        | ○               |                           | ○ | 1 |  |
|                            |      |          | 普  | ○2             | ○ | ○2 | ○2      | ○2      |        | ●始      |             |               |              | ○再<br>生<br>期 |                     |                |              | ○      | ○      | ○               |                           | ○ |   |  |
|                            |      | 四国       | 早  | ○2             | ○ | ○2 | ○2      | ○2      |        |         |             |               | ○発<br>生<br>期 | ○前           |                     |                | ○再<br>生<br>期 |        | ○      |                 |                           | ○ | ○ |  |
|                            |      |          | 普  | ○2             | ○ | ○2 | ○2      | ○2      |        | ●始      |             |               |              | ○再<br>生<br>期 |                     |                |              | ○      | ○      | ○               |                           | ○ |   |  |
|                            |      | 九州       | 早  |                |   |    |         |         |        |         | (●始)        |               |              |              |                     |                | ○再<br>生<br>期 |        | ○      |                 |                           | ○ | ○ |  |
|                            |      |          | 普  |                |   |    |         |         |        |         | (●始)        |               |              |              |                     |                | ○再<br>生<br>期 |        | ○      |                 |                           | ○ | ○ |  |

\* 初期割を全処理に少量散布することにより除草効果向上（北陸、関東～四国）  
クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することにより、さらに効果が向上する。（関東～九州）

II-6-(1)  
7.NC-311NS 粒 II-5 3 参照

II-6-(1)  
8. NC-311SCQ 粒 VII-2 21 参照

II-6-(1)  
9. NC-326 粒 VII-3-(1) 9 参照

II-6-(1)  
10. NC-3260 粒 「継」

II-6-(1)  
11. NC-329 粒 VII-2 26 参照

|                                                   | 処理<br>方法         | 地域名              | 作<br>期 | 元<br>一<br>年<br>広<br>葉<br>マ<br>シ<br>イ | オ<br>シ<br>イ | マ<br>カ<br>カ | ミ<br>カ<br>カ | オ<br>シ<br>イ | マ<br>カ<br>カ | ミ<br>カ<br>カ | オ<br>シ<br>イ | マ<br>カ<br>カ | ミ<br>カ<br>カ | 落<br>葉<br>層<br>剥<br>離 |   | 処理時期    | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土    | 壤<br>土  | 腐<br>土 | 埋<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上<br>の注意 |              |   |   |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---|---------|----------------|-----------|---------|--------|--------|-----------------|------------|--------------|---|---|
| Ⅱ-6-(1)<br>12. NJM-754<br><br>粒<br><br><br>Ⅶ-1に併用 | 土<br>壌<br>処<br>理 | 北海道              |        | ○                                    | 1.5         | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           |             |             |             | ○                     | ○ | 発生<br>前 | 300<br>g/a     | 1.5       | ○       | ○      | ○      | ○               | 2          | (34)<br>(42) |   |   |
|                                                   |                  | 東北               |        | ○                                    | 1.5         | ○           | ○           | 始           | ○           | 始           | ○           | 始           |             |                       | ○ | ○       |                | 発生<br>期   |         | ○      | ○      | ○               | ○          |              |   |   |
|                                                   |                  | 北陸               |        | ○                                    | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 始           |             |             |                       |   |         | +3~+12L        |           |         | ○      | ○      | ○               | ○          |              |   |   |
|                                                   |                  | 関東<br>・東山<br>・東海 | 早      | ○                                    | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 始           |             |             |             |                       |   |         |                | 1.5       | ○       | ○      | ○      | ○               |            |              |   |   |
|                                                   |                  |                  | 普      | ○                                    | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 始           |             |                       |   |         |                |           |         | ○      | ○      | ○               | ○          |              |   |   |
|                                                   |                  | 近畿<br>・中国        | 早      | ○                                    | 1.5         | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           |             |             |                       | ○ | ○       | 発生<br>期        | +3~+11.5L |         |        | ○      | ○               | ○          |              | ○ | 1 |
|                                                   |                  |                  | 普      | ○                                    | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 始           |                       | ○ | ○       |                | +3~+12L   |         |        | ○      | ○               | ○          |              | ○ |   |
|                                                   |                  | 四国               | 早      | ○                                    | 1.5         | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           |             |             |                       | ○ | ○       | 発生<br>期        | +3~+11.5L |         |        | ○      | ○               | ○          |              | ○ |   |
|                                                   |                  |                  | 普      | ○                                    | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 始           |                       | ○ | ○       |                | +3~+12L   |         |        | ○      | ○               | ○          |              | ○ |   |
|                                                   |                  | 九州               | 早      | ○                                    | 1.5         | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           |             |             |                       | ○ | ○       | 発生<br>期        | +3~+11.5L |         |        | ○      | ○               | ○          |              | ○ |   |
|                                                   |                  |                  | 普      | ○                                    | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 始           |                       |   | ○       | ○              |           | +3~+12L |        |        | ○               | ○          |              | ○ | ○ |

クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することにより、さらに効果が向上する。(関東・東山・東海、近畿・中国・四国)

## II-6-(1) つづき

|                             | 処理<br>法          | 地域名              | 作<br>期 | バ<br>I | 一年<br>広葉<br>マツバ | ネ<br>カ<br>イ | ウ<br>カ<br>カ | ミ<br>ス<br>カ<br>カ | ハ<br>ラ<br>カ<br>カ | カ<br>カ<br>イ | カ<br>カ<br>カ | ヒ<br>ム<br>シ<br>ロ | 藻類<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期 | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上<br>の注意 |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|--|------|----------------|-------------|--------|--------|--------|-----------------|------------|
| II-6-(1)<br>13. NS-112<br>粒 | 土<br>壌<br>処<br>理 | 北海道              |        |        |                 |             |             |                  |                  |             |             |                  |                |  |      |                |             |        |        |        |                 |            |
|                             |                  | 東北               |        |        |                 |             |             |                  |                  | ○始          |             |                  |                |  |      | 300<br>g/a     |             |        | ○      | ○      | 1               | (42)       |
|                             |                  | 北陸               |        |        |                 |             |             |                  |                  |             |             |                  |                |  |      |                |             |        |        |        |                 |            |
|                             |                  | 関東<br>・東山<br>・東海 | 早      |        |                 |             |             |                  |                  |             |             |                  |                |  |      |                |             |        |        |        |                 |            |
|                             |                  |                  | 普      |        |                 |             |             |                  |                  | ○始          |             |                  |                |  |      |                |             | ○      | ○      | ○      |                 |            |
|                             |                  | 近畿<br>・中国        | 早      |        |                 |             |             |                  |                  |             |             |                  |                |  |      |                |             |        |        |        |                 |            |
|                             |                  |                  | 普      |        |                 |             |             |                  |                  | ○始          |             |                  |                |  |      |                |             | ○      | ○      | ○      |                 |            |
|                             |                  | 四国               | 早      |        |                 |             |             |                  |                  |             |             |                  |                |  |      |                |             |        |        |        |                 |            |
|                             |                  |                  | 普      |        |                 |             |             |                  |                  | ○始          |             |                  |                |  |      |                |             | ○      | ○      | ○      |                 |            |
|                             |                  | 九州               | 早      |        |                 |             |             |                  |                  | ○始          |             |                  |                |  |      |                |             | ○      | ○      | ○      |                 |            |
|                             |                  |                  | 普      |        |                 |             |             |                  |                  |             |             |                  |                |  |      |                |             |        |        |        |                 |            |

クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することにより、さらに効果が向上する。  
2回散布、連年施用により徹底防除可能。(東北、関東・東山・東海)

II-6-(1)  
14. NS-177 粒 II-5 4 参照

II-6-(1)  
15. NSK-855 フロアブル VII-1 18 参照

II-6-(1)  
16. NSK-855Q フロアブル 「継」

II-6-(1)  
17. SKH-8602Q 粒 VII-1 20 参照

II-6-(1)  
18. TH-913Q 粒 II-5 5 参照

## II-6-(2) オモダカ対象

II-6-(2)  
1. KUH-883Q 粒 VII-1 10 参照

II-6-(2)  
2. NC-311SCQ 粒 VII-2 21 参照

II-6-(2)  
3. NC-326 粒 VII-3-(1) 9 参照

II-6-(2)  
4. NC-326Q 粒 「継」

II-6-(2)  
5. NC-329 粒 VII-2 26 参照

II-6-(2)  
6. NS-177 粒 II-5 4 参照

II-6-(2)  
7. NSK-855 フロアブル VII-1 18 参照

II-6-(2)  
8. NSK-855Q フロアブル VII-1 19 参照

II-6-(2)  
9. SKH-8602Q 粒 VII-1 20 参照

Ⅱ-6-(5) シズイ対象

II-6-(5)

1. JC-940 粒

II-6-(1) 4 参照

|                                     | 処理<br>法         | 地域名              | 作<br>期 | 1年<br>広葉<br>マツイ | ナリイ | ナリイ | ミナ<br>ナリイ | ナリイ | ナリイ | ナリイ     | ナリイ      | 落類<br>剥離   |                | 処理時期                            | 使用<br>量<br>製品 | 砂<br>壤<br>土 | 壤<br>土 | 壤<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上<br>の注意                                   |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|--------|-----------------|-----|-----|-----------|-----|-----|---------|----------|------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------|--------|--------|-----------------|----------------------------------------------|
| Ⅱ-6-(5)<br>2.NC-311R<br>粒<br>Ⅶ-2に併用 | 産業<br>棄土<br>壌処理 | 北海道              | ○2     | ○               | ○2  | ○2  | ○         | ○2  |     |         | ○発生<br>期 | ○ナリイ<br>剥離 | ○*             | +10~+20(ナリイ)                    | 300<br>g/a    | ○           | ○      | ○      | 2               | (28)<br>(34)<br>(38)<br>(40)<br>(42)<br>(44) |
|                                     |                 | 東北               | ○2.5   | ○               | ○2  | ○2  | ○2        | ○2  | ○始  | ○始      | ○前<br>期  | ○ナリイ<br>剥離 | ○**            | +7~ ナリイ 2.5L                    |               | ○           | ○      | ○      |                 |                                              |
|                                     |                 | 北陸               | ○2.5   | ○               | ○2  | ○2  | ○2        | ○2  |     | ○前<br>期 | ○発生<br>期 | ○ナリイ<br>剥離 | ○*             | *1)ナリイ<br>発生始<br>**1/4<br>発生前~始 |               | ○           | ○      | ○      |                 |                                              |
|                                     |                 | 関東<br>・東山<br>・東海 | 早<br>普 | ○2.5            | ○   | ○2  | ○2        | ○2  | ○始  | ○始      | ○        | ○          | ○本<br>業展<br>開期 |                                 |               | ○           | ○      | ○      |                 |                                              |
|                                     |                 | 近畿<br>・中国        | 早<br>普 | ○2.5            | ○   | ○2  | ○2        | ○2  | ○始  | ○始      |          |            |                | +5~ ナリイ 2.5L                    |               |             |        |        | 1               |                                              |
|                                     |                 | 四国               | 早<br>普 | ○2.5            | ○   | ○2  | ○2        | ○2  | ○始  | ○始      |          |            |                |                                 |               |             |        |        |                 |                                              |
|                                     |                 | 九州               | 早<br>普 | ○2.5            | ○   | ○2  | ○2        | ○2  | ○始  | ○前<br>期 | ○発生<br>期 | ○ナリイ<br>剥離 | ○*             |                                 |               | ○           | ○      | ○      | 1.5             |                                              |

クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することにより、さらに効果が向上する。(東北、関東～九州)  
オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することにより、さらに効果が向上する。(東北～九州)

## II-6-(6) エゾノサヤヌカグサ対象

II - 6 - (6)

1. DPX-84MN 粒

VII-2      11      参照

II - 6 - (6)

2. NC-311HW 粒

VII-1      16      参照

## II-6-(7) クサネム対象

II - 6 - (7)

1. BAS-3510 (Na) 粒 「継」

|                                     | 処理法  | 地域名          | 作期 | 1年<br>広葉<br>マツ | オウゴン | ウグイス | ミドリ<br>カ      | オウゴン<br>カ     | ヒメ<br>カ       | 落葉<br>表層<br>剥離       | 処理時期                     | 使用<br>量・<br>製品       | 砂<br>壤<br>土       | 壤<br>土 | 植<br>壤<br>土 | 植<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上<br>の注意                                  |   |
|-------------------------------------|------|--------------|----|----------------|------|------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------|-------------|--------|-----------------|---------------------------------------------|---|
| II-6-(7)<br>2. BAS-3510<br>NaO<br>液 | 薬液処理 | 北海道          |    | ○<br>生育<br>期   | ○*   | ○*   | ○*            | ○<br>発生<br>盛期 | ○             | ○                    | 1月<br>10~4L, 20cm<br>増進期 | +25~+55              | 50<br>~70<br>ml/a | ○      | ○           | ○      | ○               | (6)<br>(10)<br>(11)<br>(12)<br>(21)<br>(20) |   |
|                                     |      | 東北           |    | ○<br>生育<br>期   | ○*   | ○*   | ○*            | ○*            | ○<br>発生<br>盛期 | ○*                   | ○                        | 1月<br>10~30cm<br>増進期 | +25~+55           |        | ○           | ○      | ○               |                                             | ○ |
|                                     |      | 北陸           |    | ○<br>生育<br>期   | ○*   | ○*   | ○*            | ○*            | ○<br>発生<br>盛期 | ○                    | ○                        | 1月<br>10~30cm<br>増進期 | +25~+55           |        | ○           | ○      | ○               |                                             | ○ |
|                                     |      | 関東・東山・東海     | 早  | ○<br>生育<br>期   | ○*   | ○*   | ○*            | ○*            | ○<br>発生<br>盛期 | ○                    | ○                        | 1月<br>10~30cm<br>増進期 | +30~+55           |        | ○           | ○      | ○               |                                             | ○ |
|                                     |      |              | 普  | ○<br>生育<br>期   | ○*   | ○*   | ○*            | ○*            | ○<br>発生<br>盛期 | ○                    | ○                        | 1月<br>10~30cm<br>増進期 | +25~+55           |        | ○           | ○      | ○               |                                             | ○ |
|                                     |      | 近畿・中国        | 早  | ○<br>生育<br>期   | ○*   | ○*   | ○*            | ○*            | ○<br>発生<br>盛期 | ○                    | ○                        | 1月<br>10~30cm<br>増進期 | +25~+50           |        | ○           | ○      | ○               |                                             | ○ |
|                                     |      |              | 普  | ○<br>生育<br>期   | ○*   | ○*   | ○*            | ○*            | ○<br>発生<br>盛期 | ○                    | ○                        | 1月<br>10~30cm<br>増進期 | +25~+50           |        | ○           | ○      | ○               |                                             | ○ |
|                                     |      | 四国           | 早  | ○<br>生育<br>期   | ○*   | ○*   | ○*            | ○*            | ○<br>発生<br>盛期 | ○                    | ○                        | 1月<br>10~30cm<br>増進期 | +25~+55           |        | ○           | ○      | ○               |                                             | ○ |
|                                     |      |              | 普  | ○<br>生育<br>期   | ○*   | ○*   | ○*            | ○*            | ○<br>発生<br>盛期 | ○                    | ○                        | 1月<br>10~30cm<br>増進期 | +25~+50           |        | ○           | ○      | ○               |                                             | ○ |
|                                     |      | 九州           | 早  | ○<br>生育<br>期   | ○*   | ○*   | ○*            | ○*            | ○<br>発生<br>盛期 | ○                    | ○                        | 1月<br>10~30cm<br>増進期 | +25~+45           |        | ○           | ○      | ○               |                                             | ○ |
|                                     | 普    | ○<br>生育<br>期 | ○* | ○*             | ○*   | ○*   | ○<br>発生<br>盛期 | ○             | ○             | 1月<br>10~30cm<br>増進期 | +25~+40                  |                      | ○                 | ○      | ○           | ○      |                 |                                             |   |

※発生盛期～花茎抽出期      ※発生盛期～増殖初期      ※発生盛期～増殖中期      7/21 徹底防除 2 回散布の 連年施用。 (東北・関東～九州)  
12/24 多量用 2 回散布

## II-6-(8) コウキヤガラ対象

II - 6 - (8)

1. NC-311CG④ 粒

VI-1 14 参照

II - 6 - (8)

2. NC-311SC 粒

VII-2      21      参照

Ⅲ-1 港水直播

|                         | 処理法  | 地域名              | 作<br>期 | ベI | 一年<br>広葉<br>マツ | ササ<br>イ | ササ<br>イ | ミサ<br>ツ | ハサ<br>ツ | 知ツ<br>イ | ササ<br>イ | ヒル<br>口 | 落類<br>表層<br>剥離 |              | 処理時期      | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壤<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上<br>の注意         |
|-------------------------|------|------------------|--------|----|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|--------------|-----------|----------------|-------------|--------|--------|--------|-----------------|--------------------|
| Ⅲ-1<br>1. KUH-8830<br>粒 | 土壌処理 | 北海道              |        |    |                |         |         |         |         |         |         |         |                |              | 4月11日~12日 | 300<br>g/a     |             |        |        |        |                 | 機械播き<br>条播<br>適正覆土 |
|                         |      | 東北               |        |    |                |         |         |         |         |         |         |         |                |              |           |                |             |        |        |        |                 |                    |
|                         |      | 北陸               |        | ●2 | ●              | ●2      | ●2      |         |         |         |         |         |                |              |           |                |             |        | ●      | ●      | 1               |                    |
|                         |      | 関東<br>・東山<br>・東海 |        | ●2 | ●              | ●2      | ●2      | ●2      |         |         |         |         | 発生<br>期        |              |           |                |             |        | ●      | ●      | ●               | 2                  |
|                         |      | 近畿<br>・中国        |        | ●2 | ●              | ●2      | ●2      |         |         |         |         |         |                | 切<br>再生<br>前 |           |                |             |        | ●      | ●      | ●               | 1                  |
|                         |      | 四国               |        | ●2 | ●              | ●2      | ●2      |         |         |         |         |         | ●始             |              |           |                |             |        | ●      | ●      | ●               |                    |
|                         |      | 九州               |        |    |                |         |         |         |         |         |         |         |                |              |           |                |             |        |        |        |                 |                    |
|                         |      |                  |        |    |                |         |         |         |         |         |         |         |                |              |           |                |             |        |        |        |                 |                    |

|                         | 処理法  | 地域名      | 作<br>期 | ベI | 一年<br>広葉<br>マツ | ササ<br>イ | ササ<br>イ | ミサ<br>ツ | ハサ<br>ツ | 知ツ<br>イ | ササ<br>イ | ヒル<br>口 | 落類<br>表層<br>剥離 |             | 処理時期      | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壤<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上<br>の注意 |   |   |   |
|-------------------------|------|----------|--------|----|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|-------------|-----------|----------------|-------------|--------|--------|--------|-----------------|------------|---|---|---|
| Ⅲ-1<br>2. NC-311HW<br>粒 | 土壌処理 | 北海道      |        | ○2 | ○              | ○2      | ○2      |         |         | ○2      |         |         | ○発生<br>期       | ○切<br>再生前~始 | +5 ~ベI 2L | 300<br>g/a     |             | ○      | ○      | ○      | ○               | 2          |   |   |   |
|                         |      | 東北       |        | ○2 | ○              | ○2      | ○2      |         |         |         |         |         | ○発生<br>期       | ○切<br>再生前~始 |           |                |             |        | ○      | ○      | ○               |            |   |   |   |
|                         |      | 北陸       |        | ○2 | ○              | ○2      | ○2      | ●2      |         |         |         |         |                |             |           |                |             | ●      | ○      | ○      | ○               |            |   |   |   |
|                         |      | 関東・東山・東海 |        |    |                |         |         |         |         |         |         |         |                |             |           |                |             |        |        | ○      | ○               |            | ○ |   |   |
|                         |      |          |        | ○2 | ○              | ○2      | ○2      | ○2      |         |         |         |         | ○発生<br>期       | ○切<br>再生前~始 |           |                |             |        |        | ○      | ○               | ○          |   |   |   |
|                         |      | 近畿・中国    |        |    | ○2             | ○       | ○2      | ○2      | ○2      |         |         |         |                |             |           |                |             |        |        |        | ○               | ○          | ○ | ○ | 2 |
|                         |      |          |        | ○2 | ○              | ○2      | ○2      | ○2      |         |         |         |         |                |             |           |                |             |        |        |        | ○               | ○          | ○ | ○ |   |
|                         |      | 四国       |        | ○2 | ○              | ○2      | ○2      | ○2      |         |         |         |         |                |             |           |                |             |        |        |        | ○               | ○          | ○ | ○ |   |
|                         |      | ○2       | ○      | ○2 | ○2             | ○2      |         |         |         |         |         |         |                |             |           |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 1               |            |   |   |   |
| 九州                      |      | ○2       | ○      | ○2 | ○2             | ○2      | ●2      |         |         |         |         |         |                |             |           |                | ●           | ○      | ○      | ○      |                 |            |   |   |   |

|                                 | 処理法      | 地域名              | 作<br>期 | ベI | 一年<br>広葉<br>マツ | ササ<br>イ | ササ<br>イ | ミサ<br>ツ | ハサ<br>ツ | 知ツ<br>イ | ササ<br>イ | ヒル<br>口 | 落類<br>表層<br>剥離 |             | 処理時期      | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壤<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上<br>の注意 |
|---------------------------------|----------|------------------|--------|----|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|-------------|-----------|----------------|-------------|--------|--------|--------|-----------------|------------|
| Ⅲ-1<br>3. NC-311HW<br>~1kg<br>粒 | 土壌<br>処理 | 北海道              |        | ●2 | ●              | ●2      | ●2      |         |         | ●2      |         |         | ●発生<br>期       | ●切再生<br>前~始 | +5 ~ベI 2L | 100<br>g/a     |             | ●      | ●      | ●      | 2               |            |
|                                 |          | 東北               |        |    |                |         |         |         |         |         |         |         |                |             |           |                |             |        |        |        |                 |            |
|                                 |          | 北陸               |        |    |                |         |         |         |         |         |         |         |                |             |           |                |             |        |        |        |                 |            |
|                                 |          | 関東<br>・東山<br>・東海 |        | ●2 | ●              | ●2      | ●2      | ●2      |         |         |         |         |                | ●前          |           |                |             | ●      | ●      | ●      |                 |            |
|                                 |          | 近畿<br>・中国        |        | ●2 | ●              | ●2      | ●2      | ●2      |         |         |         |         |                |             |           |                |             | ●      | ●      | ●      | ●               |            |
|                                 |          | 四国               |        | ●2 | ●              | ●2      | ●2      | ●2      |         |         |         |         |                |             |           |                |             | ●      | ●      | ●      | ●               |            |
|                                 |          | 九州               |        | ●2 | ●              | ●2      |         |         |         |         |         |         |                |             |           |                |             | ●      | ●      | ●      | ●               | 1          |
|                                 |          |                  |        | ●2 | ●              | ●2      |         |         |         |         |         |         |                |             |           |                |             | ●      | ●      | ●      | ●               |            |

## Ⅲ-1 つづき

|                      | 処理法  | 地域名      | 作期 | ベ1   | 一年広葉マツイ | 杉イ | カサ | ミササギ | ハナハチ | カサ | カサ | ヒメシロ | 落葉表層剥離  |  | 処理時期         | 使用量・製品 | 砂壌土 | 壤土 | 埴壌土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意                      |
|----------------------|------|----------|----|------|---------|----|----|------|------|----|----|------|---------|--|--------------|--------|-----|----|-----|----|----------|-----------------------------|
| Ⅲ-1<br>4.NC-311<br>粒 | 土壌処理 | 北海道      |    | ●2.5 | ●       | ●2 | ●2 |      | ●2   |    |    | ●発生期 | ●刈再生前~始 |  | 4/1L~4/12.5L | 300g   |     | ●  | ●   | ●  | 2        | 処理時に根が出ている場合は、葉等の発生することがある。 |
|                      |      | 東北       |    | ●2.5 | ●       | ●2 | ●2 |      |      |    |    |      |         |  |              |        |     |    | ●   | ●  | 1        |                             |
|                      |      | 北陸       |    | ●2.5 | ●       | ●2 | ●2 | ●2   |      |    |    |      |         |  |              |        |     |    | ●   | ●  |          |                             |
|                      |      | 関東・東山・東海 |    | ●2.5 | ●       | ●2 | ●2 | ●2   |      |    |    | ●発生期 | ●刈再生前~始 |  |              |        |     | ●  | ●   | ●  | 2        |                             |
|                      |      | 近畿・中国    |    |      |         |    |    |      |      |    |    |      | ●刈再生前~始 |  |              |        |     |    |     |    | 1        |                             |
|                      |      | 四国       |    | ●2.5 | ●       | ●2 | ●2 | ●2   |      |    |    |      |         |  |              |        |     |    | ●   | ●  | ●        |                             |
|                      |      | 九州       |    |      |         |    |    |      |      |    |    |      | ●刈再生前~始 |  |              |        |     |    | ●   | ●  | ●        |                             |

|                                 | 処理法  | 地域名      | 作期 | ベ1 | 一年広葉マツイ | 杉イ | カサ | ミササギ | ハナハチ | カサ | カサ | ヒメシロ | 落葉表層剥離  |  | 処理時期                   | 使用量・製品 | 砂壌土 | 壤土 | 埴壌土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意 |
|---------------------------------|------|----------|----|----|---------|----|----|------|------|----|----|------|---------|--|------------------------|--------|-----|----|-----|----|----------|--------|
| Ⅲ-1<br>5.TH-913<br>HSK-1kg<br>粒 | 土壌処理 | 北海道      |    | ●2 | ●       | ●2 | ●2 |      | ●2   |    |    | ●発生期 | ●刈再生前~始 |  | 4/1L~4/12L<br>+5~4/12L | 100g/a |     | ●  | ●   | ●  | 2        |        |
|                                 |      | 東北       |    | ●2 | ●       | ●2 |    |      |      |    |    |      |         |  |                        |        |     |    | ●   | ●  | 1        |        |
|                                 |      | 北陸       |    | ●2 | ●       | ●2 | ●2 |      |      |    |    |      |         |  |                        |        |     |    | ●   | ●  |          |        |
|                                 |      | 関東・東山・東海 |    | ●2 | ●       | ●2 | ●2 | ●2   |      |    |    | ●発生期 |         |  |                        |        |     | ●  | ●   | ●  | 2        |        |
|                                 |      | 近畿・中国    |    | ●2 | ●       | ●2 | ●2 | ●2   |      |    |    |      |         |  |                        |        |     | ●  | ●   | ●  | 2        |        |
|                                 |      | 四国       |    | ●2 | ●       | ●2 | ●2 | ●2   |      |    |    |      |         |  |                        |        |     | ●  | ●   | ●  |          |        |
|                                 |      | 九州       |    | ●2 | ●       | ●2 |    |      |      |    |    |      |         |  |                        |        |     | ●  | ●   | ●  | 1        |        |

## Ⅲ-2 乾田直播

|                        | 処理法  | 地域名      | 作期 | ベ1 | 一年広葉マツ | 杉  | カサ | ミササギ | ハナハチ | カサ | ヒメシロ | 落葉表層剥離 |    | 処理時期 | 使用量・製品          | 砂壌土 | 壤土 | 埴壌土 | 埴土 | 減水深<br>cm/d | 使用上の注意 |
|------------------------|------|----------|----|----|--------|----|----|------|------|----|------|--------|----|------|-----------------|-----|----|-----|----|-------------|--------|
| Ⅲ-2<br>1.KUH-883◎<br>粒 | 土壌処理 | 北海道      |    |    |        |    |    |      |      |    |      |        |    |      | 300<br>g/a      |     |    |     |    |             | 2      |
|                        |      | 東北       |    |    |        |    |    |      |      |    |      |        |    |      |                 |     |    |     |    |             |        |
|                        |      | 北陸       |    |    |        |    |    |      |      |    |      |        |    |      |                 |     |    |     |    |             |        |
|                        |      | 関東・東山・東海 |    | ○2 | ○      | ○2 | ○2 | ○2   |      |    |      | ○期     | ○前 |      | 入水後7日<br>～ノビエ2L |     |    | ○   | ○  | ○           |        |
|                        |      | 近畿・中国    |    | ○2 | ○      | ○始 | ○始 | ○始   |      |    |      |        |    |      | 入水後3日<br>～ノビエ2L |     |    | ○   | ○  | ○           |        |
|                        |      | 四国       |    | ○2 | ○      | ○始 | ○始 | ○始   |      |    |      |        |    |      |                 |     |    | ○   | ○  | ○           |        |
|                        |      | 九州       |    |    |        |    |    |      |      |    |      |        |    |      |                 |     |    |     |    |             |        |

Ⅲ-2  
2.KUH-911 液 「継」Ⅲ-2  
3.KUH-911A フロアブル 「継」

## Ⅲ-2 つづき

|                        | 処理法    | 地域名      | 作期 | 元I | 一年広葉マツ | オシイ | ウカ | ミカツ | ハラタ | カクイ | オモ | ヒメシ | 藻類表層剥離 |  | 処理時期              | 使用量・製品         | 砂壌土 | 壤土 | 埴土 | 埴土 | 減水深cm/d | 使用上の注意            |
|------------------------|--------|----------|----|----|--------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|--------|--|-------------------|----------------|-----|----|----|----|---------|-------------------|
| Ⅲ-2<br>4. KUH-914<br>乳 | 茎葉土壌処理 | 北海道      |    |    |        |     |    |     |     |     |    |     |        |  | +15~+13L<br>(入水前) | 80~100<br>ml/a |     |    |    |    |         | DCPA剤の使用上の注意事項を守る |
|                        |        | 東北       |    |    |        |     |    |     |     |     |    |     |        |  |                   |                |     |    |    |    |         |                   |
|                        |        | 北陸       |    |    |        |     |    |     |     |     |    |     |        |  |                   |                |     |    |    |    |         |                   |
|                        |        | 関東・東山・東海 |    |    |        |     |    |     |     |     |    |     |        |  |                   |                |     |    |    |    |         |                   |
|                        |        | 近畿・中国    |    | ○  | ○      |     |    |     |     |     |    |     |        |  |                   |                |     | ○  | ○  | ○  |         |                   |
|                        |        | 四国       |    |    |        |     |    |     |     |     |    |     |        |  |                   |                |     |    |    |    |         |                   |
|                        |        | 九州       |    |    |        |     |    |     |     |     |    |     |        |  | +12~+13L<br>(入水前) |                |     |    |    |    |         |                   |
|                        |        |          |    |    |        |     |    |     |     |     |    |     |        |  |                   |                |     |    |    |    |         |                   |
|                        |        |          |    |    |        |     |    |     |     |     |    |     |        |  |                   |                |     |    |    |    |         |                   |
|                        |        |          |    |    |        |     |    |     |     |     |    |     |        |  |                   |                |     |    |    |    |         |                   |
|                        |        |          |    |    |        |     |    |     |     |     |    |     |        |  |                   |                |     |    |    |    |         |                   |
|                        |        |          |    |    |        |     |    |     |     |     |    |     |        |  |                   |                |     |    |    |    |         |                   |
|                        |        |          |    |    |        |     |    |     |     |     |    |     |        |  |                   |                |     |    |    |    |         |                   |
|                        |        |          |    |    |        |     |    |     |     |     |    |     |        |  |                   |                |     |    |    |    |         |                   |
|                        |        |          |    |    |        |     |    |     |     |     |    |     |        |  |                   |                |     |    |    |    |         |                   |
|                        |        |          |    |    |        |     |    |     |     |     |    |     |        |  |                   |                |     |    |    |    |         |                   |

## Ⅳ 畦畔雑草

|                        | 処理法  | 地域名      | 対象雑草名 | 処理時期                | 使用量・製品<br>(希釈水量) | 適用土壌 | 使用上の注意                                  |
|------------------------|------|----------|-------|---------------------|------------------|------|-----------------------------------------|
| Ⅳ<br>1. Hoe-86610<br>液 | 茎葉処理 | 北海道      | ○ 全草種 | 雑草生育期<br>(草丈30cm以下) | 100ml/a          | 全土壌  | (23)<br>(24)<br>多年生雑草は<br>100ml/a<br>のみ |
|                        |      | 東北       | ○     |                     |                  |      |                                         |
|                        |      | 北陸       | ○     |                     | 50~100ml/a       |      |                                         |
|                        |      | 関東・東山・東海 | ○     |                     | 75~100ml/a       |      |                                         |
|                        |      | 近畿・中国    | ○     |                     | 100ml/a          |      |                                         |
|                        |      | 四国       | ○     |                     |                  |      |                                         |
|                        |      | 九州       | ○     |                     | 50~100ml/a       |      |                                         |

|                          | 処理法  | 地域名      | 対象雑草名 | 処理時期                | 使用量・製品<br>(希釈水量) | 適用土壌 | 使用上の注意       |
|--------------------------|------|----------|-------|---------------------|------------------|------|--------------|
| Ⅳ<br>2. Hoe-866-3H<br>水和 | 茎葉処理 | 北海道      |       | 雑草生育期<br>(草丈30cm以下) | 50~75g/a         | 全土壌  | (23)<br>(24) |
|                          |      | 東北       | ● 全草種 |                     |                  |      |              |
|                          |      | 北陸       | ●     |                     |                  |      |              |
|                          |      | 関東・東山・東海 | ○     |                     |                  |      |              |
|                          |      | 近畿・中国    | ○     |                     |                  |      |              |
|                          |      | 四国       | ○     |                     |                  |      |              |
|                          |      | 九州       | ○     |                     |                  |      |              |

|                       | 処理法  | 地域名      | 対象雑草名 | 処理時期                | 使用量・製品<br>(希釈水量) | 適用土壌 | 使用上の注意    |
|-----------------------|------|----------|-------|---------------------|------------------|------|-----------|
| Ⅳ<br>3. HSW-9106<br>液 | 茎葉処理 | 北海道      | ○ 全草種 | 雑草生育期<br>(草丈10cm以下) | 500~700ml/a      | 全土壌  | (23) (24) |
|                       |      | 東北       |       |                     |                  |      |           |
|                       |      | 北陸       |       |                     |                  |      |           |
|                       |      | 関東・東山・東海 |       |                     |                  |      |           |
|                       |      | 近畿・中国    |       |                     |                  |      |           |
|                       |      | 四国       |       |                     |                  |      |           |
|                       |      | 九州       |       |                     |                  |      |           |

Ⅳ  
4. KUH-913 液 「継」

## Ⅳ つづき

|                        | 処理法  | 地域名      | 対象雑草名        | 処理時期                | 使用量・製品<br>(希釈水量)                                          | 適用土壌 | 使用上の注意       |
|------------------------|------|----------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------------|
| Ⅳ<br>5. Mon-6069<br>水溶 | 茎葉処理 | 北海道      | 全草種 (スギナは除く) | 雑草生育期<br>(草丈30cm以下) | 15~30 g/a<br><br>*少量散布:<br>希釈水量2.5l/aでも有効<br>専用の散布ノズルを用いる | 全土壌  | (23)<br>(24) |
|                        |      | 東北       |              |                     |                                                           |      |              |
|                        |      | 北陸       |              |                     |                                                           |      |              |
|                        |      | 関東・東山・東海 |              |                     |                                                           |      |              |
|                        |      | 近畿・中国    |              |                     |                                                           |      |              |
|                        |      | 四国       |              |                     |                                                           |      |              |
|                        |      | 九州       |              |                     |                                                           |      |              |

|                     | 処理法  | 地域名      | 対象雑草名 | 処理時期                | 使用量・製品<br>(希釈水量) | 適用土壌 | 使用上の注意       |
|---------------------|------|----------|-------|---------------------|------------------|------|--------------|
| Ⅳ<br>6. MR-29<br>水溶 | 茎葉処理 | 北海道      | 全草種   | 雑草生育期<br>(草丈30cm以下) | 40~60 g/a        | 全土壌  | (23)<br>(24) |
|                     |      | 東北       |       |                     |                  |      |              |
|                     |      | 北陸       |       |                     |                  |      |              |
|                     |      | 関東・東山・東海 |       |                     |                  |      |              |
|                     |      | 近畿・中国    |       |                     |                  |      |              |
|                     |      | 四国       |       |                     |                  |      |              |
|                     |      | 九州       |       |                     |                  |      |              |

|                     | 処理法  | 地域名      | 対象雑草名 | 処理時期                | 使用量・製品<br>(希釈水量) | 適用土壌 | 使用上の注意       |
|---------------------|------|----------|-------|---------------------|------------------|------|--------------|
| Ⅳ<br>7. MW-851<br>液 | 茎葉処理 | 北海道      | 全草種   | 雑草生育期<br>(草丈30cm以下) | 50~100ml/a       | 全土壌  | (23)<br>(24) |
|                     |      | 東北       |       |                     |                  |      |              |
|                     |      | 北陸       |       |                     |                  |      |              |
|                     |      | 関東・東山・東海 |       |                     |                  |      |              |
|                     |      | 近畿・中国    |       |                     |                  |      |              |
|                     |      | 四国       |       |                     |                  |      |              |
|                     |      | 九州       |       |                     |                  |      |              |

Ⅳ  
8. SUM-302 顆粒性水和 「継」

|                     | 処理法  | 地域名      | 対象雑草名        | 処理時期                | 使用量・製品<br>(希釈水量)                   | 適用土壌 | 使用上の注意       |
|---------------------|------|----------|--------------|---------------------|------------------------------------|------|--------------|
| Ⅳ<br>9. ULV-03<br>液 | 茎葉処理 | 北海道      | 全草種 (スギナは除く) | 雑草生育期<br>(草丈30cm以下) | 300~500ml/a<br>原液散布:<br>専用の散布機を用いる | 全土壌  | (23)<br>(24) |
|                     |      | 東北       |              |                     |                                    |      |              |
|                     |      | 北陸       |              |                     |                                    |      |              |
|                     |      | 関東・東山・東海 |              |                     |                                    |      |              |
|                     |      | 近畿・中国    |              |                     |                                    |      |              |
|                     |      | 四国       |              |                     |                                    |      |              |
|                     |      | 九州       |              |                     |                                    |      |              |





## VII-1 つづき

|                                       | 処理法  | 地域名      | 作期 | 元1               | 一年広葉マリン | 秋刈             | 刈加             | ミカサ刈           | バサ刈            | 刈加イ | 刈効 | ヒムロ  | 藻類・層剥離 |      | 処理時期                 | 使用量・製品  | 砂壌土 | 壤土 | 埴土 | 埴土 | 減水深cm/d | 使用上の注意                       |
|---------------------------------------|------|----------|----|------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|----|------|--------|------|----------------------|---------|-----|----|----|----|---------|------------------------------|
| VII-1<br>5.DPX<br>-84CGD<br>-1kg<br>粒 | 土壌処理 | 北海道      |    |                  |         |                |                |                |                |     |    |      |        |      |                      |         |     |    |    |    |         |                              |
|                                       |      | 東北       |    |                  |         |                |                |                |                |     |    |      |        |      |                      |         |     |    |    |    |         |                              |
|                                       |      | 北陸       |    | 〇 <sub>2</sub>   | 〇       | 〇 <sub>2</sub> | 〇 <sub>2</sub> | 〇 <sub>2</sub> | 〇 <sub>2</sub> |     | 〇始 | 〇    | 〇      | ●刈再  | *北陸の砂壌土は+5以降+3~+7に2L | 100 g/a | 〇   | 〇  | 〇  | 〇  | 2       | (26)<br>(28)<br>(34)<br>(38) |
|                                       |      | 関東・東山・東海 | 早  | 〇 <sub>2</sub>   | 〇       | 〇 <sub>2</sub> | ● <sub>2</sub> | 〇 <sub>2</sub> |                |     |    | ●発生期 | ●発生期   | ●発生期 | +5~+7に2L             |         |     | 〇  | 〇  | 〇  | 2       |                              |
|                                       |      |          | 昔  | 〇 <sub>2</sub>   | 〇       | 〇 <sub>2</sub> | ● <sub>2</sub> | 〇 <sub>2</sub> |                |     |    | ●    | ●      | ●    |                      |         |     | 〇  | 〇  | 〇  |         |                              |
|                                       |      | 近畿・中国    | 早  | ● <sub>2</sub>   | ●       | ● <sub>2</sub> | ● <sub>2</sub> | ● <sub>2</sub> |                |     |    | ●発生期 | ●発生期   | ●    | +5~+7に2L             |         |     | ●  | ●  | ●  | 1       |                              |
|                                       |      |          | 昔  | 〇 <sub>1.5</sub> | 〇       | 〇始             |                | 〇 <sub>2</sub> |                |     |    | 〇前   | 〇前     | ●刈再  | +5~+7に1.5L           |         |     | 〇  | 〇  | 〇  |         |                              |
|                                       |      | 四国       | 早  | ● <sub>2</sub>   | ●       | ● <sub>2</sub> | ● <sub>2</sub> | ● <sub>2</sub> |                |     |    | ●発生期 | ●発生期   | ●前   | +5~+7に2L             |         |     | ●  | ●  | ●  |         |                              |
|                                       |      |          | 昔  | 〇 <sub>1.5</sub> | 〇       | 〇始             |                | 〇 <sub>2</sub> |                |     |    | 〇前   | 〇前     | ●    | +5~+7に1.5L           |         |     | 〇  | 〇  | 〇  |         |                              |
|                                       |      | 九州       | 早  | ● <sub>2</sub>   | ●       | ● <sub>2</sub> | ● <sub>2</sub> | ● <sub>2</sub> |                |     |    | ●発生期 |        |      | +5~+7に2L             |         |     | ●  | ●  | ●  |         |                              |
|                                       |      |          | 昔  | ● <sub>2</sub>   | ●       | ● <sub>2</sub> | ● <sub>2</sub> | ● <sub>2</sub> |                |     |    | ●発生期 |        |      |                      |         |     | ●  | ●  | ●  |         |                              |

[illegible][illegible]

## VII-1 つづき

| 処理法                                              | 地域名      | 作期 | 元1   | 一年<br>広葉<br>マツイ | オシイ | カカ<br>ツ | ミカ<br>ツ | ハカ<br>ツ | カカ<br>イ | カカ<br>ツ | ヒル<br>シ | 藻類<br>表層<br>剥離 | 切<br>リ | 1ツヤ<br>ツ | 処理時期      | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壤<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上<br>の注意                   |
|--------------------------------------------------|----------|----|------|-----------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|--------|----------|-----------|----------------|-------------|--------|--------|--------|-----------------|------------------------------|
| 8. KUH-883<br>粒<br><br>VII-2 18<br>II-6-(1) 5 併用 | 北海道      |    | ○2   | ○               | ○2  | ○2      |         | ○2      |         |         | ○発生     | ○始             | ○前     | ○始       | +0~+12L   | 1.50<br>g/a    | ○           | ○      | ○      | ○      | 2               | (28)<br>(38)<br>(42)<br>(44) |
|                                                  | 東北       |    | ○2.5 | ○               | ○2  | ○2      | ○2      | ○2      | ○始      | ○始      | ○期      | ○前             | ○始     | ○始       | +0~+12.5L | 300            | ○           | ○      | ○      | ○      |                 |                              |
|                                                  | 北陸       |    |      |                 |     |         |         |         |         |         |         |                |        |          |           |                |             |        |        |        |                 |                              |
|                                                  | 関東・東山・東海 | 早  |      |                 |     |         |         |         |         |         |         |                |        |          |           |                |             |        |        |        |                 |                              |
|                                                  |          | 普  |      |                 |     |         |         |         |         |         |         |                |        |          |           |                |             |        |        |        |                 |                              |
|                                                  | 近畿・中国    | 早  |      |                 |     |         |         |         |         |         |         |                |        |          |           |                |             |        |        |        |                 |                              |
|                                                  |          | 普  |      |                 |     |         |         |         |         |         |         |                |        |          |           |                |             |        |        |        |                 |                              |
|                                                  | 四国       | 早  |      |                 |     |         |         |         |         |         |         |                |        |          |           |                |             |        |        |        |                 |                              |
|                                                  |          | 普  |      |                 |     |         |         |         |         |         |         |                |        |          |           |                |             |        |        |        |                 |                              |
|                                                  | 九州       | 早  |      |                 |     |         |         |         |         |         |         |                |        |          |           |                |             |        |        |        |                 |                              |
|                                                  |          | 普  |      |                 |     |         |         |         |         |         |         |                |        |          |           |                |             |        |        |        |                 |                              |

クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することにより、さらに効果が向上する（東北）  
オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することにより、さらに効果が向上する（東北）

| 処理法                              | 地域名      | 作期 | 元1 | 一年<br>広葉<br>マツイ | オシイ | カカ<br>ツ | ミカ<br>ツ | ハカ<br>ツ | カカ<br>イ | カカ<br>ツ | ヒル<br>シ | 藻類<br>表層<br>剥離 | 切<br>リ | 1ツヤ<br>ツ | 処理時期    | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壤<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上<br>の注意           |
|----------------------------------|----------|----|----|-----------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|--------|----------|---------|----------------|-------------|--------|--------|--------|-----------------|----------------------|
| VII-1<br>9. KUH-883<br>粒<br>-1kg | 北海道      |    | ○2 | ○               | ○2  | ○2      |         | ○2      |         |         | ○発生     | ○前             | ○前     | ○始       | +5~+12L | 1.50<br>g/a    | ○           | ○      | ○      | ○      | 2               | (28)<br>(38)<br>(42) |
|                                  | 東北       |    | ○2 | ○               | ○2  | ○2      | ○2      | ○2      | ○始      | ○始      | ○期      | ○前             | ○始     | ○始       |         |                | ○           | ○      | ○      | ○      |                 |                      |
|                                  | 北陸       |    |    |                 |     |         |         |         |         |         |         |                |        |          |         |                |             |        |        |        |                 |                      |
|                                  | 関東・東山・東海 | 早  |    |                 |     |         |         |         |         |         |         |                |        |          |         |                |             |        |        |        |                 |                      |
|                                  |          | 普  |    |                 |     |         |         |         |         |         |         |                |        |          |         |                |             |        |        |        |                 |                      |
|                                  | 近畿・中国    | 早  |    |                 |     |         |         |         |         |         |         |                |        |          |         |                |             |        |        |        |                 |                      |
|                                  |          | 普  |    |                 |     |         |         |         |         |         |         |                |        |          |         |                |             |        |        |        |                 |                      |
|                                  | 四国       | 早  |    |                 |     |         |         |         |         |         |         |                |        |          |         |                |             |        |        |        |                 |                      |
|                                  |          | 普  |    |                 |     |         |         |         |         |         |         |                |        |          |         |                |             |        |        |        |                 |                      |
|                                  | 九州       | 早  |    |                 |     |         |         |         |         |         |         |                |        |          |         |                |             |        |        |        |                 |                      |
|                                  |          | 普  |    |                 |     |         |         |         |         |         |         |                |        |          |         |                |             |        |        |        |                 |                      |

| 処理法                                                               | 地域名      | 作期 | 元1 | 一年<br>広葉<br>マツイ | オシイ | カカ<br>ツ | ミカ<br>ツ | ハカ<br>ツ | カカ<br>イ | カカ<br>ツ | ヒル<br>シ | 藻類<br>表層<br>剥離 | 切<br>リ  | 1ツヤ<br>ツ | 処理時期    | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壤<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上<br>の注意                           |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----|----|-----------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|----------|---------|----------------|-------------|--------|--------|--------|-----------------|--------------------------------------|
| VII-1<br>10. KUH-883<br>粒<br>○<br><br>II-6-(1) 6<br>II-6-(2) 1 併用 | 北海道      |    | ○2 | ○               | ○2  | ○2      |         | ○2      |         |         | ○発生     | ○前             | ○再<br>生 | ○始       | +5~+12L | 300<br>g/a     | ○           | ○      | ○      | ○      | 2               | (26)<br>(34)<br>(38)<br>(41)<br>(42) |
|                                                                   | 東北       |    | ○2 | ○               | ○2  | ○2      | ○2      |         |         |         | ○発生     | ○前             | ○再<br>生 | ○始       |         |                | ○           | ○      | ○      | ○      |                 |                                      |
|                                                                   | 北陸       |    | ○2 | ○               | ○2  | ○2      | ○2      | ○2      | ○始      | ○始      | ○期      | ○前             | ○始      | ○始       | +0~+12L |                | ○           | ○      | ○      | ○      |                 |                                      |
|                                                                   | 関東・東山・東海 | 早  | ○2 | ○               | ○2  | ○2      | ○2      |         |         |         | ○発生     | ○前             | ○再<br>生 | ○始       |         |                | ○           | ○      | ○      | ○      |                 |                                      |
|                                                                   |          | 普  | ○2 | ○               | ○2  | ○2      | ○2      |         | ○始      | ○始      | ○期      | ○前             | ○再<br>生 | ○始       |         |                | ○           | ○      | ○      | ○      |                 |                                      |
|                                                                   | 近畿・中国    | 早  | ○2 | ○               | ○2  | ○2      | ○2      |         |         |         | ○発生     | ○前             | ○再<br>生 | ○始       | +5~+12L |                | ●           | ○      | ○      | ○      | 1               |                                      |
|                                                                   |          | 普  | ○2 | ○               | ○2  | ○2      | ○2      |         | ○始      | ○期      | ○前      | ○再<br>生        | ○始      | +0~+12L  |         |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 2               |                                      |
|                                                                   | 四国       | 早  | ○2 | ○               | ○2  | ○2      | ○2      |         |         |         | ○発生     | ○前             | ○再<br>生 | ○始       | +5~+12L |                | ●           | ○      | ○      | ○      | 1               |                                      |
|                                                                   |          | 普  | ○2 | ○               | ○2  | ○2      | ○2      |         | ○始      | ○期      | ○前      | ○再<br>生        | ○始      | +0~+12L  |         |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 2               |                                      |
|                                                                   | 九州       | 早  | ○2 | ○               | ○2  | ○2      | ○始      |         | ●始      | ○前      | ○発生     | ○前             | ○再<br>生 | ○始       | +5~+12L |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 1               |                                      |
|                                                                   |          | 普  | ○2 | ○               | ○2  | ○2      | ○始      |         | ○始      | ●前      | ○期      | ○前             | ○再<br>生 | ○始       | +0~+12L |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 1.5             |                                      |

クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することにより、さらに効果が向上する（関東・東山・東海、近畿〜九州）  
オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することにより、さらに効果が向上する（北陸、関東・東山・東海、九州）

VII-1 つづき

|                                        | 処理法  | 地域名      | 作期 | ベI | 一年広葉マツバ | オシロイ | ウカ | ミズナ | ハルタ | ウカ | ハルタ | ヒムシ | 落類表層剥離 |    | 処理時期         | 使用量・製品     | 砂壌土 | 壤土 | 埴土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意               |
|----------------------------------------|------|----------|----|----|---------|------|----|-----|-----|----|-----|-----|--------|----|--------------|------------|-----|----|----|----|----------|----------------------|
| VII-1<br>11. KUH<br>-8830<br>-1kg<br>粒 | 土壌処理 | 北海道      |    |    |         |      |    |     |     |    |     |     |        |    |              |            |     |    |    |    |          |                      |
|                                        |      | 東北       |    |    |         |      |    |     |     |    |     |     |        |    |              |            |     |    |    |    |          |                      |
|                                        |      | 北陸       |    | 02 | 0       | 02   | 02 | 02  | 02  |    |     | 0始  | 0発生    | 0前 | +5~<br>ベI 2L | 100<br>g/a | 0   | 0  | 0  | 0  | 2        | (26)<br>(34)<br>(41) |
|                                        |      | 関東・東山・東海 | 早  | 02 | 0       | 02   | 02 | 02  |     |    |     |     | 0発生    | 0前 |              |            | 0   | 0  | 0  | 0  |          |                      |
|                                        |      |          | 普  | 02 | 0       | 02   | 02 | 02  |     |    |     |     | 0発生    | 0前 |              |            |     | 0  | 0  | 0  |          |                      |
|                                        |      | 近畿・中国    | 早  | 02 | 0       | 02   | 02 | 02  |     |    |     |     | 0発生    | 0前 |              |            |     |    | 0  | 0  | 1        |                      |
|                                        |      |          | 普  | 02 | 0       | 02   | 02 | 02  |     |    |     |     | 0発生    | 0前 |              |            |     | 0  | 0  | 0  |          |                      |
|                                        |      | 四国       | 早  | 02 | 0       | 02   | 02 | 02  |     |    |     |     | 0発生    | 0前 |              |            |     |    | 0  | 0  |          |                      |
|                                        |      |          | 普  | 02 | 0       | 02   | 02 | 02  |     |    |     |     | 0発生    | 0前 |              |            |     | 0  | 0  | 0  |          |                      |
|                                        |      | 九州       | 早  | 02 | 0       | 02   | 02 | 02  |     |    |     |     | 0発生    | 0前 |              |            | 0   | 0  | 0  | 0  | 2        |                      |
|                                        |      |          | 普  | 02 | 0       | 02   | 02 | 02  |     |    |     |     | 0発生    | 0前 |              |            | 0   | 0  | 0  | 0  |          |                      |

|                                | 処理法  | 地域名      | 作期 | ベI | 一年広葉マツバ | オシロイ | ウカ | ミズナ | ハルタ | ウカ | ハルタ | ヒムシ | 落類表層剥離 |    | 処理時期                                | 使用量・製品     | 砂壌土 | 壤土 | 埴土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意                                               |
|--------------------------------|------|----------|----|----|---------|------|----|-----|-----|----|-----|-----|--------|----|-------------------------------------|------------|-----|----|----|----|----------|------------------------------------------------------|
| VII-1<br>12. NC<br>-311CG<br>粒 | 土壌処理 | 北海道      |    | 02 | 0       | 02   | 02 |     | 02  |    |     | 0   | 0発生    | 0前 | +5~ベI 2L                            | 150<br>g/a | 0   | 0  | 0  | 0  | 2        | (26)<br>(28)<br>(36)<br>(38)<br>(40)<br>(42)<br>(44) |
|                                |      | 東北       |    | 02 | 0       | 02   | 02 | 02  | 02  | 0始 | 0始  | 0発生 | 0**    | 0再 | +0~ベI 2L                            | 300<br>g/a | 0   | 0  | 0  | 0  |          |                                                      |
|                                |      | 北陸       |    | 02 | 0       | 02   | 02 | 02  | 02  |    |     | 0   |        | 0再 |                                     |            | 0   | 0  | 0  | 0  |          |                                                      |
|                                |      | 関東・東山・東海 | 早  | 02 | 0       | 02   | 02 | 02  |     |    |     |     | 0発生    | 0前 |                                     |            |     | 0  | 0  | 0  |          |                                                      |
|                                |      |          | 普  | 02 | 0       | 02   | 02 | 02  |     | 0始 | 0始  | 0発生 | 0前     | 0  |                                     |            | 0   | 0  | 0  | 0  |          |                                                      |
|                                |      | 近畿・中国    | 早  |    |         |      |    |     |     |    |     |     |        |    | *マツバ<br>始~本葉<br>展開期<br>**マツバ<br>前~始 |            |     |    |    |    |          | +0は、<br>埴土<br>~埴土                                    |
|                                |      |          | 普  |    |         |      |    |     |     |    |     |     |        |    |                                     |            |     |    |    |    |          |                                                      |
|                                |      | 四国       | 早  |    |         |      |    |     |     |    |     |     |        |    |                                     |            |     |    |    |    |          |                                                      |
|                                |      |          | 普  |    |         |      |    |     |     |    |     |     |        |    |                                     |            |     |    |    |    |          |                                                      |
|                                |      | 九州       | 早  |    |         |      |    |     |     |    |     |     |        |    |                                     |            |     |    |    |    |          |                                                      |
|                                |      |          | 普  |    |         |      |    |     |     |    |     |     |        |    |                                     |            |     |    |    |    |          |                                                      |

クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することにより、さらに効果が向上する（東北、関東・東山・東海）  
オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することにより、さらに効果が向上する（東北、関東・東山・東海）  
コウキヤガラに有効な剤との組み合わせで連年施用することにより、さらに効果が向上する（東北）

|                                        | 処理法  | 地域名      | 作期 | ベI | 一年広葉マツバ | オシロイ | ウカ | ミズナ | ハルタ | ウカ | ハルタ | ヒムシ | 落類表層剥離 |    | 処理時期     | 使用量・製品     | 砂壌土 | 壤土 | 埴土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意                               |
|----------------------------------------|------|----------|----|----|---------|------|----|-----|-----|----|-----|-----|--------|----|----------|------------|-----|----|----|----|----------|--------------------------------------|
| VII-1<br>13. NC<br>-311CG<br>-1kg<br>粒 | 土壌処理 | 北海道      |    | 02 | 0       | 02   | 02 |     | 02  |    |     | 0   | 0発生    | 0前 | +5~ベI 2L | 100<br>g/a | 0   | 0  | 0  | 0  | 2        | (26)<br>(28)<br>(38)<br>(40)<br>(42) |
|                                        |      | 東北       |    | 02 | 0       | 02   | 02 | 02  | 02  | 0始 | 0始  | 0発生 | 0      | 0再 |          |            | 0   | 0  | 0  | 0  |          |                                      |
|                                        |      | 北陸       |    | 02 | 0       | 02   | 02 | 02  | 02  |    |     | 0   |        | 0始 |          |            | 0   | 0  | 0  | 0  |          |                                      |
|                                        |      | 関東・東山・東海 | 早  | 02 | 0       | 02   | 02 | 02  |     |    |     |     | 0発生    | 0前 |          |            |     | 0  | 0  | 0  | 1.5      |                                      |
|                                        |      |          | 普  | 02 | 0       | 02   | 02 | 02  |     |    |     |     | 0発生    | 0前 |          |            |     | 0  | 0  | 0  | 2        |                                      |
|                                        |      | 近畿・中国    | 早  |    |         |      |    |     |     |    |     |     |        |    |          |            |     |    |    |    |          |                                      |
|                                        |      |          | 普  |    |         |      |    |     |     |    |     |     |        |    |          |            |     |    |    |    |          |                                      |
|                                        |      | 四国       | 早  |    |         |      |    |     |     |    |     |     |        |    |          |            |     |    |    |    |          |                                      |
|                                        |      |          | 普  |    |         |      |    |     |     |    |     |     |        |    |          |            |     |    |    |    |          |                                      |
|                                        |      | 九州       | 早  |    |         |      |    |     |     |    |     |     |        |    |          |            |     |    |    |    |          |                                      |
|                                        |      |          | 普  |    |         |      |    |     |     |    |     |     |        |    |          |            |     |    |    |    |          |                                      |

## VII-1 つづき

|                                               | 処理法  | 地域名      | 作期   | ベ1   | 一年広葉マツイ | 杉イ | カカ | ミカカ | ハカカ | カカイ | カカ | ヒカシ | 落類表層剥離 |     | 処理時期 | 使用量・製品    | 砂壌土        | 壤土 | 埴壌土 | 埴土 | 減水深<br>cm/d | 使用上の注意 |                                      |  |  |
|-----------------------------------------------|------|----------|------|------|---------|----|----|-----|-----|-----|----|-----|--------|-----|------|-----------|------------|----|-----|----|-------------|--------|--------------------------------------|--|--|
| Ⅶ-1<br>14. NC<br>-311CGD<br>粒<br>Ⅱ-6-(8) 1 併用 | 土壌処理 | 北海道      |      |      |         |    |    |     |     |     |    |     |        |     |      |           |            |    |     |    |             |        |                                      |  |  |
|                                               |      | 東北       |      |      |         |    |    |     |     |     |    |     |        |     |      |           |            |    |     |    |             |        |                                      |  |  |
|                                               |      | 北陸       |      |      |         |    |    |     |     |     |    |     |        |     |      |           |            |    |     |    |             |        |                                      |  |  |
|                                               |      | 関東・東山・東海 | 早    |      |         |    |    |     |     |     |    |     |        |     |      |           |            |    |     |    |             |        |                                      |  |  |
|                                               |      | 普        |      |      |         |    |    |     |     |     |    |     |        |     |      |           |            |    |     |    |             |        |                                      |  |  |
|                                               |      | 近畿・中国    | 早    | ○1.5 | ○       | ○始 | ○始 | ○2  |     |     |    | ○2  | ○発生    | ○発生 | ○リ   | +3~+11.5L | 300<br>g/a | 1  | ○   | ○  | ○           | 1      | (26)<br>(34)<br>(38)<br>(41)<br>(42) |  |  |
|                                               |      | 普        | ○1.5 | ○    | ○2      | ○2 | ○2 |     | ○始  | ○始  | ○期 | ○前  | ○再     | ○   | ○    |           |            | ○  | 2   |    |             |        |                                      |  |  |
|                                               |      | 四国       | 早    | ○1.5 | ○       | ○始 | ○始 | ○2  |     |     | ○2 | ○発生 | ○発生    | ○前  | 1    |           |            | ○  | ○   | ○  | 1           |        |                                      |  |  |
|                                               |      | 普        | ○1.5 | ○    | ○2      | ○2 | ○2 |     | ○始  | ○始  | ○期 | ○前  | ○始     | ○   | ○    |           |            | ○  | 2   |    |             |        |                                      |  |  |
|                                               |      | 九州       | 早    | ○1.5 | ○       | ○2 | ○2 | ○2  |     | ○始  |    | ○発生 | ○発生    | ○   | ○    |           |            | ○  | ○   | 1  |             |        |                                      |  |  |
|                                               |      | 普        | ○1.5 | ○    | ○2      | ○2 | ○2 |     | ○始  | ○始  | ○期 | ○前  | ○      | ○   | ○    |           |            | ○  | 1.5 |    |             |        |                                      |  |  |
|                                               |      |          |      |      |         |    |    |     |     |     |    |     |        |     |      |           |            |    |     |    |             |        |                                      |  |  |
|                                               |      |          |      |      |         |    |    |     |     |     |    |     |        |     |      |           |            |    |     |    |             |        |                                      |  |  |
|                                               |      |          |      |      |         |    |    |     |     |     |    |     |        |     |      |           |            |    |     |    |             |        |                                      |  |  |
|                                               |      |          |      |      |         |    |    |     |     |     |    |     |        |     |      |           |            |    |     |    |             |        |                                      |  |  |
|                                               |      |          |      |      |         |    |    |     |     |     |    |     |        |     |      |           |            |    |     |    |             |        |                                      |  |  |
|                                               |      |          |      |      |         |    |    |     |     |     |    |     |        |     |      |           |            |    |     |    |             |        |                                      |  |  |
|                                               |      |          |      |      |         |    |    |     |     |     |    |     |        |     |      |           |            |    |     |    |             |        |                                      |  |  |

クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することにより、さらに効果が向上する（近畿・中国・四国・九州）  
 オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することにより、さらに効果が向上する（近畿・中国・四国・九州）

|                                         | 処理法              | 地域名              | 作期 | ベ1   | 一年<br>広葉<br>マツ | 杉イ | ウカ | ミカ<br>カ | ハカ<br>カ | カカ<br>イ | カカ | ヒカ<br>シ | 落類<br>表層<br>剥離 |         | 処理時期    | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>壌<br>土 | 埴<br>土 | 減水深<br>cm/d | 使用<br>上の<br>注 |   |      |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|----|------|----------------|----|----|---------|---------|---------|----|---------|----------------|---------|---------|----------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------|---|------|
| VII-1<br>15. NC<br>-311CGD<br>-1kg<br>粒 | 土<br>壌<br>処<br>理 | 北海道              |    |      |                |    |    |         |         |         |    |         |                |         |         |                |             |        |             |        |             |               |   |      |
|                                         |                  | 東北               |    |      |                |    |    |         |         |         |    |         |                |         |         |                |             |        |             |        |             |               |   |      |
|                                         |                  | 北陸               |    |      |                |    |    |         |         |         |    |         |                |         |         |                |             |        |             |        |             |               |   |      |
|                                         |                  | 関東<br>・東山<br>・東海 | 早  |      |                |    |    |         |         |         |    |         |                |         |         |                |             |        |             |        |             |               |   |      |
|                                         |                  |                  | 普  |      |                |    |    |         |         |         |    |         |                |         |         |                |             |        |             |        |             |               |   |      |
|                                         |                  | 近畿<br>・中国        | 早  | ●1.5 | ●              | ●始 | ●始 | ●2      |         |         |    |         |                | ●発<br>生 | ●リ<br>再 | +5~+11.5L      | 100<br>g/a  |        | ●           | ●      | ●           | ●             | 1 | (26) |
|                                         |                  |                  | 普  | ○1.5 | ○              | ○始 | ○始 | ○2      |         |         |    |         |                | ○前      | ○生<br>前 | +3~+11.5L      |             |        | ○           | ○      | ○           | ○             |   | (28) |
|                                         |                  | 四国               | 早  | ●1.5 | ●              | ●始 | ●始 | ●2      |         |         |    |         |                | ●発<br>生 | ●リ<br>再 | +5~+11.5L      |             |        | ●           | ●      | ●           | ●             |   | (34) |
|                                         |                  |                  | 普  | ○1.5 | ○              | ○始 | ○始 | ○2      |         |         |    |         |                | ○前      | ○生<br>前 | +3~+11.5L      |             |        |             | ○      | ○           | ○             |   |      |
|                                         |                  | 九州               | 早  | ●1.5 | ●              | ●始 | ●始 | ●2      |         |         |    |         |                | ●発<br>生 |         | +5~+11.5L      |             |        | ●           | ●      | ●           | ●             |   |      |
|                                         |                  |                  | 普  | ●1.5 | ●              | ●始 | ●始 | ●始      |         |         |    |         |                | ●期      |         | +3~+11.5L      |             |        | ●<br>1      | ●      | ●           | ●             | ● | 1.5  |
|                                         |                  |                  |    |      |                |    |    |         |         |         |    |         |                |         |         |                |             |        |             |        |             |               |   |      |
|                                         |                  |                  |    |      |                |    |    |         |         |         |    |         |                |         |         |                |             |        |             |        |             |               |   |      |
|                                         |                  |                  |    |      |                |    |    |         |         |         |    |         |                |         |         |                |             |        |             |        |             |               |   |      |
|                                         |                  |                  |    |      |                |    |    |         |         |         |    |         |                |         |         |                |             |        |             |        |             |               |   |      |
|                                         |                  |                  |    |      |                |    |    |         |         |         |    |         |                |         |         |                |             |        |             |        |             |               |   |      |
|                                         |                  |                  |    |      |                |    |    |         |         |         |    |         |                |         |         |                |             |        |             |        |             |               |   |      |
|                                         |                  |                  |    |      |                |    |    |         |         |         |    |         |                |         |         |                |             |        |             |        |             |               |   |      |

|                                                                | 処理法  | 地域名      | 作期 | ベ1 | 一年広葉マツ | 杉イ | カカ | ミカカ | ハカカ | カカイ | カカ | ヒカシ | 落類表層剥離   |           | 処理時期     | 使用量・製品     | 砂壌土      | 壤土 | 埴土 | 埴土 | 減水深<br>cm/d | 使用上の注意       |     |
|----------------------------------------------------------------|------|----------|----|----|--------|----|----|-----|-----|-----|----|-----|----------|-----------|----------|------------|----------|----|----|----|-------------|--------------|-----|
| Ⅶ-1<br>16. NC<br>-311HW<br>粒<br>(BNC-311H)<br><br>Ⅱ-6-(6) 2 併用 | 土壌処理 | 北海道      |    | ○2 | ○      | ○2 | ○2 |     | ○2  |     |    | ○   | ○前       | ○再生<br>●2 | +5 ~+12L | 300<br>g/a | ●1.5     | ○  | ○  | ○  | 2           | (28)<br>(34) |     |
|                                                                |      | 東北       |    | ○2 | ○      | ○2 | ○2 | ○2  | ○2  |     |    | ○生  | ○前       | ○再生<br>●  | +5 ~+12L |            | ●        | ○  | ○  | ○  |             |              |     |
|                                                                |      | 北陸       |    | ○2 | ○      | ○2 | ○2 | ○2  |     |     |    | ●   |          | ○再生<br>●  | +5 ~+12L |            |          | ○  | ○  | ○  |             |              |     |
|                                                                |      | 関東・東山・東海 | 早  | ●2 | ●      | ●2 | ●2 |     |     |     |    |     | ○再生<br>● | ○再生<br>●  | +0 ~+12L |            | ●        | ●  | ●  | ●  |             |              |     |
|                                                                |      |          | 普  | ○2 | ○      | ○2 | ○2 | ○2  |     |     |    |     | ○期       | ○再生<br>●  |          |            |          | ○  | ○  | ○  | ○           |              |     |
|                                                                |      | 近畿・中国    | 早  | ●2 | ●      | ●2 | ●2 | ●2  |     |     |    |     | ●発       | ○再生<br>●  | ○再生<br>● |            | +0 ~+12L |    | ●  | ●  | ●           |              | 1   |
|                                                                |      |          | 普  | ○2 | ○      | ○2 | ○2 | ○2  |     |     |    |     | ○期       | ○再生<br>●  | ○再生<br>● |            | +0 ~+12L | ○  | ○  | ○  | ○           |              | 1.5 |
|                                                                |      | 四国       | 早  | ●2 | ●      | ●2 | ●2 | ●2  |     |     |    |     | ●発       | ○再生<br>●  | ○再生<br>● |            | +0 ~+12L |    | ●  | ●  | ●           |              | 1   |
|                                                                |      |          | 普  | ○2 | ○      | ○2 | ○2 | ○2  |     |     |    |     | ○期       | ○再生<br>●  | ○再生<br>● |            | +0 ~+12L | ○  | ○  | ○  | ○           |              | 1.5 |
|                                                                |      | 九州       | 早  | ●2 | ●      | ●2 | ●2 | ●2  |     |     |    |     | ●発       | ○再生<br>●  |          |            | +0 ~+12L |    |    | ●  | ●           |              | 1   |
|                                                                |      |          | 普  | ○2 | ○      | ○2 | ○2 | ○2  |     |     |    |     | ●期       |           |          |            | +0 ~+12L |    | ○  | ○  | ○           |              | ○   |
|                                                                |      |          |    |    |        |    |    |     |     |     |    |     |          |           |          |            |          |    |    |    |             |              |     |

VII-1 つづき

|                                    | 処理法  | 地域名              | 作期 | PC1 | 一年<br>広葉<br>マツバ | 杉バ | ツバ<br>ツバ | ミナ<br>ツバ | ハナ<br>ツバ | ツバ<br>ツバ | ツバ<br>ツバ | ツバ<br>ツバ | 種類<br>表層<br>剥離 | 処理時期        | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壤<br>土 | 壤<br>土 | 塩<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上<br>の注意 |              |   |
|------------------------------------|------|------------------|----|-----|-----------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------|--------|-----------------|------------|--------------|---|
| VII-1<br>17. NC-311<br>HW-1kg<br>粒 | 土壌処理 | 北海道              |    | ●2  | ●               | ●2 | ●2       |          | ●2       |          |          |          | ●発生<br>期       | ●切再生<br>前~始 | 100<br>g/a     | 1.5         | ●      | ●      | ●               | 2          | (28)<br>(34) |   |
|                                    |      | 東北               |    |     |                 |    |          |          |          |          |          |          |                |             |                | ●           | ●      | ●      |                 |            |              |   |
|                                    |      | 北陸               |    |     |                 |    |          |          |          |          |          |          |                |             |                |             |        |        |                 |            |              |   |
|                                    |      | 関東<br>・東山<br>・東海 | 早  |     |                 |    |          |          |          |          |          |          | ●発生<br>期       |             |                |             |        | ●      | ●               | ●          |              |   |
|                                    |      |                  | 普  | ●2  | ●               | ●2 | ●2       | ●2       |          |          |          |          |                |             |                |             | ●      | ●      | ●               | ●          |              |   |
|                                    |      | 近畿<br>・中国        | 早  |     |                 |    |          |          |          |          |          |          |                |             |                |             |        |        |                 |            |              |   |
|                                    |      |                  | 普  | ●2  | ●               | ●2 | ●2       | ●2       |          |          |          |          |                |             |                | ●切再生<br>前~始 |        | ●      | ●               | ●          |              | ● |
|                                    |      | 四国               | 早  |     |                 |    |          |          |          |          |          |          |                |             |                |             |        |        |                 |            |              |   |
|                                    |      |                  | 普  | ●2  | ●               | ●2 | ●2       | ●2       |          |          |          |          |                |             |                | ●切再生<br>前~始 |        | ●      | ●               | ●          |              | ● |
|                                    |      | 九州               | 早  |     |                 |    |          |          |          |          |          |          |                |             |                |             |        |        |                 |            |              |   |
|                                    |      |                  | 普  |     |                 |    |          |          |          |          |          |          |                |             |                |             |        |        |                 |            |              |   |

[illegible]

|                                  |              | 処理法  | 地域名              | 作<br>期 | 1年<br>広葉<br>マツ | ササ<br>ガ | ツバ<br>キ | ミナ<br>モリ | ハナ<br>ハナ | ツバ<br>キ | ツバ<br>キ | ツバ<br>キ  | ツバ<br>キ  | ツバ<br>キ  | ツバ<br>キ    | 処理時期 | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上<br>の注意           |  |
|----------------------------------|--------------|------|------------------|--------|----------------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|------------|------|----------------|-------------|--------|--------|-----------------|----------------------|--|
| Ⅶ-1<br>19. NSK<br>-855Q<br>フロアブル | Ⅱ-6-(2) 8 併用 | 土壌処理 | 北海道              |        |                |         |         |          |          |         |         |          |          |          |            |      | 50<br>mℓ/a     |             |        |        |                 | (28)<br>(34)<br>(38) |  |
|                                  |              |      | 東北               |        |                |         |         |          |          |         |         |          |          |          |            |      |                |             |        |        |                 |                      |  |
|                                  |              |      | 北陸               | ●2     | ●              | ●2      | ●2      | ●2       |          |         | ●始      |          | ●再生<br>前 |          | +5~ ㌢12L   |      |                | ●           | ●      | ●      | 2               |                      |  |
|                                  |              |      | 関東<br>・東山<br>・東海 | 早 ●1.5 | ●              | ●2      | ●2      | ●2       |          |         |         | ●発生<br>期 | ●発生<br>前 | ●始       | +5~㌢11. 5L |      |                | ●           | ●      | ●      | 1               |                      |  |
|                                  |              |      |                  | 普 ●1.5 | ●              | ●2      | ●2      | ●2       |          |         |         |          |          | ●始       |            |      |                | ●           | ●      | ●      | 2               |                      |  |
|                                  |              |      | 近畿<br>・中国        | 早 ●2   | ●              | ●2      | ●2      | ●2       |          |         |         |          |          | ●再生<br>前 | +5~ ㌢12L   |      |                | ●           | ●      | ●      | 1               |                      |  |
|                                  |              |      |                  | 普 ●2   | ●              | ●2      | ●2      | ●2       |          |         |         |          |          | ●再生<br>前 |            | ●    |                | ●           | ●      | 1.5    |                 |                      |  |
|                                  |              |      | 四国               | 早 ●2   | ●              | ●2      | ●2      | ●2       |          |         |         |          |          | ●始       |            |      |                | ●           | ●      | ●      | 1               |                      |  |
|                                  |              |      |                  | 普 ●2   | ●              | ●2      | ●2      | ●2       |          |         |         |          |          | ●        |            | ●    |                | ●           | ●      | 1.5    |                 |                      |  |
|                                  |              |      | 九州               | 早      |                |         |         |          |          |         |         |          | ●発生<br>期 |          |            |      |                |             |        |        |                 |                      |  |
|                                  |              |      |                  | 普 ●2   | ●              | ●2      | ●2      | ●2       |          |         |         |          |          |          |            |      |                | ●           | ●      | ●      |                 |                      |  |

## VII-1 つづき

|                                                                 | 処理法  | 地域名      | 作期 | バ1 | 一年広葉マ刈 | サ刈 | 刈刈 | ミサ刈 | ハラ刈 | 刈刈イ | サ刈 | ヒムシ | 藻類表層剥離 | 処理時期           | 使用量・製品     | 砂壌土 | 壤土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意                                              |
|-----------------------------------------------------------------|------|----------|----|----|--------|----|----|-----|-----|-----|----|-----|--------|----------------|------------|-----|----|----|----------|-----------------------------------------------------|
| VII-1<br>20. SKH-86020<br>粒<br><br>II-6-(1) 17<br>II-6-(2) 9 併用 | 土壌処理 | 北海道      |    | 02 | 0      | 02 | 0始 |     | 02  |     |    | 0発生 | 0前     | 刈<br>0再生<br>0始 | 300<br>g/a | 0   | 0  | 0  | 2        | (3)<br>(26)<br>(33)<br>(38)<br>(40)<br>(41)<br>(42) |
|                                                                 |      | 東北       |    | 02 | 0      | 02 | 02 | 02  | 02  | 0始  |    | 0発生 | 0期     | 刈<br>0再生<br>0始 |            |     |    |    |          |                                                     |
|                                                                 |      | 北陸       |    | 02 | 0      | 02 | 02 | 02  |     |     |    |     |        | 刈<br>0再生<br>0始 |            |     |    |    |          |                                                     |
|                                                                 |      | 関東・東山・東海 | 早  | 02 | 0      | 02 | 0始 | 02  |     |     |    |     |        | 刈<br>0再生<br>0始 |            |     |    |    |          |                                                     |
|                                                                 |      |          | 普  | 02 | 0      | 02 | 0始 | 0始  |     | ●始  | ●始 | 0発生 | 0前     | 刈<br>0再生<br>0始 |            |     |    |    |          |                                                     |
|                                                                 |      | 近畿・中国    | 早  | 02 | 0      | 02 | 02 | 02  |     |     |    | 0発生 | 0期     | 刈<br>0再生<br>0始 |            |     |    |    |          |                                                     |
|                                                                 |      |          | 普  | 02 | 0      | 02 | 02 | 02  |     | ●始  | ●始 |     |        | 刈<br>0再生<br>0始 |            |     |    |    |          |                                                     |
|                                                                 |      | 四国       | 早  | 02 | 0      | 02 | 02 | 02  |     |     |    | 0発生 | 0期     | 刈<br>0再生<br>0始 |            |     |    |    |          |                                                     |
|                                                                 |      |          | 普  | 02 | 0      | 02 | 02 | 02  |     | ●始  | ●始 |     |        | 刈<br>0再生<br>0始 |            |     |    |    |          |                                                     |
|                                                                 |      | 九州       | 早  | ●2 | ●      | ●2 | ●2 | ●2  |     |     |    | ●発生 | ●前     | 刈<br>0再生<br>0始 |            |     |    |    |          |                                                     |
|                                                                 |      |          | 普  | 02 | 0      | 02 | 02 | 02  |     | ●始  |    | 0期  | 0      | 刈<br>0再生<br>0始 |            |     |    |    |          |                                                     |

クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することにより、さらに効果が向上する。(東北、関東～九州)  
オモタカに有効な剤との組み合わせで連年施用することにより、さらに効果が向上する。(東北、近畿・中国)

|                                   | 処理法  | 地域名      | 作期 | バ1 | 一年広葉マ刈 | サ刈 | 刈刈 | ミサ刈 | ハラ刈 | 刈刈イ | サ刈 | ヒムシ | 藻類表層剥離 | 処理時期    | 使用量・製品     | 砂壌土 | 壤土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意 |
|-----------------------------------|------|----------|----|----|--------|----|----|-----|-----|-----|----|-----|--------|---------|------------|-----|----|----|----------|--------|
| VII-1<br>21. SL-4980<br>-1kg<br>粒 | 土壌処理 | 北海道      |    | ●2 | ●      | ●2 | ●2 |     | ●2  |     |    | ●発生 | ●発生    | +0～バ12L | 100<br>g/a | ●   | ●  | ●  | 2        |        |
|                                   |      | 東北       |    |    |        |    |    |     |     |     |    |     |        |         |            |     |    |    |          |        |
|                                   |      | 北陸       |    |    |        |    |    |     |     |     |    |     |        |         |            |     |    |    |          |        |
|                                   |      | 関東・東山・東海 | 早  |    |        |    |    |     |     |     |    |     |        |         |            |     |    |    |          |        |
|                                   |      |          | 普  |    |        |    |    |     |     |     |    |     |        |         |            |     |    |    |          |        |
|                                   |      | 近畿・中国    | 早  |    |        |    |    |     |     |     |    |     |        |         |            |     |    |    |          |        |
|                                   |      |          | 普  |    |        |    |    |     |     |     |    |     |        |         |            |     |    |    |          |        |
|                                   |      | 四国       | 早  |    |        |    |    |     |     |     |    |     |        |         |            |     |    |    |          |        |
|                                   |      |          | 普  |    |        |    |    |     |     |     |    |     |        |         |            |     |    |    |          |        |
|                                   |      | 九州       | 早  |    |        |    |    |     |     |     |    |     |        |         |            |     |    |    |          |        |
|                                   |      |          | 普  |    |        |    |    |     |     |     |    |     |        |         |            |     |    |    |          |        |

|                                  | 処理法  | 地域名      | 作期 | バ1   | 一年広葉マ刈 | サ刈 | 刈刈 | ミサ刈 | ハラ刈 | 刈刈イ | サ刈 | ヒムシ | 藻類表層剥離 | 処理時期      | 使用量・製品     | 砂壌土 | 壤土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意 |
|----------------------------------|------|----------|----|------|--------|----|----|-----|-----|-----|----|-----|--------|-----------|------------|-----|----|----|----------|--------|
| VII-1<br>22. SL-498<br>-1kg<br>粒 | 土壌処理 | 北海道      |    |      |        |    |    |     |     |     |    | ●発生 |        | +0～バ11.5L | 100<br>g/a | ●   | ●  | ●  | 2        |        |
|                                  |      | 東北       |    | ●1.5 | ●      | ●始 | ●始 | ●始  |     |     |    | ●発生 | ●前     |           |            |     |    |    |          |        |
|                                  |      | 北陸       |    |      |        |    |    |     |     |     |    |     |        |           |            |     |    |    |          |        |
|                                  |      | 関東・東山・東海 | 早  | ●2   | ●      | ●2 | ●2 |     |     |     |    |     | ●前     | +0～バ12L   |            |     |    |    |          |        |
|                                  |      |          | 普  | ●2   | ●      | ●2 | ●2 |     |     |     |    |     | ●前     |           |            |     |    |    |          |        |
|                                  |      | 近畿・中国    | 早  |      |        |    |    |     |     |     |    |     |        |           |            |     |    |    |          |        |
|                                  |      |          | 普  | ●2   | ●      | ●始 | ●始 | ●始  |     |     |    |     |        |           |            |     |    |    |          |        |
|                                  |      | 四国       | 早  |      |        |    |    |     |     |     |    |     |        |           |            |     |    |    |          |        |
|                                  |      |          | 普  | ●2   | ●      | ●始 | ●始 | ●始  |     |     |    |     |        |           |            |     |    |    |          |        |
|                                  |      | 九州       | 早  |      |        |    |    |     |     |     |    |     |        |           |            |     |    |    |          |        |
|                                  |      |          | 普  |      |        |    |    |     |     |     |    |     |        |           |            |     |    |    |          |        |

VII-1 つづき

|                              | 処理方法 | 地域名      | 作期 | ベ1   | 一年広葉マカシ | オハクイ | ササキ | ミカシ | ハナタチ | 知カシ | ササキ | ヒメシロ | 藻類表層剥離 |  | 処理時期          | 使用量・製品      | 砂壤土 | 壤土 | 植土 | 減水深<br>cm/d | 使用上の注意 |              |   |   |
|------------------------------|------|----------|----|------|---------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|--------|--|---------------|-------------|-----|----|----|-------------|--------|--------------|---|---|
| VII-1<br>23. SL-970<br>フロアブル | 土壌処理 | 北海道      |    | ○1.5 | ○       | ○2   | ○2  |     | ○2   |     |     | ○発生期 |        |  | +3~ベ1 1.5L    | 100<br>ml/a | 1.5 | ○  | ○  | ○           | 2      | (33)<br>(34) |   |   |
|                              |      | 東北       |    | ○2   | ○       | ○2   | ○2  | ○2  | ●2   |     |     | ●発生期 |        |  | +3 ~ ベ1 2L    |             | ●   | ○  | ○  | ○           |        |              |   |   |
|                              |      | 北陸       |    | ○2   | ○       | ○2   | ○2  | ○2  | ○2   |     |     |      | ●      |  | +3 ~<br>ベ1 2L |             |     |    | ○  | ○           | ○      |              |   |   |
|                              |      | 関東・東山・東海 | 早  | ○2   | ○       | ○2   | ●2  |     |      |     |     |      | ●発生期   |  |               |             |     |    |    | ○           | ○      |              | ○ |   |
|                              |      |          | 昔  | ○2   | ○       | ○2   | ●2  | ○2  |      |     |     |      | ●発生期   |  |               |             |     | ●  | ○  | ○           | ○      |              |   |   |
|                              |      | 近畿・中国    | 早  | ●2   | ●       | ●2   | ●始  |     |      |     |     |      |        |  |               |             |     |    |    |             | ●      |              | ● | 1 |
|                              |      |          | 昔  | ○2   | ○       | ○2   | ○2  | ○2  |      |     |     |      |        |  |               |             |     |    | ○  | ○           | ○      |              | ○ |   |
|                              |      | 四国       | 早  | ●2   | ●       | ●2   | ●始  |     |      |     |     |      |        |  |               |             |     |    |    |             |        |              | ● | ● |
|                              |      |          | 昔  | ○2   | ○       | ○2   | ○2  | ○2  |      |     |     |      |        |  |               |             |     |    |    | ○           | ○      |              | ○ | ○ |
|                              |      | 九州       | 早  | ●2   | ●       | ●2   | ●2  | ●2  |      |     |     |      |        |  |               |             |     |    |    |             | ●      |              | ● | ● |
| 昔                            | ○2   |          | ○  | ○2   | ○2      | ○2   |     |     |      |     |     |      |        |  |               |             |     |    | ○  | ○           |        |              |   |   |

|                            | 処理法  | 地域名      | 作<br>期 | 元<br>年<br>広葉<br>マツバ | オシロイ | ワカメ | ミズナ<br>マ | ハクサイ<br>効 | アスパ<br>イ | セロリ | ヒヨコ<br>口 | 落類・<br>剥離層 |          | 処理時期             | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壤土   | 埴<br>土   | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上<br>の注意  |   |   |
|----------------------------|------|----------|--------|---------------------|------|-----|----------|-----------|----------|-----|----------|------------|----------|------------------|----------------|-----------|----------|--------|-----------------|-------------|---|---|
| Ⅶ-1<br>24. SW-907<br><br>粒 | 土壌処理 | 北海道      |        |                     |      |     |          |           |          |     |          |            |          |                  |                |           |          |        |                 |             |   |   |
|                            |      | 東北       | ○2     | ○                   | ○2   | ○2  | ○2       | ○2        |          |     |          |            | 発生<br>前  | +3<br>~<br>元1 2L | 300<br>g/a     | ○         | ○        | ○      | 2               | (3)<br>(26) |   |   |
|                            |      | 北陸       | ○2     | ○                   | ○2   | ○2  | ○2       |           |          |     |          |            |          |                  |                |           | ○        | ○      | ○               |             |   |   |
|                            |      | 関東・東山・東海 | 早      | ●2                  | ●    | ●2  | ●2       | ●2        |          |     |          |            | 発生<br>前  |                  |                |           | ●        | ●      | ●               |             |   |   |
|                            |      |          | 普      | ○2                  | ○    | ○2  | ○2       | ○2        |          |     |          |            | ○前       |                  |                |           | ●        | ○      | ○               |             |   |   |
|                            |      | 近畿・中国    | 早      | ○2                  | ○    | ○2  | ○2       | ○2        |          |     |          | ○発生<br>期   | ○発生<br>期 |                  |                | 切○再生<br>前 |          | ○      | ○               |             | ○ | 1 |
|                            |      |          | 普      | ○2                  | ○    | ○2  | ○2       | ○2        |          |     |          |            | ○発生<br>期 |                  |                | ○発生<br>期  | ○再生<br>前 |        | ○               |             | ○ | ○ |
|                            |      | 四国       | 早      | ○2                  | ○    | ○2  | ○2       | ○2        |          |     |          | ○発生<br>期   | ○発生<br>期 |                  |                | ○始        |          | ○      | ○               |             | ○ | 1 |
|                            |      |          | 普      | ○2                  | ○    | ○2  | ○2       | ○2        |          |     |          |            | ○発生<br>期 |                  |                | ○発生<br>期  |          |        | ○               |             | ○ | ○ |
|                            |      | 九州       | 早      | ●2                  | ●    | ●2  | ●2       | ●2        |          |     |          |            | 発生<br>期  |                  |                | ●発生<br>期  |          |        | ●               |             | ● | ● |
| 普                          | ○2   |          | ○      | ○2                  | ○2   | ○2  |          |           |          |     | ○期       | ○前         |          |                  |                |           | ○        | ○      | ○               |             |   |   |

VII-1  
25. SW-921 粒 「繼」

[illegible]

## VII-1 つづき

|                                    | 処理法  | 地域名      | 作期 | 元I   | 一年広葉マツ | ナラ | クナ | ミナ | ハナ | カ | サ | ヒ | 藻類表層剥離 |      | 処理時期        | 使用量・製品     | 砂壌土 | 壤土 | 埴土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意                      |
|------------------------------------|------|----------|----|------|--------|----|----|----|----|---|---|---|--------|------|-------------|------------|-----|----|----|----|----------|-----------------------------|
| VII-1<br>27. TDS<br>-888Q<br>フロアブル | 土壌処理 | 北海道      |    |      |        |    |    |    |    |   |   |   |        |      | +3 ~ 元11.5L | 50<br>ml/a |     |    |    |    |          | (3)<br>(28)<br>(33)<br>(34) |
|                                    |      | 東北       |    |      |        |    |    |    |    |   |   |   |        |      |             |            |     |    |    |    |          |                             |
|                                    |      | 北陸       |    | ●1.5 | ●      | ●始 | ●始 | ●始 |    |   |   |   |        |      |             |            |     | ●  | ●  | ●  | 2        |                             |
|                                    |      | 関東・東山・東海 | 早  | ●1.5 | ●      | ●2 | ●2 | ●2 |    |   |   |   | ●発生    |      |             |            |     | ●  | ●  | ●  | 1        |                             |
|                                    |      |          | 普  | ●1.5 | ●      | ●2 | ●2 | ●2 |    |   |   |   | ●発生前   |      |             |            |     | ●  | ●  | ●  | 2        |                             |
|                                    |      | 近畿・中国    | 早  | ●1.5 | ●      | ●始 | ●始 | ●始 |    |   |   |   | ●発生    | ●再   |             |            |     | ●  | ●  | ●  | 1        |                             |
|                                    |      |          | 普  | ●1.5 | ●      | ●始 | ●始 | ●始 |    |   |   |   | ●発生期   | ●発生前 |             |            |     | ●  | ●  | ●  | 2        |                             |
|                                    |      | 四国       | 早  | ●1.5 | ●      | ●始 | ●始 | ●始 |    |   |   |   | ●発生    | ●再   |             |            |     | ●  | ●  | ●  | 1        |                             |
|                                    |      |          | 普  | ●1.5 | ●      | ●始 | ●始 | ●始 |    |   |   |   | ●発生期   | ●始   |             |            |     | ●  | ●  | ●  | 2        |                             |
|                                    |      | 九州       | 早  | ●1.5 | ●      | ●2 | ●2 | ●2 |    |   |   |   | ●発生    |      |             |            |     | ●  | ●  | ●  | 1.5      |                             |
|                                    |      |          | 普  | ●1.5 | ●      | ●2 | ●2 | ●2 |    |   |   |   | ●発生期   |      |             |            |     | ●  | ●  | ●  |          |                             |

|                                  | 処理法  | 地域名      | 作期 | 元I   | 一年広葉マツ | ナラ | クナ | ミナ | ハナ | カ | サ | ヒ   | 藻類表層剥離 |    | 処理時期        | 使用量・製品     | 砂壌土 | 壤土 | 埴土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意       |
|----------------------------------|------|----------|----|------|--------|----|----|----|----|---|---|-----|--------|----|-------------|------------|-----|----|----|----|----------|--------------|
| VII-1<br>28. TH-913<br>ADSO<br>粒 | 土壌処理 | 北海道      |    | ●1.5 | ●      | ●2 | ●2 |    | ●2 |   |   | ●発生 | ●発生    | ●再 | +3 ~ 元11.5L | 300<br>g/a |     | ●  | ●  | ●  |          | (28)<br>(34) |
|                                  |      | 東北       |    | ●1.5 | ●      | ●始 | ●始 | ●始 | ●始 |   |   | ●発生 | ●発生    | ●再 |             |            |     | ●  | ●  | ●  | 2        |              |
|                                  |      | 北陸       |    | ●1.5 | ●      | ●始 | ●始 | ●始 | ●始 |   |   | ●発生 | ●発生    | ●再 |             |            |     | ●  | ●  | ●  |          |              |
|                                  |      | 関東・東山・東海 | 早  | ●1.5 | ●      | ●2 | ●2 | ●2 |    |   |   | ●発生 | ●発生    | ●再 |             |            |     | ●  | ●  | ●  | 1        |              |
|                                  |      |          | 普  | ●1.5 | ●      | ●2 | ●2 | ●2 |    |   |   | ●発生 | ●発生    | ●再 |             |            |     | 1  | ●  | ●  | 2        |              |
|                                  |      | 近畿・中国    | 早  | ●1.5 | ●      | ●始 | ●始 | ●始 |    |   |   | ●発生 | ●発生    | ●再 |             |            |     | ●  | ●  | ●  | 1        |              |
|                                  |      |          | 普  | ●1.5 | ●      | ●始 | ●始 | ●始 |    |   |   | ●発生 | ●発生    | ●再 |             |            |     | ●  | ●  | ●  |          |              |
|                                  |      | 四国       | 早  | ●1.5 | ●      | ●始 | ●始 | ●始 |    |   |   | ●発生 | ●発生    | ●再 |             |            |     | ●  | ●  | ●  |          |              |
|                                  |      |          | 普  | ●1.5 | ●      | ●始 | ●始 | ●始 |    |   |   | ●発生 | ●発生    | ●再 |             |            |     | ●  | ●  | ●  |          |              |
|                                  |      | 九州       | 早  | ●1.5 | ●      | ●2 | ●2 | ●2 |    |   |   | ●発生 | ●発生    | ●再 |             |            |     | ●  | ●  | ●  |          |              |
|                                  |      |          | 普  | ●1.5 | ●      | ●2 | ●2 | ●2 |    |   |   | ●発生 | ●発生    | ●再 |             |            |     | ●  | ●  | ●  | 1.5      |              |

|                                     | 処理法  | 地域名      | 作期 | 元I | 一年広葉マツ | ナラ | クナ | ミナ | ハナ | カ | サ | ヒ   | 藻類表層剥離 |  | 処理時期      | 使用量・製品     | 砂壌土 | 壤土 | 埴土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意 |
|-------------------------------------|------|----------|----|----|--------|----|----|----|----|---|---|-----|--------|--|-----------|------------|-----|----|----|----|----------|--------|
| VII-1<br>29. TH-913<br>HSK-1kg<br>粒 | 土壌処理 | 北海道      |    | ●2 | ●      | ●2 | ●2 |    | ●2 |   |   | ●発生 | ●再     |  | +5 ~ 元12L | 100<br>g/a |     | ●  | ●  | ●  |          |        |
|                                     |      | 東北       |    | ●2 | ●      | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 |   |   | ●発生 | ●再     |  |           |            |     | ●  | ●  | ●  | 2        |        |
|                                     |      | 北陸       |    | ●2 | ●      | ●2 | ●2 | ●2 |    |   |   | ●発生 | ●再     |  |           |            |     | ●  | ●  | ●  |          |        |
|                                     |      | 関東・東山・東海 | 早  |    |        |    |    |    |    |   |   | ●発生 | ●再     |  |           |            |     |    |    |    |          |        |
|                                     |      |          | 普  | ●2 | ●      | ●2 | ●2 | ●2 |    |   |   | ●発生 | ●再     |  |           |            |     | ●  | ●  | ●  |          |        |
|                                     |      | 近畿・中国    | 早  | ●2 | ●      | ●2 | ●2 | ●2 |    |   |   | ●発生 | ●再     |  |           |            |     | ●  | ●  | ●  | 1        |        |
|                                     |      |          | 普  | ●2 | ●      | ●2 | ●2 | ●2 |    |   |   | ●発生 | ●再     |  |           |            |     | ●  | ●  | ●  | 1.5      |        |
|                                     |      | 四国       | 早  | ●2 | ●      | ●2 | ●2 | ●2 |    |   |   | ●発生 | ●再     |  |           |            |     | ●  | ●  | ●  | 1        |        |
|                                     |      |          | 普  | ●2 | ●      | ●2 | ●2 | ●2 |    |   |   | ●発生 | ●再     |  |           |            |     | ●  | ●  | ●  | 1.5      |        |
|                                     |      | 九州       | 早  |    |        |    |    |    |    |   |   |     |        |  |           |            |     |    |    |    |          |        |
|                                     |      |          | 普  |    |        |    |    |    |    |   |   |     |        |  |           |            |     |    |    |    |          |        |



VII-1 つづき

|                                       | 処理方法 | 地域名      | 作期   | バC1  | 一年<br>広葉<br>マカII | オウイ | ウカガ | Mカサ<br>刈 | ハカサ<br>効 | カカイ | セカ | ヒカシ<br>0 | 藻類<br>表層<br>剥離    |                             | 処理時期        | 使用量・<br>製品 | 砂<br>壤土 | 塩<br>壤土 | 塩<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の注意 |                             |   |   |     |
|---------------------------------------|------|----------|------|------|------------------|-----|-----|----------|----------|-----|----|----------|-------------------|-----------------------------|-------------|------------|---------|---------|--------|-----------------|--------|-----------------------------|---|---|-----|
| VII-1<br>30.<br>TH-913<br>ST<br>フロアブル | 土壌処理 | 北海道      |      | ●1.5 | ●                | ●2  | ●2  |          | ●2       |     |    | ●発生<br>期 | ●発生<br>前          | ●刈<br>再<br>生<br>前<br>→<br>始 | +0 ~ バ11.5L | 50<br>ml/a |         | ●       | ●      | ●               | 2      | 田植時散布可<br>(東北・関東東・東山・東海・九州) |   |   |     |
|                                       |      | 東北       |      | ●1.5 | ●                | ●始  | ●始  | ●始       | ●始       |     |    | ●        | ●生<br>前<br>→<br>始 |                             |             |            | ●       | ●       | ●      |                 |        |                             |   |   |     |
|                                       |      | 北陸       |      | ●1.5 | ●                | ●始  | ●始  | ●始       | ●始       |     |    |          |                   | ●                           |             |            | ●       | ●       |        |                 |        |                             |   |   |     |
|                                       |      | 関東・東山・東海 | 早    |      |                  |     |     |          |          |     |    | ●発生<br>期 |                   | ●刈<br>再<br>生<br>前<br>→<br>始 |             |            |         |         |        |                 |        |                             |   |   |     |
|                                       |      | 普        | ●1.5 | ●    | ●2               | ●2  | ●2  |          | ●始       |     | ●  | ●生<br>期  | ●                 |                             |             |            | ●       | ●       | ●      |                 |        |                             |   |   |     |
|                                       |      | 近畿・中国    | 早    | ●1.5 | ●                | ●始  |     |          |          |     |    |          |                   | ●                           |             |            |         |         | ●      | ●               |        |                             | ● | 1 |     |
|                                       |      | 普        | ●1.5 | ●    | ●始               | ●始  | ●始  |          |          |     |    |          |                   | ●                           |             |            |         | ●       | ●      | ●               |        |                             |   |   |     |
|                                       |      | 四国       | 早    | ●1.5 | ●                | ●始  |     |          |          |     |    |          |                   |                             |             |            | ●       |         |        | ●               |        |                             | ● | ● | 1   |
|                                       |      | 普        | ●1.5 | ●    | ●始               | ●始  | ●始  |          |          |     |    |          |                   |                             |             |            | ●       |         | ●      | ●               |        |                             | ● |   |     |
|                                       |      | 九州       | 早    |      |                  |     |     |          |          |     |    |          |                   |                             |             |            | ●       |         |        |                 |        |                             |   |   | 1.5 |
| 普                                     | ●1.5 | ●        | ●始   | ●始   | ●始               |     |     |          |          |     |    |          |                   |                             |             | ●          | ●       | ●       |        |                 |        |                             |   |   |     |

|                                 | 処理方法 | 地域名      | 作期 | バ1 | 一年広葉マツバ | ナツメ | カウ | ミカウ | ヘナウ | カウイ | ナウ | ヒムロ | 藻類表層剥離 |     | 処理時期                       | 使用量・製品          | 砂壌土 | 壤土 | 塩土 | 適土 | 減水深cm/d | 使用上の注意 |                                                              |     |
|---------------------------------|------|----------|----|----|---------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|--------|-----|----------------------------|-----------------|-----|----|----|----|---------|--------|--------------------------------------------------------------|-----|
| Ⅶ-1<br>31. TSM-612<br><br>フロアブル | 土壌処理 | 北海道      |    | 〇  | 1.5     | 〇   | 〇  | 始   | 〇   | 始   |    | 〇   | 発生期    |     | +0~+211.5L<br>(+0が100m10㍓) | m1/a<br>100~120 | 1.5 | 〇  | 〇  | 〇  | 〇       | 2      | (33)<br>(34)<br>(3)<br>田圃同時散布可<br>(全域)<br>水口処理可<br>(九州を除く全域) |     |
|                                 |      |          | 東北 |    | 〇       | 1.5 | 〇  | 〇   | 始   | 〇   | 始  | 〇   | 〇      | 発生期 |                            |                 |     | 〇  | 〇  | 〇  | 〇       |        |                                                              |     |
|                                 |      |          | 北陸 |    | 〇       | 1.5 | 〇  | 〇   | 始   | 〇   | 始  | 〇   | 〇      | 〇   |                            |                 |     | 〇  | 〇  | 〇  | 〇       |        |                                                              |     |
|                                 |      | 関東・東山・東海 | 早  | 〇  | 1.5     | 〇   | 〇  | 2   | 〇   | 2   | 〇  | 始   |        |     | +0~+211.5L                 | 80~100          | 1.  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇       |        |                                                              |     |
|                                 |      |          | 普  | 〇  | 1.5     | 〇   | 〇  | 2   | 〇   | 2   | 〇  | 始   |        |     |                            |                 | 〇   | 〇  | 〇  | 〇  |         |        |                                                              |     |
|                                 |      | 近畿・中国    | 早  | 〇  | 1.5     | 〇   | 〇  | 始   | 〇   | 2   | 〇  | 2   |        | 〇   | 発生期                        |                 |     |    | ●  | 〇  | 〇       | 〇      |                                                              | 1   |
|                                 |      |          | 普  | 〇  | 1.5     | 〇   | 〇  | 2   | 〇   | 2   | 〇  | 2   |        | 〇   |                            | 〇               |     |    | 〇  | 〇  | 〇       | 2      |                                                              |     |
|                                 |      | 四国       | 早  | 〇  | 1.5     | 〇   | 〇  | 始   | 〇   | 2   | 〇  | 2   |        | 〇   | 発生期                        |                 |     |    | ●  | 〇  | 〇       | 〇      |                                                              | 1   |
|                                 |      |          | 普  | 〇  | 1.5     | 〇   | 〇  | 2   | 〇   | 2   | 〇  | 2   |        | 〇   |                            | 〇               |     |    | 〇  | 〇  | 〇       | 2      |                                                              |     |
|                                 |      | 九州       | 早  | 〇  | 1.5     | 〇   | 〇  | 2   | 〇   | 2   | 〇  | 2   |        | 〇   | 発生期                        |                 |     |    | 〇  | 〇  | 〇       | 〇      |                                                              | 1.5 |
|                                 |      |          | 普  | 〇  | 1.5     | 〇   | 〇  | 2   | 〇   | 2   | 〇  | 2   |        | 〇   | 発生期                        |                 |     |    | 〇  | 〇  | 〇       | 〇      |                                                              |     |

#### Ⅳ-2 初・中期一発処理剤

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Ⅶ-2<br>1. CH-904 粒        | 「継」 |
| Ⅶ-2<br>2. CH-904○ 粒       | 「継」 |
| Ⅶ-2<br>3. CH-906 粒        | 「継」 |
| Ⅶ-2<br>4. CH-906○ 粒       | 「継」 |
| Ⅶ-2<br>5. CH-907 粒        | 「継」 |
| Ⅶ-2<br>6. DJL-367-1kg 粒   | 「継」 |
| Ⅶ-2<br>7. DPX-47K-1kg 粒   | 「継」 |
| Ⅶ-2<br>8. DPX-47K○-1kg 粒  | 「継」 |
| Ⅶ-2<br>9. DPX-47SC 粒      | 「継」 |
| Ⅶ-2<br>10. DPX-47TD-1kg 粒 | 「継」 |

## VII-2 つづき

|                                                                          | 処理法     | 地域名      | 作期 | デ1   | 一年広葉マツ | ナリ | ウナギ | ミナミ | ハナ | カウ | カウ | ヒル  | 藻類表層剥離 |       | 処理時期                         | 使用量・製品  | 砂壌土 | 壤土 | 埴土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----|------|--------|----|-----|-----|----|----|----|-----|--------|-------|------------------------------|---------|-----|----|----|----|----------|--------|
| VII-2<br>11. DPX-84MN<br>(IBMY-911) 粒<br><br>II-6-(1) 2<br>II-6-(6) 1 併用 | 茎葉兼土壌処理 | 北海道      |    | ●2.5 | ●      | ●2 | ●2  |     | ●2 |    |    | ●発生 | ●発生    | ●切再生前 | +10~+20<br>( $\times$ 12.5L) | 300 g/a | ●   | ●  | ●  | ●  | 2        | (42)   |
|                                                                          |         | 東北       |    | ●2.5 | ●      | ●2 | ●2  | ●2  | ●2 | ●始 |    | ●発生 | ●発生    | ●切再生前 | +5~ $\times$ 12.5L           |         |     | ●  | ●  |    |          |        |
|                                                                          |         | 北陸       |    |      |        |    |     |     |    |    |    |     |        | ●切再生前 |                              |         |     |    |    |    |          |        |
|                                                                          |         | 関東・東山・東海 | 早  |      |        |    |     |     |    |    |    |     |        | ●切再生前 |                              |         |     |    |    |    |          |        |
|                                                                          |         |          | 普  |      |        |    |     |     |    |    |    |     |        |       |                              |         |     |    |    |    |          |        |
|                                                                          |         | 近畿・中国    | 早  |      |        |    |     |     |    |    |    |     |        |       |                              |         |     |    |    |    |          |        |
|                                                                          |         |          | 普  |      |        |    |     |     |    |    |    |     |        |       |                              |         |     |    |    |    |          |        |
|                                                                          |         | 四国       | 早  |      |        |    |     |     |    |    |    |     |        |       |                              |         |     |    |    |    |          |        |
|                                                                          |         |          | 普  |      |        |    |     |     |    |    |    |     |        |       |                              |         |     |    |    |    |          |        |
|                                                                          |         | 九州       | 早  |      |        |    |     |     |    |    |    |     |        |       |                              |         |     |    |    |    |          |        |
|                                                                          |         |          | 普  |      |        |    |     |     |    |    |    |     |        |       |                              |         |     |    |    |    |          |        |

|                                                             | 処理法     | 地域名      | 作期 | デ1   | 一年広葉マツ | ナリ | ウナギ | ミナミ | ハナ | カウ | カウ | ヒル  | 藻類表層剥離 |       | 処理時期      | 使用量・製品  | 砂壌土 | 壤土 | 埴土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意               |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------|----|------|--------|----|-----|-----|----|----|----|-----|--------|-------|-----------|---------|-----|----|----|----|----------|----------------------|
| VII-2<br>12. DPX-84MNO<br>(IBMY-911) 粒<br><br>II-6-(1) 3 併用 | 茎葉兼土壌処理 | 北海道      |    |      |        |    |     |     |    |    |    |     |        |       |           |         |     |    |    |    |          |                      |
|                                                             |         | 東北       |    |      |        |    |     |     |    |    |    |     |        |       |           |         |     |    |    |    |          |                      |
|                                                             |         | 北陸       |    | ●2.5 | ●      | ●2 | ●2  | ●2  |    |    |    |     |        |       | +5~デ12.5L | 300 g/a | ●   | ●  | ●  | ●  | 2        | (28)<br>(34)<br>(42) |
|                                                             |         | 関東・東山・東海 | 早  | ●2.5 | ●      | ●2 | ●2  | ●2  |    | ●始 |    | ●発生 | ●発生    | ●切再生前 |           |         | ●   | ●  | ●  | ●  | 1.5      |                      |
|                                                             |         |          | 普  | ●2.5 | ●      | ●2 | ●2  | ●2  |    | ●始 |    | ●発生 | ●発生    | ●切再生前 |           |         | ●   | ●  | ●  | ●  | 2        |                      |
|                                                             |         | 近畿・中国    | 早  | ●2.5 | ●      | ●2 | ●2  | ●2  |    | ●始 |    |     |        | ●切再生前 |           |         | ●   | ●  | ●  | ●  | 1        |                      |
|                                                             |         |          | 普  | ●2.5 | ●      | ●2 | ●2  | ●2  |    | ●始 |    |     |        | ●切再生前 |           |         | ●   | ●  | ●  | ●  | 1.5      |                      |
|                                                             |         | 四国       | 早  | ●2.5 | ●      | ●2 | ●2  | ●2  |    | ●始 |    |     |        | ●切再生前 |           |         | ●   | ●  | ●  | ●  | 1        |                      |
|                                                             |         |          | 普  | ●2.5 | ●      | ●2 | ●2  | ●2  |    | ●始 |    |     |        | ●切再生前 |           |         | ●   | ●  | ●  | ●  | 1.5      |                      |
|                                                             |         | 九州       | 早  | ●2.5 | ●      | ●2 | ●2  | ●2  |    |    |    | ●発生 |        |       |           |         | ●   | ●  | ●  | ●  |          |                      |
|                                                             |         |          | 普  | ●2.5 | ●      | ●2 | ●2  | ●2  |    |    |    | ●発生 |        |       |           |         | ●   | ●  | ●  | ●  |          |                      |

クログワイに有効剤との組み合わせで連年施用することにより、さらに効果が向上する。(関東～四国)

|                             | 処理法     | 地域名      | 作期 | デ1   | 一年広葉マツ | ナリ | ウナギ | ミナミ | ハナ | カウ | カウ | ヒル  | 藻類表層剥離 |       | 処理時期                        | 使用量・製品  | 砂壌土 | 壤土 | 埴土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意 |
|-----------------------------|---------|----------|----|------|--------|----|-----|-----|----|----|----|-----|--------|-------|-----------------------------|---------|-----|----|----|----|----------|--------|
| VII-2<br>13. DPX-84SC-1kg 粒 | 茎葉兼土壌処理 | 北海道      |    | ●2.5 | ●      | ●2 | ●2  |     | ●2 |    |    | ●発生 | ●発生    | ●切再生前 | +5~+20<br>( $\times$ 12.5L) | 100 g/a | ●   | ●  | ●  | ●  | 2        | (42)   |
|                             |         | 東北       |    | ●2.5 | ●      | ●2 | ●2  | ●2  | ●2 | ●始 |    | ●発生 | ●発生    | ●切再生前 | +5~ $\times$ 12.5L          |         |     | ●  | ●  | ●  |          |        |
|                             |         | 北陸       |    |      |        |    |     |     |    |    |    |     |        | ●切再生前 |                             |         |     |    |    |    |          |        |
|                             |         | 関東・東山・東海 | 早  |      |        |    |     |     |    |    |    |     |        | ●切再生前 |                             |         |     |    |    |    |          |        |
|                             |         |          | 普  |      |        |    |     |     |    |    |    |     |        |       |                             |         |     |    |    |    |          |        |
|                             |         | 近畿・中国    | 早  |      |        |    |     |     |    |    |    |     |        |       |                             |         |     |    |    |    |          |        |
|                             |         |          | 普  |      |        |    |     |     |    |    |    |     |        |       |                             |         |     |    |    |    |          |        |
|                             |         | 四国       | 早  |      |        |    |     |     |    |    |    |     |        |       |                             |         |     |    |    |    |          |        |
|                             |         |          | 普  |      |        |    |     |     |    |    |    |     |        |       |                             |         |     |    |    |    |          |        |
|                             |         | 九州       | 早  |      |        |    |     |     |    |    |    |     |        |       |                             |         |     |    |    |    |          |        |
|                             |         |          | 普  |      |        |    |     |     |    |    |    |     |        |       |                             |         |     |    |    |    |          |        |

Ⅶ-2 つづき

|                                   | 処理法     | 地域名      | 作期 | ㏽I   | 一年広葉マツバ | ㏽II | ㏽III | ミヅナ | ハナタネ | 知㏽イ | オトコ | ヒムロ  | 落類表層剥離 |        | 処理時期      | 使用量・製品  | 砂壌土 | 壤土 | 埴壌土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意       |
|-----------------------------------|---------|----------|----|------|---------|-----|------|-----|------|-----|-----|------|--------|--------|-----------|---------|-----|----|-----|----|----------|--------------|
| Ⅶ-2<br>14. DPX-84<br>SCQ-1kg<br>粒 | 茎葉兼土壌処理 | 北海道      |    |      |         |     |      |     |      |     |     |      |        |        | +5~㏽I2.5L | 100 g/a |     |    |     |    | 1        | (28)<br>(34) |
|                                   |         | 東北       |    |      |         |     |      |     |      |     |     | 発生期  |        | ㏽II再生前 |           |         |     |    |     |    |          |              |
|                                   |         | 北陸       |    | ●2.5 | ●       | ●2  | ●2   | ●2  |      |     |     | ●発生期 |        | ㏽II再生前 |           |         | ●   | ●  | ●   |    |          |              |
|                                   |         | 関東・東山・東海 | 早  | ●2.5 | ●       | ●2  | ●2   | ●2  |      |     |     | 発生期  | 発生前    | ㏽II再生前 |           |         | ●   | ●  | ●   |    |          |              |
|                                   |         |          | 普  | ●2.5 | ●       | ●2  | ●2   | ●2  |      |     |     | ●発生期 | ●発生前   | ㏽II再生前 |           |         | ●   | ●  | ●   |    |          |              |
|                                   |         | 近畿・中国    | 早  | ●2.5 | ●       | ●2  | ●2   | ●2  |      |     |     | ●発生期 | ●発生前   | ㏽II再生前 |           |         | ●   | ●  | ●   |    |          |              |
|                                   |         |          | 普  | ●2.5 | ●       | ●2  | ●2   | ●2  |      |     |     | ●発生期 | ●発生前   | ㏽II再生前 |           |         | ●   | ●  | ●   |    |          |              |
|                                   |         | 四国       | 早  | ●2.5 | ●       | ●2  | ●2   | ●2  |      |     |     | ●発生期 | ●発生前   | ㏽II再生前 |           |         | ●   | ●  | ●   |    |          |              |
|                                   |         |          | 普  | ●2.5 | ●       | ●2  | ●2   | ●2  |      |     |     | ●発生期 | ●発生前   | ㏽II再生前 |           |         | ●   | ●  | ●   |    |          |              |
|                                   |         | 九州       | 早  |      |         |     |      |     |      |     |     |      |        |        |           |         |     |    |     |    |          |              |
|                                   |         |          | 普  | ●2.5 | ●       | ●2  | ●2   | ●2  | ●始   |     |     |      |        |        |           |         |     | ●  | ●   | ●  |          |              |

|                         | 処理法     | 地域名      | 作期 | ㏽I   | 一年広葉マツバ | ㏽II | ㏽III | ミヅナ | ハナタネ | 知㏽イ | オトコ | ヒムロ  | 落類表層剥離 |    | 処理時期                                                                | 使用量・製品  | 砂壌土  | 壤土 | 埴壌土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意                                       |
|-------------------------|---------|----------|----|------|---------|-----|------|-----|------|-----|-----|------|--------|----|---------------------------------------------------------------------|---------|------|----|-----|----|----------|----------------------------------------------|
| Ⅶ-2<br>15. DPX-84T<br>粒 | 茎葉兼土壌処理 | 北海道      |    | ○2.5 | ○       | ○2  | ○2   |     | ○2   |     |     | ○始   | ○発生期   | ○* | +5~+20<br>(㏽I 2.5L)                                                 | 300 g/a | ○1.5 | ○  | ○   | ○  | 2        | (26)<br>(28)<br>(36)<br>(38)<br>(42)<br>(44) |
|                         |         | 東北       |    | ○2.5 | ○       | ○2  | ○2   | ○2  | ○2   | ○始  | ○始  | ○発生期 | ○発生前   | ○* |                                                                     |         | ○    | ○  | ○   | ○  |          |                                              |
|                         |         | 北陸       |    | ○2.5 | ○       | ○2  | ○2   | ○2  | ○2   | ○始  | ○始  | ○発生期 | ○発生前   | ○* |                                                                     |         | ○    | ○  | ○   | ○  |          |                                              |
|                         |         | 関東・東山・東海 | 早  |      |         |     |      |     |      |     |     |      |        |    | *I/㏽II効力<br>1~4L<br>(20cm以下)<br>**㏽II始<br>本葉展開期<br>***㏽II始<br>発生始~盛 |         |      |    |     |    |          |                                              |
|                         |         |          | 普  |      |         |     |      |     |      |     |     |      |        |    |                                                                     |         |      |    |     |    |          |                                              |
|                         |         | 近畿・中国    | 早  |      |         |     |      |     |      |     |     |      |        |    |                                                                     |         |      |    |     |    |          |                                              |
|                         |         |          | 普  |      |         |     |      |     |      |     |     |      |        |    |                                                                     |         |      |    |     |    |          |                                              |
|                         |         | 四国       | 早  |      |         |     |      |     |      |     |     |      |        |    |                                                                     |         |      |    |     |    |          |                                              |
|                         |         |          | 普  |      |         |     |      |     |      |     |     |      |        |    |                                                                     |         |      |    |     |    |          |                                              |
|                         |         | 九州       | 早  |      |         |     |      |     |      |     |     |      |        |    |                                                                     |         |      |    |     |    |          |                                              |
|                         |         |          | 普  |      |         |     |      |     |      |     |     |      |        |    |                                                                     |         |      |    |     |    |          |                                              |

クログワイに有効な剤との組み合わせで適年施用することにより、さらに効果が向上する。(東北)

|                                 | 処理法     | 地域名      | 作期 | ㏽I   | 一年広葉マツバ | ㏽II | ㏽III | ミヅナ | ハナタネ | 知㏽イ | オトコ | ヒムロ  | 落類表層剥離 |     | 処理時期                                   | 使用量・製品  | 砂壌土  | 壤土 | 埴壌土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意                               |
|---------------------------------|---------|----------|----|------|---------|-----|------|-----|------|-----|-----|------|--------|-----|----------------------------------------|---------|------|----|-----|----|----------|--------------------------------------|
| Ⅶ-2<br>16. DPX-84T<br>-1kg<br>粒 | 茎葉兼土壌処理 | 北海道      |    | ○2.5 | ○       | ○2  | ○2   |     | ○2   |     |     | ○発生期 | ○前     | ○*  | +5~+20(㏽I2.5L)                         | 100 g/a | ○1.5 | ○  | ○   | ○  | 2        | (26)<br>(28)<br>(36)<br>(38)<br>(42) |
|                                 |         | 東北       |    | ○2.5 | ○       | ○2  | ○2   | ○2  | ○2   | ○始  | ○始  | ○発生期 | ○始     | ○** |                                        |         | ○    | ○  | ○   | ○  |          |                                      |
|                                 |         | 北陸       |    |      |         |     |      |     |      |     |     |      |        |     | * I/㏽II効力<br>始~2L<br>** ㏽II効力<br>発生始~盛 |         |      |    |     |    |          |                                      |
|                                 |         | 関東・東山・東海 | 早  |      |         |     |      |     |      |     |     |      |        |     |                                        |         |      |    |     |    |          |                                      |
|                                 |         |          | 普  |      |         |     |      |     |      |     |     |      |        |     |                                        |         |      |    |     |    |          |                                      |
|                                 |         | 近畿・中国    | 早  |      |         |     |      |     |      |     |     |      |        |     |                                        |         |      |    |     |    |          |                                      |
|                                 |         |          | 普  |      |         |     |      |     |      |     |     |      |        |     |                                        |         |      |    |     |    |          |                                      |
|                                 |         | 四国       | 早  |      |         |     |      |     |      |     |     |      |        |     |                                        |         |      |    |     |    |          |                                      |
|                                 |         |          | 普  |      |         |     |      |     |      |     |     |      |        |     |                                        |         |      |    |     |    |          |                                      |
|                                 |         | 九州       | 早  |      |         |     |      |     |      |     |     |      |        |     |                                        |         |      |    |     |    |          |                                      |
|                                 |         |          | 普  |      |         |     |      |     |      |     |     |      |        |     |                                        |         |      |    |     |    |          |                                      |

## VII-2 つづき

|                                     | 処理法     | 地域名      | 作期 | ベ1   | 一年広葉マサキ | オサキ | ウサキ | ミサキ | ハサキ | カサキ | ササキ | ヒサキ | 落葉表層剥離 | 処理時期 | 使用量・製品 | 砂壌土 | 壤土 | 植壌土 | 植土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意 |
|-------------------------------------|---------|----------|----|------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|------|--------|-----|----|-----|----|----------|--------|
| VII-2<br>17. DPX-84TDQ<br>-1kg<br>粒 | 茎葉兼土壌処理 | 北海道      |    |      |         |     |     |     |     |     |     |     |        |      |        |     |    |     |    |          |        |
|                                     |         | 東北       |    |      |         |     |     |     |     |     |     |     |        |      |        |     |    |     |    |          |        |
|                                     |         | 北陸       |    | 02.5 | 0       | 02  | 02  | 02  | 02  | 02  | 02  | 02  | 02     | 02   | 02     | 02  | 02 | 02  | 02 | 2        | (26)   |
|                                     |         | 関東・東山・東海 | 早  | 02.5 | 0       | 02  | ●2  | ●2  |     |     |     |     |        | 02   | 02     | 02  | 02 | 02  | 02 | 2        | (28)   |
|                                     |         |          | 普  | 02.5 | 0       | 02  | ●2  | ●2  |     |     |     |     |        | 02   | 02     | 02  | 02 | 02  | 02 | 2        | (34)   |
|                                     |         | 近畿・中国    | 早  | 02.5 | 0       | 02  | 02  | 02  |     |     |     |     |        | 02   | 02     | 02  | 02 | 02  | 02 | 1        | (38)   |
|                                     |         |          | 普  | 02.5 | 0       | 02  | 02  | 02  |     |     |     |     |        | 02   | 02     | 02  | 02 | 02  | 02 | 1.5      |        |
|                                     |         | 四国       | 早  | 02.5 | 0       | 02  | 02  | 02  |     |     |     |     |        | 02   | 02     | 02  | 02 | 02  | 02 | 1        |        |
|                                     |         |          | 普  | 02.5 | 0       | 02  | 02  | 02  |     |     |     |     |        | 02   | 02     | 02  | 02 | 02  | 02 | 1.5      |        |
|                                     |         | 九州       | 早  | ●2   | ●       | ●2  | ●2  | ●2  |     |     |     |     |        |      |        |     |    |     |    |          |        |
|                                     |         |          | 普  | ●2.5 | ●       | ●2  | ●2  |     |     |     |     |     |        |      |        |     |    |     |    |          |        |

|                                                      | 処理法     | 地域名      | 作期 | ベ1   | 一年広葉マサキ | オサキ | ウサキ | ミサキ | ハサキ | カサキ | ササキ | ヒサキ | 落葉表層剥離 | 処理時期 | 使用量・製品 | 砂壌土 | 壤土 | 植壌土 | 植土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意      |
|------------------------------------------------------|---------|----------|----|------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|------|--------|-----|----|-----|----|----------|-------------|
| VII-2<br>18. KUH-883<br>粒<br>VII-1 8<br>II-6(1) 5 併用 | 茎葉兼土壌処理 | 北海道      |    |      |         |     |     |     |     |     |     |     |        |      |        |     |    |     |    |          |             |
|                                                      |         | 東北       |    | 02.5 | 0       | 02  | 02  | 02  | 02  | 02  | 02  | 02  | 02     | 02   | 02     | 02  | 02 | 02  | 02 | 2        | (28)        |
|                                                      |         | 北陸       |    |      |         |     |     |     |     |     |     |     |        |      |        |     |    |     |    |          | (38)        |
|                                                      |         | 関東・東山・東海 | 早  |      |         |     |     |     |     |     |     |     |        |      |        |     |    |     |    |          | (42)        |
|                                                      |         |          | 普  |      |         |     |     |     |     |     |     |     |        |      |        |     |    |     |    |          | (44)        |
|                                                      |         | 近畿・中国    | 早  |      |         |     |     |     |     |     |     |     |        |      |        |     |    |     |    |          | +0は、<br>植土～ |
|                                                      |         |          | 普  |      |         |     |     |     |     |     |     |     |        |      |        |     |    |     |    |          | 植土          |
|                                                      |         | 四国       | 早  |      |         |     |     |     |     |     |     |     |        |      |        |     |    |     |    |          |             |
|                                                      |         |          | 普  |      |         |     |     |     |     |     |     |     |        |      |        |     |    |     |    |          |             |
|                                                      |         | 九州       | 早  |      |         |     |     |     |     |     |     |     |        |      |        |     |    |     |    |          |             |
|                                                      |         |          | 普  |      |         |     |     |     |     |     |     |     |        |      |        |     |    |     |    |          |             |

クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することにより、さらに効果が向上する。(東北)

VII-2  
19. NC-311DCG 粒 「継」

VII-2  
20. NC-311DCD 粒 「継」

|                                                                       | 処理法     | 地域名      | 作期 | ベ1   | 一年広葉マサキ | オサキ | ウサキ | ミサキ | ハサキ | カサキ | ササキ | ヒサキ | 落葉表層剥離 | 処理時期 | 使用量・製品 | 砂壌土 | 壤土 | 植壌土 | 植土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|----------|----|------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|------|--------|-----|----|-----|----|----------|--------|
| VII-2<br>21. NC-311SCQ<br>粒<br>II-6(1) 8<br>II-6(2) 2<br>II-6(8) 2 併用 | 茎葉兼土壌処理 | 北海道      |    | 02.5 | 0       | 02  | 02  |     | 02  |     |     | 02  | 02     | 02   | 02     | 02  | 02 | 02  | 02 | 2        | (34)   |
|                                                                       |         | 東北       |    | 02.5 | 0       | 02  | 02  | 02  | 02  | 02  | 02  | 02  | 02     | 02   | 02     | 02  | 02 | 02  | 02 | 2        | (36)   |
|                                                                       |         | 北陸       |    | 02.5 | 0       | 02  | 02  | 02  | 02  | 02  | 02  | 02  | 02     | 02   | 02     | 02  | 02 | 02  | 02 | 2        | (38)   |
|                                                                       |         | 関東・東山・東海 | 早  | 02.5 | 0       | 02  | 02  | 02  |     |     |     |     |        | 02   | 02     | 02  | 02 | 02  | 02 | 2        | (40)   |
|                                                                       |         |          | 普  | 02.5 | 0       | 02  | 02  | 02  |     |     |     |     |        | 02   | 02     | 02  | 02 | 02  | 02 | 2        | (41)   |
|                                                                       |         | 近畿・中国    | 早  | 02.5 | 0       | 02  | 02  | 02  |     |     |     |     |        | 02   | 02     | 02  | 02 | 02  | 02 | 1        | (42)   |
|                                                                       |         |          | 普  | 02.5 | 0       | 02  | 02  | 02  |     |     |     |     |        | 02   | 02     | 02  | 02 | 02  | 02 | 1.5      | (44)   |
|                                                                       |         | 四国       | 早  | 02.5 | 0       | 02  | 02  | 02  |     |     |     |     |        | 02   | 02     | 02  | 02 | 02  | 02 | 1        |        |
|                                                                       |         |          | 普  | 02.5 | 0       | 02  | 02  | 02  |     |     |     |     |        | 02   | 02     | 02  | 02 | 02  | 02 | 1.5      |        |
|                                                                       |         | 九州       | 早  | 02.5 | 0       | 02  | 02  | 02  |     |     |     |     |        | 02   | 02     | 02  | 02 | 02  | 02 |          |        |
|                                                                       |         |          | 普  | 02.5 | 0       | 02  | 02  | 02  |     |     |     |     |        | 02   | 02     | 02  | 02 | 02  | 02 |          |        |

クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することにより、さらに効果が向上する。(東北、関東～九州)

オモタカに有効な剤との組み合わせで連年施用することにより、さらに効果が向上する。(東北～四国)

VII-2 つづき

| 処理法                                    | 地域名                                                          | 作期               | 元 | 一年<br>広葉<br>マツ | オシ<br>マツ | ミナ<br>マツ | ハナ<br>マツ | カマ<br>マツ | ヒメ<br>マツ | 落葉<br>表層<br>剥離 | 処理時期 | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土     | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上<br>の注意 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|------|----------------|------------|--------|--------|--------|-----------------|------------|
| VII-2<br>22. NC-311<br>SC<br>粒<br>-1kg | 北海道<br>東北<br>北陸<br>関東・<br>東山・<br>東海<br>近畿・<br>中国<br>四国<br>九州 | 北海道              | 元 | ○              | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○              | ○    | +5~+20(元12.5L) | 1.5        | ○      | ○      | ○      | 2               | (28)       |
|                                        |                                                              | 東北               | 元 | ○              | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○              | ○    | +5~元12.5L      | 100<br>g/a | ○      | ○      | ○      | 2               | (34)       |
|                                        |                                                              | 北陸               | 元 | ○              | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○              | ○    |                |            | ○      | ○      | ○      |                 |            |
|                                        |                                                              | 関東・<br>東山・<br>東海 | 早 | ●              | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●              | ●    |                |            | ○      | ○      | ○      | 1.5             |            |
|                                        |                                                              |                  | 普 | ●              | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●              | ●    |                |            | ○      | ○      | ○      | 2               |            |
|                                        |                                                              | 近畿・<br>中国        | 早 | ●              | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●              | ●    |                |            | ○      | ○      | ○      | 1               |            |
|                                        |                                                              |                  | 普 | ●              | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●              | ●    |                |            | ○      | ○      | ○      |                 |            |
|                                        |                                                              | 四国               | 早 | ●              | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●              | ●    |                |            | ○      | ○      | ○      |                 |            |
|                                        |                                                              |                  | 普 | ●              | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●              | ●    |                |            | ○      | ○      | ○      |                 |            |
|                                        |                                                              | 九州               | 早 | ●              | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●              | ●    |                |            | ○      | ○      | ○      |                 |            |
|                                        |                                                              |                  | 普 | ●              | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●              | ●    |                |            | ○      | ○      | ○      | 1.5             |            |

|                         |                                 | 処理法              | 地域名 | 作期 | 元   | 一年<br>広葉<br>マツ | オシ<br>マツ | ミナ<br>マツ | ハナ<br>マツ | カマ<br>マツ | ヒメ<br>マツ | 落葉<br>表層<br>剥離 | 処理時期        | 使用<br>量・<br>製品                  | 砂<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上<br>の注意 |                                                              |
|-------------------------|---------------------------------|------------------|-----|----|-----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|-------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| Ⅶ-2<br>23. NC-311T<br>粒 | 聖<br>業<br>岸<br>土<br>壌<br>処<br>理 | 北海道              |     | ○  | 2.5 | ○              | ○        | ○        | ○        |          |          | ○              | 発<br>生<br>始 | 10~20(元12.5L)<br><br>300<br>g/a | 1.5    | ○      | ○      | ○      | ○               | 2          | (26)<br>(34)<br>(36)<br>(38)<br>(40)<br>(41)<br>(42)<br>(44) |
|                         |                                 | 東北               |     | ○  | 2.5 | ○              | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○              | ○           |                                 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○               | ○          |                                                              |
|                         |                                 | 北陸               |     | ○  | 2.5 | ○              | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○              | ○           |                                 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○               | ○          |                                                              |
|                         |                                 | 関東・<br>東山・<br>東海 | 早   | ○  | 2.5 | ○              | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○              | ○           |                                 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○               | ○          |                                                              |
|                         |                                 | 近畿・<br>中国        | 早   | ○  | 3   | ○              | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○              | ○           |                                 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○               | ○          | 1                                                            |
|                         |                                 | 四国               | 早   | ○  | 3   | ○              | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○              | ○           |                                 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○               | ○          | 1.5                                                          |
|                         |                                 | 九州               | 早   | ○  | 3   | ○              | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○              | ○           |                                 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○               | ○          | 1                                                            |
|                         |                                 | 北海道              |     | ○  | 2.5 | ○              | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○              | ○           |                                 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○               | ○          |                                                              |
|                         |                                 | 東北               |     | ○  | 2.5 | ○              | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○              | ○           |                                 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○               | ○          |                                                              |
|                         |                                 | 北陸               |     | ○  | 2.5 | ○              | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○              | ○           |                                 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○               | ○          |                                                              |
|                         |                                 | 関東・<br>東山・<br>東海 | 普   | ○  | 2.5 | ○              | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○              | ○           |                                 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○               | ○          |                                                              |

クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することにより、さらに効果が向上する。(東北、関東～九州)  
オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することにより、さらに効果が向上する。(東北、関東～九州)  
コウキガラに有効な剤との組み合わせで連年施用することにより、さらに効果が向上する。(東北)

|                                 | 処理法     | 地域名              | 作期 | 元 | 一年<br>広葉<br>マツ | オシ<br>マツ | ミナ<br>マツ | ハナ<br>マツ | カマ<br>マツ | ヒメ<br>マツ | 落葉<br>表層<br>剥離 |    | 処理時期       | 使用<br>量・<br>製品                         | 砂<br>土     | 壤<br>土 | 埴<br>土      | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上<br>の注意 |                                              |   |
|---------------------------------|---------|------------------|----|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----|------------|----------------------------------------|------------|--------|-------------|--------|-----------------|------------|----------------------------------------------|---|
| Ⅶ-2<br>24. NC-311T<br>粒<br>-1kg | 茎葉糞土壌処理 | 北海道              |    | ○ | ○              | ○        |          | ○        |          | ○        | 発生期            | ○前 | ○再生<br>○** | +5 ~ +20<br>(元12.5L)<br>+5 ~<br>元12.5L | 100<br>g/a | ○      | ○           | ○      | ○               | 2          | (26)<br>(28)<br>(36)<br>(38)<br>(40)<br>(42) |   |
|                                 |         | 東北               |    | ○ | ○              | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | 始              |    | ○前         |                                        |            | ○始     | ○           | ○      | ○               |            |                                              | ○ |
|                                 |         | 北陸               |    | ○ | ○              | ○        | ○        | ○        | ○        |          |                |    |            |                                        |            | ○始     |             | ○      | ○               |            |                                              | ○ |
|                                 |         | 関東・<br>東山・<br>東海 | 早  | ○ | ○              | ○        | ○        |          |          |          |                |    | 発生         |                                        |            |        |             | ○      | ○               | ○          |                                              |   |
|                                 |         |                  | 普  | ○ | ○              | ○        |          | ○        |          |          |                |    | ○前         | ○再生<br>○                               |            |        |             | ○      | ○               | ○          |                                              |   |
|                                 |         | 近畿・<br>中国        | 早  | ○ | ○              | ○        | ○        | ○        |          |          |                | ○  | 発生期        | ○発生<br>○                               |            | ○前     |             | ○      | ○               | ○          |                                              | 1 |
|                                 |         |                  | 普  | ○ | ○              | ○        | ○        | ○        |          |          |                | ●  | ○前         | ○始                                     |            | ●      |             | ○      | ○               | ○          |                                              |   |
|                                 |         | 四国               | 早  | ○ | ○              | ○        | ○        | ○        |          |          |                | ○  | 発生期        | ○発生<br>○                               |            | ○前     |             | ○      | ○               | ○          |                                              |   |
|                                 |         |                  | 普  | ○ | ○              | ○        | ○        | ○        |          |          |                | ●  | ○前         | ○始                                     |            | ●      |             | ○      | ○               | ○          |                                              |   |
|                                 |         | 九州               | 早  | ● | ●              | ●        | ●        | ●        |          |          |                | ●  | 発生期        | ●発生<br>●                               |            |        | +5 ~ 元12L   | ●      | ●               | ●          |                                              | ● |
|                                 |         |                  | 普  | ● | ●              | ●        | ●        | ●        |          |          |                | ●  | ○前         | ●                                      |            |        | +5 ~ 元12.5L |        | ●               | ●          |                                              |   |

## VII-2 つづき

| 処理法                       | 地域名                                              | 作期 | ベ1   | 一年広葉マツイ | ササ | ツツ | ミミ | ハハ | カカ | ヒヒ | 藻類表層剥離 | 処理時期           | 使用量・製品     | 砂壌土 | 壤土 | 埴土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意       |
|---------------------------|--------------------------------------------------|----|------|---------|----|----|----|----|----|----|--------|----------------|------------|-----|----|----|----|----------|--------------|
| VII-2<br>25. NC-3260<br>粒 | 北海道<br>東北<br>北陸<br>関東・東山・東海<br>近畿・中国<br>四国<br>九州 | 早  |      |         |    |    |    |    |    |    |        |                |            |     |    |    |    |          |              |
|                           |                                                  | 普  | 02.5 | 0       | 02 | 0始 | 02 |    |    |    |        | +5 ~<br>+12.5L | 300<br>g/a |     |    |    |    | 2        | (28)<br>(34) |
|                           |                                                  | 早  | 02.5 | 0       | 0始 | 02 | 02 |    |    |    | 発生期    | 発生期            | 発生期        |     |    |    |    | 1        |              |
|                           |                                                  | 普  | 02.5 | 0       | 02 | 02 | 02 |    |    |    | 発生期    | 発生期            | 発生期        |     |    |    |    |          |              |
|                           |                                                  | 早  | 02.5 | 0       | 0始 | 02 | 02 |    |    |    | 発生期    | 発生期            | 発生期        |     |    |    |    |          |              |
|                           |                                                  | 普  | 02.5 | 0       | 02 | 02 | 02 |    |    |    | 発生期    | 発生期            | 発生期        |     |    |    |    |          |              |
|                           |                                                  | 早  | 02.5 | 0       | 0始 | 02 | 02 |    |    |    | 発生期    | 発生期            | 発生期        |     |    |    |    |          |              |
|                           |                                                  | 普  | 02.5 | 0       | 02 | 02 | 02 |    |    |    | 発生期    | 発生期            | 発生期        |     |    |    |    |          |              |
|                           |                                                  | 早  | 02.5 | 0       | 0始 | 02 | 02 |    |    |    | 発生期    | 発生期            | 発生期        |     |    |    |    |          |              |
|                           |                                                  | 普  | 02.5 | 0       | 02 | 02 | 02 |    |    |    | 発生期    | 発生期            | 発生期        |     |    |    |    |          |              |
|                           |                                                  | 早  | 02.5 | 0       | 0始 | 02 | 02 |    |    |    | 発生期    | 発生期            | 発生期        |     |    |    |    |          |              |
|                           |                                                  | 普  | 02.5 | 0       | 02 | 02 | 02 |    |    |    | 発生期    | 発生期            | 発生期        |     |    |    |    |          |              |

| 処理法                                                      | 地域名                                              | 作期 | ベ1   | 一年広葉マツイ | ササ | ツツ | ミミ | ハハ | カカ | ヒヒ | 藻類表層剥離 | 処理時期 | 使用量・製品 | 砂壌土 | 壤土 | 埴土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意                               |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|------|---------|----|----|----|----|----|----|--------|------|--------|-----|----|----|----|----------|--------------------------------------|
| VII-2<br>26. NC-329<br>粒<br>II-6-(1) 11<br>II-6-(2) 5 併用 | 北海道<br>東北<br>北陸<br>関東・東山・東海<br>近畿・中国<br>四国<br>九州 | 早  | 2.5  | ●       | ●2 | ●2 |    | ●2 |    |    | 発生期    | 発生期  | 発生期    |     |    |    |    | 2        | (34)<br>(38)<br>(40)<br>(41)<br>(42) |
|                                                          |                                                  | 普  | 02.5 | 0       | 02 | ●2 | 02 | 02 | 0始 | 0始 | 発生期    | 発生期  | 発生期    |     |    |    |    |          |                                      |
|                                                          |                                                  | 早  | 02.5 | 0       | 02 | ●2 | 02 | 02 | 0始 | 0始 | 発生期    | 発生期  | 発生期    |     |    |    |    |          |                                      |
|                                                          |                                                  | 普  | 02.5 | 0       | 02 | 02 | 02 |    | ●始 | ●始 | 発生期    | 発生期  | 発生期    |     |    |    |    |          |                                      |
|                                                          |                                                  | 早  | 02.5 | 0       | 02 | 02 | 02 |    |    |    | 発生期    | 発生期  | 発生期    |     |    |    |    |          |                                      |
|                                                          |                                                  | 普  | 02.5 | 0       | 02 | 02 | 02 |    | ●始 | ●始 | 発生期    | 発生期  | 発生期    |     |    |    |    |          |                                      |
|                                                          |                                                  | 早  | 02.5 | 0       | 02 | 02 | 02 |    |    |    | 発生期    | 発生期  | 発生期    |     |    |    |    |          |                                      |
|                                                          |                                                  | 普  | 02.5 | 0       | 02 | 02 | 02 |    | ●始 | ●始 | 発生期    | 発生期  | 発生期    |     |    |    |    |          |                                      |
|                                                          |                                                  | 早  | 02.5 | 0       | 02 | 02 | 02 |    |    |    | 発生期    | 発生期  | 発生期    |     |    |    |    |          |                                      |
|                                                          |                                                  | 普  | 02.5 | 0       | 02 | 02 | 02 |    | ●始 | ●始 | 発生期    | 発生期  | 発生期    |     |    |    |    |          |                                      |
|                                                          |                                                  | 早  | 02.5 | 0       | 02 | 02 | 02 |    |    |    | 発生期    | 発生期  | 発生期    |     |    |    |    |          |                                      |
|                                                          |                                                  | 普  | 02.5 | 0       | 02 | 02 | 02 |    | ●始 | ●始 | 発生期    | 発生期  | 発生期    |     |    |    |    |          |                                      |

クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することにより、さらに効果が向上する。(東北、関東～九州)  
オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することにより、さらに効果が向上する。(北陸～四国)

| 処理法                              | 地域名                                              | 作期 | ベ1  | 一年広葉マツイ | ササ | ツツ | ミミ | ハハ | カカ | ヒヒ | 藻類表層剥離 | 処理時期 | 使用量・製品 | 砂壌土 | 壤土 | 埴土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|----|-----|---------|----|----|----|----|----|----|--------|------|--------|-----|----|----|----|----------|--------------|
| VII-2<br>27. NC-329<br>-1kg<br>粒 | 北海道<br>東北<br>北陸<br>関東・東山・東海<br>近畿・中国<br>四国<br>九州 | 早  | 2.5 | ●       | ●2 | ●2 |    | ●2 |    |    | 発生期    | 発生期  | 発生期    |     |    |    |    | 2        | (28)<br>(34) |
|                                  |                                                  | 普  | 2.5 | ●       | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 |    |    | 発生期    | 発生期  | 発生期    |     |    |    |    |          |              |
|                                  |                                                  | 早  | 2.5 | ●       | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 |    |    | 発生期    | 発生期  | 発生期    |     |    |    |    |          |              |
|                                  |                                                  | 普  | 2.5 | ●       | ●2 | ●2 | ●2 |    |    |    | 発生期    | 発生期  | 発生期    |     |    |    |    |          |              |
|                                  |                                                  | 早  | 2.5 | ●       | ●2 | ●2 | ●2 |    |    |    | 発生期    | 発生期  | 発生期    |     |    |    |    |          |              |
|                                  |                                                  | 普  | 2.5 | ●       | ●2 | ●2 | ●2 |    |    |    | 発生期    | 発生期  | 発生期    |     |    |    |    |          |              |
|                                  |                                                  | 早  | 2.5 | ●       | ●2 | ●2 | ●2 |    |    |    | 発生期    | 発生期  | 発生期    |     |    |    |    |          |              |
|                                  |                                                  | 普  | 2.5 | ●       | ●2 | ●2 | ●2 |    |    |    | 発生期    | 発生期  | 発生期    |     |    |    |    |          |              |
|                                  |                                                  | 早  | 2.5 | ●       | ●2 | ●2 | ●2 |    |    |    | 発生期    | 発生期  | 発生期    |     |    |    |    |          |              |
|                                  |                                                  | 普  | 2.5 | ●       | ●2 | ●2 | ●2 |    |    |    | 発生期    | 発生期  | 発生期    |     |    |    |    |          |              |
|                                  |                                                  | 早  | 2.5 | ●       | ●2 | ●2 | ●2 |    |    |    | 発生期    | 発生期  | 発生期    |     |    |    |    |          |              |
|                                  |                                                  | 普  | 2.5 | ●       | ●2 | ●2 | ●2 |    |    |    | 発生期    | 発生期  | 発生期    |     |    |    |    |          |              |

VII-2  
28. NC-343 粒 「継」

VII-2  
29. NC-344 粒 「継」

VII-2  
30. NC-345 粒 「継」

## VII-2 つづき

VII-2  
31. NCH-903 粒 「継」VII-2  
32. NSK-860 粒 「継」VII-2  
33. NSK-860D 粒 「継」VII-2  
34. TH-913ADE-1kg 粒 「継」

| 処理法                            | 地域名      | 作期   | 元1   | 一年広葉マツ | 杉  | ツグミ | ミズナ | スギ | カシ | クヌ | ヒメ   | 落葉表層剥離 | 切    | 処理時期       | 使用量・製品  | 砂壌土 | 壤土 | 植土 | 植土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意       |
|--------------------------------|----------|------|------|--------|----|-----|-----|----|----|----|------|--------|------|------------|---------|-----|----|----|----|----------|--------------|
| VII-2<br>35. TH-913<br>粒<br>SN | 北海道      |      | ●2.5 | ●      | ●2 | ●2  |     | ●2 |    |    | ●発生期 | ●発生前   | ●再生前 | +10~元12.5L | 1.5     | ●   | ●  | ●  | ●  |          | (28)<br>(34) |
|                                | 東北       |      | ●2.5 | ●      | ●2 | ●2  | ●2  |    |    |    | ●発生期 | ●発生前   | ●再生前 | +5~元12.5L  | 300 g/a | ●   | ●  | ●  | ●  | 2        |              |
|                                | 北陸       |      | ●2.5 | ●      | ●2 | ●2  | ●2  |    |    |    |      |        | ●始   |            |         | ●   | ●  | ●  | ●  |          |              |
|                                | 関東・東山・東海 | 早    | ●2.5 | ●      | ●2 | ●2  | ●2  |    |    |    | ●発生期 | ●発生前   | ●再生前 |            |         | ●   | ●  | ●  | ●  | 1.5      |              |
|                                | 普        | ●2.5 | ●    | ●2     | ●2 | ●2  |     |    |    |    | ●発生期 | ●発生前   | ●再生前 |            |         | ●   | ●  | ●  | ●  | 2        |              |
|                                | 近畿・中国    | 早    | ●2.5 | ●      | ●2 | ●2  | ●2  |    |    |    | ●発生期 | ●発生前   | ●再生前 |            |         | ●   | ●  | ●  | ●  | 1        |              |
|                                | 普        | ●2.5 | ●    | ●2     | ●2 | ●2  |     |    |    |    | ●発生期 | ●発生前   | ●再生前 |            |         | ●   | ●  | ●  | ●  | 1.5      |              |
|                                | 四国       | 早    | ●2.5 | ●      | ●2 | ●2  | ●2  |    |    |    | ●発生期 | ●発生前   | ●再生前 |            |         | ●   | ●  | ●  | ●  | 1        |              |
|                                | 普        | ●2.5 | ●    | ●2     | ●2 | ●2  |     |    |    |    | ●発生期 | ●発生前   | ●再生前 |            |         | ●   | ●  | ●  | ●  | 1.5      |              |
|                                | 九州       | 早    | ●2.5 | ●      | ●2 | ●2  | ●2  |    |    |    | ●発生期 | ●発生前   | ●再生前 |            |         | ●   | ●  | ●  | ●  | 1        |              |
|                                | 普        | ●2.5 | ●    | ●2     | ●2 | ●2  |     |    |    |    | ●発生期 | ●発生前   | ●再生前 |            |         | ●   | ●  | ●  | ●  |          |              |

| 処理法                             | 地域名      | 作期   | 元1   | 一年広葉マツ | 杉  | ツグミ | ミズナ | スギ | カシ | クヌ | ヒメ   | 落葉表層剥離 | 切    | 処理時期       | 使用量・製品  | 砂壌土 | 壤土 | 植土 | 植土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意       |
|---------------------------------|----------|------|------|--------|----|-----|-----|----|----|----|------|--------|------|------------|---------|-----|----|----|----|----------|--------------|
| VII-2<br>36. TH-913<br>粒<br>SSC | 北海道      |      | ●2.5 | ●      | ●2 | ●2  |     | ●2 |    |    | ●発生期 | ●発生前   | ●再生前 | +10~元12.5L | 1.5     | ●   | ●  | ●  | ●  | 2        | (28)<br>(34) |
|                                 | 東北       |      | ●2.5 | ●      | ●2 | ●2  | ●2  | ●2 |    |    | ●発生期 | ●発生前   | ●再生前 | +5~元12.5L  | 300 g/a | ●   | ●  | ●  | ●  |          |              |
|                                 | 北陸       |      | ●2.5 | ●      | ●2 | ●2  | ●2  |    |    |    |      |        | ●始   |            |         | ●   | ●  | ●  | ●  |          |              |
|                                 | 関東・東山・東海 | 早    | ●2.5 | ●      | ●2 | ●2  | ●2  |    |    |    |      |        |      |            |         | ●   | ●  | ●  | ●  | 1        |              |
|                                 | 普        | ●2.5 | ●    | ●2     | ●2 | ●2  |     |    |    |    |      |        |      |            |         | ●   | ●  | ●  | ●  | 1.5      |              |
|                                 | 近畿・中国    | 早    | ●2.5 | ●      | ●2 | ●2  | ●2  |    |    |    | ●発生期 | ●発生前   | ●再生前 |            |         | ●   | ●  | ●  | ●  | 1        |              |
|                                 | 普        | ●2.5 | ●    | ●2     | ●2 | ●2  |     |    |    |    | ●発生期 | ●発生前   | ●再生前 |            |         | ●   | ●  | ●  | ●  |          |              |
|                                 | 四国       | 早    | ●2.5 | ●      | ●2 | ●2  | ●2  |    |    |    | ●発生期 | ●発生前   | ●再生前 |            |         | ●   | ●  | ●  | ●  |          |              |
|                                 | 普        | ●2.5 | ●    | ●2     | ●2 | ●2  |     |    |    |    | ●発生期 | ●発生前   | ●再生前 |            |         | ●   | ●  | ●  | ●  |          |              |
|                                 | 九州       | 早    | ●2.5 | ●      | ●2 | ●2  | ●2  |    |    |    | ●発生期 | ●発生前   | ●再生前 |            |         | ●   | ●  | ●  | ●  |          |              |
|                                 | 普        | ●2.5 | ●    | ●2     | ●2 | ●2  |     |    |    |    | ●発生期 | ●発生前   | ●再生前 |            |         | ●   | ●  | ●  | ●  | 1.5      |              |

## VII-3-(1) 長期持続型一発処理剤

| 処理法                                         | 地域名      | 作期 | 元1   | 一年広葉マツ | 杉  | ツグミ | ミズナ | スギ | カシ | クヌ | ヒメ   | 落葉表層剥離 | 切    | 処理時期      | 使用量・製品  | 砂壌土 | 壤土 | 植土 | 植土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意                              |
|---------------------------------------------|----------|----|------|--------|----|-----|-----|----|----|----|------|--------|------|-----------|---------|-----|----|----|----|----------|-------------------------------------|
| VII-3-(1)<br>I. DM-72<br>粒<br>II-6-(1) 1 併用 | 北海道      |    | ○1.5 | ○      | ○2 | ○2  |     | ○2 |    |    | ○発生期 | ○発生前   | ○再生前 | +5~元11.5L | 300 g/a | ○   | ○  | ○  | ○  | 2        | (3)<br>(26)<br>(28)<br>(38)<br>(42) |
|                                             | 東北       |    | ○1.5 | ○      | ○2 | ○2  | ○2  |    | ○始 | ○始 | ○発生期 |        | ○再生前 |           |         | ○   | ○  | ○  | ○  |          |                                     |
|                                             | 北陸       |    |      |        |    |     |     |    |    |    |      |        | ○始   |           |         |     |    |    |    |          |                                     |
|                                             | 関東・東山・東海 | 早  |      |        |    |     |     |    |    |    |      |        |      |           |         |     |    |    |    |          |                                     |
|                                             | 普        |    |      |        |    |     |     |    |    |    |      |        |      |           |         |     |    |    |    |          |                                     |
|                                             | 近畿・中国    | 早  |      |        |    |     |     |    |    |    |      |        |      |           |         |     |    |    |    |          |                                     |
|                                             | 普        |    |      |        |    |     |     |    |    |    |      |        |      |           |         |     |    |    |    |          |                                     |
|                                             | 四国       | 早  |      |        |    |     |     |    |    |    |      |        |      |           |         |     |    |    |    |          |                                     |
|                                             | 普        |    |      |        |    |     |     |    |    |    |      |        |      |           |         |     |    |    |    |          |                                     |
|                                             | 九州       | 早  |      |        |    |     |     |    |    |    |      |        |      |           |         |     |    |    |    |          |                                     |
|                                             | 普        |    |      |        |    |     |     |    |    |    |      |        |      |           |         |     |    |    |    |          |                                     |

## VII-3-(1) つづき

|                            | 処理法     | 地域名      | 作期 | 元1   | 一年広葉マリン | オキ | ウカ | ミカ | ハカ | カウイ | カウイ | ヒム | 藻類表層剥離 |      | 処理時期 | 使用量・製品 | 砂壌土                      | 壤土         | 埴土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意 |   |  |
|----------------------------|---------|----------|----|------|---------|----|----|----|----|-----|-----|----|--------|------|------|--------|--------------------------|------------|----|----|----------|--------|---|--|
| Ⅶ-3-(1)<br>2. DPX-84T<br>粒 | 茎葉兼土壌処理 | 北海道      |    | ●2.5 | ●       | ●2 | ●2 |    |    | ●2  |     |    | ●発生期   | ●発生前 | ●再生前 | ●**    | +5~+20<br>(元12.5L)       | 1.5        | ●  | ●  | ●        | ●      | 2 |  |
|                            |         | 東北       |    | ●2.5 | ●       | ●2 | ●2 | ●2 |    |     |     |    | ●発生期   | ●発生前 | ●再生前 | ●**    | +5~元12.5L                | 300<br>g/a |    | ●  | ●        | ●      |   |  |
|                            |         | 北陸       |    |      |         |    |    |    |    |     |     |    |        |      |      |        |                          |            |    |    |          |        |   |  |
|                            |         | 関東・東山・東海 | 早  |      |         |    |    |    |    |     |     |    |        |      |      |        | **12/7~カウイ<br>発生始<br>~2L |            |    |    |          |        |   |  |
|                            |         |          | 普  |      |         |    |    |    |    |     |     |    |        |      |      |        |                          |            |    |    |          |        |   |  |
|                            |         | 近畿・中国    | 早  |      |         |    |    |    |    |     |     |    |        |      |      |        |                          |            |    |    |          |        |   |  |
|                            |         |          | 普  |      |         |    |    |    |    |     |     |    |        |      |      |        |                          |            |    |    |          |        |   |  |
|                            |         | 四国       | 早  |      |         |    |    |    |    |     |     |    |        |      |      |        |                          |            |    |    |          |        |   |  |
|                            |         |          | 普  |      |         |    |    |    |    |     |     |    |        |      |      |        |                          |            |    |    |          |        |   |  |
|                            |         | 九州       | 早  |      |         |    |    |    |    |     |     |    |        |      |      |        |                          |            |    |    |          |        |   |  |
|                            |         |          | 普  |      |         |    |    |    |    |     |     |    |        |      |      |        |                          |            |    |    |          |        |   |  |

|                                | 処理法     | 地域名      | 作期 | 元1   | 一年広葉マリン | オキ | ウカ | ミカ | ハカ | カウイ | カウイ | ヒム | 藻類表層剥離 |      | 処理時期      | 使用量・製品     | 砂壌土 | 壤土 | 埴土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意 |
|--------------------------------|---------|----------|----|------|---------|----|----|----|----|-----|-----|----|--------|------|-----------|------------|-----|----|----|----|----------|--------|
| VII-3-(1)<br>3. DPX-84TDQ<br>粒 | 茎葉兼土壌処理 | 北海道      |    |      |         |    |    |    |    |     |     |    |        |      | +5~元12.5L | 300<br>g/a |     |    |    |    |          | 2      |
|                                |         | 東北       |    |      |         |    |    |    |    |     |     |    |        |      |           |            |     |    |    |    |          |        |
|                                |         | 北陸       |    | ●2.5 | ●       | ●2 | ●2 | ●2 |    |     |     |    |        | ●再生前 |           |            | ●   | ●  | ●  | ●  |          |        |
|                                |         | 関東・東山・東海 | 早  |      |         |    |    |    |    |     |     |    |        | ●再生前 |           |            |     |    |    |    |          |        |
|                                |         |          | 普  |      |         |    |    |    |    |     |     |    |        | ●再生前 |           |            |     |    |    |    |          |        |
|                                |         | 近畿・中国    | 早  |      |         |    |    |    |    |     |     |    |        |      |           |            |     |    |    |    |          |        |
|                                |         |          | 普  |      |         |    |    |    |    |     |     |    |        |      |           |            |     |    |    |    |          |        |
|                                |         | 四国       | 早  |      |         |    |    |    |    |     |     |    |        |      |           |            |     |    |    |    |          |        |
|                                |         |          | 普  |      |         |    |    |    |    |     |     |    |        |      |           |            |     |    |    |    |          |        |
|                                |         | 九州       | 早  |      |         |    |    |    |    |     |     |    |        |      |           |            |     |    |    |    |          |        |
|                                |         |          | 普  |      |         |    |    |    |    |     |     |    |        |      |           |            |     |    |    |    |          |        |

VII-3-(1)  
4. KUH-921-1kg 粒 「継」VII-3-(1)  
5. KUH-922-1kg 粒 「継」VII-3-(1)  
6. KUH-926-1kg 粒 「継」VII-3-(1)  
7. KUH-926-1kg 粒 「継」

|                              | 処理法     | 地域名      | 作期 | 元1   | 一年広葉マリン | オキ | ウカ | ミカ | ハカ | カウイ | カウイ | ヒム   | 藻類表層剥離 |      | 処理時期 | 使用量・製品                            | 砂壌土               | 壤土 | 埴土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意 |  |  |
|------------------------------|---------|----------|----|------|---------|----|----|----|----|-----|-----|------|--------|------|------|-----------------------------------|-------------------|----|----|----|----------|--------|--|--|
| VII-3-(1)<br>8. NC-311T<br>粒 | 茎葉兼土壌処理 | 北海道      |    | ●2.5 | ●       | ●2 | ●2 |    | ●2 |     |     | ●発生期 | ●発生前   | ●再生前 | ●**  | +5 ~ +20<br>(元12.5L)<br>+5~元12.5L | 1.5<br>300<br>g/a | ●  | ●  | ●  | ●        | 2      |  |  |
|                              |         | 東北       |    | ●2.5 | ●       | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 |     |     | ●発生期 | ●発生前   | ●再生前 | ●    |                                   |                   | ●  | ●  | ●  |          |        |  |  |
|                              |         | 北陸       |    | ●2.5 | ●       | ●2 | ●2 | ●2 |    |     |     |      |        |      |      |                                   |                   | ●  | ●  | ●  |          |        |  |  |
|                              |         | 関東・東山・東海 | 早  |      |         |    |    |    |    |     |     |      |        |      |      |                                   | **12/7~カウイ発生始~2L  |    |    |    |          |        |  |  |
|                              |         |          | 普  |      |         |    |    |    |    |     |     |      |        |      |      |                                   |                   |    |    |    |          |        |  |  |
|                              |         | 近畿・中国    | 早  |      |         |    |    |    |    |     |     |      |        |      |      |                                   |                   |    |    |    |          |        |  |  |
|                              |         |          | 普  |      |         |    |    |    |    |     |     |      |        |      |      |                                   |                   |    |    |    |          |        |  |  |
|                              |         | 四国       | 早  |      |         |    |    |    |    |     |     |      |        |      |      |                                   |                   |    |    |    |          |        |  |  |
|                              |         |          | 普  |      |         |    |    |    |    |     |     |      |        |      |      |                                   |                   |    |    |    |          |        |  |  |
|                              |         | 九州       | 早  |      |         |    |    |    |    |     |     |      |        |      |      |                                   |                   |    |    |    |          |        |  |  |
|                              |         |          | 普  |      |         |    |    |    |    |     |     |      |        |      |      |                                   |                   |    |    |    |          |        |  |  |



## VII-3-(1) つづき

|                           | 処理法  | 地域名      | 作期 | ベ1   | 一年<br>広葉<br>マツバ | オハ | ウカ | ミカ<br>判 | ハカ<br>効 | カク<br>イ | サカ<br>効 | ヒム<br>日 | 藻類<br>表層<br>剥離 | 処理時期                                              | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上<br>の注意 |                              |
|---------------------------|------|----------|----|------|-----------------|----|----|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|-----------------|------------|------------------------------|
| Ⅶ-3-(1)<br>9. NC-326<br>粒 | 土壌処理 | 北海道      |    | 02.5 | ○               | ○2 | ○2 |         | ○2      |         |         | ○発生     | ○発生            | 1971年~2L<br>+10~+20<br>(カ1 2.5L)<br>+5<br>カ1 2.5L | 300<br>g/a     | ○      | ○      | ○      | ○               | 2          | (28)<br>(38)<br>(40)<br>(42) |
|                           |      | 東北       |    | 02.5 | ○               | ○2 | ○2 | ○2      | ○2      | ○始      | ○前      | ○期      | ○発生<br>前       | ○発生<br>前                                          | ○始             |        | ○      | ○      | ○               |            |                              |
|                           |      | 北陸       |    | 02.5 | ○               | ○2 | ○2 | ○2      |         |         | ○前      |         |                | ○始                                                |                |        | ○      | ○      | ○               |            |                              |
| Ⅱ-6-(1) 9<br>Ⅱ-6-(2) 3 併用 | 土壌処理 | 関東・東山・東海 | 早  |      |                 |    |    |         |         |         |         |         |                |                                                   |                |        |        |        |                 |            |                              |
|                           |      |          | 普  |      |                 |    |    |         |         |         |         |         |                |                                                   |                |        |        |        |                 |            |                              |
|                           |      | 近畿・中国    | 早  |      |                 |    |    |         |         |         |         |         |                |                                                   |                |        |        |        |                 |            |                              |
|                           |      |          | 普  |      |                 |    |    |         |         |         |         |         |                |                                                   |                |        |        |        |                 |            |                              |
|                           |      | 四国       | 早  |      |                 |    |    |         |         |         |         |         |                |                                                   |                |        |        |        |                 |            |                              |
|                           |      |          | 普  |      |                 |    |    |         |         |         |         |         |                |                                                   |                |        |        |        |                 |            |                              |
| 九州                        | 早    |          |    |      |                 |    |    |         |         |         |         |         |                |                                                   |                |        |        |        |                 |            |                              |
|                           | 普    |          |    |      |                 |    |    |         |         |         |         |         |                |                                                   |                |        |        |        |                 |            |                              |

## VII-3-(2) 一年生持株型除草剤

|                                | 処理法              | 地域名              | 作期 | ベ1 | 一年<br>広葉<br>マツバ | オハ<br>イ | ウカ<br>ツ | ミカ<br>ツ | ハカ<br>ツ | カク<br>イ | ネカ<br>ツ | ヒム<br>シ<br>ロ | 藻類<br>表層<br>剥離 | 処理時期 | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壤<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上<br>の注意 |  |
|--------------------------------|------------------|------------------|----|----|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|----------------|------|----------------|-------------|--------|--------|-----------------|------------|--|
| VII-3-(2)<br>1.CG-187<br><br>粒 | 土<br>壌<br>処<br>理 | 北海道              |    |    |                 |         |         |         |         |         |         |              |                |      |                |             |        |        |                 |            |  |
|                                |                  | 東北               |    |    |                 |         |         |         |         |         |         |              |                |      |                |             |        |        |                 |            |  |
|                                |                  | 北陸               |    |    |                 |         |         |         |         |         |         |              |                |      |                |             |        |        |                 |            |  |
|                                |                  | 関東<br>・東山<br>・東海 | 早  | ●2 | ●               | ●2      |         |         |         |         |         |              |                |      | +3~<br>ノビエ2L   | 300<br>g/a  | ●      | ●      | ●               | 2          |  |
|                                |                  |                  | 普  | ●2 | ●               | ●2      |         |         |         |         |         |              |                |      |                |             | ●      | ●      | ●               |            |  |
|                                |                  | 近畿<br>・中国        | 早  | ●2 | ●               | ●2      |         |         |         |         |         |              |                |      |                |             | ●      | ●      | ●               | 1          |  |
|                                |                  |                  | 普  | ●2 | ●               | ●2      |         |         |         |         |         |              |                |      |                |             |        | ●      | ●               | 1.5        |  |
|                                |                  | 四国               | 早  | ●2 | ●               | ●2      |         |         |         |         |         |              |                |      |                |             | ●      | ●      | ●               | 1          |  |
|                                |                  |                  | 普  | ●2 | ●               | ●2      |         |         |         |         |         |              |                |      |                |             |        | ●      | ●               | 1.5        |  |
|                                |                  | 九州               | 早  |    |                 |         |         |         |         |         |         |              |                |      |                |             |        |        |                 |            |  |
|                                |                  |                  | 普  |    |                 |         |         |         |         |         |         |              |                |      |                |             |        |        |                 |            |  |

## VII-3-(2) 2. CH-902 粒 「継」

## VII-1 少量散布法

|                                               | 処理法  | 地域名              | 作期 | ベ1 | 一年<br>広葉<br>マツバ | オハ<br>イ | ウカ | ミカ<br>ツ | ハカ<br>効 | カク<br>イ | カ効 | ヒム<br>口 | 藻類<br>表層<br>剥離 |               | 処理時期 | 使用<br>量・<br>製品      | 砂<br>壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上<br>の注意 |                   |
|-----------------------------------------------|------|------------------|----|----|-----------------|---------|----|---------|---------|---------|----|---------|----------------|---------------|------|---------------------|-------------|--------|--------|--------|-----------------|------------|-------------------|
| VII-1<br>1. KUH-883<br>粒<br><br>II-6-(1) 5 併用 | 土壌処理 | 北海道              |    |    |                 |         |    |         |         |         |    |         |                |               |      |                     |             |        |        |        |                 |            |                   |
|                                               |      | 東北               |    | 02 | 0               | 02      | 02 | 02      | 02      | ●始      |    | 0発生     |                | 0再生<br>前<br>始 |      | +5 ~ +20<br>(カI 2L) | 300<br>g/a  | 0      | 0      | 0      | 0               | 2          | *<br>(28)<br>(42) |
|                                               |      | 北陸               |    |    |                 |         |    |         |         |         |    |         |                |               |      |                     |             |        |        |        |                 |            |                   |
|                                               |      | 関東<br>・東山<br>・東海 | 早  |    |                 |         |    |         |         |         |    |         |                |               |      |                     |             |        |        |        |                 |            |                   |
|                                               |      |                  | 普  |    |                 |         |    |         |         |         |    |         |                |               |      |                     |             |        |        |        |                 |            |                   |
|                                               |      | 近畿<br>・中国        | 早  |    |                 |         |    |         |         |         |    |         |                |               |      |                     |             |        |        |        |                 |            |                   |
|                                               |      |                  | 普  |    |                 |         |    |         |         |         |    |         |                |               |      |                     |             |        |        |        |                 |            |                   |
|                                               |      | 四国               | 早  |    |                 |         |    |         |         |         |    |         |                |               |      |                     |             |        |        |        |                 |            |                   |
|                                               |      |                  | 普  |    |                 |         |    |         |         |         |    |         |                |               |      |                     |             |        |        |        |                 |            |                   |
|                                               |      | 九州               | 早  |    |                 |         |    |         |         |         |    |         |                |               |      |                     |             |        |        |        |                 |            |                   |
|                                               | 普    |                  |    |    |                 |         |    |         |         |         |    |         |                |               |      |                     |             |        |        |        |                 |            |                   |

\* 初期剤を前処理に少量散布することにより除草効果向上（東北）  
クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することにより、さらに効果が向上する。（東北）

Ⅶ-2 少量散布

|                       | 処理法  | 地域名      | 作期 | ベI | 一年広葉マツバ | オシイ | カカ | ミカサツ | ハラセ効 | 加効イ | オセ効 | ビムシ | 藻類表層剥離 |  | 処理時期                                         | 使用量・製品                             | 砂壌土 | 壤土 | 埴壌土 | 埴土 | 減水深<br>cm/d | 使用上の注意 |
|-----------------------|------|----------|----|----|---------|-----|----|------|------|-----|-----|-----|--------|--|----------------------------------------------|------------------------------------|-----|----|-----|----|-------------|--------|
| Ⅶ-2<br>1. CG-113<br>粒 | 土壌処理 | 北海道      |    | ○1 | ○       | ○始  |    |      | ○始   |     |     |     |        |  | 植代後～4,<br>+0～+5<br>……………<br>(ベI 1L)<br>…………… | 150<br>～200<br>g/a<br><br>少量<br>散布 | ●   | ○  | ○   | ○  | 2           | *      |
|                       |      | 東北       |    | ○1 | ○       | ○始  |    | ●始   | ○始   |     |     |     |        |  |                                              |                                    | ○   | ○  | ○   | ○  |             |        |
|                       |      | 北陸       |    | ○1 | ○       | ○始  |    |      |      |     |     |     |        |  |                                              |                                    | ○   | ○  | ○   | ○  |             |        |
|                       |      | 関東・東山・東海 | 早  | ○1 | ○       | ○始  |    | ○始   |      |     |     |     |        |  |                                              |                                    | ○   | ○  | ○   | ○  |             |        |
|                       |      |          | 普  | ○1 | ○       | ○始  |    |      |      |     |     |     |        |  |                                              |                                    | ○   | ○  | ○   | ○  |             |        |
|                       |      | 近畿・中国    | 早  | ○1 | ○       | ○始  |    | ○始   |      |     |     |     |        |  |                                              |                                    | ●   | ○  | ○   | ○  | 1           |        |
|                       |      |          | 普  | ○1 | ○       | ○始  |    | ○始   |      |     |     |     |        |  |                                              |                                    | ○   | ○  | ○   | ○  | 1.5         |        |
|                       |      | 四国       | 早  | ○1 | ○       | ○始  |    | ○始   |      |     |     |     |        |  |                                              |                                    | ●   | ○  | ○   | ○  | 1           |        |
|                       |      |          | 普  | ○1 | ○       | ○始  |    | ○始   |      |     |     |     |        |  |                                              |                                    | ○   | ○  | ○   | ○  | 1.5         |        |
|                       |      | 九州       | 早  | ○1 | ○       | ○始  |    | ○始   |      |     |     |     |        |  |                                              |                                    | ○   | ○  | ○   | ○  | 1.5         |        |
|                       |      |          | 普  | ○1 | ○       | ○始  |    |      |      |     |     |     |        |  |                                              |                                    | ○   | ○  | ○   | ○  | 1           |        |

\* 一発処理型除草剤の前処理として少量散布(150～200g/a)が可能

#### 水稻関係除草剤使用基準一覧表の表示について

- 過年度、既に実用化の認められている適用草種・土壌条件に○を印した。(本年度の試験の結果、特に拡大のない場合も含む。)
 

草種欄の数字、字句で草種毎の葉齢を示した。[例: ○前(発生前)、○2(2葉期まで)]

ⅣおよびⅤの項目の地域名の○は前年度までに実用化の認められている地域を示し、●は本年度新たに実用化の認められた地域を示した。

使用上の注意は別途一覧表の番号で記し、一覧表にない注意事項の場合は\*を付し、欄外に字句を記載した。
- 本年度、新たに使用基準が作成された場合は、実用化可能となった適用草種・土壌に●を印し、処理時期・使用量を記載した。
- 過年度の基準に適用条件拡大が可能となった場合
 

作期の拡大: 拡大可能となった作期の適用草種・土壌に●を印した。

草種の拡大: 拡大可能となった草種に●を印した。

葉齢の拡大: 拡大可能となった葉齢にアンダーラインを付した。(例: ○2.5)

処理時期、使用量の拡大: 拡大部分にアンダーラインを付した。(例: +3 ~ ベI2L、50 ~ 75ml/a)

土壌条件の拡大: 拡大可能となった土壌に●を印した。
- 「継」、「継?」、「中止」の場合は判定のみ記載した。

第5表 平成4年度水稲作関係除草剤ジャンボ剤使用基準一覧表

## II-2 移植前後土壌処理

II-2  
1.CG-199 ジャンボ 「継」

| 処理法                      | 地域名  | 作期       | 元I | 一年広葉マシイ | 木刈 | 刈刈 | ミカ刈 | ハラ刈 | 刈刈イ | 刈刈 | ヒムシ | 落類表層剥離 | 処理時期                    | 使用量・製品      | 砂壌土 | 壤土 | 埴土 | 減水深<br>cm/d | 使用上の注意       |
|--------------------------|------|----------|----|---------|----|----|-----|-----|-----|----|-----|--------|-------------------------|-------------|-----|----|----|-------------|--------------|
| II-2<br>2.CG-200<br>ジャンボ | 土壌処理 | 北海道      | ●1 | ●       | ●始 |    |     | ●始  |     |    |     | ●前     | +0~+10(元IIL)            | 50x2<br>g/a | ●   | ●  | ●  | 1           | (45)<br>(46) |
|                          |      | 東北       | ●  | ●       | ●  |    |     |     |     |    |     | ●前     | +3 ~ +5                 |             |     | ●  | ●  |             |              |
|                          |      | 北陸       | ●  | ●       | ●  |    | ●   |     |     |    |     |        | 植代後 ~ -4,<br>元I +0 ~ +3 |             |     | ●  | ●  |             |              |
|                          |      | 関東・東山・東海 | 早  |         |    |    |     |     |     |    |     |        |                         |             |     |    |    |             |              |
|                          |      |          | 普  |         |    |    |     |     |     |    |     |        |                         |             |     |    |    |             |              |
|                          |      | 近畿・中国    | 早  |         |    |    |     |     |     |    |     |        | 植代後 ~ -4<br>+3 ~ 元IIL   |             |     |    |    |             |              |
|                          |      |          | 普  | ●1      | ●  | ●始 |     |     |     |    |     | ●前     |                         |             | ●   | ●  | ●  |             |              |
|                          |      | 四国       | 早  |         |    |    |     |     |     |    |     |        |                         |             |     |    |    |             |              |
|                          |      |          | 普  | ●1      | ●  | ●始 |     |     |     |    |     | ●前     |                         |             | ●   | ●  | ●  |             |              |
|                          |      | 九州       | 早  |         |    |    |     |     |     |    |     |        |                         |             |     |    |    |             |              |
|                          |      |          | 普  |         |    |    |     |     |     |    |     |        |                         |             |     |    |    |             |              |

II-2  
3.KPP-2005 ジャンボ 「継」

| 処理法                      | 地域名  | 作期       | 元I | 一年広葉マシイ | 木刈 | 刈刈 | ミカ刈 | ハラ刈 | 刈刈イ | 刈刈 | ヒムシ | 落類表層剥離 | 処理時期                           | 使用量・製品      | 砂壌土 | 壤土 | 埴土 | 減水深<br>cm/d | 使用上の注意       |
|--------------------------|------|----------|----|---------|----|----|-----|-----|-----|----|-----|--------|--------------------------------|-------------|-----|----|----|-------------|--------------|
| II-2<br>4.MO-338<br>ジャンボ | 土壌処理 | 北海道      | ●1 | ●       |    |    |     |     |     |    |     |        | 植代後 ~ -4, +0~+6(元IIL)          | 25x4<br>g/a | ●   | ●  | ●  | 1           | (45)<br>(46) |
|                          |      | 東北       | ●1 | ●       |    |    |     |     |     |    |     |        | +0 ~ +3                        |             |     | ●  | ●  |             |              |
|                          |      | 北陸       | ●1 | ●       |    |    |     |     |     |    |     |        | 植代後 ~ -4,<br>+0 ~ +3<br>(元IIL) |             |     | ●  | ●  |             |              |
|                          |      | 関東・東山・東海 | 早  |         |    |    |     |     |     |    |     |        |                                |             |     |    |    |             |              |
|                          |      |          | 普  | ●1      | ●  |    |     |     |     |    |     |        |                                |             |     | ●  | ●  |             |              |
|                          |      | 近畿・中国    | 早  |         |    |    |     |     |     |    |     |        |                                |             |     |    |    |             |              |
|                          |      |          | 普  | ●1      | ●  |    |     |     |     |    |     |        |                                |             |     | ●  | ●  |             |              |
|                          |      | 四国       | 早  |         |    |    |     |     |     |    |     |        |                                |             |     |    |    |             |              |
|                          |      |          | 普  | ●1      | ●  |    |     |     |     |    |     |        |                                |             |     | ●  | ●  |             |              |
|                          |      | 九州       | 早  |         |    |    |     |     |     |    |     |        | 植代後 ~ -4                       |             |     |    |    |             |              |
|                          |      |          | 普  | ●       | ●  |    |     |     |     |    |     |        |                                |             |     | ●  | ●  |             |              |

| 処理法                     | 地域名  | 作期       | 元I | 一年広葉マシイ | 木刈 | 刈刈 | ミカ刈 | ハラ刈 | 刈刈イ | 刈刈 | ヒムシ | 落類表層剥離 | 処理時期                           | 使用量・製品      | 砂壌土 | 壤土 | 埴土 | 減水深<br>cm/d | 使用上の注意       |
|-------------------------|------|----------|----|---------|----|----|-----|-----|-----|----|-----|--------|--------------------------------|-------------|-----|----|----|-------------|--------------|
| II-2<br>5.MTS-1<br>ジャンボ | 土壌処理 | 北海道      | ●1 | ●       | ●始 |    |     |     |     |    |     |        | 植代後 ~ -4,<br>+0 ~ +7<br>(元IIL) | 25x4<br>g/a | ●   | ●  | ●  | 1           | (45)<br>(46) |
|                         |      | 東北       |    |         |    |    |     |     |     |    |     |        |                                |             |     |    |    |             |              |
|                         |      | 北陸       | ●1 | ●       | ●始 |    |     |     |     |    |     |        | 植代後 ~ -4,<br>+0 ~ +3<br>(元IIL) |             |     | ●  | ●  |             |              |
|                         |      | 関東・東山・東海 | 早  |         |    |    |     |     |     |    |     |        |                                |             |     |    |    |             |              |
|                         |      |          | 普  | ●1      | ●  | ●始 |     |     |     |    |     |        |                                |             |     | ●  | ●  |             |              |
|                         |      | 近畿・中国    | 早  |         |    |    |     |     |     |    |     |        |                                |             |     |    |    |             |              |
|                         |      |          | 普  | ●1      | ●  | ●始 |     |     |     |    |     |        |                                |             |     | ●  | ●  |             |              |
|                         |      | 四国       | 早  |         |    |    |     |     |     |    |     |        |                                |             |     |    |    |             |              |
|                         |      |          | 普  | ●1      | ●  | ●始 |     |     |     |    |     |        |                                |             |     | ●  | ●  |             |              |
|                         |      | 九州       | 早  |         |    |    |     |     |     |    |     |        | 植代後 ~ -4                       |             |     |    |    |             |              |
|                         |      |          | 普  | ●       | ●  | ●  |     |     |     |    |     |        |                                |             |     |    | ●  |             |              |



## VII-1 つづき

|                             | 処理法  | 地域名      | 作期 | バI   | 一年広葉マツバ | ナメI | ウカ | ミカ | ハラ | カク | 枯効 | ヒム | 藻類表層剥離 | 処理時期        | 使用量・製品      | 砂壌土 | 壤土 | 埴土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意                               |
|-----------------------------|------|----------|----|------|---------|-----|----|----|----|----|----|----|--------|-------------|-------------|-----|----|----|----|----------|--------------------------------------|
| VII-1<br>2.DPX-84CG<br>ジャンボ | 土壌処理 | 北海道      |    |      |         |     |    |    |    |    |    |    |        | +5 ~ ㊦11.5L | 75×2<br>g/a |     |    |    |    |          | (26)<br>(28)<br>(34)<br>(45)<br>(47) |
|                             |      | 東北       |    |      |         |     |    |    |    |    |    |    |        |             |             |     |    |    |    |          |                                      |
|                             |      | 北陸       |    | ●1.5 | ●       | ●始  | ●始 | ●始 |    |    |    |    |        |             |             | -1  | ●  | ●  | ●  | 1        |                                      |
|                             |      | 関東・東山・東海 | 早  | ●1.5 | ●       | ●始  | ●始 | ●始 |    |    |    |    |        |             |             | ●   | ●  | ●  | ●  | 1.5      |                                      |
|                             |      |          | 普  | ●1.5 | ●       | ●始  | ●始 | ●始 |    |    |    |    |        |             |             |     | ●  | ●  | ●  |          |                                      |
|                             |      | 近畿・中国    | 早  |      |         |     |    |    |    |    |    |    |        |             |             |     |    |    |    |          |                                      |
|                             |      |          | 普  | ●1.5 | ●       | ●始  | ●始 | ●始 |    |    |    |    | ●再生前   |             |             | ●   | ●  | ●  | ●  | 1        |                                      |
|                             |      | 四国       | 早  |      |         |     |    |    |    |    |    |    | ●      |             |             |     |    |    |    |          |                                      |
|                             |      |          | 普  | ●1.5 | ●       | ●始  | ●始 | ●始 |    |    |    |    | ●      |             |             | ●   | ●  | ●  | ●  |          |                                      |
|                             |      | 九州       | 早  |      |         |     |    |    |    |    |    |    |        |             |             |     |    |    |    |          |                                      |
|                             |      |          | 普  | ●1.5 | ●       | ●2  | ●2 | ●始 |    |    |    |    |        |             |             | ●   | ●  | ●  | ●  |          |                                      |

|                            | 処理法  | 地域名      | 作期 | バI   | 一年広葉マツバ | ナメI | ウカ | ミカ | ハラ | カク | 枯効 | ヒム   | 藻類表層剥離 | 処理時期        | 使用量・製品      | 砂壌土  | 壤土 | 埴土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意               |
|----------------------------|------|----------|----|------|---------|-----|----|----|----|----|----|------|--------|-------------|-------------|------|----|----|----|----------|----------------------|
| VII-1<br>3.DPX-84M<br>ジャンボ | 土壌処理 | 北海道      |    | ●1.5 | ●       | ●2  | ●2 |    | ●2 |    |    | ●発生期 | ●前     | +7 ~ ㊦11.5L | 80×2<br>g/a | ●    | ●  | ●  | ●  | 2        | (28)<br>(45)<br>(47) |
|                            |      | 東北       |    |      |         |     |    |    |    |    |    |      | ●再生前   |             |             | -1.5 |    |    |    |          |                      |
|                            |      | 北陸       |    |      |         |     |    |    |    |    |    |      | ●      |             |             |      |    |    |    |          |                      |
|                            |      | 関東・東山・東海 | 早  |      |         |     |    |    |    |    |    |      | ●      |             |             |      |    |    |    |          |                      |
|                            |      |          | 普  |      |         |     |    |    |    |    |    |      |        |             |             |      |    |    |    |          |                      |
|                            |      | 近畿・中国    | 早  |      |         |     |    |    |    |    |    |      |        |             |             |      |    |    |    |          |                      |
|                            |      |          | 普  |      |         |     |    |    |    |    |    |      |        |             |             |      |    |    |    |          |                      |
|                            |      | 四国       | 早  |      |         |     |    |    |    |    |    |      |        |             |             |      |    |    |    |          |                      |
|                            |      |          | 普  |      |         |     |    |    |    |    |    |      |        |             |             |      |    |    |    |          |                      |
|                            |      | 九州       | 早  |      |         |     |    |    |    |    |    |      |        |             |             |      |    |    |    |          |                      |
|                            |      |          | 普  |      |         |     |    |    |    |    |    |      |        |             |             |      |    |    |    |          |                      |

|                             | 処理法  | 地域名      | 作期 | バI   | 一年広葉マツバ | ナメI | ウカ | ミカ | ハラ | カク | 枯効 | ヒム   | 藻類表層剥離 | 処理時期        | 使用量・製品      | 砂壌土 | 壤土 | 埴土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意               |
|-----------------------------|------|----------|----|------|---------|-----|----|----|----|----|----|------|--------|-------------|-------------|-----|----|----|----|----------|----------------------|
| VII-1<br>4.DPX-84MO<br>ジャンボ | 土壌処理 | 北海道      |    |      |         |     |    |    |    |    |    |      |        | +5 ~ ㊦11.5L | 80×2<br>g/a |     |    |    |    |          | (28)<br>(45)<br>(47) |
|                             |      | 東北       |    |      |         |     |    |    |    |    |    |      |        |             |             |     |    |    |    |          |                      |
|                             |      | 北陸       |    | ●1.5 | ●       | ●始  | ●始 | ●始 |    |    |    |      |        |             |             | ●   | ●  | ●  | ●  | 2        |                      |
|                             |      | 関東・東山・東海 | 早  | ●1.5 | ●       | ●始  | ●始 | ●始 |    |    |    |      |        |             |             | ●   | ●  | ●  | ●  | 1.5      |                      |
|                             |      |          | 普  | ●1.5 | ●       | ●始  | ●始 | ●始 |    |    |    |      |        |             |             | 1   | ●  | ●  | ●  |          |                      |
|                             |      | 近畿・中国    | 早  | ●1.5 | ●       | ●始  | ●始 | ●始 |    |    |    | ●発生期 | ●      |             |             |     | ●  | ●  | ●  | 1        |                      |
|                             |      |          | 普  | ●1.5 | ●       | ●始  | ●始 | ●始 |    |    |    | ●    | ●再生前   |             |             | ●   | ●  | ●  | ●  |          |                      |
|                             |      | 四国       | 早  | ●1.5 | ●       | ●始  | ●始 | ●始 |    |    |    | ●発生期 | ●      |             |             |     | ●  | ●  | ●  |          |                      |
|                             |      |          | 普  | ●1.5 | ●       | ●始  | ●始 | ●始 |    |    |    |      | ●      |             |             | ●   | ●  | ●  | ●  |          |                      |
|                             |      | 九州       | 早  |      |         |     |    |    |    |    |    |      |        |             |             |     |    |    |    |          |                      |
|                             |      |          | 普  |      |         |     |    |    |    |    |    |      |        |             |             |     |    |    |    |          |                      |

VII-1  
5.HOK-915D ジャンボ 「継」VII-1  
6.HOK-915DQジャンボ 「継」

## Ⅶ-1 つづき

|                           | 処理法  | 地域名      | 作期 | 元I   | 一年広葉マツバ | オシロイ | ウチワ | ミズウチ | ハラモ | カウイ | カサ | ヒメシロ | 落類表層剥離 |       | 処理時期        | 使用量・製品   | 砂壌土 | 壤土 | 埴壌土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意               |
|---------------------------|------|----------|----|------|---------|------|-----|------|-----|-----|----|------|--------|-------|-------------|----------|-----|----|-----|----|----------|----------------------|
| Ⅶ-1<br>7. KUH-883<br>ジャンボ | 土壌処理 | 北海道      |    | ●1.5 | ●       | ●始   | ●始  |      | ●始  |     |    | ●発生期 | ●前     | ●切再生前 | +5 ~ 元11.5L | 30x2 g/a | 1.5 | ●  | ●   | ●  | 2        | (28)<br>(45)<br>(47) |
|                           |      | 東北       |    | ●1.5 | ●       | ●始   | ●始  | ●始   | ●始  |     |    |      |        | ●切再生前 |             |          |     |    |     |    |          |                      |
|                           |      | 北陸       |    |      |         |      |     |      |     |     |    |      |        | ●切再生前 |             |          |     |    |     |    |          |                      |
|                           |      | 関東・東山・東海 | 早  |      |         |      |     |      |     |     |    |      |        | ●切再生前 |             |          |     |    |     |    |          |                      |
|                           |      |          | 普  |      |         |      |     |      |     |     |    |      |        | ●切再生前 |             |          |     |    |     |    |          |                      |
|                           |      | 近畿・中国    | 早  |      |         |      |     |      |     |     |    |      |        | ●切再生前 |             |          |     |    |     |    |          |                      |
|                           |      |          | 普  |      |         |      |     |      |     |     |    |      |        | ●切再生前 |             |          |     |    |     |    |          |                      |
|                           |      | 四国       | 早  |      |         |      |     |      |     |     |    |      |        | ●切再生前 |             |          |     |    |     |    |          |                      |
|                           |      |          | 普  |      |         |      |     |      |     |     |    |      |        | ●切再生前 |             |          |     |    |     |    |          |                      |
|                           |      | 九州       | 早  |      |         |      |     |      |     |     |    |      |        | ●切再生前 |             |          |     |    |     |    |          |                      |
|                           |      |          | 普  |      |         |      |     |      |     |     |    |      |        | ●切再生前 |             |          |     |    |     |    |          |                      |

|                            | 処理法  | 地域名      | 作期 | 元I   | 一年広葉マツバ | オシロイ | ウチワ | ミズウチ | ハラモ | カウイ | カサ | ヒメシロ | 落類表層剥離 |  | 処理時期        | 使用量・製品   | 砂壌土 | 壤土 | 埴壌土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意                       |
|----------------------------|------|----------|----|------|---------|------|-----|------|-----|-----|----|------|--------|--|-------------|----------|-----|----|-----|----|----------|------------------------------|
| Ⅶ-1<br>8. KUH-883○<br>ジャンボ | 土壌処理 | 北海道      |    |      |         |      |     |      |     |     |    |      |        |  | +5 ~ 元11.5L | 30x2 g/a |     | ●  | ●   | ●  | 1.5      | (26)<br>(34)<br>(45)<br>(47) |
|                            |      | 東北       |    |      |         |      |     |      |     |     |    |      |        |  |             |          |     |    |     |    |          |                              |
|                            |      | 北陸       |    | ●1.5 | ●       | ●始   | ●始  | ●始   | ●始  |     |    |      |        |  |             |          |     |    |     |    |          |                              |
|                            |      | 関東・東山・東海 | 早  | ●1.5 | ●       | ●始   | ●始  | ●始   | ●始  |     |    |      |        |  |             |          |     |    |     |    |          |                              |
|                            |      |          | 普  | ●1.5 | ●       | ●始   | ●始  | ●始   | ●始  |     |    |      |        |  |             |          |     |    |     |    |          |                              |
|                            |      | 近畿・中国    | 早  |      |         |      |     |      |     |     |    |      |        |  |             |          |     |    |     |    |          |                              |
|                            |      |          | 普  | ●1.5 | ●       | ●始   | ●始  | ●始   | ●始  |     |    |      |        |  |             |          |     |    |     |    |          |                              |
|                            |      | 四国       | 早  |      |         |      |     |      |     |     |    |      |        |  |             |          |     |    |     |    |          |                              |
|                            |      |          | 普  | ●1.5 | ●       | ●始   | ●始  | ●始   | ●始  |     |    |      |        |  |             |          |     |    |     |    |          |                              |
|                            |      | 九州       | 早  |      |         |      |     |      |     |     |    |      |        |  |             |          |     |    |     |    |          |                              |
|                            |      |          | 普  | ●1.5 | ●       | ●2   | ●始  |      |     |     |    |      |        |  |             |          |     |    |     |    |          |                              |

Ⅶ-1  
9. KUH-891 ジャンボ 「継」Ⅶ-1  
10. KUH-891○ジャンボ 「継」

|                                 | 処理法              | 地域名      | 作期 | 元I   | 一年<br>広葉<br>マツバ | オシロイ | ウチワ | ミズウチ | ハラモ | カウイ | カサ | ヒメシロ | 落類<br>表層<br>剥離 |       | 処理時期        | 使用量・<br>製品  | 砂<br>壌<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d              | 使用上<br>の注意 |  |
|---------------------------------|------------------|----------|----|------|-----------------|------|-----|------|-----|-----|----|------|----------------|-------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|------------------------------|------------|--|
| Ⅶ-1<br>11. NC<br>-311CG<br>ジャンボ | 土<br>壌<br>処<br>理 | 北海道      |    | ●1.5 | ●               | ●2   | ●2  |      | ●2  |     |    | ●発生期 | ●前             | ●切再生前 | +5 ~ 元11.5L | 50x2<br>g/a | ●           | ●      | ●      | 2      | (26)<br>(28)<br>(45)<br>(47) |            |  |
|                                 |                  | 東北       |    |      |                 |      |     |      |     |     |    |      |                |       |             |             |             |        |        |        |                              | ●切再生前      |  |
|                                 |                  | 北陸       |    | ●1.5 | ●               | ●始   | ●始  | ●始   |     |     |    |      |                |       |             |             |             |        |        |        |                              | ●切再生前      |  |
|                                 |                  | 関東・東山・東海 | 早  |      |                 |      |     |      |     |     |    |      |                |       |             |             |             |        |        |        |                              | ●切再生前      |  |
|                                 |                  |          | 普  | ●1.5 | ●               | ●始   | ●始  | ●始   |     |     |    |      |                |       |             |             |             |        |        |        |                              | ●切再生前      |  |
|                                 |                  | 近畿・中国    | 早  |      |                 |      |     |      |     |     |    |      |                |       |             |             |             |        |        |        |                              |            |  |
|                                 |                  |          | 普  |      |                 |      |     |      |     |     |    |      |                |       |             |             |             |        |        |        |                              |            |  |
|                                 |                  | 四国       | 早  |      |                 |      |     |      |     |     |    |      |                |       |             |             |             |        |        |        |                              |            |  |
|                                 |                  |          | 普  |      |                 |      |     |      |     |     |    |      |                |       |             |             |             |        |        |        |                              |            |  |
|                                 |                  | 九州       | 早  |      |                 |      |     |      |     |     |    |      |                |       |             |             |             |        |        |        |                              |            |  |
|                                 |                  |          | 普  |      |                 |      |     |      |     |     |    |      |                |       |             |             |             |        |        |        |                              |            |  |

Ⅶ-1 つづき

|                                  | 処理法              | 地域名              | 作期 | 1年<br>広葉<br>マツバ | オシ<br>バ | ウカ<br>バ | ミカ<br>バ | ハカ<br>バ | カク<br>イ | カク<br>バ | ヒム<br>シ | 落類<br>表層<br>剥離 |          | 処理時期        | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上<br>の注意                   |
|----------------------------------|------------------|------------------|----|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|----------|-------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|------------------------------|
| Ⅶ-1<br>12. NC<br>-311CGQ<br>ジャンボ | 土<br>壌<br>処<br>理 | 北海道              |    |                 |         |         |         |         |         |         |         |                |          | +3 ~ ㊦11.5L | 50×2<br>g/a    |        |        |        |        | 1               | (26)<br>(34)<br>(45)<br>(47) |
|                                  |                  | 東北               |    |                 |         |         |         |         |         |         |         |                |          |             |                |        |        |        |        |                 |                              |
|                                  |                  | 北陸               |    |                 |         |         |         |         |         |         |         |                |          |             |                |        |        |        |        |                 |                              |
|                                  |                  | 関東<br>・東山<br>・東海 | 早  |                 |         |         |         |         |         |         |         |                |          |             |                |        |        |        |        |                 |                              |
|                                  |                  |                  | 普  |                 |         |         |         |         |         |         |         |                |          |             |                |        |        |        |        |                 |                              |
|                                  |                  | 近畿<br>・中国        | 早  |                 |         |         |         |         |         |         |         |                |          |             |                |        |        |        |        |                 |                              |
|                                  |                  |                  | 普  | ●1.5 ●          | ●始      | ●始      | ●始      |         |         |         |         |                | ●再生<br>前 |             |                | ●      | ●      | ●      |        |                 |                              |
|                                  |                  | 四国               | 早  |                 |         |         |         |         |         |         |         |                |          |             |                |        |        |        |        |                 |                              |
|                                  |                  |                  | 普  | ●1.5 ●          | ●始      | ●始      | ●始      |         |         |         |         |                | ●始       |             |                | ●      | ●      | ●      |        |                 |                              |
|                                  |                  | 九州               | 早  |                 |         |         |         |         |         |         |         |                |          |             |                |        |        |        |        |                 |                              |
|                                  |                  |                  | 普  |                 |         |         |         |         |         |         |         |                |          |             |                |        |        |        |        |                 |                              |

Ⅶ-1  
13. NC-311SS ジャンボ 「継」

|                                 | 処理法              | 地域名              | 作期 | 1年<br>広葉<br>マツバ | オシ<br>バ | ウカ<br>バ | ミカ<br>バ | ハカ<br>バ | カク<br>イ | カク<br>バ | ヒム<br>シ | 落類<br>表層<br>剥離 |                             | 処理時期        | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上<br>の注意           |
|---------------------------------|------------------|------------------|----|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|-----------------------------|-------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|----------------------|
| Ⅶ-1<br>14. NSK<br>-850D<br>ジャンボ | 土<br>壌<br>処<br>理 | 北海道              |    | ●1.5 ●          | ●2      | ●2      |         | ●2      |         |         | ●発生期    | ●前             | ●切<br>再<br>生<br>前<br>ス<br>始 | +5 ~ ㊦11.5L | 50×2<br>g/a    |        | ●      |        | ●      | 2               | (28)<br>(45)<br>(47) |
|                                 |                  | 東北               |    |                 |         |         |         |         |         |         |         |                |                             |             |                |        |        |        |        |                 |                      |
|                                 |                  | 北陸               |    |                 |         |         |         |         |         |         |         |                |                             |             |                |        |        |        |        |                 |                      |
|                                 |                  | 関東<br>・東山<br>・東海 | 早  |                 |         |         |         |         |         |         |         |                |                             |             |                |        |        |        |        |                 |                      |
|                                 |                  |                  | 普  |                 |         |         |         |         |         |         |         |                |                             |             |                |        |        |        |        |                 |                      |
|                                 |                  | 近畿<br>・中国        | 早  |                 |         |         |         |         |         |         |         |                |                             |             |                |        |        |        |        |                 |                      |
|                                 |                  |                  | 普  |                 |         |         |         |         |         |         |         |                |                             |             |                |        |        |        |        |                 |                      |
|                                 |                  | 四国               | 早  |                 |         |         |         |         |         |         |         |                |                             |             |                |        |        |        |        |                 |                      |
|                                 |                  |                  | 普  |                 |         |         |         |         |         |         |         |                |                             |             |                |        |        |        |        |                 |                      |
|                                 |                  | 九州               | 早  |                 |         |         |         |         |         |         |         |                |                             |             |                |        |        |        |        |                 |                      |
|                                 |                  |                  | 普  |                 |         |         |         |         |         |         |         |                |                             |             |                |        |        |        |        |                 |                      |

|                                  | 処理法              | 地域名              | 作期 | 1年<br>広葉<br>マツバ | オシ<br>バ | ウカ<br>バ | ミカ<br>バ | ハカ<br>バ | カク<br>イ | カク<br>バ | ヒム<br>シ | 落類<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期        | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上<br>の注意                   |
|----------------------------------|------------------|------------------|----|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|--|-------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|------------------------------|
| Ⅶ-1<br>15. NSK<br>-850DQ<br>ジャンボ | 土<br>壌<br>処<br>理 | 北海道              |    |                 |         |         |         |         |         |         |         |                |  | +5 ~ ㊦11.5L | 50×2<br>g/a    |        |        |        |        | 1               | (28)<br>(34)<br>(45)<br>(47) |
|                                  |                  | 東北               |    |                 |         |         |         |         |         |         |         |                |  |             |                |        |        |        |        |                 |                              |
|                                  |                  | 北陸               |    | ●1.5 ●          | ●始      | ●始      | ●始      |         |         |         |         |                |  |             |                |        | ●      | ●      | ●      |                 |                              |
|                                  |                  | 関東<br>・東山<br>・東海 | 早  |                 |         |         |         |         |         |         |         |                |  |             |                |        |        |        |        |                 |                              |
|                                  |                  |                  | 普  | ●1.5 ●          | ●始      | ●始      | ●始      |         |         |         |         |                |  |             |                |        |        | ●      | ●      |                 |                              |
|                                  |                  | 近畿<br>・中国        | 早  |                 |         |         |         |         |         |         |         |                |  |             |                |        |        |        |        |                 |                              |
|                                  |                  |                  | 普  | ●1.5 ●          | ●始      | ●始      | ●始      |         |         |         |         |                |  |             |                |        | ●      | ●      | ●      |                 |                              |
|                                  |                  | 四国               | 早  |                 |         |         |         |         |         |         |         |                |  |             |                |        |        |        |        |                 |                              |
|                                  |                  |                  | 普  | ●1.5 ●          | ●始      | ●始      | ●始      |         |         |         |         |                |  |             |                |        | ●      | ●      | ●      |                 |                              |
|                                  |                  | 九州               | 早  |                 |         |         |         |         |         |         |         |                |  |             |                |        |        |        |        |                 |                              |
|                                  |                  |                  | 普  |                 |         |         |         |         |         |         |         |                |  |             |                |        |        |        |        |                 |                              |

## VII-1 つづき

|                                 | 処理法              | 地域名              | 作期 | デI   | 一年<br>広葉<br>マツバ | オウイ | ウカ | ミカ<br>ツメ | ハラ<br>ツメ | カウ<br>イ | カウ<br>ツメ | ヒム<br>ツメ | 藻類<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期        | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壤<br>土 | 壤<br>土 | 植<br>壤<br>土 | 植<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上<br>の注意                  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|------------------|------------------|----|------|-----------------|-----|----|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|--|-------------|----------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| VII-1<br>16. SL-496<br><br>ジャンボ | 土<br>壌<br>処<br>理 | 北海道              |    | ●1.5 | ●               | ●始  | ●始 |          | ●始       |         |          | ●<br>発生期 |                |  | +3 ~ デ11.5L | 25x4<br>g/a    |             | ●      | ●           | ●      | 2               | (7)<br>(17)<br>(45)<br>(47) |  |  |  |  |  |
|                                 |                  | 東北               |    |      |                 |     |    |          |          |         |          |          |                |  |             |                |             |        |             |        |                 |                             |  |  |  |  |  |
|                                 |                  | 北陸               |    |      |                 |     |    |          |          |         |          |          |                |  |             |                |             |        |             |        |                 |                             |  |  |  |  |  |
|                                 |                  | 関東<br>・東山<br>・東海 | 早  |      |                 |     |    |          |          |         |          |          |                |  |             |                |             |        |             |        |                 |                             |  |  |  |  |  |
|                                 |                  |                  | 普  |      |                 |     |    |          |          |         |          |          |                |  |             |                |             |        |             |        |                 |                             |  |  |  |  |  |
|                                 |                  | 近畿<br>・中国        | 早  |      |                 |     |    |          |          |         |          |          |                |  |             |                |             |        |             |        |                 |                             |  |  |  |  |  |
|                                 |                  |                  | 普  |      |                 |     |    |          |          |         |          |          |                |  |             |                |             |        |             |        |                 |                             |  |  |  |  |  |
|                                 |                  | 四国               | 早  |      |                 |     |    |          |          |         |          |          |                |  |             |                |             |        |             |        |                 |                             |  |  |  |  |  |
|                                 |                  |                  | 普  |      |                 |     |    |          |          |         |          |          |                |  |             |                |             |        |             |        |                 |                             |  |  |  |  |  |
|                                 |                  | 九州               | 早  |      |                 |     |    |          |          |         |          |          |                |  |             |                |             |        |             |        |                 |                             |  |  |  |  |  |
|                                 |                  |                  | 普  |      |                 |     |    |          |          |         |          |          |                |  |             |                |             |        |             |        |                 |                             |  |  |  |  |  |

|                                | 処理法      | 地域名              | 作期 | デI   | 一年<br>広葉<br>マツバ | オウイ | ウカ | ミカ<br>ツメ | ハラ<br>ツメ | カウ<br>イ | カウ<br>ツメ | ヒム<br>ツメ | 藻類<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期        | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌<br>土 | 壤<br>土 | 塘<br>壌<br>土 | 塘<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上<br>の注意                  |     |
|--------------------------------|----------|------------------|----|------|-----------------|-----|----|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|--|-------------|----------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------------|-----------------------------|-----|
| Ⅶ-1<br>17. SL-496○<br><br>ジャンボ | 土壌<br>処理 | 北海道              |    |      |                 |     |    |          |          |         |          |          |                |  | +3 ~ デ11.5L | 25x4<br>g/a    |             |        |             |        | 2               | (7)<br>(17)<br>(45)<br>(47) |     |
|                                |          | 東北               |    | ●1.5 | ●               | ●始  |    |          |          |         |          |          |                |  |             |                |             |        | ●           | ●      |                 |                             |     |
|                                |          | 北陸               |    | ●1.5 | ●               | ●始  |    |          |          |         |          |          |                |  |             |                |             |        | ●           | ●      |                 |                             |     |
|                                |          | 関東<br>・東山<br>・東海 | 早  |      |                 |     |    |          |          |         |          |          |                |  |             |                |             |        |             |        |                 |                             | 1.5 |
|                                |          |                  | 普  | ●1.5 | ●               | ●始  | ●始 |          |          |         |          |          |                |  |             |                |             |        |             | ●      | ●               |                             |     |
|                                |          | 近畿<br>・中国        | 早  |      |                 |     |    |          |          |         |          |          |                |  |             |                |             |        |             |        |                 |                             |     |
|                                |          |                  | 普  | ●1.5 | ●               | ●始  | ●始 | ●始       |          |         |          |          |                |  |             |                |             |        |             | ●      | ●               |                             |     |
|                                |          | 四国               | 早  |      |                 |     |    |          |          |         |          |          |                |  |             |                |             |        |             |        |                 |                             |     |
|                                |          |                  | 普  | ●1.5 | ●               | ●始  | ●始 | ●始       |          |         |          |          |                |  |             |                |             |        |             |        | ●               | ●                           |     |
|                                |          | 九州               | 早  |      |                 |     |    |          |          |         |          |          |                |  |             |                |             |        |             |        |                 |                             |     |
|                                |          |                  | 普  | ●1.5 | ●               | ●2  | ●2 | ●始       |          |         |          |          |                |  |             |                |             |        |             |        | ●               | ●                           | 1   |

|                                   | 処理法              | 地域名                      | 作期 | デI   | 一年<br>広葉<br>マツバ | オウイ | ウカ | ミカ | ハラ | カウ | カウ | ヒム | 藻類<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期        | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌<br>土 | 壤<br>土 | 植<br>壌<br>土 | 塩<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上<br>の注意                  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------|----|------|-----------------|-----|----|----|----|----|----|----|----------------|--|-------------|----------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| VII- 1<br>18. SL-498⊕<br><br>ジャンボ | 土<br>壌<br>処<br>理 | 北海道                      |    | ●1.5 | ●               | ●始  | ●始 |    | ●始 |    |    | ●始 | ●前             |  | +3 ~ デ11.5L | 25x4<br>g/a    | ●1.5        | ●      | ●           | ●      | 2               | (7)<br>(17)<br>(45)<br>(47) |  |  |  |  |  |
|                                   |                  | 東北                       |    |      |                 |     |    |    |    |    |    |    |                |  |             |                |             |        |             |        |                 |                             |  |  |  |  |  |
|                                   |                  | 北陸                       |    |      |                 |     |    |    |    |    |    |    |                |  |             |                |             |        |             |        |                 |                             |  |  |  |  |  |
|                                   |                  | 関東<br>・東<br>山<br>・東<br>海 | 早  |      |                 |     |    |    |    |    |    |    |                |  |             |                |             |        |             |        |                 |                             |  |  |  |  |  |
|                                   |                  |                          | 普  |      |                 |     |    |    |    |    |    |    |                |  |             |                |             |        |             |        |                 |                             |  |  |  |  |  |
|                                   |                  | 近畿<br>・中国                | 早  |      |                 |     |    |    |    |    |    |    |                |  |             |                |             |        |             |        |                 |                             |  |  |  |  |  |
|                                   |                  |                          | 普  |      |                 |     |    |    |    |    |    |    |                |  |             |                |             |        |             |        |                 |                             |  |  |  |  |  |
|                                   |                  | 四国                       | 早  |      |                 |     |    |    |    |    |    |    |                |  |             |                |             |        |             |        |                 |                             |  |  |  |  |  |
|                                   |                  |                          | 普  |      |                 |     |    |    |    |    |    |    |                |  |             |                |             |        |             |        |                 |                             |  |  |  |  |  |
|                                   |                  | 九州                       | 早  |      |                 |     |    |    |    |    |    |    |                |  |             |                |             |        |             |        |                 |                             |  |  |  |  |  |
|                                   |                  |                          | 普  |      |                 |     |    |    |    |    |    |    |                |  |             |                |             |        |             |        |                 |                             |  |  |  |  |  |



## VII-1 つづき

|                             | 処理法  | 地域名      | 作期 | 元I   | 一年広葉マツバ | オウゴン | ミナツツ | ヘラツツ | カクイ | オウゴン | ヒメツツ | 落類表層剥離 |  | 処理時期        | 使用量・製品      | 砂壌土 | 壤土 | 植土 | 植土 | 減水深<br>cm/d | 使用上の注意                                  |
|-----------------------------|------|----------|----|------|---------|------|------|------|-----|------|------|--------|--|-------------|-------------|-----|----|----|----|-------------|-----------------------------------------|
| VII-1<br>19. SL-498<br>ジャンボ | 土壌処理 | 北海道      |    |      |         |      |      |      |     |      |      |        |  | +3 ~ 元I. 5L | 25x4<br>g/a |     |    |    |    |             | 2<br>(7)<br>(8)<br>(17)<br>(45)<br>(47) |
|                             |      | 東北       |    | ●1.5 | ●       | ●始   | ●始   | ●始   |     |      |      | ●前     |  |             |             |     |    | ●  | ●  |             |                                         |
|                             |      | 北陸       |    | ●1.5 | ●       | ●始   |      |      |     |      |      |        |  |             |             |     | ●  | ●  | ●  |             |                                         |
|                             |      | 関東・東山・東海 | 早  |      |         |      |      |      |     |      |      |        |  |             |             |     |    |    |    |             |                                         |
|                             |      |          | 普  |      |         |      |      |      |     |      |      |        |  |             |             |     |    |    |    |             |                                         |
|                             |      | 近畿・中国    | 早  |      |         |      |      |      |     |      |      |        |  |             |             |     |    |    |    |             |                                         |
|                             |      |          | 普  | ●1.5 | ●       | ●始   | ●始   | ●始   |     |      |      |        |  |             |             |     | ●  | ●  | ●  |             |                                         |
|                             |      | 四国       | 早  |      |         |      |      |      |     |      |      |        |  |             |             |     |    |    |    |             |                                         |
|                             |      |          | 普  | ●1.5 | ●       | ●始   | ●始   | ●始   |     |      |      |        |  |             |             |     | ●  | ●  | ●  |             |                                         |
|                             |      | 九州       | 早  |      |         |      |      |      |     |      |      |        |  |             |             |     |    |    |    |             |                                         |
|                             |      |          | 普  |      |         |      |      |      |     |      |      |        |  |             |             |     |    |    |    |             |                                         |

VII-1  
20. SL-500 ジャンボ 「継」

|                                  | 処理法  | 地域名      | 作期 | 元I   | 一年広葉マツバ | オウゴン | ウツカ | ミナツツ | ヘラツツ | カクイ | オウゴン | ヒメツツ | 落類表層剥離 |         | 処理時期        | 使用量・製品      | 砂壌土 | 壤土 | 植土 | 植土 | 減水深<br>cm/d | 使用上の注意       |  |  |
|----------------------------------|------|----------|----|------|---------|------|-----|------|------|-----|------|------|--------|---------|-------------|-------------|-----|----|----|----|-------------|--------------|--|--|
| VII-1<br>21. SW-918㊥<br><br>ジャンボ | 土壌処理 | 北海道      |    | ●1.5 | ●       | ●始   | ●始  |      | ●始   |     |      | ●始   | ●前     | ●切再生前へ始 | +3 ~ 元I. 5L | 50x2<br>g/a |     | ●  | ●  | ●  | 2           | (45)<br>(47) |  |  |
|                                  |      | 東北       |    | ●1.5 | ●       | ●始   | ●始  | ●始   | ●始   |     |      |      |        |         |             |             |     |    | ●  | ●  | 1           |              |  |  |
|                                  |      | 北陸       |    |      |         |      |     |      |      |     |      |      |        |         |             |             |     |    |    |    |             |              |  |  |
|                                  |      | 関東・東山・東海 | 早  |      |         |      |     |      |      |     |      |      |        |         |             |             |     |    |    |    |             |              |  |  |
|                                  |      |          | 普  |      |         |      |     |      |      |     |      |      |        |         |             |             |     |    |    |    |             |              |  |  |
|                                  |      | 近畿・中国    | 早  |      |         |      |     |      |      |     |      |      |        |         |             |             |     |    |    |    |             |              |  |  |
|                                  |      |          | 普  |      |         |      |     |      |      |     |      |      |        |         |             |             |     |    |    |    |             |              |  |  |
|                                  |      | 四国       | 早  |      |         |      |     |      |      |     |      |      |        |         |             |             |     |    |    |    |             |              |  |  |
|                                  |      |          | 普  |      |         |      |     |      |      |     |      |      |        |         |             |             |     |    |    |    |             |              |  |  |
|                                  |      | 九州       | 早  |      |         |      |     |      |      |     |      |      |        |         |             |             |     |    |    |    |             |              |  |  |
| 普                                |      |          |    |      |         |      |     |      |      |     |      |      |        |         |             |             |     |    |    |    |             |              |  |  |

|                             | 処理法  | 地域名      | 作期 | 元I   | 一年広葉マツバ | オウゴン | ウラボシ | ミナツツ | ヘラツツ | カクイ | オウゴン | ヒメツツ | 落類表層剥離 |             | 処理時期        | 使用量・製品 | 砂壌土 | 壤土   | 植土 | 植土 | 減水深<br>cm/d                  | 使用上の注意 |   |     |
|-----------------------------|------|----------|----|------|---------|------|------|------|------|-----|------|------|--------|-------------|-------------|--------|-----|------|----|----|------------------------------|--------|---|-----|
| VII-1<br>22. SW-918<br>ジャンボ | 土壌処理 | 北海道      |    |      |         |      |      |      |      |     |      |      |        | +3 ~ 元I. 5L | 50x2<br>g/a |        |     |      |    |    | (26)<br>(28)<br>(45)<br>(47) |        |   |     |
|                             |      | 東北       |    |      |         |      |      |      |      |     |      |      |        |             |             |        |     |      |    |    |                              |        |   |     |
|                             |      | 北陸       |    | ●1.5 | ●       | ●始   | ●始   | ●始   |      |     |      |      |        |             |             |        |     | ●    | ●  | ●  |                              | 1.5    |   |     |
|                             |      | 関東・東山・東海 | 早  |      |         |      |      |      |      |     |      |      |        |             |             |        |     |      |    |    |                              |        |   | 2   |
|                             |      |          | 普  | ●1.5 | ●       | ●始   | ●始   | ●始   |      |     |      |      |        |             |             |        |     | ●1.5 | ●  | ●  | ●                            | ●      |   |     |
|                             |      | 近畿・中国    | 早  |      |         |      |      |      |      |     |      |      |        |             |             |        |     |      |    |    |                              |        |   | 1.5 |
|                             |      |          | 普  | ●1.5 | ●       | ●始   | ●始   | ●始   |      |     |      |      |        |             |             |        |     |      |    | ●  | ●                            | ●      | ● |     |
|                             |      | 四国       | 早  |      |         |      |      |      |      |     |      |      |        |             |             |        |     |      |    |    |                              |        |   |     |
|                             |      |          | 普  | ●1.5 | ●       | ●始   | ●始   | ●始   |      |     |      |      |        |             |             |        |     |      |    |    | ●                            | ●      | ● |     |
|                             |      | 九州       | 早  |      |         |      |      |      |      |     |      |      |        |             |             |        |     |      |    |    |                              |        |   | 2   |
| 普                           | ●1.5 |          | ●  | ●2   | ●2      | ●始   |      |      |      |     |      |      |        |             |             |        | ●   | ●    | ●  | ●  |                              |        |   |     |

VII-1  
23. TH-913ADS① ジャンボ 「継」

## VII-2 初・中期一発処理剤

|                                 | 処理法     | 地域名      | 作期 | 元I   | 一年広葉マリン | オリーブ | ウレシ | ミカド | ハナハ | 知カ | ハナハ | ヒルシ  | 藻類表層剥離 | 処理時期        | 使用量・製品      | 砂壌土 | 壤土 | 植壌土 | 減水深<br>cm/d | 使用上の注意 |                      |
|---------------------------------|---------|----------|----|------|---------|------|-----|-----|-----|----|-----|------|--------|-------------|-------------|-----|----|-----|-------------|--------|----------------------|
| VII-2<br>1.DPX-84SC<br><br>ジャンボ | 茎葉兼土壌処理 | 北海道      |    | ●2.5 | ●       | ●2   | ●2  |     | ●2  |    |     | ●発生期 |        | +5 ~ 元12.5L | 60x2<br>g/a |     | ●  | ●   | ●           | 2      | (28)<br>(45)<br>(47) |
|                                 |         | 東北       |    |      |         |      |     |     |     |    |     |      |        |             |             |     |    |     |             |        |                      |
|                                 |         | 北陸       |    |      |         |      |     |     |     |    |     |      |        |             |             |     |    |     |             |        |                      |
|                                 |         | 関東・東山・東海 | 早  |      |         |      |     |     |     |    |     |      |        |             |             |     |    |     |             |        |                      |
|                                 |         |          | 普  |      |         |      |     |     |     |    |     |      |        |             |             |     |    |     |             |        |                      |
|                                 |         | 近畿・中国    | 早  |      |         |      |     |     |     |    |     |      |        |             |             |     |    |     |             |        |                      |
|                                 |         |          | 普  |      |         |      |     |     |     |    |     |      |        |             |             |     |    |     |             |        |                      |
|                                 |         | 四国       | 早  |      |         |      |     |     |     |    |     |      |        |             |             |     |    |     |             |        |                      |
|                                 |         |          | 普  |      |         |      |     |     |     |    |     |      |        |             |             |     |    |     |             |        |                      |
|                                 |         | 九州       | 早  |      |         |      |     |     |     |    |     |      |        |             |             |     |    |     |             |        |                      |
|                                 |         |          | 普  |      |         |      |     |     |     |    |     |      |        |             |             |     |    |     |             |        |                      |

|                             | 処理法     | 地域名      | 作期 | 元I   | 一年広葉マリン | オリーブ | ウレシ | ミカド | ハナハ | 知カ | ハナハ | ヒルシ  | 藻類表層剥離 | 処理時期      | 使用量・製品   | 砂壌土  | 壤土 | 植壌土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意               |
|-----------------------------|---------|----------|----|------|---------|------|-----|-----|-----|----|-----|------|--------|-----------|----------|------|----|-----|----------|----------------------|
| VII-2<br>2.DPX-84SC<br>ジャンボ | 茎葉兼土壌処理 | 北海道      |    |      |         |      |     |     |     |    |     |      |        | +5 ~ 元12L | 60x2 g/a |      |    |     | 1        | (34)<br>(45)<br>(47) |
|                             |         | 東北       |    |      |         |      |     |     |     |    |     |      |        |           |          |      |    |     |          |                      |
|                             |         | 北陸       |    | ●2   | ●       | ●2   | ●2  | ●2  |     |    |     |      |        |           |          |      | ●  | ●   |          |                      |
|                             |         | 関東・東山・東海 | 早  |      |         |      |     |     |     |    |     |      |        |           |          |      |    |     |          |                      |
|                             |         |          | 普  | ●2.5 | ●       | ●2   | ●2  | ●2  |     |    |     |      |        |           |          |      |    |     |          |                      |
|                             |         | 近畿・中国    | 早  | ●2.5 | ●       | ●2   | ●2  | ●2  |     |    |     | ●発生期 |        |           |          | -1.5 | ●  | ●   |          |                      |
|                             |         |          | 普  | ●2.5 | ●       | ●2   | ●2  | ●2  |     |    |     | ●発生期 | ●前     |           |          |      | ●  | ●   |          |                      |
|                             |         | 四国       | 早  | ●2.5 | ●       | ●2   | ●2  | ●2  |     |    |     | ●発生期 |        |           |          |      |    |     |          |                      |
|                             |         |          | 普  | ●2.5 | ●       | ●2   | ●2  | ●2  |     |    |     |      | ●前     |           |          |      | ●  | ●   |          |                      |
|                             |         | 九州       | 早  |      |         |      |     |     |     |    |     |      |        |           |          |      |    |     |          |                      |
|                             |         |          | 普  |      |         |      |     |     |     |    |     |      |        |           |          |      |    |     |          |                      |

|                            | 処理法     | 地域名      | 作期 | 元I   | 一年広葉マリン | オリーブ | ウレシ | ミカド | ハナハ | 知カ | ハナハ | ヒルシ  | 藻類表層剥離 | 処理時期        | 使用量・製品   | 砂壌土  | 壤土 | 植壌土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意                       |
|----------------------------|---------|----------|----|------|---------|------|-----|-----|-----|----|-----|------|--------|-------------|----------|------|----|-----|----------|------------------------------|
| VII-2<br>3.DPX-84T<br>ジャンボ | 茎葉兼土壌処理 | 北海道      |    | ●2.5 | ●       | ●2   | ●2  |     | ●2  |    |     | ●発生期 | ●前     | +5 ~ 元12.5L | 50x2 g/a | ●    | ●  | ●   | 2        | (26)<br>(28)<br>(45)<br>(47) |
|                            |         | 東北       |    | ●2.5 | ●       | ●2   | ●2  | ●2  |     |    |     | ●発生期 |        |             |          | -1.5 | ●  | ●   |          |                              |
|                            |         | 北陸       |    |      |         |      |     |     |     |    |     |      |        |             |          |      |    |     |          |                              |
|                            |         | 関東・東山・東海 | 早  |      |         |      |     |     |     |    |     |      |        |             |          |      |    |     |          |                              |
|                            |         |          | 普  |      |         |      |     |     |     |    |     |      |        |             |          |      |    |     |          |                              |
|                            |         | 近畿・中国    | 早  |      |         |      |     |     |     |    |     |      |        |             |          |      |    |     |          |                              |
|                            |         |          | 普  |      |         |      |     |     |     |    |     |      |        |             |          |      |    |     |          |                              |
|                            |         | 四国       | 早  |      |         |      |     |     |     |    |     |      |        |             |          |      |    |     |          |                              |
|                            |         |          | 普  |      |         |      |     |     |     |    |     |      |        |             |          |      |    |     |          |                              |
|                            |         | 九州       | 早  |      |         |      |     |     |     |    |     |      |        |             |          |      |    |     |          |                              |
|                            |         |          | 普  |      |         |      |     |     |     |    |     |      |        |             |          |      |    |     |          |                              |

|                                  | 処理法     | 地域名      | 作期     | 元<br>広葉マツバ | オシロイ | ウチカ | ミヅカサ | ヘラタネ | カサノイ | ワカサ  | ヒメシロ | 落葉層剥離 | 処理時期       | 使用量・製品      | 砂<br>壤土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の注意                               |   |   |
|----------------------------------|---------|----------|--------|------------|------|-----|------|------|------|------|------|-------|------------|-------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|--------------------------------------|---|---|
| VII-2<br>4.DPX<br>-84TDQ<br>ジャンボ | 茎葉兼土壤処理 | 北海道      |        |            |      |     |      |      |      |      |      |       | +5 ~ 元2.5L | 50x2<br>g/a |         |        |        |        | 1.5             | (26)<br>(28)<br>(34)<br>(45)<br>(47) |   |   |
|                                  |         | 東北       |        |            |      |     |      |      |      |      |      |       |            |             |         |        |        |        |                 |                                      |   |   |
|                                  |         | 北陸       | ●2.5 ● | ●2         | ●2   | ●2  |      |      |      |      |      |       |            |             |         |        | ●      | ●      |                 |                                      | ● |   |
|                                  |         | 関東・東山・東海 | 早      |            |      |     |      |      |      |      |      |       |            |             |         |        |        |        |                 |                                      |   |   |
|                                  |         |          | 普      | ●2.5 ●     | ●2   | ●2  | ●2   |      |      |      |      |       |            |             |         |        |        | ●      | ●               |                                      | ● | 1 |
|                                  |         | 近畿・中国    | 早      |            |      |     |      |      |      |      |      |       |            |             |         |        |        |        |                 |                                      |   |   |
|                                  |         |          | 普      | ●2.5 ●     | ●2   | ●2  | ●2   |      |      |      |      | ●前    |            |             |         |        |        | ●      | ●               |                                      | ● |   |
|                                  |         | 四国       | 早      |            |      |     |      |      |      |      |      |       |            |             |         |        |        |        |                 |                                      |   |   |
|                                  | 普       | ●2.5 ●   | ●2     | ●2         | ●2   |     |      |      |      | ●前   |      |       |            | ●           | ●       | ●      |        |        |                 |                                      |   |   |
| 九州                               | 早       |          |        |            |      |     |      |      |      |      |      |       |            |             |         |        |        | 1.5    |                 |                                      |   |   |
|                                  | 普       | ●2.5 ●   | ●2     | ●2         | ●2   |     |      |      |      | ●発生期 |      |       |            | ●           | ●       | ●      |        |        |                 |                                      |   |   |

|                              | 処理法     | 地域名      | 作期 | 1年<br>広葉<br>マコバ | ササユイ | ウカワ | ミヤヅメ | ヘラレタケ | ウツクシイ | ヒメハダ | 藻類<br>表層剥離 |  | 処理時期        | 使用量・<br>製品  | 砂<br>壤土 | 埴<br>土 | 植<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上<br>の注意                            |
|------------------------------|---------|----------|----|-----------------|------|-----|------|-------|-------|------|------------|--|-------------|-------------|---------|--------|--------|-----------------|---------------------------------------|
| Ⅶ-2<br>5.NC-311R<br><br>ジャンボ | 茎葉兼土壌処理 | 北海道      |    |                 |      |     |      |       |       |      |            |  | +5 ~ ヲ12.5L | 50x2<br>g/a |         |        |        |                 | 1<br><br>(28)<br>(34)<br>(45)<br>(47) |
|                              |         | 東北       |    |                 |      |     |      |       |       |      |            |  |             |             |         |        |        |                 |                                       |
|                              |         | 北陸       |    | ●2.5 ●          | ●2   | ●2  | ●2   |       |       |      |            |  |             |             |         | ●      | ●      |                 |                                       |
|                              |         | 関東・東山・東海 | 早  |                 |      |     |      |       |       |      |            |  |             |             |         |        |        |                 |                                       |
|                              |         |          | 昔  | ●2.5 ●          | ●2   | ●2  | ●2   |       |       |      |            |  |             |             |         | ●      | ●      |                 |                                       |
|                              |         | 近畿・中国    | 早  |                 |      |     |      |       |       |      |            |  |             |             |         |        |        |                 |                                       |
|                              |         |          | 昔  |                 |      |     |      |       |       |      |            |  |             |             |         |        |        |                 |                                       |
|                              |         | 四国       | 早  |                 |      |     |      |       |       |      |            |  |             |             |         |        |        |                 |                                       |
|                              |         |          | 昔  |                 |      |     |      |       |       |      |            |  |             |             |         |        |        |                 |                                       |
|                              |         | 九州       | 早  |                 |      |     |      |       |       |      |            |  |             |             |         |        |        |                 |                                       |
|                              | 昔       |          |    |                 |      |     |      |       |       |      |            |  |             |             |         |        |        |                 |                                       |

[illegible]



## 使用上の注意一覧表

- (1) 低気温及び低水温は葉害の危険性があるので使用はさける。
- (2) 処理後2日以内に低温や降雨が予想される場合は使用をさける。
- (3) ごく浅植えの場合、葉害のおそれがあるので注意する。
- (4) 移植後の深水はさける。
- (5) 深水での処理はさける。
- (6) 散布は水稻になるべくかからないようにする。
- (7) 著しい高温条件下のときは、砂壤土ではクロロシスの発生が著しいので注意する。
- (8) トリアジン系除草剤の使用上の注意を守る。
- (9) MCP混合剤の注意事項を守る。
- (10) 処理後の灌水は48～72時間経過後に行なう。
- (11) 処理後2日以内に降雨が予想される場合は使用をさしひかえる。
- (12) 落水もしくは浅水で使用する。
- (13) ミズガヤツリの多い水田では早めに散布する。
- (14) ミズガヤツリに対し遅い処理では、400g/a を処理する。
- (15) ホタルイ、ミズガヤツリ優先圃場では、400g/a で処理する。
- (16) ホタルイ多発田では早めに使用する。
- (17) 泥炭質土壌では、ウリカワに対する効果が低下することがある。
- (18) コナギ多発田では早めに処理する。
- (19) 一年生広葉雑草多発田では400g/a とし、特にヒメミソハギが多発する水田での使用は避ける。
- (20) クログワイ防除はクログワイに有効な前処理剤との組合せで使用する。
- (21) 前処理剤との組合せで使用する。
- (22) 稀釈水量は出来るだけ少く茎葉に付着するように散布する。
- (23) ノリ面散布は避ける。
- (24) 流入、飛散等による水稻への葉害に注意する。
- (25) 周辺の作物に飛散しないように注意する。
- (26) 植付精度不良で根が露出する水田では使用しない。
- (27) ホタルイ多発田では、ホタルイに有効な中・後期剤との組合せで使用する。
- (28) 著しい多雨条件では除草効果が低下する場合があるので使用はさしひかえる。
- (29) コウキヤガラに有効な中・後期剤との組合せで使用する。
- (30) 水稻が水面に抽出してから使用する。
- (31) 短小苗、深水条件での使用は避ける。
- (32) クログワイ防除はクログワイに有効な後期剤との組合せで使用する。
- (33) 広葉多発田での使用はさける。
- (34) 田植前に生育したミズガヤツリは、完全に防除してから使用する。
- (35) マツバイ多発田での使用はさける。
- (36) コウキヤガラ防除は、コウキヤガラに有効な剤との組合せで使用する。
- (37) クログワイ防除の場合、同一成分含有薬剤を初期剤として使用しないこと。
- (38) オモダカ防除は、オモダカに有効な剤との組合せで使用する。
- (39) ミズガヤツリ防除は、ミズガヤツリに有効な前処理剤との組合せで使用する。
- (40) シズイ防除は、シズイに有効な剤との組合せで使用する。
- (41) 散布後24時間以内から1日50mm以上の降雨が連続することが予想される場合は使用を差し控える。
- (42) クログワイ防除はクログワイに有効な剤との組合せで使用する。
- (43) エゾノサヤヌカグサ防除はエゾノサヤヌカグサに有効な剤との組合せで使用する。
- (44) クサネムが残草または後発生した場合は有効な後期剤を散布する。
- (45) 水深5～6cmの湛水条件で投入する。
- (46) 移植前処理は田面水が澄んでから投入する。
- (47) 藻類または表層剥離の発生しやすい水田では有効な剤との体系で使用する。