

新 登 録 除 草 剤 一 覧

農林水産省農薬園芸局植物防疫課

平成5年9月1日～平成7年1月31日

(1) 移植水稻

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
シメタメトリン・ヒラゾレート・フ・レチラクロール・フ・ロモフ・チト・粒剤	スラッシュ粒剤	既登録薬剤と同じ									北興化学工業(株)
ヒラゾレート・フ・ロモフ・チト・メフエナセット粒剤	リート・ツツ粒剤	既登録薬剤と同じ									(株)アグロス
ヒラゾールスルフロニエチル・メフエナセット粒剤	アクト1キロ粒剤	エチル=5-(4,6-ジメトキシヒラシチン-2-イルカルハ)モイリスルフロニエチル-1-メチルヒラゾール-4-カルホキシレート・・・0.3% 2-ヘンソチアゾール-2-イルホキシ-N-メチルアセトニリト・・・10.0%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ・イ、ネタノイ、ウリカワ、ミヌカ・ヤフリ、ヘラオモタ、カ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層剥離	北海道 東北・北陸・関東以西の普通栽培地帯	壤土～埴土 減水深2cm/日以下 但し近畿以西は減水深1cm/日以下	移植後10日～20日(ノビエ2.5薬期まで) 移植後5日～15日(ノビエ2.5薬期まで)	1kg	湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 ヒラゾールスルフロニエチルを含む農薬の総使用回数1回 メフエナセットを含む農薬の総使用回数2回以内	日産化学工業(株) ・日本ハイレックロム(株) ・八洲化学工業(株) ・三笠化学工業(株)
ヘンソルフロニエチル・ヘンチオカーフ・メフエナセット粒剤	ウルフェース1キロ粒剤75	メチル=α-(4,6-ジメトキシヒラシチン-2-イルカルハ)モイリスルフロニエチル)-o-トリアートS-(4-クロルヘンソチアゾール)-N,N-ジエチルチオカーハ・メイト・・・15.0% 2-ヘンソチアゾール-2-イルホキシ-N-メチルアセトニリト・・・4.5%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ・イ、ネタノイ、ウリカワ、ミヌカ・ヤフリ、ヘラオモタ、カ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層剥離	北海道 東北	壤土～埴土 減水深2cm/日以下	移植後5日～15日(ノビエ2.5薬期まで)	1kg	湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 ヘンソルフロニエチルを含む農薬の総使用回数2回以内 ヘンチオカーフを含む農薬の総使用回数1回 メフエナセットを含む農薬の総使用回数2回以内	クミアイ化学工業(株) ・デュポン・シ・ハ・ンリミット・日本ハイレックロム(株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
ヘンネルフロンメチル・ヘンチホカール・メフェナセト粒剤	ウルフェース11粒剤51	メチル=α-(4,6-ジメトキシヒンジ)シ-2-イルカルハチモリスルファエイル)-オートルート・・・0.51% S-(4-クロルヘンシ)ル)-N,N-ジエチルチオカールハチメイト・・・15.0% 2-ヘンチアゾール-2-イルオキシ-N-メチルアセトニトリ・・・3.0%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ、イ、オタノイ、ウリカワ、ミス、カヤヅリ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、アモミ、ロ・藻類による表層剥離	関東以西の普通期栽培地帯	砂壤土～埴土 減水深2cm/日以下	移植後5日～10日 (ノビエ2葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 ヘンネルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内 ヘンチホカールを含む農薬の総使用回数1回 メフェナセトを含む農薬の総使用回数2回以内	クミイ化学工業(株)・デューン・シ・ハ・ン・リミテッド・日本ハ・イ・ル・ク・ロ・ケム(株)
タイムロン・ヘンネルフロンメチル・メフェナセト粒剤	サークD11粒剤51	1-(α,α-ジメチルヘンシ)ル)-3-(ハ・トリル)尿素・・・4.5% メチル=α-(4,6-ジメトキシヒンジ)シ-2-イルカルハチモリスルファエイル)-オートルート・・・0.51% 2-ヘンチアゾール-2-イルオキシ-N-メチルアセトニトリ・・・10.0%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ、イ、オタノイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ミス、カヤヅリ、オモダカ、クロクワイ、セリ、アモミ、ロ・藻類による表層剥離	北陸・関東以西の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～埴土 減水深2cm/日以下	移植後5～15日 (ノビエ2.5葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 タイムロンを含む農薬の総使用回数2回以内 ヘンネルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内 メフェナセトを含む農薬の総使用回数2回以内	三共(株)・九州三共(株)・日本ハ・イ・ル・ク・ロ・ケム(株)・デューン・シ・ハ・ン・リミテッド・クミイ化学工業(株)
ヘンネルフロンメチル・メフェナセト粒剤	サーク11粒剤75	メチル=α-(4,6-ジメトキシヒンジ)シ-2-イルカルハチモリスルファエイル)-オートルート・・・0.75% 2-ヘンチアゾール-2-イルオキシ-N-メチルアセトニトリ・・・10.0%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ、イ、オタノイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ミス、カヤヅリ、オモダカ	北海道 東北	埴土～埴土 減水深2cm/日以下	移植後5～20日 (ノビエ2.5葉期まで) 移植後5～15日 (ノビエ2.5葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 ヘンネルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内 メフェナセトを含む農薬の総使用回数2回以内	三共(株)・北海三共(株)・日本ハ・イ・ル・ク・ロ・ケム(株)・デューン・シ・ハ・ン・リミテッド・クミイ化学工業(株)

新刊 日本原色カメムシ図鑑

友国雅章／監修 安永智秀・高井幹夫・
山下 泉・川村 満・川澤哲夫／著
A5判 定価9,300円(税込)

斑点米を引き起こすことでよく知られているカメムシ。本書はその生きた姿を鮮明なカラー写真で紹介した新しいタイプの図鑑。後半には農業害虫としての側面を解説。

全国農村教育協会

〒110 東京都台東区台東1-26-6(植調会館)
Tel.03-3833-1821 Fax.03-3833-1665

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適用地 帯	適用 土壌	使用時期	10a 当り 使用量	使用方法	登録会社
ビ'ラソ'スル フロンエチル・ブ レチクロール 粒剤	ライザ'-1キロ 粒剤20	エチル=5-(4,6-ジ'メ トキシビ'リミシ'ン-2-イ ルカルハ'モイルスルファモイ ル)-1-メチルビ'ラソ'- ル-4-カルホ'キシレート0.3% 2-クロロ-2',6'-ジ' エチル-N-(2-フ'ロホ' キシエチル)アセト'ニリト'6.0%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマワハ'イ、 ホタルイ、ウリカ ワ、ミス'ガ'ヤ ツリ、ヘラオモ タ'カ、ヒルムシ ロ、セリ、クロ ク'ワイ、アオミ ト'ロ・藻類 による表 層剥離	北海道	砂壤土 ～塩土 減水深 2cm/日 以下	移植後 5～15日 (ノ'ビエ 2葉期ま で)	1 k g	湛水散布 〔本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 ビ'ラソ'スルフ ロンエチル を含む農 薬の総使 用回数1回 ブ'レチクロール を含む農 薬の総使用 回数2回以内〕	日産化学 工業(株) ・日本チ ハ'カ'イ'キ'- (株)・石 原産業 (株)・大 塚化学 (株)
					水田一年 生雑草及 びマワハ'イ、 ホタルイ、ウリカ ワ、ミス'ガ'ヤ ツリ、ヘラオモ タ'カ、ヒルムシ ロ、セリ、クロ ク'ワイ、ホ タ'カ、アオミ ト'ロ・藻類 による表 層剥離	東北・ 北陸 関東・ 東山・ 東海の 普通期 及び早 期栽培 地帯		移植後 5～13日 (ノ'ビエ 2葉期ま で)			
ビ'ラソ'スル フロンエチル・ブ レチクロール 粒剤	ライザ'-1キロ 粒剤15	エチル=5-(4,6-ジ'シ' トキシビ'リミシ'ン-2-イ ルカルハ'モイルスルファモイ ル)-1-メチルビ'ラソ'- ル-4-カルホ'キシレート0.3% 2-クロロ-2',6'-ジ' エチル-N-(2-フ'ロホ' キシエチル)アセト'ニリト'4.5%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマワハ'イ、 ホタルイ、ウリカ ワ、ミス'ガ'ヤ ツリ、ヒルムシ ロ、セリ、アオミ ト'ロ・藻類 による表 層剥離	近畿以 西の普 通期栽 培地帯 近畿以 西の早 期栽培	砂壤土 ～塩土 減水深 2cm/日 以下 但し九 州の砂 壤土で は減水 深1.5 cm/日 以下	移植後 3～8日 (ノ'ビエ 1.5葉期 まで) 移植後 3～10日 (ノ'ビエ 1.5葉期 まで)	1 k g	湛水散布 〔本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 ビ'ラソ'スルフ ロンエチル を含む農 薬の総使 用回数1回 ブ'レチクロール を含む農 薬の総使用 回数2回以内〕	日産化学 工業(株) ・日本チ ハ'カ'イ'キ'- (株)・石 原産業 (株)・大 塚化学 (株)
ブ'レチクロール・ ヘ'ンスル フロンメチル粒 剤	ゴ'ルホ'1キロ 粒剤75	2-クロロ-2',6'-ジ' エチル-N-(2-フ'ロホ' キシエチル)アセト'ニリト'6.0% メチル=α-(4,6-ジ' メトキシビ'リミシ'ン-2- イルカルハ'モイルスルファモ イル)-o-ト'ルア'ート0.75%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマワハ'イ、 ホタルイ、ウリカ ワ、ミス'ガ'ヤ ツリ、ヘラオモ タ'カ、ヒルムシ ロ、セリ、クロ ク'ワイ、アオミ ト'ロ・藻類 による表 層剥離	北海道	砂壤土 ～塩土 砂壤土 では減 水深1.5 cm/日 以下 塩土～ 塩土で は減水 深2cm/日 以下	移植後 5～15日 (ノ'ビエ 1.5葉期 まで)	1 k g	湛水散布 〔本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 ブ'レチクロール を含む農 薬の総使用 回数2回以内 ヘ'ンスルフ ロンメチ ルを含む農 薬の総使用 回数2回以 内〕	武田薬品 工業(株) ・テ'ホ'ソ (株)・日 本チハ'カ'イ キ'-(株)
						東北	塩土～ 塩土 減水深 2cm/日 以下	移植後 5～15日 (ノ'ビエ 2葉期ま で)			

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用地帯	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
フ・レチクロール・ヘンズルフロンドル粒剤	コ・ルネ1粒剤51	2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(2-フ・ロネ・キシエチル)アセトアニリド6.0% メチル=α-(4,6-ジメトキシヒ・リミジ)ノ-2-イカルハ・モイヌスルファミル)-O-トメ7-ト0.51%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ・イ、ネグミ、ウリカワ、ミス・カヤ、ヘラモタ・カ、ヒムシロ、クワ、ワ、セリ、アミト・ロ・藻類による表層剥離	北陸・関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯	壤土～埴土 減水深2cm/日以下	移植後3～10日(ノビエ1.5葉期まで)	1kg	湛水散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数1回 フ・レチクロールを含む農薬の総使用回数2回以内 ヘンズルフロンドルを含む農薬の総使用回数2回以内〕	武田薬品工業(株)・デ・ホ・ン(株)・日本ハル・カ・イ・キ-(株)
ヒ・リフ・チカル・フ・フ・レチクロール乳剤	シンク・乳剤	0-3-tert-フ・チルフェニル=6-メトキシ-2-ヒ・リジ)ル(メチル)チオカルハ・マト.....12.0% 2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(2-フ・ロネ・キシエチル)アセトアニリド8.0%	乳剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ・イ、ネグミ、ミス・カヤ、ヘラモタ・カ(北海道)	全域の普通期及び早期栽培地帯(九州除く)	砂壤土～埴土 減水深2cm/日以下 但し早期栽培は減水深1cm/日以下	植代時～移植4日前まで	500ml	原液湛水散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数1回 ヒ・リフ・チカル・フ・レチクロールを含む農薬の総使用回数2回以内〕	三共(株)・九州三共(株)
エス・ロカル・フ・ヒ・ラソ・スルフロンドル粒剤	コントラクト1粒剤	S-ヘン・ジ)ル=1,2-ジメチル・ロヒ)ル(エチル)チオカルハ・マト.....21.0% エチル=5-(4,6-ジメトキシヒ・リミジ)ノ-2-イカルハ・モイヌスルファミル)-1-メチルヒ・ラソ・ル-4-カルホ・キシラト0.3%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ・イ、ネグミ、ウリカワ、ヒムシロ、ヘラモタ・カ、セリ、アミト・ロ・藻類による表層剥離	北海道	砂壤土～埴土 減水深2cm/日以下	移植後5～20日(ノビエ2.5葉期まで)	1kg	湛水散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数1回 エス・ロカル・フ・ヒ・ラソを含む農薬の総使用回数1回 ヒ・リフ・チカル・フ・レチクロールを含む農薬の総使用回数1回〕	日産化学工業(株)・セ・ホ・ン(株)・石原産業(株)・塩野義製薬(株)
					水田一年生雑草及びマツハ・イ、ネグミ、ウリカワ、ミス・カヤ、ヘラモタ・カ、セリ(九州除く)、クワ、ワ、ヘラモタ・カ、アミト・ロ・藻類による表層剥離(東北)	東北・北陸・関東以西の普通期及び早期栽培地帯		移植後5～15日(ノビエ2.5葉期まで)			

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 地 用 帯	適 用 壤	使用時期	10a 当り 使用量	使用方法	登録会社
ビ'リフ'チカル ブ'・ヘ'ンスル フロシメチル水 和 剤	カルショットフ ロフ'ル	0-3-tert-フ'チル フェニル=6-メトキシ-2- ヒ'リシ'ル(メチル)チオカ ルハ'マート...12.0% メチル=α-(4,6-ジ' メトキシヒ'リシ'ン-2- イカルハ'モイェスルファ イェル)-o-トルア'ト ...1.4%	水 和 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマワ'イ、 ネタルイ、ウリカ ワ、ミズ'カ'ヤ ワリ、ヘラオモ タ'カ、ヒルムシ ロ、セリ、アオミ ト'ロ・藻類 による表 層剥離	北海道 ・東北	壤土～ 塩土 減水深 2cm/日 以下	移植後 3～10日 (ノビエ 1.5葉期 まで)	500ml	原液湛水散布 〔本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 ビ'リフ'チカルブ' を含む農薬 の総使用回 数1回 ヘ'ンスルフロシメ チルを含む農 薬の総使用 回数2回以 内〕	三共(株) ・北海三 共(株)・ デ'ュキ'ン (株)
ビ'リフ'チカル ブ'・ヘ'ンスル フロシメチル水 和 剤	カルショットフ ロフ'ル	0-3-tert-フ'チル フェニル=6-メトキシ-2- ヒ'リシ'ル(メチル)チオカ ルハ'マート...12.0% メチル=α-(4,6-ジ' メトキシヒ'リシ'ン-2- イカルハ'モイェスルファ イェル)-o-トルア'ト ...1.0%	水 和 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマワ'イ、 ネタルイ、ウリカ ワ、ミズ'カ'ヤ ワリ、ヘラオモ タ'カ、ヒルムシ ロ、セリ、アオミ ト'ロ・藻類 による表 層剥離	北陸 関東・ 東山・ 東海・ 近畿・ 中国・ 四国の 普通期 及び早 期栽培 地帯 九州の 普通期 及び早 期栽培 地帯	壤土～ 塩土 減水深 2cm/日 以下 砂壤土 ～塩土 減水深 2cm/日 以下 但し早 期は 1cm/日 以下 砂壤土 ～塩土 減水深 1.5 cm/日 以下	移植後 3～10日 (ノビエ 1.5葉期 まで)	500ml	原液湛水散布 〔本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 ビ'リフ'チカルブ' を含む農薬 の総使用回 数1回 ヘ'ンスルフロシメ チルを含む農 薬の総使用 回数2回以 内〕	三共(株) ・九州三 共(株)・ デ'ュキ'ン (株)
エスフ'ロカル ブ'・シ'メタメ トリン・ヒ'ラ ゾ'スルフロシ チル・フ'レチラ クロール粒 剤	スハ'ーカス タ'キロ粒 剤	S-ヘ'ンシ'ル=1,2- ジ'メチルフ'ロヒ'ル(エチ ル)チオカルハ'マート ...15.0% 2-メチルチオ-4-エチルア ミノ-6-(1,2-ジ'メチ ルフ'ロヒ'ルアミノ)-s- トリアジ'ン...0.6% エチル=5-(4,6-ジ'メ トキシヒ'リシ'ン-2-イ カルハ'モイェスルファ イェル)-1-メチルヒ'ラゾ'- ル-4-カルホ'キシラ'ト ...0.3% 2-クロロ-2',6'-ジ' エチル-N-(2-フ'ロホ' キシエチル)アセトア'ニト' ...4.5%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマワ'イ、 ネタルイ、ウリカ ワ、ヘラオモ タ'カ、ヒルムシ ロ、セリ、アオミ ト'ロ・藻類 による表層 剥離 水田一年 生雑草及 びマワ'イ、 ネタルイ、ウリカ ワ、ミズ'カ'ヤ ワリ、ヘラオモ タ'カ、クロク ワ、イモタ'カ 、ヒルムシロ、 タ'ス'イ(東北)、セリ(九 州を除く)、 アオミト'ロ・ 藻類による 表層剥離 九州の 普通期 及び早 期栽培	北海道 東北・ 北陸・ 関東以 西(九 州を除 く)の 早期栽 培地帯 関東以 西(九 州を除 く)の 普通期 栽培地 帯 九州の 普通期 及び早 期栽培	壤土～ 塩土 減水深 2cm/日 以下 砂壤土 ～塩土 減水深 2cm/日 以下 壤土～ 塩土 減水深 1.5 cm/日 以下	移植後 10～20日 (ノビエ 2.5葉期 まで) 移植後 5～15日 (ノビエ 2.5葉期 まで)	1kg	湛水散布 〔本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 エスフ'ロカルブ' を含む農薬 の総使用回 数1回 シ'メタメトリン を含む農薬 の総使用回 数2回以内 ヒ'ラゾ'スルフロ シチルを含む 農薬の総使 用回数1回 フ'レチラクロ ールを含む農 薬の総使用 回数2回以内〕	日産化学 工業(株) ・日本チ ハ'カ'イキ' (株)・ セ'キ(株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地域	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
フ・レチクロール粒剤	ソルネット110粒剤	2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(2-フルオロエチル)アセトアニリド4.0%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ、オタノイ、ヘラオモタ、カ、ミス、カ、ヤブ	北海道・東北・北陸・関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯	壤土～埴土 減水深2cm/日以下 但し、北海道・東北・北陸では砂埴土 減水深1cm/日以下を含む	植代後～移植前4日又は移植直後～移植後5日 (ノビエ1葉期まで) 移植後に使用する除草剤との体系で使用する	1kg	湛水散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数1回 フ・レチクロールを含む農薬の総使用回数2回以内〕	日本チンカ、イキ（株）・クミアイ化学工業（株）・武田薬品工業（株）
エスア・ロカルブ・ヘ・ンズルフロノメチル粒剤	フジク・ラス1キロ粒剤75	S-ヘンシル=1,2-ジメチルフルロビル（エチル）チオカルハート21.0% メチル=α-(4,6-ジメトキシヒ）リミジノ-2-イルカルハート0.75%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ、オタノイ、ウリカ、ミス、カ、ヤブ（東北）、ヘラオモタ、カ、クロク、ワ（東北）、ヒルムシロ、セリ、アモト、ロ・藻類による表層剥離	北海道 東北	壤土～埴土 減水深2cm/日以下	移植後5～20日（ノビエ2.5葉期まで） 移植後5～15日（ノビエ2.5葉期まで）	1kg	湛水散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数1回 エスア・ロカルブを含む農薬の総使用回数1回 ヘ・ンズルフロノメチルを含む農薬の総使用回数2回以内〕	日本農薬（株）・セキ（株）・テ（株）
エスア・ロカルブ・ヘ・ンズルフロノメチル粒剤	フジク・ラス1キロ粒剤51	S-ヘンシル=1,2-ジメチルフルロビル（エチル）チオカルハート21.0% メチル=α-(4,6-ジメトキシヒ）リミジノ-2-イルカルハート0.51%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ、オタノイ、ウリカ、ミス、カ、ヤブ、ヒルムシロ、セリ、アモト、ロ・藻類による表層剥離	北陸及び関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯 近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯及び九州の普通期栽培地帯	壤土～埴土 減水深2cm/日以下 埴土～埴土 減水深1cm/日以下	移植後5～15日（ノビエ2.5葉期まで）	1kg	湛水散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数1回 エスア・ロカルブを含む農薬の総使用回数1回 ヘ・ンズルフロノメチルを含む農薬の総使用回数2回以内〕	日本農薬（株）・セキ（株）・テ（株）

芝生の造成と管理 — 芝草管理者のために —

眞木芳助／編集

B5判 定価20,000円(税込)

環境保全のための資源として芝生の需要が増している。本書は芝生の造成から管理にいたる芝生づくりのすべてをゴルフ場の例を中心に分かりやすく解説。

全国農村教育協会

〒110 東京都台東区台東1-26-6(植調会館)
Tel.03-3833-1821 Fax.03-3833-1665

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
イマツ・スルフロ ン・エス・ロカ ル・タ・イ ム・ロ・ン 粒剤	ゴ・サイン粒 剤	1-(2-クロロイミダゾ [1,2-a]ピリジン- 3-イルスルホニル)-3-(4,6-ジ・メトキシピリミ ジン-2-イル)尿素 ・・・0.3% S-ベンゾチン・ル=1,2- ジ・メチル・ロビ・ル(エチ ル)チオカルハ・マート ・・・7.0% 1-(α,α-ジ・メチルハ ンジ・ル)-3-(ハ・テトリ ル)尿素・・・5.0%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツハ・イ、 ネタリイ、ウリカ ワ、ミス・カ・ヤ ブ、ヘラオモ タ・カ(北海 道、東北) ヒムシロ、セリ (九州を 除く)、ア ミ・ト・ロ・漢 類による 表層剥離	北海道	壤土～ 塩土 減水深 2cm/日 以下 但し砂 壤土で は減水深 1.5 cm/日 以下	移植後 10～15日 (ノビエ 2.5薬期 まで)	3 k g	湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 イマツ・スルフロ ンを含む農薬 の総使用回 数2回以内 エス・ロカル を含む農薬 の総使用回 数1回 タ・イムロンを 含む農薬の 総使用回数 2回以内	武田薬品 工業(株) ・セ・ネ (株)・エス ・チ・エ・エ ス・ハ・イ・テ ・大塚化 学(株)・ (株)ア・ロ ス
						東北・ 北陸	壤土～ 塩土 減水深 2cm/日 以下	移植後 5～15日 (ノビエ 2.5薬期 まで)			
						関東・ 東山・ 東海・ 九州の 普通期 栽培地 帯	壤土～ 塩土 減水深 1.5 cm/日 以下				
						関東・ 東山・ 東海・ 九州の 早期裁 培地帯	砂壤土 ～塩土 減水深 1cm/日 以下				
						近畿・ 中国・ 四国の 普通期 及び早 期栽培 地帯	壤土～ 塩土 減水深 1cm/日 以下				
イマツ・スルフロ ン・ジ・メタメ リン・タ・イム ン・フ・レチラ ク・ロ・ル 粒剤	ハ・テ粒剤	1-(2-クロロイミダゾ [1,2-a]ピリジン- 3-イルスルホニル)-3-(4,6-ジ・メトキシピリミ ジン-2-イル)尿素 ・・・0.3% 2-メチルチオ-4-エチル ミノ-6-(1,2-ジ・メ チル・ロビ・ル7ミノ)- 6-トリアジン・・・・0.2% 1-(α,α-ジ・メチルハ ンジ・ル)-3-(ハ・テトリ ル)尿素・・・5.0% 2-クロロ-2',6'-ジ エチル-N-(2-フ・ロホ キシエチル)アセト・ニ リト・ ・・・1.5%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツハ・イ、 ネタリイ、ウリカ ワ、ミス・カ・ヤ ブ、ヘラオモ タ・カ(北海 道、東北、 北陸)、ヒ ムシロ、セ リ、アミ・ ト・ロ・漢 類による 表層剥離	北海道 東北・ 北陸	壤土～ 塩土 減水深 2cm/日 以下	移植後 3～10日 (ノビエ 1.5薬期 まで)	3 k g	湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 イマツ・スルフロ ンを含む農薬 の総使用回 数2回以内 ジ・メタメリン を含む農薬 の総使用回 数2回以内 フ・レチラク ロ・ルを含む 農薬の総 使用回数 2回以内	武田薬品 工業(株) ・(株)エス ・チ・エ・エ ス・ハ・イ・テ ・日本チ ・ハ・カ・イ・ (株)・ト (株)・モ・ リ・カ・明 治製薬 (株)
						関東・ 東山・ 東海・ 九州の 普通期 栽培地 帯	砂壤土 ～塩土 減水深 1cm/日 以下				
						関東・ 東山・ 東海・ 九州の 普通期 及び 近畿・ 中国・ 四国の 早期裁 培地帯	壤土～ 塩土 減水深 1cm/日 以下				

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
イマゾスルフロン・タ・イムロン・メフェナセト粒剤	ハートル粒剤	1-(2-クロロイミダゾール[1,2-a]ピリジン-3-イルスルホニル)-3-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イル)尿素・・・0.3% 1-(4,6-ジメチルヘンソリル)-3-(ハートル)尿素・・・5.0% 2-ヘンソリチアゾール-2-イルオキシ-N-メチル7セトニリト・・・3.5%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ・イ、ネグサシ、ウリカワ、ミズカキワ、ヘラオモダカ(北海道)、ヒメシロ、セリ(九州除く)、アザミ、ロ、藻類による表層剥離(東北・北陸を除く)	北海道	砂壤土～埴土 減水深2cm/日以下 但し砂壤土では減水深1.5cm/日以下	移植後10～20日(ノビエ2.5葉期まで)	3kg	湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 イマゾスルフロンを含む農薬の総使用回数2回以内 タ・イムロンを含む農薬の総使用回数2回以内 メフェナセトを含む農薬の総使用回数2回以内	武田薬品工業(株)・(株)エス・デー・エス・ハ・イ・エ・エ・日本ハ・イ・エル・ア・ロ・ム(株)・北興化学工業(株)
						東北・北陸	埴土～埴土 減水深2cm/日以下	移植後5～15日(ノビエ2.5葉期まで)			
						関東・東山・東海・近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	砂壤土～埴土 減水深1.5cm/日以下				
						関東・東山・東海・近畿・中国・四国の早期栽培地帯	埴土～埴土 減水深1cm/日以下				
						九州の普通期栽培地帯	埴土～埴土 減水深1cm/日以下				
						九州の早期栽培地帯	砂壤土～埴土 減水深1cm/日以下				

新刊 日本原色植物ダニ図鑑

江原昭三／編集

A5判 定価13,000円(税込)

微少で判別の困難な代表種といえる植物ダニ。本書は代表種88種をカラー写真と形態図・記載により解説した判別図鑑。農業上被害の大きいハダニについては、別項を設け解説。

全国農村教育協会

〒110 東京都台東区台東1-26-6(植調会館)
Tel.03-3833-1821 Fax.03-3833-1665

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
イマゾスルフロン・タ・イムロン・ヒ・リフ・チカル・水和剤	アワート・フロア・アル	1-(2-クロロイミダゾール[1,2-a]ピリジン-3-イルスルホニル)-3-(4,6-ジメトキシピリジン-2-イル)尿素1.7% 1-(α,α-ジメチルヘンジル)-3-(ヘキサトリル)尿素.....27.5% 0-3-tert-ブチルフェニル-6-メトキシ-2-ヒ・リフ・チカル(メチル)チオカルハート.....12.0%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ・イ、ネタリ、ウリカワ、ミス・カヤツリ、ヘラモタカ(北海道、東北、北陸)、ネタカ(関東、東山、東海)、ヒルムシロ(北海道、東北、関東、東山、東海)、セリ(九州を除く)、アミ・ロ・藻類による表層剥離(北海道)	北海道・東北・北陸・関東・東山・東海の普通期栽培地帯 近畿・中国・四国の普通期栽培地帯 近畿・中国・四国の早期栽培地帯 九州の普通期栽培地帯	壤土～埴土 減水深2cm/日以下 砂壤土～埴土 減水深1.5cm/日以下 埴土～埴土 減水深1cm/日以下 埴土～埴土 減水深1.5cm/日以下	移植直後～移植後10日(ノビエ1.5薬期まで)	500ml	原液湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 イマゾスルフロンを含む農薬の総使用回数2回以内 タ・イムロンを含む農薬の総使用回数2回以内 ヒ・リフ・チカルを含む農薬の総使用回数1回	武田薬品工業(株)・(株)エス・ディー・エス・ハ・イ・オ・テック
テニクロール・ヘ・ンスルフロン・メチル水和剤	タシメツ・フロア・アル	2-クロロ-N-(3-メトキシ-2-フェニル)-2',6'-ジメチルアセトアニト5.0% メチル=α-(4,6-ジメトキシピリジン-2-イル)カルハート・モイリスルファモイル)-オ・ト・ア1.4%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ・イ、ネタリ、ウリカワ、ミス・カヤツリ(東北)、ヘラモタカ、クロ・グ・ワイ(東北)、オモタカ(東北)、ヒルムシロ、セリ(東北)、藻類による表層剥離	北海道 東北	壤土～埴土 減水深2cm/日以下 砂壤土～埴土 減水深2cm/日以下	移植後5～13日(ノビエ1.5薬期まで) 移植後5～15日(ノビエ2薬期まで)	500ml	原液湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 テニクロールを含む農薬の総使用回数2回以内 ヘ・ンスルフロンを含む農薬の総使用回数2回以内	北興化学工業(株)・日本農薬(株)・テ・キ・ン(株)・徳山曹達(株)

水田雑草の生態と防除 — 水稻作の雑草と除草剤解説 —

宮原益次／著

A5判 定価3,090円(税込)

水田雑草の発生特性、雑草害について著者40年の知見を網羅。さらに水田における合理的で省力的・低コストの雑草防除について解説。

全国農村教育協会

〒110 東京都台東区台東1-26-6(植調会館)
Tel.03-3833-1821 Fax.03-3833-1665

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物・場所	適用雑草	適用地帯	適用環境	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
テニクロール・ヘ'ンスルフロンメチル水和剤	クシメップフロ77'ル	2-クロロ-N-(3-メトキシ-2-テニル)-2',6'-ジ'メチル7セ7ニリト'.....5.0% メチル=α-(4.6-ジ'メトキシビ'リミシ'ン-2-イ'ルカルハ'モイ'スルフロネイ'ル)-オ'トル7-ト'.....1.0%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ'イ、ネ'タルイ、ウリカワ、ミス'カ'ヤブ、ヒルムシロ(関東、東山、東海、九州の普通期栽培地帯)、モ'タ'オ(北陸)、モ'リ(九州除く)、7'オミ'ロ・深類による表層剥離(関東、東山、東海の普通期栽培地帯)	北陸	壤土～壇土 減水深2cm/日以下	移植後5～15日(ノビエ2葉期まで)	500ml	原液湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 テニクロールを含む農薬の総使用回数2回以内 ヘ'ンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内	北興化学工業(株)・日本農薬(株)・テ'ニ'ン(株)・徳山曹達(株)
						関東・東山・東海の普通期栽培地帯	壇壤土～壇土 減水深1cm/日以下	移植後5～10日(ノビエ1.5葉期まで)			
						近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	砂壤土～壇土 減水深1.5cm/日以下	移植後5～13日(ノビエ2葉期まで)			
						近畿・中国・四国の早期栽培地帯	壇土～壇土 減水深1cm/日以下				
						九州の普通期栽培地帯	壇土～壇土 減水深1.5cm/日以下				
ビ'フェノキサ・ヒ'リ'ア'チカル7'・7'ロセ7'チ'ト'水和剤	レトリ77'ロ7'ル	5-(2,4-ジ'クロ7エ'キシ)-2-ニ'トロ安息香酸メチル.....1.0% 0-3-tert-7'チル7'エニル=6-メトキシ-2-ヒ'リ'シ'ル(メチル)チ'オカルハ'マ'ート.....10.0% (RS)-2-7'ロセ-N-(α,α-ジ'メチルハ'ンジ'ル)-3,3-ジ'メチル7'チル7'ミ'ト'.....12.0%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ'イ、ネ'タルイ	北海道・東北・北陸・関東以西(九州除く)の普通期栽培地帯及び関東・東山・東海の早期栽培地帯	砂壤土～壇土 減水深2cm/日以下	移植直後～10日(ノビエ1.5葉期まで)	500ml	原液湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 ビ'フェノキサを含む農薬の総使用回数2回以内 ヒ'リ'ア'チカル7'を含む農薬の総使用回数1回 7'ロセ7'チ'ト'を含む農薬の総使用回数1回	大日本イ'ナ'キ化学工業(株)・(株)7'ク'ロ'ス・日産化学工業(株)・北興化学工業(株)・ロ'ス7'7'ー7'ン7'ク'ロ'(株)
						九州の普通期栽培地帯及び近畿以西の早期栽培地帯	壇土～壇土 減水深1cm/日以下				

— 40 —

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使用時期	10a 当り 使用量	使用方法	登録会社
シメトリン・ヘ ソフレート・M CPB粒剤	サ・ヘ・ックス SM粒剤	2-メチル-4,6-ジ ス(エチルアミノ)-s-トリ アジン・・・・1.5% 2,3-ジ・ヒド・ロ-3,3 -ジ・メチルヘ・ソ・フリン -5-イル=エタノール・ネー ト・・・・2.0% 2-メチル-4-クロロフェノ キシ酸エチル ・・・0.8%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツハ・イ、 ネタノイ、ウリカ ワ、ヘラオモタ カ、ヒルムシロ、 エソ・ノササカ ク・サ	北海道	砂壤土 ～塩土 減水深 1.5 cm/日 以下	移植後 20～25日 (ノビエ 2.5薬期 まで 移植前後 の初期除 草剤による 土壌処理 との体系 で使用する)	3kg	湛水敷布 〔本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 シメトリンを含 む農薬の総 使用回数 2回以内 ヘ・ソフレートを含 む農薬の総 使用回数 2回以内 MCPBエチルを 含む農薬の 総使用回数 2回以内〕	日本シェー リ・ンク(株)
					水田一年 生雑草及 びマツハ・イ、 ネタノイ、ウリカ ワ、ミス・カ・ヤ フリ、ヘラオモ タ・カ、オモタ カ、クロク・ワイ 、シス・イ(東 北)	東北・ 北陸	塩土 ～塩土 減水深 1.5 cm/日 以下				
					水田一年 生雑草及 びマツハ・イ、 ネタノイ、ウリカ ワ、ミス・カ・ヤ フリ、オモタ・カ 、クロク・ワイ	関東・ 東山・ 東海の 早期及 び普通 栽培地 帯	砂壤土 ～塩土 減水深 2cm/日 以下				
シ・メ・ト・ヘ・レ ート・ヘ・ン・ス・ル フロノメチル・ ヘ・ソフレート 粒剤	レイン・シャ ー・粒剤 25	S-1-メチル-1-フェニル エチル=ヒ・ヘ・リジン・N-1 -カルボキチレート ・・・5.0% メチル=α-(4,6-ジ・メ トシヒ・リジン・N-2-イ ルカルハ・モイルスルファミ ル)-O-トルアート ・・・0.25% 2,3-ジ・ヒド・ロ-3,3 -ジ・メチルヘ・ソ・フリン -5-イル=エタノール・ネー ト・・・・1.5%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツハ・イ、 ネタノイ、ウリカ ワ、ヘラオモタ カ、ミス・カ・ヤ フリ、ヒルムシロ 、セリ、クロク ・ワイ(東北) 、アミト・ロ・ 藻類によ る表層剥 離、エソ・ノサ サカク・サ (北海道)	北海道	塩土～ 塩土 減水深 2cm/日 以下	移植後 10～20日 (ノビエ 2.5薬期 まで)	3kg	湛水敷布 〔本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 シ・メ・ト・ヘ・レ ートを含む農 薬の総使用 回数1回 ヘ・ソフレートを含 む農薬の総 使用回数 2回以内 ヘ・ソフレートを含 む農薬の 総使用回数 2回以内〕	日本シェー リ・ンク(株)・ 北興化学 工業(株)・ ・デ・ユ・ネ・フ (株)・ロー ヌ・フ・ラン 油化ア・ク・ロ (株)
						東北		移植後 5～15日 (ノビエ 2.5薬期 まで)			

植 調 協 会 だ よ り

◎ 会議開催日程のお知らせ ・平成7年度農薬(作物・土壌・水中)残留分析委員会予定表

開 催 月 日	委員会名	会 場
平成7年4月19日(水)	第1回 水 中	日植防会議室
20日(木)	第1回 作 物	日植防会議室
6月6日(火)	第1回 土 壌	日植調会議室
8日(木)	第2回 作 物	日植調会議室
7月20日(木)	第3回 作 物	日植防会議室
9月19日(火)	第2回 土 壌	日植防会議室
21日(木)	第4回 作 物	日植防会議室
10月18日(水)	第2回 水 中	日植調会議室

開 催 月 日	委員会名	会 場
平成7年11月16日(木)	第5回 作 物	日植調会議室
12月21日(木)	第6回 作 物	日植調会議室
	第3回 土 壌	日植調会議室
平成8年2月14日(水)	第3回 水 中	日植防会議室
15日(木)	第7回 作 物	日植防会議室
3月5日(火)	第4回 土 壌	日植防会議室
7日(木)	第8回 作 物	日植防会議室

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
ジ'メビ'ヘ'レート・ヘ'ンスルフロメチル・ヘ'ンフレート粒剤	レイソジ'ヤ-粒剤17	S-1-メチル-1-フェニルエチル=ヒ'ヘ'リジ'ン-1-カルホ'チオア-ト5.0% メチル=α-(4,6-ジ'メトキシヒ'リミジ'ン-2-イルカルハ'モイルスルファモイル)-o-トルア-ト0.17% 2,3-ジ'ヒト'ロ-3,3-ジ'メチルヘ'ンソ'フレン-5-イル=エタンスルホネ-ト1.5%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ'イ、ネタ'イ、ウリカワ、ミス'カ'ヤワリ、ヒルムシロ(北陸を除く)、セリ、アミト'ロ・藻類による表層剥離	北陸・関東以西の早期栽培地帯	壤土～埴土 減水深2cm/日以下	移植後5～15日(ノビエ2.5薬期まで)	3kg	湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 ジ'メビ'ヘ'レートを含む農薬の総使用回数1回 ヘ'ンスルフロメチルを含む農薬の総使用回数2回以内 ヘ'ンフレートを含む農薬の総使用回数2回以内	日本シェーリング(株)・北興化学工業(株)・テ'ュホ'ン(株)・ローヌ・フ'ーラン油化ア'グロ(株)
ジ'メタメトリン・ヒ'ラソ'レート・フ'レチラクロール・ヘ'ンフレート粒剤	クリネス粒剤15	2-メチルチオ-4-エチルアミノ-6-(1,2-ジ'メチルフ'ロヒ'ルア'ミノ)-s-トリアジ'ン.....0.2% 4-(2,4-ジ'クロロヘ'ンソ'イル)-1,3-ジ'メチル-5-ヒ'ラソ'リル-p-トルエンスルホネ-ト8.0% 2-クロロ-2',6'-ジ'エチル-N-(2-フ'ロホ'キシエチル)アセトア'ニリト'.....1.5% 2,3-ジ'ヒト'ロ-3,3-ジ'メチルヘ'ンソ'フレン-5-イル=エタンスルホネ-ト1.5%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ'イ、ネタ'イ、ウリカワ、ヘ'ラソ'モク'カ、ヒルムシロ、エソ'ノサヤモク'サ、アミト'ロ・藻類による表層剥離	北海道	壤土～埴土 減水深1.5cm/日以下	移植後5～15日(ノビエ2薬期まで)	3kg	湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 ジ'メタメトリンを含む農薬の総使用回数2回以内 ヒ'ラソ'レートを含む農薬の総使用回数1回 フ'レチラクロールを含む農薬の総使用回数2回以内 ヘ'ンフレートを含む農薬の総使用回数2回以内	日本シェーリング(株)・三共(株)・北海三共(株)

植調協会だより

◎ 人事異動

・平成7年2月1日付

任	事務局 主事	畑 本 佳 美
任	事務局 主事	黒 澤 尚 子
命	事務局技術部長代理	山 崎 和 己
命	事務局技術部技術第二課長	立 野 篤 男
命	研究所特別研究チーム長	横 山 昌 雄

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
ジメタメトリン・ビラゾレート・フ・レチクロール・ヘンソフ・レシート粒剤	クリネス粒剤10	2-メチルチオ-4-エチル7ミノ-6-(1,2-ジメチル7ロビ"ル7ミノ)-s-トリアジソン・・・0.2% 4-(2,4-ジクロロヘンソ"イル)-1,3-ジメチル-5-ビラゾ"リル-p-トリスノルネート・・・4.0% 2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(2-7"ロホ"キシエチル)アセトア"リト"・・・・1.5% 2,3-ジ"ヒト"ロ-3,3-ジ"メチルヘンソ"フラン-5-イル=エタノールネート・・・・1.0%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ"イ、ネムシ"イ、ウリカワ、ミス"カ"ヤヅリ、ヘラモ"タ"カ、ヒルムシロ、アミ"ト"ロ・藻類による表層剥離	東北・北陸・関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯	壤土～埴土 減水深2cm/日以下	移植後3～10日(ノビエ2葉期まで)	3kg	湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 ジメタメトリンを含む農薬の総使用回数2回以内 ビラゾレートをを含む農薬の総使用回数1回 フ・レチクロールを含む農薬の総使用回数2回以内 ヘンソフ・レシートを含む農薬の総使用回数2回以内	日本シェリツク(株)・三共(株)・九州三共(株)
					水田一年生雑草及びマツハ"イ、ネムシ"イ、ウリカワ、ミス"カ"ヤヅリ、ヘラモ"タ"カ、ヒルムシロ、セリ(九州除く)、アミ"ト"ロ・藻類による表層剥離	近畿以西の普通期及び早期栽培地帯	壤土～埴土 減水深1.5cm/日以下				
					水田一年生雑草及びマツハ"イ、ネムシ"イ、ウリカワ、ミス"カ"ヤヅリ、ヘラモ"タ"カ	東北	壤土～埴土 減水深2cm/日以下	移植後5～20日(ノビエ2葉期まで移植前後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用する)			
ビラゾスルフロニエチル・ヘンソフ・レシート粒剤	イネセ"ット粒剤	エチル=5-(4,6-ジ"メトキシ"リミシ"ン-2-イルカルハ"モイルスルフォ"イ"ル)-1-メチルビラゾ"ール-4-カルボ"キシレート"・・・0.1% 2,3-ジ"ヒト"ロ-3,3-ジ"メチルヘンソ"フラン-5-イル=エタノールネート・・・・1.5%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草(イネ科を除く)及びマツハ"イ、ネムシ"イ、ウリカワ、ミス"カ"ヤヅリ、ヘラモ"タ"カ(東北、北陸)、ヒルムシロ(近畿以西除く)、クロク"ワイ、イモ"タ"カ	東北・北陸・関東以西の普通期栽培地帯	砂壤土～埴土 減水深2cm/日以下	移植後12～20日(移植前後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用する)	3kg	湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 ビラゾスルフロニエチルを含む農薬の総使用回数1回 ヘンソフ・レシートを含む農薬の総使用回数2回以内	日本シェリツク(株)・日産化学工業(株)
					水田一年生雑草(イネ科を除く)及びマツハ"イ、ネムシ"イ、ウリカワ、ミス"カ"ヤヅリ、ヒルムシロ(近畿以西を除く)	関東以西の早期栽培地帯					
ビラゾレート・フ・ロモフ"チ"ト粒剤	サリ"ト粒剤			既登録薬剤に同じ							(株)ア"ク"ロ"ス

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 用 地 帯	適 用 壤	使用時期	10a 当り 使用量	使用方法	登録会社
フ・レチクロロ ル・ヘ・ンツ・フ エナツ・水 和 剤	ユニハ・フ・プロ アツ・ル	2-クロロ-2',6'-ジ エチル-N-(2-プ ロキ シエチル)アセトアニリド5.0% 2-[4-(2,4-ジ クロ ロ-m-トリメ チル)-1,3 -ジ メチルピ ラゾ ール- 5-イミ ダゾ ール]-4'-メ チ ルアセ トフェ ニル20.0%	水 和 剤	移植水稻	水田一年 生雑草 及びマ ツハ・イ、 ネ タリイ、ウ リカ リ、ミ ス・カ・ヤ アリ、ヘ ラオモ タ・カ (北海 道・東北)	北海道 ・東北	壤土～ 埴土 減水深 2cm/日 以下	植代時～ 移植前4 日まで	500～ 750 ml	原液湛水散布 〔本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 フ・レチクロ ルを含む農 薬の総使用 回数2回以 内 ヘ・ンツ・フ エナツを含 む農薬の総 使用回数1 回〕	ロ・ヌ・フ・テ ン油化77 ロ(株)・ 日本チハ カ・イキ (株)・ 北興化学 工業(株)
						北陸・ 関東以 西の普 通期裁 培地帯 及び 関東・ 東山・ 東海 の早期 栽培地 帯	砂壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下				
						北海道 ・東北	埴土～ 埴土 減水深 2cm/日 以下	移植直後			
						北陸・ 関東以 西の普 通期裁 培地帯 及び 関東・ 東山・ 東海 の早期 栽培地 帯	砂壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下				
ACN剤	モカ・トシ・ヤ ンホ	2-アミノ-3-クロロ-1, 4-ナフトキノール・9.0%		移植水稻	アミト・ロ・ 藻類によ る表層剥 離	北海道 ・東北 ・北陸 ・関東 以西の 普通期 及び早 期栽培 地帯	埴土～ 埴土 減水深 2cm/日 以下	アミト・ロ・ 表層剥離 の発生時 但し収穫 90日前ま で	20個 (1kg)	水田に投げ入 れる 〔本剤及びAC Nを含む農 薬の総使用 回数1回〕	アタ・ロ・カネ ヨリ(株)
タ・イムロン・ ビ・リフ・チカル フ・ヘ・ンズル フロンメチル剤	カサトリ・シ・ヤ ンホ	1-(α,α-ジメチルヘ ンツ)-3-(ヘ・ナトリ ル)尿素.....6.0% 0-3-tert-ブチル フェニル-6-メトキシ-2- ヒ・リシ・ル(メチル)チカ ルハ・マート.....7.0% メチル-α-(4,6-ジメ トキシヒ リシ)-2-イ ムロンハ モイリス ル)-o-トル アール0.75%		移植水稻	水田一年 生雑草 及びマ ツハ・イ、 ネ タリイ、ウ リカ リ、ミ ス・カ・ヤ アリ、ヘ ラオモ タ・カ、ヒ ルムシ ロ、セリ	北海道	砂壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下 但し砂 壤土で は減水深 1.5 cm/日 以下	移植後 3～10日 (ノビエ 1.5葉期 まで)	小包装 (パック) 20個(1kg)	水田に小包装 (パック)のまま 投げ入れる 〔本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 タ・イムロン を含む農薬 の総使用回 数2回以内 ヒ・リフ・チ カルフを含 む農薬の総 使用回数1 回 ヘ・ンズル フロンメ チルを含む 農薬の総使 用回数2回 以内〕	三共(株) ・大日本 イキ化学 工業(株)
						東北	埴壤土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下				

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 地 用 帯	適 用 土 壌	使用時期	10a 当り 使用量	使用方法	登録会社
タムロン・ ビリアン プロンメチル剤	クサトリ-Lシ ンホ	1-(a, a'-ジ'メチルヘ ンシ'ル)-3-(8'ラトリ ル)尿素・・・4.5% 0-3-tert-7'チルア ニル=6-メトキシ-2- ヒ'リシ'ル(メチル)チカ ルハ'ート・・・6.0% メチル=α-(4,6-ジ'メ トキシヒ'リシ'ン)-2-イ ルカルハ'ート・・・0.51%		移植水稻	水田一年 生雑草及 びマブ'イ、 ネタ'イ、ウリカ ワ、ミス'カ'ヤ ワリ、ヒルムシ ロ、セリ	北陸 関東以 西の普 通期及 び関東 ・東山 ・東海 の早期 栽培地 帯	壤土～ 塩土 減水深 1.5 cm/日 以下 砂壤土 ～塩土 減水深 2cm/日 以下但し早 期栽培 では 減水深 1cm/日 以下	移植後 3～10日 (ノビエ 1.5葉期 まで)	小包装 (パック) 20個(1kg)	水田に小包装 (パック)のまま 投げ入れる 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 タムロンを含 む農薬の総 使用回数 2回以内 ビ'リフ'チカル ワ'を含む農 薬の総使用 回数1回 ヘ'ンスルプロ ンメチルを含 む農薬の総 使用回数 2回以内	三共(株) ・九州三 共(株)・ 大日本イ ンキ化学工 業(株)
テニクロール・ ビ'フェノックス 乳剤	7'レカット乳 剤	2-クロロ-N-(3-メトキ シ-2-テニル)-2',6'- ジ'メチルアセトアニリト' ・・・5.0% 5-(2,4-ジ'クロロフェ ニル)-2-ニトロ安息 香酸メチル・・・15.0%	乳 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマブ'イ、 ネタ'イ	北海道 ・東北 ・関東 以西の 普通期 及び早 期栽培 地帯 北陸	壤土～ 塩土 減水深 2cm/日 以下 砂壤土 ～塩土 減水深 2cm/日 以下	植代時～ 移植4日 前まで	500ml	原液湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 テニクロールを 含む農薬の 総使用回数 2回以内 ビ'フェノクス を含む農薬 の総使用回 数2回以内	北興化学 工業(株) ・ロネフ ・テラ油化 学(株)・ (株)トクヤマ
テニクロール・ ヘ'ンスルプロン メチル粒剤	クサメツ1キロ 粒剤75	2-クロロ-N-(3-メトキ シ-2-テニル)-2',6'- ジ'メチルアセトアニリト' ・・・2.7% メチル=α-(4,6-ジ'メ トキシヒ'リシ'ン)-2-イ ルカルハ'ート・・・0.75%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマブ'イ、 ネタ'イ、ウリカ ワ、ミス'カ'ヤ ワリ、ヘ'アミ ト'ロ・藻類 による表 層剥離	北海道 ・東北	壤土～ 塩土 減水深 2cm/日 以下	移植後 5～15日 (ノビエ 2葉期ま で)	1kg	湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 テニクロールを 含む農薬の 総使用回数 2回以内 ヘ'ンスルプロ ンメチルを含 む農薬の総 使用回数2回 以内	北興化学 工業(株) ・日本農 薬(株)・ (株)トクヤマ
テニクロール・ ヘ'ンスルプロン メチル粒剤	クサメツ1キロ 粒剤51	2-クロロ-N-(3-メトキ シ-2-テニル)-2',6'- ジ'メチルアセトアニリト' ・・・2.7% メチル=α-(4,6-ジ'メ トキシヒ'リシ'ン)-2-イ ルカルハ'ート・・・0.51%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマブ'イ、 ネタ'イ、ウリカ ワ、ヘ'アミ ト'ロ・藻類 による表 層剥離 水田一年 生雑草及 びマブ'イ、 ネタ'イ、ウリカ ワ、セリ、ミ ス'カ'ヤワリ、 ヒルムシ ロ、アミ ト'ロ・藻類 による表 層剥離 水田一年 生雑草及 びマブ'イ、 ネタ'イ、ミ ス'カ'ヤワリ	北陸 関東・ 東山・ 東海 の普通 期栽培 地帯 関東・ 東山・ 東海 の早期 栽培地 帯	砂壤土 ～塩土 減水深 2cm/日 以下 壤土～ 塩土 減水深 2cm/日 以下	移植後 5～15日 (ノビエ 2葉期ま で)	1kg	湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 テニクロールを 含む農薬の 総使用回数 2回以内 ヘ'ンスルプロ ンメチルを含 む農薬の総 使用回数2回 以内	北興化学 工業(株) ・日本農 薬(株)・ (株)トクヤマ

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適地	用土	用土	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
テニクロール・ヘンズルフロシメチル粒剤 つづき	クシメツ1キロ粒剤 51 つづき				水田一年生雑草及びマツハ ¹ イ、ネタルイ、ウリカワ、セリ、ミス ¹ カ ¹ ヤツリ、ヒルムシロ	近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯						
					水田一年生雑草及びマツハ ¹ イ、ネタルイ、ミス ¹ カ ¹ ヤツリ、ウリカワ	九州の普通期栽培地帯	壇塚土 ～壇土	減水深 1cm/日 以下				
ビ ¹ フェノックス・フ ¹ レチクロール乳剤	フ ¹ ロータ ¹ グ ¹ ス乳剤	5-(2,4-ジクロロフェニル)-2-ニトロ安息香酸メチル・・・20.0% 2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(2-フ ¹ ロホ ¹ キシエチル)アセトアニリド ¹ ・・・8.0%	乳剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ ¹ イ、ネタルイ、ミス ¹ カ ¹ ヤツリ	全域	砂塚土 ～壇土	減水深 2cm/日 以下	植代時～ 移植4日 前まで	500ml	原液湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 ビ ¹ フェノックスを含む農薬の総使用回数2回以内 フ ¹ レチクロールを含む農薬の総使用回数2回以内	日本 ¹ チ ¹ カ ¹ イ ¹ キ ¹ ・ローヌ・フ ¹ ラン ¹ 油化 ¹ フ ¹ ロ ¹ （株）・日産化学工業（株）・北興化学工業（株）
シメトリン・ヒ ¹ ラソ ¹ キシフェン・フ ¹ レチクロール粒剤	ワノールS1キロ粒剤 24	2-メチルチオ-4,6-ヒ ¹ ス(エチルアミノ)-S-トリ ¹ アジ ¹ ン・・・1.5% 2-[4-(2,4-ジクロロペンゾ ¹ イ ¹ ル)-1,3-ジ ¹ メチルヒ ¹ ラソ ¹ -ル-5-イ ¹ ルオキシ]アセトフェノ ¹ ン・・・24.0% 2-クロロ-2',6'-ジ ¹ エチル-N-(2-フ ¹ ロホ ¹ キシエチル)アセトアニリド ¹ ・・・4.5%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ ¹ イ、ネタルイ、ウリカワ、ヘラモタ ¹ カ ¹ 、ヒルムシロ、アミ ¹ ト ¹ ロ ¹ ・藻類による表層剥離	北海道	砂塚土 ～壇土	減水深 2cm/日 以下 但し砂塚土は減水深 1.5cm/日以下	移植直後～移植後 15日 (¹ ヒ ¹ エ ¹ 2 薬期まで)	1kg	湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 シメトリンを含む農薬の総使用回数2回以内 ヒ ¹ ラソ ¹ キシフェンを含む農薬の総使用回数1回 フ ¹ レチクロールを含む農薬の総使用回数2回以内	石原産業（株）・日本 ¹ チ ¹ カ ¹ イ ¹ キ ¹ （株）
シメトリン・ヒ ¹ ラソ ¹ キシフェン・フ ¹ レチクロール粒剤	ワノールS1キロ粒剤	2-メチルチオ-4,6-ヒ ¹ ス(エチルアミノ)-S-トリ ¹ アジ ¹ ン・・・1.5% 2-[4-(2,4-ジクロロペンゾ ¹ イ ¹ ル)-1,3-ジ ¹ メチルヒ ¹ ラソ ¹ -ル-5-イ ¹ ルオキシ]アセトフェノ ¹ ン・・・18.0% 2-クロロ-2',6'-ジ ¹ エチル-N-(2-フ ¹ ロホ ¹ キシエチル)アセトアニリド ¹ ・・・4.5%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ ¹ イ、ネタルイ、ウリカワ、ミス ¹ カ ¹ ヤツリ、ヘラモタ ¹ カ ¹ (東北)、ヒルムシロ(東北、近畿・中国・四国の早期)、アミ ¹ ト ¹ ロ ¹ ・藻類による表層剥離	東北	砂塚土 ～壇土	減水深 2cm/日 以下	移植直後～移植後 13日 (¹ ヒ ¹ エ ¹ 2 薬期まで)	1kg	湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 シメトリンを含む農薬の総使用回数2回以内 ヒ ¹ ラソ ¹ キシフェンを含む農薬の総使用回数1回 フ ¹ レチクロールを含む農薬の総使用回数2回以内	石原産業（株）・日本 ¹ チ ¹ カ ¹ イ ¹ キ ¹ （株）
						北陸	壇塚土 ～壇土	減水深 1cm/日 以下				
						関東・東山・東海の普通期栽培地帯	砂塚土 ～壇土	減水深 2cm/日 以下				
						関東・東山・東海の早期栽培地帯	砂塚土 ～壇土	減水深 1.5cm/日以下 但し砂塚土は減水深 1cm/日 以下				

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
シメトリン・ビラゾキシフェン・フ・レチラクロール粒剤つづき	ワノールS11粒剤つづき					近畿・中国・四国・早期栽培地帯	壤土～埴土 減水深1cm/日以下				
						近畿・中国・九州・普通期栽培地帯	砂壤土～埴土 減水深1.5cm/日以下				

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稲刈後・畑作・野菜作・永年生作物・非農耕地対象

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
イマザビリン・グリホシネート液剤	セローラス液剤	イマザビリン・グリホシネート = (RS)-2-(4-イマザビリン-4-メチル-5-オキソ-2-イミダゾリノ-2-イル)ニコチン酸12.5% グリホシネートDL-ホモエー ニフ-4-イル(メチル)ホス フィネート.....9.0%	液剤	鉄道・工場敷地・公園・堤とう・道路・運動場・宅地等	一年生雑草及び多年生雑草			雑草生育期	800～1200 ml 〔希釈水量 100～150 ℓ〕	雑草茎葉散布 本剤のみを使用する場合の使用回数2回以内 イマザビリンを含む農薬の総使用回数2回以内 グリホシネートを含む農薬の総使用回数3回以内	日産化学工業(株)
ヘンテメタリン・リニロン粉粒剤	カイクタ細粒剤 F	N-(1-エチルピロリジン)-3,4-ジメチル-2,6-ジニトロアニリン1.5% 3-(3,4-ジクロロフェニル)-1-メトキシ-1-メチル尿素.....1.0%	粉粒剤	小麦	畑地一年生雑草	関東以西	砂壤土～埴土	播種直後(雑草発生前)	5～6 kg	全面土壌散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 ヘンテメタリンを含む農薬の総使用回数1回 リニロンを含む農薬の総使用回数1回	日本農薬(株)・テュボ・ン・ジ・ハ・ン・リミテッド・日本サイファミット(株)
DCMU粉粒剤	クザクロン微粒剤	既登録薬剤に同じ									(株)フタロス
DCBN水和剤	ヘンホル水和剤・グラスタン水和剤	2,6-ジクロロベンザミド.....50.0%	水和剤	日本芝	ヒメクサスキナ			芝生育期(雑草生育初期～生育期)	1～2 kg 〔希釈水量 150～200 ℓ〕	散布 〔本剤及びDCBNを含む農薬の総使用回数1回以内〕	保土谷化学工業(株)・北興産業(株)
				公園・庭園・堤とう・駐車場・道路・運動場・宅地・鉄道等	スキナ			雑草生育初期～生育期		散布 〔本剤及びDCBNを含む農薬の総使用回数3回以内〕	
DCBN粒剤	ヘンホル粒剤・シハキーフ粒剤	2,6-ジクロロベンザミド.....4.0%	粒剤	日本芝	ヒメクサスキナ			芝生育期(雑草生育初期～生育期)	10～20 kg	全面均一散布 〔本剤及びDCBNを含む農薬の総使用回数1回以内〕	保土谷化学工業(株)・タタ・園芸(株)・レイノール薬品(株)
				公園・庭園・堤とう・駐車場・道路・運動場・宅地・鉄道等	スキナ			雑草生育初期～生育期		全面均一散布 〔本剤及びDCBNを含む農薬の総使用回数3回以内〕	

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 地 帯	適 土 壤	使用時期	10a 当り 使用量	使用方法	登録会社
ヒノリテート 水和剤	ヒノリテート 水和剤	既登録薬剤に同じ									アタロリソフ アタラヘミカ リソフヘミカ ム・ヘミカ
カルブチレート ・MDBA粒 剤	フインカム	3-(3,3-ジメチルクレ イト)フェニルエーテル 7-フルカハート4.0% 2-メトキシ-3,6-ジク ロ安息香酸1.5%	粒 剤	公園・堤 とう・駐 車場・道 路・運動 場・のり 面・宅地 ・鉄道等	一年生雑 草			雑草生育 初期	15 ~ 25 kg	全面均一散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数2回以内 カルブチレートを 含む農薬の 総使用回数 2回以内 MDBAを含む 農薬の総使 用回数3回 以内	(株)エス デー・エス ハ・イネック
アトラジン・テ トラビオン・D CMU・DPA 粒剤	トモスハークZ 粒剤・ノア グ粒剤・ ビュクアッ 180粒剤W ・タリソPP 粒剤・ス ハーク・セ スト粒剤・S	2-クロロ-4-エチルア ミノ-6-イソプロピル アミノ -s-トリアジン4.0% 2,2,3,3-テトラフル オロプロピル アミン.....1.5% 2-(3,4-ジクロロフェ ニル)-1,1-ジメチル尿 素.....6.0% 2,2-ジクロロプロ ピルアミン10.0%	粒 剤	公園・庭 園・堤と う・駐 車場・道 路・運動 場・宅地 ・鉄道等	一年生及 び多年生 雑草			雑草発生 前～生育 初期 (草丈 30cm以下)	8 ~ 10 kg	全面均一散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数2回以内 アトラジンを含 む農薬の総 使用回数 2回以内 DCMUを含む 農薬の総使 用回数3回 以内 DPAを含む 農薬の総使 用回数3回 以内	保土谷化 学工業 (株)・ (株)トモ リカ・フ マキ・ (株)・ 武田薬品 工業(株) ・大阪化 成(株)
メトスルホン メチル水和 剤	サーヘ・MDF	メチル=2-[3-(4-メ トキシ-6-メチル-1,3,5 -トリアジン-2-イル)ク レイト]スルホニルヘ ンゾート.....60.0%	水 和 剤	日本芝	一年生及 び多年生 広葉雑草			春期～夏 期 芝生育期 (雑草発 生始期 ～生育初 期) 秋期～冬 期 (雑草発 生始期 ～生育初 期)	1 ~ 2 g 〔希釈液量 150 ~ 200 ℓ〕 2 ~ 4 g 〔希釈液量 150 ~ 200 ℓ〕	雑草茎葉散布 本剤及びメ トスルホンメチルを 含む農薬の 総使用回数 2回以内	デー・ ン (株)・ 丸和ハ イネック (株)
カルブチレート ・MDBA水 和剤	フインカムフロ アール	3-(3,3-ジメチルクレ イト)フェニルエーテル 7-フルカハート43.0% 2-メトキシ-3,6-ジク ロ安息香酸シメ チルアミン.....8.5%	水 和 剤	公園・堤 とう・駐 車場・道 路・運動 場・のり 面・宅地 ・鉄道等	一年生及 び多年生 雑草			雑草生育 初期	1 ~ 2 ℓ 〔希釈水量 100 ℓ〕	全面均一散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数2回以内 カルブチレートを 含む農薬の 総使用回数 2回以内 MDBAを含む 農薬の総使 用回数3回 以内	(株)エス デー・エス ハ・イネック

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
ヘンチオール・ヘンチイメタリン・リニロン乳剤	クリアタン乳剤	S-(4-クロロベンジル)-N,N-ジエチルチオカハメート・・・50.0% N-(1-エチルプロピル)-3,4-ジメチル-2,6-ジニトロアニリン・・・5.0% 3-(3,4-ジクロロフェニル)-1-メトキシ-1-メチル尿素・・・7.5%	乳剤	だいず	畑地一年生雑草	北海道全域	全土壌(砂土除く)	播種直後(雑草発生前)	600 ～800 ml 〔希釈水量 70～100 ℓ〕	全面土壌散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数1回 ヘンチオール・ヘンチイメタリンを含む農薬の総使用回数1回 ヘンチイメタリンを含む農薬の総使用回数1回 リニロンを含む農薬の総使用回数1回〕	ミヤイ化学工業(株)・日本チアミッド(株)・デコボン(株)
ナフロハミト水和剤	ケレス水和剤	既登録薬剤に同じ									(株)アグロス
DCMU・DPA・2,4-PA水和剤	フルキア水和剤	既登録薬剤に同じ									(株)アグロス
DCMU水和剤	タイロンゾル	3-(3,4-ジクロロフェニル)-1,1-ジメチル尿素・・・50.0%	水和剤	水田畦畔	一年生雑草	北海道九州を除く全域		雑草発生前～生育初期(草丈15cm以下)	200～250 ml 〔希釈水量 100ℓ〕	茎葉兼土壌散布 〔本剤及びDCMUを含む農薬の総使用回数1回〕	保土谷化学工業(株)・北興化学工業(株)
ヒアリス液剤	クサノンスプレー	L-2-アミノ-4-[(ヒドロキシ)メチル]ピリジン-5-イル-1-ヒドロキシ-2-ナトリウム塩・・・0.4%	液剤	公園・庭園・堤とう・駐車場・運動場・宅地・のり面等	一年生及び多年生雑草			雑草生育期(草丈30cm以下)	50～100 ml/m ² (原液散布)	雑草茎葉散布 〔本剤及びヒアリスを含む農薬の総使用回数3回以内〕	武田薬品工業(株)
DCBN・DCMU・MDBA粉粒剤	クリーンセイフ・ネコサキZ・草一番・フマキラーHW微粒剤	2,6-ジクロロベンジルサミット・・・1.5% 3-(3,4-ジクロロフェニル)-1,1-ジメチル尿素・・・5.0% 2-メトキシ-3,6-ジクロロ安息香酸・・・1.5%	粉粒剤	公園・庭園・堤とう・駐車場・道路・運動場・宅地・鉄道等	一年生及び多年生広葉雑草			雑草発生前～生育初期(草丈20cm以下)	15～25 kg	全面均一散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数3回以内 DCBNを含む農薬の総使用回数3回以内 DCMUを含む農薬の総使用回数3回以内 MDBAを含む農薬の総使用回数3回以内〕	保土谷化学工業(株)・レインボウ薬品(株)・理研グリーン・フマキラー(株)
アトラジン・オカルベン・MCP水和水剤	クリアランサープロアツル	2-クロロ-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ-8-トリアジン・・・5.0% S-(2-クロロベンジル)-N,N-ジエチルチオカハメート・・・35.0% α-(2-メチル-4-クロロフェニル)プロピオン酸カルウム・・・10.0%	水和水剤	日本芝	一年生雑草及び多年生広葉雑草			雑草発生前～生育初期	1～1.5 ℓ 〔希釈水量 200～300 ℓ〕	全面均一散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数2回以内 アトラジンを含む農薬の総使用回数2回以内 オカルベンを含む農薬の総使用回数3回以内 MCPを含む農薬の総使用回数3回以内〕	(株)理研グリーン

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適地	用帯	適土	用環	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
ヒアテス液剤	セニコケタウAL	レ-2-7ミノ-4-[(ヒト)ロキシ](メチル)ホスフィン酸・ナトリウム塩・7...1.0%	液剤	公園・庭園・駐車場・宅地等	セニコケ					生育期	50~100 ml/m ²	散布	北興産業(株)
イマザキン・ベンチメタリン水和剤	オフロアブル	(RS)-2-(4-イソプロピル-4-メチル-5-オキソ-2-イミダゾリノ-2-イル)キノリン-3-カルボキサン酸...8.5% N-(1-エチル-7-ロビル)-3,4-ジメチル-2,6-ジニトロアニリン...36.0%	水和剤	日本芝(こうらいしば)	畑地一年生雑草					秋期～冬期 (雑草発生始期～生育期)	300~500 ml 〔希釈水量 200~250 ℓ〕	散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数1回 イマザキンを含む農薬の総使用回数3回以内 ベンチメタリンを含む農薬の総使用回数2回以内〕	日本サイファミット(株)
グリホサートイソプロピルアミン塩・MCPイソプロピルアミン塩液剤	グロフーン	イソプロピルアミノニウム=N-(ホスホメチル)グリホサート...34.0% 2-メチル-4-クロロフェノキシ酢酸イソプロピルアミン塩...6.5%	液剤	道路・鉄道・宅地・公園・運動場・堤とう・のり面等	一年生及び多年生雑草					雑草生育期	1~1.5 ℓ 〔希釈水量 50~100 ℓ〕	雑草茎葉散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数3回以内 グリホサートを含む農薬の総使用回数3回以内 MCPを含む農薬の総使用回数3回以内〕	日産化学工業(株)・日本モンサント(株)
イマザビル・テトラヒオン粒剤	ブッシュロン粒剤	イソプロピルアミノニウム=(RS)-2-(4-イソプロピル-4-メチル-5-オキソ-2-イミダゾリノ-2-イル)ニコチナート...1.2% 2,2,3,3-テトラフルオロ-7-ロビル-5-オン酸ナトリウム...3.0%	粒剤	ひのき(下刈り)	ササ、ススキ、雑草、かん木、一年生及び多年生雑草					春期又は秋期	8~10 kg 10~20	全面均一散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数1回 イマザビルを含む農薬の総使用回数2回以内 テトラヒオンを含む農薬の総使用回数1回〕 全面均一散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数2回以内 イマザビルを含む農薬の総使用回数2回以内 テトラヒオンを含む農薬の総使用回数2回以内〕	保土谷化学工業(株)・日本サイファミット(株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用地帯	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
ニコスルフロ 乳剤	ワソホーフ乳 剤	2-(4,6-ジメチル ピリミジン-2-イルカ ルホキシメチル)- N,N-ジメチルニコチ アミド・・・4.0%	乳 剤	飼料用と うもろこ し	畑地一年 生雑草 及び シハミナ 、 レドトップ			とうもろ こし3～5 葉期 但し収穫 30日前ま で	100～150ml 〔希釈水量 70～100 ℓ〕	雑草茎葉散布 〔本剤及びニコ スルフロを含 む農薬の総 使用回数 1回〕	石原産業 (株)
ヘンチカー ブ・ヘンチ イメタリン・リ ニロン粉粒 剤	クリアーン 細粒剤 F	S-(4-クロロベン ジ)-N,N-ジエチル アミン・ヘンチカ ブ・ヘンチイメ タリン・リニ ロン粉粒剤 ・・・8.0% N-(1-エチル ピペリジン)-3,4- ジメチル-2, 6-ジニトロア ニリン ・・・0.80% 3-(3,4-ジクロ ロフェニル)-1-メ チル尿素・・・1.2%	粉 粒 剤	だいず・ えだまめ ・とうも ろこし 小麦	畑地一年 生雑草	北海道 を除く 全域	全土壌 (砂土 を除く)	播種直後 (雑草発 生前)	4～5kg	全面土壌散布 〔本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 ヘンチカーブ を含む農薬 の総使用回 数1回 ヘンチイメ タリンを含む 農薬の総使 用回数1回 リニロンを含 む農薬の総 使用回数1 回〕	アミ化学 工業(株) ・日本チ アミット (株)・テ ィエツ(株)
トリフルリン・ ヘンチイメ タリン粉粒 剤	コンネタル	a,a,a-トリフル ロメチル-2, 6-ジニトロ-N,N- ジエチルア ミン・ヘンチ イメタリン ・・・1.2% N-(1-エチル ピペリジン)-3,4- ジメチル-2, 6-ジニトロア ニリン ・・・1.2%	粉 粒 剤	こんにゃ く ねぎ にんじん さといも やまのい も	畑地一年 生雑草 ただし ワケナ・キ 科雑草を 除く		砂壌土 ～壇土	植付後又 は培土後 (植付後 30日まで)	4～6kg	全面土壌散布 〔本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 トリフルリン を含む農薬 の総使用回 数2回以内 ヘンチイメ タリンを含む 農薬の総使 用回数1回〕	塩野義製 薬(株)・ ダウケミカ ル日本(株) ・日本チ アミット(株)
プロツアミン 複合肥料	テマックス	5-ジフル ロメチルア ミン・a,a,a- トリフル ロメチル-2, 6-ジニトロ ・・・0.24%		日本芝	一年生雑 草(キ科 雑草を除 く)			春期雑草 発生前 (芝生育 期)	50～60kg	全面土壌散布 〔本剤及び プロツアミン を含む農薬 の総使用回 数2回以内〕	日産化学 工業(株)