

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使用時期	10a 当り 使用量	使用方法	登録会社
シメトリン・ヘ ソフレート・M CPB粒剤	サ・ヘ・ックス SM粒剤	2-メチル-4,6-ジ ス(エチルアミノ)-s-トリ アジン・・・・1.5% 2,3-ジ・ヒド・ロ-3,3 -ジ・メチルヘ・ソ・フリン -5-イル=エタノール・ネー ト・・・・2.0% 2-メチル-4-クロロフェノ キシ酸エチル ・・・0.8%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツハ・イ、 ネタノイ、ウリカ ワ、ヘラオモタ カ、ヒルムシロ、 エソ・ノササカ ク・サ	北海道	砂壤土 ～塩土 減水深 1.5 cm/日 以下	移植後 20～25日 (ノビエ 2.5薬期 まで 移植前後 の初期除 草剤による 土壌処理 との体系で 使用する)	3kg	湛水敷布 〔本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 シメトリンを含 む農薬の総 使用回数 2回以内 ヘ・ソフレートを含 む農薬の総 使用回数 2回以内 MCPBエチルを 含む農薬の 総使用回数 2回以内〕	日本シェー リ・ンク(株)
					水田一年 生雑草及 びマツハ・イ、 ネタノイ、ウリカ ワ、ミス・カ・ヤ フリ、ヘラオモ タ・カ、オモタ カ、クロク・ワイ 、シス・イ(東 北)	東北・ 北陸	塩土 ～塩土 減水深 1.5 cm/日 以下				
					水田一年 生雑草及 びマツハ・イ、 ネタノイ、ウリカ ワ、ミス・カ・ヤ フリ、オモタ・カ 、クロク・ワイ	関東・ 東山・ 東海の 早期及 び普通 栽培地 帯	砂壤土 ～塩土 減水深 2cm/日 以下				
シ・メ・ト・ヘ・レ ート・ヘ・ン・ス・ル フロソメチル・ ヘ・ソフレート 粒剤	レイソ・ン・ヤ 粒剤 25	S-1-メチル-1-フェニル エチル=ヒ・ヘ・リジン・N-1 -カルボキシアート ・・・5.0% メチル=α-(4,6-ジ・メ トシヒ・リジン・N-2-イ ルカルハ・モイルスル・フ・イ ル)-O-トルアート ・・・0.25% 2,3-ジ・ヒド・ロ-3,3 -ジ・メチルヘ・ソ・フリン -5-イル=エタノール・ネー ト・・・・1.5%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツハ・イ、 ネタノイ、ウリカ ワ、ヘラオモタ カ、ミス・カ・ヤ フリ、ヒルムシロ 、セリ、クロク ・ワイ(東北) 、アミト・ロ・ 藻類によ る表層剥 離、エソ・ノサ サカク・サ (北海道)	北海道	塩土～ 塩土 減水深 2cm/日 以下	移植後 10～20日 (ノビエ 2.5薬期 まで)	3kg	湛水敷布 〔本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 シ・メ・ト・ヘ・レ ートを含む農 薬の総使用 回数1回 ヘ・ソフレートを含 む農薬の総 使用回数 2回以内 ヘ・ソフレートを含 む農薬の 総使用回数 2回以内〕	日本シェー リ・ンク(株)・ 北興化学 工業(株) ・デ・ユ・ネ・フ (株)・ロー ヌ・フ・ラン 油化・ア・ロ (株)
						東北		移植後 5～15日 (ノビエ 2.5薬期 まで)			

植 調 協 会 だ よ り

◎ 会議開催日程のお知らせ ・平成7年度農薬(作物・土壌・水中)残留分析委員会予定表

開 催 月 日	委員会名	会 場
平成7年4月19日(水) 20日(木)	第1回 水 中 第1回 作 物	日植防会議室 日植防会議室
6月6日(火) 8日(木)	第1回 土 壌 第2回 作 物	日植調会議室 日植調会議室
7月20日(木)	第3回 作 物	日植防会議室
9月19日(火) 21日(木)	第2回 土 壌 第4回 作 物	日植防会議室 日植防会議室
10月18日(水)	第2回 水 中	日植調会議室

開 催 月 日	委員会名	会 場
平成7年11月16日(木)	第5回 作 物	日植調会議室
12月21日(木)	第6回 作 物 第3回 土 壌	日植調会議室 日植調会議室
平成8年2月14日(水) 15日(木)	第3回 水 中 第7回 作 物	日植防会議室 日植防会議室
3月5日(火) 7日(木)	第4回 土 壌 第8回 作 物	日植防会議室 日植防会議室

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
ジ'メビ'ヘ'レート・ヘ'ンスルフロメチル・ヘ'ンフレート粒剤	レイソジ'ヤ-粒剤17	S-1-メチル-1-フェニルエチル=ヒ'ヘ'リジ'ン-1-カルボ'チオア'ート5.0% メチル=α-(4,6-ジ'メトキシヒ'リミジ'ン-2-イ'ルカルハ'モイ'ルスル'ファ'モイ'ル)-o-トル'ア'ート0.17% 2,3-ジ'ヒト'ロ-3,3-ジ'メチルヘ'ンソ'フ'ラン-5-イ'ル=エ'タ'ンスル'ホ'ナ'ート.....1.5%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマ'ワ'ハ'イ、ネ'タ'ル'イ、ウ'リ'カ'ワ、ミ'ス'カ'ヤ'ワ、ヒ'ル'ム'シ'ロ(北陸を除く)、セ'リ、ア'ミ'ト'ロ・藻類による表層剥離	北陸・関東以西の早期栽培地帯	壤土～埴土 減水深2cm/日以下	移植後5～15日(ノ'ビエ2.5薬期まで)	3kg	湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 ジ'メビ'ヘ'レートを含む農薬の総使用回数1回 ヘ'ンソ'スル'フロ'メ'ルを含む農薬の総使用回数2回以内 ヘ'ンフ'レートを含む農薬の総使用回数2回以内	日本シェ'リ'ソ'ク(株)・北興化学工業(株)・テ'ス'ホ'ン(株)・ロー'ヌ'フ'ー'ラン油化'ア'グ'ロ(株)
ジ'メタ'メ'トリ'ン・ヒ'ラ'ソ'レ'ート・フ'レ'チ'ラ'ク'ロー'ル・ヘ'ン'フ'レ'ート粒剤	クリ'ネ'ス'粒剤15	2-メチル'チ'オ-4-エチル'ア'ミ'ノ-6-(1,2-ジ'メチル'フ'ロ'ビ'ル'ア'ミ'ノ)-s-トリ'ア'ジ'ン.....0.2% 4-(2,4-ジ'クロ'ロヘ'ンソ'イ'ル)-1,3-ジ'メチル-5-ヒ'ラ'ソ'リ'ル-p-トル'エ'ンスル'ホ'ナ'ート.....8.0% 2-クロ'ロ-2',6'-ジ'エチル-N-(2-フ'ロ'ホ'キシエチル)ア'セ'ト'ア'ニ'リ'ト'.....1.5% 2,3-ジ'ヒト'ロ-3,3-ジ'メチルヘ'ンソ'フ'ラン-5-イ'ル=エ'タ'ンスル'ホ'ナ'ート.....1.5%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマ'ワ'ハ'イ、ネ'タ'ル'イ、ウ'リ'カ'ワ、ヘ'ラ'オ'モ'ク'カ、ヒ'ル'ム'シ'ロ、エ'ソ'ノ'サ'ヤ'シ'カ'ク'サ、ア'ミ'ト'ロ・藻類による表層剥離	北海道	壤土～埴土 減水深1.5cm/日以下	移植後5～15日(ノ'ビエ2薬期まで)	3kg	湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 ジ'メタ'メ'トリ'ンを含む農薬の総使用回数2回以内 ヒ'ラ'ソ'レ'ートを含む農薬の総使用回数1回 フ'レ'チ'ラ'ク'ロー'ルを含む農薬の総使用回数2回以内 ヘ'ン'フ'レ'ートを含む農薬の総使用回数2回以内	日本シェ'リ'ソ'ク(株)・三共(株)・北海三共(株)

植調協会だより

◎ 人事異動

・平成7年2月1日付

任	事務局 主事	畑 本 佳 美
任	事務局 主事	黒 澤 尚 子
命	事務局技術部長代理	山 崎 和 己
命	事務局技術部技術第二課長	立 野 篤 男
命	研究所特別研究チーム長	横 山 昌 雄