

新 登 録 除 草 剤 一 覧

農林水産省農産園芸局植物防疫課

平成7年2月1日～平成7年10月31日

(1) 移植水稻

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	登録会社
ダイムロン・ テニクロール 粒剤	ジョウカ-1キロ 粒剤	1-(a, a-ジメチルヘ ンソール)-3-(ハートリ ル)尿素・・・21.0% 2-クロロ-N-(3-メトキ シ-2-テニル)-2, 6- ジメチルアセトニトリ ・・・2.0%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツバ、イ モタ、イ、ヘラ モタ、カ(北 海道、東 北)ミ、カ ヤツリ(北海 道、九州 を除く)	北海道 、東北	壤土～ 埴土	移植直後 ～移植後 5 日 (ハ・エ1葉 期まで)	1 k g	湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 ダイムロンを含 む農薬の総 使用回数 2回以内 テニクロールを 含む農薬の 総使用回数 2回以内	(株)エス・ ディー・エス バイオテック ・(株)トリ ヤマ・クミヤ 化学工業 (株)
						関東・ 東山・ 東海の 早期栽 培地帯	減水深 2cm/日 以下				
						北陸、 関東・ 東山・ 東海の 普通期 栽培地 帯	砂壤土 ～埴土	減水深 2cm/日 以下			
						近畿・ 中国・ 四国の 普通期 栽培地 帯	壤土～ 埴土	減水深 1cm/日 以下			
						九州の 普通期 栽培地 帯	移植後 3 日 ～5 日 (ハ・エ1葉 期まで)				
ダイムロン・ プレチクロール 粒剤	ハ・テ・ホ-フ 1キロ粒剤	1-(a, a-ジメチルヘ ンソール)-3-(ハートリ ル)尿素・・・15.0% 2-クロロ-2', 6'-ジ エチル-N-(2-フ'ロホ キシエチル)アセトニトリ ・・・3.0%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツバ、イ モタ、イ、ミ カ、ヤツリ、ヘ ラモタ、カ(北 海道、東 北、北陸)	北海道 、東北 、北陸	埴土～ 埴土 但し北 陸では 砂壤土 を含む	植代後～ 移植4日 前または 移植直後 ～移植後 7 日 (ハ・エ1葉 期まで)	1 k g	湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 ダイムロンを含 む農薬の総 使用回数 2回以内 プレチクロール を含む農薬 の総使用回 数2回以内	クミヤ化学 工業(株) ・(株)エス ・ディー・エス バイオテック ・日本チ ホ・ハ・イ (株)
						関東以 西の普 通期栽 培地帯	減水深 2cm/日 以下	植代後～ 移植4日 前または 移植直後 ～移植後 5 日 (ハ・エ1葉 期まで)			

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使用時期	10a 当り 使用量	使用方法	登録会社
ジメヒ [®] ヘ [®] レ ート・ヘ [®] ンスル フロメチル・ ヘ [®] ソフレート 粒剤	レイソ [®] イ [®] 1 キロ粒剤75	S-1-メチル-1-フェニル エチル=ヒ [®] ヘ [®] リジ [®] ソ-1 -カルボ [®] チオ [®] ア [®] ート ...15.0% メチル=a-(4, 6-ジ [®] メ トキシ [®] ヒ [®] リミジ [®] ソ-2-イ ルカルハ [®] モイルスル [®] フェイ ル)-オ [®] トル [®] ア [®] ート ...0.75% 2, 3-ジ [®] ヒト [®] ロ-3, 3 -ジ [®] メチル [®] ヘ [®] ソ [®] フ [®] ラ [®] ソ -5-イル=エタ [®] スル [®] ホ [®] ナ [®] ー ト...4.5%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツバ [®] イ, ネ [®] タ [®] イ,ウ [®] リ [®] カ リ,ミ [®] ス [®] カ [®] ヤ ツリ,ヘ [®] ラ [®] モ タ [®] カ,ヒ [®] ル [®] シ ロ,セ [®] リ,エ [®] ソ ノ [®] サ [®] ス [®] カ [®] グ [®] サ (北海道), コ [®] ウ [®] キ [®] カ [®] ラ [®] (東北), [®] ア オ [®] ミ [®] ト [®] ・ [®] 藻 類による 表層はく 離	北海道	砂壌土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下、 但し砂 埴土で は減水 深1.5 cm/日 以下	移植後 5～20日 (/ヒ [®] エの 2.5葉期 まで)	1kg	湛水散布 〔本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 ジメヒ [®] ヘ [®] レ ートを含 む農薬の 総使用回 数1回 ヘ [®] ンスル [®] フロ ン [®] メ [®] チ [®] ル [®] を含む農 薬の総使 用回数 2回以内 ヘ [®] ソフ [®] レ [®] ア [®] ー トを含む 農薬の総 使用回数 2回以内	北興化学 工業(株) ・デ [®] ュ [®] ホ [®] ソ [®] (株)・ヘ [®] キ スト・シェ [®] ー [®] リ [®] ン グ [®] ・ア [®] カ [®] レ ホ [®] (株)・ ローヌ [®] ・ア [®] ー [®] ラ ン [®] 油 [®] 化 [®] ア [®] グ [®] ロ(株)
						東北	埴土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下	移植後 5～15日 (/ヒ [®] エの 2葉期ま で)			
ジメヒ [®] ヘ [®] レ ート・ヘ [®] ンスル フロメチル・ ヘ [®] ソフレート 粒剤	レイソ [®] イ [®] 1 キロ粒剤51	S-1-メチル-1-フェニル エチル=ヒ [®] ヘ [®] リジ [®] ソ-1 -カルボ [®] チオ [®] ア [®] ート ...15.0% メチル=a-(4, 6-ジ [®] メ トキシ [®] ヒ [®] リミジ [®] ソ-2-イ ルカルハ [®] モイルスル [®] フェイ ル)-オ [®] トル [®] ア [®] ート ...0.51% 2, 3-ジ [®] ヒト [®] ロ-3, 3 -ジ [®] メチル [®] ヘ [®] ソ [®] フ [®] ラ [®] ソ -5-イル=エタ [®] スル [®] ホ [®] ナ [®] ー ト...4.5%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツバ [®] イ, ネ [®] タ [®] イ,ウ [®] リ [®] カ リ,ミ [®] ス [®] カ [®] ヤ ツリ,ヘ [®] ラ [®] モ タ [®] カ(北 陸),ヒ [®] ル [®] シ ロ,セ [®] リ(北 陸,九州を 除く), コ [®] ウ [®] キ [®] カ [®] ラ [®] (九州), [®] ア オ [®] ミ [®] ト [®] ・ [®] 藻 類による 表層はく 離(九州を 除く)	北陸, 関東以 西(九州 を除く)の 普通期 栽培地 帯	砂壌土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下	移植後 5～15日 (/ヒ [®] エの 2.5葉期 まで)	1kg	湛水散布 〔本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 ジメヒ [®] ヘ [®] レ ートを含 む農薬の 総使用回 数1回 ヘ [®] ンスル [®] フロ ン [®] メ [®] チ [®] ル [®] を含む農 薬の総使 用回数 2回以内 ヘ [®] ソフ [®] レ [®] ア [®] ー トを含む 農薬の総 使用回数 2回以内	北興化学 工業(株) ・デ [®] ュ [®] ホ [®] ソ [®] (株)・ヘ [®] キ スト・シェ [®] ー [®] リ [®] ン グ [®] ・ア [®] カ [®] レ ホ [®] (株)・ ローヌ [®] ・ア [®] ー [®] ラ ン [®] 油 [®] 化 [®] ア [®] グ [®] ロ(株)
						九州の 普通期 栽培地 帯	砂壌土 ～埴土 減水深 1.5cm /日 以下				
						関東・ 東山・ 東海の 早期栽 培地帯	砂壌土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下	移植後 5～13日 (/ヒ [®] エの 2葉期ま で)			
						近畿・ 中国・ 四国の 早期栽 培地帯	埴土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下	移植後 5～15日 (/ヒ [®] エの 2.5葉期 まで)			

作物ウイルス病事典

土崎常男・栃原比呂志・亀谷満朗・柳瀬春夫／編集
A5判 定価12,500円(税込)

作物ごとにすべてのウイルス病を取り上げた病害事典。病徴、被害、ウイルスの性質、伝染方法、防除法などを解説。口絵にはウイルス病徴写真を掲載。

全国農村教育協会

〒110 東京都台東区台東1-26-6(植調会館)
Tel.03-3833-1821 Fax.03-3833-1665

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
イマゾスルフロ ン・ダ [®] イムロン ・メフェナセット 粒剤	ハートル1キ 粒剤	1-(2-クロロイミダゾ [1,2-a]ピリジン- 3-イルスルホニル)-3- (4,6-ジメチルピリ ミジン-2-イル)尿素 ・・・0.9% 1-a, α-ジメチルベン ジル)-3-(ハートル ル)尿素・・・15.0% 2-ベンゾチアゾール- 2-イルオキシ-N-メチル アセチル ・・・10.0%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツバ ^イ , ウリ ^ハ , ミス ^カ ヤ ア ^ハ , ヘ ^モ ダ ^カ , ヒル ^ム シ ロ, オ ^モ ダ ^カ (北海道 を除く), クワ ^イ (北海道 を除く), セリ, アミ ^ト ロ・藻類 による表層 はく離 (北陸, 九州を除く), エノ ^ノ ササ ^ガ サ, シズ ^イ , コキ ヤ ^ウ	北海道	砂壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下、 但し砂 壤土で は減水 深1.5 cm/日 以下	移植後 10～20 日 (ヒ ^エ の 2.5葉期 まで)	1 k g	湛水散布 本剤のみを 移用する場 合の使用回 数1回 イマゾスルフロ ンを含む農薬 の総使用回 数2回以内 ダ [®] イムロンを 含む農薬の総 使用回数 2回以内 メフェナセッ トを含む農薬 の総使用回数 2回以内	武田薬品 工業(株) ・北興化 学工業 (株)・日 本ハ ^イ エル グ ^{ロム} (株)・ (株)エス ・デー ^ー ・エ ス ハ ^イ テック
						東北、 北陸、 関東・ 東山・ 東海の 普通期 及び早期 栽培地帯	砂壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下	移植後 5～15 日 (ヒ ^エ の 2.5葉期 まで)			
						近畿・ 中国・ 四国の 普通期 栽培地帯、 九州の普 通期及 び早期 栽培地帯	砂壤土 ～埴土 減水深 1.5cm /日以下				
						近畿・ 中国・ 四国の 早期栽 培地帯	埴土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下				
アタミス・ プロモナチ [®] 粒剤	スミレート粒 剤	既登録薬剤に同じ									日産化学 工業(株)

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稻刈後・畑作・野菜作・永年生物・非農耕地対象

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
ヒ [®] アミス・D CMU水和 剤	サ [®] ート水 和剤	既登録薬剤に同じ									明治製薬 (株)
ア [®] ロゾ [®] アミ ン複合肥料	テマックス	5-ジ [®] ア [®] ロ [®] アミ ン・α, α-トリフル オロ-4, 6-ジ [®] ニトロ-オ トルイ ジン・・・0.24%		日本芝	一年生雑 草 (キク科 雑草を除 く)			春期雑草 発生前 (芝生育 期)	50～60 k g	全面土壌散布 本剤及び ア [®] ロゾ [®] アミ ンを含む農 薬の総使用 回数2回以 内	(株)エ ス・ デー ー・エ ス ハ イ テ ク
イマゾ [®] ヒ [®] ル グ [®] ルホシネ ート液剤	ゼ [®] ロ [®] ラス 液剤	既登録薬剤に同じ									日本サイ ミット(株)

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 地	用 帯	適 土	用 壇	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	登録会社
アッシュラム水 溶剤	アッシュラム80 SG	N'-メトキシカルボニル スルファニルアミドナトリウム ...80.0%	水 溶 剤	日本芝	畑地一年 生雑草					春～秋期 雑草生育 期(芝生 育期)	200～300g 〔希釈水量 200～300 ℓ〕	散布 〔本剤及び アッシュラムを 含む農薬の総 使用回数 3回以内〕	ロ・ヌ・ア・ラ ン油化アガ ロ(株)・ 石原産業 (株)・塩 野義製薬 (株)
ハロスフロソメ チル水和剤	インフール水 和剤	メチル-3-クロロ-5-(4 .6-ジメトキシピリミ ジン-2-イルカルバモイ ルスルファモイル)-1-メチ ルピラゾール-4-カル ボキシレート...10.0%	水 和 剤	日本芝	広葉雑草 及びヒメク ク、ハマスガ					芝生育期 (雑草生 育期)	200～400g 〔希釈水量 200～300 ℓ〕	散布 〔本剤及び ハロスフロソメチル を含む農薬 の総使用回 数3回以内〕	日産化学 工業(株)
グリネサートア ンモニウム塩 水溶剤	アグログリーン	既登録薬剤に同じ											アグロネショ ウ(株)
エンドタルニ ナトリウム塩 液剤	エンドタル 液剤II	(1R, 2S, 3R, 4S)- 7-オキサビシクロ[2. 2.1]ヘプタン-2, 3-ジ カルボキシル酸ナトリウ ム塩...18.5% ((1R, 2S, 3R, 4S)-7-オキサビシクロ [2.2.1]ヘプタン-2 .3-ジカルボキシル酸と して...15.0%)	液 剤	日本芝 (こうら いしば)	スズメノカタ ビラ					雑草生育 期(芝休 眠期)	800～1200 ml 〔希釈水量 200ℓ〕	散布 〔本剤のみを 使用する場 合の使用回 数3回以内 エンドタルを 含む農薬の 総使用回数 6回以内〕	三共(株) ・北海三 共(株)
エンドタルニ ナトリウム塩 液剤	エンドタル 液剤	(1R, 2S, 3R, 4S)- 7-オキサビシクロ[2. 2.1]ヘプタン-2, 3-ジ カルボキシル酸ナトリウ ム塩...1.85% ((1R, 2S, 3R, 4S)-7-オキサビシクロ [2.2.1]ヘプタン-2 .3-ジカルボキシル酸と して...1.50%)	液 剤	日本芝 (こうら いしば)	スズメノカタ ビラ					雑草生育 期(芝休 眠期)	8～12ℓ 〔希釈水量 200ℓ〕	散布 〔本剤のみを 使用する場 合の使用回 数3回以内 エンドタルを 含む農薬の 総使用回数 6回以内〕	三共(株) ・北海三 共(株)
				西洋芝 (ブルー グラス)						雑草生育 期	2～6ℓ 〔希釈水量 200ℓ〕	散布 〔本剤のみを 使用する場 合の使用回 数6回以内 エンドタルを 含む農薬の 総使用回数 6回以内〕	
エンドタルニ ナトリウム塩 粒剤	エンドタル 粒剤25	(1R, 2S, 3R, 4S)- 7-オキサビシクロ[2. 2.1]ヘプタン-2, 3-ジ カルボキシル酸ナトリウ ム塩...3.1% ((1R, 2S, 3R, 4S)-7-オキサビシクロ [2.2.1]ヘプタン-2 .3-ジカルボキシル酸と して...2.5%)	粒 剤	西洋芝 (ブルーグ ラス, フェスク)	スズメノカタ ビラ					雑草生育 期	5～10 kg	散布 〔本剤のみを 使用する場 合の使用回 数6回以内 エンドタルを 含む農薬の 総使用回数 6回以内〕	北海三共 (株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適地	用帯	用壇	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社	
グリホサートイソプロピルアミン塩液剤	ラントマスター	イソプロピルアミノモニウム=N-(ホスホノメチル)グリホサート・・・6.0%	液剤	かんきつりんごぶどうなし	一年生及び多年生雑草				雑草生育期 (草丈30cm以下) 但し収穫7日前まで	3～5ℓ	雑草茎葉散布 〔本剤及びグリホサートを含む農薬の総使用回数3回以内〕	日本モンサント(株)	
				水田畦畔					雑草生育期 (草丈30cm以下) 但し収穫14日前まで		雑草茎葉散布 〔本剤及びグリホサートを含む農薬の総使用回数2回以内〕		
				公園・庭園・堤とう・駐車場・道路・運動場・宅地・のり面等					雑草生育期 (草丈30cm以下)		雑草茎葉散布 〔本剤及びグリホサートを含む農薬の総使用回数3回以内〕		
ジソ酸塩水溶剤	ジソノット	既登録薬剤に同じ										日本ヒュージン工業(株)	
DCMU水和剤	ダクロンゾル	既登録薬剤に同じ										保土谷7クロス(株)	
グリホサートイソプロピルアミン塩・トリクロロピル液剤	スターミックスL液剤	イソプロピルアミノモニウム=N-(ホスホノメチル)グリホサート・・・35.0% トリエチルアミノモニウム=3,5,6-トリクロロ-2-ピリジノキシアセテート・・・6.0%	液剤	公園・庭園・堤とう・駐車場・道路・運動場・宅地・のり面等	一年生及び多年生雑草 (草丈30cm程度)				雑草生育期	500g	希釈水量 通常散布 100ℓ 少量散布 25ℓ	雑草茎葉散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数3回以内 グリホサートを含む農薬の総使用回数3回以内 トリクロロピルを含む農薬の総使用回数3回以内〕	ダウ・ケミカル日本(株)・日本モンサント(株)
					多年生雑草 (草丈100cm程度)					1000～1500g			
					スギナ					500～1000g			
イソクロン・DCBN・DCMU粒剤	ネコキース粒剤・ワイトウェイ粒剤・カリシオンエース粒剤	3-(5-ターシャリーブチル-3-イソキザリル)-1,1-ジメチル尿素・・・1.0% 2,6-ジクロロベンゾサミト・・・3.0% 3-(3,4-ジクロロフェニル)-1,1-ジメチル尿素・・・6.0%	粒剤	公園・庭園・駐車場・道路・運動場・鉄道・宅地等	一年生雑草及び多年生広葉雑草スギナ				雑草発生前～生育初期	10～20kg	全面土壌散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数3回以内 イソクロンを含む農薬の総使用回数3回以内 DCBNを含む農薬の総使用回数3回以内 DCMUを含む農薬の総使用回数3回以内〕	保土谷化学工業(株)・保土谷7クロス(株)・日本イソナミッド(株)	