

平成8年度桑園関係 除草剤・生育調節剤試験成績概要

財団法人 日本植物調節剤研究協会 技術部

平成8年度桑園関係除草剤・生育調節剤試験成績検討会は、平成9年1月20日(月)に当協会研究所(牛久市)において開催された。

この検討会には、試験場関係者11名、委託関係者7名ほか、計22名の参集を得て、除草剤3

薬剤(12点)、普及適用性除草剤2薬剤(4点)について試験成績の報告と検討が行われた。

その判定結果及び使用基準については、次の判定表に示す通りである。

平成8年度 桑園関係除草剤・生育調節剤試験供試薬剤および判定結果一覧

A. 除 草 剤

薬剤名・剤型 〔委託者名〕	有効成分および含有量(%)	試験の種類 新・継 の 別	試験実施 場所(数)	試験設計〔対象雑草〕 処理時期; 処理薬量<水量 I>/a; 処理方法 比) 比較薬剤	今 回 判 定	内 容
1. CG-119 P 水和剤 (コダール)	プロメトリン20% メトラクロール30%	適用性 継 続	福島蚕試, 群馬蚕試, 長野蚕業セ 南信, 鹿児島蚕試. (4)	〔一年生雑草全般; (倍量薬害含む)〕 ・春期萌芽前及び夏切後, 雑草発生前. ・30, 40, 80 g<10>. ・土壌処理. 比) トレファノサイド乳 30 ml<10>.	実	実)〔一年生雑草全般〕 ・春期萌芽前及び夏切後, 雑草発生前. ・30~40 g<10 I>/a. ・土壌処理.
〔日本チバガイギー〕		蚕 毒 新 規	福島蚕試, (1)	〔蚕に対する影響〕 ・夏切後. ・40 g<10>. ・桑葉処理. 比) 無処理葉.		
2. WOC-02 液剤	グリホサートナ トリウム塩11.5% エンドタールニ ナトリウム8.5%	適用性 新 規	山形蚕系研 セ, 埼玉蚕 試, 長野蚕 業セ南信, 徳島蚕枝セ, 宮崎総農試. (5)	〔雑草全般(一年生雑草中心)〕 ・春期萌芽前及び夏切後, 雑草生育期(草丈30cm以下). ・100, 150, 200 ml<10>. ・茎葉処理. 比) プリブロックスL液 100 ml<10>.	継	継)・効果, 薬害の確認.
〔三共〕						

薬剤名・剤型 〔委託者名〕	有効成分および含有率 (%)	試験の種類 新・継別	試験実施 場所 (数)	試験設計 〔対象雑草〕 処理時期; 処理薬量<水量 I>/a; 処理方法 比〕比較薬剤	今 回 判 定	内 容
3. MRS-195 液剤 〔MRS普及会 ; マルゼン化 工〕	グリホサートイ ソプロピルアミ ン塩……………41%	蚕 毒 新 規	東京農試. (1)	〔蚕に対する影響〕 ・50, 100, 200ml/<10> ・桑葉処理. 比〕無処理葉.	—	—



ホクコーの水稲用除草剤

パピカA
1キロ粒剤36

レインジャー 1キロ粒剤

バトル1 1キロ粒剤

クサメッツ フロアブル

マイキード 1キロ粒剤

ブローダックス 乳剤

レトリール フロアブル

ユニハーフ フロアブル

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

JAグループ

農 協 | 経 済 連

全 農



北興化学工業株式会社

〒103 東京都中央区日本橋本石町4-4-20

水田雑草の生態と防除 —水稲作の雑草と除草剤解説—

宮原益次／著

A5判 定価3,090円(税込)

水田雑草の発生特性、雑草害について著者40年の知見を網羅。さらに水田における合理的で省力的・低コストの雑草防除について解説。

全国農村教育協会

〒110 東京都台東区台東1-26-6(植調会館)

Tel. 03-3833-1821

Fax. 03-3833-1665