

新 登 録 除 草 剤 一 覧

農林水産省農産園芸局植物防疫課

平成8年11月1日～平成9年10月31日

(1) 移植水稻

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
シメリン・ビラジキソフェン・プロレチクロール粒剤	ホソハート1キロ粒剤	2-メチルチオ-4,6-ビス(エチルアミノ)-S-トリアジン・・・1.0% 2-[4-(2,4-ジクロロベンゾイル)-1,3-ジメチルピラゾール-5-イルオキシ]アセトフェノン・・・10.0% 2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(2-プロポキシエチル)アセトアミド・・・3.0%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバ、ネタイル、ウリハワ(東北、北陸)、ミズカヤヅリ(北海道を除く)、ヘラオモミカ(北海道、東北)、ヒルムシロ(北海道、関東・東山・東海の早期栽培地帯)、アミトロ・藻類による表層剥離(北海道)	北海道	壇塩土～壇土 減水深2cm/日以下	移植直後～移植後8日(ノビE1.5葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 シメリンを含む農薬の総使用回数2回以内 ビラジキソフェンを含む農薬の総使用回数1回 プロレチクロールを含む農薬の総使用回数2回以内	石原産業(株)、ノバルティス アーロ(株)
						東北	壇塩土～壇土 減水深1.5cm/日以下				
						北陸	壇塩土～壇土 減水深1cm/日以下				
						関東・東山・東海の早期栽培地帯	壇土～壇土 減水深2cm/日以下				
						近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	壇土～壇土 減水深1.5cm/日以下				
						九州の早期、普通期栽培地帯	砂壇土～壇土 減水深1cm/日以下				
ビフェノキサ・SAP粒剤	リーター1キロ粒剤	5-(2,4-ジクロロフェニル)-2-ニトロ安息香酸メチル・・・15.0% 0,0-ジイソプロピル-2-(4-ヘンセンスルホンアミド)エチルジチオホスファート・・・15.0%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバ、ネタイル、ヘラオモミカ、ミズカヤヅリ	北陸	砂壇土～壇土 減水深2cm/日以下	移植直後～移植後7日(ノビE1葉期まで)(移植後に使用する除草剤との体系で使用)	1kg	湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 ビフェノキサを含む農薬の総使用回数2回以内 SAPを含む農薬の総使用回数2回以内	八洲化学工業(株)
						東北	壇土～壇土 減水深2cm/日以下				
					水田一年生雑草及びマツバ、ネタイル、ミズカヤヅリ	関東・東山・東海の普通期栽培地帯					

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
タイムロソ・ビフェノックス粒剤	タイムロソ1キロ粒剤	1-(α , α -ジメチルベンゾイル)-3-(β -トリル)尿素・・・15.0% 5-(2,4-ジクロロフェニル)-2-ニトロ安息香酸メチル・・・15.0%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ、ホタルイ、ウリカワ、ミズカヤヅリ(北海道を除く)、ヘラオモダカ(北海道、東北、北陸)、ヒルシロ、セリ、アミト、ロ・藻類による表層剥離	関東・東山・東海の普通期栽培地帯	壤土～埴土 減水深2cm/日以下	移植直後～移植後5日 (/ビエ1葉期まで) (移植後に使用する除草剤との体系で使用)	1 k g	湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 タイムロソを含む農薬の総使用回数2回以内 ビフェノックスを含む農薬の総使用回数2回以内	八洲化学工業(株)、石原産業(株)
イマゾスルフロンのシメタメリン・タイムロソ・ブレンチカロール粒剤	ハヤ1キロ粒剤	1-(2-クロロイミダゾール[1,2-a]ピリジン-3-イルスルホニル)-3-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イル)尿素・・・0.90% 2-メチルチオ-4-エチルアミノ-6-(1,2-ジメチルプロピルアミノ)-s-トリアジン・・・0.60% 1-(α , α -ジメチルベンゾイル)-3-(β -トリル)尿素・・・15.0% 2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(2-ブチルオキシエチル)アセトアミド・・・4.5%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ、ホタルイ、ウリカワ、ミズカヤヅリ(北海道を除く)、ヘラオモダカ(北海道、東北、北陸)、ヒルシロ、セリ、アミト、ロ・藻類による表層剥離	北海道 東北、北陸、関東・東山・東海及び近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	砂壤土～埴土 減水深2cm/日以下 但し砂壤土では減水深1.5cm/日以下	移植後3日～10日 (/ビエ1.5葉期まで)	1 k g	湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 イマゾスルフロンの含む農薬の総使用回数2回以内 シメタメリンを含む農薬の総使用回数2回以内 タイムロソを含む農薬の総使用回数2回以内 ブレンチカロールを含む農薬の総使用回数2回以内	武田薬品工業(株)、(株)エス・ディー・エス・ハイトック、/ハルティス、アグロ(株)、トモアクリ(株)、明治製菓(株)
シロホップ・ブチル・ヒラゾスルフロンのチル・メフェナセツト粒剤	リボルバ-1キロ粒剤	ブチル(R)-[4-(4-シアリ-2-フルオロフェニル)-2-フルオロフェニル]アセト・・・1.5% エチル=5-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イル)スルホニル-1-メチルピラゾール-4-カルボキシレート・・・0.30%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ、ホタルイ、ウリカワ、ミズカヤヅリ、ヘラオモダカ(北海道、東北)、オモダカ(北海道を	北海道 東北	埴土～埴土 減水深2cm/日以下 埴土～埴土 減水深1cm/日以下 埴土～埴土 減水深1cm/日以下 埴土～埴土 減水深1.5cm/日以下	移植後7日～25日 (/ビエ3葉期まで) 移植後7日～20日	1 k g	湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 シロホップ・ブチルを含む農薬の総使用回数2回以内	日産化学工業(株)、日本ハイレバアグロケム(株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
シロキア [®] プチル・ヒラゾスルフロエチル・メフェナセト粒剤 つづき		2-ベンゾチアゾール-2-イルオキシ-N-メチルアセトアミド・・・7.5%			除く)、ヒルムシロ、セリ、クログワイ(北海道を除く)、アミト・ロ・藻類による表層剥離	北陸、関西以西の普通期及び九州の早期栽培地帯	減水深 1.5cm/日以下 砂壤土～埴土 減水深 2cm/日以下	(/ヒ [®] E3葉期まで)		ヒラゾスルフロエチルを含む農薬の総使用回数1回メフェナセトを含む農薬の総使用回数2回以内	
シロキア [®] プチル・シメタトリン・ヒラゾスルフロエチル・フレンチカロール粒剤	ネクト1粒剤	ア [®] チル(R)-[4-(4-シアノ-2-フルオロフェニル)フェニル]プロピオン酸・・・1.8% 2-メチルチオ-4-エチルアミノ-6-(1,2-ジメチルプロピル)ピリジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-1-メチルヒラゾール-4-カルボキシル酸・・・0.60% エチル=5-(4,6-ジメトキシ)リジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-1-メチルヒラゾール-4-カルボキシル酸・・・0.30% 2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(2-プロピル)アセトアミド・・・4.5%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ、イネ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ、ワタ、ミズカヤヅリ、ヘラモダカ(北海道、東北)、オモダカ(東北、関東・東山・東海の普通期及び早期)、ヒルムシロ、セリ、クログワイ(東北、関東・東山の普通期)、アミト・ロ・藻類による表層剥離	北海道、東北、北陸 関西以西の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～埴土 減水深 2cm/日以下 砂壤土～埴土 減水深 1.5cm/日以下	移植後 5日～20日 (/ヒ [®] E3葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 シロキア [®] プチルを含む農薬の総使用回数2回以内 シメタトリンを含む農薬の総使用回数2回以内 ヒラゾスルフロエチルを含む農薬の総使用回数1回 フレンチカロールを含む農薬の総使用回数2回以内	日産化学工業(株)、ノバルティスファーマ(株)、塩野義製薬(株)
エトベンチニド・ヒラゾスルフロエチル粒剤	サンウエル1粒剤	既登録薬剤に同じ									八洲化学工業(株)
アジメスルフロン・カフェンストロール・グァイメロン・ベンズルフロンメチル粒剤	ウィートレスA1粒剤36	1-(4,6-ジメトキシ)ピリジン-2-イル)-3-[1-メチル-4-(2-メチル-2H-チオコナゾール-5-イル)ヒラゾール-5-イルスルホニル]尿素・・・0.0060% N,N-ジエチル-3-メチルスルホニル-1H-1,2,4-トリアゾール-1-カルボキシル酸・・・3.0% 1-(α,α-ジメチルベンゾイル)-3-(ベンゾイル)尿素・・・6.0% メチル=α-(4,6-ジメトキシ)ピリジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-0-トールアト・・・0.30%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ、イネ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ、ワタ、ミズカヤヅリ、ヘラモダカ(北海道を除く)、オモダカ(とうほく)を除く)、ヒルムシロ(北陸を除く)、セリ、アミト・ロ・藻類による表層剥離(東北を除く)	北海道 東北 北陸	埴土～埴土 減水深 2cm/日以下 砂壤土～埴土 減水深 2cm/日以下	移植後 5日～15日 (/ヒ [®] E2葉期まで) 移植後 5日～12日 (/ヒ [®] E2葉期まで) 移植後 5日～15日 (/ヒ [®] E2.5葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 アジメスルフロンを含む農薬の総使用回数1回 カフェンストロールを含む農薬の総使用回数1回 グァイメロンを含む農薬の総使用回数2回以内 ベンズルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内	デボソ(株)、三共(株)、永光化成(株)
					水田一年生雑草及びマツハ、イネ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ、ワタ、ミズカヤヅリ、ヘラモダカ(北海道を除く)、オモダカ(とうほく)を除く)、ヒルムシロ(北陸を除く)、セリ、アミト・ロ・藻類による表層剥離(東北を除く)	関東・東山・東海、九州の普通期及び早期栽培地帯	埴土～埴土 減水深 1cm/日以下				

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使用時期	10a 当り 使用量	使用方法	登録会社
アジマスフロ ン・カフェスト ロール・グァ ン・ベンスル フロノメチル粒 剤つづき					層剥離	近畿・ 中国・ 四国の 普通期 及び早 期栽培 地帯	埴壌土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下				
アジマスフロ ン・ベンスル フロノメチル・ベ ンチオカーブ・ メフェナセット 粒剤	ウルフェースA1 キ粒剤36	1-(4,6-ジ ⁺ メトキシ ビ ⁺ リミジ ⁺ ン-2-イル)- 3-[1-メチル-4-(2- メチル-2H-テトラゾリ ン-5-イル)ビ ⁺ ラソ ⁺ - ル-5-イルスルホニル]尿 素・・・0.0060% メチル=α-(4,6-ジ ⁺ メトキシビ ⁺ リミジ ⁺ ン-2- イルカルハ ⁺ モイルスルホニ ル)-o-トルアルト・・・ 0.30% S-(4-クロロベンジル)-N,N-ジ ⁺ エチルチオカ ーハ ⁺ メト・・・15.0% 2-ベンゾチアゾ ⁺ ル- 2-イルオキシ-N-メチルア セトニリト・・・4.5%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツバ ⁺ イ、 ネグイ、ウリ ワ、ヘラオモ カ、ヒルシロ、 エゾノササカ クサ、セリ、ア オミ ⁺ ロ・藻 類による 表層剥離	北海道	砂壌土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下 但し 砂壌土 は1.5 cm/日 以下	移植後 5日～ 15日 (/ビ ⁺ エ2葉 期まで)	1kg	湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 アジマスフロ ンを含む農薬 の総使用回 数1回 ベンスルフロ ノメチル を含む農薬 の総使用回 数2回以内 ベンチオカー ブを含む農薬 の総使用回 数1回 メフェナセ ットを含む農薬 の総使用回 数2回以内	デモソ ⁺ (株)、ミ ア化学工業 (株)、日 本バ ⁺ イ グ ⁺ ア ⁺ (株)
					水田一年 生雑草及 びマツバ ⁺ イ、 ネグイ、ウリ ワ、ミズカ ⁺ ヤ ツリ、ヘラオ モカ(東北)、オモ ⁺ カ (北陸、近 畿・中国・ 四国を除 く)、ヒルシ ロ、セリ、ク ロクワイ、ス イ(東北)、 アオミ ⁺ ロ・ 藻類による 表層剥離	東北、 北陸、 関東・ 東山・ 東海の 普通期 栽培地 帯 近畿・ 中国・ 四国の 普通期 栽培地 帯 九州の 普通期 栽培地 帯	砂壌土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下 砂壌土 ～埴土 減水深 1.5cm/ 日以下 砂壌土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下	移植後 5日～ 15日 (/ビ ⁺ エ2.5 葉期まで)			
アジマスフロ ン・ジ ⁺ メタ リン・ブ ⁺ レ チクロール・ベ ンスルフロノメ チル粒剤	ゴ ⁺ ル本 ⁺ A1 キ粒剤36	1-(4,6-ジ ⁺ メトキシ ビ ⁺ リミジ ⁺ ン-2-イル)- 3-[1-メチル-4-(2- メチル-2H-テトラゾリ ン-5-イル)ビ ⁺ ラソ ⁺ - ル-5-イルスルホニル]尿 素・・・0.0060% 2-メチルチオ-4-エチルア ミノ-6-(1,2-ジ ⁺ メチ ル ⁺ ロビ ⁺ ルアミノ)-s- トリアゾ ⁺ ン・・・0.60% 2-クロロ-2',6'-ジ ⁺ エチル-N-(2-フ ⁺ ロホ ⁺ キシエチル)アセトニリト ・・・4.5% メチル=α-(4,6-ジ ⁺ メトキシビ ⁺ リミジ ⁺ ン-2- イルカルハ ⁺ モイルスルホニ ル)-o-トルアルト・・・ 0.30%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツバ ⁺ イ、 ネグイ、ウリ ワ、ミズカ ⁺ ヤ ツリ(北海 道を除く)、 ヘラオモ カ(北海道 、東北)、 ヒルシロ、 セリ、コ キヤカ ⁺ ラ (東北、九 州)、ス ⁺ イ (東北)、ア オミ ⁺ ロ・藻 類による 表層剥離	北海道	砂壌土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下 但し 砂壌土 は1.5 cm/日 以下	移植後 3日～ 10日 (/ビ ⁺ エ1.5 葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 アジマスフロ ンを含む農薬 の総使用回 数1回 ジ ⁺ メタリン を含む農薬 の総使用回 数2回以内 ブ ⁺ レチクロ ールを含む 農薬の総使 用回数2回 以内 ベンスルフロ ノメチル を含む農薬 の総使用回 数2回以内	デモソ ⁺ (株)、武田 薬品工業 (株)、ノ バ ⁺ グ ⁺ ア ⁺ グ ⁺ ア ⁺ (株)
						北陸、 関東・ 東山・ 東海の 普通期 及び早 期栽培 地帯 近畿・ 中国・ 四国の 普通期 栽培地 帯	砂壌土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下				
						東北、 近畿・	埴土 ～埴土				

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用地帯	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
アジメスルフロ ン・シメタメ リソ・ブレン クロール・ヘン スルフロメチル 粒剤つづき						中国・ 四国の 早期栽 培地帯	減水深 1cm/日 以下				
						九州の 普通期 及び早 期栽培 地帯	砂壌土 ～埴土 減水深 1.5cm/ 日以下				
アジメスルフロ ン・シメタメ リソ・ヘン スルフロ ンメチル・メ フェナセット粒剤	サードDA1+ ロ粒剤36	1-(4,6-ジメチル ピリミジン-2-イル)- 3-[1-メチル-4-(2- メチル-2H-テトラゾリ ン-5-イル)ピラゾ ル-5-イルスルホニル]尿 素・・・0.0060% 1-(α , α -ジメチル ベンジル)-3-(ヘ トリル)尿素・・・4.5% メチル- α -(4,6-ジ メチルピリミジン-2- イルカルバモイルスル フォイル)-オートル ート・・・0.30% 2-ベンジルチアゾ ル-2-イルオキシ-N- メチルア セトリド・・・10.0%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツハ イ、ホ ウライ、ウ リハ ワ、ミス ガヤ ツリ(北海 道を除 く)、ヘ イモダ カ(北海 道、東 北)、イ モダ カ(北 海道、 北陸を 除く)、 ヒメシ ロ、セ リ、ク ロウ イ、コ ウキ ガ ラ(東 北)、 シズ イ(東 北)、 エソ ノ サヤ カ(北 海道)、 ア ボ ト ロ ・ 藻類 による 表層剥 離	北海道	砂壌土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下 但し 砂壌土 は1.5 cm/日 以下	移植後 5日～ 20日 (ノビ エ2.5 薬期まで)	1kg	湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 アジメスル フロ ンを含む農 薬の総使用 回数1回 グライホ ソを含む農 薬の総使 用回数 2回以内 アジメスル フロ ンを含む農 薬の総使用 回数2回以 内 メフェ セットを含 む農薬の 総使用回数 2回以内	デ・エ ン 株)、ミ イ 化学工 業 (株)、 日 本 ハ イ セ ン 株)、三 共 (株)、 (株) エ ス ・ デ ィ ー エ ス ハ イ セ ン 株
						東北、 北陸	砂壌土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下	移植後 5日～ 20日 (ノビ エ3薬 期まで)			
						関東・ 東山・ 東海の 普通期 栽培地 帯	埴土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下	移植後 5日～ 15日 (ノビ エ2.5 薬期まで)			
						関東・ 東山・ 東海の 早期栽 培地帯	埴土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下				
						近畿・ 中国・ 四国の 普通期 及び早 期栽培 地帯	埴土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下				
						九州の 普通期 栽培地 帯	埴土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下				
						九州の 早期栽 培地帯	砂壌土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下				

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使用時期	10a 当り 使用量	使用方法	登録会社
アジマスフロ ン・シハロフ ン・フチル・テ ニル・クロル・ ヘンソルフロ ン・メチル 粒剤	ハビカ1キ ロ粒剤	1-(4,6-ジメチル ピリミジン-2-イル)- 3-[1-メチル-4-(2- メチル-2H-テトラゾリ ン-5-イル)ピラゾ ル-5-イルスルホニル]尿 素・・・0.0060% フチル(R)-2-[4- (4-シアノ-2-フルオロ エノキシ)フェニル]ア ミド・・・1.8% 2-クロロ-N-(3-メチ ル-2-テニル)-2',6' -ジメチルアミノニト ・・・2.1% メチル=α-(4,6-ジ メチルピリミジン-2- イルカルバモイルスル フィニル)-オロアト ・・・0.30%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツハ イ、オ タカイ、ウ リカ ワ、ミズ ガヤ ツリ(北 海 道)、ヘ ラオ タカ(北 海 道、東 北)、 クロ クワイ (東 北、近 畿・中 国・四 国の普 通期)、 オ タ カ (東 北、近 畿・中 国・四 国の普 通期)、 ヒル シロ、 セリ、 アミ ト ロ・藻 類に よる表 層剥 離	北海道	壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下	移植後 5日～ 25日 (ノビエ3 葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 アジマスフロ ンを含む農 薬の総使用 回数1回 シハロフ ン・フチル を含む農薬 の総使用回 数2回以内 テニル・クロ ルを含む農 薬の総使用 回数2回以 内 ヘンソルフロ ン・メチル を含む農薬 の総使用回 数2回以内	デモン(株)、日本 農薬(株)、北興化 学工業(株)、(株) トヤマ
						東北	埴土 ～埴土 減水深 1.5cm/ 日以下	移植後 5日～ 20日 (ノビエ3 葉期まで)			
						北陸	砂壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下				
						関東・東 山・東 海の 早期栽 培地帯	埴土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下				
						関東・東 山・東 海の 普通期 栽培地 帯	埴土 ～埴土 減水深 1.5cm/ 日以下				
						近畿・中 国・四 国の普 通期及 び早期 栽培地 帯	埴土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下				
						九州の 普通期 栽培地 帯					
アジマスフロ ン・エス ロカ ル フ ン・ヘン ソ ル フロ ン・メ チ ル 粒 剤	アジマスA 1キロ粒剤	1-(4,6-ジメチル ピリミジン-2-イル)- 3-[1-メチル-4-(2- メチル-2H-テトラゾリ ン-5-イル)ピラゾ ル-5-イルスルホニル]尿 素・・・0.0060% S-ヘンソルル=1,2- ジメチルアミノニト ル(エチ ル)カルバモイルスル フィニル)-オロアト ・・・21.0% メチル=α-(4,6-ジ メチルピリミジン-2- イルカルバモイルスル フィニル)-オロアト ・・・0.30%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツハ イ、オ タカイ、ウ リカ ワ、ミズ ガヤ ツリ(北 海 道を除 く)、ヘ ラオ タカ(北 海 道、東 北)、 オ タ カ (北 海 道、東 北、九 州)、 ヒル シロ、 セリ、 クロ クワイ、 コナ ヤガ ツ(東 北、九 州)、 エノ ノサ ヤ ガ ツ(北 海 道)、 シ ズ イ(東 北)、 アミ ト ロ・藻 類に よる表 層剥 離	北海道	砂壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下 但し 砂壤土 は1.5 cm/日 以下	移植後 5日～ 20日 (ノビエ2.5 葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 アジマスフロ ンを含む農 薬の総使用 回数1回 エス ロ カ ル フ ンを含む農 薬の総使用 回数1回 ヘンソルフロ ン・メチル を含む農薬 の総使用回 数2回以内	デモン(株)、日本 農薬(株)、 セネカ(株)
						東北	埴土 ～埴土 減水深 1.5cm/ 日以下	移植後 5日～ 15日 (ノビエ2.5 葉期まで)			
						北陸、 関東・ 東山・ 東海の	砂壤土 ～埴土 減水深				

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
アジメスルフロ ン・エスア [®] 助 力 [®] ハ [®] ス ルフロシメチル 粒剤 つづ き						普通期 栽培地 帯	2cm/日 以下				
						関東・ 東山・ 東海の 早期栽 培地帯	壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下				
						近畿・ 中国・ 四国の 普通期 栽培地 帯	砂壤土 ～埴土 減水深 1.5cm/ 日以下				
						近畿・ 中国・ 四国の 早期栽 培地帯	壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下				
						九州の 普通期 栽培地 帯	砂壤土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下				
アジメスルフロ ン・シ [®] メ [®] ハ [®] レート [®] ハ [®] スルフロシメチ ル・ハ [®] ソ [®] フレ ート粒剤	レインジ [®] ャーA 1+粒剤3 6	1-(4,6-ジ [®] メトキシ ビ [®] リミジ [®] ソ-2-イル)- 3-[1-メチル-4-(2- メチル-2H-テトラコナゾ ール-5-イル)ピ [®] ラゾ [®] - ル-5-イルスルホニル]尿 素・・・0.0060% S-1-メチル-1-フェニル エチル=ヒ [®] ハ [®] リジ [®] ソ-1 -カルボ [®] チオ [®] アート・・・ 15.0% メチル=α-(4,6-ジ [®] メトキシビ [®] リミジ [®] ソ-2- イルカルバ [®] モイルスルホニ ル)-O-トル [®] アート・・・ 0.30% 2,3-ジ [®] ヒ [®] ト [®] ロ-3,3 -ジ [®] メチルハ [®] ソ [®] フラソ -5-イル=エタ [®] スルホニ ト・・・4.5%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツハ [®] イ、 ホタルイ、ウリガ リ、ミス [®] カ [®] ヤ フリ(北海 道を除く)、ヘラオモダ カ(北海道 、東北)、セ リ(九州を 除く)、ホ ダ [®] カ(北海 道を除く)、 ヒルムシロ、 クロク [®] フイ、コ ウヤカ [®] ラ(東 北)、エ ゾノサヤカ ク [®] ス(北海 道)、ジス [®] イ (東北)、ア オミ [®] ト [®] ロ・藻 類による 表層剥離	北海道	砂壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下 但し 砂壤土 は1.5 cm/日 以下	移植後 5日～ 15日 (ハ [®] ビ [®] イ2薬 期まで)	1 k g	潜水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 アジメスルフロ ンを含む農薬 の総使用回 数1回 シ [®] メ [®] ハ [®] レート を含む農薬 の総使用回 数1回 ハ [®] ソ [®] フレートを 含む農薬 の総使用回 数2回以内 ハ [®] ソ [®] フレートを 含む農薬 の総使用回 数2回以内	デ [®] ム [®] ソ [®] (株)、北興 化学工業 (株)、ローマ ・ブ [®] -ラン油 化 [®] ア [®] ロ [®] (株)
						東北	壤土 ～埴土 減水深 1.5cm/ 日以下	移植後 5日～ 15日 (ハ [®] ビ [®] イ2.5 薬期まで)			
						北陸	埴壤土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下				
						近畿・ 中国・ 四国、 九州の 普通期 栽培地 帯	砂壤土 ～埴土 減水深 1.5cm/ 日以下				
						関東・ 東山・ 東海、 近畿・ 中国	壤土 ～埴土 減水深 2cm/日				

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地域	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
つづき						四国の早期栽培地帯	以下				
アジメスルフロ ン・ビ [®] リミ ン・メチル・ ベンズルフロ ン・メチル・ メチル・メフェ セット粒剤	ア [®] ロスバ [®] -A 1キロ粒剤3 6	1-(4,6-ジ [®] メトキシ ビ [®] リミ [®] ン-2-イル)- 3-[1-メチル-4-(2- メチル-2H-テトラコナソ [®] -ル-5-イル)ビ [®] ラソ [®] - ル-5-イルスルホニル]尿 素・・・0.0060% メチル=2-(4,6-ジ [®] メ トキシビ [®] リミ [®] ン-2-イ ルオキシ)-6-(1-メトキ シイミエチル)ベンゾ [®] エ ト・・・0.30% メチル=α-(4,6-ジ [®] メトキシビ [®] リミ [®] ン-2- イル)カルバ [®] モイルスルホニ ル)-o-トルアト・・・ 0.30% 2-ベンゾ [®] チアゾ [®] -ル- 2-イルオキシ-N-メチルア セトア [®] ニト [®] ・・・4.5%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツハ [®] イ、 オタカイ、ウリガ リ、ミス [®] カ [®] ヤ ツリ(東北) 、ヘラオモ タ [®] カ(東北) 、ヒルムシロ、セ リ、アオモト [®] ロ ・藻類に よる表層 剥離	北海道	壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下	移植後 10日～ 25日 (ノビ [®] エ3葉 期まで)	1 k g	湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 アジメスルフロ ンを含む農薬 の総使用回 数1回 ビ [®] リミ [®] ン・メ チルを含む農 薬の総使用 回数1回 ベンズルフロ ンを含む農薬 の総使用回 数2回以内 メフェセット を含む農薬の 総使用回数 2回以内	ア [®] イ化学 工業(株) 、チ [®] エホ [®] ノ (株)、日本 ハ [®] エ [®] 町 [®] カ ヤ [®] ム(株)
						東北		移植後 5日～ 20日 (ノビ [®] エ3葉 期まで)			
						北陸、 関東・ 東山・ 東海の 早期及 び普通 期栽培 地帯	砂壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下				
						近畿・ 中国・ 四国の 普通期 栽培地 帯、九 州の早 期栽培 地帯	埴土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下				
						近畿・ 中国・ 四国の 早期裁 培地帯	埴土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下				
ビ [®] フェノ [®] ス 粒剤	モー [®] ダ [®] ウ [®] 1キ ロ粒剤	5-(2,4-ジ [®] クロロフェ ノキシ)-2-ニトロ安息 香酸メチル・・・16.0%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツハ [®] イ、 オタカイ、ヘラ オモタ [®] カ	北海道 、北陸 及び近 畿・中 国以西 の普通 期栽培 地帯	砂壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下 但し、 近畿・ 中国以 西は 1cm/日 以下	植代後～ 移植前 4日 又は 移植直後 ～移植後 5日 (ノビ [®] エ1葉 期まで)	1 k g	湛水散布 (土壌処理) 本剤及び ビ [®] フェノ [®] スを 含む農薬の 総使用回数 2回以内	ロ [®] ス [®] ・フ [®] - ラ [®] ン [®] 油 [®] 化 [®] ア [®] ロ [®] (株)、北 興化学工 業(株)、 八洲化学 工業(株)
						東北及 び関東 ・東山 ・東海 の普通 期栽培 地帯	埴土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下 但し、 東北は				

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 地 帯	適 用 土 壌	使用時期	10a 当り 使用量	使用方法	登録会社
つづき							1.5cm/ 日以下				
メフナセット 粒剤	ヒノクロ7粒 剤	既登録薬剤に同じ									八洲化学 工業(株)
シロホップ アチル・ア ムロソ・ヘン スルフロメチル メフナセット 粒剤	イネグリンD 1+粒剤5 1	アチル(R)-[4-(4- シアノ-2-フルオロフェ ニル)フェニル]ア ミド・1.5% 1-(α , α -ジメチル ベンジル)-3-(α - トリル)尿素・4.5% メチル = α -(4,6-シ メトキシ)リミジン-2- イルカルハモイルスル フェニル)-オートル アミド・0.51% 2-ベンゾチアゾ ール-2-イルオキシ N-メチルア ミド・7.5%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツハ イ、オ シロイ、ウ リカ ワ、ミズ ガヤ ツリ、ヘ アモ タカ(北 陸)、ク ロガ ワ、 オモ タカ、 ヒル シロ、 セリ、 アミ ト・ ロ・ 藻類 による 表層剥 離	北陸・ 関東・ 東山・ 東海 の普 通期 栽培 地帯 近畿・ 中国・ 四国 の普 通期 栽培 地帯、 九州 の早 期裁 培地 帯	砂壤土 ～植土 減水深 2cm/日 以下	移植後 7日～ 20日 (/ヒ ² 3葉 期まで) 移植後 7日～ 15日 (/ヒ ² 3葉 期まで)	1 k g	湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 シロホップアチル を含む農薬 の総使用回 数2回以内 タムロソを 含む農薬の 総使用回数 2回以内 メフナセ ットを含む 農薬の総使 用回数2回 以内	日本ハ イ ワ タ ナ ミ (株)、 デ ュ ボ ン (株)、 (株)エ ス・ デ ィ ー エ ス バ イ オ テ ク
シロホップ アチル・ヘ ン スルフロメチ ルメフナセ ット 粒剤	イネグリン1 +粒剤75	アチル(R)-[4-(4- シアノ-2-フルオロフェ ニル)フェニル]ア ミド・1.5% メチル = α -(4,6-シ メトキシ)リミジン-2- イルカルハモイルスル フェニル)-オートル アミド・0.75% 2-ベンゾチアゾ ール-2-イルオキシ N-メチルア ミド・7.5%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツハ イ、オ シロイ、ウ リカ ワ、ミズ ガヤ ツリ(東北) 、ヘ アモ タカ 、ク ロガ ワ、 オモ タカ、 ヒル シロ、 セリ、 アミ ト・ ロ・ 藻類 による 表層剥 離	北海道 東北	壇塩土 ～植土 減水深 2cm/日 以下 壇塩土 ～植土 減水深 1.5cm/ 日以下	移植後 7日～ 25日 (/ヒ ² 3葉 期まで) 移植後 7日～ 20日 (/ヒ ² 3葉 期まで)	1 k g	湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 シロホップアチル を含む農薬 の総使用回 数2回以内 ベンスルフロ メチルを含 む農薬の総 使用回数2 回以内 メフナセ ットを含む 農薬の総使 用回数2回 以内	日本ハ イ ワ タ ナ ミ (株)、 デ ュ ボ ン (株)
イマツスル フロ ン・シロホ ップアチル ・グ アイム ロソ・メ フナセ ット 粒 剤	グ ラ ビ ッ ク 1 +粒 剤	1-(2-クロイミ ダゾ [1,2-a]ピ リ ジ ン-3-イル スルホ ニル)-3-(4,6-シ メ ト キ シ リ ミ ジ ン-2-イル) 尿素・ 0.90% アチル(R)-[4-(4- シアノ-2-フルオロフェ ニル)フェニル]ア ミド・1.5% 1-(α , α -ジメチル ベンジル)-3-(α - トリル)尿素・ 15.0% 2-ベンゾチアゾ ール-2-イルオキシ N-メチルア ミド・7.5%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツハ イ、オ シロイ、ウ リカ ワ、ミズ ガヤ ツリ(北海 道を除 く)、ヘ アモ タカ(北 海道、 東北、 北 陸)、 ヒル シ ロ、 セリ、 アミ ト・ ロ・ 藻類 による 表層剥 離(北 海道、 東北、 九州 を除 く)、 セリ、 アミ ト・ ロ・ 藻類 による 表層剥 離(北 海道、 東北、 九州 を除 く)	北海道 東北 北陸、 九州 の普 通期 栽培 地帯 関東・ 東山・ 東海、 近畿	壇塩土 ～植土 減水深 2cm/日 以下 壇塩土 ～植土 減水深 1.5cm/ 日以下 壇塩土 ～植土 減水深 1cm/日 以下 砂壤土 ～植土 減水深	移植後 7日～ 20日 (/ヒ ² 2.5 葉期まで) 移植後 7日～ 20日 (/ヒ ² 3葉 期まで) 移植後 7日～ 15日	1 k g	湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 イマツスル フロ ンを含む 農薬の総 使用回数 2回以内 シロホップ アチルを 含む農薬 の総使用 回数2回 以内 グ アイム ロソを 含む農薬 の総使用 回数2回 以内 メフナセ ットを含 む農薬の 総使用回 数2回以 内	日本ハ イ ワ タ ナ ミ (株)、 武 田 薬 品 工 業 (株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
つづき						中国・四国の普通期栽培地帯	2cm/日以下	(/t ² 13葉期まで)			
カネストロール・タ・イムロン・ヘ・ンスルフロメチル水和剤	ラクタ [®] -Lフロア [®] ル	N, N-ジ [®] エチル-3-メチルスルホニル-1H-1, 2, 4-トリアゾ [®] -ル-1-カルボ [®] キザミト [®] ・5.5% 1-(α , α -ジ [®] メチルペン [®] ジ [®] ル)-3-(β -ラトリ [®] ル)尿素・10.0% メチル α -(4, 6-ジ [®] メトキシ [®] ヒ [®] リミジ [®] ン-2-イルカルバ [®] モイルスルファ [®] モイル)- α -トルア [®] ト [®] ・1.0%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ [®] イ、ネ [®] グイ、ウリ [®] ワ、ミズ [®] カ [®] ヤツリ、ヒル [®] シロ(北陸を除く)、セ [®] リ(九州を除く)、ア [®] ミ [®] ト [®] ・藻類による表層剥離(北陸、九州を除く)	北陸・近畿・中国・四国の早期栽培地帯 関東・東山・東海の普通期栽培地帯 近畿・中国・四国の普通期栽培地帯 九州の普通期栽培地帯	壇 [®] 壤土 [®] ～壇土 [®] 減水深1cm/日以下 砂 [®] 壇土 [®] ～壇土 [®] 減水深2cm/日以下 壇土 [®] ～壇土 [®] 減水深1.5cm/日以下 壇 [®] 壤土 [®] ～壇土 [®] 減水深2cm/日以下	移植後3日～15日 (/t ² 12.5葉期まで)	500ml	原液湛水散布又は水口施用(水口施用は九州を除く)本剤のみを使用する場合の使用回数1回 カネストロールを含む農薬の総使用回数1回 タ [®] イムロンを含む農薬の総使用回数2回以内 ヘ [®] ンスルフロメチルを含む農薬の総使用回数2回以内	三共(株)、永光化成(株)、デ [®] キ [®] ン(株)
カネストロール・タ・イムロン・ヘ・ンスルフロメチル粒剤	ウィート [®] レス1キ [®] ロ粒剤51	N, N-ジ [®] エチル-3-メチルスルホニル-1H-1, 2, 4-トリアゾ [®] -ル-1-カルボ [®] キザミト [®] ・3.0% 1-(α , α -ジ [®] メチルペン [®] ジ [®] ル)-3-(β -ラトリ [®] ル)尿素・6.0% メチル α -(4, 6-ジ [®] メトキシ [®] ヒ [®] リミジ [®] ン-2-イルカルバ [®] モイルスルファ [®] モイル)- α -トルア [®] ト [®] ・0.51%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ [®] イ、ネ [®] グイ、ウリ [®] ワ、ミズ [®] カ [®] ヤツリ、ヒル [®] シロ(北陸を除く)、セ [®] リ(九州の早期及び普通期栽培地帯を除く)	北陸・関東・東山・東海の普通期栽培地帯、九州の早期及び普通期栽培地帯 近畿・中国・四国の早期栽培地帯 近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	壇 [®] 壤土 [®] ～壇土 [®] 減水深2cm/日以下 壇土 [®] ～壇土 [®] 減水深1cm/日以下 砂 [®] 壇土 [®] ～壇土 [®] 減水深1cm/日以下	移植後5日～15日 (/t ² 12.5葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 カネストロールを含む農薬の総使用回数1回 タ [®] イムロンを含む農薬の総使用回数2回以内 ヘ [®] ンスルフロメチルを含む農薬の総使用回数2回以内	三共(株)、永光化成(株)、デ [®] キ [®] ン(株)
カネストロール・タ・イムロン・ヘ・ンスルフロメチル粒剤	クサトリエースH [®] シ [®] ンホ [®]	N, N-ジ [®] エチル-3-メチルスルホニル-1H-1, 2, 4-トリアゾ [®] -ル-1-カルボ [®] キザミト [®] ・7.0% 1-(α , α -ジ [®] メチルペン [®] ジ [®] ル)-3-(β -ラトリ [®] ル)尿素・15.0% メチル α -(4, 6-ジ [®] メトキシ [®] ヒ [®] リミジ [®] ン-2-	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ [®] イ、ネ [®] グイ、ウリ [®] ワ、ミズ [®] カ [®] ヤツリ(東北)、ヒル [®] シロ(北海道)、セ [®] リ(北海道)	北海道東北	壇 [®] 壤土 [®] ～壇土 [®] 減水深1cm/日以下	移植後3日～15日 (/t ² 12葉期まで)	小包装(ハ [®] ッ [®] ク)10個(300g)	水田に小包装(ハ [®] ッ [®] ク)のまま投げ入れる 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 カネストロールを含む農薬	三共(株)、永光化成(株)、デ [®] キ [®] ン(株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
ガフェンストロール・タムロン・ヘンソルフロンメチル粒剤つづき		イルカハ・モイルスルファモイル・オートルート・・・2.5%								の総使用回数1回 タムロンを含む農薬の総使用回数2回以内 ヘンソルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内	
ガフェンストロール・タムロン・ヘンソルフロンメチル粒剤	クサトリエースH シ・ンホ	N, N-ジ・エチル-3-メチルスルホニル-1H-1, 2, 4-トリアゾール-1-カルボキサミド・・・7.0% 1-(α , α -ジ・メチルペンツル)-3-(β -ナトリル)尿素・・・15.0% メチル- α -(4, 6-ジ・メトキシ・リミジノ-2-イルカハ・モイルスルファモイル)-オートルート・・・1.7%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ・イ、ホタルイ、ウリワ、ミズ・カ・ヤリ	北陸	壇土 ～壇土 減水深 1cm/日 以下	移植後 3日～ 15日 (/t ² 12薬期まで)	小包装(ハ・ッ)10個 (300g)	水田に小包装(ハ・ッ)のまま投げ入れる 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 ガフェンストロールを含む農薬の総使用回数1回 タムロンを含む農薬の総使用回数2回以内 ヘンソルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内	三共(株)、永光化成(株)、デ・ホ・ン(株)
ジ・メタトリン・ヒ・ヘ・ロホス粒剤	アビ・ロザン粒剤	既登録薬剤に同じ									ハ・ル・ティス・ツ・ロ(株)
ジ・メタトリン・ヒ・リ・フ・チル・フ・レ・チ・ラ・ロール水和剤	農将軍フロアブル	2-メチルチオ-4-エチルアミノ-6-(1, 2-ジ・メチル7・ロビ・ル7・ミノ)-s-トリアゾール・・・0.50% 0-3-tert-7・チルフェニル-6-メトキシ-2-ヒ・リ・ン・ル(メチル)チカハ・マート・・・10.0% 2-クロロ-2', 6'-ジ・エチル-N-(2-7・ロホ・キシエチル)アセトアニト・・・5.0%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ・イ、ホタルイ、ヘラオモ・カ(北海道、東北)、アミト・ロ・薬類による表層剥離	北海道	壇土 ～壇土 減水深 2cm/日 以下	移植直後～移植後 10日 (/t ² 11薬期まで)	500ml	原液湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 ジ・メタトリンを含む農薬の総使用回数2回以内 ヒ・リ・フ・チル・フ・レ・チ・ラ・ロールを含む農薬の総使用回数2回以内	八洲化学工業(株)、ハ・ル・ティス・ツ・ロ(株)、大日本イ・ソ・化学工業(株)
ガフェンストロール・タムロン・ヘンソルフロンメチル水和剤	ラクタ・Hフロアブル	N, N-ジ・エチル-3-メチルスルホニル-1H-1, 2, 4-トリアゾール-1-カルボキサミド・・・5.5% 1-(α , α -ジ・メチルペンツル)-3-(β -ナ	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ・イ、ホタルイ、ウリワ、ミズ・カ・ヤリ(東北)	北海道	壇土 ～壇土 減水深 2cm/日 以下	移植後 3日～ 20日 (/t ² 12.5薬期まで)	500ml	原液湛水散布又は水口施用 本剤のみを使用する場合の使用回数1回	三共(株)、永光化成(株)、デ・ホ・ン(株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用塩	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
カフエントロー ル・サ・イムロン ・ヘンズルフロ ンメチル水和 剤つづき		トリル尿素・・・・ 10.0% メチル- α -(4,6-ジ メトキシヒミジジ ン-2-イル)カハ モイルスルファ イル)- α -トルア ート・・・・ 1.4%			、ヒルムシロ、ハ ラモダ、セ リ(北海道)、ア ミト・ロ ・藻による表層剥 離(北海道)	東北		移植後 3日～ 15日 (/ヒエ2.5 葉期まで)		カフエントロー ルを含む農薬 の総使用回 数1回 ダイムロンを 含む農薬の 総使用回数 2回以内 ヘンズルフロ ンメチル を含む農薬 の総使用回 数2回以内	
ビ・ス・リハ ックナトリウム 塩液剤	ノミニ液剤	2,6-ビス(4,6-ジ メトキシヒミジジ ン)安息香酸 ナトリウム・・・・ 2.0%	液 剤	乾田直播 水稻	水田一年 生雑草	全域(北 海道、九 州を除く) の普通 期栽培地 帯	塩土 ～塩土	播種後 10日～ 40日 (/ヒエ3～ 5葉期) (入水前)	100～200ml 希釈水量 100l	雑草茎葉散布 本剤及びビ ス・リハ・ク ナトリウム を含む農薬 の総使用回 数1回	三井化学 工業(株)
ナフ・ロニ ド・プロセ ブ・チト・メ ンセト粒 剤	シグ・ン1 粒剤	既登録薬剤に同じ									三井化学 (株)
カフエントロー ル・シハロ フ・ア・チル ・ダイムロン ・ヘンズルフロ ンメチル水和 剤	シ・ョイス ター・L フロア ル	N, N-ジエチル-3-メ チルスルホニル-1H-1, 2 , 4-トリアゾ-ル-1-カ ルボキサイド・・・・ 4.2% ア・チル(R)-[4-(4- ジメチル-2-フル オロフェニル)フ ェニル]ア・ロ ニド・・・・ 3.0% 1-(α , α -ジメチル ヘンズル)-3-(ハ ラトリル)尿素・・・・ 8.0% メチル- α -(4,6-ジ メトキシヒミジジ ン-2-イル)カハ モイルスルファ イル)- α -トルア ート・・・・ 1.0%	水 和 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマダバ イ、ホタル イ、ウリ ア、ミズ ナギ、ハ ラモダ、セ リ、コウ キヤガ ラ(九州 の普通 期栽培 地帯、九 州の早 期及び 普通 期栽培 地帯)	北陸、 関東・ 東山・ 東海 の普通 期栽培 地帯	砂塩土 ～塩土 減水深 2cm/日 以下	移植後 3日～ 20日 (/ヒエ3葉 期まで)	500ml	原液湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 カフエント ロールを含 む農薬の 総使用回 数1回 シハロフ・ ア・チル を含む農 薬の総使 用回数2 回以内 ダイム ロンを含 む農薬の 総使用回 数2回以 内 ヘンズ ルフロ ンメチ ルを含 む農薬 の総使 用回数 2回以 内	三井化学 工業(株)、 永光化 成(株)、 デ・ホ ン(株)、 タ・カ ミ・ル 日本 (株)
カフエントロー ル・シハロ フ・ア・チル ・ダイムロン ・ヘンズルフロ ンメチル水和 剤	クサ ライ ト 1 粒 剤	N, N-ジエチル-3-メ チルスルホニル-1H-1, 2 , 4-トリアゾ-ル-1-カ ルボキサイド・・・・ 4.2% 1-(4,6-ジメトキシ ヒミジジ ン-2-イル)-3-[2-(2-メ トキシ フェニル)フ ェニル]尿 素・・・・ 0.18% 1-(α , α -ジメチル ヘンズル)-3-(ハ ラトリル)尿 素・・・・ 4.5%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマダバ イ、ホタル イ、ウリ ア、ミズ ナギ、ハ ラモダ、セ リ(北 海道、東 北、北 陸)	北海道	砂塩土 ～塩土 減水深 2cm/日 以下 但し、 砂塩土 は1.5 cm/日 以下	移植後 5日～ 10日 (/ヒエ1.5 葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 カフエント ロールを含 む農薬の 総使用回 数1回 シハロフ ンメチル を含む農 薬の総使 用回数1 回 ダイム ロンを含 む農薬の 総使用回 数2回以 内	ハ・ル ティ ス 7 ア ロ (株)、 永光化 成(株)
						東北、 北陸	塩土 ～塩土 減水深 2cm/日 以下				
						関東・ 東山・ 東海の	砂塩土 ～塩土				

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
つづき					藻類による表層剥離(北陸を除く)	通期栽培地帯及び九州の早期栽培地帯	減水深 2cm/日以下			2 回以内 ベ [®] ソスルフロ [®] メチルを含む農薬の総使用回数 2 回以内	
テニクロール・ビ [®] フェノックス乳剤	7 [®] レオット乳剤	既登録薬剤に同じ									八洲化学工業(株)
シクロスルファミロン粒剤	イデソマルシ [®] オンホ [®] 60	1-[2-(シクロ [®] ロ [®] ピ [®] ルカルホ [®] ニル)ア [®] ニ [®] ルホ [®] ニル]-3-(4,6-ジ [®] メトキシ [®] ピ [®] リミジ [®] ン-2-イル)尿素・0.60%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草(イネ科雑草を除く)及びマ [®] ハ [®] イ、ホ [®] タイ [®] ル、ウ [®] リ [®] カ [®] 、ミ [®] ス [®] ガ [®] ヤ [®] ツ [®] リ、ヒ [®] ム [®] シ [®] ロ、ア [®] ミ [®] ト [®] ロ・藻類による表層剥離	北海道東北 北陸・関東・東山・東海の普通期栽培地帯 近畿・中国・四国の普通期栽培地帯 九州の普通期栽培地帯	壇 [®] 壤土 [®] ～壇土 [®] 減水深 2cm/日以下 壇土 [®] ～壇土 [®] 減水深 2cm/日以下 砂 [®] 壇土 [®] ～壇土 [®] 減水深 1cm/日以下 壇 [®] 壤土 [®] ～壇土 [®] 減水深 1cm/日以下	移植後 5 日～15 日 (ノ [®] ビ [®] エ [®] 2 葉期まで) 移植後 5 日～10 日 (ノ [®] ビ [®] エ [®] 2 葉期まで)	小包装(ハ [®] ッ [®] ク)20 個 (1 k g)	水田に小包装(ハ [®] ッ [®] ク)のまま投げ入れる 本剤及びシクロスルファミロンを含む農薬の総使用回数 1 回	日本 [®] イ [®] ワ [®] ミ [®] ト [®] (株)
シクロスルファミロン粒剤	イデソマルシ [®] オンホ [®] 60	1-[2-(シクロ [®] ロ [®] ピ [®] ルカルホ [®] ニル)ア [®] ニ [®] ルホ [®] ニル]-3-(4,6-ジ [®] メトキシ [®] ピ [®] リミジ [®] ン-2-イル)尿素・0.30%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草(イネ科雑草を除く)及びマ [®] ハ [®] イ、ホ [®] タイ [®] ル	北海道東北 北陸・関東・東山・東海の普通期栽培地帯 近畿・中国・四国の普通期栽培地帯 九州の普通期栽培地帯	壇 [®] 壤土 [®] ～壇土 [®] 減水深 2cm/日以下 壇土 [®] ～壇土 [®] 減水深 2cm/日以下 砂 [®] 壇土 [®] ～壇土 [®] 減水深 1.5cm/日以下 壇 [®] 壤土 [®] ～壇土 [®] 減水深 1cm/日以下	移植後 5 日～15 日 (ノ [®] ビ [®] エ [®] 2 葉期まで) 移植後 5 日～10 日 (ノ [®] ビ [®] エ [®] 2 葉期まで)	小包装(ハ [®] ッ [®] ク)20 個 (1 k g)	水田に小包装(ハ [®] ッ [®] ク)のまま投げ入れる 本剤及びシクロスルファミロンを含む農薬の総使用回数 1 回	日本 [®] イ [®] ワ [®] ミ [®] ト [®] (株)

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	登録会社
カフエントロー ル・シクロスル ファミロン・タ ムロン粒剤	ネト・ロス1キ 粒剤	N, N-ジ・エチル-3-メ チルスルホニル-1H-1, 2 , 4-トリアゾール-1-カ ルボキサミド・・・3.0% 1-[2-(シクロプロピ ルカルボニル)アミノスル ホニル]-3-(4, 6-ジ メトキシ)リビジン-2- イル)尿素・・・0.60% 1-(α , α -ジメチル ヘンジル)-3-(ハ トリル)尿素・・・6.0%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツハ イ、オ タカイ、ウ リカ ワ、ミズ ガヤ ツリ、ヘ アオモ ダナ(北海 道、東北 、北陸)、ヒ ムシロ、セ リ(近畿・中 国・四国、 九州の早 期を除く)、 アオミト ロ・藻類に よる表層 剥離(九 州の早期 を除く)	全域の 普通期 及早 期栽培 地帯	砂壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下	移植後 5日～ 15日 (ノビエ2葉 期まで)	1 k g	湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 カフエントロー ルを含む農薬 の総使用回 数1回 シクロスルファミ ロンを含む農薬 の総使用回 数1回 タムロンを 含む農薬の 総使用回数 2回以内	日本サ イファ ミッド(株) 、永光化 成(株)
カフエントロー ル・シクロスル ファミロン・タ ムロン粒剤	ネト・ロスシ ンホ 粒剤	N, N-ジ・エチル-3-メ チルスルホニル-1H-1, 2 , 4-トリアゾール-1-カ ルボキサミド・・・3.0% 1-[2-(シクロプロピ ルカルボニル)アミノスル ホニル]-3-(4, 6-ジ メトキシ)リビジン-2- イル)尿素・・・0.60% 1-(α , α -ジメチル ヘンジル)-3-(ハ トリル)尿素・・・6.0%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツハ イ、オ タカイ、ウ リカ ワ、ミズ ガヤ ツリ、ヘ アオモ ダナ(北海 道、東北 、北陸、関 東・東山・ 東海の普 通期栽培 地帯	北海道 東北 北陸、 関東・ 東山・ 東海の 普通期 栽培地 帯	埴土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下 砂壤土 ～埴土 減水深 1.5cm/ 日以下	移植後 5日～ 15日 (ノビエ2葉 期まで) 移植後 5日～ 10日 (ノビエ2葉 期まで)	小包装(ハ ッ)20個 (1 k g)	水田に小包装 (ハッ)のまま 投げ入れる 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 カフエントロー ルを含む農薬 の総使用回 数1回 シクロスルファミ ロンを含む農薬 の総使用回 数1回 タムロンを 含む農薬の 総使用回数 2回以内	日本サ イファ ミッド(株) 、永光化 成(株)
エス・ロカル ブ・シクロスル ファミロン粒 剤	シ・カリキ1キ 粒剤	S-ヘンジル=1, 2- ジメチルアミノエチ ル)チオカルバマート・・・ 21.0% 1-[2-(シクロプロピ ルカルボニル)アミノスル ホニル]-3-(4, 6-ジ メトキシ)リビジン-2- イル)尿素・・・0.60%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツハ イ、オ タカイ、ウ リカ ワ、ミズ ガヤ ツリ、ヘ アオモ ダナ(北海 道、東北 、北陸、関 東・東山・ 東海の普 通期を除 く)、ア オミト ロ・藻類に よる表層 剥離(九 州の普 通期を除 く)	北海道 東北 北陸、 関東・ 東山・ 東海の 普通期 栽培地 帯	埴土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下 砂壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下	移植後 5日～ 20日 (ノビエ2.5 葉期まで) 移植後 5日～ 15日 (ノビエ2.5 葉期まで)	1 k g	湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 エス・ロカル ブを含む農薬 の総使用回 数1回 シクロスルファミ ロンを含む農薬 の総使用回 数1回	日本サ イファ ミッド(株) 、大塚化 学(株)

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	登録会社
エスア [®] ロカル ア [®] ・シクロス ファミロン粒 剤つづく						培地帯 ・九州 の普通 期栽培 地帯	1cm/日 以下				
						近畿・ 中国・ 四国の 普通期 栽培地 帯、九 州の早 期栽培 地帯	砂壤土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下				
						近畿・ 中国・ 四国の 早期裁 培地帯	埴土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下				
エスア [®] ロカル ア [®] ・ビラソ スルフロエチル ・ビ [®] リフ [®] チ ル [®] 粒剤	ビ [®] ノス1キロ 粒剤	S-ヘ [®] ソジ [®] ル=1, 2- ジ [®] メチル [®] ロビ [®] ル(エチ ル)チオカルバ [®] マート・・・ 15.0% エチル=5-(4, 6-ジ [®] メ トキシ [®] リミ [®] ン-2-イ ルカル [®] モイルスル [®] フ [®] チ ル)-1-メチル [®] ビラソ [®] - ル-4-カル [®] キシラート・・・ 0.30% 0-3-tert-7 [®] チル [®] ニル=6-メトキシ-2- ビ [®] リジ [®] ル(メチル)チオカ ル [®] マート・・・6.0%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツバ [®] イ、 ネタ [®] イ、ウリカ ワ、ミス [®] カ [®] ヤ ワリ(北海 道を除く)、 ヒル [®] シロ、 セリ、アミ [®] ト ロ [®] 藻類に よる表層 剥離	北海道	埴壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下	移植後 5日～ 20日 (ノ [®] ビ [®] 2.5 葉期 [®] まで)	1 k g	湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 エスア [®] ロカル [®] を含む農薬 の総使用回 数1回 ビ [®] ラソ [®] スル [®] フ ロエチル [®] を含む 農薬の総使 用回数1回 ビ [®] リフ [®] チル [®] を含む農薬 の総使用回 数2回以内	日産化学 工業(株) 、セ [®] 林 [®] (株) 、大日本 イ [®] チ [®] 化学 工業(株) 、塩野義 製薬(株)
						東北、 北陸	埴壤土 ～埴土 減水深 1.5cm/ 日以下	移植後 5日～ 15日 (ノ [®] ビ [®] 2.5 葉期 [®] まで)			
						関東・ 東山・ 東海の 普通期 栽培地 帯	埴壤土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下				
						近畿・ 中国・ 四国の 普通期 栽培地 帯	埴土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下				
						九州の 普通期 栽培地 帯	砂壤土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下				
ジ [®] メタトリ ・ビ [®] ラソ [®] レー ト [®] ・フ [®] レチラ コロ [®] ・ヘ [®] ソ レ [®] ト粒剤	リ [®] ス1キロ 粒剤	2-メチル [®] オチ [®] -4-エチル [®] ミノ [®] -6-(1, 2-ジ [®] メチ ル [®] ロビ [®] ル [®] チ [®] ノ [®])-s- トリ [®] アジ [®] ン・・・0.60% 4-(2, 4-ジ [®] クロ [®] ロ [®] ハ [®] ソ [®] イル)-1, 3-ジ [®] メ チル [®] -5-ビ [®] ラソ [®] リ [®] ル-p -トリ [®] エ [®] スル [®] ネ [®] ト・・・ 18.0% 2-クロ [®] ロ [®] -2', 6'-ジ [®] エチル [®] -N-(2-7 [®] ロ [®] ホ [®] キシエチル)ア [®] セ [®] ト [®] ニ [®] リ [®] ト [®] ・・・3.0%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツバ [®] イ、 ネタ [®] イ、ウリカ ワ、ヘ [®] オ [®] モ [®] タ [®] カ、ヒル [®] シロ、 エソ [®] /サ [®] サ [®] ク グ [®] 、アミ [®] ト [®] ロ [®] 藻類 による表 層剥離	北海道	砂壤土 ～埴土 減水深 1.5cm/ 日以下	移植後 3日～ 15日 (ノ [®] ビ [®] 2葉 期 [®] まで)	1 k g	湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 ジ [®] メタトリ [®] を含む農薬 の総使用回 数2回以内 ビ [®] ラソ [®] レー ト [®] を含む農 薬の総使用 回数1回	北海三共 (株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
ジメタメトリン・ヒラゾレート・フ・レチナロール・ヘンソレート粒剤つづき		2,3-ジ・ヒ・ロ・3,3-ジ・メチル・ヘンソ・フ・ラ・ン・5-イル・エタン・スルホ・ト・・・0.3%								フ・レチナロールを含む農薬の総使用回数2回以内 ヘンソレートを含む農薬の総使用回数2回以内	
アジメスルフロ・ヘンソレート・メフエセット粒剤	サ・ウ・ク・A1・キ・ロ粒剤	1-(4,6-ジ・メ・ト・キ・ビ・リ・ミ・ジ・ン・2-イル)-3-[1-メチル-4-(2-メチル-2H-テトラコナゾール-5-イル)ヒラゾール-5-イルスルホニル]尿素・・・0.0060% メチル=α-(4,6-ジ・メ・ト・キ・ビ・リ・ミ・ジ・ン・2-イル)カルバ・モイルスルファ・イ・ル)-O-トール・ア・ト・・・0.30% 2-ヘンソ・チ・ア・ソ・ール-2-イルオキシ-N-メチル・ア・セ・ト・リ・ト・・・10.0%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ・イ、オタカイ、ウリカワ、セリ、ミスガ・ヤブ(東北)、ヒルシロ、アオミ・ロ・藻類による表層剥離	北海道 東北	塩壌土～塩土 減水深2cm/日以下 塩壌土～塩土 減水深1.5cm/日以下	移植後5日～20日 (/ヒ・エ2.5薬期まで) 移植後5日～15日 (/ヒ・エ2.5薬期まで)	1kg	湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 アジメスルフロを含む農薬の総使用回数1回 ヘンソレートを含む農薬の総使用回数2回以内 メフエセットを含む農薬の総使用回数2回以内	デ・ホ・ン(株)、メ・イ・化学工業(株)、三共(株)、日本ハ・イ・ワ・ク・ア・ム(株)

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稻刈後・畑作・野菜作・永年生作物・非農耕地対象

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
ヒアラネス液剤	クサキールAL	L-2-アミノ-4-[1-(トリロキシ)(メチル)オキシイソプロピル]アチル-L-アチル-L-アチルのナトリウム塩・・・0.50%	液剤	公園・庭園・駐車場・道路・運動場・宅地等	一年生及び多年生雑草			雑草生育期 (草丈30cm以下)	50～100ml/m ²	雑草茎葉散布	北興産業(株)
グリサート・ア・ン・エ・ム・塩液剤	ア・ロ・ン・コ	ア・ン・モ・ニ・リ・ム・N-(オ・ス・ホ・メチル)ク・リ・シ・ナ・ト・・・33.0%	液剤	かんきつりんごなし	一年生及び多年生雑草			雑草生育期 (草丈30cm以下) 但し収穫7日前まで	250～500ml 希釈水量 通常散布 50～100l 少量散布 25～50l	雑草茎葉散布 本剤及びグリサートを含む農薬の総使用回数3回以内	日本シヤン(株)
				水田畦畔				雑草生育期 (草丈30cm以下) 但し収穫14日前まで		雑草茎葉散布 本剤及びグリサートを含む農薬の総使用回数2回以内	
				公園・庭園・堤とう・駐車場・道路・運動場・宅地・のり面等				雑草生育期 (草丈100cm以下)		500～1000ml 希釈水量 通常散布 50～100l 少量散布 25～50l	
DCPA・NAC乳剤	ワイタック乳剤	既登録薬剤に同じ									八洲化学工業(株)
MCPAイソプロピルアミン塩液剤	アラスコンM液剤	2-メチル-4-クロロフェニル酢酸イソプロピルアミン・・・40.0%	液剤	日本芝	一年生及び多年生広葉雑草			雑草生育初期(芝生育期)	1～1.5 l 希釈水量 200 l	雑草茎葉散布 本剤及びMCPAを含む農薬の総使	日産化学工業(株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適地	用帯	用土	用壤	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
MCPAイソフロピルミン塩液剤つづき				道路・宅地・公園・運動場・堤とう・のり面等						雑草生育期(生育中期まで)	1~2 l 希釈水量 150~200 l	用回数 3回以内	
DCMU粉粒剤	家庭園芸用ダクロン微粒剤、家庭園芸用ジクロン微粒剤	既登録薬剤に同じ											保土谷7グロ(株)、タタ園芸(株)、トモナグロ(株)
ビアラネスエゾル	泡の除草剤	L-2-アミノ-4-[(ピロキシ)(メチル)ホスフィイル]アチル-L-アラニル-L-アラニンのナトリウム塩・・・1.25%	液剤	公園・庭園・堤とう・道路・駐車場・宅地・運動場・のり面等	一年生及び多年生雑草					雑草生育期 (草丈30cm以下)	8~10ml/m ² (1秒間の噴射量は約 1ml)	雑草茎葉噴射	明治製薬(株)、ファマリー(株)
グリサートイソフロピルミン塩液剤	ラントマスターフロ	イソフロピルアゾネキム=N-(ホスホメチル)グリサート・・・12.0%	液剤	公園・庭園・堤とう・駐車場・運動場・宅地・のり面等	一年生及び多年生雑草					雑草生育期	3~5 l	雑草茎葉散布本剤及びグリサートを含む農薬の総使用回数 3回以内	日本センバト(株)
ビフェノキサ・ヒリフチカル水和水和剤	トップランター水和水和剤	5-(2,4-ジクロロフェニル)-2-ニトロ安息香酸メチル・・・40.0% 0-3-tert-ブチルフェニル-6-メチル-2-ヒリフチル(メチル)チカルハート・・・20.0%	水 和 剤	日本芝	一年生雑草					芝生育期(雑草発生前)	600~1000g 希釈水量 200~300 l	全面土壌散布 本剤のみを使用する場合の使用回数 2回以内 ビフェノキサを含む農薬の総使用回数 2回以内 ヒリフチカルを含む農薬の総使用回数 2回以内	八洲化学工業(株)、ロース・フーリン油化7グロ(株)
ジフルフェニオン・トリフルラリン乳剤	カレース乳剤	2',4'-ジフルオロ-2-(α , α , α -トリフルオロ-メトリルオキシ)ニコチンニリト・・・3.7% α , α , α -トリフルオロ-2,6-ジニトロ-N,N-ジフロピル-ハーニトリル・・・37.0%	乳 剤	小麦(秋播) 大麦(秋播)	畑地一年生雑草	全域		全土壌(砂地を除く)	播種後発芽前(雑草発生前)	200~250ml 希釈水量 100 l	全面土壌散布 本剤のみを使用する場合の使用回数 1回 ジフルフェニオンを含む農薬の総使用回数 1回 トリフルラリンを含む農薬の総使用回数 1回	ロース・フーリン油化7グロ(株)、塩野義製薬(株)、タカギ日本(株)	
ジフルフェニオン・DBN水和水和剤	サックラー水和水和剤	2',4'-ジフルオロ-2-(α , α , α -トリフルオロ-メトリルオキシ)ニコチンニリト・・・4.0% 2,6-ジクロロヘキシル・・・30.0%	乳 剤	小麦(秋播) 大麦(秋播)	畑地一年生雑草	全域		全土壌(砂地を除く)	播種後発芽前又は麦2~3葉期(雑草発生前~発生始期)	200~250g 希釈水量 100 l	全面土壌散布 本剤のみを使用する場合の使用回数 1回 ジフルフェニオンを含む農薬の総使用回数 1回 DBNを含む農薬の総使用回数 1回	ロース・フーリン油化7グロ(株)	

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 地 帯	適 用 土 壌	使用時期	10a 当り 使用量	使用方法	登録会社
チフェンスフロ ンメチル・IPC 乳剤	タイマックスD EW	メチル=3-(4-メトキシ- 6-メチル-1, 3, 5-トリ アジノ-2-イルカルバモ イルスルファミル)-2-テ ィアト・・・2.0% イソプロピル-N-(3- クロロフェニル)カルバメ ト・・・30.0%	乳 剤	あずき	畑地一年 生広葉雑 草	北海道	全土壌 (砂地を 除く)	播種後 2 ～5日	100～150ml 希釈水量 100～150 1	全面土壌散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数 1 回 チフェンスフロ ンメチルを含む農 薬の総使用 回数 1 回 IPC を含む農薬 の総使用回 数 1 回	北海三共 (株)
				いんげん まめ、 だいず				播種後発 芽前	150～200ml 希釈水量 100～150 1		
				小麦(秋 播)	畑地一年 生雑草			播種後 2 ～5日又 は麦2葉 期	200ml 希釈水量 100 1	雑草茎葉散布 又は全面土壌 散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数 1 回 チフェンスフロ ンメチルを含む農 薬の総使用 回数 1 回 IPC を含む農薬 の総使用回 数 1 回	
プロビサミ ド水和剤	アグロマックス 水和剤	既登録薬剤に同じ									アグリト (株)
ザントセス キノンベ ストリス 液剤	キノンベ ストリス 液剤	ザントセス キノンベ ストリス N・ソル エ・・・2×10 ¹¹ CFU /ml	液 剤	日本芝(コ ラシイハ)、 西洋芝(ベ ンチグラス)	スズメノカタ ビエ			芝生育期 (春～夏 期)(スズメ ノカタビエ生 育期)	200ml 希釈水量 200 1 400ml 希釈水量 400 1	刈り込み後雑 草茎葉散布 本剤及び ザントセス キ ノンベ ストリスを 含む農薬の 総使用回数 1 回	日本たば こ産業 (株)
イマツスフロ ン・プロシ アミン水和 剤	イマツスフロ ン・プロシ アミン水和 剤	1-(2-クロロイミダゾ [1, 2-a]ピリジン- 3-イルスルホニル)-3-(4, 6-ジメチルピリ ジン-2-イル)尿素・ ・・・20.0% 5-ジプロピルピ リジン-α, α, α-トリ フルオ ロ-4, 6-ジ ニトロ-オ トルイ ジン・・・22.0%	水 和 剤	日本芝	一年生雑 草 多年生広 葉雑草 ヒメクサ、 ハマスガ			芝生育期 (雑草発 生前～雑 草生育初 期)	200～300ml 希釈水量 200～300 1	雑草茎葉散布 又は全面土壌 散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数 3 回以内 イマツスフロ ンを含む農薬 の総使用回 数 3 回以内 プロシ アミンを 含む農薬 の総使用回 数 3 回以内	日産化学 工業(株) , (株)エス デー・エス バ・イテック
ジクワット液 剤	レガロックス	既登録薬剤に同じ									ゼ・初(株)
ナフロハミ ド水和剤	ナフロハミ ド水和剤	既登録薬剤に同じ									ゼ・初(株)
グリサート ソフ・ロ シ塩液剤	グリサート ソフ・ロ シ塩液剤	イソプロピルア ミノ-N-(ホスホ メチル)グ リサート・・・41.0%	液 剤	公園・庭 園・堤と う・駐車 場・道路 ・運動場 ・宅地・ のり面等	一年生雑 草			雑草生育 期 (草丈50 cm以下)	500ml 希釈水量 100 1	雑草茎葉散布 本剤及びグ リサートを含 む農薬の総使 用回数 3 回以内	(株)マルゼ ン化工、 マスト(株)
					多年生雑 草				1000ml 希釈水量 100 1		

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用環境	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
779*スルフロ ン水和剤	カサ顆粒 水和剤	1-(4,6-ジ*メトキシ ヒ*リミシ*ン-2-イル)- 3-(3-トリフオロメチル -2-ヒ*リジ*ルスルホニル)尿素・・・25.0%	水和 剤	さとうき び(春植 え、夏植 え)	畑地一年 生雑草	九州	全土壌 (砂地 を除く)	雑草発生 盛期～雑 草生育始 期(草丈 5cm以下)	15～20g 希釈水量 100 l	雑草茎葉散布 本剤及び 779*スルフロ ンを含む農薬の 総使用回数 1回	石原産業 (株)
779*スルフロ ン水和剤	カサ水和 剤	1-(4,6-ジ*メトキシ ヒ*リミシ*ン-2-イル)- 3-(3-トリフオロメチル -2-ヒ*リジ*ルスルホニル)尿素・・・10.0%	水和 剤	ぶどう	一年生及 び多年生 雑草		全土壌 (砂地 を除く)	秋冬期～ 春期(降 雪期を除 く)雑草 生育期(草丈20cm 以下)(収 穫30日前 まで)	50～100ml 希釈水量 100～150 l	雑草茎葉散布 本剤及び 779*スルフロ ンを含む農薬の 総使用回数 2回以内	石原産業 (株)
			桑園					春期萌芽 前夏切後 萌芽前雑 草生育期 (草丈10c m以下)	75～100ml 希釈水量 100～150 l		
			すぎ、ひ のき(床 替床)					春期～夏 期雑草生 育期(草 丈10cm以 下)	30～50ml 希釈水量 100～150 l		
			公園・庭 園・堤と う・駐車 場・道路 ・運動場 ・宅地・ のり面等	一年生及 び多年生 雑草(但 し、多年 生雑草は 伸長抑制 効果)				雑草生育 期(草丈3 0cm以下) 夏期刈取 後(草丈1 0cm以下)	200～400ml 希釈水量 100～150 l		
ジ*メテミド ・リニエロン乳 剤	エコトップ [®] 乳 剤	(RS)-2-クロロ-N-(2,4-ジ*メチル-3-チエ ニル)-N-(2-メトキシ- 1-メチルエチル)アセト ミド・・・14.0% 3-(3,4-ジ*クロロフェ ニル)-1-メトキシ-1-メ チル尿素・・・12.0%	乳 剤	だいず とうもろ こし	畑地一年 生雑草	全域(北 海道を除 く)	全土壌 (砂地 を除く)	播種後発 芽前(雑 草発生前)	500～600ml 希釈水量 100 l	全面土壌散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 ジ*メテミド [®] を含む農薬 の総使用回 数1回 リニエロン を含む農薬 の総使用回 数1回	日産化学 工業(株) 、(株)エス ディー・エ ス バイテク、 デ・ボーン (株)、丸和 バ・イタミ カル(株)
DCMU・DPA ・MCPAトリ カ塩粒剤	トルソ [®] 粒 剤	3-(3,4-ジ*クロロフェ ニル)-1,1-ジ*メチル 尿素・・・4.0% 2,2-ジ*クロロ*ロヒ ン酸ナトリウム・・・ 10.0% 2-メチル-4-クロロフェ ニル酢酸ナトリウム一 水化物・・・5.0%	粒 剤	公園・庭 園・駐車 場・道路 ・運動場 ・宅地等	一年生及 び多年生 雑草			雑草生育 初期～生 育期(草 丈30cm以 下)	20～30 kg	全面均一散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数3回以内 DCMU [®] を含む農薬 の総使用回 数3回以内 DPA [®] を含む農薬 の総使用回 数3回以内 MCPA [®] を含む農薬 の総使用回 数3回以内	日産化学 工業(株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適地	用帯	用土	用壤	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
グリホサート ソフ・ロビ・ル ミン塩液剤	グリホサート 液剤0.4 園芸用ソ フ・ロン液剤	イソプロピルアミン N-(ホスホメチル)カ リナート・・・0.40%	液 剤	公園・庭 園・堤と う・駐車 場・道路 ・運動場 ・宅地・ のり面等	一年生及 び多年生 雑草					雑草生育 期(草丈 30cm以下)	50～100 ml/m ² (原液散布)	雑草茎葉散布 本剤及びグ リホサートを含む 農薬の総使 用回数 3回以内	赤城物産 (株)、大 成農材(株)
イソキサベン ハスロジ ン水和剤	ハナフィン ロDF	N-[3-(1-エチル-1- メチルプロピル)イソキ サベン-5-イル]-2, 6-ジメチルベンゾ ミド・・・5.5% N-ブチル-N-エチル- α, α, α-トリフルオ ル-2, 6-ジニトロハ ラトリジン・・・・・・ 55.0%	水 和 剤	日本芝、 西洋芝(ハ ンツグラス 、ブルーグ ラス)	畑地一年 生雑草					雑草発生 前	500～700 g 希釈水量 200～300 l	全面土壌散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数2回以内 イソキサベン を含む農薬 の総使用回 数2回以内 ハスロジ ンを含む農薬 の総使用回 数2回以内	ダウケミカル 日本(株) 、塩野義 製薬(株)
カネストロ ル・ハロスル フロンメチル水和 剤	サンシール 水和剤	N, N-ジエチル-3-メシ チルスルホニル-1H-, 2, 4-トリアゾール-1-カル ボキシルト・・・50.0% メチル-3-クロロ-5-(4, 6-ジメチルピリミ ジン-2-イル)カルバモイ ルスルファモイル)-1-メチ ルピラゾール-4-カル ボキシルト・・・10.0%	水 和 剤	日本芝	一年生雑 草					芝生育期 (雑草発 生前)	200～400 g 希釈水量 200～300 l	全面土壌散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 カネストロ ルを含む農薬 の総使用回 数1回 ハロスルフ ロンメチル を含む農薬 の総使用回 数3回以内	日産化学 工業(株) 、永光化 成(株)、 (株)アグ ロス

この草はなんだろう? 手軽に調べたい。

三二雑草図鑑

耕地雑草ハンドブック

A5判 本体2,200円

耕地には主要なものだけで150種を超える雑草が生えてきます。これら雑草の防除の第一歩は草を知ることです。本書は、農耕地や樹園地などによく見られる雑草397種を写真とともに紹介した、草を知るための野帳版雑草図鑑です。

原色図鑑 芽ばえとたね

浅野 貞夫／著

A4判 本体9,800円

芽ばえの姿はどうなんだろう。本書は、植物の芽ばえのようすを克明に表した精密図版と、種・成植物の写真による植物の一生図鑑です。成植物のみの図鑑と異なり、芽ばえのようすから紹介しているため、植生などの調査にたいへん役に立つとの声が寄せられています。

全国農村教育協会

〒110 東京都台東区台東1-26-6
TEL. 03-3833-1821 FAX. 03-3833-1665