

新登録除草剤一覧

農林水産省農産園芸局植物防疫課
平成9年11月1日～平成10年3月31日

(1) 移植水稻

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
テニクロール水和剤	アムハーブフロアール	2-クロロ-N-(3-メトキシ-2-テニル)-2',6'-ジメチルアセトアニリド・・・4.0%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハヱ	北海道	壇土～壇土 減水深1.5cm/日以下	植代時～移植前4日 又は 移植直後～移植後5日 (ノビエ発生始期まで)	500ml	原液湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 テニクロールを含む農薬の総使用回数2回以内	(株)トクマ
						東北	壇壇土～壇土 減水深1.5cm/日以下				
						北陸	壇土～壇土 減水深2cm/日以下				
						関東・東山・東海の普通期栽培地帯	壇壇土～壇土 減水深1cm/日以下	植代時～移植前4日 又は 移植直後～移植後5日 (ノビエ葉期まで)			
						近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	壇土～壇土 減水深1.5cm/日以下				
						九州の普通期栽培地帯	砂壇土～壇土 減水深1cm/日以下				
シメトリン・ヘソフベート・MCPB粒剤	サーベックスSM1キロ粒剤	2-メチルチオ-4,6-ビス(エチルアミノ)-s-トリアジン・・・4.5% 2,3-ジヒドロ-3,3-ジメチルヘンソフラン-5-イル=エタンスルホネート・・・6.0% 2-メチル-4-クロロフェノキシ酢酸エチル・・・2.4%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハヱ、ネタイル、ヘラオモダカ、アオミドロ・藻類による表層剥離	北海道	砂壇土～壇土 減水深2cm/日以下、 但し砂壇土は1.5cm/日以下	移植後20～25日 (ノビエ2.5葉期まで) (移植前後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用)	1kg	湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 シメトリンを含む農薬の総使用回数2回以内 ヘソフベートを含む農薬の総使用回数2回以内 MCPBエチルを含む農薬の総使用回数2回以内	三共(株) (株)アグレマ・ジヤパン
						関東・東山・東海の普通期栽培地帯	壇土～壇土 減水深2cm/日以下	移植後20～25日 (ノビエ2葉期まで) (移植前後の初期			

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適地 用帯	適用 土壌	使用時期	10a 当り 使用量	使用方法	登録会社
つづき					による表 層剥離			除草剤に よる土壌 処理との 体系で使 用)			
シハロネップ フチル粒剤	クリンチャー ンネ	フチル(R)-2-[4- (4-シアノ-2-フルオロ フェニル)フェニル]プロ ピオネート・・・1.8%	粒 剤	移植水稻	ノビエ	全域の 普通期 栽培地 帯、九 州の早 期栽培 地帯	砂壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下	移植後 15～ 25日 (ノビエ3葉 期まで) (但し 収穫70日 前まで)	小包装(ハッ ク)20個 (1kg)	水田に小包装 (ハック)のまま 投げ入れる 本剤のみを 使用する場合 の使用回数 1回 シハロネップフチル を含む農業 の総使用回 数2回以内	タウケミカル 日本(株) 日産化学 工業(株) 北興化学 工業(株) (株)アグロ ス、日本農 薬(株)
						関東・ 東山・ 東海の 早期裁 培地帯	埴壤土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下				
						全域の 普通期 栽培地 帯、九 州の早 期栽培 地帯	砂壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下	移植後 25～ 35日 (ノビエ3～ 4葉期まで) (但し 収穫70日 前まで)	小包装(ハッ ク)30個 (1.5kg)		
						関東・ 東山・ 東海の 早期裁 培地帯	埴壤土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下				
カフェンストロ ール・シハロネ ップフチル・ タイムロン・ ヘンズルフロ ンメチル水和 剤	ジョイスター フロアール	N, N-ジエチル-3-メ チルスルホニル-1H-1, 2 , 4-トリアゾール-1-カ ルボキサミド・・・4.2% フチル(R)-2-[4- (4-シアノ-2-フルオロ フェニル)フェニル]プロ ピオネート・・・3.0% 1-(α, α-ジメチル ヘンソール)-3-(ハ ラトリル)尿素・8.0% メチル=α-(4, 6-ジ メトキシビリジン)-2- イルカルバミド・0.4%	水 和 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマブハ イ、ネ タリイ、ウ リカ ワ、ヘラモ ダカ、ヒル ムシロ、セ リ、エゾノ サ ヤスカサテ 、ア オミドロ・ 藻類によ る表層剥 離	北海道	砂壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下、 但し 砂壤土 は1.5 cm/日 以下	移植後 5～ 25日 (ノビエ3葉 期まで)	500ml	原液湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 カフェンスト ールを含む 農業の総使 用回数1回 シハロネッ プフチルを 含む農業の 総使用回数 2回以内 タイムロン を含む農業 の総使用回 数2回以内 ヘンズルフ ロンメチル を含む農業 の総使用回 数2回以内	タミイ化学 工業(株) 永光化成 (株)、テ ィ ン(株)、 タウケミカ ル日本(株)
					水田一年 生雑草及 びマブハ イ、ネ タリイ、ウ リカ ワ、ミス カヤ ワリ、ヘラ モ ダカ、ヒル ムシロ、セ リ、コウキ ヤカ、ラ、 ス イ、アオミ ドロ・藻 類による 表層剥離	東北	埴土 ～埴土 減水深 1.5cm/ 日以下	移植後 5～ 20日 (ノビエ3葉 期まで)			
ビリフチル ア・ヘンズル フロンメチル ・メ フェンセツ水 和剤	ライカート フロアール	0-3-tert-フチル フェニル=6-メトキシ-2- ビリジン(メチル)チオ カルバート・・・10.0% メチル=α-(4, 6-ジ メトキシビリジン)-2- イルカルバミド・0.4% 1-(α, α-ジメチル ヘンソール)-3-(ハ ラトリル)尿素・8.0% メチル=α-(4, 6-ジ メトキシビリジン)-2- イルカルバミド・0.4%	水 和 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマブハ イ、ネ タリイ、ウ リカ ワ、ミス カヤ ワリ、ヘラ モ ダカ、ヒル ムシロ、セ リ、コウキ ヤカ、ラ、 ス イ、アオミ ドロ・藻 類による 表層剥離	北海道	埴壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下	移植後 3～ 15日 (ノビエ2葉 期まで)	500ml	原液湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 ビリフチル アを含む農 業の総使用 回数2回以 内	ティン(株)、三共 (株)、日 本バリエ ル(株)、 大日本 イソ化学 工業(株)
					水田一年 生雑草及 びマブハ イ、ネ タリイ、ウ リカ ワ、ミス カヤ ワリ、ヘラ モ ダカ、ヒル ムシロ、セ リ、コウキ ヤカ、ラ、 ス イ、アオミ ドロ・藻 類による 表層剥離	東北	埴土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下	移植直後 ～15日			

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適地	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
つづき		2-ヘンソ [®] チアゾ [®] ール-2-イルオキシ-N-メチルアセトアニリド・・・8.0%			藻類による表層剥離		減水深1cm/日以下	(/ヒ [®] 2葉期 [®])		ヘンソ [®] チアゾ [®] ールを含む農薬の総使用回数2回以内 メフエナセットを含む農薬の総使用回数2回以内	
ヒ [®] リフ [®] チカル [®] ア [®] ・ヘンソ [®] ル [®] フロン [®] メチル [®] ・メフエナセット水和剤	ライカ [®] ート [®] L [®] フロア [®] ル	0-3-tert-フ [®] チル [®] エニル=6-メトキシ-2-ヒ [®] リジ [®] ル(メチル)チオカルハ [®] マート・・・10.0% メチル=α-(4,6-ジ [®] メトキシヒ [®] リミジ [®] ン-2-イルカルハ [®] セイルス [®] ル [®] フェイ [®] ル)-オートル [®] ア [®] ート・・・1.0% 2-ヘンソ [®] チアゾ [®] ール-2-イルオキシ-N-メチルアセトアニリド・・・8.0%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ [®] イ、ネタルイ、ウリカワ、ミス [®] ガ [®] ヤツリ、ヒルムシロ(北陸を除く)、セリ	北陸	埴壇土～埴土 減水深1cm/日以下	移植直後～15日 (/ヒ [®] 2葉期 [®])	500ml	原液灌水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 ヘンソ [®] チアゾ [®] ールを含む農薬の総使用回数2回以内 メフエナセットを含む農薬の総使用回数2回以内	デ [®] ュ [®] ホ [®] ン(株)、三共(株)、日本 [®] ハ [®] イ [®] エ [®] ル [®] カ [®] ワ [®] ム(株)、大日本 [®] イ [®] ン [®] キ [®] 化学工業(株)
						関東・東山・東海の普通期栽培地帯	砂壇土～埴土 減水深2cm/日以下	移植直後～12日 (/ヒ [®] 2葉期 [®])			
						近畿・中国・四国の普通期栽培地帯		移植後3～12日 (/ヒ [®] 2葉期 [®])			
						九州の普通期栽培地帯	砂壇土～埴土 減水深1cm/日以下				
テニ [®] ル [®] クロール [®] ・ヒ [®] リフ [®] チカル [®] ア [®] ・ヘンソ [®] ル [®] フロン [®] メチル [®] 水和剤	キンク [®] タ [®] ム [®] フロア [®] ル	2-クロール-N-(3-メトキシ-2-テニ [®] ル)-2',6'-ジ [®] メチルアセトアニリド・・・4.0% 0-3-tert-フ [®] チル [®] エニル=6-メトキシ-2-ヒ [®] リジ [®] ル(メチル)チオカルハ [®] マート・・・10.0% メチル=α-(4,6-ジ [®] メトキシヒ [®] リミジ [®] ン-2-イルカルハ [®] セイルス [®] ル [®] フェイ [®] ル)-オートル [®] ア [®] ート・・・1.4%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ [®] イ、ネタルイ、ウリカワ、ミス [®] ガ [®] ヤツリ(東北)ヘラオモ [®] カ [®] (北海道)、ヒルムシロ、セリアオミ [®] ト [®] ロ [®] ・藻類による表層剥離	北海道	埴壇土～埴土 減水深2cm/日以下	移植後5～20日 (/ヒ [®] 2.5葉期 [®])	500ml	原液灌水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 テニ [®] ル [®] クロールを含む農薬の総使用回数2回以内 ヒ [®] リフ [®] チカル [®] ア [®] を含む農薬の総使用回数2回以内 ヘンソ [®] チアゾ [®] ールを含む農薬の総使用回数2回以内	大日本 [®] イ [®] ン [®] キ [®] 化学工業(株)、デ [®] ュ [®] ホ [®] ン(株)、(株)トクヤマ
						東北	埴壇土～埴土 減水深1.5cm/日以下				
テニ [®] ル [®] クロール [®] ・ヒ [®] リフ [®] チカル [®] ア [®] ・ヘンソ [®] ル [®] フロン [®] メチル [®] 水和剤	キンク [®] タ [®] ム [®] フロア [®] ル	2-クロール-N-(3-メトキシ-2-テニ [®] ル)-2',6'-ジ [®] メチルアセトアニリド・・・4.0% 0-3-tert-フ [®] チル [®] エニル=6-メトキシ-2-ヒ [®] リジ [®] ル(メチル)チオカルハ [®] マート・・・10.0% メチル=α-(4,6-ジ [®] メトキシヒ [®] リミジ [®] ン-2-イルカルハ [®] セイルス [®] ル [®] フェイ [®] ル)-オートル [®] ア [®] ート・・・1.0%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ [®] イ、ネタルイ、ウリカワ、ミス [®] ガ [®] ヤツリ、ヒルムシロ(北陸、九州を除く)、セリ(九州を除く)、アオミ [®] ト [®] ロ [®] ・藻類による表層剥離(関東・東山・東海、近	北陸	埴土～埴土 減水深2cm/日以下	移植後5～20日 (/ヒ [®] 2.5葉期 [®])	500ml	原液灌水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 テニ [®] ル [®] クロールを含む農薬の総使用回数2回以内 ヒ [®] リフ [®] チカル [®] ア [®] を含む農薬の総使用回数2回以内 ヘンソ [®] チアゾ [®] ールを含む農薬の総使用回数2回以内	大日本 [®] イ [®] ン [®] キ [®] 化学工業(株)、デ [®] ュ [®] ホ [®] ン(株)、(株)トクヤマ
						関東・東山・東海の早期栽培地帯	埴壇土～埴土 減水深1cm/日以下				
						関東・東山・東海、近	埴壇土～埴土				

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 地 用 帯	適 用 土 壌	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	登録会社
つづき					畿・中国・ 四国の普 通期)	東海の 普通期 栽培地 帯	減水深 1.5cm/ 日以下			数 2 回以内	
					近畿・ 中国・ 四国の 普通期 栽培地 帯	壤土 ～ 埴土	減水深 1.5cm/ 日以下				
					九州の 普通期 栽培地 帯	砂埴土 ～ 埴土	減水深 1cm/日 以下	移植後 5 ～ 15 日 (ノビエ2.5 葉期まで)			
イマゾスルフロ ン・タ・イムロン ・ヒ・リフ・チカ ル・メフェナ セット水和 剤	ロンゲットフロ アフル	1-(2-クロロイミダゾ [1,2-a]ピリジン- 3-イルスルホニル)-3-(4,6-ジメトキシピリミ ジン-2-イル)尿素 ・・・1.5% 1-(α , α -ジメチル ヘンソル)-3-(α - テトリル)尿素・・・ 18.0% 0-3-tert-ブチル フェニル-6-メトキシ-2- ヒ・リジル(メチル)チオカ ルハート・・・10.0% 2-ヘンソル・チアゾール- 2-イルオキシ-N-メチルア セトアニリド・・・8.0%	水 和 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツハ イ、オタ ルイ、ウ リカワ、 ミス、カ ヤツリ(北 海道を除 く)、ヘラ オモダカ (東北)、 ヒルムシ ロ(北海 道、東北 、関東・ 東山・東 海及び近 畿・中国 ・四国の 普通期)、 セリア オミト ロ、藻類 による表 層剥離(北 海道、関 東・東山 ・東海)	北海道	埴土 ～ 埴土	移植直後 ～ 15 日 (ノビエ2葉 期まで)	500ml	原液湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数 1 回 イマゾスルフロ ンを含む農薬 の総使用回 数 2 回以内 タ・イムロンを 含む農薬の 総使用回数 2 回以内 ヒ・リフ・チカ ルを含む農薬 の総使用回 数 2 回以内 メフェナセ トを含む農薬 の総使用回 数 2 回以内	武田薬品 工業(株) 日本ハ イ ル グ ロ ウ (株)、(株) エス・デー ー エス・イ オ テ ク、大日本 イ ン ク 化 学 工 業(株)
						東北	埴土 ～ 埴土	減水深 1cm/日 以下			
						北陸	埴土 ～ 埴土	減水深 1cm/日 以下			
						関東・ 東山・ 東海の 普通期 及び早 期栽培 地帯	埴土 ～ 埴土	移植直後 ～ 12 日 (ノビエ2葉 期まで)			
						近畿・ 中国・ 四国の 普通期 栽培地 帯	埴土 ～ 埴土	減水深 1.5cm/ 日以下			
						九州の 普通期 栽培地 帯	砂埴土 ～ 埴土	減水深 2cm/日 以下			
シハロネップ・ フ・チル・テニ ル・クロール・ヘ ン スルフロメチル 水和剤	ハ・ヒ・カ フロ アフル	フ・チル(R)-2-[4- (4-シアノ-2-フルオロ フェニル)フェニル]フ ロ ヒ・オナート・・・3.6% 2-クロロ-N-(3-メト キシ-2-フェニル)-2',6' -ジメチルアセトア ニリド・・・4.2% メチル= α -(4,6-シ	水 和 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツハ イ、オタ ルイ、ウ リカワ、 ミス、カ ヤツリ(東 北) ヘラオモ ダカ(北 海道)、 ヒルムシ ロ、セリ	北海道	埴土 ～ 埴土	移植後 5 ～ 25 日 (ノビエ3葉 期まで)	500ml	原液湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数 1 回 シハロネップ・フ ・チルを含む農 薬の総使用回 数 2 回以内	北興化学 工業(株) デ ュ キ ン (株)、(株) ト ク ヤ マ、日 本 農 薬 (株)
						東北	埴土 ～ 埴土	移植後 5 ～			

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用塩土	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
つづき		メトキシ・リミジ・ソ-2- イルカルハ・モイルスルファ イル)-o-トルアト... 1.4%			アオミ・ロ・ 藻類により表層剥 離(北海道)		減水深 1cm/日 以下	20日 (/ビ・エ2.5 葉期まで)		テニルコロルを 含む農業の 総使用回数 2回以内 ヘ・ソスルフロソメチル を含む農業 の総使用回 数2回以内	
シハロホッパ ア・チル・テニル クロール・ヘ・ソ スルフロソメチル 水和剤	ハ・ビ・カレ アフル	ア・チル=(R)-2-[4- (4-シアノ-2-フルオロ エノキシ)フェノキシ]ア ロ ビ・オート...3.6% 2-クロロ-N-(3-メトキ シ-2-テニル)-2',6' -ジ・メチルアセトア ニリト ...4.2% メチル=α-(4,6-ジ メトキシ・リミジ・ソ-2- イルカルハ・モイルスル ファイル)-o-トルアト... 1.0%	水和 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツハ・イ、 ホタルイ、ウリカ リ、ミズ・カヤ フリ、ヒルムシロ (北陸を除く)、セリ アオミ・ロ・ 藻類により表層剥 離	北陸 関東・ 東山・ 東海の 普通期 栽培地 帯	塩土 ～塩土 減水深 2cm/日 以下 減水深 1.5cm/ 日以下	移植後 5～ 20日 (/ビ・エ3葉 期まで)	500ml	原液湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 シハロホッパ・ア・チル を含む農業 の総使用回 数2回以内 テニルコロルを 含む農業の 総使用回数 2回以内 ヘ・ソスルフロソメチル を含む農業 の総使用回 数2回以内	北興化学 工業(株) テ・ヨ・ソ(株)、(株) トヤマ、日 本農業(株)
ヘ・ソトキサ ン水和剤	ヘ・タサ-45 7 ロフル	3-(4-クロロ-5-シクロ ヘ・ソチルオキシ-2-フル オロフェニル)-5-イソ プロ ピリデ-1,3-オキサ ゾリシ-2,4-ジ・オ ソ...8.6%	水和 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツハ・イ	東北 北陸	塩土 ～塩土 減水深 1.5cm/ 日以下 砂塩土 ～塩土 減水深 2cm/日 以下	植代時～ 移植前 4日 又は 移植直後 ～移植後 5日 (/ビ・エ1葉 期まで)	500ml	原液湛水散布 本剤及び ヘ・ソトキサ ンを含む農 業の総使用 回数2回以 内	科研製薬 (株)
ヘ・ソトキサ ン水和剤	ヘ・タサ-フロ アフル	3-(4-クロロ-5-シクロ ヘ・ソチルオキシ-2-フル オロフェニル)-5-イソ プロ ピリデ-1,3-オキサ ゾリシ-2,4-ジ・オ ソ...2.9%	水和 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツハ・イ	北海道 東北 北陸	塩土 ～塩土 減水深 2cm/日 以下 塩土 ～塩土 減水深 1.5cm/ 日以下 塩土 ～塩土 減水深 2cm/日 以下	植代後～ 移植前 4日 又は 移植直後 ～移植後 5日 (/ビ・エ 発生初期 まで)	500ml	原液湛水散布 本剤及び ヘ・ソトキサ ンを含む農 業の総使用 回数2回以 内	科研製薬 (株)、三 井東洋農 薬(株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
つづき						関東・東山・東海の普通期栽培地帯	埴壌土～埴土 減水深1cm/日以下				
						関東・東山・東海・近畿・中国・四国の早期栽培地帯	埴土～埴土 減水深1cm/日以下				
						近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	砂埴土～埴土 減水深1cm/日以下				
						九州の早期及び普通期栽培地帯					
ヘントキサゾ [®] 粒剤	ヘクサ-1キロ粒剤	3-(4-クロロ-5-シクロヘンチルオキシ-2-フルオロフェニル)-5-イソプロピリデン-1,3-オキサゾリジン-2,4-ジオン・・・1.5%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ [®] イ	北海道	埴壌土～埴土 減水深2cm/日以下	植代後～移植前4日又は移植直後～移植後5日	1kg	湛水散布 本剤及びヘントキサゾ [®] を含む農薬の総使用回数2回以内	科研製薬(株)、三井東圧農薬(株)
						東北	埴壌土～埴土 減水深1.5cm/日以下	(ノビエ発生始期まで)			
						北陸	埴土～埴土 減水深2cm/日以下				
						関東・東山・東海の普通期栽培地帯	埴壌土～埴土 減水深1cm/日以下				
						近畿・中国・四国の早期栽培地帯	埴土～埴土 減水深1cm/日以下				
						近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	砂埴土～埴土 減水深1cm/日以下				

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
つづき						九州の早期及び普通期栽培地帯					
タイムロン・ヘントキサゾン水和剤	テマカットフロアール	1-(α , α -ジメチルヘンソル)-3-(α -トリル)尿素・・・28.0% 3-(4-クロロ-5-シクロヘンチルオキシ-2-フルオロフェニル)-5-イソプロピルリチン-1,3-オキサゾリジン-2,4-ジオン・・・7.2%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ、イネ、タビ、ミズカヤツリ、ヘラオモタカ	北海道	砂壤土～埴土 減水深2cm/日以下 但し砂壤土では1.5cm/日以下	植代時～移植前4日又は移植直後～移植後5日 ($\text{H}^1\text{E}1$ 葉期まで)	500ml	原液湛水散布本剤のみを使用する場合の使用回数1回 タイムロンを含む農業の総使用回数2回以内 ヘントキサゾンを含む農業の総使用回数2回以内	科研製薬(株)、(株)エス・ディー・エス・アイ・エフ・エフ
						東北	埴土～埴土 減水深1.5cm/日以下				
						北陸、関東・東山・東海の早期及び普通期栽培地帯	埴土～埴土 減水深2cm/日以下				
						近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	砂壤土～埴土 減水深2cm/日以下				
						九州の普通期栽培地帯	埴土～埴土 減水深1cm/日以下				
タイムロン・ヘントキサゾン水和剤	草笛フロアール	1-(2-クロロヘンソル)-3-(1-メチル-1-フェニルエチル)クレブ・・・27.4% 3-(4-クロロ-5-シクロヘンチルオキシ-2-フルオロフェニル)-5-イソプロピルリチン-1,3-オキサゾリジン-2,4-ジオン・・・8.2%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ、イネ、タビ、ミズカヤツリ、ヘラオモタカ(北海道、東北)	全域の早期及び普通期栽培地帯	砂壤土～埴土 減水深2cm/日以下、但し近畿・中国・四国の普通期は1.5cm/日以下、近畿・中国・四国及び九州早期のは1cm/日以下	植代時～移植前4日又は移植直後～移植後5日 ($\text{H}^1\text{E}1$ 葉期まで、但し近畿以西は H^1E 発生始期まで)	500ml	原液湛水散布本剤のみを使用する場合の使用回数1回 タイムロンを含む農業の総使用回数2回以内 ヘントキサゾンを含む農業の総使用回数2回以内	科研製薬(株)、八洲化学工業(株)、丸紅(株)日産化学工業(株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10 a 当り使用量	使用方法	登録会社
クミロン・ヘントキサゾン剤	草笛シヤンホ	1-(2-クロロベンジル)-3-(1-メチル-1-フェニルエチル)ウレア・・・15.0% 3-(4-クロロ-5-シクロヘンチルオキシ-2-フルオロフェニル)-5-イソプロピルリチン-1,3-オキサゾリジン-2,4-ジオン・・・4.5%	剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ、イ、ミ、カ、ヤ、リ、ヘ、ラ、オ、モ、カ(北海道)	北海道東北、北陸	砂壤土～埴土 減水深2cm/日以下、 但し北海道では砂壤土は1.5cm/日以下	植代後～移植前4日又は移植直後～移植後5日 (ノビエ1葉期まで)	20個(1kg)	水田に投げ入れる本剤のみを使用する場合の使用回数1回 クミロンを含む農薬の総使用回数2回以内 ヘントキサゾンを含む農薬の総使用回数2回以内	科研製薬(株)、八洲化学工業(株)、丸紅(株)
						関東・東山・東海の早期栽培地帯	埴土～埴土 減水深1cm/日以下				
						関東・東山・東海の普通期栽培地帯	砂壤土～埴土 減水深2cm/日以下				
						近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	砂壤土～埴土 減水深1.5cm/日以下				
						九州の早期及び普通期栽培地帯	砂壤土～埴土 減水深1cm/日以下				
イマゾスルフロン・タライムロン・ヘントキサゾン水和剤	サ・ワソフロアール	1-(2-クロロイミダゾール[1,2-a]ピリジン-3-イルスルホニル)-3-(4,6-ジメチルピリジン-2-イル)尿素・・・1.7% 1-(α , α -ジメチルヘンチル)-3-(α -テトリル)尿素・・・28.0% 3-(4-クロロ-5-シクロヘンチルオキシ-2-フルオロフェニル)-5-イソプロピルリチン-1,3-オキサゾリジン-2,4-ジオン・・・7.3%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ、イ、ミ、カ、ヤ、リ、ヘ、ラ、オ、モ、カ(北海道、東北、北陸)、ヒルムシロ、セリ(九州を除く)、藻類による表層剥離(九州を除く)	北海道	砂壤土～埴土 減水深2cm/日以下、 但し砂壤土は1.5cm/日以下	移植直後～移植後10日 (ノビエ1.5葉期まで)	500ml	原液灌水散布又は水口施用 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 イマゾスルフロンを含む農薬の総使用回数2回以内 タライムロンを含む農薬の総使用回数2回以内 ヘントキサゾンを含む農薬の総使用回数2回以内	科研製薬(株)、武田薬品工業(株)、(株)エス・ディー・エス・エイ・オテック
						東北	埴土～埴土 減水深1cm/日以下				
						北陸	砂壤土～埴土 減水深2cm/日以下				

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10 a 当り使用量	使用方法	登録会社
つづく						関東・東山・東海の早期栽培地帯	砂壌土～埴土 減水深2cm/日以下、 但し砂壌土は1cm/日以下				
						関東・東山・東海の普通期栽培地帯	埴土～埴土 減水深2cm/日以下				
						近畿・中国・四国の早期、九州の早期及び普通期栽培地帯	埴土～埴土 減水深1cm/日以下				
						近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	砂壌土～埴土 減水深1.5cm/日以下				
イマゾスルフロン・タムロン・ベントキサゾン粒剤	サ・ワン1キロ粒剤	1-(2-クロロイミダゾール[1,2-a]ピリジン-3-イルスルホニル)-3-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イル)尿素・・・0.90% 1-(α , α -ジメチルベンジル)-3-(β -テトリル)尿素・・・15.0% 3-(4-クロロ-5-シクロベンチルオキシ-2-フルオロフェニル)-5-イソプロピルピリジン-2,4-ジエノ・・・3.9%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツハ、イネ、カワ、ミス、カヤツリ、ヘチマ、タカ(北海道、東北、北陸)、ヒルムシロ、セリ(九州を除く)、藻類による表層剥離(九州を除く)	北海道	砂壌土～埴土 減水深2cm/日以下、 但し砂壌土は1.5cm/日以下	移植直後～移植後10日 (/ヒエ1.5葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 イマゾスルフロンを含む農薬の総使用回数2回以内 タムロンを含む農薬の総使用回数2回以内 ベントキサゾンを含む農薬の総使用回数2回以内	科研製薬(株)、武田薬品工業(株)、(株)エス・ディー・エス・エイ・エフ・エフ
						東北、北陸	砂壌土～埴土 減水深2cm/日以下				
						関東・東山・東海の早期栽培地帯	砂壌土～埴土 減水深2cm/日以下、 但し砂壌土は1cm/日以下				

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	登録会社
つづく						関東・ 東山・ 東海の 普通期 栽培地 帯	壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下				
						近畿・ 中国・ 四国の 早期、 九州の 早期及 び普通 期栽培 地帯	壤土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下				
						近畿・ 中国・ 四国の 普通期 栽培地 帯	砂壤土 ～埴土 減水深 1.5cm/ 日以下				
ビ ^ラ ソ ^ス ル ^フ ロン ^エ チ ^ル ・ ^ハ ソ ^ト キ ^サ ソ ^ン 水和剤	スター ^ホ 顆 粒	エチル=5-(4,6-ジ ^メ トキシビ ^リ ミジ ^ン -2-イ ルカルハ ^モ イ ^ル スル ^フ ア ^モ イ ル)-1-メチル ^ビ ラ ^ソ ー ル-4-カルホ ^キ シラート・ ・・・3.2% 3-(4-クロロ-5-シクロ ヘ ^ン チルホ ^キ シ-2-フルオ ロフェニル)-5-イソ ^フ ロ ビ ^リ デ ^ン -1,3-オキサ ゾ ^リ ジ ^ン -2,4-ジ ^オ ン・・・50.0%	水和 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツハ ^イ 、 オタル ^イ 、ウリカ ワ、ミス ^カ ギ ヅリ、ヘラモ タ ^カ (北海 道、東北、 北陸)、ヒル ムシロ、セリ、ク ロガ ^{ワイ} 、オモ タ ^カ 、アオミ ト ^ロ ・藻類 による表 層剥離	北海道 東北、 北陸、 関東・ 東山・ 東海の 早期及 び普通 期栽培 地帯	砂壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下	移植直後 ～移植後 10日 (ノ ^ビ エ1.5 葉期 ¹ まで)	66g 希釈水量 500ml	湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 ビ ^ラ ソ ^ス ル ^フ ロ ン ^エ チ ^ル を含む 農薬の総使 用回数1回 ヘ ^ン トキ ^サ ソ ^ン を 含む農薬の 総使用回数 2回以内	科研製薬 (株)、日 産化学工 業(株)、 大塚化学 (株)
ビ ^ラ ソ ^ス ル ^フ ロン ^エ チ ^ル ・ ^ハ ソ ^ト キ ^サ ソ ^ン 粒剤	スター ^ホ 1キ ロ 粒剤	エチル=5-(4,6-ジ ^メ トキシビ ^リ ミジ ^ン -2-イ ルカルハ ^モ イ ^ル スル ^フ ア ^モ イ ル)-1-メチル ^ビ ラ ^ソ ー ル-4-カルホ ^キ シラート・ ・・・0.30% 3-(4-クロロ-5-シクロ ヘ ^ン チルホ ^キ シ-2-フルオ ロフェニル)-5-イソ ^フ ロ ビ ^リ デ ^ン -1,3-オキサ ゾ ^リ ジ ^ン -2,4-ジ ^オ ン・・・3.9%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツハ ^イ 、 オタル ^イ 、ウリカ ワ、ミス ^カ ギ ヅリ、ヘラモ タ ^カ (北海 道、東北、 北陸)、ヒル ムシロ、セリ、ク ロガ ^{ワイ} 、オモ タ ^カ 、アオミ ト ^ロ ・藻類 による表 層剥離	北海道 東北、 北陸、 関東・ 東山・ 東海の 早期及 び普通 期栽培 地帯	砂壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下	移植直後 ～移植後 10日 (ノ ^ビ エ1.5 葉期 ¹ まで)	1kg	湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 ビ ^ラ ソ ^ス ル ^フ ロ ン ^エ チ ^ル を含む 農薬の総使 用回数1回 ヘ ^ン トキ ^サ ソ ^ン を 含む農薬の 総使用回数 2回以内	科研製薬 (株)、日 産化学工 業(株)
シクロスル ^フ ア ム ロン ^エ チ ^ル ・ ^ハ ソ ^ト キ ^サ ソ ^ン 粒剤	ユート ^ビ ア粒 剤15	1-[2-(シクロ ^フ ロ ^ビ ルカルホ ^キ ニル)ア ^ニ リノスル ホニル]-3-(4,6-ジ ^メ トキシビ ^リ ミジ ^ン -2-イ ル)尿素・・・0.20% 3-(4-クロロ-5-シクロ ヘ ^ン チルホ ^キ シ-2-フルオ ロフェニル)-5-イソ ^フ ロ	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツハ ^イ 、 オタル ^イ 、ウリカ ワ、ミス ^カ ギ ヅリ、ヘラモ タ ^カ (北海 道、東北、	北海道 関東・ 東山・ 東海の 早期裁 培地帯	埴土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下	移植直後 ～移植後 10日 (ノ ^ビ エ1.5 葉期 ¹ まで)	3kg	湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 シクロスル ^フ ア ム ロンを含む農 薬の総使用回	科研製薬 (株)、日 本サイ ^イ ナ ^ミ ト ^ド (株)
						東北、	砂壤土				

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
つづく		ビ ^レ リテ ^ン -1, 3-オキサゾ ^リ ジ ^ン -2, 4-ジ ^ン オ ^ン ・・・1.5%			北陸)、ヒムシロ、セリ、アオミト ^ロ ・藻類による表層剥離	北陸・関東・東山・東海の普通期栽培地帯	～埴土 減水深 2cm/日以下			数1回 ヘ ^ン トキサ ^ン を含む農業の総使用回数 2回以内	
シクロスルファミロン・ヘ ^ン トキサ ^ン 粒剤	ユート ^レ ア ^レ 粒剤13	1-[2-(シクロ ^ロ ロ ^ロ ビ ^ロ ルカルホ ^ニ ル)ア ^ニ リノス ^ル ホ ^ニ ル]-3-(4, 6-ジ ^メ トキシ ^ビ リミ ^シ ン-2-イル)尿 ^素 ・・・0.20% 3-(4-クロ ^ロ -5-シクロ ^ロ ヘ ^ン ソ ^ル ホ ^ニ ル)-2-フル ^オ ロ ^ロ フェ ^ニ ル)-5-イソ ^フ ロ ^ロ ビ ^レ リテ ^ン -1, 3-オキサゾ ^リ ジ ^ン -2, 4-ジ ^ン オ ^ン ・・・1.3%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツ ^ハ イ、ネ ^タ ルイ、カリ ^ウ 、ミ ^ス カ ^キ 、フ ^リ 、ヒ ^ル ムシ ^ロ 、セ ^リ 、ア ^オ ミト ^ロ ・藻類による表層剥離	近畿・中国・四国の普通期栽培地帯 九州の普通期栽培地帯	埴土～埴土 減水深 1.5cm/日以下 砂埴土～埴土 減水深 1.5cm/日以下	移植直後～移植後10日 (ノ ^ビ エ1.5 葉期 [↑] ↓)	3kg	湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 シクロスルファミロンを含む農業の総使用回数1回 ヘ ^ン トキサ ^ン を含む農業の総使用回数2回以内	科研製薬(株)、日本サイアミッド(株)
フ ^ロ モ ^フ チ ^ト ・ヘ ^ン トキサ ^ン 水和剤	ショ ^キ ニ ^ー フ ^ロ フ ^ル	(RS)-2-フ ^ロ モ ^ニ -N-(α, α-ジ ^メ チ ^ル ヘ ^ン ソ ^リ ル)-3, 3-ジ ^メ チ ^ル フ ^ル チ ^ル ア ^ミ ト ^ロ ・・・18.0% 3-(4-クロ ^ロ -5-シクロ ^ロ ヘ ^ン ソ ^ル ホ ^ニ ル)-5-イソ ^フ ロ ^ロ ビ ^レ リテ ^ン -1, 3-オキサゾ ^リ ジ ^ン -2, 4-ジ ^ン オ ^ン ・・・4.0%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツ ^ハ イ、ネ ^タ ルイ	北海道 東北 北陸 九州の早期栽培地帯 近畿・中国・四国の普通期栽培地帯 九州の普通期栽培地帯 関東・東山・東海の普通期栽培地帯	埴土～埴土 減水深 2cm/日以下 埴土～埴土 減水深 1.5cm/日以下 砂埴土～埴土 減水深 2cm/日以下 砂埴土～埴土 減水深 1.5cm/日以下 砂埴土～埴土 減水深 2cm/日以下 埴土～埴土 減水深 2cm/日以下	移植直後～移植後7日 (ノ ^ビ エ1 葉期 [↑] ↓) 移植直後～移植後5日 (ノ ^ビ エ1 葉期 [↑] ↓)	500ml	原液湛水散布又は水口施用(関東・東山・東海の普通期栽培地帯) 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 フ ^ロ モ ^フ チ ^ト を含む農業の総使用回数1回 ヘ ^ン トキサ ^ン を含む農業の総使用回数2回以内	クミ ^イ 化学工業(株) 科研製薬(株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
タイムロン・ ヘントキサゾ ン粒剤	クサハ・ンチ1キ ロ粒剤	1-(α , α -ジメチル ヘンソ ¹ ル)-3-(α - ナトリル)尿素・・・ 15.0% 3-(4-クロロ-5-シクロ ヘンソ ¹ ル)-2-フルオ ロフェニル)-5-イソプロ ピリ ² ン-1,3-ビス ゾ ³ リ ⁴ ン-2,4-ジ ⁵ オ ン・・・2.0%	粒剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツハ ¹ イ、 ネタ ² ルイ、ヘラ ³ オ モ ⁴ ナ(北 海道、東 北、北陸)	北海道 東北 北陸・ 関東・ 東山・ 東海の 早期及 び普通 期栽培 地帯 近畿・ 中国・ 四国の 早期及 び普通 期栽培 地帯 九州の 早期及 び普通 期栽培 地帯	壇塩土 ～壇土 減水深 2cm/日 以下 砂壇土 ～壇土 減水深 2cm/日 以下 壇土 ～壇土 減水深 2cm/日 以下 壇土 ～壇土 減水深 1cm/日 以下 砂壇土 ～壇土 減水深 2cm/日 以下	移植直後 ～移植後 5日 (ノビ ¹ エ1葉 期 ¹ まで)	1kg	湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 タイムロン を 含む農薬の 総使用回数 2回以内 ヘントキサゾ ³ ンを 含む農薬の 総使用回数 2回以内	科研製薬 (株)、(株) エス・デー ・エス ¹ イ チ ² ヤ
タイムロン・ ビ ¹ リミ ² ハ ³ ッ クメチ ⁴ ル・ヘ ⁵ ン スル ⁶ フロン ⁷ メチ ⁸ ル ・メ ⁹ フェナセ ¹⁰ ット 粒剤	ア ¹ ロコン ² ビ ³ 1 キ ⁴ ロ粒剤51	1-(α , α -ジメチル ヘ ⁵ ンソ ⁶ ル)-3-(α - ナトリル)尿素・・・ 4.5% メチ ⁷ ル=2-(4,6-ジ ⁸ メ トキシ ⁹ ビ ¹⁰ リミ ¹¹ ン-2-イ ル ¹² オキシ)-6-(1-メトキ シイミノエチル)ヘ ¹³ ンソ ¹⁴ エ ー ¹⁵ ・・・0.45% メチ ¹⁶ ル= α -(4,6-ジ ¹⁷ メトキシ ¹⁸ ビ ¹⁹ リミ ²⁰ ン-2- イル ²¹ カル ²² ハ ²³ セ ²⁴ イル ²⁵ ス ²⁶ ル ²⁷ フ ²⁸ ア ²⁹ メ ³⁰ チ ³¹ ル)- オ ³² トル ³³ ア ³⁴ ート ³⁵ ・・・ 0.51% 2-ヘ ³⁶ ンソ ³⁷ チ ³⁸ ア ³⁹ ソ ⁴⁰ ール- 2-イル ⁴¹ オキシ ⁴² ン-メチ ⁴³ ル ⁴⁴ ア ⁴⁵ セ ⁴⁶ ト ⁴⁷ ア ⁴⁸ ニ ⁴⁹ ト ⁵⁰ ・・・4.5%	粒剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツハ ¹ イ ネタ ² ルイ、ウリ ³ カ ワ、ミ ⁴ ス ⁵ カ ⁶ ヤ ワ ⁷ リ、ヒ ⁸ ル ⁹ ム ¹⁰ シ ¹¹ ロ (北陸・九 州を除く)、セ ¹² リ ¹³ (九 州を除く)、ア ¹⁴ オ ¹⁵ ミ ¹⁶ ト ¹⁷ ロ ・藻類に よる表層 剥離(関 東・東山・ 東海)	北陸 関東・ 東山・ 東海の 普通期 栽培地 帯 近畿・ 中国・ 四国の 普通期 栽培地 帯 九州の 普通期 栽培地 帯	壇塩土 ～壇土 減水深 2cm/日 以下 壇塩土 ～壇土 減水深 1.5cm/ 日以下 砂壇土 ～壇土 減水深 2cm/日 以下 壇塩土 ～壇土 減水深 1cm/日 以下	移植後 5～ 20日 (ノビ ¹ エ3葉 期 ¹ まで)	1kg	湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 タイムロン を 含む農薬の 総使用回数 2回以内 ビ ¹ リミ ² ハ ³ ッ ⁴ ク ⁵ メ ⁶ チ ⁷ ル を含む農薬 の総使用回 数1回 ヘ ⁸ ンソ ⁹ ス ¹⁰ ル ¹¹ フ ¹² ロン ¹³ メ ¹⁴ チ ¹⁵ ル を含む農薬 の総使用回 数2回以内 メ ¹⁶ フェ ¹⁷ ナ ¹⁸ セ ¹⁹ ットを 含む農薬の 総使用回数 2回以内	ク ²⁰ ミ ²¹ ア ²² イ ²³ 化学 工業(株) デ ²⁴ ュ ²⁵ キ ²⁶ ン ²⁷ (株)
ア ¹ ジ ² ム ³ ス ⁴ ル ⁵ フ ⁶ ロ ン・ア ⁷ ジ ⁸ ム ⁹ ス ¹⁰ ル ¹¹ フ ¹² ロ ン・ビ ¹³ リミ ¹⁴ ハ ¹⁵ ッ クメチ ¹⁶ ル・ヘ ¹⁷ ン スル ¹⁸ フロン ¹⁹ メチ ²⁰ ル	ア ²¹ ロコン ²² ビ ²³ 1 キ ²⁴ ロ粒剤3 6	1-(4,6-ジ ²⁵ メトキシ ²⁶ ビ ²⁷ リミ ²⁸ ン-2-イル)- 3-[1-メチ ²⁹ ル-4-(2- メチ ³⁰ ル-2-ヒ ³¹ ドロ ³² ラ ³³ ジ ³⁴ ール -5-イル)ビ ³⁵ ラ ³⁶ ゾ ³⁷ ール-	粒剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツハ ¹ イ ネタ ² ルイ、ウリ ³ カ ワ、ミ ⁴ ス ⁵ カ ⁶ ヤ	北海道	壇塩土 ～壇土 減水深 2cm/日	移植後 5～ 25日 (ノビ ¹ エ3葉 期 ¹ まで)	1kg	湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回	ク ²⁰ ミ ²¹ ア ²² イ ²³ 化学 工業(株) デ ²⁴ ュ ²⁵ キ ²⁶ ン ²⁷ (株)

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稻刈後・畑作・野菜作・永年生作物・非農耕地対象

- 25 -

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適地	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
ハロスルフロンメチル・フ・ロジ・アミン水和剤	ク・ラトップ・L DF	メチル=3-クロロ-5-(4,6-ジ-メトキシ)リミジ-2-イルカルハ・モイルスルファモイル)-1-メチルヒ・ラジ-ル-4-カルホ・キシラト・・・12.0% 5-ジ・フ・ロヒ・ルアミノ- α , α , α -トリフルオロ-4,6-ジ-ニトロ-オ-トルイジ-ン・・・24.0%	水和剤	日本芝	一年生雑草			芝生育期(雑草発生前)	150~300ml 希釈水量 200~300 1	散布 本剤のみを使用する場合の使用回数2回以内 ハロスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数3回以内 フ・ロジ・アミンを含む農薬の総使用回数2回以内	日産化学工業(株)(株)エス・ディー・エス・ハ・イオテック
カフエストロール・ハロスルフロンメチル水和剤	サンシールド水和剤	既登録薬剤に同じ									(株)フ・ロ・ス
シノスルフロン水和剤	シハ・コップ顆粒水和剤	1-(4,6-ジ-メトキシ-1,3,5-トリアジ-2-イル)-3-[2-(2-メトキシエトキシ)フェニル]尿素・・・18.5%	水和剤	日本芝	一年生広葉雑草、一年生ササリク科雑草			芝生育期(春期~夏期)雑草発生初期	45~90g 希釈水量 200 1	雑草茎葉散布 本剤及びシノスルフロンを含む農薬の総使用回数1回	ノハ・ルティスフ・ロ(株)
MDBA粒剤	ハ・ン・ハ・ル-D粒剤	既登録薬剤に同じ									(株)エス・ディー・エス・ハ・イオテック
デニルクロール水和剤	クリヤート水和剤	2-クロロ-N-(3-メトキシ-2-テル)-2',6'-ジ-メチルアセトニル・・・50.0%	水和剤	日本芝	一年生イネ科雑草			芝生育期(春期雑草発生前)	300~500g 希釈水量 200~300 1	散布 本剤及びデニルクロールを含む農薬の総使用回数2回以内	(株)トクヤマ大日本イネ化学工業(株)
ジ・フルフェニカ・ン・トリフルラリン粉粒剤	カ・レ・スG	2',4'-ジ・フルオロ-2-(α , α , α -トリフルオロ-m-トリルオキシ)ニコチンアニリド・・・0.15% α , α , α -トリフルオロ-2,6-ジ-ニトロ-N,N-ジ・フ・ロヒ・ル-ハ・ラ-トルイジ-ン・・・2.0%	粉粒剤	小麦(秋播) 大麦(秋播)	畑地一年生雑草	全域(北海道を除く)	全土壌(砂土を除く)	播種後発芽前(雑草発生前)	4~5kg	全面土壌散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 ジ・フルフェニカ・ンを含む農薬の総使用回数1回 トリフルラリンを含む農薬の総使用回数1回	塩野義製薬(株)、ローネ・フ・ラ・ン油化フ・ロ(株)、タ・ウ・ケミカル日本(株)
DCMU・DPA・2,4PA粒剤	ロンタ・ヒッター粒剤	既登録薬剤に同じ									石原産業(株)
ハロスルフロンメチル・フ・ロヒ・サ・ミト水和剤	クサコ・ン水和剤	メチル=3-クロロ-5-(4,6-ジ-メトキシ)リミジ-2-イルカルハ・モイルスルファモイル)-1-メチルヒ・ラジ-ル-4-カルホ・キシラト・・・10.0% 3,5-ジ・クロロ-N-(1,1-ジ・メチル-2-フ・ロヒ・ニル)ヘ・ン・ス・アミト・・・40.0%	水和剤	日本芝(こうらいしば)	一年生雑草			芝生育期(雑草発生前)(春期) 芝生育期(雑草発生前)(秋期)	200~300g 希釈水量 200~300 1 150~300g 希釈水量 200~300 1	散布 本剤のみを使用する場合の使用回数2回以内 ハロスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数3回以内 フ・ロヒ・サ・ミトを含む農薬の総使用回数2回以内	フ・ロ・リト(株)、日産化学工業(株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
ク・リネサート リメシウム塩 液剤	草とりくん	トリメチルスルホニウム=N-(ネスホノメチル)ク・リシナ ート・・・0.45%	液 剤	公園・庭 園・駐車 場・道路 ・宅地・ 墓地等	一年生及 び多年生 雑草			雑草生育 期 (草丈50 cm以下)	原液100ml/ m ²	雑草茎葉散布 本剤及びク・ リネサートを含む 農薬の総使 用回数 3回以内	日本農業 (株)、セネ カ(株)
カルブチレート 粒剤	クサトルマン粒 剤	既登録薬剤に同じ									(株)エス・ ディー・エス ハ・イオテック
ジ・チオビ・ル 複合肥料	フ・ラントフ・ラ ス	S, S'-ジ・メチル=2- ジ・フルオロメチル-4-イソ プロピル-6-トリフルオロメ チルヒ・リジ・ン-3, 5- ジ・カルボ・チオアート・・・ 0.13%	粒 状	日本芝	一年生雑 草			芝生育期 (雑草発 生前)(春 期) 芝生育期 (雑草発 生前)(秋 期)	30～60kg 40～60kg	全面土壌散布 本剤及びジ・ チオビ・ルを含む 農薬の総使 用回数 2回以内	日産化学 工業(株) アグ・リート(株)
クロルフラリム・ レナシル複合 肥料	ハ・シット	N-(4-クロロフェニル)- 1-シクロヘキセン-1, 2- ジ・カルボ・キシミト・・・ 0.40% 3-シクロヘキシル-5, 6- トリメチレンウラシル・・・ 0.40%	粒 状	日本芝	一年生雑 草			秋期雑草 発生前(芝 生育期)	30～50kg	全面土壌散布 本剤のみを使用する場 合の使用回数 1回 クロルフラリムを 含む農薬の 総使用回数 2回以内 レナシルを 含む農薬の 総使用回数 2回以内	三菱化学 (株)
ク・リネサートイ ソフ・ロビ・ルア ミン塩・MDB Aイソフ・ロビ ルアミン塩液 剤	タ・フ・ルキラー	イソフ・ロビ・ルアミンニウム =N-(ネスホノメチル)ク・ リシナート・・・20.0% 2-メトキシ-3, 6-ジ・ク ロロ安息香酸イソフ・ ロビ・ルアミン・・・10.0%	液 剤	公園・庭 園・堤と う・駐車 場・道路 ・運動場 ・宅地・ 鉄道等	一年生及 び多年生 雑草			雑草生育 期	750～1000 ml 希釈水量 100 l	雑草茎葉散布 本剤のみを使用する場 合の使用回数 3回以内 ク・リネサートを 含む農薬の 総使用回数 3回以内 MDBAを 含む農薬の 総使用回数 3回以内	(株)マルセ ン化工
ク・リネサートイ ソフ・ロビ・ルア ミン塩液剤	ラウント・ア ブ・ライトロー ト	既登録薬剤に同じ									日本モンサ ント(株)
ク・リネサートイ ソフ・ロビ・ルア ミン塩液剤	クサクリン液 剤	既登録薬剤に同じ									宇都宮化 成工業(株)