

新 登 録 除 草 剤 一 覧

農林水産省農産園芸局植物防疫課

平成10年4月1日～平成10年10月31日

(1) 移植水稻

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
クロマブ ロップ・テニクロール水和剤	ターシャットフロアブル	(RS)-2-(2,4-ジクロロ- <i>m</i> -トリメチルシ)プロピオンニトリド・・・6.0% 2-クロロ-N-(3-メチル-2-テニクロール)-2',6'-ジメチルピペリジン・・・4.0%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草及びワタバ、オシロイ	北海道近畿・中国・四国・九州の普通期栽培地帯	壤土～埴土 減水深1.5cm/日以下 但し、九州は1cm/日以下	移植直後～移植後10日(ヒエ1.5葉期まで)	500ml	原液湛水散布本剤のみを使用する場合の使用回数1回 クロマブ ロップを含む農薬の総使用回数2回以内 テニクロールを含む農薬の総使用回数2回以内	ロース・ブーラン油化アグロ(株)、日産化学工業(株)、(株)トクマ
						東北、北陸	埴壤土～埴土 減水深1.5cm/日以下				
						関東・東山・東海の普通期栽培地帯	壤土～埴土 減水深2cm/日以下	移植直後～移植後5日(ヒエ1葉期まで)			
エトキシスルホン・ピラゾレート・プレチラクロール粒剤	トップランキ剤	1-(4,6-ジメチルピリミジン-2-イル)-3-(2-エトキシフェニル)スルホン尿素・・・0.21% 4-(2,4-ジクロロペンゾイル)-1,3-ジメチル-5-ピラゾリルピロリン酸三エチル・・・12.0% 2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(2-プロポキシエチル)アセトアニリド・・・4.5%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びワタバ、ワカワ、ミズカヤツリ、ヘオモダカ(北海道、東北)、ヒルムロ(北陸、近畿・中国・四国の早期を除く)、セリ(九州の普通期を除く)、アオミドロ・藻類による表層剥離(北海道、近畿・中国・四国の普通期)	北海道	壤土～埴土 減水深2cm/日以下	移植後3～13日(ヒエ1.5葉期まで)	1kg	湛水散布本剤のみを使用する場合の使用回数1回 エトキシスルホンを含む農薬の総使用回数1回 ピラゾレートをを含む農薬の総使用回数1回 プレチラクロールを含む農薬の総使用回数2回以内	アグロバシヤン(株)
						東北	壤土～埴土 減水深1.5cm/日以下				
						北陸	埴壤土～埴土 減水深1cm/日以下	移植後3～16日(ヒエ2葉期まで)			
						関東・東山・東海の普通期栽培地帯	砂壤土～埴土 減水深2cm/日以下	移植後3～12日(ヒエ2葉期まで、但し、砂壤土はヒエ1.5葉期まで)			
						近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	砂壤土～埴土 減水深1cm/日以下	移植後3～11日(ヒエ2葉期まで)			

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
つづき						九州の普通期栽培地帯	壇壊土～壇土 減水深1cm/日以下				
						近畿・中国・四国の早期栽培地帯	壇土～壇土 減水深1cm/日以下	移植後3～16日 (ビエ3葉期まで)			
						九州の早期栽培地帯	砂壊土～壇土 減水深1cm/日以下				
テニクロール・ビリアチカル・ア・ペンシル・フロンザル水和剤	キングダム7 ロアブル	既登録薬剤に同じ									石原産業(株)
テニクロール・ビリアチカル・ア・ペンシル・フロンザル水和剤	キングダムL ロアブル	既登録薬剤に同じ									石原産業(株)
シロホップ・ア・チル・テニクロール・ア・ペンシル・フロンザル粒剤	バズーカ1キ ロ粒剤51	アチル(R)-2-[4-(4-シアノ-2-フルオロフェニル)フェニル]プロピオート...1.8% 2-クロロ-N-(3-メキシ-2-テール)-2',6'-ジメチルセトアニリド...2.1% アチル=α-(4,6-ジメチルピリミジン-2-イル)カルバモイルメスアモイル)-オートメート...0.51%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びワツバイ、オカ、ウカ、ミズカ、ツツ、ヒムシ(北陸を除く)、セ、アミ、ロ、藻類による表層剥離(北陸、九州を除く)	北陸	壇壊土～壇土 減水深1cm/日以下	移植後5～20日 (ビエ3葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 シロホップ・アチルを含む農薬の総使用回数2回以内 テニクロールを含む農薬の総使用回数2回以内 ペンシル・フロンザルを含む農薬の総使用回数2回以内 但し、近畿・中国・四国の普通期は湛水散布又は湛水周縁散布	日本農業(株)、デュボン(株)、(株)トクヤマ、北興化学工業(株)
アジメスフロ・ン・シロホップ・アチル・テニクロール・ペンシル・フロンザル粒剤	バズーカA1 キ粒剤36	1-(4,6-ジメチルピリミジン-2-イル)-3-[1-メチル-4-(2-メチル-2H-テトラゾール-5-イル)ピラゾール-5-イル]ホウ酸尿素...0.060% アチル(R)-2-[4-(4-シアノ-2-フルオロフェニル)フェニル]プロピオート...1.8% 2-クロロ-N-(3-メキシ-2-テール)-2',6'-ジメチルセトアニリド	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びワツバイ、オカ、ウカ、ミズカ、ツツ(東北)、ヒムシ、セリ、アミ、ロ、藻類による表層剥離(北海	北海道	壇土～壇土 減水深2cm/日以下	移植後5～25日 (ビエ3葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 アジメスフロを含む農薬の総使用回数1回 シロホップ・アチルを含む農薬の総使用回数2回以内 テニクロールを	日本農業(株)、デュボン(株)、(株)トクヤマ、北興化学工業(株)
						東北	壇壊土～壇土 減水深1.5cm/日以下	移植後5～20日 (ビエ3葉期まで)			

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
つづき		・・・2.1% メチル-α-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イル)カルバモイルスルファモイロートルアト・・・ 0.30%			道)					含む農薬の総使用回数2回以内 ベンシルフロンザルを含む農薬の総使用回数2回以内 但し、北海道は湛水散布又は湛水周縁散布	
カフェンストロール・ピラゾレート・プロモブチル粒剤	ナイスジョット・ジヤンボ	N, N-ジエチル-3-メチルスルホニル-1H-1,2,4-トリアゾール-1-カルバモキサイド・・・4.2% 4-(2,4-ジクロロベンゾイル)-1,3-ジメチル-5-ピラゾリル-プロトエンスルホネート・・・ 18.0% (RS)-2-プロモ-N-(α, α-ジメチルベンジル)-3,3-ジメチル-7-チルアト・・・ 18.0%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバノオタカイ、ウリカワ(関東・東山・東海を除く)	北海道 関東・東山・東海及び近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	壤土～埴土 減水深1cm/日以下	移植後3～10日 (ヒトエ1.5葉期まで)	10個(500g)	水田に投げ入れる 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 カフェンストロールを含む農薬の総使用回数1回 ピラゾレートを含む農薬の総使用回数1回 プロモブチルを含む農薬の総使用回数1回	三共(株)
						北陸	埴壤土～埴土 減水深1cm/日以下				
						東北、九州の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～埴土 減水深1cm/日以下				
カフェンストロール・ピラゾルスルホンエチル粒剤	テクノスター・ジヤンボ	N, N-ジエチル-3-メチルスルホニル-1H-1,2,4-トリアゾール-1-カルバモキサイド・・・7.0% エチル-5-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イル)カルバモイルスルファモイロートル-1-ピラゾール-4-カルバモキサイド・・・ 0.70%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバノオタカイ、ウリカワ、ミズガキツリ、ヒメシロ、セリ	関東・東山・東海の普通期栽培地帯	壤土～埴土 減水深1cm/日以下	移植後5～10日 (ヒトエ2葉期まで)	10個(300g)	水田に投げ入れる 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 カフェンストロールを含む農薬の総使用回数1回 ピラゾルスルホンエチルを含む農薬の総使用回数1回	日産化学工業(株)、永光化成(株)

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稻刈後・畑作・野菜作・永年生作物・非農耕地対象

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
DCMU粉粒剤	グリン微粒剤	既登録薬剤に同じ									タダ園芸(株)
グリンネット・フラザスルホン水和剤	ツバサ顆粒水和剤	アンニウム-DL-ホモアラニン-4-イル(メチル)ホスファイト・・・20.0% 1-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イル)-3-(3-トリフルオロメチル-2-ピリジン)スルホニル	水和剤	ぶどう	一年生及び多年生雑草			春期雑草生育期(草丈20cm以下) 収穫30日前まで	250～400g 希釈水量100～150 l	雑草茎葉散布 本剤のみを使用する場合の使用回数2回以内 グリンネットを含む農薬の	石原産業(株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適地	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
つづき		) 尿素・・・1.3%		桑園				春期萌芽前 夏切り後萌芽前 雑草生育期 (草丈20cm以下)	250～350g 希釈水量 100～150 l	総使用回数 3回以内 アザスロンを含む農薬の 総使用回数 2回以内	
				公園・庭園・堤とう・駐車場・運動場・宅地・鉄道・のり面等	一年生及び多年生雑草(大型多年生イネ科雑草を除く)			雑草生育期 (草丈30cm以下)	400～600g 希釈水量 100～150 l		
クレトジム乳剤	セレクト乳剤	(±)-(2E)-[1-(3-クロロアリルオキシメチル)プロピル]-5-(2-エチルオキシプロピル)-3-ヒドロキシクロヘキサン-2-エノール・・・23.0%	乳剤	小豆	畑地一年生イネ科雑草	北海道		雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期) 収穫45日前まで	35～50ml 希釈水量 100 l	雑草茎葉散布 本剤及びクレトジムを含む農薬の 総使用回数 1回	住友化学工業(株)、(株)トメソン
				てんさい				雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期) 収穫30日前まで			
キサロップ エマル水和剤	ボムフロアブル	エチル(RS)-2-[4-(6-クロロキリジン-2-イルオキシ)フェニル]-2-プロピオート・・・7.0%	水和剤	大豆	畑地一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)	北海道		雑草生育期 (イネ科雑草3～6葉期) 収穫60日前まで	200～300ml 希釈水量 100 l	雑草茎葉散布 本剤及びキサロップエマルを含む農薬の 総使用回数 1回	日産化学工業(株)、日本農薬(株)
				小豆、いんげんまめ				雑草生育期 (イネ科雑草3～6葉期) 収穫50日前まで			
				てんさい				雑草生育期 (イネ科雑草3～6葉期) 収穫30日前まで			
プロジアシン 水和剤	コラスタフロアブル	5-ジプロピルアミノ- α , α , α -トリフルオロ-4,6-ジニトロ-2-トリス(ジメチルアミノ)・・・41.0%	水和剤	日本芝	一年生雑草(キク科を除く)			雑草発生前(芝生育期)	80～160ml 希釈水量 200～300 l	全面土壌散布 本剤及びプロジアシンを含む農薬の 総使用回数 2回以内	バクテックス(株)
				西洋芝 (ハントグラス、スプルーグ、ラスバーム、ダグラス)	春期雑草発生前(芝生育期)						
オレハネカーブ乳剤	ホレロン90乳剤	S-(2-クロロベンジル)-N,N-ジエチルホスホロート・・・90.0%	乳剤	日本芝(こららいしば)	一年生イネ科雑草			雑草発生前	600～900ml 希釈水量	全面土壌散布 本剤及びホレロン90を	クアイ化学工業(株)、(株)理

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 地 用 帯	適 土 用 壤	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	登録会社
つづき									200～300 1	含む農薬の 総使用回数 3回以内	研ク・リン
オルホベンカー ブ・シアジ ン乳剤	ランリト [®] C 乳剤	S-(2-クロロベンジル)- N,N-ジエチルホス ホメート...50.0% 2-(4-クロロ-6-エチル フェニル)-1,3,5-トリア ジノ-2-イミダゾリ ン-2-イミダゾリ ン...1.5%	乳 剤	日本芝	一年生雑 草			雑草発生 前～発生 初期	800～ 1200ml 希釈水量 200～300 1	全面土壌散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数2回以内 オルホベンカー ブを含む農薬 の総使用回 数3回以内 シアジンを 含む農薬の 総使用回数 2回以内	(株)理研 グリーン
トリクロ [®] ル 粉粒剤	家庭園芸 用ザイトロン 微粒剤	既登録薬剤に同じ									保土谷 グロス(株)
DCBN粒剤	ペンボ [®] ール 粒剤	既登録薬剤に同じ									タカ [®] 園芸 (株)
グリホサート ソ [®] ロビ [®] ル シ塩液剤	草枯らし	既登録薬剤に同じ									三共(株)
イマザモックス アンモニウム塩 液剤	バ [®] ラ [®] カイ ザ [®] ー液剤	アンモニウム=2-(4-イ ソプロピル)-4-メチル-5- チゾロ-2-イミダゾリ ン-2-イル)-5-メチル チゾロニチナート... 0.85%	液 剤	小豆	畑地一年 生広葉雑 草	北海道	全土壌 (但し 砂土を 除く)	出芽直前 ～出芽始 (雑草発 生始期)	200～300ml 希釈水量 100 1	雑草茎葉散布 兼土壌散布 本剤及びイ マザモックスア ンモニウム塩 を含む農薬の 総使用回数1回	日本サイテ ック(株)
グ [®] ル [®] シ [®] ネ [®] ト 液剤	ザ [®] ッ [®] ソ [®] ジ 液剤	アンモニウム=DL-ホモアラ ニン-4-イル(チ [®] ル)ホス フナート...0.17%	液 剤	公園・庭 園・堤と う・駐車 場・道路 ・宅地・ のり面等	一年生及 び多年生 雑草			雑草生育 期	原液100ml/ m ²	雑草茎葉散布 本剤及び グ [®] ル [®] シ [®] ネ [®] ト を含む農薬の 総使用回数 3回以内	ア [®] グ [®] レ [®] ボ [®] ン ヤ [®] ン(株)
シアジ [®] ン・D CBN粒剤	カルコン粒 剤	2-(4-クロロ-6-エチル フェニル)-1,3,5-トリア ジノ-2-イミダゾリ ン-2-イミダゾリ ン...10.0% 2,6-ジクロロベン ゼン...5.0%	粒 剤	公園・庭 園・駐車 場・道路 ・運動場 ・宅地等	一年生及 び多年生 雑草(但 しススキ 、チガヤ を除く)			雑草生育 期 (草丈30 cm以下)	10～20kg (10～ 20g/m ²)	全面土壌散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数2回以内 シアジンを 含む農薬の 総使用回数 2回以内 DCBNを 含む農薬の 総使用回数 3回以内	日産化学 工業(株)
トリクロ [®] ル 液剤	家庭園芸 用ザイトロン アミン液剤	既登録薬剤に同じ									保土谷 グロス(株)
カフエントロー ル水和剤	ハイ [®] ト [®] グ [®] ラ フ [®] ル	N,N-ジエチル-3-メ チルホスホニル-1H-1,2 ,4-トリアゾール-1-カ ルボキサミド... 40.0%	水 和 剤	日本芝	一年生イ ネ科雑草			雑草発生 前	250～500ml 希釈水量 200～300 1	全面土壌散布 本剤及び カフエントロー ルを含む農薬 の総使用回数 2回以内	永光化成 (株)、日 産化学工 業(株)