

新 登 録 除 草 剤 一 覧

農林水産省農産園芸局植物防疫課
平成10年11月1日～平成11年3月31日

(1) 移植水稻

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
テニクロール・ベンスルフロンメチル・ベンゾフェナップ水和剤	ステップフロアブル	2-クロロ-N-(3-メトキシ-2-テニル)-2',6'-ジメチルアセトアニリド・・・5.0% メチル=α-(4,6-ジメトキシ)リミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-o-トルア-ト・・・1.4% 2-[4-(2,4-ジクロロ-m-トルオイル)-1,3-ジメチルピラゾール-5-イルオキシ]-4'-メチルアセトフェノール・・・10.0%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバ、オカ、ウリカ、ヒロムシ、ササ、アオミドロ・藻類による表層剥離	北海道	壤土～埴土 減水深1.5cm/日以下	移植後3～15日(1ピエ2葉期まで)	500ml	原液湛水散布本剤のみを使用する場合の使用回数1回 テニクロールを含む農業の総使用回数2回以内 ベンスルフロンメチルを含む農業の総使用回数2回以内 ベンゾフェナップを含む農業の総使用回数1回	北興化学工業(株)、日本農業(株)、デューボン(株)、(株)トヤマ、ロース・ブーラン油化アグロ(株)
エスプロカルブ・ベンスルフロンメチル水和剤	オートフロアブル	S-ベンジール=1,2-ジメチルプロピル(エチル)チオカルバマート・・・30.0% メチル=α-(4,6-ジメトキシ)リミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-o-トルア-ト・・・1.4%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバ、オカ、ウリカ、ミズガヤツリ(東北)、ヒロムシ(北海道)、ササ、アオミドロ・藻類による表層剥離(北海道)	北海道	壤土～埴土 減水深2cm/日以下	移植後7～20日(1ピエ2.5葉期まで)	500ml	原液湛水散布本剤のみを使用する場合の使用回数1回 エスプロカルブを含む農業の総使用回数1回 ベンスルフロンメチルを含む農業の総使用回数2回以内	ゼネラル(株)、デューボン(株)、日本農業(株)
エスプロカルブ・ベンスルフロンメチル水和剤	オートフロアブル	S-ベンジール=1,2-ジメチルプロピル(エチル)チオカルバマート・・・30.0% メチル=α-(4,6-ジメトキシ)リミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-o-トルア-ト・・・1.0%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバ、オカ、ウリカ、ミズガヤツリ、ヒロムシ(関東・東山・東海の普通期及び早期、九州の普通期)、ササ、アオミドロ・藻類による表層剥離(関東・東山・東海の普通期及び早期、近畿・中国・四国の普通期)	北陸・関東・東山・東海の早期栽培地帯	埴土～埴土 減水深1cm/日以下	移植後7～15日(1ピエ2.5葉期まで)	500ml	原液湛水散布本剤のみを使用する場合の使用回数1回 エスプロカルブを含む農業の総使用回数1回 ベンスルフロンメチルを含む農業の総使用回数2回以内	ゼネラル(株)、デューボン(株)、日本農業(株)
シメトリン・ベンチオグ・メフェナセットMCPB粒剤	クミョットSM1キロ粒剤	2-メチルチオ-4,6-ビス(エチルアミノ)-s-トリアジン・・・4.5% S-(4-クロロベンジル)-N,N-ジエチルチオカルバマート・・・15.0% 2-ベンジラチン-2-イルオキシ-N-メチルア	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバ、オカ、ウリカ、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ヘラオモダ	北海道	壤土～埴土 減水深1.5cm/日以下	移植後15～25日(1ピエ3.5葉期まで)	1kg	湛水散布本剤のみを使用する場合の使用回数1回 シメトリンを含む農業の総使用回数2回	クミイ化学工業(株)
						近畿・	砂壤土	移植後			

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
つづき		セトアニリド・・・4.5% 2-メチル-4-クロロフェノキシ酢酸エチル・・・2.4%			カ(北海道)、アオミドロ・藻類による表層剥離	中国・四国の普通期栽培地帯	～埴土 減水深 2cm/日以下	15～20日 (ビイ3葉期まで)		以内 ベンチホ-ブを含む農薬の総使用回数1回 メネットを含む農薬の総使用回数2回以内 MCPBを含む農薬の総使用回数2回以内	
						九州の早期栽培地帯	砂壤土～埴土 減水深 1.5cm/日以下	移植後 15～25日 (ビイ3.5葉期まで)			
					水田一年生雑草及びマツバ、オシロイ、ウリカ、ミズガヤリ(北海道を除く)、ヘラモダカ(北海道、東北)、アオミドロ・藻類による表層剥離	北海道	埴土～埴土 減水深 2cm/日以下、但し、埴土は1.5cm/日以下	移植後 20～30日 (ビイ2.5葉期まで) (田植え前後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用)			
						東北	埴土～埴土 減水深 1cm/日以下				
						北陸	埴土～埴土 減水深 1.5cm/日以下	移植後 20～30日 (ビイ2葉期まで) (田植え前後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用)			
						関東・東山・東海、近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	砂壤土～埴土 減水深 2cm/日以下	移植後 20～30日 (ビイ3葉期まで) (田植え前後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用)			
						九州の早期栽培地帯	砂壤土～埴土 減水深 1.5cm/日以下				
ブタコロル乳剤	マ-シエット乳剤	2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(7-トキシメチル)アセトアニリド・・・32.0%	乳剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバ、オシロイ、ミズガヤリ(東北、北陸)、ヘラモダカ(北海道)	北海道、東北、北陸、関東・東山・東海の普通期栽培地帯	埴土～埴土 減水深 2cm/日以下	植代直後(移植4日前まで)	450～500ml	原液湛水散布 本剤及びブタコロルを含む農薬の総使用回数1回	日本モンサント(株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
つづき						近畿・中国・四国、九州の普通期栽培地帯			350～500ml		
ジメトリン・ビラゲレート・ブチクロール・プロメチド粒剤	スラッシュ1粒剤	2-メチルチオ-4-エチルアミノ-6-(1,2-ジメチルプロピル)アミノ-8-トリアジン-0.60% 4-(2,4-ジクロロベンゾイル)-1,3-ジメチル-5-ヒドロキシピリロ-ピートルエンズルホネート...12.0% 2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(2-プロポキシエチル)アセトアニリド...4.5% (RS)-2-プロポキシ-N-(α , α -ジメチルベンジル)-3,3-ジメチルプロピルアミド...6.0%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバ、オタリ、ウリカ、ミズガヤツリ、ヘラモダカ(東北)、ヒルムシロ(東北、北陸、九州の早期を除く)、セリ(近畿・中国・四国)、アオミドロ・藻類による表層剥離(九州の普通期を除く)	東北	壤土～埴土 減水深1cm/日以下	移植直後～移植後10日 (ビイ葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 ジメトリンを含む農薬の総使用回数2回以内 ビラゲレートを含む農薬の総使用回数1回 ブチクロールを含む農薬の総使用回数2回以内 プロメチドを含む農薬の総使用回数1回	三共(株)
						北陸	埴壤土～埴土 減水深1.5cm/日以下				
						関東・東山・東海の普通期栽培地帯	壤土～埴土 減水深2cm/日以下				
						関東・東山・東海の早期栽培地帯	埴壤土～埴土 減水深1cm/日以下				
						近畿・中国・四国、九州の普通期栽培地帯	砂壤土～埴土 減水深2cm/日以下				
						九州の早期栽培地帯	砂壤土～埴土 減水深1cm/日以下				
ダィムロン・テニクロール水和剤	ショウカ・プロアブル	1-(α , α -ジメチルベンジル)-3-(パラトリル)尿素...28.0% 2-(クロロ-N-(3-メトキシ-2-テニル-2',6'-ジメチルアセトアニリド)...4.0%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバ、オタリ、ウリカ、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ヘラモダカ(北海道)	北海道	砂壤土～埴土 減水深2cm/日以下、但し、砂壤土は1.5cm/日以下	植代後～移植前4日 または 移植直後～移植後5日 (ビイ葉期まで)	500ml	湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 ダィムロンを含む農薬の総使用回数2回以内 テニクロールを含む農薬の総使用回数2回以内	(株)エス・ディー・エス バイテック、 (株)トヤマ
						東北	砂壤土～埴土 減水深1.5cm/日以下				
						北陸	埴壤土				

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
つづき							～埴土 減水深 2cm/日 以下				
						関東・東山・東海の普通期栽培地帯	砂壤土～埴土 減水深 2cm/日 以下				
						関東・東山・東海の早期栽培地帯	埴土～埴土 減水深 1cm/日 以下				
						近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	埴土～埴土 減水深 1.5cm/日 以下				
						九州の普通期栽培地帯	砂壤土～埴土 減水深 1cm/日 以下				
						九州の早期栽培地帯	砂壤土～埴土 減水深 1cm/日 以下				
ブレチアロール・ベンゾフェナップ水和剤	チョップフロアール	2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(2-プロポキシエチル)アゼトアニリド・・・5.0% 2-[4-(2,4-ジクロロ-メトキシ)-1,3-ジメチルピラゾール-5-イルオキシ]-4'-メチルアゼトフェン・・・12.0%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバイ、オシロイ	関東・東山・東海の普通期栽培地帯	埴土～埴土 減水深 2cm/日 以下	植代後～移植前 4日 (移植後に使用する除草剤との体系で使用)	500ml	原液湛水散布本剤のみを使用する場合の使用回数1回 ブレチアロールを含む農薬の総使用回数2回以内 ベンゾフェナップを含む農薬の総使用回数1回	北興化学工業(株)、ロース・ブーラン油化アグロ(株)
						近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	埴土～埴土 減水深 1.5cm/日 以下				
						九州の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～埴土 減水深 2cm/日 以下 但し、普通期は1cm/日以下				
						北海道	埴土～埴土 減水深 2cm/日	移植直後～移植後5日 (1/1葉			

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
つづき							以下	(移植後に使用する除草剤との体系で使用)			
						東北	埴壌土～埴土 減水深1.5cm/日以下				
						北陸	埴壌土～埴土 減水深1cm/日以下				
						関東・東山・東海の普通期栽培地帯	埴土～埴土 減水深2cm/日以下				
						近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	埴土～埴土 減水深1.5cm/日以下				
						九州の普通期及び早期栽培地帯	砂壌土～埴土 減水深2cm/日以下 但し、普通期は1cm/日以下				
シロスルファミロン・ベントキザン粒剤	ユトビ・アキロ粒剤	1-[2-(シクロプロピルカルボニル)アミノ]スルホニル-3-(4,6-ジメチルピリミジン-2-イル)尿素・0.60% 3-(4-クロロ-5-シロベンチルオキシ-2-フルオロフェニル)-5-イソプロピリデン-1,3-ビス(4-ジメチルピリジン-2,4-ジオン)・4.5%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバ、オシロイ、ウリカワ、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ヘラセグサ(北海道)、ヒルムシロ(北海道、東北、関東・東山・東海)、アミドロ・藻類による表層剥離(東北、北陸を除く)	北海道	砂壌土～埴土 減水深2cm/日以下 但し、砂壌土は1.5cm/日以下	移植直後～移植後10日 (1/1.5葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 シロスルファミロンを含む農薬の総使用回数1回 ベントキザンを含む農薬の総使用回数2回以内	日本サイファミッド(株)、科研製薬(株)
						東北	埴壌土～埴土 減水深1.5cm/日以下				
						北陸	埴土～埴土 減水深2cm/日以下				
						関東・東山・東海の普通期	砂壌土～埴土 減水深				

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
つづき						栽培地帯	2cm/日以下				
						関東・東山・東海の早期栽培地帯	砂壤土～埴土 減水深1cm/日以下				
						近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	埴土～埴土 減水深1.5cm/日以下				
アジメスフロ ン・ジメタト リン・ブレチ アクロル・ベン スフロンメチ ル粒剤	ワイドリ-A1 粒剤36	既登録薬剤に同じ									デューボン(株)

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稻刈後・畑作・野菜作・永年生作物・非農耕地対象

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
シエロン水和剤	デュバサン	既登録薬剤に同じ									丸和バイケミカル(株)
アクロル乳剤	ハブロン乳剤	2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(メキシチル)アセトニリド・・・43.0%	乳剤	日本芝(こらいしば)	畑地一年生雑草		全土壌	春期雑草発生前	600～1000 ml 希釈水量250 l	全面土壌散布 本剤のみを使用する場合の使用回数2回以内 アクロルを含む農薬の総使用回数2回以内	日本モサント(株)、(株)理研グリーン
								秋期雑草発生前	600～1200 ml 希釈水量250 l		
カルブチレート水和剤	バックアップフロアブル	3-(3,3'-ジメチルワイド)フェニル-N-メチル-N-ブチルカルバマート・・・45.0%	水和剤	公園・庭とう・駐車場・道路・運動場・宅地・鉄道・のり面等	一年生及び多年生雑草			雑草生育期(草丈30cm以下)	1～2 l 希釈水量200 l	雑草茎葉散布 本剤のみを使用する場合の使用回数2回以内 カルブチレートを含む農薬の総使用回数2回以内	(株)エス・ディ・エス・バィテック
ベスロン水和剤	バフイン顆粒水和剤	既登録薬剤に同じ									タウケミカル日本(株)
ナプロバミド水和剤	ケリス顆粒水和剤	2-(α-ナフトキシ)-N,N-ジエチル-N-ブチルアミド・・・48.0%	水和剤	日本芝	一年生イネ科雑草			春期雑草発生前	600 g 希釈水量200～300 l	全面土壌散布 本剤のみを使用する場合の使用回数3回以内 ナプロバミドを含む農薬の総使用回数3回以内	ゼネラル(株)、日本農薬(株)
ジフルフェニカ-1PC水和剤	ガリル水和剤	2',4'-ジフルオロ-2-(α,α,α-トリフルオロ-m-トリフルオキシ)ニコチンアミド・・・4.0%	水和剤	小麦(秋播)	畑地一年生雑草	北海道	全土壌(砂土を除く)	小麦2～4葉期(イネ科雑)	200 g 希釈水量100 l	雑草茎葉散布又は全面土壌散布 本剤のみを	日産化学工業(株)、ロース・ブーラン油化ア

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物・場所	適用雑草	適地	用帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
つづき		イソプロピル-N-(3-クロロフェニル)カーバメート・・・30.0%									使用する場合の使用回数1回 ジフルフェニルを含む農薬の総使用回数1回 IPCを含む農薬の総使用回数1回	グロ(株)
グリホサートアンモニウム塩液剤	ラウンドアップハイロード	アンモニウム＝N-(ホスホリル)グリホサート・・・41.0%	液剤	かんきつ、りんご、なし、ぶどう	スギナ				雑草生育盛期 但し、収穫7日前まで	2000 ml 希釈水量 少量散布 25～50 l	雑草木茎葉散布 本剤及びグリホサートを含む農薬の総使用回数 3回以内	日本モンサント(株)
				かんきつ、りんご、なし、ぶどう、くり、うめ、もも、おうとう	一年生雑草		雑草生育期 但し、収穫7日前まで	250～500ml 希釈水量 通常散布 50～100 l 少量散布 25～50 l				
					多年生雑草		500～1000 ml 希釈水量 通常散布 50～100 l 少量散布 25～50 l					
				水田畦畔	一年生及び多年生雑草		雑草生育期 但し、収穫14日前まで	250～500ml 希釈水量 通常散布 50～100 l 少量散布 25～50 l	雑草木茎葉散布 本剤及びグリホサートを含む農薬の総使用回数 2回以内			
				水田耕起前	一年生雑草		雑草生育期 但し、耕起の20～10日前		雑草木茎葉散布 本剤及びグリホサートを含む農薬の総使用回数 1回			
				直播水稻(不耕起栽培)			雑草生育期 は種前7日～は種後7日(出芽前)	250～500ml 希釈水量 50 l				
				公園・堤とう・駐車場・道路・運動場・宅地・のり面・鉄道等			雑草生育期	500ml 希釈水量 通常散布 50～100 l 少量散布 25～50 l	雑草木茎葉散布 本剤及びグリホサートを含む農薬の総使用回数 3回以内			
					多年生雑草		1000ml 希釈水量 通常散布 50～100 l 少量散布 25～50 l					

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
つづき					クズ等の つる性多年生雑草、ササ類、落葉雑草かん木			生育盛期以降	1000～2000 ml 希釈水量 通常散布 50～100 l 少量散布 25～50 l		
					スギナ			生育盛期	2000ml 希釈水量 少量散布 25～50 l		
デスメディウム・フェンメディウム乳剤	ベクタロード乳剤	エチル=3-フェニルカルバモイルオキシカルバニート・・・3.0% 3-メトキシカルボニルアミノフェニル-N-(3'-メチルフェニル)カルバメート・・・13.0%	乳剤	てんさい (移植栽培)	畑地一年生雑草	北海道	全土壌	移植活着後の雑草発生前期(但し、収穫90日前まで)	400 ml 希釈水量 50～100 l	雑草茎葉散布本剤のみを使用する場合の使用回数1回 デスメディウムを含む農薬の総使用回数2回以内 フェンメディウムを含む農薬の総使用回数3回以内	アグレボジャパン(株)、北海三共(株)
デスメディウム・フェンメトラクロール乳剤	ベクタイヤA乳剤	エチル=3-フェニルカルバモイルオキシカルバニート・・・2.3% 3-メトキシカルボニルアミノフェニル-N-(3'-メチルフェニル)カルバメート・・・10.0% 2-クロロ-2'-エチル-N-(2-メトキシ-1-メチルエチル)-6'-メチルアセトアニリド・・・12.0%	乳剤	てんさい (移植栽培)	畑地一年生雑草	北海道	全土壌 (砂土を除く)	移植活着後の雑草発生前期(但し、収穫90日前まで)	500 ml 希釈水量 50～100 l	雑草茎葉散布本剤のみを使用する場合の使用回数1回 デスメディウムを含む農薬の総使用回数2回以内 フェンメディウムを含む農薬の総使用回数3回以内 トラクロールを含む農薬の総使用回数1回	アグレボジャパン(株)、北海三共(株)
フルアジホップP乳剤	ワンサイドP乳剤	ブチル=(R)-2-[4-(5-トリフルオロメチル-2-ヒンジルオキシ)フェノキシ]プロピオン酸・・・17.5%	乳剤	だいず あずき らっかせい にんじん だいこん てんさい (移植)	畑地一年生イネ科雑草(スミカサビラを除く)及びビバムシ、レドットア	全域 東北以北 全域 北海道		雑草生育期イネ科雑草3～5葉期(但し、播種60日後まで) 雑草生育期イネ科雑草3～5葉期(但し、播種30日後まで) 雑草生育期イネ科雑草3～5葉期(但し、収穫45日前まで) 雑草生育期イネ科雑草3～5葉期(但し、	75～100 ml 希釈水量 70～100 l 50～75 ml 希釈水量 70～100 l 50～100 ml 希釈水量 70～100 l 75～100 ml 希釈水量 70～100 l	雑草茎葉散布本剤、フルアジホップ及びフルアジホップPを含む農薬の総使用回数1回	石原産業(株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10 a 当り使用量	使用方法	登録会社
つづき						全域		植付60日後まで)			
				たまねぎ				雑草生育期イネ科雑草3～5葉期(但し、収穫30日前まで)			
				いちご(親株床)				雑草生育期イネ科雑草3～5葉期(但し、収穫後～定植まで)	50～100 ml 希釈水量 70～100 l		
				きゅうり				雑草生育期イネ科雑草3～5葉期(但し、収穫30日前まで)			
				トマト				雑草生育期イネ科雑草3～5葉期(但し、収穫21日前まで)	75～100 ml 希釈水量 70～100 l		
				かんしょ				雑草生育期イネ科雑草3～5葉期(但し、植付30日後まで)	50～75 ml 希釈水量 70～100 l		
				かんきつ				春季～夏季雑草生育期(草丈30cm以下)(但し、収穫120日前まで)	200～300ml 希釈水量 100～150 l		
									300～500ml 希釈水量 100～150 l		
				いぐさ	水田一年生イネ科雑草	いぐさ先刈後～ノビエ 5葉期まで	100～200ml 希釈水量 100～150 l	雑草茎葉散布(落水) 本剤、フルアジホップ 及びフルアジホップPを含む農薬の総使用回数 1 回			
				桑	畑地一年生イネ科雑草(スズメカタビラを除く)及びシバムギ、レッドトップ	雑草生育期イネ科雑草3～5葉期	75～100ml 希釈水量 100～150 l	雑草茎葉散布 本剤、フルアジホップ 及びフルアジホップPを含む農薬の総使用回数 2 回以内			
				花木		雑草生育期草丈30cm以下	100～200ml 希釈水量 100～150 l				
				水田畦畔	一年生イネ科雑草及びキヌタス	雑草生育期草丈30cm以下	200～400ml 希釈水量	雑草茎葉散布 本剤、フルアジホップ 及びフル			

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適地	用途	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
つづき				公園、庭園、堤とう、駐車場、運動場、道路、宅地、のり面等	ズメヒエ			(但し、収穫120日前まで)	100～150 l	アジホップPを含む農業の総使用回数1回	
					一年生イネ科雑草(ズメヒエを除く)			雑草生育期草丈20cm以下	150～300ml 希釈水量100 l	雑草茎葉散布本剤、フルアジホップ及びフルアジホップPを含む農業の総使用回数3回以内	
					多年生イネ科雑草			雑草生育期草丈30cm以下	400～600ml 希釈水量150 l		
イキサベン・トリフルリン粒剤	スナップショット粒剤	N-[3-(1-エチル-1-メチルプロピル)イソキサザリル-5-イル]-2,6-ジメチルベンゾアミド・・・0.40% α, α, α-トリフルオロ-2,6-ジニトロ-N,N-ジプロピル-N-ラートリジン・・・1.8%	粒剤	つづき、つばき、かいづかい、ぶき、においひば、つげ	一年生雑草			定植活着後(秋期雑草発生前)	6～8 kg	土壌表面散布本剤のみを使用する場合の使用回数2回以内 イキサベンを含む農業の総使用回数2回以内 トリフルリンを含む農業の総使用回数2回以内	ダウ・ケミカル日本(株)
シナジン・DCBN・DCMU粒剤	マスタリ粒剤、草退治粒剤	2-(4-クロロ-6-エチルアミノ-1,3,5-トリアジン-2-イルアミノ)-2-メチルプロピオニトリル・・・2.0% 2,6-ジクロロチオベンザミド・・・3.0% 3-(3,4-ジクロロフェニル)-1,1-ジメチル尿素・・・6.0%	粒剤	家の周りの有用な植物を植えない場所	一年生雑草、多年生広葉雑草、スギナ			雑草発生前～生育初期(草丈20cm以下)	15～20g/m ²	全面土壌散布本剤のみを使用する場合の使用回数3回以内 シナジンを含む農業の総使用回数3回以内 DCBNを含む農業の総使用回数3回以内 DCMUを含む農業の総使用回数3回以内	保土谷ファグロス(株)、タカ園芸(株)
シナジン・DCBN・DCMU粒剤	マスタリ粒剤、草退治粒剤	2-(4-クロロ-6-エチルアミノ-1,3,5-トリアジン-2-イルアミノ)-2-メチルプロピオニトリル・・・1.0% 2,6-ジクロロチオベンザミド・・・1.5% 3-(3,4-ジクロロフェニル)-1,1-ジメチル尿素・・・3.0%	粒剤	家の周りの有用な植物を植えない場所	一年生雑草、多年生広葉雑草、スギナ			雑草発生前～生育初期(草丈20cm以下)	20～40g/m ²	全面土壌散布本剤のみを使用する場合の使用回数3回以内 シナジンを含む農業の総使用回数3回以内 DCBNを含む農業の総使用回数3回以内 DCMUを含む農業の総使用回数3回以内	保土谷ファグロス(株)、タカ園芸(株)
イキサベン・ベスロジン水和剤	家庭園芸用バファインP RDF	既登録薬剤に同じ									北興産業(株)
イワロン・トリフルリン粒剤	ロードキープ粒剤	3-(5-ターシャリプロチル-3-イソキサザリル)	粒剤	公園、庭園、駐車場	一年生及び多年生			雑草発生前～生育	10～20 kg	全面土壌散布本剤のみを	日産化学工業(株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適地	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
剤		-1,1-ジメチル尿素 ...3.0% 2,2,3,3-テトラフルオロ ロビオン酸ナトリウム ...4.5%		場、道路、 運動場、 宅地、鉄 道等	雑草(スギナを除く)			初期(草丈30cm以下)		使用する場合の使用回数1回 イワロンを含む農業の総使用回数3回以内 テトラビオンを含む農業の総使用回数1回	
シアジン水和剤	グラマックスフロアブル	2-(4-クロロ-6-エチルアミノ-1,3,5-トリアジン-2-イルカルバモイル)-2-メチルプロピオンニトリル...42.0%	水和剤	日本芝	畑地一年生雑草			春期雑草発生前～発生始期	100～200ml 希釈水量 200～250 l	全面土壌散布 本剤及びシアジンを含む農業の総使用回数1回	日本サイミッド(株)
ハロクソン水和剤	インパルDF	メフル-3-クロロ-5-(4,6-ジメチルピリミジン-2-イルカルバモイル)スルファモイル-1-メチルピラゾール-4-カルボキシナート...75.0%	水和剤	日本芝	広葉雑草、ヒメグサ、ハマスダ			芝生育初期～生育期(雑草発生前～生育初期)	30～50 g 希釈水量 200～300 l	散布 本剤及びハロクソンを含む農業の総使用回数3回以内	日産化学工業(株)
ピリヂチカルブ粒剤	エイゲン粒剤	0-3-tert-ブチルフェニル-6-メトキシ-2-ピリジル(メチル)チカルブナート...3.5%	粒剤	日本芝(こうらいしば)、西洋芝(ブルーグラス、ベントグラス)	畑地一年生イネ科雑草			芝生育期(春期雑草発生前)	15～25 kg	散布 本剤のみを使用する場合の使用回数2回以内 ピリヂチカルブを含む農業の総使用回数4回以内	大日本インキ化学工業(株)
グリホサートロビオン塩液剤	タンアウト液剤	既登録薬剤に同じ									タケノ園芸(株)
ベスロジン水和剤	ベネフィクス顆粒水和剤	N-ブチル-N-エチル- α , α -トリフルオロ-2,6-ジニトロ-p-トリルジン...58.0%	水和剤	日本芝	畑地一年生雑草(カヤツリグサ科、科科を除く)			春期雑草発生前	500～700 g 希釈水量 200～250 l	全面土壌散布 本剤及びベスロジンを含む農業の総使用回数2回以内	住友商事(株)
プロマシ粒剤	ウィードコン粒剤	5-ブトキシ-3-セコンダリ-ブチル-6-メチルウリシ...3.0%	粒剤	駐車場、道路、運動場等	一年生雑草			雑草生育期(草丈30cm以下)	5～10 kg	全面土壌散布 本剤及びプロマシを含む農業の総使用回数1回	丸和ハイクミカル(株)

新刊

SHIBUYA INDEX

—8th Edition—

1999年版

渋谷成美・ほか／編集 A4版 936頁 定価40,000円(税込)

1978年に第1版を発行して以来、簡便に使える農業リストとして知られていた本書の第8版。世界の農業すべてを網羅し、一般名、商品名、コードナンバー、メーカー名、構造式、適用場面、特性を記載。単剤3,600種を構造物別に整理し、関連化合物の検索も容易にできる。また、混合剤で4,600余種も掲載。

呈内容見本

全国農村教育協会 〒110-0016 東京都台東区台東1-26-6(植調会館) 電話/03-3833-1821 FAX/03-3833-1665