


# 調 植

第34巻第12号



ツルノゲイトウの種子 (*Alternanthera sessilis*) 長さ1.3mm

財団法人 日本植物調節剤研究協会編

新規水田用初期除草剤


新発売

# 初ベクサー® フロアブル 1キロ粒剤

® 科研製薬(株)商標登録

## 特長

- ◆すぐれた経済性
- ◆中期剤・一発処理剤の効果安定に
- ◆水稻に対して安心
- ◆環境に対して安心



低コスト  
稲作に!



JAグループ  
農協 全農 経済連  
◎は登録商標です



三井東圧農薬株式会社  
東京都中央区日本橋1-12-8

新発売

彼はいま、  
除草剤を  
撒いています。



※新開発の散粒機「イノバ-MGT-S」で上手に撒けます。  
(発売元: 丸山製作所)

省力

散粒機装着で  
除草時間ゼロを実現



販売

クミアイ化学工業株式会社  
北海三共株式会社  
日本バイエルアグロケム株式会社

効果

一度の散布で  
長期間の除草効果

安全

稲苗と人に対する  
安全性を徹底追求

田植と同時に散布できる一発除草剤

# イノバ® 1キロ粒剤




フェントラザミド・ベンスルフロメチル酸剤

※イノバは1kg粒剤、500mlフロアブルの2製剤あります。いずれも田植同時処理と一発剤としてご使用頂けます。

Bayer



日本バイエルアグロケム株式会社  
東京都港区高輪4-10-8 ☎108-8572



## 巻 頭 言

### 反 則 に 想 う

財団法人 日本植物調節剤研究協会 評議員 安岡 健  
 社団法人 緑の安全推進協会 専務理事

私は、スポーツ愛好者の一人です。

書き出しから私事で恐縮ですが、失礼はお許しただくこととして、学生時代に熱中した競技生活を振り返り、昨今の農業業界について感ずるところを述べてみたいと思います。

最近は専らテレビ観戦で怠けておりますが、学生時代はスポーツ万能で、高校、大学を通じ、選手としてインターハイ等公式戦も多数経験しました。高校では陸上 800mを、大学では Boxing をやりました。何れも苛酷な個人競技種目で、個々の直接対決になることから、自分自身との葛藤も大きいものがありました。

社会の秩序、生命を守るために法律があるように、スポーツ競技にも生命の安全を守り公平に技を競うためのルールがあり、また、ルールがあるから競技が成り立っていることはご承知のとおりです。特に、格闘技では生命に危険が生じるため、反則行為は絶対に許されないことです。反則は恥辱であり、競技者としての資格を剥奪されるケースもあることから、殊のほか厳しく指導されていました。勿論、反則には厳罰が課せられますが、それ以前に反則行為をしないこと、出さないことが大事です。ルール設定の目的は罰することではなく反則行為をしないことにあります。

最近、技術が高度化したためか、反則に対するペナルティが甘くなっているのが気になり、

もっと厳罰で臨んでほしいと思っております。

野球における危険球などは、故意の要素も強く、即退場は当然であり、出場停止も長期間にすればよいと思っています。

何はともあれ、法律ルールは守らなくてはならないし、順法が精神が何よりも重要であると思っております。

さて、長引く不況の影響で、政治、経済、社会が混沌としています。農業業界も需要が停滞するなか熾烈な競争が続いており、流通段階での混乱を生じております。

無登録農薬の流通量の増大、農薬の登録外使用等々の反則事例が目立ちます。このような状態が続けば業界の大混乱を招き、安全問題に対する基本をゆるがすことになり、危機すら感ずる昨今です。逆にフェアな競争は、業界の発展につながるところです。技術力、営業力は大いに競って欲しいところです。

かかる状況の進展を止めるためにも、業界として、コンプライアンス体制の構築が急務であります。また、守らせる仕組みの構築も必要と考えます。

最近は、これらの状況と学生時代の体験と重ねるとき、一種のノスタルジーを感じております。これは老化のせいでしょうか、あるいは適性の問題でしょうか、多分、後者なのかもしれません。

## 目 次

( 第 34 卷 第 12 号 )

## 巻 頭 言

反則に想う ..... 1

&lt; 財 日本植物調節剤研究協会 評議員

( 社 緑の安全推進協会 専務理事

安岡 健 &gt;

水田におけるスルホニルウレア系除草剤

抵抗性生物型雑草の研究の現状と除草法 ..... 3

&lt; 九州農業試験場水田利用部

雑草制御研究室 小荒井 晃 &gt;

南米ウルグアイの農業事情と植調剤 ..... 12

&lt; 果樹試験場カンキツ部興津 奥田 均 &gt;

平成 12 年度水稲作関係除草剤試験成績概要 ..... 16

&lt; 財 日本植物調節剤研究協会 技術部 &gt;

平成 11 年度桑園関係除草剤・生育調節剤

試験成績概要 ..... 63

&lt; 財 日本植物調節剤研究協会 技術部 &gt;

植調協会だより ..... 64

## よりよい農業生産のために。三共の農薬



- 時代先どり、ジャンボな省力  
投げ込むだけの水稲用一発処理除草剤

**クサトリエース**<sup>®</sup> Hジャンボ<sup>®</sup>  
Lジャンボ<sup>®</sup>

- 三共の優れた製剤技術から生まれた  
グリサホート液剤

**三共の草枯らし**<sup>®</sup>

- 効さめの長〜い  
水稲用初・中期一発処理除草剤

**ラクダー**<sup>®</sup> Hフロアブル  
Lフロアブル

- 移植前後に使える水稲用初期除草剤

**シング**<sup>®</sup> 乳剤

- どっしり安定、しっかり効くゾウ  
水稲用初・中期一発処理除草剤

**ウィードレス**<sup>®</sup> A1キロ粒剤36  
1キロ粒剤51

- ノビエ3.5葉期まで使える  
新しい水稲用中期除草剤

**ザーバックス**<sup>®</sup> DX1キロ粒剤

- 使いやすい水稲用初期一発処理除草剤

**ミスラッシャ**<sup>®</sup> 粒剤  
1キロ粒剤

- 難防除雑草の掃除屋さん

**ザーバックスSM**<sup>®</sup> 粒剤  
1キロ粒剤

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。


**三共株式会社**

 農薬部  
東京都中央区銀座2-7-12 〒104-8113

# 水田におけるスルホニルウレア系除草剤抵抗性生物型雑草の研究の現状と防除法

九州農業試験場水田利用部雑草制御研究室 小荒井 晃

## 1. はじめに

除草剤による雑草防除技術は、現在日本の稲作技術の重要な部分になっている。我が国の除草剤の歴史は1950年の2, 4-Dの実用化に始まり、1955年のMCPAの実用化によってノビエを除く一年生雑草はほとんど防除できるようになった。その後NIP, CNP, プタクロールおよびプレチラクロールなどが開発され、初期剤と中期剤の体系処理による雑草防除が普及した。現在は稲作の省力・低コストの観点から、初期および初・中期一発型除草剤による雑草防除が主流となっている。初期および初・中期一発型水稲用除草剤は、そのほとんどがスルホニルウレア系除草剤（以下、SU）を含む混合除草剤（以下、SU混合剤）である。SU剤は低濃度でコナギを含む広葉およびカヤツリグサ科雑草全般に対して広い殺草スペクトラムを持ち、水稲に対する安全性が高く、1994年以降は水稲作付面積の80%以上に使用されている（日植調会議資料）。

しかし1996年に北海道においてSU抵抗性生物型のミズアオイ<sup>18)</sup>の出現が報告されて以降、各地のSU混合剤連用圃場においてSU抵抗性生物型のアゼトウガラシ<sup>9)</sup>、アゼナ類<sup>35)</sup>、キクモ<sup>39)</sup>、ミゾハコベ<sup>4)</sup>、キカシグサ<sup>8)</sup>、イヌホタルイ<sup>16)</sup>およびコナギ<sup>15)</sup>が出現した。これらのSU抵抗性雑草については多くの研究が行われており、いくつかの研究は本誌においても紹介されている。本

稿では日本国内で出現が確認されたSU抵抗性雑草について、未発表の研究も含めた現時点における発生動向、生理・生態および防除対策に関する知見を紹介したい。

## 2. SU抵抗性生物型雑草の発生状況（図-1）

### a) ミズアオイ

ミズアオイは日本で最初に北海道の水田でSU抵抗性生物型の出現が確認された草種である<sup>18)</sup>。SU抵抗性生物型はSU剤の基準処理量の4倍の薬量でも完全には枯死せず、半数致死量および半数抑制量はSU感受性生物型と比較しておよそ100倍の差がある<sup>18, 38)</sup>。

### b) アゼトウガラシ

秋田県<sup>27)</sup>、山形県<sup>9)</sup>、埼玉県<sup>5)</sup>および京都府<sup>31)</sup>の水田でSU抵抗性アゼトウガラシの出現が確認され、除草剤の使用前歴としてはSU混合剤を3年以上連用していたことが報告されている<sup>24)</sup>。SU抵抗性生物型の半数致死量はSU感受性生物型と比較してベンスルフロンメチルで約280倍の差がある<sup>9)</sup>。

### c) アゼナ類（アゼナ、アメリカアゼナCタイプ、アメリカアゼナRタイプ[タケトアゼナ]）

SU抵抗性アゼナ類は青森県<sup>26)</sup>、秋田県<sup>21)</sup>、岩手（未発表）、宮城県<sup>35)</sup>、山形県<sup>35)</sup>、福島県（未発表）、埼玉県<sup>5)</sup>、新潟県<sup>25)</sup>、京都府<sup>31)</sup>および佐賀県（未発表）の水田で出現が確認され、除草剤の

使用前歴としてはSU混合剤を5年以上連用していたことが報告されている<sup>21)</sup>。アゼナ類は小型雑草であるが、多発生した場合は減収し、刈り取り時にコンバインの歯に絡みつ়ことで作業能率が低下する<sup>21)</sup>。

#### d) キクモ

秋田県の水田でSU抵抗性キクモの出現が確認




図-1 水田における都道府県別SU抵抗性雑草の発生状況

された<sup>39)</sup>。SU抵抗性生物型の半数抑制量は、SU感受性生物型と比較してピラゾスルフロンエチルでおよそ300倍の差があり、他の3種のSU剤についてもそれぞれ600~900倍の差がある。他地域では現在のところSU抵抗性キクモの出現は報告されていない。

#### e) ミゾハコベ

宮城県<sup>6)</sup>、埼玉県<sup>5)</sup>および佐賀県(未発表)の水田でSU抵抗性ミゾハコベの出現が確認された。ミゾハコベは小型雑草で水稻への雑草害や収穫作業の障害は極めて小さいと考えられるが、多発生して田面をマット状に覆った場合、追肥の効果低下を心配する耕作者もいる。

#### f) キカシグサ

秋田県の水田<sup>8)</sup>および佐賀県(未発表)の水田でSU抵抗性キカシグサの出現が確認され、除草剤の使用前歴としてはベンスルフロンメチル・エスプロカルブを7年間連用していたことが報

告されている<sup>8)</sup>。SU抵抗性生物型は、SU感受性生物型と比較してピラゾスルフロンエチルでおよそ100倍の除草効果の差がある<sup>8)</sup>。

#### g) イヌホタルイ

北海道<sup>16)</sup>、岩手(未発表)、宮城県<sup>44)</sup>および山形県<sup>13)</sup>の水田でSU抵抗性イヌホタルイの出現が確認され、除草剤の使用前歴としてはSU混合剤を5年以上連用していたことが報告されている<sup>16)</sup>。

#### h) コナギ

秋田県<sup>15)</sup>、茨城県<sup>15)</sup>および兵庫県(未発表)の水田でSU抵抗性コナギの出現が確認され、除草剤の使用前歴としてはSU混合剤を3年以上連用していたことが報告されている<sup>15)</sup>。

#### i) その他の雑草

秋田県(未発表)の水田でSU抵抗性オモダカの出現が確認された。キクモと同様に他地域では現在のところSU抵抗性オモダカの出現は報告さ

れていない。SU剤は難防除雑草であるミズガヤツリやクログワイなどの多年生雑草にも効果を示す優れた除草剤である。単一成分でこれに代わるものはまだ開発されていないので、SU抵抗性多年生雑草の出現には注意する必要がある。

### 3. SU抵抗性生物型雑草の拡散

SU抵抗性雑草が出現した水田には、大量のSU抵抗性雑草の種子が土壤中に含まれているので、土壌がトラクタやコンバインなどの作業機に付着して、他の水田にSU抵抗性雑草の種子が拡散していく可能性がある。そのため作業機の洗浄を丁寧に行うことなどによってSU抵抗性生物型の種子の拡散を防ぐ必要がある。またSU抵抗性雑草の種子は、用水路を経由して下流の水田に拡散していく可能性もある。イヌホタルイなどの強害雑草では、SU抵抗性生物型の種子の拡散には十分に注意する必要がある。一方ミズアオイは、SU抵抗性が核遺伝子に支配された完全優性で遺伝し<sup>41)</sup>、訪花昆虫による他殖率が37~80%と高いため<sup>40)</sup>、花粉によるSU抵抗性遺伝子の拡散の危険性がある。ミズアオイと同属のコナギは自殖によって種子生産をするため<sup>32)</sup>、花粉によってSU抵抗性遺伝子が拡散することはないが、雑草害はミズアオイより大きいので、イヌホタルイと同様にSU抵抗性生物型の種子の拡散には十分に注意する必要がある。

### 4. SU抵抗性生物型雑草の除草剤による防除法 (表-1)

#### a) ミズアオイ

プレチラクロール、ピラゾレート、ペントキサゾンおよびテニルクロールの発生前処理、カフェンストロールおよびエトキシスルフロン・ピラゾレート・プレチラクロール混合剤の2葉

期処理が除草効果を示した<sup>18, 37, 42, 43)</sup>。

#### b) アゼトウガラシ

プレチラクロール、カフェンストロール、ピフェノックスおよびナプロアニリドの発生前処理、ベンタゾンなどの中期剤が除草効果を示した<sup>9)</sup>。しかしメフェナセット、エスプロカルブ、ベンフレセート、ジメピペレート、エトベンザニドおよびシハロホップブチルは除草効果が不十分であった。

#### c) アゼナ類 (アゼナ, アメリカアゼナCタイプ, アメリカアゼナRタイプ[タクトアゼナ])

プレチラクロール、カフェンストロール、ピラゾレートおよびピフェノックスなどの発生前処理が除草効果を示した<sup>1, 7)</sup>。しかしメフェナセット、エスプロカルブ、ベンフレセート、ジメピペレートおよびエトベンザニドの発生前処理は除草効果が不十分だった。SU抵抗性アゼナ類に対して効果を持つ成分を含む一発剤も、同様に除草効果を示した<sup>28, 43)</sup>。

#### d) キクモ

プレチラクロールの発生前処理、プレチラクロールもしくはベンチオカーブ含有一発剤が除草効果を示した<sup>42)</sup>。

#### e) ミゾハコベ

ピラゾレート、ペントキサゾンおよびピフェノックスの発生前処理が除草効果を示した<sup>4, 6)</sup>。しかしメフェナセット、エスプロカルブおよびテニルクロールを含む一発剤は除草効果が不十分だった。カフェンストロール混合剤の1葉期処理、ジメタメトリン・プレチラクロール混合剤の2.5葉期処理は除草効果を示した<sup>6)</sup>。

#### f) イヌホタルイ

プレチラクロール、ピラゾレート、ペントキサゾン、クロメプロップ、ピリブチカルブおよびベンフレセートの発生前処理、プロモブチド



およびベンゾピシクロンの2葉期処理が除草効果を示した<sup>20,44)</sup>。また一発剤ではエトキシスルフロン・ピラゾレート・プレチラクロール粒剤およびプロモブチド含有SU混合剤などが除草効果を示した<sup>3,20,30)</sup>。

SU抵抗性イヌホタルイはSU感受性生物型よりも低温での発芽性に優れている<sup>17,19,20)</sup>。そのため代かき後気温が低温で推移する北日本の水田では、SU抵抗性イヌホタルイはSU感受性生物型よりも発生が速やかであると考えられ、処理適期を逃さないように早めに除草剤を処理することが防除の重要なポイントになる。

#### g) コナギ

プレチラクロール、ベンチオカーブもしくはメフェナセットを含むSU混合剤の1葉期処理およびピラゾレートの5葉期処理が除草効果を示した<sup>15)</sup>。

### 5. SU抵抗性の検定

今までは雑草が残存した場合、除草剤の処理時期の逸脱や水管理の不良などが原因として考えられてきた。しかし現在はSU抵抗性生物型雑草が広く出現しているので、雑草が残存した原因としてSU抵抗性生物型の出現も考慮する必要がある。そのため残存した雑草のSU抵抗性の有無を明らかにし、速やかに適切な防除対策を策定することが重要である。そこでSU剤処理後水田に残存した成植物のSU抵抗性の有無を2～3日で検定する方法として、SU剤の作用部位であるアセト乳酸合成酵素(ALS)のSU剤処理下での活性を測定する検定法が開発された<sup>34,36)</sup>。この検定法はアゼトウガラシおよびイヌホタルイの成植物と9～13葉期のアゼナ類に適用できることが確認されている。他草種に適用する場合はあらためて供試雑草の葉齢、採取部位や試葉、

除草剤の処理濃度などを確認する必要がある。この検定法は、検定に供試する雑草の葉齢、採取部位や試葉、除草剤の処理条件などに注意を要するため農家や農業普及センターなどで簡易に検定することが難しい。そこで簡易な検定法として、SU水溶液で生育させた雑草の発根を観察することによって、7～14日でSU抵抗性の有無を検定する方法が開発された<sup>22)</sup>。この検定法はアゼナ類、イヌホタルイおよびコナギの成植物に適用できることが確認されている。

一方SU剤は水田で初期あるいは初・中期一発除草剤として使用されることから、雑草の発生期における除草反応を明らかにすることが重要である。発生期における除草剤検定法には、ポット試験以外ではシャーレ試験および水耕法などがあるが、コナギは、シャーレ上などでは発芽しないためシャーレ試験や水耕法などでは検定ができない<sup>3,11)</sup>。そこでコナギ種子に対して発芽促進効果を持つことが知られているイネ種子抽出液<sup>12)</sup>を添加した寒天培地によるコナギの除草剤検定法が開発されており<sup>14)</sup>、SU抵抗性の有無の検定にも適用できる。

### 6. SU抵抗性雑草の遺伝様式

SU感受性アゼトウガラシ、アゼナ類およびイヌホタルイのALSは、タバコALSのアミノ酸配列の196番目に相当する部分がプロリンであるのに対し、SU抵抗性生物型のALSは、アゼトウガラシではグルタミン、アゼナおよびアメリカアゼナCタイプではセリン、アメリカアゼナRタイプではアラニン、イヌホタルイではロイシンに置換されている<sup>28,33)</sup>。このALSの変異によって出現したSU抵抗性は核遺伝子に支配された単因子優性で遺伝する<sup>10,41)</sup>。

SU抵抗性生物型が出現するメカニズムは、雑

草の個体群にすでに抵抗性生物型が存在していたとする説や雑草の個体群に突然変異体が出現したとする説などいくつかの仮説がある<sup>41)</sup>。アゼトウガラシでは、各地域で出現したSU抵抗性生物型は、それぞれ独立して発生した突然変異体によるとした報告がある<sup>27)</sup>。

## 7. おわりに

このようにSU抵抗性生物型雑草の発生動向や防除に関する研究は多く行われているが、生理・生態に関する研究は不十分である。SU抵抗性獲得のメカニズムはまだ不明な点も多く、遺伝様式の解明や分子生物学的な研究を行う必要がある。

SU抵抗性雑草の出現は北日本地域や早期・早植え栽培地域に集中しており、除草剤処理時の水温が低いことによる発生の長期化が、SU抵抗性雑草の出現に何らかの影響を与えている可能性がある<sup>5)</sup>。しかし最近九州でもSU抵抗性雑草が出現しており、全国どこでもSU剤を連用している水田ではSU抵抗性雑草が出現する可能性があるので注意する必要がある。

日本国内で出現したSU抵抗性雑草は複合抵抗性をもたないため、非SU系の初期剤と中期剤の体系処理によって防除できる。しかし海外ではベンスルフロンメチルと2,4-Dに対して抵抗性をもつキバナオモダカの出現が報告されており<sup>23)</sup>、日本国内でも複合抵抗性雑草が出現しないように注意する必要がある。体系処理以外にもSU抵抗性雑草に効果を示す非SU系除草剤を含有する一発剤も防除効果が期待できる。しかしSU抵抗性雑草を防除するには有効除草剤の含有量が少ない場合や処理時期が遅い場合では、一発剤の防除効果は変動するので注意する必要がある。

SU剤は低薬量で一年生カヤツリグサ科雑草や一年生広葉雑草だけでなくオモダカやクログワイなどの多年生雑草にも効果を示す優れた除草剤であり、単一成分でこれに代わるものはまだ開発されていない。今後もSU剤の使用を続けるためにも、SU抵抗性雑草が出現した水田では、SU抵抗性雑草に効果のある非SU系除草剤を組み合わせた体系処理を行いSU抵抗性雑草の蔓延を防ぐこと、SU抵抗性雑草が出現していない水田では同じ作用機作を持つ除草剤の連用を避けることが肝要である。

## 8. 引用文献

- 1) 青木美里ら 1998. スルホニルウレア系除草剤抵抗性アメリカアゼナ多発圃場における数種薬剤の効果と防除体系. 雑草研究, 43(別), 32-33.
- 2) 千坂英雄・片岡孝義 1977. 水田一年生雑草種子の休眠・発芽・出芽の特性. 雑草研究, 22(別), 94-96.
- 3) 福本俊彦ら 1999. 水稻作でのスルホニルウレア系除草剤抵抗性雑草をも対象としたベンスルフロンメチル含有一発処理剤の開発 2. スルホニルウレア系除草剤抵抗性イヌホタルイをも対象にした一発剤の開発. 雑草研究, 44(別), 90-91.
- 4) 畑克利ら 1998. スルホニルウレア系除草剤抵抗性ミゾハコベの発現. 雑草研究, 43(別), 28-29.
- 5) 畑克利ら 1998. 埼玉県における除草剤抵抗性水田雑草の発生状況. 雑草とその防除, 35, 89-93.
- 6) 平田秋靖ら 1999. 宮城県内で発生したスルホニルウレア系除草剤抵抗性ミゾハコベと数種除草剤の効果. 雑草研究, 44(別), 76-77.

- 7) 伊藤一幸ら 1997. スルホニルウレア系除草剤抵抗性アゼナ類の防除. 雑草研究, 42(別), 24-25.
- 8) 伊藤一幸ら 1998. 秋田県大曲市に出現したスルホニルウレア系除草剤抵抗性のキカシグサについて. 雑草研究, 43(別), 40-41.
- 9) Itoh, K. et al. 1999. Sulfonylurea resistance in *Lindernia micrantha*, an annual paddy weed in Japan. Weed Res., 39, 413-423.
- 10) 伊藤一幸ら 1999. アゼトウガラシにおけるスルホニルウレア系除草剤抵抗性の遺伝様式. 雑草研究, 44(別), 78-79.
- 11) 片岡孝義ら 1978. 数種雑草種子の発芽時の酸素要求度. 雑草研究, 23(1), 9-12.
- 12) Kawaguchi et al. 1997. Allelopathic potential of rice seed (*Oryza sativa* L.) on seed germination of *Monochoria vaginalis* var. *plantaginea*. J. Weed Sci. Tech., 42(3), 262-267.
- 13) 川崎聡明 1999. スルホニルウレア系抵抗性イヌホタルイの発生確認と対策. 平成11年度新しい技術の試験研究成果 (普及奨励技術), 山形県農林水産部編, 9-10.
- 14) 小荒井晃ら 2001. 寒天培地を用いたコナギの培養法の開発とイネ粉浸漬液のコナギに対する影響の品種間差異の検定. 雑草研究 (投稿中).
- 15) 小荒井晃ら 2001. 東日本の水田におけるスルホニルウレア系除草剤抵抗性のコナギの出現. 雑草研究 (投稿中).
- 16) 古原洋ら 1999. 北海道におけるスルホニルウレア系除草剤抵抗性イヌホタルイ (*Scirpus juncooides* Roxb. var. *ohwianus*. T. Koyama) の出現. 雑草研究, 44(3), 228-235.
- 17) 古原洋ら 1999. スルホニルウレア系除草剤抵抗性イヌホタルイ種子の低温下における発芽. 雑草研究, 44(別), 74-75.
- 18) 古原洋 2000. 北海道における水田雑草ミズアオイの発生状況と防除. 農業技術, 55(1), 22-25.
- 19) 古原洋ら 2000. スルホニルウレア系除草剤抵抗性イヌホタルイ 3 集団の採種直後からの発芽. 雑草研究, 45(別), 38-39.
- 20) 古原洋 2000. 北海道におけるスルホニルウレア系除草剤抵抗性雑草の発生状況とその対策. 植調, 34(3), 85-91.
- 21) 三浦恒子ら 1998. スルホニルウレア系除草剤抵抗性雑草の発生と防除方法. 東北農業研究, 51, 57-58.
- 22) 村岡哲郎 2000. イヌホタルイの発根への影響を利用したスルホニルウレア抵抗性の簡易検定法. 植調, 34(2), 67-71.
- 23) Nakayama, S. et al. 1999. *Limnorcharis flava* (L.) Buchenau resistant to 2,4-D and bensulfuron-methyl. In "The management of biotic agents in direct seeded rice culture in Malaysia" ed. by MARDI, MADA and JIRCAS, pp. 129-140.
- 24) 大場伸一 1997. 山形県川西町におけるスルホニルウレア系除草剤抵抗性雑草の発生実態. 日作紀東北支部報, 40, 65-67.
- 25) 佐藤徹 2000. 新潟県におけるSU剤抵抗性アメリカアゼナについて. 植調, 34(1), 13-21.
- 26) 清藤文仁ら 1997. 青森県津軽一部地域におけるアメリカアゼナの残草実態と除草剤使用前歴. 雑草研究, 42(別), 166-167.
- 27) Shibaike, H. et al. 1999. Genetic variation and relationships of herbicide-

- resistant and susceptible biotypes of *Lindernia micrantha*. In Proceedings of Brighton Congress - Weeds, 197-202.
- 28) 渋谷健市ら 1999. 宮城県で採取されたスルホニルウレア系除草剤抵抗性イヌホタルイのアセト乳酸合成酵素遺伝子の解析. 雑草研究, 44(別), 72-73.
- 29) 白倉伸一ら 1999. 水稻作でのスルホニルウレア系除草剤抵抗性雑草をも対象としたベンスルフロンメチル含有一発処理剤の開発 1. スルホニルウレア系除草剤抵抗性アゼナ類に対する各種ベンスルフロンメチル混合剤の除草効果. 雑草研究, 44(別), 88-89.
- 30) 杉浦健司ら 1998. スルホニルウレア抵抗性イヌホタルイに対するエトキシスルフロン(Hoe-404)・ピラゾレート(SW-751)・プレチラクロール(CG-113)混合剤の除草効果, 雑草研究, 44(別), 86-87.
- 31) 杉本充 1999. 京都府におけるスルホニルウレア系除草剤抵抗性水田雑草の出現と数種除草剤の効果. 近畿作物育種研究, 44, 43-48.
- 32) 内田萬二 1955. コナギの自花交合受粉. 採集と飼育, 17, 34-37.
- 33) 内野彰ら 1999. スルホニルウレア系除草剤抵抗性アゼトウガラシ属水田雑草のアセト乳酸合成酵素遺伝子の変異. 雑草研究, 44(別), 80-81.
- 34) 内野彰 1999. スルホニルウレア抵抗性水田雑草の迅速検定法. 植調, 33(9), 354-360.
- 35) 内野彰ら 2000. 東北地方におけるスルホニルウレア系除草剤抵抗性アゼナ類2種1変種の出現と各種除草剤に対する反応. 雑草研究, 45(1), 13-20.
- 36) 内野彰ら 2000. アゼトウガラシ属雑草の葉齢・葉位によるアセト乳酸合成酵素活性の差異. 東北雑草研究会2000要旨, 16.
- 37) 植田拓也ら 1999. スルホニルウレア系除草剤抵抗性雑草に対するベントキサゾン(KPP-314)の作用. 雑草研究, 44(別), 304-305.
- 38) 汪光熙ら 1997. ミズアオイ *Monochoria korsakowii*の数種スルホニルウレア系除草剤に対する反応. 雑草研究, 42(別), 14-15.
- 39) 汪光熙ら 1998. スルホニルウレア系除草剤抵抗性生物型のキクモの出現. 雑草研究, 43(別), 38-39.
- 40) Wang, G. et al. 1998. Outcrossing rate as affected by pollinators and the heterozygote advantage of *Monochoria korsakowii*. Aquatic Botany, 62, 135-143.
- 41) 汪光熙 2000. 除草剤抵抗性およびその遺伝様式. 植調, 34(1), 3-10.
- 42) 渡邊寛明ら 1998. スルホニルウレア系除草剤抵抗性広葉雑草(アゼナ類, キクモ, ミズアオイ)に対する数種除草剤の除草効果. 雑草研究, 43(別), 46-47.
- 43) 渡辺賢ら 1998. スルホニルウレア抵抗性雑草に対するエトキシスルフロン(Hoe-404)・ピラゾレート(SW-751)・プレチラクロール(CG-113)混合剤の除草効果, 雑草研究, 43(別), 26-27.
- 44) 吉田修一ら 1999. 宮城県におけるスルホニルウレア系除草剤抵抗性イヌホタルイの確認. 雑草研究, 44(別), 70-71.



# 軽量・コンパクト、しかも 効きめはハード。



## 1. 軽量・コンパクト

10アール当り、わずか60gの薬剤量。持ち運びが楽で、保管スペースも少なくて済みます。

## 2. 省力除草

機械の不要なボトル散布、大型水田では散布機器の使用…いずれも省力的です。

## 3. 省資源

ボトルのサイクル利用、散布機器の使用によりプラスチック容器ゴミが削減できます。

## 4. 優れた拡散性

水田に入らず畦畔からの散布も可能です。


## 5. 長い残効性

ノビエなど各種雑草に対し通常40～50日間の残効性が期待できます。

## 6. 広い散布適期幅

ノビエ2.5葉期まで使用できるので余裕をもって散布できます。

顆粒らくらく用直射スプレー  
2リットルタイプ



水田初・中期一発処理除草剤

# ダイハード 顆粒

【新剤型フロアブル】

ダイハード協議会

塩野義製薬株式会社 八洲化学工業株式会社 永光化成株式会社  
事務局 日産化学工業株式会社 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-7-1

## 南米ウルグアイの農業事情と植調剤

果樹試験場カンキツ部興津 奥田 均

### はじめに

1999年10月下旬から1月半、JICAの短期専門家としてウルグアイ東方共和国で実施された果樹保護技術改善プログラムに派遣され、カンキツの光合成と果実生産という課題を担当した。この派遣を通じて若干ではあるが、ウルグアイの農業事情に関して見聞したので、この誌面を借りて紹介したい。

### 1. ウルグアイの地理、歴史、社会

地理：南米ウルグアイは、日本のほぼ真裏に位



置する。ラプラタ川の支流ウルグアイ川の東岸沿いに広がり、東は大西洋に面し、北はブラジルと国境を接した面積176,000 km<sup>2</sup>の小国である。日本からは、ブラジルあるいはアルゼンチンで飛行機を乗り換えて丸一日もかかる。国土はアルゼンチンのパンパとブラジル南部台地の中間にあたる緩衝地帯に属し、山や森がほとんどなく、平原と小高い丘の連続である(写真-1)。このようなあるがままに残された自然に人口の何倍もの牛や羊が草を喰む様が美しく調和している。

気候：最高気温が23度、最低気温が12度と温暖だが、年間降水量は1,200mmとやや乾燥気味である。

首都：モンテビデオ

人口：人口は320万人で首都のモンテビデオに人口の40%以上にあたる133万人(96年)が住んでいる。この他にもモンテビデオと比較すると著しく小さいものの、いくつかの市があり、住民の80%以上が都市人口である。後述するようにウルグアイは典型的な農業国でありながら、ほとんどの人が都市生活者であることは不思議であった。

人種：スペイン、イタリアなどのラテン系の移民が主で、90%以上を占める。

公用語：スペイン語で英語はほとんど通じない。

宗教：信仰の自由はあるが、カソリックが大多数である。



写真-1 サルト（モンテビデオ北西約500km）近郊

歴史：ラテンアメリカの他の多くの国同様、1516年のスペイン人の到来以降、スペインの植民地になった。写真-2にある騎乗のアルティガス将軍（スペイン）は、この国の建国の父のような存在である。その後、ブラジルの属州となったものの、1825年に独立を宣言し、1828年にアルゼンチンとブラジル間で締結された平和条約に基づき独立が承認された。その後、内戦や独裁政治などが続いたが、20世紀はじめには政治は安定し、民主的な社会、労働立法がなされた。経済面では、二度の世界大戦で混乱し、生産の落ち込んだヨーロッパへ農産物を輸出することで社会資本を充実させ、経済基盤を築いた。建設当時、ラテンアメリカを誇った写真-2中の建造物をはじめ、ふんだんな外貨で多くの豪華な建造物が作られた。

交通：首都と各地を結ぶ交通は自動車が中心で、道路網が整備されている。しかし、決して快適なドライブは期待できない。人も車も少ないために日本のような渋滞に悩まされることはないが、誰もが高速道路なみのスピードで簡易舗装道を疾走する。写真-1は車の中から撮ったものだが、フロントガラスに汚れや傷があるのがわかると思う。これには二つの理由があり、一つは簡易舗装道を100km以上で走るために、跳ね上げられた小石がフロントガラスを傷つける、



写真-2 モンテビデオ市内

二つ目は鳥（日本でもよくみかける鳥から、まず目にかかることのない珍しい鳥まで、たくさんいる）が、あまりにも早く走る車をよけきれずにぶつかるからである。鉄道は農産物などの貨物の輸送のみに用いられ、旅客輸送には、ほとんど使われていない。

## 2. ウルグアイの農業事情

### 1) 産業の中での農業の位置づけ

GNPベースで見た場合、農業の総生産額はGNP全体の約12%に相当する17億ドル程度である。しかし、総輸出額に占める農産物の割合は約82%と高率である。この高い数字からも農産物関連の輸出が有力な外貨獲得源であることがわかる。この他、観光事業も有力な外貨獲得源である。1992年には、商品輸出総額の24%に相当する3億ドル以上を獲得している。

### 2) 農業総生産の内訳（図-1）

肉類、乳製品、羊毛の生産をあわせると総生産の約46%に達することから牧畜に重きが置かれている。それに米、小麦などの穀類、果実や野菜の生産がつづく。

このように、ウルグアイ経済は、牧畜業に依存する国であり、農業の比重は高くない。このことは供用されている面積からもよくわかる。




図-1 農業生産の内訳

農牧地約4,100万haのうち90%が牧場で、残りわずかに10%が耕地である。この広大な牧場に牛950万頭、羊2,600万頭が飼育されている(相当な数だが、実際に車で走っていても、それほど多いとは思えない。言い替えると、それほど広大な牧場地と言える)。それに比較すると、私のような日本人には粗放的にみえる農業も、ウルグアイでは集約的過ぎ、牧畜程には有利とは言えないようである。

これら生産物は、そのまま、あるいは加工され、輸出される。輸出相手国の筆頭はブラジルである(1992年、17.5%)。これにアルゼンチン、アメリカ、ドイツが続く。

肉類は、日本にも輸出されているそうだが、主な肥育形態が放牧であるため、あまり品質は高くなく加工原料となることが多い。穀類では米の生産が思った以上に多く、味も決して悪くはなかった。いずれ、日本へ輸出されるのかもしれない。園芸生産物の多くは国内消費であるが、果実、なかでも柑橘類の輸出を増やそうと努力している。主な輸出先は、ヨーロッパであるが南半球の柑橘産地、とくに南アフリカとの競争が激しいようである。また、北アメリカにも輸出するため、かいよう病対策などに努力している。

### 3) 果樹の栽培状況

ここで、私の派遣の対象となったカンキツ産

業について触れてみたい。ウルグアイの柑橘栽培面積は15,383haに及ぶ。エレンデールというマンダリンやオレンジ類が中心に栽培され、有力な輸出商品として位置づけられている。私は、採り忘れたエレンデールの果実をいただいたが、風味のいい、濃厚な味わいの果実であった。この品質の高さは、乾燥によるところが大きいようである。前述のように、年間降水量は1,200mmに過ぎず、土壌の保水力の低さも手伝って、樹体は常に水ストレスを受けている。そのため果実品質は優れるものの、定期的なかんがいが必要であり、約37%の圃場で既に行なわれていた。経営は典型的な大規模経営で、会社組織で行なわれている場合も目立つ。このような組織では、栽培管理を任されている管理人がおり、彼らが、経営上最良と思われる技術を導入している。そのため国の内外を問わず活発な情報交換が行なわれている。

### 植調剤利用の現状と将来

柑橘園に限れば、現在の植調剤の利用は、除草剤程度に過ぎない。生育調節剤は、成熟期に水ストレスを常にうけるウルグアイの気候では、フィガロンのような品質向上剤は不要である。しかし、隔年結果は、この国でも大きな問題となっており、着花を制御する技術が望まれている。これに関連して摘果剤や着花促進、抑制剤の利用場面が考えられ、摘果剤は一部で実用化されている。輸出に向けられる果実は、主に北半球向けであり、遠くはロシアまで運ばれるそうである。輸送中の腐敗や生理障害の回避も重要である。このような利用場面が考えられるものの、実用化にあたって重要なのは、効果よりコストであろう。コスト面で折り合えるなら相当大きな市場となりえるかもしれない。収穫以



写真-3 INIA(Instituto Nacional de Investigacion Agropecuaria)のカンキツ園

外は人手を極力使わず、最小限の投資で最大の収穫を得ようとする資本主義的な経営には、植調剤はまさに有用な道具となりそうであった。

形態の違いが、栽培対象の捉えかたに大きく影響することをあらためて教えてくれた。また、圃場を点でなく面で捉える視点には技術の多様な在り方を実感した。

今回の派遣は、経営の規模の差からくる経営

オキサジクロロメロン  
MY-100  
含有剤

水稻用初・中期一発処理除草剤

# ホームラン剤新登場!!

**ミスター・ホームラン®**  
フロアブル/Lフロアブル

① ノビエ55葉期まで効果がある。  
② ノビエに対する効果がながく持続する。  
③ 稲への安全性が高い。

**ホームラン**  
A1キロ粒剤36/1キロ粒剤51

北興化学工業株式会社 〒103-8341 東京都中央区日本橋本石町4-4-20

◎は登録商標

## 平成12年度水稻作関係

### 除草剤試験成績概要

財団法人 日本植物調節剤研究協会 技術部

平成12年度水稻作関係除草剤試験成績中央検討会は、平成12年12月7日、8日の2日間、池之端文化センターにおいて開催された。なお、適-1試験は、これに先立ち平成12年10月12日植調会館会議室にて開催された。ここに、これらの成果の概要を報告する。

#### 1) 第1次適用性試験(適-1)成績について

平成12年度の適-1試験は、北海道地域(植調北海道試験地)、東北地域(植調古川試験地)、北陸地域(植調新潟試験地)、関東地域(植調研究所)、近畿地域(植調滋賀試験地)、中国地域(植調広島第一試験地)、九州地域(植調福岡試験地)の全国7地域で24薬剤(のべ103点)について実施した。その判定結果は、第1表のとおりである。

#### 2) 第2次適用性試験(適-2)成績について

平成12年度全国で実施した試験の総点数は、のべ1,138点であった。その内訳は、Ⅱ-1(移植前土壌混和处理)2剤19点、Ⅱ-2(移植前後土壌処理)9剤70点、Ⅱ-3(移植後土壌処理)4剤17点、Ⅱ-5(適用時期拡大)5剤34点、Ⅱ-6(特殊雑草防除)のべ40剤77点、

Ⅲ(直播栽培用)11剤38点、Ⅳ(畦畔雑草用)5剤34点、Ⅴ(耕起前雑草用)2剤10点、不耕起栽培用2剤12点、Ⅵ(休耕田用)1剤5点、Ⅶ-1(初期一発処理剤)14剤101点、Ⅶ-2(初・中期一発処理剤)57剤544点、Ⅶ-3(長期持続型一発処理剤)2剤9点、Ⅸ(一年生持続型除草剤)2剤24点、Ⅹ(0.5kgおよび0.25kg粒剤)13剤128点、ⅩⅠ(生物除草剤)1剤16点であった。これら適-2試験の判定結果は第2表のとおりである。

#### 3) ジャンボ剤適用性試験成績について

平成12年度全国で実施したジャンボ剤適用性試験は、のべ673点であった。この内訳はⅡ-2(移植前後土壌処理)4剤63点、Ⅱ-3(移植後土壌処理)1剤5点、Ⅱ-5(適用時期拡大)1剤6点、Ⅱ-6(特殊雑草防除)のべ7剤16点、Ⅶ(一発処理剤)35剤512点、Ⅸ(一年生持続型除草剤)4剤71点であった。これら適用性試験の判定結果は第3表のとおりである。

第1表 平成12年度 水稻作関係除草剤適一試験 成績判定結果一覧

注) 判定欄の記入については、◎:極めて有望, ○:有望, □可能性有り, △:再検討, ×:見込みなし を表す。

| No. | 薬剤名・剤型<br>[委託者]                | 有効成分及び含有率<br>(%)                                                    | 試験実施場所別総合評価 |    |    |     |    |     |    | 中央判定結果<br>[今後の課題等]                                                    |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----|----|-----|----|-----|----|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                |                                                                     | 北海道         | 古川 | 新潟 | 竜ヶ崎 | 滋賀 | 広島1 | 福岡 |                                                                       |
| 1   | KPP-2008 乳(EW)<br>[科研]         | ブタクロール : 12<br>ベントキサゾン : 4                                          |             | ○  |    | ○   | ○  | □   |    | ○ 移植前後土壌処理剤として<br>ノビエ ~1.5L ホタルイ ~1.0L                                |
| 2   | AVH-002-1kg 粒<br>[アベニティ]       | ベンラフェート : 4<br>エトキシスルフロン : 0.17<br>オキサジゾン※ : 4.5<br>(※9/7付 成分公開)    | ○           | ○  | □  | □   | ○  | □   | △  | □ 初期一発処理剤として<br>ノビエ ~1.5L ホタルイ ~1.5L<br>・抑草期間について<br>・処理時期と効果の安定性について |
| 3   | HSW-001 フロアブル<br>[北海三共]        | ビラゾール : 300g/L<br>フェントラザミド (NBA-061)<br>: 40g/L<br>ベンゾビシロン : 40g/L  | ○           |    |    |     |    |     |    | ○ 初期一発処理剤として<br>ノビエ ~2.0L ホタルイ ~2.0L<br>・抑草期間について                     |
| 4   | KPP-2009-1kg 粒<br>[科研]         | ブタクロール : 7.5<br>ベントキサゾン : 2.5<br>ベンスルフロメチル : 0.75                   | □           | ○  |    |     |    |     |    | ○ 初期一発処理剤として<br>ノビエ ~2.0L ホタルイ ~2.0L<br>・薬害の程度及び回復性について               |
| 5   | KPP-2009(L)-1kg 粒<br>[科研]      | ブタクロール : 7.5<br>ベントキサゾン : 2.5<br>ベンスルフロメチル : 0.51                   |             |    | □  | ○   | ○  | ○   | □  | □ 初期一発処理剤として<br>ノビエ ~1.5L ホタルイ ~2.0L<br>・ノビエ, ホタルイの葉齢限界について           |
| 6   | KUH-003D-0.25kg 粒<br>[シミ化]     | ビリミノックメチル : 1.8<br>オキサジクロメホン : 1.6<br>ベンスルフロメチル : 2<br>クロメブロッグ : 14 |             |    | ○  | ○   | ○  | ○   | ○  | ○ 一発処理剤として<br>ノビエ ~2.0L ホタルイ ~2.0L                                    |
| 7   | KUH-003K-0.25kg 粒<br>[シミ化]     | ビリミノックメチル : 1.8<br>オキサジクロメホン : 1.6<br>ベンスルフロメチル : 3<br>クロメブロッグ : 14 | ○           | ○  |    |     |    |     |    | ○ 一発処理剤として<br>ノビエ ~2.0L ホタルイ ~2.0L                                    |
| 8   | NBA-126a-1kg 粒<br>[ハニエル]       | フェントラザミド (NBA-061)<br>: 2<br>ベンスルフロメチル : 0.75<br>未公開(既知) : A        | ○           | ○  |    |     |    |     |    | ○ 初期一発処理剤として<br>ノビエ ~2.0L ホタルイ ~2.0L                                  |
| 9   | NC-385SB 顆粒水和<br>[日産・SDS・ハニエル] | ビラゾールスルフロメチル : 2.6<br>フェントラザミド (NBA-061)<br>: 25<br>ベンゾビシロン : 25    | ○           | ○  | □  | ○   | ○  | ○   | ○  | ○ 初期一発処理剤として<br>ノビエ ~2.0L ホタルイ ~2.0L                                  |
| 10  | NC-397-1kg 粒<br>[日産]           | ビラゾールスルフロメチル : 0.3<br>ブロモグチド : 6<br>オキサジゾン※ : 4.5<br>(※8/25付 成分公開)  | □           | □  | □  | ○   | △  | △   | □  | □ 初期一発処理剤として<br>・水稻に対する影響と回復性について                                     |
| 11  | HOK-204-1kg 粒<br>[北興]          | ベンスルフロメチル : 0.75<br>オキサジクロメホン : 0.8<br>クロメブロッグ : 3.5                | ◎           | □  |    |     |    |     |    | □ 初期一発処理剤として<br>・効果の安定性、ノビエ, ホタルイの葉齢限界について                            |
| 12  | HOK-205-1kg 粒<br>[北興]          | ベンスルフロメチル : 0.51<br>オキサジクロメホン : 0.8<br>クロメブロッグ : 3.5                |             |    | □  | ○   | ○  | □   | □  | □ 初期一発処理剤として<br>・効果の安定性、葉齢限界について                                      |

注) 判定欄の記入については、◎: 極めて有望, ○: 有望, □: 可能性有り, △: 再検討, ×: 見込みなし を表す。

| No. | 薬剤名・剤型<br>[委託者]                              | 有効成分及び含有率<br>(%)                                                       | 試験実施場所別総合評価 |    |    |     |    |     |    | 中央判定結果<br>[今後の課題等]                                                             |
|-----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----|-----|----|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                              |                                                                        | 北海道         | 古川 | 新潟 | 竜ヶ崎 | 滋賀 | 広島1 | 福岡 |                                                                                |
| 13  | KUH-004D-1kg 粒<br>[クミ化]                      | ピリミパ ッカメチル : 0.6<br>ベントキサリ : 2<br>ベンスルフロメチル : 0.51<br>ダイムロン : 3        |             |    |    | ○   | ○  | ○   | ○  | ○<br>初・中期一発処理剤として<br>ノビエ ~3L ホタルイ ~2.0L<br>・ホタルイの葉齢限界について                      |
| 14  | KUH-004K-1kg 粒<br>[クミ化]                      | ピリミパ ッカメチル : 0.6<br>ベントキサリ : 2<br>ベンスルフロメチル : 0.75<br>ダイムロン : 3        | ○           | ○  |    |     |    |     |    | ○<br>初・中期一発処理剤として<br>ノビエ ~3L ホタルイ ~2.0L<br>・ホタルイの葉齢限界について                      |
| 15  | MY-100NC-1kg 粒<br>[*日産・アベントリス]               | ピラリ スルフロエチル : 0.3<br>オキサジ クロメホン : 0.8<br>クロメブ ロップ : 3.5                | ◎           | ◎  | ○  | ○   | ○  | ○   | ○  | ○<br>初・中期一発処理剤として<br>ノビエ ~2.5L ホタルイ ~2.5L<br>・ノビエ, ホタルイの葉齢限界と条件について            |
| 16  | MY-100TSC フロアブル<br>[*武田・アベントリス]              | イマザ スルフロ : 1.7<br>オキサジ クロメホン : 1.2<br>クロメブ ロップ : 6.6<br>ダイムロン : 9.5    | ○           | ○  | ○  | ○   |    |     |    | ○<br>初・中期一発処理剤として<br>ノビエ ~2.5L ホタルイ ~2.0L                                      |
| 17  | NH-003-1kg 粒<br>[*日農・デューボン・三菱]               | ベンスルフロメチル : 0.75<br>インダ ノファン : 1.4<br>クロメブ ロップ : 3.5                   | ○           | □  |    |     |    |     |    | □<br>初・中期一発処理剤として<br>ノビエ ~2.5L ホタルイ ~2.5L<br>・ノビエの効果について                       |
| 18  | NH-004-1kg 粒<br>[*日農・デューボン・三菱]               | ベンスルフロメチル : 0.51<br>インダ ノファン : 1.4<br>クロメブ ロップ : 3.5                   |             |    |    | ○   | ○  | ○   | ○  | □<br>初・中期一発処理剤として<br>ノビエ ~2.5L ホタルイ ~2.5L<br>・薬害と回復性について                       |
| 19  | SW-002 フロアブル<br>(旧HSW-982)<br>[*三共・永光・デューボン] | カフェンストロール : 5.5<br>ダイムロン : 10<br>ベンスルフロメチル : 1.4<br>ブロンズビシロン : 12      |             | ○  |    |     |    |     |    | ○<br>初・中期一発処理剤として<br>ノビエ ~2.5L ホタルイ ~2.0L                                      |
| 20  | SW-005 フロアブル<br>[*三共・永光・デューボン・SDS]           | カフェンストロール : 5.5<br>ダイムロン : 10<br>ベンスルフロメチル : 1.4<br>ブロンズビシロン : 4 (W/V) | ○           | ○  |    |     |    |     |    | ○<br>初・中期一発処理剤として<br>ノビエ ~2.5L ホタルイ ~2.5L<br>・2.5Lノビエの効果確認<br>・ホタルイに対する残効性について |
| 21  | SW-005(L) フロアブル<br>[*三共・永光・デューボン・SDS]        | カフェンストロール : 5.5<br>ダイムロン : 10<br>ベンスルフロメチル : 1<br>ブロンズビシロン : 4 (W/V)   |             |    |    | ○   | ◎  | ◎   | ◎  | ◎<br>初・中期一発処理剤として<br>ノビエ ~2.5L ホタルイ ~2.5L                                      |
| 22  | TH-001 フロアブル<br>[*武田・永光・SDS]                 | イマザ スルフロ : 1.7<br>カフェンストロール : 5.7<br>ブロンズビシロン : 3.8                    | ○           | ○  | ○  | ◎   | ◎  | ○   | ○  | ○<br>初・中期一発処理剤として<br>ノビエ ~2.5L ホタルイ ~2.5L<br>・砂壌土での広葉の抑草期間について                 |
| 23  | HOK-201 フロアブル<br>[北興]                        | HOK-201 (未公開(新規))<br>計 6                                               | □           | □  | □  | □   | □  | □   | □  | □<br>混合母剤として<br>ノビエ ~3.0L<br>・対象草種と処理時期について                                    |
| 24  | HOK-202 フロアブル<br>[北興]                        | HOK-201 (未公開(新規))<br>未公開(既知)<br>計 15                                   | □           | □  | △  | □   | ○  | △   | ○  | □<br>ノビエ ~3.0L<br>・混合効果について                                                    |

第2表 平成12年度 水稻関係除草剤適-2試験成績判定結果一覧

| 区 分                        | 実 ・ 継                                                                                                                                                  | 継                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ⅱ-1<br>移植前土壌混和处理           | KPP-2008 乳(EW), フタクロ-Ⅱ 乳                                                                                                                               |                                                              |
| Ⅱ-2<br>移植前後土壌処理<br>Ⅱ-2-(1) | CG-113 EW, NSK-863 フロアフル<br>YH-562 フロアフル, フタクロ-Ⅱ-1kg 粒                                                                                                 | KPP-2008 乳(EW)                                               |
| Ⅱ-2-(2)                    | KPP-2005④フロアフル(少量), NSK-859 フロアフル<br>RYH-118-1kg 粒, YH-562 フロアフル                                                                                       |                                                              |
| Ⅱ-3<br>移植後土壌処理<br>Ⅱ-3-(1)  | KH-183 粒                                                                                                                                               | HSW-991 フロアフル                                                |
| Ⅱ-3-(2)                    | KUH-958 フロアフル(少量)<br>SL-970 フロアフル(少量)                                                                                                                  |                                                              |
| Ⅱ-5<br>適用時期拡大              | DEH-112-1kg 粒, KUH-983-1kg 粒,<br>SW-973-1kg 粒, YH-591-1kg 粒                                                                                            | SB-551-1kg 粒                                                 |
| Ⅱ-6-(1)<br>クログワイ対象         | HJ-943-1kg 粒, KPP-932 フロアフル,<br>KUH-958 フロアフル, MY-100TS フロアフル,<br>NBA-076a-1kg 粒, NBA-076b-1kg 粒,<br>NBA-096a フロアフル, NBA-096b フロアフル<br>SB-528 フロアフル    | NC-339-1kg 粒                                                 |
| Ⅱ-6-(2)<br>オモダカ対象          | CH-906④-1kg 粒, HJ-943-1kg 粒,<br>KPP-932 フロアフル, MY-100TS フロアフル,<br>NBA-076a-1kg 粒, NBA-076b-1kg 粒,<br>NBA-096a フロアフル, NBA-096b フロアフル,<br>NBA-941-1kg 粒, | DHN-971 フロアフル, MY-100DC フロアフル,<br>NC-339-1kg 粒, SW-973-1kg 粒 |
| Ⅱ-6-(5)<br>シズイ対象           | KPP-932 フロアフル, MY-100DC フロアフル,<br>NBA-096a フロアフル, NC-339-1kg 粒,<br>SB-528 フロアフル                                                                        |                                                              |

| 区 分                    | 実 ・ 継                                                                                                                                                                    | 継                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ⅱ-6-(6)<br>エゾノサヤヌカグサ対象 | DHN-971 7077'ル, MY-100DC 7077'ル,<br>SB-556 7077'ル                                                                                                                        |                                                                                                                      |
| Ⅱ-6-(7)<br>クサネム対象      | SW-973-1kg 粒, KUH-911 液                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |
| Ⅱ-6-(8)<br>コウキヤガラ対象    | KPP-2005㊤ 7077'ル, MY-100DC㊤ 7077'ル,<br>SB-528 7077'ル                                                                                                                     |                                                                                                                      |
| Ⅱ-6-(9)<br>キシウスズメノヒエ対象 | DEH-112 乳(EW), DEH-BAS 乳(ME)                                                                                                                                             | SW-973-1kg 粒                                                                                                         |
| Ⅱ-6-(10)<br>その他        | SW-973-1kg 粒                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |
| Ⅲ<br>直播栽培              | AGH-925-1kg 粒, CDS-941 7077'ル,<br>CDS-941㊤ 7077'ル, NBA-941-1kg 粒,<br>NBA-942a-1kg 粒, NBA-942b-1kg 粒,<br>モリネトSM-1kg 粒, KUH-931-1kg 粒,<br>KU-936B-1kg 粒<br>不耕起直播: WOC-01 液 | SW-973-1kg 粒, TCG-128 乳<br>不耕起直播: フタコロ(播種後) 乳                                                                        |
| Ⅳ<br>畦畔対象              | CG-231GT 7077'ル, MON-96A 液,<br>SW-995 7077'ル                                                                                                                             | NH-007 7077'ル, SUM-99 7077'ル                                                                                         |
| V<br>耕起前               |                                                                                                                                                                          | NH-007 7077'ル, ZK-121 液                                                                                              |
| Ⅵ<br>休耕田               |                                                                                                                                                                          | NH-501 7077'ル                                                                                                        |
| Ⅶ-1<br>初期一発処理剤         | AGH-975 7077'ル, NBA-076a-1kg 粒,<br>NBA-076b-1kg 粒, NBA-096a 7077'ル,<br>NBA-096b 7077'ル, PSS㊤D-1kg 粒,<br>SB-533 7077'ル                                                    | HSW-001 7077'ル, KPP-2009-1kg 粒,<br>KPP-2009㊤-1kg 粒, NC-385SB 顆粒水和,<br>NC-397-1kg 粒, AVH-002-1kg 粒,<br>NBA-126a-1kg 粒 |

| 区 分                   | 実 ・ 継                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 継                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VII-2<br>初・中期一発処理剤    | AGH-925-1kg 粒, CDS-941 フロアブル,<br>DHN-971 フロアブル, DHN-971㊦ フロアブル,<br>HJ-943-1kg 粒, <u>HOK-205-1kg 粒</u> ,<br>KK-961-1kg 粒, KK-962-1kg 粒,<br>KUH-972D フロアブル, KUH-972K フロアブル,<br>KUH-985 フロアブル, KUH-985㊦ フロアブル,<br>KUH-989D-1kg 粒, KUH-989K-1kg 粒,<br>MK-243D㊦ フロアブル, MY-100D㊦-1kg 粒,<br>MY-100DC フロアブル, MY-100DC㊦ フロアブル,<br>MY-100N 顆粒水和, <u>MY-100NC 顆粒水和</u> ,<br><u>MY-100NC-1kg 粒</u> , <u>MY-100NDC-1kg 粒</u> ,<br>MY-100TS フロアブル, NBA-942b-1kg 粒,<br>NC-339 顆粒水和, NC-339-1kg 粒,<br>NC-385 顆粒水和, NC-390 フロアブル,<br><u>NC-395 顆粒水和</u> , NH-803 フロアブル,<br>NH-804 フロアブル, NOJ-101-1kg 粒,<br><u>NOJ-102-1kg 粒</u> , NOJ-103-1kg 粒,<br>NOJ-104-1kg 粒, <u>NOJ-105 OF</u> , <u>NOJ-106 OF</u> ,<br>NSK-858㊦ フロアブル, NSK-858㊦-1kg 粒,<br>NSK-858A-1kg 粒, RH-631-1kg 粒,<br>SB-556 フロアブル,<br>SW-002 (旧HSW-982) フロアブル,<br><u>SW-991-1kg 粒</u> , TH-951 フロアブル,<br><u>NBA-941S-1kg 粒</u> , NC-311DCD-1kg 粒, | HOK-204-1kg 粒, KUH-004D-1kg 粒,<br>KUH-004K-1kg 粒, NH-003-1kg 粒,<br>NH-004-1kg 粒, TH-001 フロアブル,<br>MY-100TSC フロアブル, TH-913NCS フロアブル,<br>SW-005 フロアブル, SW-005㊦ フロアブル |
| VII-3<br>長期持続型一発処理剤   | AC-014A-1kg 粒, AC-014C-1kg 粒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |
| IX<br>一年生持続型除草剤       | <u>HOK-983 フロアブル</u> , <u>MY-100MS フロアブル</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |
| X<br>0.5kgおよび0.25kg粒剤 | 移植後土壌処理剤<br><u>KUH-992-0.25kg 粒</u><br>一発処理剤<br><u>AGH-987-0.5kg 粒</u> ,<br>AKD-7105-0.5kg (旧NC-386-0.5kg) 粒,<br>KUH-986D-0.25kg 粒, KUH-986K-0.25kg 粒,<br>MK-243D㊦-0.5kg 粒, MK-243DS-0.5kg 粒,<br>MK-243N-0.5kg 粒, NH-801-0.5kg 粒,<br>NH-802-0.5kg 粒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 一発処理剤<br>KUH-003D-0.25kg粒, KUH-003K-0.25kg粒<br>一年生持続型除草剤<br>MK-243S-0.5kg 粒                                                                                        |
| X I<br>生物除草剤          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MTB-951                                                                                                                                                            |

第3表 平成12年度 水稲除草剤ジャンボ剤適用性試験成績判定結果一覧

| 区 分                    | 実 ・ 継                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 継                                                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ⅱ-2<br>移植前後土壌処理        | KPP-2005, SW-972, <u>ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MAT-159                                                                  |
| Ⅱ-3<br>移植後土壌処理         | SB-554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |
| Ⅱ-5<br>適用時期拡大          | DEH-112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |
| Ⅱ-6-(1)<br>クログワイ対象     | <u>NBA-092a</u> , <u>NBA-092b</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SB-554                                                                   |
| Ⅱ-6-(2)<br>オモダカ対象      | <u>HSA-971</u> , <u>NBA-092a</u> , <u>NBA-092b</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| Ⅱ-6-(6)<br>エゾノサヤヌカグサ対象 | <u>NBA-092a</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |
| VII<br>一発処理剤           | AC-014C, <u>AC-014C-50</u> , AGH-987, HSA-971, <u>KUH-883(改)</u> , <u>KUH-883㊦(改)</u> , KUH-975PD, KUH-975PK, <u>MY-100DC㊦</u> , MY-100MS, <u>MY-100NC</u> , NBA-092a, NBA-092b, NBA-093, NBA-101, NC-377㊦, <u>NC-391㊦</u> , <u>NCH-903DEH</u> , NH-805, NH-806, <u>NH-906</u> , <u>ONC-381(旧NC-381)</u> , SW-952, <u>SW-952P5㊦</u> , <u>SW-952P5㊦</u> , TH-913CS, AC-014C㊦ | AC-014R, AGH-008, MY-100DC㊦, NBA-101SB, NH-001, NH-002, SW-001㊦, SW-001㊦ |
| IX<br>一年生持続型除草剤        | <u>SB-533P5</u> , <u>SB-554</u> , SW-965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HOK-991                                                                  |

注) : 1) 本年度新規に使用基準を作成されたものは、薬剤名にアンダーラインを記した。

2) 本年度は「実」、「継？」及び「中止」と判定された薬剤はなかった。

# 平成12年度 水稻関係除草剤使用基準一覧表

II-1 移植前土壌混和処理

| 処理法                       | 地域名    | 作期  | ノビエ | 一年<br>広葉<br>マハ | ホタルイ | ウリカ | ミヤ<br>カリ | ヘラ<br>タカ | クロ<br>グ | オモ<br>グ | ヒル<br>ムシ<br>ロ | 類<br>表<br>腐<br>離 | 処理時期    | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意      |
|---------------------------|--------|-----|-----|----------------|------|-----|----------|----------|---------|---------|---------------|------------------|---------|----------------|-------------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|
| II-1<br>KPP-2008<br>乳(EW) | 土壌混和処理 | 北海道 |     |                |      |     |          |          |         |         |               |                  | 植代時(〜4) | 50<br>ml/a     |             |        |        |        |                 | 混和時の<br>水深3〜5cm |
|                           |        | 東北  | ●   | ●              | ●    |     | ●        |          |         |         |               |                  |         |                |             |        |        | ●      | 1               |                 |
|                           |        | 北陸  | ●   | ●              | ●    |     | ●        |          |         |         |               |                  |         |                |             | ●      | ●      | ●      | 1.5             |                 |
|                           |        | 関東海 | 早   |                |      |     |          |          |         |         |               |                  |         |                |             |        |        |        |                 |                 |
|                           |        | 普   | ●   | ●              | ●    |     | ●        |          |         |         |               |                  |         |                |             |        | ●      | ●      | 2               |                 |
|                           |        | 近畿中 | 早   |                |      |     |          |          |         |         |               |                  |         |                |             |        |        |        |                 |                 |
|                           |        | 普   | ●   | ●              | ●    |     | ●        |          |         |         |               |                  |         |                |             |        | ●      | ●      | 1               |                 |
|                           |        | 四国  | 早   |                |      |     |          |          |         |         |               |                  |         |                |             |        |        |        |                 |                 |
|                           |        | 普   | ●   | ●              | ●    |     | ●        |          |         |         |               |                  |         |                |             |        | ●      | ●      |                 |                 |
|                           |        | 九州  | 早   |                |      |     |          |          |         |         |               |                  |         |                |             |        |        |        |                 |                 |
|                           |        | 普   |     |                |      |     |          |          |         |         |               |                  |         |                |             |        | ●      | ●      |                 |                 |

| 処理法                 | 地域名    | 作期  | ノビエ | 一年<br>広葉<br>マハ | ホタルイ | ウリカ | ミヤ<br>カリ | ヘラ<br>タカ | クロ<br>グ | オモ<br>グ | ヒル<br>ムシ<br>ロ | 類<br>表<br>腐<br>離 | 処理時期        | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意      |
|---------------------|--------|-----|-----|----------------|------|-----|----------|----------|---------|---------|---------------|------------------|-------------|----------------|-------------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|
| II-1<br>ブタクロ-Ⅱ<br>乳 | 土壌混和処理 | 北海道 |     |                |      |     |          |          |         |         |               |                  | 植代時<br>(〜4) | 30<br>ml/a     |             |        |        |        |                 | 混和時の<br>水深3〜5cm |
|                     |        | 東北  | ○   | ○              | ○    |     |          |          |         |         |               |                  |             |                |             |        | ○      | ○      | 1               |                 |
|                     |        | 北陸  |     |                |      |     |          |          |         |         |               |                  |             |                |             |        |        |        |                 |                 |
|                     |        | 関東海 | 早   | ●              | ●    | ●   |          | ●        |         |         |               |                  |             |                |             |        |        | ●      | 1               |                 |
|                     |        | 普   | ○   | ○              | ○    |     |          |          |         |         |               |                  |             |                |             | ○      | ○      | ○      | 2               |                 |
|                     |        | 近畿中 | 早   |                |      |     |          |          |         |         |               |                  |             |                |             |        |        |        |                 |                 |
|                     |        | 普   |     |                |      |     |          |          |         |         |               |                  |             |                |             |        |        |        |                 |                 |
|                     |        | 四国  | 早   |                |      |     |          |          |         |         |               |                  |             |                |             |        |        |        |                 |                 |
|                     |        | 普   |     |                |      |     |          |          |         |         |               |                  |             |                |             |        |        |        |                 |                 |
|                     |        | 九州  | 早   |                |      |     |          |          |         |         |               |                  |             |                |             |        |        |        |                 |                 |
|                     |        | 普   |     |                |      |     |          |          |         |         |               |                  |             |                |             |        |        |        |                 |                 |

II-2 移植前後土壌処理

II-2-(1) (従来通り)

| 処理法                      | 地域名  | 作期  | ノビエ | 一年<br>広葉<br>マハ | ホタルイ | ウリカ | ミヤ<br>カリ | ヘラ<br>タカ | クロ<br>グ | オモ<br>グ | ヒル<br>ムシ<br>ロ | 類<br>表<br>腐<br>離 | 処理時期                                       | 使用<br>量・<br>製品              | 砂<br>壌<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意 |
|--------------------------|------|-----|-----|----------------|------|-----|----------|----------|---------|---------|---------------|------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------|--------|--------|-----------------|------------|
| II-2-(1)<br>CG-113<br>EW | 土壌処理 | 北海道 | ●1  | ●              | ●始   |     |          |          |         |         |               |                  | +0〜+5(ノビエIL)<br>植代後〜4,<br>+0〜+5<br>(ノビエIL) | 10<br>ml/a<br>(約50<br>ml/a) | ●           | ●1.5   | ●      | ●      | 2               | (13)       |
|                          |      | 東北  | ●1  | ●              | ●始   | ●始  |          |          |         |         |               |                  |                                            |                             | ●           | ●      | ●      | ●      |                 |            |
|                          |      | 北陸  | ●1  | ●              | ●始   | ●始  |          |          |         |         |               |                  |                                            |                             | ●           | ●      | ●      | ●      | 1.5             |            |
|                          |      | 関東海 | 早   | ●1             | ●    | ●始  |          |          |         |         |               |                  |                                            |                             | ●           | ●      | ●      | ●      | 1               |            |
|                          |      | 普   | ●1  | ●              | ●始   |     |          |          |         |         |               |                  |                                            |                             | ●           | ●      | ●      | ●      | 2               |            |
|                          |      | 近畿中 | 早   |                |      |     |          |          |         |         |               |                  |                                            |                             |             |        |        |        |                 |            |
|                          |      | 普   | ●1  | ●              | ●始   | ●始  |          |          |         |         |               |                  |                                            |                             |             | ●      | ●      | ●      | 1               |            |
|                          |      | 四国  | 早   |                |      |     |          |          |         |         |               |                  |                                            |                             |             |        |        |        |                 |            |
|                          |      | 普   | ●1  | ●              | ●始   | ●始  |          |          |         |         |               |                  |                                            |                             |             | ●      | ●      | ●      |                 |            |
|                          |      | 九州  | 早   | ●1             | ●    | ●始  | ●前       |          |         |         |               |                  |                                            |                             | ●           | ●      | ●      | ●      | 1.5             |            |
|                          |      | 普   | ●1  | ●              | ●始   | ●始  |          |          |         |         |               |                  |                                            |                             | ●           | ●      | ●      | ●      |                 |            |

II-2-(1) KPP-2008 乳(EW) 「継」

| 処理法                           | 地域名  | 作期  | ノビエ  | 一年<br>広葉<br>マハ | ホタルイ | ウリカ | ミヤ<br>カリ | ヘラ<br>タカ | クロ<br>グ | オモ<br>グ | ヒル<br>ムシ<br>ロ | 類<br>表<br>腐<br>離 | 処理時期                                 | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意 |
|-------------------------------|------|-----|------|----------------|------|-----|----------|----------|---------|---------|---------------|------------------|--------------------------------------|----------------|-------------|--------|--------|--------|-----------------|------------|
| II-2-(1)<br>NSK-863<br>7077-Ⅱ | 土壌処理 | 北海道 | ○1.5 | ○              | ○始   |     |          |          |         |         |               |                  | +0〜ノビエIL.5L<br>植代後〜4,<br>+0〜ノビエIL.5L | 50<br>ml/a     | ○           | ○      | ○      | ○      | 2               |            |
|                               |      | 東北  | ○1.5 | ○              | ○始   |     |          |          |         |         |               |                  |                                      |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 1.5             |            |
|                               |      | 北陸  | ○1.5 | ○              | ○始   |     |          |          |         |         |               |                  |                                      |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 2               |            |
|                               |      | 関東海 | 早    | ○1.5           | ○    | ○始  |          |          |         |         |               |                  |                                      |                | ●           | ○      | ○      | ○      | 1               |            |
|                               |      | 普   | ○1.5 | ○              | ○始   |     |          |          |         |         |               |                  |                                      |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 2               |            |
|                               |      | 近畿中 | 早    | ○1.5           | ○    | ○始  |          |          |         |         |               |                  |                                      |                | ●           | ○      | ○      | ○      | 1               |            |
|                               |      | 普   | ○1.5 | ○              | ○始   |     |          |          |         |         |               |                  |                                      |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 1.5             |            |
|                               |      | 四国  | 早    | ○1.5           | ○    | ○始  |          |          |         |         |               |                  |                                      |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 1               |            |
|                               |      | 普   | ○1.5 | ○              | ○始   |     |          |          |         |         |               |                  |                                      |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 1.5             |            |
|                               |      | 九州  | 早    | ○1.5           | ○    | ○始  |          |          |         |         |               |                  |                                      |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 1               |            |
|                               |      | 普   | ○1.5 | ○              | ○始   |     |          |          |         |         |               |                  |                                      |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 2               |            |

|                               | 処理法  | 地域名      | 作期     | ノ・エ          | 一年<br>広葉<br>マハイ | ネグイ      | ウリカ | ミヤ<br>カマリ | ハナモ<br>ダカ | クロ<br>カ | オモ<br>カ | ヒルム<br>シロ | 藻類<br>剥離 | 処理時期              | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                  |   |
|-------------------------------|------|----------|--------|--------------|-----------------|----------|-----|-----------|-----------|---------|---------|-----------|----------|-------------------|----------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------------------|---|
| Ⅱ-3-(1)<br>YII-562<br>7077' Ⅱ | 土壌処理 | 北海道      | ○1     | ○            | ○始              |          |     |           | ○始        |         |         |           | ○前       | +0~+5 (ノ・エ IL)    | 50<br>ml/a     | ○       | ○      | ○      | ○      | 2               | 田植同時<br>散布可能<br>(東北~<br>四国) |   |
|                               |      | 東北       | ○1.5   | ○            | ○始              |          |     |           | ○始        |         |         |           | ○前       | +0~+5 (ノ・エ IL)    |                | ○       | ○      | ○      | ○      |                 |                             |   |
|                               |      | 北陸       | ○1.5   | ○            | ○始              |          |     |           |           |         |         |           | ○前       |                   |                | ○       | ○      | ○      | ○      |                 |                             |   |
|                               |      | 関東<br>東海 | 早<br>普 | ○1.5<br>○1.5 | ○<br>○          | ○始<br>○始 |     |           |           |         |         |           | ○前<br>○前 |                   |                | ○<br>○  | ○<br>○ | ○<br>○ | ○<br>○ |                 |                             |   |
|                               |      | 近畿<br>中国 | 早<br>普 | ○1<br>○1     | ○<br>○          | ○始<br>○始 |     |           |           |         |         |           |          | +0~+5<br>(ノ・エ IL) |                |         | ○      | ○      | ○      | ○               |                             | 1 |
|                               |      |          | 早<br>普 | ○1<br>○1     | ○<br>○          | ○始<br>○始 |     |           |           |         |         |           |          |                   |                |         | ○<br>○ | ○<br>○ | ○<br>○ | ○<br>○          |                             |   |
|                               |      | 四国       | 早<br>普 | ○1<br>○1     | ○<br>○          | ○始<br>○始 |     |           |           |         |         |           |          |                   |                |         | ○<br>○ | ○<br>○ | ○<br>○ | ○<br>○          |                             |   |
|                               |      |          | 早<br>普 | ○1<br>○1     | ○<br>○          | ○始<br>○始 |     |           |           |         |         |           |          |                   |                |         | ○<br>○ | ○<br>○ | ○<br>○ | ○<br>○          |                             |   |
|                               |      | 九州       | 早<br>普 | ○1<br>○1     | ○<br>○          | ○始<br>○始 |     |           |           |         |         |           |          |                   |                |         | ○<br>○ | ○<br>○ | ○<br>○ | ○<br>○          |                             |   |
|                               |      |          | 早<br>普 | ○1<br>○1     | ○<br>○          | ○始<br>○始 |     |           |           |         |         |           |          |                   |                |         | ○<br>○ | ○<br>○ | ○<br>○ | ○<br>○          |                             |   |

|                               | 処理法  | 地域名      | 作期     | ル・エ        | 一年<br>広葉<br>マハバ | ネグイ        | ウリカ | ミヤ<br>カマリ  | ヘラオ<br>タカ | クロ<br>カ | オモ<br>カ | ヒルム<br>シロ | 藻類<br>剥離 |  | 処理時期           | 使用<br>量・<br>製品                 | 砂<br>壌土 | 堆<br>土        | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意 |  |
|-------------------------------|------|----------|--------|------------|-----------------|------------|-----|------------|-----------|---------|---------|-----------|----------|--|----------------|--------------------------------|---------|---------------|--------|--------|-----------------|------------|--|
| II-3-(1)<br>7' タクロ-N-1kg<br>粒 | 土壌処理 | 北海道      |        | ● 1        | ●               | ● 始        |     |            | ● 前       |         |         |           |          |  | + ~+5 (ノ・エ IL) | 100<br>g/a                     |         | ●<br>土<br>1.5 | ● 始    | ● 堆    | 2               |            |  |
|                               |      | 東北       |        | ● 1        | ●               | ● 始        |     | ● 始        |           |         |         |           |          |  |                | 植代後~4,<br>+ 1 ~+ 5<br>(ノ・エ IL) |         |               | ● 堆    | ● 堆    |                 |            |  |
|                               |      | 北陸       |        | ● 1        | ●               | ● 始        |     | ● 始        |           |         |         |           |          |  |                |                                |         | ● 堆           | ● 堆    |        |                 |            |  |
|                               |      | 関東<br>東海 | 早<br>普 | ● 1<br>○ 1 | ●<br>○          | ● 始<br>○ 始 |     | ● 始<br>● 始 |           |         |         |           |          |  |                | + 1 ~+ 5<br>(ノ・エ IL)           |         |               | ● 堆    | ● 堆    | 2               |            |  |
|                               |      | 近畿<br>中国 | 早<br>普 | ● 1<br>● 1 | ●<br>●          | ● 始<br>● 始 |     | ● 始<br>● 前 |           |         |         |           |          |  |                |                                |         |               | ● 堆    | ● 堆    | 1               |            |  |
|                               |      | 四国       | 早<br>普 | ● 1<br>● 1 | ●<br>●          | ● 始<br>● 始 |     | ● 前        |           |         |         |           |          |  |                |                                |         |               | ● 堆    | ● 堆    |                 |            |  |
|                               |      | 九州       | 早<br>普 | ● 1<br>● 1 | ●<br>●          | ● 始<br>● 始 |     |            |           |         |         |           |          |  |                |                                |         | ● 1           | ● 堆    | ● 堆    | 1.5             |            |  |
|                               |      |          |        |            |                 |            |     |            |           |         |         |           |          |  |                |                                |         |               |        |        |                 |            |  |
|                               |      |          |        |            |                 |            |     |            |           |         |         |           |          |  |                |                                |         |               |        |        |                 |            |  |
|                               |      |          |        |            |                 |            |     |            |           |         |         |           |          |  |                |                                |         |               |        |        |                 |            |  |

## II-2-(2) (一発処理剤の前処理)

|                                     | 処理法  | 地域名      | 作期 | ル・エ | 一年<br>広葉<br>マハイ | ネグイ | ウリカ | ミヤ<br>カマリ | ハナモ<br>ダカ | クロ<br>カ | オモ<br>カ | ヒルム<br>シロ | 藻類<br>剥離 |  | 処理時期           | 使用<br>量・<br>製品               | 砂<br>壌土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意 |                                              |     |
|-------------------------------------|------|----------|----|-----|-----------------|-----|-----|-----------|-----------|---------|---------|-----------|----------|--|----------------|------------------------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|------------|----------------------------------------------|-----|
| Ⅱ-2-(2)少量<br>KPP-2005(Ⅱ)<br>7077' Ⅱ | 土壌処理 | 北海道      | ○1 | ○   | ○始              |     |     |           |           |         |         |           |          |  | +0~+5 (ノ・エ IL) | 30<br>ml/a                   | ○<br>5  | ○      | ○      | ○      | ○               | 2          | 一発処理剤の前<br>除草として<br>少量散布<br>(30ml/a)が<br>可能。 |     |
|                                     |      | 東北       | ○1 | ○   | ○始              |     |     | ○前        |           |         |         |           |          |  |                | 植代後~-4,<br>+0~+5<br>(ノ・エ IL) |         | ○      | ○      | ○      | ○               | 1.5        |                                              |     |
|                                     |      | 北陸       | ○1 | ○   | ○始              |     |     | ○始        |           |         |         |           |          |  |                |                              |         | ○      | ○      | ○      | ○               | 2          |                                              |     |
|                                     |      | 関東<br>東海 | 早  | ○1  | ○               | ○始  |     |           | ○始        |         |         |           |          |  |                |                              |         |        | ●      | ●      | ○               | ○          |                                              | 1   |
|                                     |      |          | 普  | ○1  | ○               | ○始  |     |           | ○始        |         |         |           |          |  |                |                              |         |        | ○      | ○      | ○               | ○          |                                              | 2   |
|                                     |      | 近畿<br>中国 | 早  | ○1  | ○               | ○始  |     |           | ○始        |         |         |           |          |  |                |                              |         |        | ●      | ○      | ○               | ○          |                                              | 1.5 |
|                                     |      |          | 普  | ○1  | ○               | ○始  |     |           | ○始        |         |         |           |          |  |                |                              |         |        | ○      | ○      | ○               | ○          |                                              | 2   |
|                                     |      | 四国       | 早  | ○1  | ○               | ○始  |     |           | ○始        |         |         |           |          |  |                |                              |         |        | ●      | ○      | ○               | ○          |                                              | 1.5 |
|                                     |      |          | 普  | ○1  | ○               | ○始  |     |           | ○始        |         |         |           |          |  |                |                              |         |        | ○      | ○      | ○               | ○          |                                              | 2   |
|                                     |      | 九州       | 早  | ○1  | ○               | ○始  |     |           | ○始        |         |         |           |          |  |                |                              |         |        | ○      | ○      | ○               | ○          |                                              | 1.5 |
| 普                                   | ○1   |          | ○  | ○始  |                 |     | ○始  |           |           |         |         |           |          |  |                |                              | ○       | ○      | ○      | ○      |                 |            |                                              |     |

|                               | 処理法  | 地域名      | 作期 | ル・エ | 一年<br>広葉<br>マハイ | ネグイ | ウリカ | ミヤ<br>カマリ | ハナモ<br>ダカ | クロ<br>カ | オモ<br>カ | ヒルム<br>シロ | 藻類<br>剥離 |  | 処理時期                       | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                      |
|-------------------------------|------|----------|----|-----|-----------------|-----|-----|-----------|-----------|---------|---------|-----------|----------|--|----------------------------|----------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|---------------------------------|
| Ⅱ-2-(2)<br>NSK-859<br>7077' Ⅱ | 土壌処理 | 北海道      | ○1 | ○   | ○始              |     |     |           | ○始        |         |         |           |          |  | 植代後～4.<br>+0～+5<br>(ノ・エIL) | 50<br>ml/a     | ○<br>5  | ○      | ○      | ○      | 2               | *移植前処<br>理を除く<br>(関東・東海<br>の早期) |
|                               |      | 東北       | ○1 | ○   | ○始              |     |     | ○始        |           |         |         |           |          |  |                            |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 1.5             | 水口処理<br>可能                      |
|                               |      | 北陸       | ○1 | ○   | ○始              |     |     | ○始        |           |         |         |           |          |  |                            |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 2               |                                 |
|                               |      | 関東<br>東海 | 早  | ○1  | ○               | ○始  |     |           | ○始        |         |         |           |          |  |                            |                | ○*      | ○      | ○      | ○      | 1               |                                 |
|                               |      |          | 普  | ○1  | ○               | ○始  |     |           | ○始        |         |         |           |          |  |                            |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 2               |                                 |
|                               |      | 近畿<br>中国 | 早  | ○1  | ○               | ○始  |     |           | ○始        |         |         |           |          |  |                            |                | ○*      | ○      | ○      | ○      | 1.5             |                                 |
|                               |      |          | 普  | ○1  | ○               | ○始  |     |           | ○始        |         |         |           |          |  |                            |                | ○       | ○      | ○      | ○      |                 |                                 |
|                               |      | 四国       | 早  | ○1  | ○               | ○始  |     |           | ○始        |         |         |           |          |  |                            |                | ○*      | ○      | ○      | ○      |                 |                                 |
|                               |      |          | 普  | ○1  | ○               | ○始  |     |           | ○始        |         |         |           |          |  |                            |                | ○       | ○      | ○      | ○      |                 |                                 |
|                               |      | 九州       | 早  | ○1  | ○               | ○始  |     |           | ○始        |         |         |           |          |  |                            |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 2               |                                 |
|                               |      |          | 普  | ○1  | ○               | ○始  |     |           | ○始        |         |         |           |          |  |                            |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 1               |                                 |

| 処理法                      | 地域名  | 作期  | ハ・エ | 一年広葉マハイ | ホトメ | ウリカ | ミヤガ | ヘラオモ | クログ | オモカ | ヒルムシ | 藻類剥離 | 処理時期                   | 使用量・製品  | 砂壌土 | 壤土 | 埴土 | 埴土 | 減深  | 使用上の注意               |
|--------------------------|------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|------------------------|---------|-----|----|----|----|-----|----------------------|
| II-2-(2)<br>RYH-118-1kg粒 | 土壌処理 | 北海道 | ○1  | ○       |     |     |     |      |     |     |      |      | +0~+5 (/ハ・エIL)         | 100 g/a | ○   | ○  | ○  | ○  | 2   | (5)                  |
|                          |      | 東北  | ○1  | ○       |     |     |     |      |     |     |      |      | 植代後~+4, +0~+5 (/ハ・エIL) | 100 g/a | ○   | ○  | ○  | ○  | 1.5 | 一発処理型除草剤として使用する。     |
|                          |      | 北陸  | ○1  | ○       |     |     |     |      |     |     |      |      |                        | 100 g/a | ●   | ●  | ○  | ○  | 2   |                      |
|                          |      | 関東  | 早   | ○1      | ○   |     |     |      |     |     |      |      |                        | 100 g/a | ●   | ○  | ○  | ○  | 1   |                      |
|                          |      | 東海  | 普   | ○1      | ○   |     |     |      |     |     |      |      |                        | 100 g/a | ○   | ○  | ○  | ○  | 2   | ※移植前処理を施す(関東・東海の普通期) |
|                          |      | 近畿  | 早   | ○1      | ○   |     |     |      |     |     |      |      |                        | 100 g/a | ●   | ○  | ○  | ○  | 1   |                      |
|                          |      | 中国  | 普   | ○1      | ○   |     |     |      |     |     |      |      |                        | 100 g/a | ○   | ○  | ○  | ○  |     |                      |
|                          |      | 四国  | 早   | ○1      | ○   |     |     |      |     |     |      |      |                        | 100 g/a | ●   | ○  | ○  | ○  |     |                      |
|                          |      | 普   | ○1  | ○       |     |     |     |      |     |     |      |      |                        | 100 g/a | ○   | ○  | ○  | ○  |     |                      |
|                          |      | 九州  | 早   | ○1      | ○   |     |     |      |     |     |      |      |                        | 100 g/a | ●   | ○  | ○  | ○  | 2   |                      |
|                          |      | 普   | ○1  | ○       |     |     |     |      |     |     |      |      |                        | 100 g/a | ●   | ●  | ○  | ○  | 1.5 |                      |

| 処理法                             | 地域名  | 作期  | ハ・エ | 一年広葉マハイ | ホトメ | ウリカ | ミヤガ | ヘラオモ | クログ | オモカ | ヒルムシ | 藻類剥離 | 処理時期                   | 使用量・製品  | 砂壌土 | 壤土 | 埴土 | 埴土 | 減深  | 使用上の注意                             |
|---------------------------------|------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|------------------------|---------|-----|----|----|----|-----|------------------------------------|
| II-3-(2)少量<br>YH-562<br>7077g/l | 土壌処理 | 北海道 | ○1  | ○       | ○始  |     |     | ○前   |     |     |      | ○前   | +0~+5 (/ハ・エIL)         | 30 ml/a | ○   | ○  | ○  | ○  | 2   | 一発処理型除草剤として少量散布(30ml/a)が可能(北海道~北陸) |
|                                 |      | 東北  | ○1  | ○       | ○始  |     |     | ○始   |     |     |      |      | 植代後~+4, +0~+5 (/ハ・エIL) | 30 ml/a | ○   | ○  | ○  | ○  | 1.5 |                                    |
|                                 |      | 北陸  | ○1  | ○       | ○始  |     |     |      |     |     |      |      |                        | 30 ml/a | ○   | ○  | ○  | ○  | 2   |                                    |
|                                 |      | 関東  | 早   |         |     |     |     |      |     |     |      |      |                        | 30 ml/a |     |    |    |    |     |                                    |
|                                 |      | 東海  | 普   |         |     |     |     |      |     |     |      |      |                        | 30 ml/a |     |    |    |    |     |                                    |
|                                 |      | 近畿  | 早   |         |     |     |     |      |     |     |      |      |                        | 30 ml/a |     |    |    |    |     |                                    |
|                                 |      | 中国  | 普   |         |     |     |     |      |     |     |      |      |                        | 30 ml/a |     |    |    |    |     |                                    |
|                                 |      | 四国  | 早   |         |     |     |     |      |     |     |      |      |                        | 30 ml/a |     |    |    |    |     |                                    |
|                                 |      | 普   |     |         |     |     |     |      |     |     |      |      |                        | 30 ml/a |     |    |    |    |     |                                    |
|                                 |      | 九州  | 早   |         |     |     |     |      |     |     |      |      |                        | 30 ml/a |     |    |    |    |     |                                    |
|                                 |      | 普   |     |         |     |     |     |      |     |     |      |      |                        | 30 ml/a |     |    |    |    |     |                                    |

## II-3 移植後土壌処理

## II-3-(1) (従来通り)

II-3-(1) HSW-991 7077g/l 「籾」

| 処理法                     | 地域名  | 作期  | ハ・エ  | 一年広葉マハイ | ホトメ | ウリカ | ミヤガ | ヘラオモ | クログ | オモカ | ヒルムシ | 藻類剥離 | 処理時期           | 使用量・製品  | 砂壌土 | 壤土 | 埴土 | 埴土 | 減深 | 使用上の注意 |
|-------------------------|------|-----|------|---------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|----------------|---------|-----|----|----|----|----|--------|
| II-3-(1)<br>KH-183<br>粒 | 土壌処理 | 北海道 | ○1.5 | ○       | ○始  |     |     | ○始   |     |     |      | ○始   | +3~+7 (/ハ・エIL) | 300 g/a | ○   | ○  | ○  | ○  | 2  |        |
|                         |      | 東北  | ○1.5 | ○       | ○始  |     |     | ○前   |     |     |      | ○始   |                | 300 g/a | ○   | ○  | ○  | ○  |    |        |
|                         |      | 北陸  | ○1.5 | ○       | ○始  |     |     | ○前   |     |     |      | ●始   |                | 300 g/a | ○   | ○  | ○  | ○  |    |        |
|                         |      | 関東  | 早    |         |     |     |     |      |     |     |      | ●始   |                | 300 g/a |     |    |    |    |    |        |
|                         |      | 東海  | 普    | ○1.5    | ○   | ●始  |     |      |     |     |      | ●始   |                | 300 g/a | ○   | ○  | ○  | ○  |    |        |
|                         |      | 近畿  | 早    |         |     |     |     |      |     |     |      |      |                | 300 g/a |     |    |    |    |    |        |
|                         |      | 中国  | 普    | ○1.5    | ○   | ○始  |     |      |     |     |      | ○始   |                | 300 g/a | ○   | ○  | ○  | ○  |    |        |
|                         |      | 四国  | 早    |         |     |     |     |      |     |     |      | ○始   |                | 300 g/a |     |    |    |    |    |        |
|                         |      | 普   | ○1.5 | ○       | ○始  |     |     |      |     |     |      | ○始   |                | 300 g/a | ○   | ○  | ○  | ○  |    |        |
|                         |      | 九州  | 早    |         |     |     |     |      |     |     |      | ●始   |                | 300 g/a |     |    |    |    |    |        |
|                         |      | 普   | ○1.5 | ○       | ○始  |     |     |      |     |     |      | ●始   |                | 300 g/a | ○   | ○  | ○  | ○  |    |        |

## II-3-(2) (一発処理剤の前処理)

| 処理法                              | 地域名  | 作期  | ハ・エ | 一年広葉マハイ | ホトメ | ウリカ | ミヤガ | ヘラオモ | クログ | オモカ | ヒルムシ | 藻類剥離 | 処理時期           | 使用量・製品  | 砂壌土 | 壤土 | 埴土 | 埴土 | 減深  | 使用上の注意                      |
|----------------------------------|------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|----------------|---------|-----|----|----|----|-----|-----------------------------|
| II-3-(2)少量<br>KHU-958<br>7077g/l | 土壌処理 | 北海道 | ○1  | ○       | ○始  |     |     |      |     |     |      |      | +0~+5 (/ハ・エIL) | 30 ml/a | ○   | ○  | ○  | ○  | 2   | 一発処理型除草剤として少量散布(30ml/a)が可能。 |
|                                  |      | 東北  | ○1  | ○       | ○始  | ○前  |     |      |     |     |      |      |                | 30 ml/a | ○   | ○  | ○  | ○  | 1.5 |                             |
|                                  |      | 北陸  | ○1  | ○       | ○始  | ○始  |     |      |     |     |      |      |                | 30 ml/a |     | ○  | ○  | ○  |     |                             |
|                                  |      | 関東  | 早   | ○1      | ○   | ○始  | ○始  |      |     |     |      |      |                | 30 ml/a |     |    | ○  | ○  | 1   |                             |
|                                  |      | 東海  | 普   | ○1      | ○   | ○始  | ○始  |      |     |     |      |      |                | 30 ml/a | ○   | ○  | ○  | ○  | 2   |                             |
|                                  |      | 近畿  | 早   | ○1      | ○   | ○始  | ○始  |      |     |     |      |      |                | 30 ml/a |     | ○  | ○  | ○  | 1.5 |                             |
|                                  |      | 中国  | 普   | ○1      | ○   | ○始  | ○始  |      |     |     |      |      |                | 30 ml/a | ○   | ○  | ○  | ○  |     |                             |
|                                  |      | 四国  | 早   | ○1      | ○   | ○始  | ○始  |      |     |     |      |      |                | 30 ml/a | ○   | ○  | ○  | ○  |     |                             |
|                                  |      | 普   | ○1  | ○       | ○始  | ○始  |     |      |     |     |      |      |                | 30 ml/a | ○   | ○  | ○  | ○  |     |                             |
|                                  |      | 九州  | 早   | ○1      | ○   | ○始  | ○始  |      |     |     |      |      |                | 30 ml/a | ○   | ○  | ○  | ○  | 2   |                             |
|                                  |      | 普   | ○1  | ○       | ○始  | ○始  |     |      |     |     |      |      |                | 30 ml/a | ○   | ○  | ○  | ○  | 1.5 |                             |



|                          | 処理法            | 地域名      | 作期 | 1年<br>広葉<br>アハイ | ホリイ | ウリカ | ミヤ<br>ガリ | ヘラモ<br>ダガ | クロガ<br>ワイ | モダ<br>ガ | ヒムシ<br>ロ | 藻類<br>剥離 | 処理時期                               | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>cm/d | 使用上の<br>注意                |
|--------------------------|----------------|----------|----|-----------------|-----|-----|----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|------------------------------------|----------------|---------|--------|--------|--------|------------|---------------------------|
| II-5<br>VII-591-1kg<br>粒 | 基葉<br>堆肥<br>処理 | 北海道      | 早  | ○3              | ○   | ○2  | ○2       |           |           |         |          | ○始       | +20~+30<br>(イ75L以降,<br>/ビ 13Lまで)   | 100<br>g/a     | ○       | ○      | ○      | ○      | 2          | (1)<br>(8)<br>(9)<br>(21) |
|                          |                | 東北       | 早  | ○3              | ○   | ○2  | ○始       | ○始        |           |         |          |          |                                    |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 1.5        |                           |
|                          |                | 北陸       | 早  | ○3              | ○   | ○2  | ○2       | ○始        |           |         |          | ○前       |                                    |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 2          |                           |
|                          |                | 関東<br>東海 | 早  | ○3              | ○   | ○3  | ○3       | ○3        |           |         |          | ○始       | +20~+30<br>(イ75L以降,<br>/ビ 13Lまで)   |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 1          |                           |
|                          |                | 普        | ○3 | ○               | ○3  | ○3  | ○3       | ○3        |           |         |          | ○始       | +20~+25<br>(イ75L以降,<br>/ビ 13Lまで)   |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 2          |                           |
|                          |                | 近畿<br>中国 | 早  | ●2.5            | ●   | ●2  | ●3       | ●3        |           |         |          | ●始       | +20~+30<br>(イ75L以降,<br>/ビ 12.5Lまで) |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 1.5        |                           |
|                          |                | 普        | ○3 | ○               | ○3  | ○3  | ○3       | ○3        |           |         |          | ○始       | +20~+30<br>(イ75L以降,<br>/ビ 13Lまで)   |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 1          |                           |
|                          |                | 四国       | 早  | ●2.5            | ●   | ●2  | ●3       | ●3        |           |         |          | ●始       | (イ75L以降,<br>/ビ 12.5Lまで)            |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 1.5        |                           |
|                          |                | 普        | ○3 | ○               | ○3  | ○3  | ○3       | ○3        |           |         |          | ○始       | +20~+30<br>(イ75L以降,<br>/ビ 13Lまで)   |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 1          |                           |
|                          |                | 九州       | 早  |                 |     |     |          |           |           |         |          |          |                                    |                |         |        |        |        |            |                           |

## II-6-(1) クログワイ対象

II-6-(1) HJ-943-1kg 粒「実・継」 VII-2参照

II-6-(1) KPP-932 70777 粒「実・継」 VII-1の使用基準に併用

|                             | 処理法      | 地域名      | 作期   | 1年<br>広葉<br>アハイ | ホリイ | ウリカ | ミヤ<br>ガリ | ヘラモ<br>ダガ | クロガ<br>ワイ | モダ<br>ガ | ヒムシ<br>ロ | 藻類<br>剥離 | 処理時期      | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>cm/d | 使用上の<br>注意                   |
|-----------------------------|----------|----------|------|-----------------|-----|-----|----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|-----------|----------------|---------|--------|--------|--------|------------|------------------------------|
| VII-1<br>KPP-932<br>70777 粒 | 土壌<br>処理 | 北海道      | 早    | ○1.5            | ○   | ○2  | ○2       | ○2        |           |         | ○        | ○前       | +0~+11.5L | 50<br>ml/a     | ○       | ○      | ○      | ○      | 2          | (28)<br>(34)<br>(40)<br>(42) |
|                             |          | 東北       | 早    | ○1.5            | ○   | ○2  | ○2       | ○2        | ●前        | ●前      | ○        | ○前       | ●         |                | ○       | ○      | ○      | ○      |            |                              |
|                             |          | 北陸       | 早    | ○1.5            | ○   | ○2  | ○2       | ○2        | ○         |         | ○        | ○前       | ○         |                | ○       | ○      | ○      | ○      |            |                              |
|                             |          | 関東<br>東海 | 早    | ○1.5            | ○   | ○2  | ○始       | ○2        |           |         | ○        | ○前       | ○         |                | ○       | ○      | ○      | ○      |            |                              |
|                             |          | 普        | ○1.5 | ○               | ○2  | ○始  | ○2       | ○         | ●始        | ●前      | ○        | ○前       | ○         |                | ○       | ○      | ○      | ○      |            |                              |
|                             |          | 近畿<br>中国 | 早    | ○1.5            | ○   | ○始  | ○始       | ○始        |           |         | ○        | ○前       | ○         |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 1          |                              |
|                             |          | 普        | ○1.5 | ○               | ○始  | ○始  | ○始       | ○始        |           |         | ○        | ○前       | ○         |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 1.5        |                              |
|                             |          | 四国       | 早    | ○1.5            | ○   | ○始  | ○始       | ○始        |           |         | ○        | ○前       | ○         |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 1          |                              |
|                             |          | 普        | ○1.5 | ○               | ○始  | ○始  | ○始       | ○始        |           |         | ○        | ○前       | ○         |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 1.5        |                              |
|                             |          | 九州       | 早    | ○1.5            | ○   | ○2  | ○始       | ○2        |           |         | ○        | ○前       | ○         |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 2          |                              |

クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(東北、関東・東海)  
 モモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(東北、関東・東海)

II-6-(1) KUH-958 70777 粒「実・継」 II-3-(1)の使用基準に併用

|                                | 処理法      | 地域名      | 作期 | 1年<br>広葉<br>アハイ | ホリイ | ウリカ | ミヤ<br>ガリ | ヘラモ<br>ダガ | クロガ<br>ワイ | モダ<br>ガ | ヒムシ<br>ロ | 藻類<br>剥離 | 処理時期                          | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>cm/d | 使用上の<br>注意  |
|--------------------------------|----------|----------|----|-----------------|-----|-----|----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|-------------------------------|----------------|---------|--------|--------|--------|------------|-------------|
| II-3-(1)<br>KUH-958<br>70777 粒 | 土壌<br>処理 | 北海道      | 早  | ○1              | ○   | ○始  |          |           |           |         |          |          | +0~+5(イ1L)<br>植代後~4,<br>(イ1L) | 50<br>ml/a     | ○       | ○      | ○      | ○      | 2          | (5)<br>(42) |
|                                |          | 東北       | 早  | ○1              | ○   | ○始  | ○前       | ○始        | ●前        |         |          |          | +0~+7(イ1L)<br>植代後~4,<br>(イ1L) |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 1.5        |             |
|                                |          | 北陸       | 早  | ○1              | ○   | ○始  | ○始       |           |           |         |          |          | +0~+8(イ1L)<br>植代後~4,<br>(イ1L) |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 2          |             |
|                                |          | 関東<br>東海 | 早  | ○1              | ○   | ○始  | ○始       |           |           |         |          |          | +0~+5<br>(イ1L)                |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 1          |             |
|                                |          | 普        | ○1 | ○               | ○始  | ○始  | ○始       | ●前        |           |         |          |          |                               |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 2          |             |
|                                |          | 近畿<br>中国 | 早  | ○1              | ○   | ○始  | ○始       |           |           |         |          |          | 植代後~4,<br>+0~+5<br>(イ1L)      |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 1          |             |
|                                |          | 普        | ○1 | ○               | ○始  | ○始  | ○始       |           |           |         |          |          |                               |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 2          |             |
|                                |          | 四国       | 早  | ○1              | ○   | ○始  | ○始       |           |           |         |          |          | 但し植代後<br>~4は<br>早期を除く         |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 1          |             |
|                                |          | 普        | ○1 | ○               | ○始  | ○始  | ○始       |           |           |         |          |          |                               |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 2          |             |
|                                |          | 九州       | 早  | ○1              | ○   | ○始  | ○始       |           |           |         |          |          |                               |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 1.5        |             |

クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(東北、関東・東海)

II-6-(1) MY-100TS 70777 粒「実・継」 VII-2参照

II-6-(1) NBA-076a-1kg 粒「実・継」 VII-1参照

II-6-(1) NBA-076b-1kg 粒「実・継」 VII-1参照

II-6-(1) NBA-096a 70777 粒「実・継」 VII-1参照

II-6-(1) NBA-096b 70777 粒「実・継」 VII-1参照

II-6-(1) NC-339-1kg 粒「継」

II-6-(1) SB-528 7077g 粒「実・継」 II-2-(1)の使用基準に併用

| 処理法                                                              | 地域名      | 作期 | ハ・エ | 一年広葉<br>マハイ | オキイ | ウリカ | ミヤ<br>カ | ヘラオモ<br>タ | クロガ<br>イ | オモガ<br>カ | ヒムシ<br>ロ | 葉表剥離 | セリ | 処理時期                          | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                             |
|------------------------------------------------------------------|----------|----|-----|-------------|-----|-----|---------|-----------|----------|----------|----------|------|----|-------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|----------------|----------------------------------------|
| II-2-(1)<br>SB-528<br>7077g 粒<br><br>II-6-(5)<br>II-6-(8)<br>を併用 | 北海道      | 早  | ○   | ○           | ○   | ○   | ○       | ○         | ○        | ○        | ○        | ○    | ○  | 植代後～4,<br>+0～+5<br>(ハ・エIL)    | 50<br>ml/a     | ○      | ○      | ○      | ○      | 2              | (5)<br>(13)<br>(36)<br>(40)<br>(42)    |
|                                                                  | 東北       | 早  | ○   | ○           | ○   | ○   | ○       | ○         | ○        | ○        | ○        | ○    | ○  | ●**                           |                | ○      | ○      | ○      | ○      |                |                                        |
|                                                                  | 北陸       | 早  | ○   | ○           | ○   | ○   | ○       | ○         | ○        | ○        | ○        | ○    | ○  |                               |                | ○      | ○      | ○      | ○      |                |                                        |
|                                                                  | 関東<br>東海 | 早  | ○   | ○           | ○   | ○   | ○       | ○         | ○        | ○        | ○        | ○    | ○  |                               |                | ○      | ○      | ○      | ○      | 1              | 水口処理<br>可能<br>(北海道<br>東北、関東・<br>東海～九州) |
|                                                                  | 近畿<br>中国 | 早  | ○   | ○           | ○   | ○   | ○       | ○         | ○        | ○        | ○        | ○    | ○  |                               |                | ○      | ○      | ○      | ○      | 1              |                                        |
|                                                                  | 四国       | 早  | ○   | ○           | ○   | ○   | ○       | ○         | ○        | ○        | ○        | ○    | ○  | *コリキガ<br>：発生始<br>**シイ<br>：発生前 |                | ○      | ○      | ○      | ○      | 2              | 口植同時<br>散布可能<br>(関東・東海<br>～四国)         |
|                                                                  | 九州       | 早  | ○   | ○           | ○   | ○   | ○       | ○         | ○        | ○        | ○        | ○    | ○  |                               |                | ○      | ○      | ○      | ○      | 1.5            |                                        |
|                                                                  |          | 普  | ○   | ○           | ○   | ○   | ○       | ○         | ○        | ○        | ○        | ○    | ○  |                               |                | ○      | ○      | ○      | ○      |                |                                        |
|                                                                  |          |    |     |             |     |     |         |           |          |          |          |      |    |                               |                | ○      | ○      | ○      | ○      |                |                                        |
|                                                                  |          |    |     |             |     |     |         |           |          |          |          |      |    |                               |                | ○      | ○      | ○      | ○      |                |                                        |
|                                                                  |          |    |     |             |     |     |         |           |          |          |          |      |    |                               |                | ○      | ○      | ○      | ○      |                |                                        |

クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(東北、関東・東海～九州)

II-6-(2) オモダカ対象

II-6-(2) CH-906 1kg 粒「実・継」 VII-2の使用基準に併用

|                                  | 処理法 | 地域名      | 作期 | ハ・エ  | 一年広葉マハイ | オキイ | ウリカ | ミヤカ | ヘラオモタ | クロガイ | オモガ | ヒムシロ | 葉表剥離 | セリ  | 処理時期 | 使用量・製品     | 砂土         | 壤土             | 埴土 | 埴土 | 減深cm/d | 使用上の注意                               |     |  |
|----------------------------------|-----|----------|----|------|---------|-----|-----|-----|-------|------|-----|------|------|-----|------|------------|------------|----------------|----|----|--------|--------------------------------------|-----|--|
| VII-2<br>CH-906 1kg 粒<br>基葉兼土壌処理 |     | 北海道      |    |      |         |     |     |     |       |      |     |      |      | 再生前 |      | 100<br>g/a |            |                |    |    |        | (34)<br>(36)<br>(38)<br>(41)<br>(42) |     |  |
|                                  |     | 東北       |    |      |         |     |     |     |       |      |     |      |      | 発生前 |      |            |            |                |    |    |        |                                      |     |  |
|                                  |     | 北陸       |    | ○2.5 | ○       |     | ○2  | ○2  | ○2    |      |     | ●前   | ○前   | ○前  | ○始   |            | +5～ハ・エ2.5L |                | ○  | ○  | ○      | ○                                    | 2   |  |
|                                  |     | 関東<br>東海 | 早  | ○2.5 | ○       |     | ○2  | ○2  | ○2    | ○2   |     |      | ○発生前 | ○前  | ○再生前 |            |            |                | ○  | ○  | ○      | ○                                    |     |  |
|                                  |     | 近畿<br>中国 | 普  | ○2.5 | ○       |     | ○2  | ○2  | ○2    | ○2   |     | ○始   | ○始   | ○前  | ○前   |            | ○再生前       |                | ○  | ○  | ○      | ○                                    |     |  |
|                                  |     |          | 普  | ○2.5 | ○       |     | ○2  | ○2  | ○2    | ○2   |     |      | ○発生前 | ○前  | ○前   |            | ○始         |                | ○  | ○  | ○      | ○                                    | 1   |  |
|                                  |     |          | 普  | ○2.5 | ○       |     | ○2  | ○2  | ○2    | ○2   |     |      | ○前   | ○前  | ○前   |            | ○始         |                | ○  | ○  | ○      | ○                                    | 1.5 |  |
|                                  |     |          | 早  | ○2.5 | ○       |     | ○2  | ○2  | ○2    | ○2   |     |      | ○発生前 | ○前  | ○再生前 |            |            | ○              | ○  | ○  | ○      |                                      | 1   |  |
|                                  |     | 四国       | 普  | ○2.5 | ○       |     | ○2  | ○2  | ○2    | ○2   |     |      | ○前   | ○前  | ○前   |            | ○再生前       |                | ○  | ○  | ○      | ○                                    | 1.5 |  |
|                                  |     |          | 早  | ○2.5 | ○       |     | ○2  | ○2  | ○2    | ○2   |     |      | ○発生前 | ○前  | ○前   |            | ○始         | *コリキヤラ<br>：発生始 | ○  | ○  | ○      | ○                                    | 2   |  |
|                                  |     | 九州       | 普  | ○2.5 | ○       |     | ○2  | ○2  | ○2    | ○2   |     | ○始   | ○始   | ○前  | ○前   |            | ○始         |                | ○  | ○  | ○      | ○                                    |     |  |

クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することにより、さらに効果が向上する。(関東・東海、九州)

オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することにより、さらに効果が向上する。(北陸、関東・東海～九州)

II-6-(2) DIN-971 7077g 粒「継」

II-6-(2) HJ-943-1kg 粒「実・継」 VII-2 参照

II-6-(2) KPP-932 7077g 粒「実・継」 II-6-(1) 参照

II-6-(2) MY-100DC 7077g 粒「継」

II-6-(2) MY-100TS 7077g 粒「実・継」 VII-2 参照

II-6-(2) NBA-076a-1kg 粒「実・継」 VII-1 参照

II-6-(2) NBA-076b-1kg 粒「実・継」 VII-1 参照

II-6-(2) NBA-096a 7077g 粒「実・継」 VII-1 参照

II-6-(2) NBA-096b 7077g 粒「実・継」 VII-1 参照

II-6-(2) NBA-941-1kg 粒「実・継」 VII-2の使用基準に併用

| 処理法                                  | 地域名      | 作期 | ハ・エ | 一年広葉<br>マハイ | オキイ | ウリカ | ミヤ<br>カ | ヘラオモ<br>タ | クロガ<br>イ | オモガ<br>カ | ヒムシ<br>ロ | 葉表剥離 | セリ | 処理時期                                              | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                   |
|--------------------------------------|----------|----|-----|-------------|-----|-----|---------|-----------|----------|----------|----------|------|----|---------------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|----------------|------------------------------|
| VII-2<br>NBA-941<br>1kg 粒<br>基葉兼土壌処理 | 北海道      | 早  | ○   | ○           | ○   | ○   | ○       | ○         | ○        | ○        | ○        | ○    | ○  | +5～ハ・エ3L                                          | 100<br>g/a     | ○      | ○      | ○      | ○      | 2              | (28)<br>(34)<br>(38)<br>(40) |
|                                      | 東北       | 早  | ○   | ○           | ○   | ○   | ○       | ○         | ○        | ○        | ○        | ○    | ○  |                                                   |                | ○      | ○      | ○      | ○      |                |                              |
|                                      | 北陸       | 早  | ○   | ○           | ○   | ○   | ○       | ○         | ○        | ○        | ○        | ○    | ○  | *エリノサキカサ<br>：2L<br>***シイ<br>：発生始<br>***カサ<br>：子葉期 |                | ○      | ○      | ○      | ○      |                |                              |
|                                      | 関東<br>東海 | 早  | ○   | ○           | ○   | ○   | ○       | ○         | ○        | ○        | ○        | ○    | ○  |                                                   |                | ○      | ○      | ○      | ○      |                |                              |
|                                      | 近畿<br>中国 | 早  | ○   | ○           | ○   | ○   | ○       | ○         | ○        | ○        | ○        | ○    | ○  |                                                   |                | ○      | ○      | ○      | ○      | 1              |                              |
|                                      | 四国       | 早  | ○   | ○           | ○   | ○   | ○       | ○         | ○        | ○        | ○        | ○    | ○  |                                                   |                | ○      | ○      | ○      | ○      | 2              |                              |
|                                      | 九州       | 早  | ○   | ○           | ○   | ○   | ○       | ○         | ○        | ○        | ○        | ○    | ○  |                                                   |                | ○      | ○      | ○      | ○      | 1              |                              |
|                                      |          | 普  | ○   | ○           | ○   | ○   | ○       | ○         | ○        | ○        | ○        | ○    | ○  |                                                   |                | ○      | ○      | ○      | ○      | 2              |                              |
|                                      |          |    |     |             |     |     |         |           |          |          |          |      |    |                                                   |                | ○      | ○      | ○      | ○      |                |                              |
|                                      |          |    |     |             |     |     |         |           |          |          |          |      |    |                                                   |                | ○      | ○      | ○      | ○      |                |                              |
|                                      |          |    |     |             |     |     |         |           |          |          |          |      |    |                                                   |                | ○      | ○      | ○      | ○      |                |                              |
|                                      |          |    |     |             |     |     |         |           |          |          |          |      |    |                                                   |                | ○      | ○      | ○      | ○      |                |                              |

II-6-(2) NC-339-1kg 粒「継」

II-6-(2) SW-973-1kg 粒「実・継」 II-5参照

## II-6-(5) シズイ対象

II-6-(5) KPP-932 7077<sup>g</sup> 粒「実・継」 II-6-(1)参照II-6-(5) MY-100DC 7077<sup>g</sup> 粒「実・継」 VII-2参照II-6-(5) NBA-096a 7077<sup>g</sup> 粒「実・継」 VII-1参照

II-6-(5) NC-339-1kg 粒「実・継」 VII-2参照

II-6-(5) SB-528 7077<sup>g</sup> 粒「実・継」 II-6-(1)参照

## II-6-(6) エソノサヤマカグサ対象

II-6-(6) DHN-971 7077<sup>g</sup> 粒「実・継」 VII-2参照II-6-(6) MY-100DC 7077<sup>g</sup> 粒「実・継」 VII-2参照II-6-(6) SB-556 7077<sup>g</sup> 粒「実・継」 VII-2参照

## II-6-(7) クサネム対象

II-6-(7) SW-973-1kg 粒「実・継」 II-5参照

II-6-(7) KUH-911 液「実・継」

| 処理法                          | 地域名      | 作期     | 1年<br>広葉<br>マハイ | ホタルイ | ウリカ | ミヤ<br>ガリ | ヘラオ<br>ダカ | クロウ<br>タイ | オモ<br>ガ | ヒルム<br>シロ | 葉<br>表<br>剥<br>離 | 処理時期 | 使用<br>量・<br>製品                   | 砂<br>壌<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意 |
|------------------------------|----------|--------|-----------------|------|-----|----------|-----------|-----------|---------|-----------|------------------|------|----------------------------------|-------------|--------|--------|--------|-----------------|------------|
| II-6-(7)として<br>KUH-911<br>液剤 | 北海道      |        |                 |      |     |          |           |           |         |           |                  |      | 2.5<br>~5<br>ml/a<br>(10<br>g/a) |             |        |        |        |                 | (12)       |
|                              | 東北       |        |                 |      |     |          |           |           |         |           |                  |      |                                  |             |        |        |        |                 |            |
|                              | 北陸       |        |                 |      |     |          |           |           |         |           |                  |      |                                  |             |        |        |        |                 |            |
|                              | 関東<br>東海 | 早<br>普 |                 |      |     |          |           |           |         |           |                  | ○*   |                                  |             |        |        |        |                 |            |
|                              | 近畿<br>中国 | 早<br>普 |                 |      |     |          |           |           |         |           |                  | ●*   |                                  |             |        |        |        |                 |            |
|                              | 四国       | 早<br>普 |                 |      |     |          |           |           |         |           |                  | ●*   |                                  |             |        |        |        |                 |            |
|                              | 九州       | 早<br>普 |                 |      |     |          |           |           |         |           |                  | ●*   |                                  |             |        |        |        |                 |            |
|                              |          |        |                 |      |     |          |           |           |         |           |                  |      |                                  |             |        |        |        |                 |            |
|                              |          |        |                 |      |     |          |           |           |         |           |                  |      |                                  |             |        |        |        |                 |            |
|                              |          |        |                 |      |     |          |           |           |         |           |                  |      |                                  |             |        |        |        |                 |            |

\*クサネム  
:関東・東海  
草丈40cm以下  
(+35~+50)  
:近畿・中国・  
四国  
草丈15cm以下

## II-6-(8) コウキヤガラ対象

II-6-(8) KPP-2005<sup>g</sup> 7077<sup>g</sup> 粒「実・継」 II-2の使用基準に併用

| 処理法                                                        | 地域名      | 作期     | 1年<br>広葉<br>マハイ | ホタルイ     | ウリカ      | ミヤ<br>ガリ | ヘラオ<br>ダカ | クロウ<br>タイ | オモ<br>ガ | ヒルム<br>シロ | 葉<br>表<br>剥<br>離 | 処理時期                          | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                                          |
|------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|------------------|-------------------------------|----------------|-------------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| II-2-(2)少量<br>KPP-2005 <sup>g</sup><br>7077 <sup>g</sup> 粒 | 北海道      | ○1     | ○               | ○始       |          |          |           |           |         |           |                  | +0~+5(1/2 IIL)                | 30<br>ml/a     | ○           | ○      | ○      | ○      | 2               | (36)                                                |
|                                                            | 東北       | ○1     | ○               | ○始       | ○前       |          |           |           |         |           |                  | 植代後~-4,<br>+0~+5<br>(1/2 IIL) |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 1.5             | 一発処理型<br>除草剤の前<br>処理として<br>少量散布<br>(30ml/a)が<br>可能。 |
|                                                            | 北陸       | ○1     | ○               | ○始       | ○始       |          |           |           |         |           |                  |                               |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 2               |                                                     |
|                                                            | 関東<br>東海 | 早<br>普 | ○1<br>○         | ○始<br>○始 | ○始<br>○始 |          |           |           |         |           |                  |                               |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 1               |                                                     |
|                                                            | 近畿<br>中国 | 早<br>普 | ○1<br>○         | ○始<br>○始 | ○始<br>○始 |          |           |           |         |           |                  |                               |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 1.5             |                                                     |
|                                                            | 四国       | 早<br>普 | ○1<br>○         | ○始<br>○始 | ○始<br>○始 |          |           |           |         |           |                  |                               |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 2               |                                                     |
|                                                            | 九州       | 早<br>普 | ○1<br>○         | ○始<br>○始 | ○始<br>○始 |          |           |           |         |           |                  |                               |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 1.5             |                                                     |
|                                                            |          |        |                 |          |          |          |           |           |         |           |                  |                               |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 2               |                                                     |
|                                                            |          |        |                 |          |          |          |           |           |         |           |                  |                               |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 2               |                                                     |
|                                                            |          |        |                 |          |          |          |           |           |         |           |                  |                               |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 1.5             |                                                     |

\*コキヤガラ  
:発生始

II-6-(8) MY-100DC<sup>g</sup> 7077<sup>g</sup> 粒「実・継」 VII-2参照II-6-(8) SB-528 7077<sup>g</sup> 粒「実・継」 II-6-(1)参照

## II-6-(9) キシュウズメノヒエ対象

II-6-(9) DEH-112 乳(EW) 「実・継」 II-5の使用基準に併用

| 処理法                         | 地域名      | 作期     | 1年<br>広葉<br>マハイ | ホタルイ | ワリワリ | ミヤ<br>ガヤ<br>グ | ヘラオモ<br>ダカ | クログ<br>ワイ | オモダ<br>カ | ヒルムシ<br>ロ | 藻類<br>剥離 | キシュ<br>ウス<br>メ<br>ノ<br>ヒエ | 処理時期                     | 使用<br>量・<br>製品   | 砂<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                       |
|-----------------------------|----------|--------|-----------------|------|------|---------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|---------------------------|--------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|----------------------------------|
| II-5<br>I. DEH-112<br>乳(EW) | 北海道      | 〇      | 5               |      |      |               |            |           |          |           |          |                           | +25~+40<br>(/ヒ 12L~5L)   | 10<br>ml/a<br>注) | 〇      | 〇      | 〇      | 〇      | 2               | { 2 }<br>{ 4 }<br>使用直前に<br>希釈する。 |
|                             | 東北       | 〇      | 5               |      |      |               |            |           |          |           |          |                           | +25~+40<br>(/ヒ 13L~5L)   |                  | 〇      | 〇      | 〇      | 〇      |                 |                                  |
|                             | 北陸       | 〇      | 5               |      |      |               |            |           |          |           |          |                           |                          |                  | 〇      | 〇      | 〇      | 〇      |                 |                                  |
|                             | 関東<br>東海 | 早<br>普 | 〇<br>5          |      |      |               |            |           |          |           |          |                           |                          | 〇*               | 〇      | 〇      | 〇      | 〇      |                 |                                  |
|                             | 近畿<br>中国 | 早<br>普 | 〇<br>5          |      |      |               |            |           |          |           |          |                           | +25~+40<br>(/ヒ 12.5L~5L) | 〇*               | 〇      | 〇      | 〇      | 〇      | 1               |                                  |
|                             |          |        |                 |      |      |               |            |           |          |           |          |                           | +25~+40<br>(/ヒ 13L~5L)   |                  | 〇      | 〇      | 〇      | 〇      | 1.5             |                                  |
|                             | 四国       | 早<br>普 | 〇<br>5          |      |      |               |            |           |          |           |          |                           | +25~+40<br>(/ヒ 12.5L~5L) | 〇*               | 〇      | 〇      | 〇      | 〇      | 1               |                                  |
|                             |          |        |                 |      |      |               |            |           |          |           |          |                           |                          |                  | 〇      | 〇      | 〇      | 〇      | 1.5             |                                  |
|                             | 九州       | 早<br>普 | 〇<br>5          |      |      |               |            |           |          |           |          |                           | +25~+50<br>(/ヒ 12L~5L)   | 〇*               | 〇      | 〇      | 〇      | 〇      | 2               |                                  |
|                             |          |        |                 |      |      |               |            |           |          |           |          |                           |                          |                  | 〇      | 〇      | 〇      | 〇      |                 |                                  |

注) 散布液量2.5~10e/a だし、2.5~5e 散布は少量散布用ノズルを使用、展着剤加用

\* 再生茎3~6葉期(関東・東海~九州)、畦畔からの匍匐茎1m以内(関東・東海~九州)

畦畔からの侵入個体には全体にかける。(関東・東海~九州)

II-6-(9) DEH-BAS 乳(ME) 「実・継」 II-5の使用基準に併用

| 処理法                      | 地域名      | 作期     | 1年<br>広葉<br>マハイ | ホタルイ | ワリワリ | ミヤ<br>ガヤ<br>グ | ヘラオモ<br>ダカ | クログ<br>ワイ | オモダ<br>カ | ヒルムシ<br>ロ | 藻類<br>剥離 | キシュ<br>ウス<br>メ<br>ノ<br>ヒエ | 処理時期                       | 使用<br>量・<br>製品    | 砂<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                                                                          |
|--------------------------|----------|--------|-----------------|------|------|---------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| II-5<br>DEH-BAS<br>乳(ME) | 北海道      | 〇      | 5               | 〇    | 〇    | 〇             | 〇          | 〇         | 〇        | 〇         | 〇        | 〇                         | +25~+40<br>(/ヒ 12L~5L)     | 100<br>ml/a<br>注) | 〇      | 〇      | 〇      | 〇      | 2               | { 6 }<br>{ 10 }<br>{ 11 }<br>{ 12 }<br>{ 21 }<br>{ 36 }<br>{ 49 }<br>使用直前に<br>希釈する。 |
|                          | 東北       | 〇      | 5               | 〇    | 〇    | 〇             | 〇          | 〇         | 〇        | 〇         | 〇        | 〇                         | +25~+40<br>(/ヒ 13L~5L)     |                   | 〇      | 〇      | 〇      | 〇      |                 |                                                                                     |
|                          | 北陸       | 〇      | 5               | 〇    | 〇    | 〇             | 〇          | 〇         | 〇        | 〇         | 〇        | 〇                         |                            |                   | 〇      | 〇      | 〇      | 〇      |                 |                                                                                     |
|                          | 関東<br>東海 | 早<br>普 | 〇<br>5          | 〇    | 〇    | 〇             | 〇          | 〇         | 〇        | 〇         | 〇        | 〇                         | +25~+50<br>(/ヒ 13L~5L)     | 〇*                | 〇      | 〇      | 〇      | 〇      |                 |                                                                                     |
|                          |          |        |                 |      |      |               |            |           |          |           |          |                           | +25~+40<br>(/ヒ 12.5L~4.5L) |                   | 〇      | 〇      | 〇      | 〇      |                 |                                                                                     |
|                          | 近畿<br>中国 | 早<br>普 | 〇<br>5          | 〇    | 〇    | 〇             | 〇          | 〇         | 〇        | 〇         | 〇        | 〇                         | +25~+40<br>(/ヒ 12.5L~5L)   | 〇*                | 〇      | 〇      | 〇      | 〇      | 1               |                                                                                     |
|                          |          |        |                 |      |      |               |            |           |          |           |          |                           | +25~+40<br>(/ヒ 12.5L~4.5L) |                   | 〇      | 〇      | 〇      | 〇      | 1.5             |                                                                                     |
|                          | 四国       | 早<br>普 | 〇<br>5          | 〇    | 〇    | 〇             | 〇          | 〇         | 〇        | 〇         | 〇        | 〇                         | +25~+40<br>(/ヒ 12.5L~4.5L) | 〇*                | 〇      | 〇      | 〇      | 〇      | 1               |                                                                                     |
|                          |          |        |                 |      |      |               |            |           |          |           |          |                           | +25~+40<br>(/ヒ 12.5L~5L)   |                   | 〇      | 〇      | 〇      | 〇      | 1.5             |                                                                                     |
|                          | 九州       | 早<br>普 | 〇<br>5          | 〇    | 〇    | 〇             | 〇          | 〇         | 〇        | 〇         | 〇        | 〇                         | +25~+50<br>(/ヒ 12L~5L)     | 〇*                | 〇      | 〇      | 〇      | 〇      | 2               |                                                                                     |
|                          |          |        |                 |      |      |               |            |           |          |           |          |                           |                            |                   | 〇      | 〇      | 〇      | 〇      |                 |                                                                                     |

\*: 花茎抽出 \*\*: ①シズイ 草丈5cm程度, ②コウキヤガラ 発生盛期 \*\*\*: エソノサマヌカグサ 発生始~4L

☆: キシュウズメノヒエ 再生茎3~6葉期, 畦畔からの匍匐茎1m以内(関東・東海~九州)

畦畔からの侵入個体には全体にかける。(関東・東海~九州)

クログワイ防除は、クログワイに有効な前処理剤との組み合わせで使用。(東北、関東・東海~九州)

クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することにより、さらに効果が向上する。(東北、関東・東海~九州)

オモダカ防除は、オモダカに有効な前処理剤との組み合わせで使用。(東北~関東・東海、九州)

II-6-(9) SW-973-1kg 粒「継」

## II-6-(10) その他

II-6-(10) SW-973-1kg 粒「実・継」 II-5参照

## III 直播栽培

| 処理法                     | 地域名      | 作期 | 1年<br>広葉<br>マハイ | ホタルイ | ワリワリ | ミヤ<br>ガヤ<br>グ | ヘラオモ<br>ダカ | クログ<br>ワイ | オモダ<br>カ | ヒルムシ<br>ロ | 藻類<br>剥離 | キシュ<br>ウス<br>メ<br>ノ<br>ヒエ | 処理時期              | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                                                 |
|-------------------------|----------|----|-----------------|------|------|---------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|---------------------------|-------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| III<br>AGH-925-1kg<br>粒 | 北海道      | 〇  | 3               | 〇    | 〇    | 〇             | 〇          | 〇         | 〇        | 〇         | 〇        | 〇                         | 11L~12L 13L       | 100<br>g/a     |        |        | 〇      | 〇      | 2               | 11の根が<br>腐出する<br>を生<br>産する。<br>灌水直播<br>(北海道<br>~北陸、<br>九州) |
|                         | 東北       | 〇  | 3               | 〇    | 〇    | 〇             | 〇          | 〇         | 〇        | 〇         | 〇        | 〇                         |                   |                |        |        | 〇      | 〇      | 1.5             |                                                            |
|                         | 北陸       | 〇  | 3               | 〇    | 〇    | 〇             | 〇          | 〇         | 〇        | 〇         | 〇        | 〇                         |                   |                |        |        | 〇      | 〇      | 1               |                                                            |
|                         | 関東<br>東海 | 〇  | 3               | 〇    | 〇    | 〇             | 〇          | 〇         | 〇        | 〇         | 〇        | 〇                         | 11.5L~<br>12L 13L |                |        | 〇      | 〇      | 〇      | 2               |                                                            |
|                         | 近畿<br>中国 | 〇  | 3               | 〇    | 〇    | 〇             | 〇          | 〇         | 〇        | 〇         | 〇        | 〇                         | 11L~12L 13L       |                |        | 〇      | 〇      | 〇      | 1               |                                                            |
|                         | 四国       | 〇  | 3               | 〇    | 〇    | 〇             | 〇          | 〇         | 〇        | 〇         | 〇        | 〇                         |                   |                |        | 〇      | 〇      | 〇      |                 |                                                            |
|                         | 九州       | 〇  | 3               | 〇    | 〇    | 〇             | 〇          | 〇         | 〇        | 〇         | 〇        | 〇                         |                   |                |        |        | 〇      | 〇      |                 |                                                            |

|                       | 処理法     | 地域名      | 作期 | 1/2  | 一年<br>広葉<br>マハ | ネカリ | ウリカ | ミヤ<br>カ | ヘラオ<br>ダ | クロ<br>カ | オモ<br>カ | ヒルム<br>シ | 藻類<br>剥離 |  | 処理時期                | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壤土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                                         |
|-----------------------|---------|----------|----|------|----------------|-----|-----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|--|---------------------|----------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Ⅲ<br>CDS-941<br>7077% | 葉菜系土壌処理 | 北海道      |    |      |                |     |     |         |          |         |         |          |          |  | 1/21.5L<br>~1/22.5L | 50<br>ml/a     |         |        |        |        |                 | この根が<br>出でる<br>は生<br>腐<br>糸<br>を<br>す。<br><br>湛水直播 |
|                       |         | 東北       |    | ●2.5 | ●              | ●2  |     |         | ●2       |         |         |          |          |  |                     |                |         |        | ●      | ●      | 1.5             |                                                    |
|                       |         | 北陸       |    |      |                |     |     |         |          |         |         |          |          |  |                     |                |         |        |        |        |                 |                                                    |
|                       |         | 関東<br>東海 |    |      |                |     |     |         |          |         |         |          |          |  |                     |                |         |        |        |        |                 |                                                    |
|                       |         | 近畿<br>中国 |    |      |                |     |     |         |          |         |         |          |          |  |                     |                |         |        |        |        |                 |                                                    |
|                       |         | 四国       |    |      |                |     |     |         |          |         |         |          |          |  |                     |                |         |        |        |        |                 |                                                    |
|                       |         | 九州       |    |      |                |     |     |         |          |         |         |          |          |  |                     |                |         |        |        |        |                 |                                                    |

|                          | 処理法     | 地域名      | 作期 | 1/2  | 一年<br>広葉<br>マハ | ネカリ | ウリカ | ミヤ<br>カ | ヘラオ<br>ダ | クロ<br>カ | オモ<br>カ | ヒルム<br>シ | 藻類<br>剥離 |  | 処理時期                | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壤土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                             |
|--------------------------|---------|----------|----|------|----------------|-----|-----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|--|---------------------|----------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|----------------------------------------|
| Ⅲ<br>CDS-941(L)<br>7077% | 葉菜系土壌処理 | 北海道      |    |      |                |     |     |         |          |         |         |          |          |  | 1/21.5L<br>~1/22.5L | 50<br>ml/a     |         |        |        |        |                 | この根が<br>出でる<br>は生<br>腐<br>糸<br>を<br>す。 |
|                          |         | 東北       |    |      |                |     |     |         |          |         |         |          |          |  |                     |                |         |        |        |        |                 |                                        |
|                          |         | 北陸       |    |      |                |     |     |         |          |         |         |          |          |  |                     |                |         |        |        |        |                 |                                        |
|                          |         | 関東<br>東海 |    | ●2.5 | ●              | ●2  |     |         |          |         |         |          |          |  |                     |                |         | ●      | ●      | ●      | 1.5             |                                        |
|                          |         | 近畿<br>中国 |    | ●2.5 | ●              | ●2  |     | ●2      |          |         |         |          |          |  |                     |                |         | ●      | ●      | ●      | 1               |                                        |
|                          |         | 四国       |    | ●2.5 | ●              | ●2  |     | ●2      |          |         |         |          |          |  |                     |                |         | ●      | ●      | ●      |                 |                                        |
|                          |         | 九州       |    |      |                |     |     |         |          |         |         |          |          |  |                     |                |         |        |        |        |                 |                                        |

|                       | 処理法     | 地域名      | 作期 | 1/2 | 一年<br>広葉<br>マハ | ネカリ | ウリカ | ミヤ<br>カ | ヘラオ<br>ダ | クロ<br>カ | オモ<br>カ | ヒルム<br>シ | 藻類<br>剥離 | ミ          | 処理時期               | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壤土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                                                           |
|-----------------------|---------|----------|----|-----|----------------|-----|-----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|------------|--------------------|----------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ⅲ<br>NBA-941-1kg<br>粒 | 葉菜系土壌処理 | 北海道      |    |     |                |     |     |         |          |         |         |          |          | 発生<br>期    | 1/21.5L<br>~1/213L | 100<br>g/a     |         |        |        |        |                 | この根が<br>出でる<br>は生<br>腐<br>糸<br>を<br>す。<br><br>湛水直播<br>(関東・東海、<br>九州) |
|                       |         | 東北       |    | ○3  | ○              | ○2  | ○2  | ○2      | ○2       |         |         |          |          | ○期         |                    |                |         |        | ○      | ○      | 1               |                                                                      |
|                       |         | 北陸       |    | ●3  | ●              | ●2  | ●2  | ●2      |          |         |         |          |          |            |                    |                |         |        | ●      | ●      |                 |                                                                      |
|                       |         | 関東<br>東海 |    | ○3  | ○              | ○2  |     |         |          |         |         |          |          |            |                    |                |         |        | ○      | ○      |                 |                                                                      |
|                       |         | 近畿<br>中国 |    | ○3  | ○              | ○2  |     | ○2      |          |         |         |          |          | ○再生<br>前~始 |                    |                |         | ○      | ○      | ○      |                 |                                                                      |
|                       |         | 四国       |    | ○3  | ○              | ○2  |     | ○2      |          |         |         |          |          | ○期         |                    |                |         | ○      | ○      | ○      |                 |                                                                      |
|                       |         | 九州       |    | ○3  | ○              | ○2  | ○2  | ○2      |          |         |         |          |          |            |                    |                |         |        | ○      | ○      | 1.5             |                                                                      |

|                        | 処理法     | 地域名      | 作期 | 1/2 | 一年<br>広葉<br>マハ | ネカリ | ウリカ | ミヤ<br>カ | ヘラオ<br>ダ | クロ<br>カ | オモ<br>カ | ヒルム<br>シ | 藻類<br>剥離 |  | 処理時期               | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壤土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                             |
|------------------------|---------|----------|----|-----|----------------|-----|-----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|--|--------------------|----------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|----------------------------------------|
| Ⅲ<br>NBA-942a-1kg<br>粒 | 葉菜系土壌処理 | 北海道      |    |     |                |     |     |         |          |         |         |          |          |  | 1/21.5L<br>~1/213L | 100<br>g/a     |         |        |        |        |                 | この根が<br>出でる<br>は生<br>腐<br>糸<br>を<br>す。 |
|                        |         | 東北       |    | ●3  | ●              | ●2  |     | ●2      | ●2       |         |         |          |          |  |                    |                |         |        | ●      | ●      | 1               |                                        |
|                        |         | 北陸       |    |     |                |     |     |         |          |         |         |          |          |  |                    |                |         |        |        |        |                 |                                        |
|                        |         | 関東<br>東海 |    |     |                |     |     |         |          |         |         |          |          |  |                    |                |         |        |        |        |                 |                                        |
|                        |         | 近畿<br>中国 |    |     |                |     |     |         |          |         |         |          |          |  |                    |                |         |        |        |        |                 |                                        |
|                        |         | 四国       |    |     |                |     |     |         |          |         |         |          |          |  |                    |                |         |        |        |        |                 |                                        |
|                        |         | 九州       |    |     |                |     |     |         |          |         |         |          |          |  |                    |                |         |        |        |        |                 |                                        |

|                    | 処理法     | 地域名  | 作期 | バ'エ | 一年広葉マハイ | ネカリ | ウリカ | ミ'ヤ | ヘ'オモ | クロ'ウ | オモ'カ | ヒ'ルム | 藻類剥離 | セリ   | 処理時期        | 使用量・製品  | 砂壌土 | 壤土 | 堆土 | 堆土  | 減水深cm/d | 使用上の注意                      |
|--------------------|---------|------|----|-----|---------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-------------|---------|-----|----|----|-----|---------|-----------------------------|
| Ⅲ<br>NBA-942b-1kg粒 | 茎葉兼土壌処理 | 北海道  |    |     |         |     |     |     |      |      |      |      |      |      |             | 100 g/a |     |    |    |     |         | イの根が腐敗する。<br>灌水直播(関東・東海、九州) |
|                    |         | 東北   |    |     |         |     |     |     |      |      |      |      |      |      |             |         |     |    |    |     |         |                             |
|                    |         | 北陸   |    | ●3  | ●       | ●2  | ●2  | ●2  |      |      |      |      |      |      | イ1L~1/2 L3L |         |     | ●  | ●  | 1   |         |                             |
|                    |         | 関東東海 |    | ●3  | ●       | ●2  |     | ●2  |      |      |      |      |      | ●再生始 |             |         | ●   | ●  | ●  | 2   |         |                             |
|                    |         | 近畿中国 |    | ○3  | ○       | ○2  |     | ○2  |      |      |      |      |      | ○始   |             |         | ○   | ○  | ○  | 1   |         |                             |
|                    |         | 四国   |    | ○3  | ○       | ○2  |     | ○2  |      |      |      |      |      | ○始   |             |         | ○   | ○  | ○  |     |         |                             |
|                    |         | 九州   |    | ●3  | ●       | ●2  | ●2  | ●2  |      |      |      |      |      |      |             |         |     | ●  | ●  | 1.5 |         |                             |

Ⅲ SW-973-1kg 粒「籾」

Ⅲ TCG-128 乳「籾」

|                   | 処理法     | 地域名  | 作期 | バ'エ  | 一年広葉マハイ | ネカリ | ウリカ | ミ'ヤ | ヘ'オモ | クロ'ウ | オモ'カ | ヒ'ルム | 藻類剥離 | セリ | 処理時期                                            | 使用量・製品  | 砂壌土 | 壤土 | 堆土 | 堆土  | 減水深cm/d | 使用上の注意                           |
|-------------------|---------|------|----|------|---------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|----|-------------------------------------------------|---------|-----|----|----|-----|---------|----------------------------------|
| Ⅲ<br>モリネ-TSM-1kg粒 | 茎葉兼土壌処理 | 北海道  |    |      |         |     |     |     |      |      |      |      |      |    |                                                 | 100 g/a |     |    |    |     |         | (8)<br>(2)1<br>灌水直播(北陸、近畿、中国、四国) |
|                   |         | 東北   |    | ○3   | ○       | ○2  |     |     |      |      |      |      |      |    | イ5L8L, 1/2 L3L<br>+30~+45<br>(イ6L8L, 1/2 L3Lまで) |         |     | ○  | ○  | 1.5 |         |                                  |
|                   |         | 北陸   |    | ○3   | ○       | ○2  |     |     |      |      |      |      |      |    |                                                 |         |     | ○  | ○  | 1   |         |                                  |
|                   |         | 関東東海 |    | ○3.5 | ○       | ○3  |     |     |      |      |      |      |      |    | イ5L~<br>1/2 L3.5L                               |         |     | ○  | ○  | 2   |         |                                  |
|                   |         | 近畿中国 |    | ○3.5 | ○       | ○始  |     |     |      |      |      |      |      |    |                                                 |         |     | ○  | ○  | 1   |         |                                  |
|                   |         | 四国   |    | ○3.5 | ○       | ○始  |     |     |      |      |      |      |      |    |                                                 |         |     | ○  | ○  |     |         |                                  |
|                   |         | 九州   |    |      |         |     |     |     |      |      |      |      |      |    |                                                 |         |     |    |    |     |         |                                  |

|                        | 処理法     | 地域名      | 作期 | バ'エ | 一年<br>広葉<br>マハイ | ネカリ | ウリカ | ミ'ヤ<br>カヤ | ヘ'オモ<br>タ'カ | クロ'ウ | オモ'カ | ヒ'ルム<br>シロ  | 藻類<br>剥離 | セリ                    | 処理時期              | 使用<br>量・製品 | 砂<br>壌土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意        |
|------------------------|---------|----------|----|-----|-----------------|-----|-----|-----------|-------------|------|------|-------------|----------|-----------------------|-------------------|------------|---------|--------|--------|--------|----------------|-------------------|
| Ⅲ<br>KUII-931-1kg<br>粒 | 茎葉兼土壌処理 | 北海道      |    | ○ 3 | ○               | ○ 2 | ○ 2 | ○ 2       | ○ 2         |      |      | 発<br>生<br>期 |          | 再<br>生<br>前<br>○<br>始 | イ1.5L<br>〜1/2 L3L | 100<br>g/a |         |        |        |        | 1.5            | イの根が腐敗する。<br>灌水直播 |
|                        |         | 東北       |    |     |                 |     |     |           |             |      |      | ○ 期         |          |                       |                   |            |         |        | ○      | ○      |                |                   |
|                        |         | 北陸       |    |     |                 |     |     |           |             |      |      |             |          |                       |                   |            |         |        |        |        |                |                   |
|                        |         | 関東<br>東海 |    |     |                 |     |     |           |             |      |      |             |          |                       |                   |            |         |        |        |        |                |                   |
|                        |         | 近畿<br>中国 |    |     |                 |     |     |           |             |      |      |             |          |                       |                   |            |         |        |        |        |                |                   |
|                        |         | 四国       |    |     |                 |     |     |           |             |      |      |             |          |                       |                   |            |         |        |        |        |                |                   |
|                        |         | 九州       |    |     |                 |     |     |           |             |      |      |             |          |                       |                   |            |         |        |        |        |                |                   |

|                     | 処理法     | 地域名  | 作期 | バ'エ  | 一年広葉マハイ | ネカリ | ウリカ | ミ'ヤ | ヘ'オモ | クロ'ウ | オモ'カ | ヒ'ルム | 藻類剥離 | セリ     | 処理時期              | 使用量・製品  | 砂壌土 | 壤土 | 堆土 | 堆土  | 減水深cm/d | 使用上の注意            |
|---------------------|---------|------|----|------|---------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|--------|-------------------|---------|-----|----|----|-----|---------|-------------------|
| Ⅲ<br>KUII-936B-1kg粒 | 茎葉兼土壌処理 | 北海道  |    |      |         |     |     |     |      |      |      |      |      |        |                   | 100 g/a |     |    |    |     |         | イの根が腐敗する。<br>灌水直播 |
|                     |         | 東北   |    |      |         |     |     |     |      |      |      |      |      |        |                   |         |     |    |    |     |         |                   |
|                     |         | 北陸   |    | ○3   | ○       | ○2  | ○2  | ○2  |      |      |      |      |      |        | イ1L~1/2 L3L       |         |     | ○  | ○  | 1   |         |                   |
|                     |         | 関東東海 |    | ○3   | ○       | ○2  |     |     |      |      |      |      |      |        |                   |         |     | ○  | ○  | 2   |         |                   |
|                     |         | 近畿中国 |    | ○3   | ○       | ○2  |     | ○2  |      |      |      |      |      | ○再生前~始 |                   |         |     | ○  | ○  | 1.5 |         |                   |
|                     |         | 四国   |    | ○3   | ○       | ○2  |     | ○2  |      |      |      |      |      |        |                   |         |     | ○  | ○  |     |         |                   |
|                     |         | 九州   |    | ○2.5 | ○       |     |     | ○2  |      |      |      |      |      |        | イ1L~<br>1/2 L2.5L |         | ○   | ○  | ○  | 2   |         |                   |

| 処理法                  | 地 域 名 | 対象雑草名 | 処理時期                    | 使用量・製品<br>(希釈水量)  | 適用土壌 | 使用上の注意                     |
|----------------------|-------|-------|-------------------------|-------------------|------|----------------------------|
| 不耕起直播<br>WOC-01<br>液 | 北海道   | ●     | 播種前10日～<br>播種後7日(1株出芽前) | 25～50ml/a(水量5ℓ/a) | 全土壌  | (25)<br><br>乾田条件で使用<br>する。 |
|                      | 東 北   | ●     | 一年生雑草                   |                   |      |                            |
|                      | 北 陸   | ●     | 一年生雑草                   |                   |      |                            |
|                      | 関東・東海 | ●     | 播種前10日～<br>播種後7日(1株出芽前) |                   |      |                            |
|                      | 近畿・中国 | ●     | 全草種                     |                   |      |                            |
|                      | 四 国   | ●     | 播種前30日～<br>播種後7日(1株出芽前) |                   |      |                            |
|                      | 九 州   | ●     |                         |                   |      |                            |

不耕起直播 フタコ-乳「雑」

## IV 畦畔雑草

| 処理法                       | 地 域 名 | 対象雑草名 | 処理時期                | 使用量・製品<br>(希釈水量)    | 適用土壌 | 使用上の注意       |
|---------------------------|-------|-------|---------------------|---------------------|------|--------------|
| IV<br>CG-231GT<br>7077ℓ 液 | 北海道   | ●     | 雑草生育期<br>(草丈30cm以下) | 50～100ml/a(水量10ℓ/a) | 全土壌  | (23)<br>(24) |
|                           | 東 北   | ●     |                     |                     |      |              |
|                           | 北 陸   | ●     |                     |                     |      |              |
|                           | 関東・東海 | ●     |                     |                     |      |              |
|                           | 近畿・中国 | ●     |                     |                     |      |              |
|                           | 四 国   | ●     |                     |                     |      |              |
|                           | 九 州   | ●     |                     |                     |      |              |

| 処理法                | 地 域 名 | 対象雑草名 | 処理時期           | 使用量・製品<br>(希釈水量)                                      | 適用土壌 | 使用上の注意       |
|--------------------|-------|-------|----------------|-------------------------------------------------------|------|--------------|
| IV<br>MON-96A<br>液 | 北海道   | ○     | 全草種<br>(1株を除く) | 25～50ml/a<br>(2.5ℓ・5～10ℓ/a<br>ただし2.5ℓ散布は<br>専用ノズルを使用) | 全土壌  | (23)<br>(24) |
|                    | 東 北   | ○     |                |                                                       |      |              |
|                    | 北 陸   | ○     |                |                                                       |      |              |
|                    | 関東・東海 | ○     |                |                                                       |      |              |
|                    | 近畿・中国 | ○     |                |                                                       |      |              |
|                    | 四 国   | ○     |                |                                                       |      |              |
|                    | 九 州   | ○     |                |                                                       |      |              |

IV NH-007 7077ℓ「雑」

IV SUM-99 7077ℓ「雑」

| 処理法                     | 地 域 名 | 対象雑草名 | 処理時期                            | 使用量・製品<br>(希釈水量)   | 適用土壌 | 使用上の注意                          |
|-------------------------|-------|-------|---------------------------------|--------------------|------|---------------------------------|
| IV<br>SW-995<br>7077ℓ 液 | 北海道   | ●     | 雑草生育期又は<br>刈取後再生期<br>(草丈20cm以下) | 40～80ml/a(水量10ℓ/a) | 全土壌  | (24)<br><br>年一回使用<br>(近畿・中国、四国) |
|                         | 東 北   | ●     |                                 | 60～80ml/a(水量10ℓ/a) |      |                                 |
|                         | 北 陸   | ●     |                                 | 40～80ml/a(水量10ℓ/a) |      |                                 |
|                         | 関東・東海 | ●     |                                 |                    |      |                                 |
|                         | 近畿・中国 | ●     |                                 |                    |      |                                 |
|                         | 四 国   | ●     |                                 |                    |      |                                 |
|                         | 九 州   | ●     |                                 | 60～80ml/a(水量10ℓ/a) |      |                                 |

## V 耕起前

V NH-007 7077ℓ「雑」

V ZK-121 液「雑」

## VI 休耕田

VI NH-501 7077ℓ「雑」

VII-1 初期一発処理剤

| 処理法                          | 地域名  | 作期       | ハ'エ    | 一年<br>広葉<br>マハ'イ | ネ'ル | ウ'カ | ミ'ヤ<br>ガ'リ | ヘ'ラ<br>タ'カ | クロ'グ<br>ワ'イ | オモ'ダ<br>カ | ヒ'ル<br>ム'シ | 葉<br>類<br>剥<br>離 | セ'リ | 処理時期       | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌<br>主<br>土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                     |
|------------------------------|------|----------|--------|------------------|-----|-----|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------------|-----|------------|----------------|------------------|--------|--------|--------|-----------------|--------------------------------|
| VII-1<br>AGII-975<br>7077' Ⅱ | 土壌処理 | 北海道      | ○1.5   | ○                | ○始  | ○2  |            |            |             |           |            |                  |     | +0~ハ'エ1.5L | 50<br>ml/a     | 1.5<br>●         | ○      | ○      | ○      | 2               | (34)                           |
|                              |      | 東北       | ○1.5   | ○                | ○2  | ○始  | ○始         | ○始         |             |           |            |                  |     |            |                | 1.5<br>●         | ○      | ○      | ○      |                 | 田植同時<br>散布可能<br>(東北・東海<br>~九州) |
|                              |      | 北陸       | ○1.5   | ○                | ○2  | ○始  | ○始         | ●始         |             |           |            |                  |     |            |                | 1<br>●           | ○      | ○      | ○      | 1.5             |                                |
|                              |      | 関東<br>東海 | 早 ●1.5 | ●                | ●始  | ●始  | ●始         |            |             |           |            |                  |     |            |                | 1<br>●           | ○      | ○      | ○      | 2               |                                |
|                              |      | 普        | ○1.5   | ○                | ○始  | ○始  | ○始         |            |             |           |            |                  |     |            |                | ●                | ○      | ○      | ○      |                 |                                |
|                              |      | 近畿<br>中国 | 早 ○1.5 | ○                | ○始  | ○前  | ○前         |            |             |           |            |                  |     |            |                |                  | ○      | ○      | ○      | 1.5             |                                |
|                              |      | 普        | ○1.5   | ○                | ○始  | ○始  | ○始         |            |             |           |            |                  |     |            |                |                  | ○      | ○      | ○      |                 |                                |
|                              |      | 四国       | 早 ○1.5 | ○                | ○始  | ○前  | ○前         |            |             |           |            |                  |     |            |                |                  | ○      | ○      | ○      |                 |                                |
|                              |      | 普        | ○1.5   | ○                | ○始  | ○始  | ○始         |            |             |           |            |                  |     |            |                |                  | ○      | ○      | ○      |                 |                                |
|                              |      | 九州       | 早 ○1.5 | ○                | ○始  | ○始  | ○始         |            |             |           |            |                  |     |            |                | ●                | ○      | ○      | ○      |                 |                                |
|                              |      | 普        | ○1.5   | ○                | ○始  | ○始  | ○始         |            |             |           |            |                  |     |            |                | ○                | ○      | ○      | ○      | 2               |                                |

VII-1 HSW-001 7077' Ⅱ 「継」

VII-1 KPP-2009-1kg 粒 「継」

VII-1 KPP-2009-Ⅱ-1kg 粒 「継」

| 処理法                                                         | 地域名  | 作期       | ハ'エ | 一年<br>広葉<br>マハ'イ | ネ'ル | ウ'カ | ミ'ヤ<br>ガ'リ | ヘ'ラ<br>タ'カ | クロ'グ<br>ワ'イ | オモ'ダ<br>カ | ヒ'ル<br>ム'シ | 葉<br>類<br>剥<br>離 | セ'リ     | 処理時期                                       | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌<br>主<br>土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意   |
|-------------------------------------------------------------|------|----------|-----|------------------|-----|-----|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------------|---------|--------------------------------------------|----------------|------------------|--------|--------|--------|-----------------|--------------|
| VII-1<br>NBA-076a-1kg<br>粒<br><br>Ⅱ-6-(1)<br>Ⅱ-6-(2)<br>を併用 | 土壌処理 | 北海道      | ○2  | ○                | ○2  | ○2  |            |            |             | ●前        | ○発<br>生    | ○前               | ○再<br>生 | +0~ハ'エ2L                                   | 100<br>g/a     | 1.5<br>●         | ○      | ○      | ○      | 2               | (38)<br>(42) |
|                                                             |      | 東北       | ○2  | ○                | ○2  | ●始  | ○2         | ○2         | ●前          | ●始        | ○期         | ○前               | ○前      |                                            |                | ○                | ○      | ○      | ○      | 1.5             | 田植同時<br>散布可能 |
|                                                             |      | 北陸       |     |                  |     |     |            |            |             |           |            |                  | 始       |                                            |                |                  |        |        |        |                 |              |
|                                                             |      | 関東<br>東海 | 早   |                  |     |     |            |            |             |           |            |                  |         | *エ' / サ'ス'グ'サ<br>2L<br>**ス'イ<br>: 発生後~収3cm |                |                  |        |        |        |                 |              |
|                                                             |      | 普        |     |                  |     |     |            |            |             |           |            |                  |         |                                            |                |                  |        |        |        |                 |              |
|                                                             |      | 近畿<br>中国 | 早   |                  |     |     |            |            |             |           |            |                  |         |                                            |                |                  |        |        |        |                 |              |
|                                                             |      | 普        |     |                  |     |     |            |            |             |           |            |                  |         |                                            |                |                  |        |        |        |                 |              |
|                                                             |      | 四国       | 早   |                  |     |     |            |            |             |           |            |                  |         |                                            |                |                  |        |        |        |                 |              |
|                                                             |      | 普        |     |                  |     |     |            |            |             |           |            |                  |         |                                            |                |                  |        |        |        |                 |              |
|                                                             |      | 九州       | 早   |                  |     |     |            |            |             |           |            |                  |         |                                            |                |                  |        |        |        |                 |              |
|                                                             |      | 普        |     |                  |     |     |            |            |             |           |            |                  |         |                                            |                |                  |        |        |        |                 |              |

クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(東北)

オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(東北)

| 処理法                                                         | 地域名  | 作期       | ハ'エ  | 一年<br>広葉<br>マハ'イ | ネ'ル | ウ'カ | ミ'ヤ<br>ガ'リ | ヘ'ラ<br>タ'カ | クロ'グ<br>ワ'イ | オモ'ダ<br>カ | ヒ'ル<br>ム'シ | 葉<br>類<br>剥<br>離 | セ'リ     | 処理時期     | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌<br>主<br>土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                   |
|-------------------------------------------------------------|------|----------|------|------------------|-----|-----|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------------|---------|----------|----------------|------------------|--------|--------|--------|-----------------|------------------------------|
| VII-1<br>NBA-076b-1kg<br>粒<br><br>Ⅱ-6-(1)<br>Ⅱ-6-(2)<br>を併用 | 土壌処理 | 北海道      |      |                  |     |     |            |            |             |           |            |                  | 再生<br>前 |          | 100<br>g/a     |                  |        |        |        |                 | (28)<br>(34)<br>(38)<br>(42) |
|                                                             |      | 東北       |      |                  |     |     |            |            |             |           |            |                  |         |          |                |                  |        |        |        |                 |                              |
|                                                             |      | 北陸       | ○2   | ○                | ○2  | ○2  | ○2         |            |             |           |            |                  | ○始      | +0~ハ'エ2L |                | 1<br>○           | ○      | ○      | ○      | 2               | 田植同時<br>散布可能                 |
|                                                             |      | 関東<br>東海 | 早 ○2 | ○                | ○2  | ○2  | ○2         |            |             |           |            | ○発<br>生          | ○再<br>生 |          |                | ○                | ○      | ○      | ○      |                 |                              |
|                                                             |      | 普        | ○2   | ○                | ○2  | ○2  | ○2         | ●始         | ●始          | ○期        | ○前         | ○前               | ○前      |          |                | ○                | ○      | ○      | ○      |                 |                              |
|                                                             |      | 近畿<br>中国 | 早 ○2 | ○                | ○2  | ○2  | ○2         |            |             |           | ○発<br>生    | ○前               | ○始      |          |                | ○                | ○      | ○      | ○      | 1               |                              |
|                                                             |      | 普        | ○2   | ○                | ○2  | ○2  | ○2         |            |             |           | ○期         | ○前               | ○前      |          |                | ○                | ○      | ○      | ○      | 1.5             |                              |
|                                                             |      | 四国       | 早 ○2 | ○                | ○2  | ○2  | ○2         |            |             |           | ○発<br>生    | ○前               | ○再<br>生 |          |                | ○                | ○      | ○      | ○      | 1               |                              |
|                                                             |      | 普        | ○2   | ○                | ○2  | ○2  | ○2         |            |             |           | ○期         | ○前               | ○前      |          |                | ○                | ○      | ○      | ○      | 1.5             |                              |
|                                                             |      | 九州       | 早 ○2 | ○                | ○2  | ○始  | ○2         |            |             |           | ○発<br>生    | ○前               | ○始      |          |                | ○                | ○      | ○      | ○      |                 |                              |
|                                                             |      | 普        | ○2   | ○                | ○2  | ○始  | ○2         | ●始         | ●始          | ○期        | ○前         | ○前               | ○前      |          |                | ○                | ○      | ○      | ○      |                 |                              |

クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(関東・東海、九州)

オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(関東・東海、九州)

|                                                                                       | 処理法       | 地域名      | 作期     | ハ・エ | 一年<br>広葉<br>マハイ | ホタテ | ウリカ | ミ<br>ガ<br>リ | ヘ<br>ラ<br>タ<br>カ | クロ<br>グ<br>ワイ | オ<br>モ<br>ダ<br>カ | ヒ<br>ム<br>シ<br>ロ | 莖<br>葉<br>剥<br>離 | セリ      |     | 処理時期      | 使用<br>量・<br>製品                            | 砂<br>壌<br>土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減<br>水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|-----|-----------------|-----|-----|-------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------|-----|-----------|-------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|----------------------|
| VII-1<br>NBA-096a<br>7077 <sup>※</sup><br><br>II-6-(1)<br>II-6-(2)<br>II-6-(5)<br>を併用 | 土壌の<br>処理 | 北海道      |        | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○ 2 |             |                  |               | ●前               | ○発<br>生          | ○前               | ○再<br>生 | ○*  | +0~1/2 EL | 50<br>ml/a                                | 1.5<br>●    | ○      | ○      | ○      | 2                   | (38)<br>(40)<br>(42) |
|                                                                                       |           | 東北       |        | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○始  | ○始          | ○ 2              | ●前            | ●前               | ○期               | ○前               | ○前      | ●** |           |                                           | ○           | ○      | ○      | 1.5    |                     |                      |
|                                                                                       |           | 北陸       |        |     |                 |     |     |             |                  |               |                  |                  |                  |         | 始   |           |                                           |             |        |        |        |                     |                      |
|                                                                                       |           | 関東<br>東海 | 早<br>普 |     |                 |     |     |             |                  |               |                  |                  |                  |         |     |           | *エ' /オモダカ<br>サ : 2L<br>**シ'イ<br>: 発生始~3cm |             |        |        |        |                     |                      |
|                                                                                       |           | 近畿<br>中国 | 早<br>普 |     |                 |     |     |             |                  |               |                  |                  |                  |         |     |           |                                           |             |        |        |        |                     |                      |
|                                                                                       |           | 四国       | 早<br>普 |     |                 |     |     |             |                  |               |                  |                  |                  |         |     |           |                                           |             |        |        |        |                     |                      |
|                                                                                       |           | 九州       | 早<br>普 |     |                 |     |     |             |                  |               |                  |                  |                  |         |     |           |                                           |             |        |        |        |                     |                      |
|                                                                                       |           |          |        |     |                 |     |     |             |                  |               |                  |                  |                  |         |     |           |                                           |             |        |        |        |                     |                      |
|                                                                                       |           |          |        |     |                 |     |     |             |                  |               |                  |                  |                  |         |     |           |                                           |             |        |        |        |                     |                      |
|                                                                                       |           |          |        |     |                 |     |     |             |                  |               |                  |                  |                  |         |     |           |                                           |             |        |        |        |                     |                      |

クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(東北)  
オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(東北)

| 処理法                                                                       | 地域名      | 作期 | ハ・エ | 一年<br>広葉<br>マハイ | ホタテ | ウリカ | ミ<br>ガ<br>リ | ヘ<br>ラ<br>タ<br>カ | クロ<br>グ<br>ワイ | オ<br>モ<br>ダ<br>カ | ヒ<br>ム<br>シ<br>ロ | 莖<br>葉<br>剥<br>離 | セリ | 処理時期      | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌<br>土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----|-----------------|-----|-----|-------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----|-----------|----------------|-------------|--------|--------|--------|----------------|------------------------------|
| VII-1<br>NBA-096b<br>7077 <sup>※</sup><br><br>II-6-(1)<br>II-6-(2)<br>を併用 | 北海道      |    |     |                 |     |     |             |                  |               |                  |                  |                  | 再  | +0~1/2 EL | 50<br>ml/a     |             |        |        |        |                | (28)<br>(34)<br>(38)<br>(42) |
|                                                                           | 東北       |    |     |                 |     |     |             |                  |               |                  |                  |                  | 再  |           |                |             |        |        |        |                |                              |
|                                                                           | 北陸       |    | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○始  | ○始          |                  |               |                  |                  | ●前               | ○始 |           |                | ●           | ●      | ○      | ○      | 2              |                              |
|                                                                           | 関東<br>東海 | 早  | ○ 2 | ○               | ○始  | ○始  | ○ 2         |                  |               | ○発               | ○前               | ○前               | ○再 |           |                | ●           | ●      | ○      | ○      | 1              |                              |
|                                                                           | 近畿<br>中国 | 早  | ○ 2 | ○               | ○始  | ○始  | ○ 2         | ●始               | ●始            | ○発               | ○前               | ○前               | ○再 |           |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 1.5            |                              |
|                                                                           | 四国       | 早  | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○ 2 | ○ 2         |                  |               | ●発               | ○期               | ○前               | ○始 |           |                | ○           | ○      | ○      | ○      |                |                              |
|                                                                           | 九州       | 早  | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○ 2 | ○ 2         |                  |               | ●発               | ○期               | ○前               | ○再 |           |                | ○           | ○      | ○      | ○      |                |                              |
|                                                                           |          | 普  | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○ 2 | ○ 2         |                  |               | ●発               | ○期               | ○前               | ○始 |           |                | ○           | ○      | ○      | ○      |                |                              |
|                                                                           |          | 普  | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○ 2 | ○ 2         |                  |               | ●発               | ○期               | ○前               | ○再 |           |                | ○           | ○      | ○      | ○      |                |                              |
|                                                                           |          | 普  | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○ 2 | ○ 2         |                  |               | ●発               | ○期               | ○前               | ○始 |           |                | ○           | ○      | ○      | ○      |                |                              |

クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(関東・東海、九州)  
オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(関東・東海、九州)

VII-1 NC-385SB 顆粒水和「継」

VII-1 NC-397-1kg 粒「継」

| 処理法                     | 地域名      | 作期 | ハ・エ | 一年<br>広葉<br>マハイ | ホタテ | ウリカ | ミ<br>ガ<br>リ | ヘ<br>ラ<br>タ<br>カ | クロ<br>グ<br>ワイ | オ<br>モ<br>ダ<br>カ | ヒ<br>ム<br>シ<br>ロ | 莖<br>葉<br>剥<br>離 | セリ | 処理時期      | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌<br>土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意          |
|-------------------------|----------|----|-----|-----------------|-----|-----|-------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----|-----------|----------------|-------------|--------|--------|--------|----------------|---------------------|
| VII-1<br>PSS-D-1kg<br>粒 | 北海道      |    |     |                 |     |     |             |                  |               |                  |                  |                  |    | +0~1/2 EL | 100<br>g/a     | 1.5         | ○      | ○      | ○      | 2              | (3)<br>(28)<br>(34) |
|                         | 東北       |    | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○始  | ○始          | ○始               |               |                  | ○発               | ○前               | ○前 |           |                | ○           | ○      | ○      | ○      |                |                     |
|                         | 北陸       |    | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○始  | ○始          |                  |               |                  | ○発               | ○前               | ○前 |           |                | ○           | ○      | ○      | ○      |                |                     |
|                         | 関東<br>東海 | 早  | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○ 2 | ○ 2         |                  |               |                  | ○発               | ○前               | ○前 |           |                | ○           | ○      | ○      | ○      |                |                     |
|                         | 近畿<br>中国 | 早  | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○ 2 | ○ 2         |                  |               |                  | ○発               | ○前               | ○前 |           |                | ○           | ○      | ○      | ○      |                |                     |
|                         | 四国       | 早  | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○ 2 | ○ 2         |                  |               |                  | ○発               | ○前               | ○再 |           |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 1              |                     |
|                         | 九州       | 早  | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○ 2 | ○ 2         |                  |               |                  | ○発               | ○前               | ○再 |           |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 2              |                     |
|                         |          | 普  | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○ 2 | ○ 2         |                  |               |                  | ○期               | ○前               | ○始 |           |                | ○           | ○      | ○      | ○      |                |                     |
|                         |          | 普  | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○ 2 | ○ 2         |                  |               |                  | ○期               | ○前               | ○再 |           |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 1.5            |                     |
|                         |          | 普  | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○ 2 | ○ 2         |                  |               |                  | ○期               | ○前               | ○始 |           |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 2              |                     |

| 処理法                               | 地域名      | 作期 | ハ・エ   | 一年<br>広葉<br>マハイ | ホタテ | ウリカ | ミ<br>ガ<br>リ | ヘ<br>ラ<br>タ<br>カ | クロ<br>グ<br>ワイ | オ<br>モ<br>ダ<br>カ | ヒ<br>ム<br>シ<br>ロ | 莖<br>葉<br>剥<br>離 | セリ | 処理時期      | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌<br>土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意   |
|-----------------------------------|----------|----|-------|-----------------|-----|-----|-------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----|-----------|----------------|-------------|--------|--------|--------|----------------|--------------|
| IX<br>SB-533<br>7077 <sup>※</sup> | 北海道      |    | ○ 1.5 | ○               | ○始  |     |             | ○始               |               |                  |                  |                  |    | +0~1/2 EL | 50<br>ml/a     | 1.5         | ○      | ○      | ○      | 2              | (34)<br>(41) |
|                                   | 東北       |    | ○ 1.5 | ○               | ○始  | ●前  |             |                  |               |                  |                  |                  |    |           |                | ○           | ○      | ○      | ○      |                |              |
|                                   | 北陸       |    | ○ 1.5 | ○               | ○始  | ●前  |             |                  |               |                  |                  |                  |    |           |                | ○           | ○      | ○      | ○      |                |              |
|                                   | 関東<br>東海 | 早  | ○ 1.5 | ○               | ○始  |     |             |                  |               |                  |                  |                  |    |           |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 1              |              |
|                                   | 近畿<br>中国 | 早  | ○ 1.5 | ○               | ○始  | ○始  |             |                  |               |                  |                  |                  |    |           |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 2              |              |
|                                   | 四国       | 早  | ○ 1.5 | ○               | ○始  | ○始  |             |                  |               |                  |                  |                  |    |           |                | ○           | ○      | ○      | ○      |                |              |
|                                   | 九州       | 早  | ○ 1.5 | ○               | ○始  | ○始  |             |                  |               |                  |                  |                  |    |           |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 1.5            |              |
|                                   |          | 普  | ○ 1.5 | ○               | ○始  | ○始  |             |                  |               |                  |                  |                  |    |           |                | ○           | ○      | ○      | ○      |                |              |
|                                   |          | 普  | ○ 1.5 | ○               | ○始  | ○始  |             |                  |               |                  |                  |                  |    |           |                | ○           | ○      | ○      | ○      |                |              |
|                                   |          | 普  | ○ 1.5 | ○               | ○始  | ○始  |             |                  |               |                  |                  |                  |    |           |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 2              |              |

VII-1 AVII-002-1kg 粒「継」

VII-1 NBA-126a-1kg 粒「継」

VII-2 初・中期一発処理剤

| 処理法                       | 地域名                         | 作期       | ハ' E     | 一年<br>広葉<br>マハ'イ | ホ'ルイ | ウ'リカ | ミ'ヤ<br>ガ'リ | ヘ'オモ<br>ダ'カ | クロ'グ<br>ワイ | オ'モガ<br>カ | ヒ'ルム<br>シ'ロ   | 薬類<br>表層<br>剥離 | セリ            | 処理時期                           | 使用<br>量・製<br>品 | 砂<br>壌土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意   |
|---------------------------|-----------------------------|----------|----------|------------------|------|------|------------|-------------|------------|-----------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------|----------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|--------------|
| VII-2<br>AGH-925-1kg<br>粒 | 某<br>菜<br>菜<br>上<br>壤<br>処理 | 北海道      | ○ 3      | ○                | ○ 2  | ○ 2  |            | ○ 2         |            |           | ○ 発<br>生<br>期 | ○ 前            | ○ 再<br>生<br>期 | +5~ハ' E 3L                     | 100<br>g/a     | ○       | ○      | ○      | ○      | 2               | (34)<br>(41) |
|                           |                             | 東北       | ○ 3      | ○                | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2        | ○ 2         |            |           | ○ 発<br>生<br>期 | ○ 前            | ○ 再<br>生<br>期 | 但し北海道<br>関東・東海<br>砂壌土は<br>2.5L | 50<br>g/a      | ○       | ○      | ○      | ○      | 1.5             |              |
|                           |                             | 北陸       | ○ 3      | ○                | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2        |             |            |           | ○ 前           | ○ 始            |               |                                |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 2               |              |
|                           |                             | 関東<br>東海 | 早<br>○ 3 | ○                | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2        |             |            |           | ○ 発<br>生<br>期 | ○ 前            | ○ 再<br>生<br>期 |                                |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 1               |              |
|                           |                             | 普        | ○ 3      | ○                | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2        |             |            |           | ○ 前           | ○ 前            | ○ 再<br>生<br>期 |                                |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 2               |              |
|                           |                             | 近畿<br>中国 | 早<br>○ 3 | ○                | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2        |             |            |           | ○ 発<br>生<br>期 | ○ 前            | ○ 再<br>生<br>期 |                                |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 1               |              |
|                           |                             | 普        | ○ 3      | ○                | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2        |             |            |           | ○ 前           | ○ 前            | ○ 再<br>生<br>期 |                                |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 2               |              |
|                           |                             | 四国       | 早<br>○ 3 | ○                | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2        |             |            |           | ○ 発<br>生<br>期 | ○ 前            | ○ 再<br>生<br>期 |                                |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 1               |              |
|                           |                             | 普        | ○ 3      | ○                | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2        |             |            |           | ○ 前           | ○ 前            | ○ 再<br>生<br>期 |                                |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 2               |              |
|                           |                             | 九州       | 早<br>○ 3 | ○                | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2        |             |            |           | ○ 発<br>生<br>期 | ○ 前            | ○ 再<br>生<br>期 |                                |                | ○       | ○      | ○      | ○      |                 |              |
|                           |                             | 普        | ○ 3      | ○                | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2        |             |            |           | ○ 前           | ○ 前            | ○ 再<br>生<br>期 |                                |                | ○       | ○      | ○      | ○      |                 |              |

| 処理法                         | 地域名                         | 作期       | ハ' E     | 一年<br>広葉<br>マハ'イ | ホ'ルイ | ウ'リカ | ミ'ヤ<br>ガ'リ | ヘ'オモ<br>ダ'カ | クロ'グ<br>ワイ | オ'モガ<br>カ | ヒ'ルム<br>シ'ロ   | 薬類<br>表層<br>剥離 | セリ            | 処理時期         | 使用<br>量・製<br>品 | 砂<br>壌土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                   |
|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|------------------|------|------|------------|-------------|------------|-----------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|------------------------------|
| VII-2<br>CDS-941<br>7077' 粒 | 某<br>菜<br>菜<br>上<br>壤<br>処理 | 北海道      | ○ 2.5    | ○                | ○ 2  | ○ 2  |            | ○ 2         |            | ○ 前       | ○ 発<br>生<br>期 | ○ 前            | ○ 再<br>生<br>期 | +3~ハ' E 2.5L | 50<br>ml/a     | ○       | ○      | ○      | ○      | 2               | (36)<br>(38)<br>(40)<br>(42) |
|                             |                             | 東北       | ○ 2.5    | ○                | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2        | ○ 2         | ○ 前        | ○ 前       | ○ 前           | ● 前            | ○ 前           | 00**         |                | ○       | ○      | ○      | ○      |                 | 水口処理<br>可能                   |
|                             |                             | 北陸       |          |                  |      |      |            |             |            |           |               |                | 始             |              |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                             |                             | 関東<br>東海 | 早<br>○ 3 | ○                | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2        |             |            |           |               |                |               |              |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                             |                             | 普        |          |                  |      |      |            |             |            |           |               |                |               |              |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                             |                             | 近畿<br>中国 | 早<br>○ 3 | ○                | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2        |             |            |           |               |                |               |              |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                             |                             | 普        |          |                  |      |      |            |             |            |           |               |                |               |              |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                             |                             | 四国       | 早<br>○ 3 | ○                | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2        |             |            |           |               |                |               |              |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                             |                             | 普        |          |                  |      |      |            |             |            |           |               |                |               |              |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                             |                             | 九州       | 早<br>○ 3 | ○                | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2        |             |            |           |               |                |               |              |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                             |                             | 普        |          |                  |      |      |            |             |            |           |               |                |               |              |                |         |        |        |        |                 |                              |

クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することにより、さらに効果が向上する。(東北)  
オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することにより、さらに効果が向上する。(東北)

| 処理法                         | 地域名                         | 作期       | ハ' E     | 一年<br>広葉<br>マハ'イ | ホ'ルイ | ウ'リカ | ミ'ヤ<br>ガ'リ | ヘ'オモ<br>ダ'カ | クロ'グ<br>ワイ | オ'モガ<br>カ | ヒ'ルム<br>シ'ロ   | 薬類<br>表層<br>剥離 | セリ            | 処理時期         | 使用<br>量・製<br>品 | 砂<br>壌土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意 |
|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|------------------|------|------|------------|-------------|------------|-----------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|------------|
| VII-2<br>DIN-971<br>7077' 粒 | 某<br>菜<br>菜<br>上<br>壤<br>処理 | 北海道      | ○ 2.5    | ○                | ○ 2  | ○ 2  |            |             |            |           | ○ 発<br>生<br>期 | ○ 前            | ○ 再<br>生<br>期 | +0~ハ' E 2.5L | 50<br>ml/a     | ○       | ○      | ○      | ○      | 2               |            |
|                             |                             | 東北       | ○ 2.5    | ○                | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2        | ○ 2         |            |           | ○ 前           | ○ 前            | ○ 前           |              |                | ○       | ○      | ○      | ○      |                 |            |
|                             |                             | 北陸       |          |                  |      |      |            |             |            |           |               |                | 始             |              |                |         |        |        |        |                 |            |
|                             |                             | 関東<br>東海 | 早<br>○ 3 | ○                | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2        |             |            |           |               |                |               |              |                |         |        |        |        |                 |            |
|                             |                             | 普        |          |                  |      |      |            |             |            |           |               |                |               |              |                |         |        |        |        |                 |            |
|                             |                             | 近畿<br>中国 | 早<br>○ 3 | ○                | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2        |             |            |           |               |                |               |              |                |         |        |        |        |                 |            |
|                             |                             | 普        |          |                  |      |      |            |             |            |           |               |                |               |              |                |         |        |        |        |                 |            |
|                             |                             | 四国       | 早<br>○ 3 | ○                | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2        |             |            |           |               |                |               |              |                |         |        |        |        |                 |            |
|                             |                             | 普        |          |                  |      |      |            |             |            |           |               |                |               |              |                |         |        |        |        |                 |            |
|                             |                             | 九州       | 早<br>○ 3 | ○                | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2        |             |            |           |               |                |               |              |                |         |        |        |        |                 |            |
|                             |                             | 普        |          |                  |      |      |            |             |            |           |               |                |               |              |                |         |        |        |        |                 |            |

| 処理法                            | 地域名                         | 作期       | ハ' E       | 一年<br>広葉<br>マハ'イ | ホ'ルイ | ウ'リカ | ミ'ヤ<br>ガ'リ | ヘ'オモ<br>ダ'カ | クロ'グ<br>ワイ | オ'モガ<br>カ | ヒ'ルム<br>シ'ロ   | 薬類<br>表層<br>剥離 | セリ            | 処理時期         | 使用<br>量・製<br>品 | 砂<br>壌土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                     |
|--------------------------------|-----------------------------|----------|------------|------------------|------|------|------------|-------------|------------|-----------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|--------------------------------|
| VII-2<br>DIN-971(L)<br>7077' 粒 | 某<br>菜<br>菜<br>上<br>壤<br>処理 | 北海道      |            |                  |      |      |            |             |            |           |               |                | 再<br>生<br>期   |              | 50<br>ml/a     |         |        |        |        |                 | (28)<br>(34)                   |
|                                |                             | 東北       |            |                  |      |      |            |             |            |           |               |                | 再<br>生<br>期   |              |                |         |        |        |        |                 |                                |
|                                |                             | 北陸       | ○ 2.5      | ○                | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2        |             |            |           |               | ○ 前            | ○ 始           | +0~ハ' E 2.5L |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 2               | *砂壌土は<br>+5~<br>(近畿・中国・<br>四国) |
|                                |                             | 関東<br>東海 | 早<br>○ 2.5 | ○                | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2        |             |            |           | ○ 発<br>生<br>期 | ○ 前            | ○ 再<br>生<br>期 |              |                | ○       | ○      | ○      | ○      |                 |                                |
|                                |                             | 普        | ○ 2.5      | ○                | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2        |             |            |           | ○ 前           | ○ 前            | ○ 再<br>生<br>期 |              |                | ○       | ○      | ○      | ○      |                 |                                |
|                                |                             | 近畿<br>中国 | 早<br>○ 2.5 | ○                | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2        |             |            |           | ○ 発<br>生<br>期 | ○ 前            | ○ 再<br>生<br>期 |              |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 1.5             |                                |
|                                |                             | 普        | ○ 2.5      | ○                | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2        |             |            |           | ○ 前           | ○ 前            | ○ 再<br>生<br>期 |              |                | ●*      | ○      | ○      | ○      |                 |                                |
|                                |                             | 四国       | 早<br>○ 2.5 | ○                | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2        |             |            |           | ○ 発<br>生<br>期 | ○ 前            | ○ 再<br>生<br>期 |              |                | ○       | ○      | ○      | ○      |                 |                                |
|                                |                             | 普        | ○ 2.5      | ○                | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2        |             |            |           | ○ 前           | ○ 前            | ○ 再<br>生<br>期 |              |                | ○       | ○      | ○      | ○      |                 |                                |
|                                |                             | 九州       | 早<br>○ 2.5 | ○                | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2        |             |            |           | ○ 発<br>生<br>期 | ○ 前            | ○ 再<br>生<br>期 |              |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 2               |                                |
|                                |                             | 普        | ○ 2.5      | ○                | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2        |             |            |           | ○ 前           | ○ 前            | ○ 再<br>生<br>期 |              |                | ○       | ○      | ○      | ○      |                 |                                |

|                                                       | 処理法    | 地域名  | 作期 | ハ'エ  | 広葉マ<br>ハ'イ | ネタ'イ | ウリカ<br>マ'イ | ヘ'オモ<br>ダ'カ | クロ'イ | オモ'カ | ヒル'シ<br>ロ | 葉類腐<br>離 | セ'イ  | 処理時期        | 使用量・<br>製品 | 砂壌土  | 壤土 | 埴土 | 埴土 | 減深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                   |   |     |   |
|-------------------------------------------------------|--------|------|----|------|------------|------|------------|-------------|------|------|-----------|----------|------|-------------|------------|------|----|----|----|------------|------------------------------|---|-----|---|
| VII-2<br>HJ-943-1kg<br>粒<br>Ⅱ-6-(1)<br>Ⅱ-6-(2)<br>を併用 | 農薬土壌処理 | 北海道  |    | ○2.5 | ○          | ○2   | ○2         | ○2          |      |      | ○発生期      | ○前       | ○再生前 | +5~7' I2.5L | 100<br>g/a |      |    | ○  | ○  | 2          | (28)<br>(34)<br>(38)<br>(42) |   |     |   |
|                                                       |        | 東北   |    | ○2.5 | ○          | ○2   | ○2         | ○2          | ●前   | ●前   | ○前        | ○前       | ○前   |             |            |      |    |    | ○  | ○          | 1.5                          |   |     |   |
|                                                       |        | 北陸   |    | ○2.5 | ○          | ○2   | ○2         | ○2          |      | ●前   | ○前        | ○前       | ○前   |             |            | ○始   |    |    |    | ○          | ○                            | 1 |     |   |
|                                                       |        | 関東東海 | 早  | ○2.5 | ○          | ○2   | ○2         | ○2          |      |      |           | ○発生期     | ○前   |             |            | ○再生前 |    |    |    | ○          | ○                            | ○ |     |   |
|                                                       |        |      | 普  | ○2.5 | ○          | ○2   | ○2         | ○2          | ●始   | ●始   | ○前        | ○前       | ○前   |             |            | ○始   |    |    |    | ○          | ○                            | ○ | 2   |   |
|                                                       |        | 近畿中国 | 早  | ○2.5 | ○          | ○2   | ○2         | ○始          | ○2   |      |           |          | ○発生期 |             |            | ○前   | ○始 |    |    |            | ○                            | ○ | ○   | 1 |
|                                                       |        |      | 普  | ○2.5 | ○          | ○2   | ○2         | ○2          | ●始   | ●始   | ○前        | ○前       | ○前   |             |            | ○始   |    |    |    | ○          | ○                            | ○ | 1.5 |   |
|                                                       |        | 四国   | 早  | ○2.5 | ○          | ○2   | ○始         | ○2          |      |      |           | ○発生期     | ○前   |             |            | ○再生前 |    |    |    | ○          | ○                            | ○ | 1   |   |
|                                                       |        |      | 普  | ○2.5 | ○          | ○2   | ○2         | ○2          | ●始   | ●始   | ○前        | ○前       | ○前   |             |            | ○始   |    |    |    | ○          | ○                            | ○ | 1.5 |   |
|                                                       |        | 九州   | 早  | ○2.5 | ○          | ○2   | ○2         | ○2          |      |      |           | ○発生期     | ○前   |             |            | ○再生前 |    |    |    | ○          | ○                            | ○ |     |   |
|                                                       |        |      | 普  | ○2.5 | ○          | ○2   | ○2         | ○2          | ●始   | ●始   | ○前        | ○前       | ○前   |             |            | ○始   |    |    |    | ○          | ○                            | ○ |     |   |

クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(東北・関東・東海~九州)  
オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(東北~九州)

VII-2 HOK-204-1kg 粒「籾」

|                           | 処理法             | 地域名      | 作期     | ハ'エ  | 一年<br>広葉<br>マハ'イ | ホ'ホ'イ | ウリカ'イ | ミ'カ'イ | ヘ'ウオモ<br>ダ'カ | クロ'イ | オモ'カ | ヒル'シ<br>ロ | 葉<br>類<br>腐<br>離 | セ'イ |           | 処理時期 | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意 |  |
|---------------------------|-----------------|----------|--------|------|------------------|-------|-------|-------|--------------|------|------|-----------|------------------|-----|-----------|------|----------------|-------------|--------|--------|--------|----------------|------------|--|
| VII-2<br>HOK-205-1kg<br>粒 | 基礎<br>準土壌<br>処理 | 北海道      |        |      |                  |       |       |       |              |      |      |           |                  |     |           |      | 100<br>g/a     |             |        |        |        |                |            |  |
|                           |                 | 東北       |        |      |                  |       |       |       |              |      |      |           |                  |     |           |      |                |             |        |        |        |                |            |  |
|                           |                 | 北陸       |        |      |                  |       |       |       |              |      |      |           |                  |     |           |      |                |             |        |        |        |                |            |  |
|                           |                 | 関東<br>東海 | 早<br>普 |      |                  |       |       |       |              |      |      |           |                  |     |           |      | +5～ハ' I2.5L    |             |        |        |        |                |            |  |
|                           |                 | 近畿<br>中国 | 早<br>普 | ●2.5 | ●                | ●2    | ●2    | ●2    |              |      |      |           | 発生期              | ●前  | 再生前<br>～始 |      |                |             |        |        |        |                |            |  |
|                           |                 | 四国       | 早<br>普 | ●2.5 | ●                | ●2    | ●2    | ●2    |              |      |      |           | 発生期              | ●前  | 再生前<br>～始 |      |                |             |        |        |        |                |            |  |
|                           |                 | 九州       | 早<br>普 |      |                  |       |       |       |              |      |      |           |                  |     |           |      |                |             |        |        |        |                |            |  |
|                           |                 |          |        |      |                  |       |       |       |              |      |      |           |                  |     |           |      |                |             |        |        |        |                |            |  |
|                           |                 |          |        |      |                  |       |       |       |              |      |      |           |                  |     |           |      |                |             |        |        |        |                |            |  |
|                           |                 |          |        |      |                  |       |       |       |              |      |      |           |                  |     |           |      |                |             |        |        |        |                |            |  |

| 処理法                      | 地域名      | 作期 | ハ'エ | 一年<br>広葉<br>マハ'イ | ネタ'イ | ウリカ'イ | ミ'カ'イ | ヘ'オモ<br>ダ'カ | クロ'イ | オモ'カ | ヒル'シ<br>ロ | 葉<br>類<br>腐<br>離 | セ'イ | 処理時期          | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意           |
|--------------------------|----------|----|-----|------------------|------|-------|-------|-------------|------|------|-----------|------------------|-----|---------------|----------------|-------------|--------|--------|--------|----------------|----------------------|
| VII-2<br>KK-961-1kg<br>粒 | 北海道      |    | ○3  | ○                | ○2   | ○2    |       |             |      | ○    | ○         | ○                | ○   | +5~7' I3L     | 100<br>g/a     |             |        | ○      | ○      | 2              | (28)<br>(34)<br>(38) |
|                          | 東北       |    | ○3  | ○                | ○2   | ●2    | ○2    | ○2          | ○    | ○    | ○         | ○                | ○   | 減水周縁部<br>散布可能 |                | ○           | ○      | ○      | ○      |                | (42)<br>(48)         |
|                          | 北陸       |    |     |                  |      |       |       |             |      |      |           |                  |     |               |                |             |        |        |        |                |                      |
|                          | 関東<br>東海 | 早  |     |                  |      |       |       |             |      |      |           |                  |     |               |                |             |        |        |        |                |                      |
|                          |          | 普  |     |                  |      |       |       |             |      |      |           |                  |     |               |                |             |        |        |        |                |                      |
|                          | 近畿<br>中国 | 早  |     |                  |      |       |       |             |      |      |           |                  |     |               |                |             |        |        |        |                |                      |
|                          |          | 普  |     |                  |      |       |       |             |      |      |           |                  |     |               |                |             |        |        |        |                |                      |
|                          | 四国       | 早  |     |                  |      |       |       |             |      |      |           |                  |     |               |                |             |        |        |        |                |                      |
|                          |          | 普  |     |                  |      |       |       |             |      |      |           |                  |     |               |                |             |        |        |        |                |                      |
|                          | 九州       | 早  |     |                  |      |       |       |             |      |      |           |                  |     |               |                |             |        |        |        |                |                      |
|                          |          | 普  |     |                  |      |       |       |             |      |      |           |                  |     |               |                |             |        |        |        |                |                      |

クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(東北)  
オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(東北)

| 処理法                      | 地域名      | 作期 | ハ'エ | 一年<br>広葉<br>マハ'イ | ネタ'イ | ウリカ'イ | ミ'カ'イ | ヘ'オモ<br>ダ'カ | クロ'イ | オモ'カ | ヒル'シ<br>ロ | 葉<br>類<br>腐<br>離 | セ'イ | 処理時期          | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意           |
|--------------------------|----------|----|-----|------------------|------|-------|-------|-------------|------|------|-----------|------------------|-----|---------------|----------------|-------------|--------|--------|--------|----------------|----------------------|
| VII-2<br>KK-962-1kg<br>粒 | 北海道      |    |     |                  |      |       |       |             |      |      |           |                  |     |               | 100<br>g/a     |             |        |        |        |                | (28)<br>(34)<br>(38) |
|                          | 東北       |    |     |                  |      |       |       |             |      |      |           |                  |     |               |                |             |        |        |        |                | (42)<br>(48)         |
|                          | 北陸       |    | ○3  | ○                | ○2   | ○2    | ○2    | ○           | ○    | ○    |           |                  | ○   | +5~7' I3L     |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 2              |                      |
|                          | 関東<br>東海 | 早  | ○3  | ○                | ○2   | ○2    | ○2    |             |      |      | ○         | ○                | ○   |               |                | ○           | ○      | ○      | ○      |                |                      |
|                          |          | 普  | ○3  | ○                | ○2   | ○2    | ○2    | ○           | ○    | ○    | ○         | ○                | ○   |               |                | ○           | ○      | ○      | ○      |                |                      |
|                          | 近畿<br>中国 | 早  | ○3  | ○                | ○2   | ○2    | ○2    |             |      |      | ○         | ○                | ○   |               |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 1              |                      |
|                          |          | 普  | ○3  | ○                | ○2   | ○2    | ○2    |             |      |      | ○         | ○                | ○   |               |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 2              |                      |
|                          | 四国       | 早  | ○3  | ○                | ○2   | ○2    | ○2    |             |      |      | ○         | ○                | ○   |               |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 1              |                      |
|                          |          | 普  | ○3  | ○                | ○2   | ○2    | ○2    |             |      |      | ○         | ○                | ○   |               |                | ○           | ○      | ○      | ○      | 2              |                      |
|                          | 九州       | 早  | ○3  | ○                | ○2   | ○2    | ○2    |             |      |      | ○         | ○                | ○   |               |                | ○           | ○      | ○      | ○      |                |                      |
|                          |          | 普  | ○3  | ○                | ○2   | ○2    | ○2    | ○           | ○    | ○    | ○         | ○                | ○   | 減水周縁部<br>散布可能 |                | ○           | ○      | ○      | ○      |                |                      |

クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(関東・東海,九州)  
オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(関東・東海,九州)

VII-2 KUH-004D-1kg 粒「籾」

VII-2 KUH-004K-1kg 粒「籾」

| 処理法                          | 地域名 | 作期 | 1/2エ | 一年<br>広葉<br>マハイ | ホタル | ウリカ | ミヤ<br>ガヤ | ヘラオ<br>モカ | クロ<br>グ | オモ<br>カ | ヒルム<br>シ | 藻類<br>剥離 | セリ       | 処理時期     | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                                             |
|------------------------------|-----|----|------|-----------------|-----|-----|----------|-----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| VII-2<br>KUH-972D<br>7077g 籾 | 北海道 |    |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |          |          | 50<br>ml/a     |        |        |        |        |                 | (28)<br>(34)                                           |
|                              | 東北  |    |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |          |          |                |        |        |        |        |                 |                                                        |
|                              | 北陸  | 早  | ○3   | ○               | ○2  | ○2  | ○2       |           |         |         |          |          |          | ±0~7/13L |                | ●      | ○      | ○      | ○      | 2               | 田植同時<br>散布可能<br>(近畿・中国・<br>四国)<br>*砂埴土<br>は+5~<br>(北陸) |
|                              | 関東  | 早  | ○3   | ○               | ○2  | ○2  | ○2       |           |         |         | ○発生<br>期 | ○前       | ○再<br>生前 | ±5~7/13L |                | ●      | ○      | ○      | ○      |                 |                                                        |
|                              | 東海  | 早  | ○3   | ○               | ○2  | ○2  | ○2       |           |         |         | ○発生<br>期 | ○前       | ○再<br>生前 |          |                | ●      | ○      | ○      | ○      |                 |                                                        |
|                              | 近畿  | 早  | ○3   | ○               | ○2  | ○2  | ○2       |           |         |         | ○発生<br>期 | ●前       | ○始       | ±0~7/13L |                |        | ○      | ○      | ○      | 1.5             |                                                        |
|                              | 中国  | 早  | ○3   | ○               | ○2  | ○2  | ○2       |           |         |         | ○発生<br>期 | ○前       | ○始       |          |                | ○      | ○      | ○      | ○      | 2               |                                                        |
|                              | 四国  | 早  | ○3   | ○               | ○2  | ○2  | ○2       |           |         |         | ○発生<br>期 | ●前       | ○再<br>生前 |          |                | ○      | ○      | ○      | ○      | 1.5             |                                                        |
|                              | 九州  | 早  | ○3   | ○               | ○2  | ○2  | ○2       |           |         |         | ○発生<br>期 | ○前       | ○再<br>生前 | ±5~7/13L |                | ○      | ○      | ○      | ○      | 1.5             |                                                        |
|                              |     | 早  | ○3   | ○               | ○2  | ○2  | ○2       |           |         |         | ○発生<br>期 | ○前       | ○始       |          |                | ○      | ○      | ○      | ○      | 2               |                                                        |
|                              |     | 早  | ○3   | ○               | ○2  | ○2  | ○2       |           |         |         | ○発生<br>期 | ○前       | ○始       |          |                | ○      | ○      | ○      | ○      | 2               |                                                        |
|                              |     | 早  | ○3   | ○               | ○2  | ○2  | ○2       |           |         |         | ○発生<br>期 | ○前       | ○始       |          |                | ○      | ○      | ○      | ○      | 2               |                                                        |

| 処理法                          | 地域名 | 作期 | 1/2エ | 一年<br>広葉<br>マハイ | ホタル | ウリカ | ミヤ<br>ガヤ | ヘラオ<br>モカ | クロ<br>グ | オモ<br>カ | ヒルム<br>シ | 藻類<br>剥離 | セリ       | 処理時期     | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意 |
|------------------------------|-----|----|------|-----------------|-----|-----|----------|-----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|------------|
| VII-2<br>KUH-972K<br>7077g 籾 | 北海道 |    | ○3   | ○               | ○2  | ○2  |          |           |         |         | ○発生<br>期 | ○前       | ○再<br>生前 | ±5~7/13L | 50<br>ml/a     | ○      | ○      | ○      | ○      | 2               |            |
|                              | 東北  |    | ○3   | ○               | ○2  | ○2  | ○2       | ○2        |         |         | ○発生<br>期 | ○前       | ○再<br>生前 |          |                | ○      | ○      | ○      | ○      | 1.5             |            |
|                              | 北陸  |    |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          | 始        |          |                |        |        |        |        |                 |            |
|                              | 関東  | 早  |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |          |          |                |        |        |        |        |                 |            |
|                              | 東海  | 早  |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |          |          |                |        |        |        |        |                 |            |
|                              | 近畿  | 早  |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |          |          |                |        |        |        |        |                 |            |
|                              | 中国  | 早  |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |          |          |                |        |        |        |        |                 |            |
|                              | 四国  | 早  |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |          |          |                |        |        |        |        |                 |            |
|                              | 九州  | 早  |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |          |          |                |        |        |        |        |                 |            |
|                              |     | 早  |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |          |          |                |        |        |        |        |                 |            |
|                              |     | 早  |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |          |          |                |        |        |        |        |                 |            |
|                              |     | 早  |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |          |          |                |        |        |        |        |                 |            |

| 処理法                         | 地域名 | 作期 | 1/2エ | 一年<br>広葉<br>マハイ | ホタル | ウリカ | ミヤ<br>ガヤ | ヘラオ<br>モカ | クロ<br>グ | オモ<br>カ | ヒルム<br>シ | 藻類<br>剥離 | セリ       | 処理時期     | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意 |
|-----------------------------|-----|----|------|-----------------|-----|-----|----------|-----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|------------|
| VII-2<br>KUH-985<br>7077g 籾 | 北海道 |    | ○3   | ○               | ○2  | ○2  |          | ●2        |         |         | ○発生<br>期 | ○前       | ○再<br>生前 | ±5~7/13L | 50<br>ml/a     | ○      | ○      | ○      | ○      | 2               |            |
|                             | 東北  |    | ○3   | ○               | ○2  | ○2  | ○2       |           |         |         | ○発生<br>期 | ○前       | ○再<br>生前 |          |                | ●      | ●      | ○      | ○      | 1.5             |            |
|                             | 北陸  |    |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          | 始        |          |                |        |        |        |        |                 |            |
|                             | 関東  | 早  |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |          |          |                |        |        |        |        |                 |            |
|                             | 東海  | 早  |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |          |          |                |        |        |        |        |                 |            |
|                             | 近畿  | 早  |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |          |          |                |        |        |        |        |                 |            |
|                             | 中国  | 早  |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |          |          |                |        |        |        |        |                 |            |
|                             | 四国  | 早  |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |          |          |                |        |        |        |        |                 |            |
|                             | 九州  | 早  |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |          |          |                |        |        |        |        |                 |            |
|                             |     | 早  |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |          |          |                |        |        |        |        |                 |            |
|                             |     | 早  |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |          |          |                |        |        |        |        |                 |            |
|                             |     | 早  |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |          |          |                |        |        |        |        |                 |            |

| 処理法                            | 地域名 | 作期 | 1/2エ | 一年<br>広葉<br>マハイ | ホタル | ウリカ | ミヤ<br>ガヤ | ヘラオ<br>モカ | クロ<br>グ | オモ<br>カ | ヒルム<br>シ | 藻類<br>剥離 | セリ       | 処理時期     | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意   |
|--------------------------------|-----|----|------|-----------------|-----|-----|----------|-----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|--------------|
| VII-2<br>KUH-985(1)<br>7077g 籾 | 北海道 |    |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |          |          | 50<br>ml/a     |        |        |        |        |                 | (28)<br>(34) |
|                                | 東北  |    |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |          |          |                |        |        |        |        |                 |              |
|                                | 北陸  | 早  | ○3   | ○               | ○2  | ○2  | ○2       |           |         |         |          |          |          | ±5~7/13L |                |        | ○      | ○      | ○      | 1.5             |              |
|                                | 関東  | 早  | ○3   | ○               | ○2  | ○2  | ○2       |           |         |         | ○発生<br>期 | ○前       | ○再<br>生前 |          |                | ●      | ●      | ○      | ○      | 1               |              |
|                                | 東海  | 早  | ○3   | ○               | ○2  | ○2  | ○2       |           |         |         | ○発生<br>期 | ○前       | ○再<br>生前 |          |                | ○      | ○      | ○      | ○      | 2               |              |
|                                | 近畿  | 早  |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          | ○始       |          |                |        |        |        |        |                 |              |
|                                | 中国  | 早  | ○3   | ○               | ○2  | ○2  | ○2       |           |         |         |          |          | ○        |          |                | ○      | ○      | ○      | ○      |                 |              |
|                                | 四国  | 早  |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |          |          |                | ○      | ○      | ○      | ○      |                 |              |
|                                | 九州  | 早  | ●3   | ●               | ●2  | ●2  | ●2       |           |         |         | ●発生<br>期 | ●前       | ●再<br>生前 |          |                | ●      | ●      | ●      | ●      | 1.5             |              |
|                                |     | 早  | ○3   | ○               | ○2  | ○2  | ○2       |           |         |         | ○発生<br>期 | ○前       | ○始       |          |                | ○      | ○      | ○      | ○      | 2               |              |
|                                |     | 早  |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |          |          |                |        |        |        |        |                 |              |
|                                |     | 早  |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |          |          |                |        |        |        |        |                 |              |

| 処理法                        | 地域名 | 作期 | バ'エ | 一年<br>広葉<br>マハ'イ | ネ'ル'イ | ウ'リ'カ'リ | ミ'ヤ<br>ガ'リ | ヘ'ラ'オ<br>ダ'カ | クロ'グ<br>ワイ | オモ'グ<br>カ | ヒ'ル'ム<br>シ'ロ | 藻類<br>剥離 | シ'リ | 処理時期     | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意   |
|----------------------------|-----|----|-----|------------------|-------|---------|------------|--------------|------------|-----------|--------------|----------|-----|----------|----------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|--------------|
| VII-2<br>KUH-989D-1kg<br>粒 | 北海道 |    |     |                  |       |         |            |              |            |           |              |          |     |          | 100<br>g/a     |         |        |        |        |                 | (28)<br>(34) |
|                            | 東北  |    |     |                  |       |         |            |              |            |           |              |          |     |          |                |         |        |        |        |                 |              |
|                            | 北陸  |    | ○3  | ○                | ○2    | ○2      | ○2         | ○始           |            |           |              |          | ○前  | +5~ノ'エ3L |                |         | ○      | ○      | ○      | 1.5             |              |
|                            | 関東海 | 早  | ●3  | ●                | ●2    | ●2      | ●2         |              |            |           | ●発生          |          | ●   |          |                |         |        | ●      | ●      | 1               |              |
|                            | 普   | ○3 | ○   | ○2               | ○2    | ○2      |            |              |            |           | ○期           | ○前       | ○再生 |          |                |         | ○      | ○      | ○      | 2               |              |
|                            | 近畿中 | 早  |     |                  |       |         |            |              |            |           |              | ○発生      |     |          |                |         |        |        |        |                 |              |
|                            | 普   | ○3 | ○   | ○2               | ○2    | ○2      |            |              |            |           | ○期           |          | ○始  |          |                |         | ○      | ○      | ○      | 1.5             |              |
|                            | 四国  | 早  |     |                  |       |         |            |              |            |           |              | ○発生      |     |          |                |         |        |        |        |                 |              |
|                            | 普   | ○3 | ○   | ○2               | ○2    | ○2      |            |              |            |           | ○期           |          | ○再生 |          |                |         | ○      | ○      | ○      |                 |              |
|                            | 九州  | 早  | ●3  | ●                | ●2    | ●2      | ●2         |              |            |           | ●発生          | ●前       | ○再生 |          |                |         | ●      | ●      | ●      |                 |              |
|                            | 普   | ○3 | ○   | ○2               | ○2    | ○2      |            |              |            |           | ○期           | ○前       | ○始  |          |                |         | ○      | ○      | ○      | 1               |              |

| 処理法                        | 地域名 | 作期 | バ'エ | 一年<br>広葉<br>マハ'イ | ネ'ル'イ | ウ'リ'カ'リ | ミ'ヤ<br>ガ'リ | ヘ'ラ'オ<br>ダ'カ | クロ'グ<br>ワイ | オモ'グ<br>カ | ヒ'ル'ム<br>シ'ロ | 藻類<br>剥離 | シ'リ | 処理時期          | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意 |
|----------------------------|-----|----|-----|------------------|-------|---------|------------|--------------|------------|-----------|--------------|----------|-----|---------------|----------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|------------|
| VII-2<br>KUH-989K-1kg<br>粒 | 北海道 |    | ○3  | ○                | ○2    | ○2      |            | ●始           |            |           | ○発生          | ○前       | ○再生 | +5~ノ'エ3L      | 100<br>g/a     |         | ○1.5   | ○      | ○      | ○2              | (48)       |
|                            | 東北  |    | ○3  | ○                | ○2    | ○2      | ○2         |              |            |           | ○期           |          | ○前  |               |                | ●       | ●      | ○      | ○      | 1.5             |            |
|                            | 北陸  |    |     |                  |       |         |            |              |            |           |              |          | ○始  | 湛水周縁部<br>散布可能 |                |         |        |        |        |                 |            |
|                            | 関東海 | 早  |     |                  |       |         |            |              |            |           |              |          |     |               |                |         |        |        |        |                 |            |
|                            | 普   |    |     |                  |       |         |            |              |            |           |              |          |     |               |                |         |        |        |        |                 |            |
|                            | 近畿中 | 早  |     |                  |       |         |            |              |            |           |              |          |     |               |                |         |        |        |        |                 |            |
|                            | 普   |    |     |                  |       |         |            |              |            |           |              |          |     |               |                |         |        |        |        |                 |            |
|                            | 四国  | 早  |     |                  |       |         |            |              |            |           |              |          |     |               |                |         |        |        |        |                 |            |
|                            | 普   |    |     |                  |       |         |            |              |            |           |              |          |     |               |                |         |        |        |        |                 |            |
|                            | 九州  | 早  |     |                  |       |         |            |              |            |           |              |          |     |               |                |         |        |        |        |                 |            |
|                            | 普   |    |     |                  |       |         |            |              |            |           |              |          |     |               |                |         |        |        |        |                 |            |

| 処理法                             | 地域名 | 作期   | バ'エ  | 一年<br>広葉<br>マハ'イ | ネ'ル'イ | ウ'リ'カ'リ | ミ'ヤ<br>ガ'リ | ヘ'ラ'オ<br>ダ'カ | クロ'グ<br>ワイ | オモ'グ<br>カ | ヒ'ル'ム<br>シ'ロ | 藻類<br>剥離 | シ'リ | 処理時期       | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                   |
|---------------------------------|-----|------|------|------------------|-------|---------|------------|--------------|------------|-----------|--------------|----------|-----|------------|----------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|------------------------------|
| VII-2<br>MK-243D-1kg<br>7077' 粒 | 北海道 |      |      |                  |       |         |            |              |            |           |              |          | 再生  |            | 50<br>ml/a     |         |        |        |        |                 | (34)<br>(38)<br>(41)<br>(42) |
|                                 | 東北  |      |      |                  |       |         |            |              |            |           |              |          | ○再生 |            |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                                 | 北陸  |      | ○2.5 | ○                | ○2    | ○2      | ○2         |              |            | ○始        |              |          | ○始  | +5~ノ'エ2.5L |                | ●       | ○      | ○      | ○      | 2               |                              |
|                                 | 関東海 | 早    | ○2.5 | ○                | ○2    | ○2      | ○2         |              |            |           | ○発生          | ○前       | ○   |            |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 1               |                              |
|                                 | 普   | ○2.5 | ○    | ○2               | ○2    | ○2      |            |              | ○始         |           | ○期           | ○前       | ○再生 |            |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 2               |                              |
|                                 | 近畿中 | 早    | ○2.5 | ○                | ○2    | ○始      | ○始         |              |            |           | ○発生          | ○前       | ○   |            |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 1.5             |                              |
|                                 | 普   | ○2.5 | ○    | ○2               | ○2    | ○2      |            |              |            | ○始        | ○期           | ●前       | ○   |            |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 2               |                              |
|                                 | 四国  | 早    | ○2.5 | ○                | ○2    | ○始      | ○始         |              |            |           | ○発生          | ○前       | ○   |            |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 1.5             |                              |
|                                 | 普   | ○2.5 | ○    | ○2               | ○2    | ○2      |            |              | ○始         | ○期        | ●前           | ○        | ○再生 |            |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 2               |                              |
|                                 | 九州  | 早    | ○2.5 | ○                | ○2    | ○2      | ○2         |              |            |           | ○発生          | ○前       | ○   |            |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 1.5             |                              |
|                                 | 普   | ○2.5 | ○    | ○2               | ○2    | ○2      |            |              | ○始         | ○期        | ○前           | ○        | ○始  |            |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 2               |                              |

クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することにより、さらに効果が向上する。(関東・東海、九州)  
オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することにより、さらに効果が向上する。(北陸、近畿・中国、四国)

| 処理法                       | 地域名 | 作期   | バ'エ  | 一年<br>広葉<br>マハ'イ | ネ'ル'イ | ウ'リ'カ'リ | ミ'ヤ<br>ガ'リ | ヘ'ラ'オ<br>ダ'カ | クロ'グ<br>ワイ | オモ'グ<br>カ | ヒ'ル'ム<br>シ'ロ | 藻類<br>剥離 | シ'リ | 処理時期       | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意   |
|---------------------------|-----|------|------|------------------|-------|---------|------------|--------------|------------|-----------|--------------|----------|-----|------------|----------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|--------------|
| VII-2<br>MY-100D-1kg<br>粒 | 北海道 |      |      |                  |       |         |            |              |            |           |              |          | 再生  |            | 100<br>g/a     |         |        |        |        |                 | (28)<br>(34) |
|                           | 東北  |      |      |                  |       |         |            |              |            |           |              |          | ○再生 |            |                |         |        |        |        |                 |              |
|                           | 北陸  |      | ○2.5 | ○                | ○2    | ○2      | ○2         |              |            |           |              |          | ○始  | +5~ノ'エ2.5L |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 2               |              |
|                           | 関東海 | 早    | ○2.5 | ○                | ○2    | ○2      | ○2         |              |            |           | ○発生          | ○前       | ○   |            |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 1               |              |
|                           | 普   | ○2.5 | ○    | ○2               | ○2    | ○2      |            |              |            |           | ○期           | ○前       | ○再生 |            |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 2               |              |
|                           | 近畿中 | 早    | ○2.5 | ○                | ○2    | ○始      | ○始         |              |            |           | ○発生          | ○前       | ○   |            |                |         | ○      | ○      | ○      | 1.5             |              |
|                           | 普   | ○2.5 | ○    | ○2               | ○2    | ○2      |            |              |            |           | ○期           | ●前       | ○   |            |                | ○       | ○      | ○      |        |                 |              |
|                           | 四国  | 早    | ○2.5 | ○                | ○2    | ○始      | ○始         |              |            |           | ○発生          | ○前       | ○   |            |                | ○       | ○      | ○      |        |                 |              |
|                           | 普   | ○2.5 | ○    | ○2               | ○2    | ○2      |            |              |            |           | ○期           | ●前       | ○   | ○再生        |                | ○       | ○      | ○      |        |                 |              |
|                           | 九州  | 早    | ○2.5 | ○                | ○2    | ○2      | ○2         |              |            |           | ○発生          | ○前       | ○   |            |                | ○       | ○      | ○      |        |                 |              |
|                           | 普   | ○2.5 | ○    | ○2               | ○2    | ○2      |            |              |            |           | ○期           | ○        | ○始  |            |                | ○       | ○      | ○      |        |                 |              |

|                                                           | 処理法     | 地域名      | 作期     | ハ・エ  | 一年<br>広葉<br>マハ・イ | ホカノ | ウリカ | ミヤ<br>カ・リ | ヘラオ<br>タ・カ | クロ<br>グ・リ | オモ<br>タ・カ | ヒルム<br>シ・ロ | 藻類<br>剥離 | セリ      | 処理時期                                                 | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土<br>1.5 | 壤<br>土 | 壇<br>土 | 壇<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意 |
|-----------------------------------------------------------|---------|----------|--------|------|------------------|-----|-----|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|---------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|-----------------|------------|
| VII-2<br>MY-100DC<br>7077' Ⅱ<br>Ⅱ-6-(5)<br>Ⅱ-6-(6)<br>を併用 | 莖葉兼土壌処理 | 北海道      |        | ○2.5 | ○                | ○2  | ○始  |           | ○始         |           |           | ○発<br>生    | ○前       | ○再<br>生 | +0~1/2 12.5L<br>*エノノササカグサ<br>:2L<br>*シシイ<br>:発生始~3cm | 50<br>ml/a     | ○              | ○      | ○      | ○      | 2               | (40)       |
|                                                           |         | 東北       |        | ○2.5 | ○                | ○2  | ○始  | ○2        | ○始         |           |           | ○期         | ○前       | ○前<br>始 |                                                      |                |                | ○      | ○      | ○      |                 |            |
|                                                           |         | 北陸       |        |      |                  |     |     |           |            |           |           |            |          |         |                                                      |                |                | ○      | ○      | ○      |                 |            |
|                                                           |         | 関東<br>東海 | 早<br>普 |      |                  |     |     |           |            |           |           |            |          |         |                                                      |                |                |        |        |        |                 |            |
|                                                           |         | 近畿<br>中国 | 早<br>普 |      |                  |     |     |           |            |           |           |            |          |         |                                                      |                |                |        |        |        |                 |            |
|                                                           |         | 四国       | 早<br>普 |      |                  |     |     |           |            |           |           |            |          |         |                                                      |                |                |        |        |        |                 |            |
|                                                           |         | 九州       | 早<br>普 |      |                  |     |     |           |            |           |           |            |          |         |                                                      |                |                |        |        |        |                 |            |
|                                                           |         |          |        |      |                  |     |     |           |            |           |           |            |          |         |                                                      |                |                |        |        |        |                 |            |
|                                                           |         |          |        |      |                  |     |     |           |            |           |           |            |          |         |                                                      |                |                |        |        |        |                 |            |
|                                                           |         |          |        |      |                  |     |     |           |            |           |           |            |          |         |                                                      |                |                |        |        |        |                 |            |

|                                                   | 処理法     | 地域名      | 作期     | ハ・エ          | 一年<br>広葉<br>マハ・イ | ホカノ      | ウリカ      | ミヤ<br>カ・リ | ヘラオ<br>タ・カ | クロ<br>グ・リ | オモ<br>タ・カ | ヒルム<br>シ・ロ | 藻類<br>剥離 | セリ      | 処理時期         | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土<br>1.5 | 壤<br>土 | 壇<br>土 | 壇<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意           |
|---------------------------------------------------|---------|----------|--------|--------------|------------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|---------|--------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|-----------------|----------------------|
| VII-2<br>MY-100DC(L)<br>7077' Ⅱ<br>Ⅱ-6-(8)<br>を併用 | 莖葉兼土壌処理 | 北海道      |        |              |                  |          |          |           |            |           |           |            |          |         | +0~1/2 12.5L | 50<br>ml/a     |                |        |        |        |                 | (28)<br>(34)<br>(36) |
|                                                   |         | 東北       |        |              |                  |          |          |           |            |           |           |            |          |         |              |                |                |        |        |        |                 |                      |
|                                                   |         | 北陸       |        | ○2.5         | ○                | ○2       | ○2       | ○2        |            |           |           |            |          |         |              |                |                | ○      | ○      | ○      | 1.5             |                      |
|                                                   |         | 関東<br>東海 | 早<br>普 | ●2.5<br>○2.5 | ●<br>○           | ●2<br>○2 | ●2<br>○2 | ●2<br>○2  |            |           |           | ○発<br>生    | ○前       | ○再<br>生 |              |                | ●<br>●         | ●<br>● | ●<br>● | ●<br>● | 1<br>2          |                      |
|                                                   |         | 近畿<br>中国 | 早<br>普 | ○2.5<br>○2.5 | ○<br>○           | ○2<br>○2 | ○2<br>○2 | ○2<br>○2  |            |           |           | ○発<br>生    | ○期       | ○前<br>始 |              |                | ○<br>○         | ○<br>○ | ○<br>○ | ○<br>○ | 1.5<br>2        |                      |
|                                                   |         | 四国       | 早<br>普 | ○2.5<br>○2.5 | ○<br>○           | ○2<br>○2 | ○2<br>○2 | ○2<br>○2  |            |           |           | ○発<br>生    | ○期       | ○前<br>始 |              |                | ○<br>○         | ○<br>○ | ○<br>○ | ○<br>○ | 1.5<br>2        |                      |
|                                                   |         | 九州       | 早<br>普 | ○2.5<br>○2.5 | ○<br>○           | ○2<br>○2 | ○2<br>○2 | ○2<br>○2  | ○前         |           |           | ○発<br>生    | ○期       | ○前<br>始 |              |                | ○<br>○         | ○<br>○ | ○<br>○ | ○<br>○ | 1.5<br>2        |                      |
|                                                   |         |          |        |              |                  |          |          |           |            |           |           |            |          |         |              |                |                |        |        |        |                 |                      |
|                                                   |         |          |        |              |                  |          |          |           |            |           |           |            |          |         |              |                |                |        |        |        |                 |                      |
|                                                   |         |          |        |              |                  |          |          |           |            |           |           |            |          |         |              |                |                |        |        |        |                 |                      |

|                                                      | 処理法     | 地域名      | 作期     | ハ・エ          | 一年<br>広葉<br>マハ・イ | ホカノ      | ウリカ      | ミヤ<br>カ・リ | ヘラオ<br>タ・カ | クロ<br>グ・リ | オモ<br>タ・カ | ヒルム<br>シ・ロ | 藻類<br>剥離 | セリ      | 処理時期                                                                   | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土<br>1.5 | 壤<br>土 | 壇<br>土 | 壇<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                                      |
|------------------------------------------------------|---------|----------|--------|--------------|------------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|-----------------|-------------------------------------------------|
| VII-2<br>MY-100N<br>Ⅱ<br>H8まで<br>RYH-110 顆粒<br>水和で実施 | 莖葉兼土壌処理 | 北海道      |        | ○2.5         | ○                | ○2       | ○2       |           |            |           |           | ○発<br>生    | ○前       | ○再<br>生 | +0~1/2 12.5L<br>4g/a<br>(8g/a<br>25~50<br>ml/a)<br>但し北陸<br>は50<br>ml/a | 8g/a           | ○              | ○      | ○      | ○      | 2               | (28)<br>(34)<br>田植同時<br>散布可能<br>(北海道・東海<br>~四国) |
|                                                      |         | 東北       |        | ○2.5         | ○                | ○2       | ○2       | ○2        | ○始         |           |           | ○期         |          | ○前      |                                                                        |                | ○              | ○      | ○      | ○      |                 |                                                 |
|                                                      |         | 北陸       |        | ○2.5         | ○                | ○2       | ○2       | ○2        |            |           |           |            |          | ○始      |                                                                        |                | ○              | ○      | ○      | ○      | 1               |                                                 |
|                                                      |         | 関東<br>東海 | 早<br>普 | ○2.5<br>○2.5 | ○<br>○           | ○2<br>○2 | ○2<br>○2 | ○2<br>○2  |            |           |           | ○発<br>生    | ○期       | ○再<br>生 |                                                                        |                | ○<br>○         | ○<br>○ | ○<br>○ | ○<br>○ | 2               |                                                 |
|                                                      |         | 近畿<br>中国 | 早<br>普 | ○2.5<br>○2.5 | ○<br>○           | ○2<br>○2 | ○2<br>○2 | ○2<br>○2  |            |           |           | ○発<br>生    | ○期       | ○前<br>始 |                                                                        |                | ○<br>○         | ○<br>○ | ○<br>○ | ○<br>○ |                 |                                                 |
|                                                      |         | 四国       | 早<br>普 | ○2.5<br>○2.5 | ○<br>○           | ○2<br>○2 | ○2<br>○2 | ○2<br>○2  |            |           |           | ○発<br>生    | ○期       | ○前<br>始 |                                                                        |                | ○<br>○         | ○<br>○ | ○<br>○ | ○<br>○ |                 |                                                 |
|                                                      |         | 九州       | 早<br>普 | ○2.5<br>○2.5 | ○<br>○           | ○2<br>○2 | ○2<br>○2 | ○2<br>○2  |            |           |           | ○発<br>生    | ○期       | ○前<br>始 |                                                                        |                | ○<br>○         | ○<br>○ | ○<br>○ | ○<br>○ | 1.5<br>2        |                                                 |
|                                                      |         |          |        |              |                  |          |          |           |            |           |           |            |          |         |                                                                        |                |                |        |        |        |                 |                                                 |
|                                                      |         |          |        |              |                  |          |          |           |            |           |           |            |          |         |                                                                        |                |                |        |        |        |                 |                                                 |
|                                                      |         |          |        |              |                  |          |          |           |            |           |           |            |          |         |                                                                        |                |                |        |        |        |                 |                                                 |

|                           | 処理法     | 地域名      | 作期     | ハ・エ          | 一年<br>広葉<br>マハ・イ | ホカノ      | ウリカ      | ミヤ<br>カ・リ | ヘラオ<br>タ・カ | クロ<br>グ・リ | オモ<br>タ・カ | ヒルム<br>シ・ロ | 藻類<br>剥離 | セリ      | 処理時期                                         | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土<br>1.5 | 壤<br>土 | 壇<br>土 | 壇<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意   |
|---------------------------|---------|----------|--------|--------------|------------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|---------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|-----------------|--------------|
| VII-2<br>MY-100NC<br>顆粒水和 | 莖葉兼土壌処理 | 北海道      |        | ●2.5         | ●                | ●2       | ●2       | ●2        | ●始         |           |           | ●発<br>生    | ●前       | ●再<br>生 | +5~1/2 12.5L<br>8g/a<br>(8g/a<br>50<br>ml/a) | 8g/a           |                | ●      | ●      | ●      | 2               | (28)<br>(34) |
|                           |         | 東北       |        | ●2.5         | ●                | ●2       | ●2       | ●2        | ●始         |           |           | ●発<br>生    | ●前       | ●再<br>生 |                                              |                |                | ●      | ●      | ●      | 1               |              |
|                           |         | 北陸       |        |              |                  |          |          |           |            |           |           |            |          | 始       |                                              |                |                |        |        |        |                 |              |
|                           |         | 関東<br>東海 | 早<br>普 | ●2.5<br>●2.5 | ●<br>●           | ●2<br>●2 | ●2<br>●2 | ●2<br>●2  |            |           |           | ●発<br>生    | ●前       | ●再<br>生 |                                              |                |                | ●      | ●      | ●      | 1<br>1.5        |              |
|                           |         | 近畿<br>中国 | 早<br>普 | ●2.5<br>●2.5 | ●<br>●           | ●2<br>●2 | ●2<br>●2 | ●2<br>●2  |            |           |           | ●発<br>生    | ●前       | ●再<br>生 |                                              |                |                |        |        |        |                 |              |
|                           |         | 四国       | 早<br>普 | ●2.5<br>●2.5 | ●<br>●           | ●2<br>●2 | ●2<br>●2 | ●2<br>●2  |            |           |           | ●発<br>生    | ●前       | ●再<br>生 |                                              |                |                | ●      | ●      | ●      |                 |              |
|                           |         | 九州       | 早<br>普 | ●2.5<br>●2.5 | ●<br>●           | ●2<br>●2 | ●2<br>●2 | ●2<br>●2  |            |           |           | ●発<br>生    | ●期       | ●再<br>生 |                                              |                | ●1             | ●      | ●      | ●      | 1.5             |              |
|                           |         |          |        |              |                  |          |          |           |            |           |           |            |          |         |                                              |                |                |        |        |        |                 |              |
|                           |         |          |        |              |                  |          |          |           |            |           |           |            |          |         |                                              |                |                |        |        |        |                 |              |
|                           |         |          |        |              |                  |          |          |           |            |           |           |            |          |         |                                              |                |                |        |        |        |                 |              |

| 処理法                        | 地域名         | 作期       | ハ・エ    | 一年<br>広葉<br>マハイ | ネグイ | クワ<br>カ | ミヤ<br>ガ | ヘラ<br>モ<br>ダ | クロ<br>グ<br>ワ | オモ<br>ダ | ヒル<br>ム<br>シ | 藻<br>類<br>剥<br>離 | セリ         | 処理時期         | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土 | 壊<br>土 | 埋<br>土 | 埋<br>土 | 減水<br>cm/d | 使用上の<br>注意 |
|----------------------------|-------------|----------|--------|-----------------|-----|---------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|------------------|------------|--------------|----------------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|
| VII-2<br>MY-100NC-1kg<br>粒 | 千葉県<br>土壌処理 | 北海道      | ●2.5   | ●               | ●2  | ●始      |         | ●始           |              |         | ●発生<br>期     | ●前               | ●再生<br>前～始 | +5～/ビ' 12.5L | 100<br>g/a     | ●1.5   | ●      | ●      | ●      | 2          |            |
|                            |             | 東北       | ●2.5   | ●               | ●2  | ●2      | ●2      | ●始           |              |         | ●発生<br>期     | ●前               | ●再生<br>前～始 |              |                |        |        |        |        |            |            |
|                            |             | 北陸       |        |                 |     |         |         |              |              |         |              |                  |            |              |                |        |        |        |        |            |            |
|                            |             | 関東<br>東海 | 早<br>普 | ●2.5            | ●   | ●2      | ●2      | ●2           |              |         | ●発生<br>期     | ●前               | ●再生<br>前～始 |              |                |        |        |        |        |            |            |
|                            |             | 近畿<br>中国 | 早<br>普 | ●2.5            | ●   | ●2      | ●2      | ●2           |              |         | ●発生<br>期     | ●前               | ●再生<br>前～始 |              |                |        |        |        |        |            |            |
|                            |             | 四国       | 早<br>普 | ●2.5            | ●   | ●2      | ●2      | ●2           |              |         | ●発生<br>期     | ●前               | ●再生<br>前～始 |              |                |        |        |        |        |            |            |
|                            |             | 九州       | 早<br>普 |                 |     |         |         |              |              |         | ●発生<br>期     | ●前               | ●再生<br>前～始 |              |                |        |        |        |        |            |            |
|                            |             |          |        |                 |     |         |         |              |              |         |              |                  |            |              |                |        |        |        |        |            |            |
|                            |             |          |        |                 |     |         |         |              |              |         |              |                  |            |              |                |        |        |        |        |            |            |
|                            |             |          |        |                 |     |         |         |              |              |         |              |                  |            |              |                |        |        |        |        |            |            |

| 処理法                          | 地域名         | 作期       | ハ・エ    | 一年<br>広葉<br>マハイ | ネグイ | クワ<br>カ | ミヤ<br>ガ | ヘラ<br>モ<br>ダ | クロ<br>グ<br>ワ | オモ<br>ダ | ヒル<br>ム<br>シ | 藻<br>類<br>剥<br>離 | セリ         | 処理時期       | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土 | 壊<br>土 | 埋<br>土 | 埋<br>土 | 減水<br>cm/d | 使用上の<br>注意   |
|------------------------------|-------------|----------|--------|-----------------|-----|---------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|------------------|------------|------------|----------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------------|
| VII-2<br>MY-100NDC<br>-1kg 粒 | 千葉県<br>土壌処理 | 北海道      | ●3     | ●               | ●2  | ●2      |         | ●2           |              |         | ●発生<br>期     | ●前               | ●再生<br>前～始 | +5～/ビ' 13L | 100<br>g/a     |        | ●      | ●      | ●      | 2          | (28)<br>(34) |
|                              |             | 東北       | ●3     | ●               | ●2  | ●2      | ●2      | ●2           |              |         | ●発生<br>期     | ●前               | ●再生<br>前～始 |            |                |        |        |        |        |            |              |
|                              |             | 北陸       | ●3     | ●               | ●2  | ●2      | ●2      |              |              |         | ●発生<br>期     | ●前               | ●再生<br>前～始 |            |                |        |        |        |        |            |              |
|                              |             | 関東<br>東海 | 早<br>普 | ●3              | ●   | ●2      | ●2      | ●2           |              |         | ●発生<br>期     | ●前               | ●再生<br>前～始 |            |                |        |        |        |        |            |              |
|                              |             | 近畿<br>中国 | 早<br>普 | ●3              | ●   | ●2      | ●2      | ●2           |              |         | ●発生<br>期     | ●前               | ●再生<br>前～始 |            |                |        |        |        |        |            |              |
|                              |             | 四国       | 早<br>普 | ●3              | ●   | ●2      | ●2      | ●2           |              |         | ●発生<br>期     | ●前               | ●再生<br>前～始 |            |                |        |        |        |        |            |              |
|                              |             | 九州       | 早<br>普 | ●3              | ●   | ●2      | ●2      | ●2           |              |         | ●発生<br>期     | ●前               | ●再生<br>前～始 |            |                |        |        |        |        |            |              |
|                              |             |          |        |                 |     |         |         |              |              |         |              |                  |            |            |                |        |        |        |        |            |              |
|                              |             |          |        |                 |     |         |         |              |              |         |              |                  |            |            |                |        |        |        |        |            |              |
|                              |             |          |        |                 |     |         |         |              |              |         |              |                  |            |            |                |        |        |        |        |            |              |

| 処理法                                                                                         | 地域名         | 作期       | ハ・エ    | 一年<br>広葉<br>マハイ | ネグイ | クワ<br>カ | ミヤ<br>ガ | ヘラ<br>モ<br>ダ | クロ<br>グ<br>ワ | オモ<br>ダ | ヒル<br>ム<br>シ | 藻<br>類<br>剥<br>離 | セリ         | 処理時期                               | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土 | 壊<br>土 | 埋<br>土 | 埋<br>土 | 減水<br>cm/d | 使用上の<br>注意                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------|-----------------|-----|---------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|------------------|------------|------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------------------------------------|
| VII-2<br>MY-100TS<br>7077 #<br>H8 まで<br>RYH-10377077<br>#で実施<br>II-6-(1)<br>II-6-(2)<br>を併用 | 千葉県<br>土壌処理 | 北海道      | ○2.5   | ○               | ○2  | ○2      |         | ○2           |              |         | ○発生<br>期     | ○前               | ○再生<br>前～始 | +0～/ビ' 12.5L<br>※ス'イ<br>:発生後～6月3cm | 50<br>ml/a     | ○1.5   | ○      | ○      | ○      | 2          | (28)<br>(34)<br>(38)<br>(40)<br>(42) |
|                                                                                             |             | 東北       | ○2.5   | ○               | ○2  | ○2      | ○2      | ○2           | ●前           | ●始      | ○発生<br>期     | ○前               | ○再生<br>前～始 |                                    |                |        |        |        |        |            |                                      |
|                                                                                             |             | 北陸       | ○2.5   | ○               | ○2  | ○2      | ○2      | ○2           |              |         | ○発生<br>期     | ○前               | ○再生<br>前～始 |                                    |                |        |        |        |        |            |                                      |
|                                                                                             |             | 関東<br>東海 | 早<br>普 | ○2.5            | ○   | ○2      | ○2      | ○2           |              | ●始      | ○発生<br>期     | ○前               | ○再生<br>前～始 |                                    |                |        |        |        |        |            |                                      |
|                                                                                             |             | 近畿<br>中国 | 早<br>普 | ○2.5            | ○   | ○2      | ○2      | ○2           |              |         | ○発生<br>期     | ○前               | ○再生<br>前～始 |                                    |                |        |        |        |        |            |                                      |
|                                                                                             |             | 四国       | 早<br>普 | ○2.5            | ○   | ○2      | ○2      | ○2           |              |         | ○発生<br>期     | ○前               | ○再生<br>前～始 |                                    |                |        |        |        |        |            |                                      |
|                                                                                             |             | 九州       | 早<br>普 | ○2.5            | ○   | ○2      | ○2      | ○2           |              |         | ○発生<br>期     | ○前               | ○再生<br>前～始 |                                    |                |        |        |        |        |            |                                      |
|                                                                                             |             |          |        |                 |     |         |         |              |              |         |              |                  |            |                                    |                |        |        |        |        |            |                                      |
|                                                                                             |             |          |        |                 |     |         |         |              |              |         |              |                  |            |                                    |                |        |        |        |        |            |                                      |
|                                                                                             |             |          |        |                 |     |         |         |              |              |         |              |                  |            |                                    |                |        |        |        |        |            |                                      |

クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(東北、関東・東海)

オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(東北、関東・東海)

| 処理法                        | 地域名         | 作期       | ハ・エ    | 一年<br>広葉<br>マハイ | ネグイ | クワ<br>カ | ミヤ<br>ガ | ヘラ<br>モ<br>ダ | クロ<br>グ<br>ワ | オモ<br>ダ | ヒル<br>ム<br>シ | 藻<br>類<br>剥<br>離 | セリ         | 処理時期       | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土 | 壊<br>土 | 埋<br>土 | 埋<br>土 | 減水<br>cm/d | 使用上の<br>注意   |
|----------------------------|-------------|----------|--------|-----------------|-----|---------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|------------------|------------|------------|----------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------------|
| VII-2<br>NBA-942b-1kg<br>粒 | 千葉県<br>土壌処理 | 北海道      |        |                 |     |         |         |              |              |         |              |                  |            | +5～/ビ' 13L | 100<br>g/a     | ○      | ○      | ○      | ○      | 2          | (28)<br>(34) |
|                            |             | 東北       |        |                 |     |         |         |              |              |         |              |                  |            |            |                |        |        |        |        |            |              |
|                            |             | 北陸       | ○3     | ○               | ○2  | ○2      | ○2      | ○2           |              |         |              | ○前               |            |            |                |        |        |        |        |            |              |
|                            |             | 関東<br>東海 | 早<br>普 | ○3              | ○   | ○2      | ○2      | ○2           |              |         | ○発生<br>期     | ○前               | ○再生<br>前～始 |            |                |        |        |        |        |            |              |
|                            |             | 近畿<br>中国 | 早<br>普 | ○3              | ○   | ○2      | ○2      | ○2           |              |         | ○発生<br>期     | ○前               | ○再生<br>前～始 |            |                |        |        |        |        |            |              |
|                            |             | 四国       | 早<br>普 | ○3              | ○   | ○2      | ○2      | ○2           |              |         | ○発生<br>期     | ○前               | ○再生<br>前～始 |            |                |        |        |        |        |            |              |
|                            |             | 九州       | 早<br>普 | ○3              | ○   | ○2      | ○2      | ○2           |              |         | ○発生<br>期     | ○前               | ○再生<br>前～始 |            |                |        |        |        |        |            |              |
|                            |             |          |        |                 |     |         |         |              |              |         |              |                  |            |            |                |        |        |        |        |            |              |
|                            |             |          |        |                 |     |         |         |              |              |         |              |                  |            |            |                |        |        |        |        |            |              |
|                            |             |          |        |                 |     |         |         |              |              |         |              |                  |            |            |                |        |        |        |        |            |              |

|                         | 処理法    | 地域名 | 作期 | ハ' E | 広葉マハ'イ | ホ'ルイ | ウ'リカ | ミ'ガヤ | ヘ'オモタ'カ | クロ'ウイ | オモ'カ | ヒ'ルムシ | 藻類剥離 | セリ  | 処理時期                                                         | 使用量・製品                                        | 砂土   | 壤土 | 埴土 | 埴土 | 減水深cm/d | 使用上の注意                                                  |
|-------------------------|--------|-----|----|------|--------|------|------|------|---------|-------|------|-------|------|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----|----|----|---------|---------------------------------------------------------|
| VII-2<br>NC-339<br>顆粒水和 | 莖葉兼根処理 | 北海道 |    | ○2.5 | ○      | ○2   | ○2   |      | ○2      |       | ○前   | ○発生   | ○前   | ○再生 | +5~ハ' E2.5L<br>※エ'ノ'ヤ'ス'カ'ガ'ヤ<br>:2L<br>※シ'ス'イ<br>:発生始~長さ3cm | 4g/a<br>(※減速<br>25~50<br>ml/a<br>は50<br>ml/a) | ○5   | ○  | ○  | ○  | 2       | (28)<br>(34)<br>(38)<br>(40)<br>※砂埴土は<br>ハ' E2L<br>(北陸) |
|                         |        | 東北  |    | ○2.5 | ○      | ○2   | ○2   | ○2   | ○2      |       | ○前   | ○発生   | ○前   | ○再生 |                                                              |                                               | ○1.5 | ○  | ○  | ○  |         |                                                         |
|                         |        | 北陸  |    | ○2.5 | ○      | ○2   | ○2   | ○2   | ○2      |       |      |       | ●前   | ○始  |                                                              |                                               | ○5   | ○  | ○  | ○  |         |                                                         |
|                         |        | 関東  | 早  | ○2.5 | ○      | ○2   | ○2   | ○2   |         |       |      | ○発生   | ○前   | ○再生 |                                                              |                                               | ○1   | ○  | ○  | ○  |         |                                                         |
|                         |        | 東海  | 普  | ○2.5 | ○      | ○2   | ○2   | ○2   |         |       |      | ○発生   | ○前   | ○再生 |                                                              |                                               | ○    | ○  | ○  | ○  |         |                                                         |
|                         |        | 近畿  | 早  | ○2.5 | ○      | ○2   | ○2   | ○2   |         |       |      | ○発生   | ○前   | ○再生 |                                                              |                                               | ○    | ○  | ○  | ○  | 1       |                                                         |
|                         |        | 中国  | 普  | ○2.5 | ○      | ○2   | ○2   | ○2   |         |       |      | ○発生   | ○前   | ○再生 |                                                              |                                               | ○    | ○  | ○  | ○  | 2       |                                                         |
|                         |        | 四国  | 早  | ○2.5 | ○      | ○2   | ○2   | ○2   |         |       |      | ○発生   | ○前   | ○再生 |                                                              |                                               | ○    | ○  | ○  | ○  | 1       |                                                         |
|                         |        |     | 普  | ○2.5 | ○      | ○2   | ○2   | ○2   |         |       |      | ○発生   | ○前   | ○再生 |                                                              |                                               | ○    | ○  | ○  | ○  | 2       |                                                         |
|                         |        | 九州  | 早  | ○2.5 | ○      | ○2   | ○2   | ○2   |         |       |      | ○発生   | ○前   | ○再生 |                                                              |                                               | ○    | ○  | ○  | ○  | 1       |                                                         |
|                         |        |     | 普  | ○2.5 | ○      | ○2   | ○2   | ○2   |         |       |      | ○発生   | ○前   | ○再生 |                                                              |                                               | ○    | ○  | ○  | ○  | 1.5     |                                                         |

|                                             | 処理法        | 地域名 | 作期 | ハ' E | 一年<br>広葉<br>マハ'イ | ホ'ルイ | ウ'リカ | ミ'ガ<br>ヤ | ヘ'オモ<br>タ'カ | クロ'ウイ | オモ'カ | ヒ'ルム<br>シ | 藻類<br>剥離 | セリ  | 処理時期                            | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意           |     |     |
|---------------------------------------------|------------|-----|----|------|------------------|------|------|----------|-------------|-------|------|-----------|----------|-----|---------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|----------------------|-----|-----|
| VII-2<br>NC-339-1kg<br>粒<br>II-6-(5)<br>を併用 | 莖葉茶<br>堆処理 | 北海道 |    | ○2.5 | ○                | ○2   | ○2   |          | ○2          |       |      | ○発生       | ○前       | ○再生 | +5~ハ' E2.5L<br>※ス'イ<br>:発生始~3cm | 100<br>g/a     |        | ○      | ○      | ○      | 2               | (28)<br>(34)<br>(40) |     |     |
|                                             |            | 東北  |    | ○2.5 | ○                | ○2   | ○2   | ○2       |             |       |      | ○発生       | ○前       | ○前  |                                 |                |        |        | ○      | ○      | ○               |                      | 1.5 |     |
|                                             |            | 北陸  |    | ○2.5 | ○                | ○2   | ○2   | ○2       |             |       |      |           |          |     |                                 |                | 始      |        | ○      | ○      | ○               |                      | 2   |     |
|                                             |            | 関東  | 早  | ○2.5 | ○                | ○2   | ○2   | ○2       | ○2          |       |      |           | ○発生      | ○前  |                                 |                | ○再生    |        | ●1     | ○      | ○               |                      | ○   |     |
|                                             |            | 東海  | 普  | ○2.5 | ○                | ○2   | ○2   | ○2       | ○2          |       |      |           | ○発生      | ○前  |                                 |                | ○再生    |        | ○      | ○      | ○               |                      | ○   |     |
|                                             |            | 近畿  | 早  | ○2.5 | ○                | ○2   | ○2   | ○2       | ○2          |       |      |           | ○発生      | ○前  |                                 |                | ○再生    |        |        | ○      | ○               |                      | ○   | 1.5 |
|                                             |            | 中国  | 普  | ○2.5 | ○                | ○2   | ○2   | ○2       | ○2          |       |      |           | ○発生      | ○前  |                                 |                | ○再生    |        | ○      | ○      | ○               |                      | ○   | 2   |
|                                             |            | 四国  | 早  | ○2.5 | ○                | ○2   | ○2   | ○2       | ○2          |       |      |           | ○発生      | ○前  |                                 |                | ○再生    |        |        | ○      | ○               |                      | ○   | 1.5 |
|                                             |            |     | 普  | ○2.5 | ○                | ○2   | ○2   | ○2       | ○2          |       |      |           | ○発生      | ○前  |                                 |                | ○再生    |        |        | ○      | ○               |                      | ○   | 2   |
|                                             |            | 九州  | 早  | ○2.5 | ○                | ○2   | ○2   | ○2       | ○2          |       |      |           | ○発生      | ○前  |                                 |                | ○再生    |        |        | ○      | ○               |                      | ○   | 1.5 |
|                                             |            |     | 普  | ○2.5 | ○                | ○2   | ○2   | ○2       | ○2          |       |      |           | ○発生      | ○前  |                                 |                | ○再生    |        |        | ○      | ●               |                      | ○   | ○   |

|                         | 処理法     | 地域名 | 作期 | ハ' E | 一年<br>広葉<br>マハ'イ | ホ'ルイ | ウ'リカ | ミ'ガ<br>ヤ | ヘ'オモ<br>タ'カ | クロ'ウイ | オモ'カ | ヒ'ルム<br>シ | 藻類<br>剥離 | セリ  | 処理時期                                 | 使用<br>量・<br>製品                 | 砂<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意   |
|-------------------------|---------|-----|----|------|------------------|------|------|----------|-------------|-------|------|-----------|----------|-----|--------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|--------------|
| VII-2<br>NC-385<br>顆粒水和 | 葉菜系土壌処理 | 北海道 |    | ○2.5 | ○                | ○2   | ○2   |          | ●2          |       |      | ○発生       | ○前       | ○再生 | +5~ハ' E2.5L<br>※減速<br>25~50<br>ml/a) | 6g/a<br>(※減速<br>25~50<br>ml/a) | ○1.5   | ○      | ○      | ○      | 2               | (28)<br>(34) |
|                         |         | 東北  |    | ○2.5 | ○                | ○2   | ○2   | ○2       | ○2          |       |      | ○発生       | ○前       | ○再生 |                                      |                                | ●      | ●      | ○      | ○      | 1.5             |              |
|                         |         | 北陸  |    | ○2.5 | ○                | ○2   | ○2   | ○2       | ○始          |       |      | ●         |          | ●始  |                                      |                                |        | ○      | ○      | ○      |                 |              |
|                         |         | 関東  | 早  | ●2.5 | ●                | ●2   | ●2   | ●2       |             |       |      | ●発生       | ●前       | ●再生 |                                      |                                | ●      | ●      | ●      | ●      | 1               |              |
|                         |         | 東海  | 普  | ○2.5 | ○                | ○2   | ○2   | ○2       |             |       |      | ○発生       | ○前       | ○再生 |                                      |                                | ●      | ●      | ○      | ○      | 2               |              |
|                         |         | 近畿  | 早  | ●2.5 | ●                | ●2   | ●2   | ●2       |             |       |      | ●発生       | ●前       | ●再生 |                                      |                                | ●      | ●      | ●      | ●      | 1.5             |              |
|                         |         | 中国  | 普  | ○2.5 | ○                | ○2   | ○2   | ○2       |             |       |      | ○発生       | ○前       | ○再生 |                                      |                                | ●      | ○      | ○      | ○      | 2               |              |
|                         |         | 四国  | 早  | ●2.5 | ●                | ●2   | ●2   | ●2       |             |       |      | ●発生       | ●前       | ●再生 |                                      |                                |        | ●      | ●      | ●      | 1.5             |              |
|                         |         |     | 普  | ○2.5 | ○                | ○2   | ○2   | ○2       |             |       |      | ○発生       | ○前       | ○再生 |                                      |                                | ●      | ○      | ○      | ○      | 2               |              |
|                         |         | 九州  | 早  | ●2.5 | ●                | ●2   | ●2   | ●2       |             |       |      | ●発生       | ●前       | ●再生 |                                      |                                | ●      | ●      | ●      | ●      | 1.5             |              |
|                         |         |     | 普  | ○2.5 | ○                | ○2   | ○2   | ○2       |             |       |      | ○発生       | ○前       | ○再生 |                                      |                                |        | ○      | ○      | ○      | 1               |              |
|                         |         |     |    |      |                  |      |      |          |             |       |      |           |          |     |                                      |                                |        |        |        |        |                 |              |

|                           | 処理法        | 地域名 | 作期 | ハ' E | 一年<br>広葉<br>マハ'イ | ホ'ルイ | ウ'リカ | ミ'ガ<br>ヤ | ヘ'オモ<br>タ'カ | クロ'ウイ | オモ'カ | ヒ'ルム<br>シ | 藻類<br>剥離 | セリ  | 処理時期      | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土         | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意   |   |     |   |
|---------------------------|------------|-----|----|------|------------------|------|------|----------|-------------|-------|------|-----------|----------|-----|-----------|----------------|----------------|--------|--------|--------|-----------------|--------------|---|-----|---|
| VII-2<br>NC-390<br>707g/g | 喜葉菜<br>堆処理 | 北海道 |    | ○3   | ○                | ○2   | ○2   |          |             |       |      | ○発生       | ○前       | ○再生 | +5~ハ' E3L | 50<br>ml/a     | ● <sup>5</sup> | ○      | ○      | ○      | 2               | (34)<br>(41) |   |     |   |
|                           |            | 東北  |    | ○3   | ○                | ○2   | ○2   | ○2       |             |       |      | ○期        | ●前       | ○前  |           |                |                | ●      | ●      | ○      | ○               |              |   |     |   |
|                           |            | 北陸  |    | ○3   | ○                | ○2   | ○2   | ○2       |             |       |      |           | ●前       | ●始  |           |                |                |        |        | ○      | ○               |              | 1 |     |   |
|                           |            | 関東  | 早  |      |                  |      |      |          |             |       |      |           | 発生期      |     |           |                | 再生前            |        |        |        |                 |              |   |     |   |
|                           |            | 東海  | 普  | ○3   | ○                | ○2   | ○2   | ○2       |             |       |      |           | ○期       | ○前  |           |                | ○再生            |        |        |        | ○               |              | ○ |     |   |
|                           |            | 近畿  | 早  | ●3   | ●                | ●2   | ●2   | ●2       |             |       |      |           | ●発生      | ●前  |           |                | ●再生            |        |        | ●      | ●               |              | ● | 1.5 |   |
|                           |            | 中国  | 普  | ○3   | ○                | ○2   | ○2   | ○2       |             |       |      |           | ○期       | ○前  |           |                | ○始             |        | ●      | ○      | ○               |              | ○ | 2   |   |
|                           |            | 四国  | 早  | ●3   | ●                | ●2   | ●2   | ●2       |             |       |      |           | ●発生      | ●前  |           |                | ●再生            |        |        | ●      | ●               |              | ● | 1.5 |   |
|                           |            |     | 普  | ○3   | ○                | ○2   | ○2   | ○2       |             |       |      |           | ○期       | ○前  |           |                | ○再生            |        | ●      | ○      | ○               |              | ○ | 2   |   |
|                           |            | 九州  | 早  |      |                  |      |      |          |             |       |      |           |          |     |           |                | ○再生            |        |        |        |                 |              |   |     | 2 |
|                           |            |     | 普  | ○3   | ○                | ○2   | ●2   | ○2       |             |       |      |           |          | ○前  |           |                | ○始             |        |        |        | ○               |              | ○ | ○   |   |

|                         | 処理法         | 地域名 | 作期   | ヒ・エ | 一年<br>広葉マハ | ホハ | ウリカ | ミヤ<br>ガリ | ヘラ<br>オモ<br>ダ | クロ<br>ガリ | オモ<br>ダ | ヒル<br>ム  | 葉類<br>莖  | 留<br>離   | セリ       |          | 処理時期      | 使用<br>量・製品                      | 砂<br>土       | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意   |     |
|-------------------------|-------------|-----|------|-----|------------|----|-----|----------|---------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------------------------|--------------|--------|--------|--------|----------------|--------------|-----|
| VII-2<br>NC-395<br>顆粒水和 | 芽葉兼土<br>壌処理 | 北海道 |      | ●3  | ●          | ●2 | ●2  |          | ●2            |          |         | ●発生<br>期 | ●前       | ●前       | ●再生<br>前 |          | +5～/ヒ' 3L | 6g/a<br>(<br>現在濃度<br>50<br>ml/a | ●            | 1.5    | ●      | ●      | 2              | (28)<br>(34) |     |
|                         |             | 東北  |      | ●3  | ●          | ●2 | ●2  | ●2       |               |          |         | ●発生<br>期 | ●前       | ●前       | ●再生<br>前 |          |           |                                 |              |        | ●      | ●      | 1              |              |     |
|                         |             | 北陸  |      | ●3  | ●          | ●2 | ●2  | ●2       |               |          |         |          | ●発生<br>期 | ●前       | ●前       | ●始       |           |                                 |              |        |        | ●      | ●              | 2            |     |
|                         |             | 関東  | 早    |     |            |    |     |          |               |          |         |          |          | ●発生<br>期 | ●前       | ●再生<br>前 |           |                                 |              |        |        |        |                |              |     |
|                         |             | 東海  | 普    | ●3  | ●          | ●2 | ●2  | ●2       |               |          |         |          | ●発生<br>期 | ●前       | ●前       | ●再生<br>前 |           |                                 |              |        | ●      | ●      | ●              |              |     |
|                         |             | 近畿  | 早    |     |            |    |     |          |               |          |         |          |          | ●発生<br>期 | ●前       | ●再生<br>前 |           |                                 |              |        |        |        |                |              |     |
|                         |             | 中国  | 普    | ●3  | ●          | ●2 | ●2  | ●2       |               |          |         |          | ●発生<br>期 | ●前       | ●前       | ●始       |           |                                 |              |        | ●      | ●      | ●              | 1            |     |
|                         |             | 四国  | 早    |     |            |    |     |          |               |          |         |          |          | ●発生<br>期 | ●前       | ●再生<br>前 |           |                                 |              |        |        |        |                |              |     |
|                         |             | 普   | ●3   | ●   | ●2         | ●2 | ●2  |          |               |          |         |          | ●発生<br>期 | ●前       | ●前       | ●再生<br>前 |           |                                 |              |        | ●      | ●      | ●              |              |     |
|                         |             | 九州  | 早    |     |            |    |     |          |               |          |         |          |          | ●発生<br>期 | ●前       | ●再生<br>前 |           |                                 |              |        |        |        |                |              |     |
|                         |             | 普   | ●2.5 | ●   | ●2         | ●2 | ●2  |          |               |          |         |          | ●発生<br>期 | ●前       | ●前       | ●始       |           |                                 | +5～/ヒ' 12.5L |        | ●1     | ●      | ●              | ●            | 1.5 |

VII-2 NH-003-1kg 粒「継」

VII-2 NH-004-1kg 粒「継」

|                           | 処理法     | 地域名 | 作期 | ヒ・エ  | 一年広葉マハ | ホハ | ウリカ | ミヤ | ヘラ | クロ | オモ | ヒル   | 葉類 | セリ   | 処理時期       | 使用量・製品 | 砂   | 壤 | 埴 | 埴 | 減水 | 使用上の |
|---------------------------|---------|-----|----|------|--------|----|-----|----|----|----|----|------|----|------|------------|--------|-----|---|---|---|----|------|
| VII-2<br>NH-803<br>707g/ℓ | 芽葉兼土壌処理 | 北海道 |    | ○2.5 | ○      | ○2 | ○2  |    |    |    |    | ○発生期 | ○前 | ○再生前 | +5~ヒ・エ2.5L | 50ml/a | 1.5 | ● | ○ | ○ | 2  |      |
|                           |         | 東北  |    | ○2.5 | ○      | ○2 | ●始  | ○2 | ○2 |    |    | ○発生期 | ●前 | ○前   |            |        |     |   |   |   |    |      |
|                           |         | 北陸  |    |      |        |    |     |    |    |    |    | ○発生期 | ●前 | ○始   |            |        |     |   |   |   |    |      |
|                           |         | 関東  | 早  |      |        |    |     |    |    |    |    |      |    |      |            |        |     |   |   |   |    |      |
|                           |         | 東海  | 普  |      |        |    |     |    |    |    |    |      |    |      |            |        |     |   |   |   |    |      |
|                           |         | 近畿  | 早  |      |        |    |     |    |    |    |    |      |    |      |            |        |     |   |   |   |    |      |
|                           |         | 中国  | 普  |      |        |    |     |    |    |    |    |      |    |      |            |        |     |   |   |   |    |      |
|                           |         | 四国  | 早  |      |        |    |     |    |    |    |    |      |    |      |            |        |     |   |   |   |    |      |
|                           |         | 普   |    |      |        |    |     |    |    |    |    |      |    |      |            |        |     |   |   |   |    |      |
|                           |         | 九州  | 早  |      |        |    |     |    |    |    |    |      |    |      |            |        |     |   |   |   |    |      |
|                           |         | 普   |    |      |        |    |     |    |    |    |    |      |    |      |            |        |     |   |   |   |    |      |

|                           | 処理法     | 地域名 | 作期   | ヒ・エ  | 一年広葉マハ | ホハ | ウリカ | ミヤ | ヘラ | クロ | オモ | ヒル   | 葉類 | セリ   | 処理時期       | 使用量・製品 | 砂   | 壤 | 埴 | 埴 | 減水 | 使用上の         |
|---------------------------|---------|-----|------|------|--------|----|-----|----|----|----|----|------|----|------|------------|--------|-----|---|---|---|----|--------------|
| VII-2<br>NH-804<br>707g/ℓ | 芽葉兼土壌処理 | 北海道 |      |      |        |    |     |    |    |    |    |      |    |      | +5~ヒ・エ2.5L | 50ml/a | 1.5 | ● | ○ | ○ | 1  | (28)<br>(34) |
|                           |         | 東北  |      |      |        |    |     |    |    |    |    |      |    |      |            |        |     |   |   |   |    |              |
|                           |         | 北陸  |      | ○2.5 | ○      | ○2 | ○2  | ○2 |    |    |    |      | ○前 |      |            |        |     |   |   |   |    |              |
|                           |         | 関東  | 早    | ●2.5 | ●      | ●2 | ●2  | ●始 |    |    |    | ●発生期 | ●前 | ●再生前 |            |        |     |   |   |   |    |              |
|                           |         | 東海  | 普    | ○2.5 | ○      | ○2 | ○2  | ○2 |    |    |    | ○発生期 | ○前 | ○始   |            |        |     |   |   |   |    |              |
|                           |         | 近畿  | 早    | ●2.5 | ●      | ●2 | ●2  | ●2 |    |    |    | ●発生期 | ●前 | ●始   |            |        |     |   |   |   |    |              |
|                           |         | 中国  | 普    | ○2.5 | ○      | ○2 | ○2  | ○2 |    |    |    | ○発生期 | ○前 | ○始   |            |        |     |   |   |   |    |              |
|                           |         | 四国  | 早    | ●2.5 | ●      | ●2 | ●2  | ●2 |    |    |    | ●発生期 | ●前 | ●再生前 |            |        |     |   |   |   |    |              |
|                           |         | 普   | ○2.5 | ○    | ○2     | ○2 | ○2  |    |    |    |    | ○発生期 | ○前 | ○始   |            |        |     |   |   |   |    |              |
|                           |         | 九州  | 早    | ○2.5 | ○      | ○2 | ○2  | ○2 |    |    |    | ○発生期 | ○前 | ○始   |            |        |     |   |   |   |    |              |
|                           |         | 普   | ○2.5 | ○    | ○2     | ○2 | ○2  |    |    |    |    | ○発生期 | ○前 | ○始   |            |        |     |   |   |   |    |              |

|                       | 処理法     | 地域名 | 作期 | ヒ・エ | 一年広葉マハ | ホハ | ウリカ | ミヤ | ヘラ | クロ | オモ | ヒル   | 葉類 | セリ   | 処理時期     | 使用量・製品 | 砂   | 壤 | 埴 | 埴 | 減水 | 使用上の         |
|-----------------------|---------|-----|----|-----|--------|----|-----|----|----|----|----|------|----|------|----------|--------|-----|---|---|---|----|--------------|
| VII-2<br>NH-101-1kg 粒 | 芽葉兼土壌処理 | 北海道 |    | ○3  | ○      | ○2 | ○2  |    |    |    |    | ○発生期 | ○前 | ○再生前 | +5~ヒ・エ3L | 100g/a | 1.5 | ● | ○ | ○ | 2  | (28)<br>(34) |
|                       |         | 東北  |    | ○3  | ○      | ○2 | ●2  | ○2 | ○2 |    |    | ○発生期 | ●前 | ○前   |          |        |     |   |   |   |    |              |
|                       |         | 北陸  |    | ○3  | ○      | ○2 | ○2  | ○2 |    |    |    |      |    | 始    |          |        |     |   |   |   |    |              |
|                       |         | 関東  | 早  | ○3  | ○      | ○2 | ○2  | ○2 |    |    |    | ○発生期 | ○前 | ○再生前 |          |        |     |   |   |   |    |              |
|                       |         | 東海  | 普  | ○3  | ○      | ○2 | ○2  | ○2 |    |    |    | ○発生期 | ○前 | ○始   |          |        |     |   |   |   |    |              |
|                       |         | 近畿  | 早  |     |        |    |     |    |    |    |    | ○発生期 | ○前 | ○始   |          |        |     |   |   |   |    |              |
|                       |         | 中国  | 普  | ○3  | ○      | ○2 | ○2  | ○2 |    |    |    | ○発生期 | ○前 | ○始   |          |        |     |   |   |   |    |              |
|                       |         | 四国  | 早  |     |        |    |     |    |    |    |    | ○発生期 | ○前 | ○再生前 |          |        |     |   |   |   |    |              |
|                       |         | 普   | ○3 | ○   | ○2     | ○2 | ○2  |    |    |    |    | ○発生期 | ○前 | ○始   |          |        |     |   |   |   |    |              |
|                       |         | 九州  | 早  | ●3  | ●      | ●2 | ●2  | ●2 |    |    |    | ●発生期 | ●前 | ●始   |          |        |     |   |   |   |    |              |
|                       |         | 普   | ●3 | ●   | ●2     | ●2 | ●2  |    |    |    |    | ●発生期 | ●前 | ●始   |          |        |     |   |   |   |    |              |

| 処理法                      | 地域名      | 作期 | ハ・エ | 一年<br>広葉<br>マハ・イ | ホ・ル | ウ・カ | ミ・ヤ<br>ガ・リ | ヘ・オ<br>モ・カ | ク・ロ<br>グ・イ | オ・モ<br>グ・カ | ヒ・ム<br>シ・ロ | 藻類<br>剥離 | セリ       | 処理時期       | 使用<br>電・<br>製品                              | 砂<br>壌土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意   |
|--------------------------|----------|----|-----|------------------|-----|-----|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|---------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|--------------|
| VII-2<br>NOJ-102<br>顆粒水和 | 北海道      |    | ●3  | ●                | ●2  | ●2  |            |            |            |            | ●発生<br>期   | ●前       | ●再生<br>前 | +5~ハ・エ 13L | 10<br>g/a<br>〔<br>散<br>布<br>50<br>ml/a<br>〕 | ●       | ●      | ●      | ●      | 2               | (28)<br>(34) |
|                          | 東北       |    | ●3  | ●                | ●2  | ●2  | ●2         | ●2         |            |            | ●発生<br>期   | ●前       | ●再生<br>前 |            |                                             |         |        |        |        |                 |              |
|                          | 北陸       |    | ●3  | ●                | ●2  | ●2  | ●2         |            |            |            |            | ●前       | ●始       |            |                                             |         |        |        |        |                 |              |
|                          | 関東<br>東海 | 早  | ●3  | ●                | ●2  | ●2  | ●2         |            |            |            | ●発生<br>期   | ●前       | ●再生<br>前 |            |                                             |         |        |        |        |                 |              |
|                          |          | 普  | ●3  | ●                | ●2  | ●2  | ●2         |            |            |            | ●発生<br>期   | ●前       | ●再生<br>前 |            |                                             |         |        |        |        |                 |              |
|                          | 近畿<br>中国 | 早  |     |                  |     |     |            |            |            |            |            | ●前       | ●始       |            |                                             |         |        |        |        |                 |              |
|                          |          | 普  | ●3  | ●                | ●2  | ●2  | ●2         |            |            |            |            | ●前       | ●        |            |                                             |         |        |        |        |                 |              |
|                          | 四国       | 早  |     |                  |     |     |            |            |            |            |            | ●前       | ●再生<br>前 |            |                                             |         |        |        |        |                 |              |
|                          |          | 普  | ●3  | ●                | ●2  | ●2  | ●2         |            |            |            |            | ●前       | ●再生<br>前 |            |                                             |         |        |        |        |                 |              |
|                          | 九州       | 早  |     |                  |     |     |            |            |            |            | ●発生<br>期   | ●前       | ●始       |            |                                             |         |        |        |        |                 |              |
|                          |          | 普  | ●3  | ●                | ●2  | ●2  | ●2         |            |            |            | ●発生<br>期   | ●前       | ●始       |            |                                             |         |        |        |        |                 |              |

| 処理法                       | 地域名      | 作期 | ハ・エ | 一年<br>広葉<br>マハ・イ | ホ・ル | ウ・カ | ミ・ヤ<br>ガ・リ | ヘ・オ<br>モ・カ | ク・ロ<br>グ・イ | オ・モ<br>グ・カ | ヒ・ム<br>シ・ロ | 藻類<br>剥離 | セリ       | 処理時期       | 使用<br>電・<br>製品 | 砂<br>壌土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意 |
|---------------------------|----------|----|-----|------------------|-----|-----|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|----------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|------------|
| VII-2<br>NOJ-103-1kg<br>粒 | 北海道      |    | ○3  | ○                | ○2  | ○2  |            |            |            |            | ○発生<br>期   | ○前       | ○再生<br>前 | +5~ハ・エ 13L | 100<br>g/a     | ●       | ○      | ○      | ○      | 2               |            |
|                           | 東北       |    | ○3  | ○                | ○2  | ○2  | ○2         | ○2         |            |            | ○発生<br>期   | ○前       | ○再生<br>前 |            |                |         |        |        |        |                 |            |
|                           | 北陸       |    |     |                  |     |     |            |            |            |            |            |          | ○始       |            |                |         |        |        |        |                 |            |
|                           | 関東<br>東海 | 早  |     |                  |     |     |            |            |            |            |            |          |          |            |                |         |        |        |        |                 |            |
|                           |          | 普  |     |                  |     |     |            |            |            |            |            |          |          |            |                |         |        |        |        |                 |            |
|                           | 近畿<br>中国 | 早  |     |                  |     |     |            |            |            |            |            |          |          |            |                |         |        |        |        |                 |            |
|                           |          | 普  |     |                  |     |     |            |            |            |            |            |          |          |            |                |         |        |        |        |                 |            |
|                           | 四国       | 早  |     |                  |     |     |            |            |            |            |            |          |          |            |                |         |        |        |        |                 |            |
|                           |          | 普  |     |                  |     |     |            |            |            |            |            |          |          |            |                |         |        |        |        |                 |            |
|                           | 九州       | 早  |     |                  |     |     |            |            |            |            |            |          |          |            |                |         |        |        |        |                 |            |
|                           |          | 普  |     |                  |     |     |            |            |            |            |            |          |          |            |                |         |        |        |        |                 |            |

| 処理法                       | 地域名      | 作期 | ハ・エ  | 一年<br>広葉<br>マハ・イ | ホ・ル | ウ・カ | ミ・ヤ<br>ガ・リ | ヘ・オ<br>モ・カ | ク・ロ<br>グ・イ | オ・モ<br>グ・カ | ヒ・ム<br>シ・ロ | 藻類<br>剥離 | セリ       | 処理時期       | 使用<br>電・<br>製品 | 砂<br>壌土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意   |
|---------------------------|----------|----|------|------------------|-----|-----|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|----------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|--------------|
| VII-2<br>NOJ-104-1kg<br>粒 | 北海道      |    |      |                  |     |     |            |            |            |            |            |          |          | +5~ハ・エ 13L | 100<br>g/a     | ●       | ●      | ●      | ●      | 2               | (28)<br>(34) |
|                           | 東北       |    |      |                  |     |     |            |            |            |            |            |          |          |            |                |         |        |        |        |                 |              |
|                           | 北陸       |    | ●3   | ●                | ●2  | ●2  | ●2         |            |            |            |            |          |          |            |                |         |        |        |        |                 |              |
|                           | 関東<br>東海 | 早  | ●2.5 | ●                | ●2  | ●2  | ●2         |            |            |            | ●発生<br>期   | ●前       | ●再生<br>前 |            |                |         |        |        |        |                 |              |
|                           |          | 普  | ○3   | ○                | ○2  | ○2  | ○2         |            |            |            | ○発生<br>期   | ○前       | ○再生<br>前 |            |                |         |        |        |        |                 |              |
|                           | 近畿<br>中国 | 早  |      |                  |     |     |            |            |            |            | ●発生<br>期   | ●前       | ●始       |            |                |         |        |        |        |                 |              |
|                           |          | 普  | ○3   | ○                | ○2  | ○2  | ○2         |            |            |            | ○発生<br>期   | ○前       | ○        |            |                |         |        |        |        |                 |              |
|                           | 四国       | 早  |      |                  |     |     |            |            |            |            | ●発生<br>期   | ●前       | ●再生<br>前 |            |                |         |        |        |        |                 |              |
|                           |          | 普  | ○3   | ○                | ○2  | ○2  | ○2         |            |            |            | ○発生<br>期   | ○前       | ○再生<br>前 |            |                |         |        |        |        |                 |              |
|                           | 九州       | 早  | ●2.5 | ●                | ●2  | ●2  | ●2         | ●2         |            |            | ●発生<br>期   | ●前       | ●始       |            |                |         |        |        |        |                 |              |
|                           |          | 普  | ●3   | ●                | ●2  | ●2  | ●2         |            |            |            | ●発生<br>期   | ●        | ●        |            |                |         |        |        |        |                 |              |

| 処理法                    | 地域名      | 作期 | ハ・エ | 一年<br>広葉<br>マハ・イ | ホ・ル | ウ・カ | ミ・ヤ<br>ガ・リ | ヘ・オ<br>モ・カ | ク・ロ<br>グ・イ | オ・モ<br>グ・カ | ヒ・ム<br>シ・ロ | 藻類<br>剥離 | セリ       | 処理時期       | 使用<br>電・<br>製品                               | 砂<br>壌土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意 |
|------------------------|----------|----|-----|------------------|-----|-----|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|----------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|------------|
| VII-2<br>NOJ-105<br>OF | 北海道      |    | ●3  | ●                | ●2  | ●2  |            |            |            |            | ●発生<br>期   | ●前       | ●再生<br>前 | +5~ハ・エ 13L | 10<br>ml/a<br>〔<br>散<br>布<br>50<br>ml/a<br>〕 | ●       | ●      | ●      | ●      | 2               |            |
|                        | 東北       |    | ●3  | ●                | ●2  | ●2  | ●2         | ●2         |            |            |            | ●発生<br>期 | ●前       |            |                                              |         |        |        |        |                 |            |
|                        | 北陸       |    |     |                  |     |     |            |            |            |            |            |          | ●始       |            |                                              |         |        |        |        |                 |            |
|                        | 関東<br>東海 | 早  |     |                  |     |     |            |            |            |            |            |          |          |            |                                              |         |        |        |        |                 |            |
|                        |          | 普  |     |                  |     |     |            |            |            |            |            |          |          |            |                                              |         |        |        |        |                 |            |
|                        | 近畿<br>中国 | 早  |     |                  |     |     |            |            |            |            |            |          |          |            |                                              |         |        |        |        |                 |            |
|                        |          | 普  |     |                  |     |     |            |            |            |            |            |          |          |            |                                              |         |        |        |        |                 |            |
|                        | 四国       | 早  |     |                  |     |     |            |            |            |            |            |          |          |            |                                              |         |        |        |        |                 |            |
|                        |          | 普  |     |                  |     |     |            |            |            |            |            |          |          |            |                                              |         |        |        |        |                 |            |
|                        | 九州       | 早  |     |                  |     |     |            |            |            |            |            |          |          |            |                                              |         |        |        |        |                 |            |
|                        |          | 普  |     |                  |     |     |            |            |            |            |            |          |          |            |                                              |         |        |        |        |                 |            |

| 処理法                    | 地域名  | 作期 | ヒ・エ | 一年<br>広葉<br>マツハ | ホトメ | ウリカ | ミヤ<br>ガヤ | ヘラオ<br>タカ | クロ<br>グ | オモ<br>カ | ヒムシ<br>ロ | 藻類<br>剥離 | セリ  | 処理時期     | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意   |
|------------------------|------|----|-----|-----------------|-----|-----|----------|-----------|---------|---------|----------|----------|-----|----------|----------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|--------------|
| VII-2<br>N01-106<br>OF | 北海道  |    |     |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |     |          | 10<br>ml/a     |         |        |        |        |                 | (28)<br>(34) |
|                        | 東北   |    |     |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |     |          | 50<br>ml/a     |         |        |        |        |                 |              |
|                        | 北陸   |    | ●3  | ●               | ●2  | ●2  | ●2       |           |         |         |          |          |     | +5~ヒ・エ3L |                |         |        | ●●     | 2      |                 |              |
|                        | 関東海  | 早  |     |                 |     |     |          |           |         |         | 発生期      |          | 再生前 |          |                |         |        |        |        |                 |              |
|                        | 普    | ●3 | ●   | ●2              | ●2  | ●2  |          |           |         |         | ●        | ●前       | ●   |          |                |         |        | ●●     |        |                 |              |
|                        | 近畿中国 | 早  |     |                 |     |     |          |           |         |         | 発生期      |          | 再生前 |          |                |         |        |        |        |                 |              |
|                        | 普    | ●3 | ●   | ●2              | ●2  | ●2  |          |           |         |         | ●        | ●前       | ●   |          |                |         |        | ●●     | 1      |                 |              |
|                        | 四国   | 早  |     |                 |     |     |          |           |         |         | 発生期      |          | 再生前 |          |                |         |        |        |        |                 |              |
|                        | 普    | ●3 | ●   | ●2              | ●2  | ●2  |          |           |         |         | ●        | ●前       | ●   |          |                |         |        | ●●     |        |                 |              |
|                        | 九州   | 早  |     |                 |     |     |          |           |         |         | 発生期      |          | 再生前 |          |                |         |        |        |        |                 |              |
|                        | 普    | ●3 | ●   | ●2              | ●2  | ●2  |          |           |         |         | ●        | ●        | ●   |          |                |         |        | ●●     | 1.5    |                 |              |

| 処理法                         | 地域名  | 作期   | ヒ・エ  | 一年<br>広葉<br>マツハ | ホトメ | ウリカ | ミヤ<br>ガヤ | ヘラオ<br>タカ | クロ<br>グ | オモ<br>カ | ヒムシ<br>ロ | 藻類<br>剥離 | セリ   | 処理時期           | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                           |
|-----------------------------|------|------|------|-----------------|-----|-----|----------|-----------|---------|---------|----------|----------|------|----------------|----------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|--------------------------------------|
| VII-2<br>NSK-858(1)<br>7077 | 北海道  |      |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          | 再生前  |                | 50<br>ml/a     |         |        |        |        |                 | (28)<br>(34)<br>(36)<br>(38)<br>(42) |
|                             | 東北   |      |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          | 再生前  |                |                |         |        |        |        |                 |                                      |
|                             | 北陸   |      | ○2.5 | ○               | ○2  | ○2  | ○2       |           |         | ○始      |          |          | ○始   | +5~ヒ・エ2.5L     |                |         | ○      | ○      | ○      | 2               |                                      |
|                             | 関東海  | 早    | ○2.5 | ○               | ○2  | ○2  | ○2       |           |         | ○発生期    | ○前       | ○        | 再生前  | +0~ヒ・エ2.5L     |                | ○*      | ○      | ○      | ○      | 1.5             | 水口処理<br>可能<br>(北陸<br>~九州)            |
|                             | 普    | ○2.5 | ○    | ○2              | ○2  | ○2  |          |           |         | ○始      | ○期       | ○前       | ○    |                |                | ○       | ○      | ○      | ○      |                 |                                      |
|                             | 近畿中国 | 早    | ○2.5 | ○               | ○2  | ○2  | ○2       |           |         |         | ○発生期     | ○前       | ○始   |                |                |         | ○      | ○      | ○      | 1               |                                      |
|                             | 普    | ○2.5 | ○    | ○2              | ○2  | ○2  |          |           |         |         | ○期       | ○前       | ○    |                |                |         | ○      | ○      | ○      | 1.5             | *砂壌土は<br>+5~<br>(関東・東海<br>の早期)       |
|                             | 四国   | 早    | ○2.5 | ○               | ○2  | ○2  | ○2       |           |         |         | ○発生期     | ○前       | ○    |                |                |         | ○      | ○      | ○      | 1               |                                      |
|                             | 普    | ○2.5 | ○    | ○2              | ○2  | ○2  |          |           |         |         | ○期       | ○前       | ○再生前 |                |                |         | ○      | ○      | ○      | 1.5             |                                      |
|                             | 九州   | 早    | ○2.5 | ○               | ○2  | ○2  | ○2       |           |         |         | ○発生期     | ○前       | ○始   | *コリヤガウ<br>:発生始 |                |         | ○      | ○      | ○      | 2               |                                      |
|                             | 普    | ○2.5 | ○    | ○2              | ○2  | ○2  |          |           | ○始      | ○始      | ○期       | ○前       | ○    | ○*             |                | ○       | ○      | ○      | ○      |                 |                                      |

クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(九州)  
オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(北陸、関東・東海、九州)

| 処理法                           | 地域名  | 作期   | ヒ・エ  | 一年<br>広葉<br>マツハ | ホトメ | ウリカ | ミヤ<br>ガヤ | ヘラオ<br>タカ | クロ<br>グ | オモ<br>カ | ヒムシ<br>ロ | 藻類<br>剥離 | セリ   | 処理時期                            | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意           |
|-------------------------------|------|------|------|-----------------|-----|-----|----------|-----------|---------|---------|----------|----------|------|---------------------------------|----------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|----------------------|
| VII-2<br>NSK-858(1)<br>-1kg 粒 | 北海道  |      |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |      |                                 | 100<br>g/a     |         |        |        |        |                 | (28)<br>(34)<br>(48) |
|                               | 東北   |      |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |      |                                 |                |         |        |        |        |                 |                      |
|                               | 北陸   |      | ○2.5 | ○               | ○2  | ○2  | ○2       |           |         |         |          |          |      | +5~ヒ・エ2.5L                      |                |         | ○      | ○      | ○      | 1.5             |                      |
|                               | 関東海  | 早    | ●2.5 | ●               | ●2  | ●2  | ●2       |           |         |         | ●発生期     | ●前       | ●    |                                 |                |         | ●      | ●      | ●      | 1               |                      |
|                               | 普    | ○2.5 | ○    | ○2              | ○2  | ○2  |          |           |         |         | ○期       | ○前       | ○再生前 |                                 |                |         | ○      | ○      | ○      | 2               |                      |
|                               | 近畿中国 | 早    | ●2.5 | ●               | ●2  | ●2  | ●2       |           |         |         | ●発生期     | ●前       | ●始   | 湛水周縁部<br>散布可能<br>(関東・東海<br>~九州) |                |         | ●      | ●      | ●      | 1.5             |                      |
|                               | 普    | ○2.5 | ○    | ○2              | ○2  | ○2  |          |           |         |         | ●期       | ●前       | ○    |                                 |                |         | ●      | ○      | ○      |                 |                      |
|                               | 四国   | 早    | ●2.5 | ●               | ●2  | ●2  | ●2       |           |         |         | ●発生期     | ●前       | ●再生前 |                                 |                |         | ●      | ●      | ●      |                 |                      |
|                               | 普    | ○2.5 | ○    | ○2              | ○2  | ○2  |          |           |         |         | ●期       | ●前       | ○    |                                 |                |         | ●      | ○      | ○      |                 |                      |
|                               | 九州   | 早    | ●2.5 | ●               | ●2  | ●2  | ●2       |           |         |         | ●発生期     | ●前       | ●始   |                                 |                |         | ●      | ○      | ○      | 2               |                      |
|                               | 普    | ●2.5 | ●    | ●2              | ●2  | ●2  |          |           |         |         | ●        | ●前       | ●    |                                 |                |         | ●      | ●      | ●      | 1.5             |                      |

| 処理法                        | 地域名  | 作期 | ヒ・エ  | 一年<br>広葉<br>マツハ | ホトメ | ウリカ | ミヤ<br>ガヤ | ヘラオ<br>タカ | クロ<br>グ | オモ<br>カ | ヒムシ<br>ロ | 藻類<br>剥離 | セリ   | 処理時期          | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意 |
|----------------------------|------|----|------|-----------------|-----|-----|----------|-----------|---------|---------|----------|----------|------|---------------|----------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|------------|
| VII-2<br>NSK-858A-1kg<br>粒 | 北海道  |    | ○2.5 | ○               | ○2  | ○2  |          |           |         |         | ○発生期     | ○前       | ○再生前 | +5~ヒ・エ2.5L    | 100<br>g/a     | ●       | ○      | ○      | ○      | 2               | (48)       |
|                            | 東北   |    | ○2.5 | ○               | ○2  | ○2  | ○2       |           |         |         | ○期       | ○前       | ○始   |               |                | ●       | ○      | ○      | ○      | 1.5             |            |
|                            | 北陸   |    |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |      | 湛水周縁部<br>散布可能 |                |         |        |        |        |                 |            |
|                            | 関東海  | 早  |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |      |               |                |         |        |        |        |                 |            |
|                            | 普    |    |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |      |               |                |         |        |        |        |                 |            |
|                            | 近畿中国 | 早  |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |      |               |                |         |        |        |        |                 |            |
|                            | 普    |    |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |      |               |                |         |        |        |        |                 |            |
|                            | 四国   | 早  |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |      |               |                |         |        |        |        |                 |            |
|                            | 普    |    |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |      |               |                |         |        |        |        |                 |            |
|                            | 九州   | 早  |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |      |               |                |         |        |        |        |                 |            |
|                            | 普    |    |      |                 |     |     |          |           |         |         |          |          |      |               |                |         |        |        |        |                 |            |

|                          | 処理法            | 地域名      | 作期                   | ヒ・エ | 一年<br>広葉<br>マハ | ホタル | ウリカ | ミ<br>ガ<br>リ | ヘラオモ<br>タカ | クロウ<br>リ | オモ<br>カ      | ヒルシ<br>ロ     | 葉<br>類<br>剥<br>離 | セリ           | 処理時期         | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 減<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意   |  |  |
|--------------------------|----------------|----------|----------------------|-----|----------------|-----|-----|-------------|------------|----------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------------|--|--|
| VII-2<br>RH-631-1kg<br>粒 | 芽菜<br>土壌<br>処理 | 北海道      | ○2.5                 | ○   | ○2             | ○2  |     | ●2          |            |          |              | ○発<br>生<br>期 | ○前               | ○再<br>生<br>前 | +5〜/ヒ' I2.5L | 100<br>g/a     | ○      | ○      | ○      | 2              | (28)<br>(34) |  |  |
|                          |                | 東北       | ○3                   | ○   | ○2             | ○2  | ○2  | ○2          |            |          | ○前           | ●前           | ○前               | +5〜/ヒ' I3L   | ○            |                | ○      | ○      | 1.5    |                |              |  |  |
|                          |                | 北陸       | ○2.5                 | ○   | ○2             | ○2  | ○2  |             |            |          |              | ○前           | ○始               | +5〜/ヒ' I2.5L |              |                | ○      | ○      |        |                |              |  |  |
|                          |                | 関東<br>東海 | 早<br>○2.5<br>普<br>○3 | ○   | ○2             | ○2  | ○2  |             |            |          | ○発<br>生<br>期 | ○前           | ○再<br>生<br>前     | +5〜/ヒ' I3L   |              |                | ○      | ○      | ○      | 2              |              |  |  |
|                          |                | 近畿<br>中国 | 早<br>○2.5<br>普<br>○3 | ○   | ○2             | ○2  | ○2  |             |            |          | ○発<br>生<br>期 | ○前           | ○再<br>生<br>前     | +5〜/ヒ' I2.5L |              |                | ○      | ○      | ○      | 1.5            |              |  |  |
|                          |                | 四国       | 早<br>○2.5<br>普<br>○3 | ○   | ○2             | ○2  | ○2  |             |            |          | ○発<br>生<br>期 | ○前           | ○再<br>生<br>前     |              |              |                | ○      | ○      | ○      |                |              |  |  |
|                          |                | 九州       | 早<br>○2.5<br>普<br>○3 | ○   | ○2             | ○2  | ○2  |             |            |          | ○発<br>生<br>期 | ○前           | ○始               |              |              |                | ○      | ○      | ○      | 1              |              |  |  |
|                          |                |          |                      |     |                |     |     |             |            |          |              |              |                  |              |              |                |        |        |        |                |              |  |  |
|                          |                |          |                      |     |                |     |     |             |            |          |              |              |                  |              |              |                |        |        |        |                |              |  |  |
|                          |                |          |                      |     |                |     |     |             |            |          |              |              |                  |              |              |                |        |        |        |                |              |  |  |

|                | 処理法  | 地域名      | 作期 | ヒ・エ | 一年<br>広葉<br>マハ | ホタル | ウリカ | ミ<br>ガ<br>リ | ヘ<br>ラ<br>モ<br>タ | クロ<br>ウ | オモ<br>カ | ヒル<br>シ | 葉<br>表<br>剥<br>離 | セリ |    | 処理時期       | 使用<br>量・<br>製品  | 砂<br>土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 填<br>土 | 減<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意   |                                 |
|----------------|------|----------|----|-----|----------------|-----|-----|-------------|------------------|---------|---------|---------|------------------|----|----|------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------------|---------------------------------|
| Ⅱ-6-(6)<br>を併用 | 土壌処理 | 北海道      |    | ○   | ○              | ○   | ○   | 始           |                  |         |         |         |                  |    | ●* | +0～ノヒ' E2L | 50<br>ml/a      | ○      | ○      | ○      | ○      | 2              | (28)<br>(34) |                                 |
|                |      | 東北       |    | ○   | ○              | ○   | ○   | ○           | 始                |         |         |         |                  |    |    |            |                 | ○      | ○      | ○      | ○      | 1.5            |              |                                 |
|                |      | 北陸       |    | ○   | ○              | ○   | ○   | ○           | 始                | ○       | 始       |         |                  |    |    |            | *I' /サヤスカ' : 2L |        | ○      | ○      | ○      | ○              | 2            | 水口処理<br>可能<br>(北海道<br>北陸<br>九州) |
|                |      | 関東<br>東海 | 早  | ●   | 2              | ●   | ●   | 2           | ●                | 2       | ●       | 2       |                  |    |    |            |                 |        | ○      | ○      | ○      | ○              | 2            |                                 |
|                |      | 普        | ○  | 2.5 | ○              | ○   | ○   | ○           | ○                | ○       | ○       | ○       | ○                | ○  | ○  | ○          |                 |        | ○      | ○      | ○      | ○              | 2            |                                 |
|                |      | 近畿<br>中国 | 早  | ●   | 2.5            | ●   | ●   | 2           | ●                | 2       | ●       | ○       | 始                |    |    |            |                 |        | ○      | ○      | ○      | ○              | 1.5          |                                 |
|                |      | 普        | ○  | 2.5 | ○              | ○   | ○   | ○           | ○                | ○       | ○       | ○       | ○                | ○  | ○  | ○          |                 |        | ○      | ○      | ○      | ○              |              |                                 |
|                |      | 四国       | 早  | ●   | 2.5            | ●   | ●   | 2           | ●                | 2       | ●       | ○       | 始                |    |    |            |                 |        | ○      | ○      | ○      | ○              |              |                                 |
|                |      | 普        | ○  | 2.5 | ○              | ○   | ○   | ○           | ○                | ○       | ○       | ○       | ○                | ○  | ○  | ○          |                 |        | ○      | ○      | ○      | ○              |              |                                 |
|                |      | 九州       | 早  | ○   | ○              | ○   | ○   | ○           | ○                | ○       | ○       | ○       | ○                | ○  | ○  | ○          |                 |        | ○      | ○      | ○      | ○              | 2            |                                 |
|                |      | 普        | ○  | ○   | ○              | ○   | ○   | ○           | ○                | ○       | ○       | ○       | ○                | ○  | ○  | ○          |                 |        | ○      | ○      | ○      | ○              |              |                                 |

|                                           | 処理法     | 地域名      | 作期     | ハ・エ  | 一年<br>広葉<br>マハ | ホタル | ウリカ | ミ<br>ガ<br>リ | ヘラモ<br>タ | クロ<br>ウ | オモ<br>カ | ヒル<br>シ  | 葉<br>表<br>剥<br>離 | セリ       | 処理時期         | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土              | 壤<br>土   | 堆<br>土 | 減<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意 |                     |     |  |
|-------------------------------------------|---------|----------|--------|------|----------------|-----|-----|-------------|----------|---------|---------|----------|------------------|----------|--------------|----------------|---------------------|----------|--------|----------------|------------|---------------------|-----|--|
| VII-2<br>SW-002<br>7077' Ⅱ<br>(旧HISW-982) | 茅草兼土壌処理 | 北海道      |        | ○2.5 | ○              | ○2  | ○2  |             |          |         |         | ○発生<br>期 | ○前               | ○再生<br>前 | +3〜ノヒ' Ⅱ2.5L | 50<br>ml/a     |                     | ○<br>1.5 | ○      | ○              | 2          | 水口処理<br>可能<br>(北海道) |     |  |
|                                           |         | 東北       |        | ●2.5 | ●              | ●2  | ●2  | ●2          | ●始       |         |         | ●発生<br>期 | ●前               | ●前       |              |                |                     |          | ○      | ○              | ○          |                     | 1.5 |  |
|                                           |         | 北陸       |        |      |                |     |     |             |          |         |         |          |                  |          |              |                | *エ' /ノヤスカ'サ<br>: 2L |          |        |                |            |                     |     |  |
|                                           |         | 関東<br>東海 | 早<br>普 |      |                |     |     |             |          |         |         |          |                  |          |              |                |                     |          |        |                |            |                     |     |  |
|                                           |         | 近畿<br>中国 | 早<br>普 |      |                |     |     |             |          |         |         |          |                  |          |              |                |                     |          |        |                |            |                     |     |  |
|                                           |         | 四国       | 早<br>普 |      |                |     |     |             |          |         |         |          |                  |          |              |                |                     |          |        |                |            |                     |     |  |
|                                           |         | 九州       | 早<br>普 |      |                |     |     |             |          |         |         |          |                  |          |              |                |                     |          |        |                |            |                     |     |  |

|                          | 処理法     | 地域名      | 作期     | ヒ・エ  | 一年<br>広葉<br>マハ | ホタル | ウリカ | ミ<br>ガ<br>リ | ヘ<br>ラ<br>モ<br>タ | クロ<br>ウ | オモ<br>カ | ヒル<br>シ | 葉<br>表<br>剥<br>離 | セリ | 処理時期         | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土       | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 増<br>深 | 減<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意 |              |   |
|--------------------------|---------|----------|--------|------|----------------|-----|-----|-------------|------------------|---------|---------|---------|------------------|----|--------------|----------------|--------------|--------|--------|--------|----------------|------------|--------------|---|
| VII-2<br>SW-991-1kg<br>粒 | 芽葉兼土壌処理 | 北海道      |        | ●2.5 | ●              | ●2  | ●2  |             |                  |         |         | ●発生期    | ●前               |    | +5〜/ヒ' I2.5L | 100<br>g/a     |              | ●土1.5  | ●      | ●      | ●              | 2          | (28)<br>(34) |   |
|                          |         | 東北       |        |      |                |     |     |             |                  |         |         |         |                  |    |              |                |              |        |        |        |                |            |              |   |
|                          |         | 北陸       |        | ●2.5 | ●              | ●2  | ●始  | ●2          |                  |         |         |         |                  |    |              |                | +5〜/ヒ' I2.5L |        |        |        | ●              | ●          |              | 2 |
|                          |         | 関東<br>東海 | 早<br>普 | ●2   | ●              | ●2  | ●2  | ●2          | ●2               |         |         |         | ●発生期             |    |              |                | +5〜/ヒ' I2L   |        |        | ●      | ●              | ●          |              |   |
|                          |         | 近畿<br>中国 | 早<br>普 | ●2.5 | ●              | ●2  | ●2  | ●2          | ●2               |         |         |         |                  |    |              |                | +5〜/ヒ' I2.5L |        |        | ●      | ●              | ●          |              | 1 |
|                          |         | 四国       | 早<br>普 | ●2.5 | ●              | ●2  | ●2  | ●2          | ●2               |         |         |         |                  |    |              |                |              |        |        | ●      | ●              | ●          |              |   |
|                          |         | 九州       | 早<br>普 | ●2.5 | ●              | ●2  | ●2  | ●2          | ●2               |         |         |         | ●発生期             |    |              |                |              |        |        | ●      | ●              | ●          |              |   |
|                          |         |          |        |      |                |     |     |             |                  |         |         |         |                  |    |              |                |              |        |        | ●      | ●              | ●          |              |   |

VII-2 TH-001 7077' Ⅱ 「緑」

VII-2 MY-100TSC 7077' Ⅱ 「緑」

VII-2 TH-913NCS 7077' Ⅱ 「緑」

| 処理法                                   | 地域名      | 作期 | 1年<br>広葉<br>マハイ | ネタイ | ウリカ | ミヤ<br>タリ | ヘラオ<br>タカ | クロ<br>ガイ | オモ<br>カ | ヒムシ<br>ロ | 葉類<br>剥離 | セリ   | 処理時期         | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                                                 |
|---------------------------------------|----------|----|-----------------|-----|-----|----------|-----------|----------|---------|----------|----------|------|--------------|----------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| VII-2<br>TH-951<br>7077' Ⅱ<br>茶葉茶土壌処理 | 北海道      | 早  | ○2.5            | ○   | ○2  | ○2       |           |          |         | ○発生      | ○前       | ○再生  | +0～/ヒ' 12.5L | 50<br>ml/a     | ●       | ○      | ○      | ○      | 2               | (28)<br>(34)<br>水口処理<br>可能<br>(東北)<br>田植同時<br>散布可能<br>(北陸) |
|                                       | 東北       | 早  | ○2.5            | ○   | ○2  | ○2       | ○2        |          |         | ○発生      | ○前       | ○再生  |              |                |         |        |        |        |                 |                                                            |
|                                       | 北陸       | 早  | ○2.5            | ○   | ○2  | ○2       | ○2        |          |         |          |          | ○始   |              |                |         |        |        |        |                 |                                                            |
|                                       | 関東<br>東海 | 早  | ○2.5            | ○   | ○2  | ○2       | ○2        |          |         | ○発生      | ○前       | ○再生  |              |                |         |        |        |        |                 |                                                            |
|                                       |          | 普  | ○2.5            | ○   | ○2  | ○2       | ○2        |          |         | ○発生      | ○前       | ○再生  |              |                |         |        |        |        |                 |                                                            |
|                                       | 近畿<br>中国 | 早  | ○2.5            | ○   | ○2  | ○2       | ○2        |          |         | ○発生      | ○前       | ○前～始 |              |                |         |        |        |        |                 |                                                            |
|                                       |          | 普  | ○2.5            | ○   | ○2  | ○2       | ○2        |          |         | ○発生      | ○前       | ○前   |              |                |         |        |        |        |                 |                                                            |
|                                       | 四国       | 早  | ○2.5            | ○   | ○2  | ○2       | ○2        |          |         | ○発生      | ○前       | ○再生  |              |                |         |        |        |        |                 |                                                            |
|                                       |          | 普  | ○2.5            | ○   | ○2  | ○2       | ○2        |          |         | ○発生      | ○前       | ○再生  |              |                |         |        |        |        |                 |                                                            |
|                                       | 九州       | 早  | ○2.5            | ○   | ○2  | ○2       | ○2        |          |         | ○発生      | ○前       | ○再生  |              |                |         |        |        |        |                 |                                                            |
|                                       |          | 普  | ○2.5            | ○   | ○2  | ○2       | ○2        |          |         | ○発生      | ○前       | ○始   |              |                |         |        |        |        |                 |                                                            |

| 処理法                     | 地域名      | 作期 | 1年<br>広葉<br>マハイ | ネタイ | ウリカ | ミヤ<br>タリ | ヘラオ<br>タカ | クロ<br>ガイ | オモ<br>カ | ヒムシ<br>ロ | 葉類<br>剥離 | セリ  | 処理時期       | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意 |
|-------------------------|----------|----|-----------------|-----|-----|----------|-----------|----------|---------|----------|----------|-----|------------|----------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|------------|
| VII-2<br>NBA-941S-1kg 粒 | 北海道      | 早  | ●3              | ●   | ●2  | ●2       |           | ●始       |         | ●発生      | ●前       | ●再生 | +5～/ヒ' 13L | 100<br>g/a     | ●       | ●      | ●      | ●      | 2               |            |
|                         | 東北       | 早  | ●3              | ●   | ●2  | ●2       | ●2        | ●始       |         | ●発生      | ●前       | ●再生 |            |                |         |        |        |        |                 |            |
|                         | 北陸       | 早  |                 |     |     |          |           |          |         |          |          | ●始  |            |                |         |        |        |        |                 |            |
|                         | 関東<br>東海 | 早  |                 |     |     |          |           |          |         |          |          |     |            |                |         |        |        |        |                 |            |
|                         |          | 普  |                 |     |     |          |           |          |         |          |          |     |            |                |         |        |        |        |                 |            |
|                         | 近畿<br>中国 | 早  |                 |     |     |          |           |          |         |          |          |     |            |                |         |        |        |        |                 |            |
|                         |          | 普  |                 |     |     |          |           |          |         |          |          |     |            |                |         |        |        |        |                 |            |
|                         | 四国       | 早  |                 |     |     |          |           |          |         |          |          |     |            |                |         |        |        |        |                 |            |
|                         |          | 普  |                 |     |     |          |           |          |         |          |          |     |            |                |         |        |        |        |                 |            |
|                         | 九州       | 早  |                 |     |     |          |           |          |         |          |          |     |            |                |         |        |        |        |                 |            |
|                         |          | 普  |                 |     |     |          |           |          |         |          |          |     |            |                |         |        |        |        |                 |            |

| 処理法                          | 地域名      | 作期 | 1年<br>広葉<br>マハイ | ネタイ    | ウリカ | ミヤ<br>タリ | ヘラオ<br>タカ | クロ<br>ガイ | オモ<br>カ | ヒムシ<br>ロ | 葉類<br>剥離 | セリ  | 処理時期       | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                   |
|------------------------------|----------|----|-----------------|--------|-----|----------|-----------|----------|---------|----------|----------|-----|------------|----------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|------------------------------|
| VII-2<br>NC-311DCD<br>-1kg 粒 | 北海道      | 早  | ○3              | ○      | ○2  | ○2       | ○2        |          | ○前      | ○発生      | ○前       | ○再生 | +5～/ヒ' 13L | 100<br>g/a     | 1.5     | ○      | ○      | ○      | 2               | (28)<br>(34)<br>(38)<br>(40) |
|                              | 東北       | 早  | ○3              | ○00*** | ○2  | ○2       | ○2        | ○2       |         | ○前       | ○前       | ○前  |            |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                              | 北陸       | 早  | ○3              | ○      | ○2  | ○2       | ○2        |          |         |          | ○前       | ○始  |            |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                              | 関東<br>東海 | 早  | ○3              | ○      | ○2  | ○2       | ○2        |          |         | ○発生      | ○前       | ○再生 |            |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                              |          | 普  | ○3              | ○      | ○2  | ○2       | ○2        |          |         | ○発生      | ○前       | ○再生 |            |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                              | 近畿<br>中国 | 早  | ○3              | ○      | ○2  | ○2       | ○2        |          |         | ○発生      | ○前       | ○前  |            |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                              |          | 普  | ○3              | ○      | ○2  | ○2       | ○2        |          |         | ○発生      | ○前       | ○始  |            |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                              | 四国       | 早  | ○3              | ○      | ○2  | ○2       | ○2        |          |         | ○発生      | ○前       | ○再生 |            |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                              |          | 普  | ○3              | ○      | ○2  | ○2       | ○2        |          |         | ○発生      | ○前       | ○再生 |            |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                              | 九州       | 早  | ○3              | ○      | ○2  | ○2       | ○2        |          |         | ○発生      | ○前       | ○再生 |            |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                              |          | 普  | ○3              | ○      | ○2  | ○2       | ○2        |          |         | ○発生      | ○前       | ○始  |            |                |         |        |        |        |                 |                              |

VII-2 SW-005 7077' Ⅱ 「縦」

VII-2 SW-005(Ⅱ) 7077' Ⅱ 「縦」

## VII-3 長期持続型一発処理剤

| 処理法                    | 地域名      | 作期 | 1年<br>広葉<br>マハイ | ネタイ | ウリカ | ミヤ<br>タリ | ヘラオ<br>タカ | クロ<br>ガイ | オモ<br>カ | ヒムシ<br>ロ | 葉類<br>剥離 | セリ | 処理時期        | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                           |
|------------------------|----------|----|-----------------|-----|-----|----------|-----------|----------|---------|----------|----------|----|-------------|----------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|--------------------------------------|
| VII-3<br>AC-014A-1kg 粒 | 北海道      | 早  | ○1.5            | ○   | ○2  | ○2       | ○2        |          | ○前      | ○発生      | ○前       |    | +0～/ヒ' 1.5L | 100<br>g/a     | 1.5     | ○      | ○      | ○      | 2               | (38)<br>田植同時<br>散布可能<br>(北海道<br>～四国) |
|                        | 東北       | 早  | ○1.5            | ○   | ○2  | ○2       | ○2        |          |         | ○前       | ○前       |    |             |                |         |        |        |        |                 |                                      |
|                        | 北陸       | 早  | ○1.5            | ○   | ○2  | ○2       | ○2        |          |         |          | ●前       |    |             |                |         |        |        |        |                 |                                      |
|                        | 関東<br>東海 | 早  | ○1.5            | ○   | ○2  | ○2       | ○2        |          |         | ○発生      | ○前       |    |             |                |         |        |        |        |                 |                                      |
|                        |          | 普  | ○1.5            | ○   | ○2  | ○2       | ○2        |          |         | ○発生      | ○前       |    |             |                |         |        |        |        |                 |                                      |
|                        | 近畿<br>中国 | 早  | ○1.5            | ○   | ○始  | ○始       | ○始        |          |         | ○発生      | ○前       |    |             |                |         |        |        |        |                 |                                      |
|                        |          | 普  | ○1.5            | ○   | ○2  | ○2       | ○2        |          |         | ○前       | ○前       |    |             |                |         |        |        |        |                 |                                      |
|                        | 四国       | 早  | ○1.5            | ○   | ○始  | ○始       | ○始        |          |         | ○発生      | ○前       |    |             |                |         |        |        |        |                 |                                      |
|                        |          | 普  | ○1.5            | ○   | ○2  | ○2       | ○2        |          |         | ○前       | ○前       |    |             |                |         |        |        |        |                 |                                      |
|                        | 九州       | 早  |                 |     |     |          |           |          |         |          |          |    |             |                |         |        |        |        |                 |                                      |
|                        |          | 普  |                 |     |     |          |           |          |         |          |          |    |             |                |         |        |        |        |                 |                                      |

オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(近畿・中国・四国)

| 処理法                    | 地域名      | 作期 | ハ' E | 一年<br>広葉<br>マハ' I | ホ' R | ウ' K | ミ' Y | ヘ' O | クロ' G | オ' M | ヒ' M | 藻類<br>剥離 | セ' I | 処理時期           | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土<br>1.5 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意           |
|------------------------|----------|----|------|-------------------|------|------|------|------|-------|------|------|----------|------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|-----------------|----------------------|
| VII-3<br>AC-014C-1kg 粒 | 北海道      |    | ○ 2  | ○                 | ○ 2  | ○ 2  |      | ○ 2  |       |      | ○ 発生 | ○ 前      | ○ 再  | +5 ~ / E' I 2L | 100<br>g/a     | ○              | ○      | ○      | ○      | 2               | (28)<br>(34)<br>(41) |
|                        | 東北       |    | ○ 2  | ○                 | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2  |       |      | ○ 発生 | ○ 前      | ○ 前  |                |                |                |        |        |        |                 |                      |
|                        | 北陸       |    | ○ 2  | ○                 | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2  |       |      |      | ○ 前      |      |                |                |                |        |        |        |                 |                      |
|                        | 関東<br>東海 | 早  | ○ 2  | ○                 | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2  |       |      | ○ 発生 | ○ 前      |      |                |                |                |        |        |        |                 |                      |
|                        |          | 普  | ○ 2  | ○                 | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2  |       |      | ○ 発生 | ○ 前      |      |                |                |                |        |        |        |                 |                      |
|                        | 近畿<br>中国 | 早  | ○ 2  | ○                 | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2  |       |      | ○ 発生 | ○ 前      |      |                |                |                |        |        |        |                 |                      |
|                        |          | 普  | ○ 2  | ○                 | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2  |       |      | ○ 発生 | ○ 前      |      |                |                |                |        |        |        |                 |                      |
|                        | 四国       | 早  | ○ 2  | ○                 | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2  |       |      | ○ 発生 | ○ 前      |      |                |                |                |        |        |        |                 |                      |
|                        |          | 普  | ○ 2  | ○                 | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2  |       |      | ○ 発生 | ○ 前      |      |                |                |                |        |        |        |                 |                      |
|                        | 九州       | 早  | ○ 2  | ○                 | ○ 2  | ○ 始  | ○ 2  |      |       |      | ○ 発生 | ○ 前      |      |                |                |                |        |        |        |                 |                      |
|                        |          | 普  | ○ 2  | ○                 | ○ 2  | ○ 2  | ○ 2  |      |       |      | ○ 発生 | ○ 前      |      |                |                |                |        |        |        |                 |                      |

## IX 一年生持続型除草剤

| 処理法                      | 地域名      | 作期 | ハ' E | 一年<br>広葉<br>マハ' I | ホ' R | ウ' K | ミ' Y | ヘ' O | クロ' G | オ' M | ヒ' M | 藻類<br>剥離 | 処理時期           | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土<br>1.5 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意 |
|--------------------------|----------|----|------|-------------------|------|------|------|------|-------|------|------|----------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|-----------------|------------|
| IX<br>HGX-983<br>7077' 粉 | 北海道      |    | ● 2  | ●                 | ● 始  |      |      | ● 始  |       |      |      | ● 前      | +0 ~ / E' I 2L | 50<br>ml/a     | ●              | ●      | ●      | ●      | 2               |            |
|                          | 東北       |    |      |                   |      |      |      |      |       |      |      |          |                |                |                |        |        |        |                 |            |
|                          | 北陸       |    |      |                   |      |      |      |      |       |      |      |          |                |                |                |        |        |        |                 |            |
|                          | 関東<br>東海 | 早  |      |                   |      |      |      |      |       |      |      |          |                |                |                |        |        |        |                 |            |
|                          |          | 普  |      |                   |      |      |      |      |       |      |      |          |                |                |                |        |        |        |                 |            |
|                          | 近畿<br>中国 | 早  |      |                   |      |      |      |      |       |      |      |          |                |                |                |        |        |        |                 |            |
|                          |          | 普  |      |                   |      |      |      |      |       |      |      |          |                |                |                |        |        |        |                 |            |
|                          | 四国       | 早  |      |                   |      |      |      |      |       |      |      |          |                |                |                |        |        |        |                 |            |
|                          |          | 普  |      |                   |      |      |      |      |       |      |      |          |                |                |                |        |        |        |                 |            |
|                          | 九州       | 早  |      |                   |      |      |      |      |       |      |      |          |                |                |                |        |        |        |                 |            |
|                          |          | 普  |      |                   |      |      |      |      |       |      |      |          |                |                |                |        |        |        |                 |            |

| 処理法                             | 地域名      | 作期 | ハ' E  | 一年<br>広葉<br>マハ' I | ホ' R | ウ' K | ミ' Y | ヘ' O | クロ' G | オ' M | ヒ' M | 藻類<br>剥離 | 処理時期             | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土<br>1.5 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意 |
|---------------------------------|----------|----|-------|-------------------|------|------|------|------|-------|------|------|----------|------------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|-----------------|------------|
| VII-1として<br>MY-100MS<br>7077' 粉 | 北海道      |    |       |                   |      |      |      |      |       |      |      |          | +0 ~ / E' I 1.5L | 50<br>ml/a     |                |        |        |        | 1.5             |            |
|                                 | 東北       |    |       |                   |      |      |      |      |       |      |      |          |                  |                |                |        |        |        |                 |            |
|                                 | 北陸       |    |       |                   |      |      |      |      |       |      |      |          |                  |                |                |        |        |        |                 |            |
|                                 | 関東<br>東海 | 早  |       |                   |      |      |      |      |       |      |      |          |                  |                |                |        |        |        |                 |            |
|                                 |          | 普  | ● 1.5 | ●                 | ● 始  |      | ● 始  |      |       |      |      |          |                  |                |                |        |        |        |                 |            |
|                                 | 近畿<br>中国 | 早  |       |                   |      |      |      |      |       |      |      |          |                  |                |                |        |        |        |                 |            |
|                                 |          | 普  | ● 1.5 | ●                 | ● 始  | ● 始  | ● 始  |      |       |      |      |          |                  |                |                |        |        |        |                 |            |
|                                 | 四国       | 早  |       |                   |      |      |      |      |       |      |      |          |                  |                |                |        |        |        |                 |            |
|                                 |          | 普  | ● 1.5 | ●                 | ● 始  | ● 始  | ● 始  |      |       |      |      |          |                  |                |                |        |        |        |                 |            |
|                                 | 九州       | 早  |       |                   |      |      |      |      |       |      |      |          |                  |                |                |        |        |        |                 |            |
|                                 |          | 普  | ● 1.5 | ●                 | ● 始  | ● 始  | ● 始  |      |       |      |      |          |                  |                |                |        |        |        |                 |            |

X 0.5kg及び0.25kg粒剤等  
移植後土壌処理剤

|                           | 処理法  | 地域名      | 作期 | ハ' E | 一年<br>広葉<br>マハ' I | ホ' R | ウ' K | ミ' Y | ヘ' O | クロ' G | オ' M | ヒ' M | 藻類<br>剥離 | 処理時期                 | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土<br>1.5 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意            |     |
|---------------------------|------|----------|----|------|-------------------|------|------|------|------|-------|------|------|----------|----------------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------------|-----|
| X<br>KUH-992<br>-0.25kg 粒 | 土壌処理 | 北海道      |    | ● 1  | ●                 | ● 始  |      |      | ● 前  |       |      |      |          | +1 ~ +5 (ハ' E 1L)    | 25<br>g/a      | ●              | ●      | ●      | ●      | 2               | (28)<br>(34)<br>(48)  |     |
|                           |      | 東北       |    | ● 始  | ●                 | ● 始  |      | ● 前  | ● 始  |       |      |      |          | +1 ~ +5 (ハ' E 1始)    |                |                |        | ●      | ●      | 1               | (28)<br>(34)<br>(48)  |     |
|                           |      | 北陸       |    | ● 1  | ●                 | ● 始  |      | ● 始  |      |       |      |      |          | +1 ~ +5<br>(ハ' E 1L) |                |                | ●      | ●      | ●      | 1.5             | 一発の処理<br>前延ばす。<br>前使用 |     |
|                           |      | 関東<br>東海 | 早  |      |                   |      |      |      |      |       |      |      |          |                      |                |                |        | ●      | ●      | ●               |                       | 2   |
|                           |      |          | 普  | ● 1  | ●                 | ● 始  |      |      |      |       |      |      |          |                      |                |                |        |        | ●      | ●               |                       |     |
|                           |      | 近畿<br>中国 | 早  |      |                   |      |      |      |      |       |      |      |          |                      |                |                |        |        | ●      | ●               |                       | 1.5 |
|                           |      |          | 普  | ● 始  | ●                 | ● 始  |      | ● 始  |      |       |      |      |          |                      |                |                |        |        | ●      | ●               |                       |     |
|                           |      | 四国       | 早  |      |                   |      |      |      |      |       |      |      |          |                      |                |                |        |        | ●      | ●               |                       |     |
|                           |      |          | 普  | ● 始  | ●                 | ● 始  |      | ● 始  |      |       |      |      |          |                      |                |                |        |        | ●      | ●               |                       |     |
|                           |      | 九州       | 早  |      |                   |      |      |      |      |       |      |      |          |                      |                |                |        |        | ●      | ●               |                       |     |
|                           | 普    | ● 始      | ●  | ● 始  |                   | ● 始  |      |      |      |       |      |      |          |                      |                | ●              | ●      |        |        |                 |                       |     |

一発処理剤

| 処理法                      | 地域名 | 作期 | ハ'エ | 一年広葉マハ'イ | ホ'ルイ | ウ'リカ | ミ'カ'リ | ヘ'アモ'タ'カ | クロ'ク'イ | モ'タ'カ | ヒ'ルム'シ'ロ | 藻類剥離 | セ'リ | 処理時期                      | 使用量・製品 | 砂壌土 | 壤土 | 埴壌土 | 埴土  | 減水深cm/d | 使用上の注意 |
|--------------------------|-----|----|-----|----------|------|------|-------|----------|--------|-------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-----|----|-----|-----|---------|--------|
| X<br>AGH-987<br>-0.5kg 粒 | 北海道 |    |     |          |      |      |       |          |        |       |          |      |     |                           | 50 g/a |     |    |     |     |         | (48)   |
|                          | 東北  |    | ●2  | ●        | ●2   | ●始   | ●始    | ●始       |        |       |          |      |     | +5~ハ'エ2L                  |        |     |    | ●●  | 1.5 |         |        |
|                          | 北陸  |    | ●2  | ●        | ●始   | ●前   | ●前    |          |        |       |          |      |     |                           |        |     |    | ●●  |     |         |        |
|                          | 関東海 | 早  |     |          |      |      |       |          |        |       |          |      |     | 満水周縁部<br>散布可能<br>(東北, 北陸) |        |     |    | ●●  |     |         |        |
|                          | 近畿中 | 早  |     |          |      |      |       |          |        |       |          |      |     |                           |        |     |    |     |     |         |        |
|                          | 近畿中 | 普  |     |          |      |      |       |          |        |       |          |      |     |                           |        |     |    |     |     |         |        |
|                          | 四国  | 早  |     |          |      |      |       |          |        |       |          |      |     |                           |        |     |    |     |     |         |        |
|                          | 九州  | 早  |     |          |      |      |       |          |        |       |          |      |     |                           |        |     |    |     |     |         |        |

|                                                  | 処理法  | 地域名  | 作期 | ハ'エ  | 一年広葉マハ'イ | ホ'ルイ | ウ'リカ | ミ'カ'リ | ヘ'アモ'タ'カ | クロ'ク'イ | オモ'タ'カ | ヒ'ルム'シ'ロ | 藻類剥離   | セ'リ    | 処理時期        | 使用量・製品                       | 砂壌土 | 壤土   | 埴壌土 | 埴土 | 減水深cm/d | 使用上の注意               |  |
|--------------------------------------------------|------|------|----|------|----------|------|------|-------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|-------------|------------------------------|-----|------|-----|----|---------|----------------------|--|
| X<br>AKD-7105<br>-0.5kg 粒<br>〔旧NC-386<br>-0.5kg〕 | 土壌処理 | 北海道  |    | ○2   | ○        | ○始   | ○始   |       | ○前       |        |        | ○発生期     | ○前     | ○再生前～始 | +5～/ハ' E 2L | 50<br>g/a                    |     | ○1.5 | ○   | ○  | 2       | (34)<br>(41)<br>(48) |  |
|                                                  |      | 東北   |    | ○2   | ○        | ○2   | ○始   | ○2    |          |        |        | ○期       | ○前     | ○再生前～始 |             |                              |     |      | ○   | ○  | 1.5     |                      |  |
|                                                  |      | 北陸   |    | ○2   | ○        | ○2   | ○始   | ○始    | ○始       |        |        |          |        |        |             |                              |     | ○    | ○   |    |         |                      |  |
|                                                  |      | 関東海  | 早  | ●1.5 | ●        | ●始   | ●始   | ●始    |          |        |        |          | ○発生期   | ●前     | ○再生前～始      | +5～/ハ' E 1.5L<br>+5～/ハ' E 2L |     |      | ●   | ●  | 2       |                      |  |
|                                                  |      | 普    | ○2 | ○    | ○始       | ○始   | ○始   |       |          |        | ○期     | ○前       | ○再生前～始 |        |             |                              |     | ○    | ○   | 1  |         |                      |  |
|                                                  |      | 近畿中国 | 早  |      |          |      |      |       |          |        |        |          |        |        |             |                              |     |      |     |    |         |                      |  |
|                                                  |      | 普    | ○2 | ○    | ○2       | ○2   | ○2   |       |          |        |        | ○前       | ○      |        |             |                              |     | ○    | ○   |    |         |                      |  |
|                                                  |      | 四国   | 早  |      |          |      |      |       |          |        |        |          |        | ○前     | ○再生前～始      |                              |     |      |     |    |         |                      |  |
|                                                  |      | 普    | ○2 | ○    | ○2       | ○2   | ○2   |       |          |        |        |          | ○期     | ○前     | ○再生前～始      |                              |     |      | ○   | ○  |         |                      |  |
|                                                  |      | 九州   | 早  | ●2   | ●        | ●2   | ●始   | ●始    |          |        |        |          | ○発生期   | ●前     | ○再生前～始      | 減水周縁部<br>散布可能                |     |      |     | ○  | ○       |                      |  |
|                                                  |      | 普    | ●2 | ●    | ●2       | ●始   | ●始   |       |          |        | ●発生期   | ●前       | ●      |        |             |                              |     |      | ●   | ●  | 1.5     |                      |  |

X KUHI-003D-0.25kg 粒「継」

X KUHI-003K-0.25kg 粒「継」

| 処理法                         | 地域名  | 作期 | ハ'エ | 一年<br>広葉<br>マハ'イ | ホ'ルイ | ウ'リカ | ミ'カ'リ | ヘ'アモ<br>ダ'カ | クロ'ク'イ | オ'タ'カ | ヒ'ルムシ'ロ | 藻類剥<br>離 | セ'リ        | 処理時期     | 使用<br>量・製<br>品 | 砂<br>壌土 | 埴<br>土 | 埴<br>壌土 | 埴<br>土 | 減水深<br>cm/d                        | 使用上の<br>注意           |
|-----------------------------|------|----|-----|------------------|------|------|-------|-------------|--------|-------|---------|----------|------------|----------|----------------|---------|--------|---------|--------|------------------------------------|----------------------|
| X<br>KUHI-986D<br>-0.25kg 粒 | 北海道  |    |     |                  |      |      |       |             |        |       |         |          | 再生<br>前~始  |          | 25<br>g/a      |         |        |         |        |                                    | (34)<br>(41)<br>(48) |
|                             | 東北   |    |     |                  |      |      |       |             |        |       |         |          | 再生<br>前~始  |          |                |         |        |         |        |                                    |                      |
|                             | 北陸   |    | ○2  | ○                | ○始   | ○始   | ○始    |             |        |       |         |          | ●始         | +1~ハ'エ2L |                | ●*      | ○      | ○       | 2      | *砂壌土<br>厚+5~<br>(北陸, 近畿<br>中国, 四国) |                      |
|                             | 関東海  | 早  | ●2  | ●                | ●始   | ●2   | ●始    |             |        |       | 発生期     | ○        | ●再生<br>前~始 | +5~ハ'エ2L |                | ●1      | ●      | ●       |        |                                    |                      |
|                             | 関東海  | 普  | ○2  | ○                | ○始   | ○始   | ○始    |             |        |       | ○期      | ○前       | ○再生<br>前~始 |          |                | ○       | ○      | ○       |        |                                    |                      |
|                             | 近畿中国 | 早  |     |                  |      |      |       |             |        |       | 発生期     | ○        | ○再生<br>前~始 | +1~ハ'エ2L |                |         |        |         |        |                                    |                      |
|                             | 近畿中国 | 普  | ○2  | ○                | ○2   | ●2   | ○2    |             |        |       | ●発生期    | ○前       | ○          |          |                | ●*      | ○      | ○       | 1      |                                    |                      |
|                             | 四国   | 早  | ○2  | ○                | ○2   | ●2   | ○2    |             |        |       | 発生期     | ○        | ○再生<br>前~始 |          |                | ●*      | ○      | ○       |        | 湛水周縁部<br>散布可能                      |                      |
|                             | 四国   | 普  | ○2  | ○                | ○2   | ○2   | ○2    |             |        |       | ●発生期    | ○前       | ○          |          |                | ●*      | ○      | ○       |        |                                    |                      |
|                             | 九州   | 早  | ●2  | ●                | ●2   | ●2   | ●2    | ●2          |        |       | ●発生期    | ●        | ●再生<br>前~始 | +5~ハ'エ2L |                | ●       | ●      | ●       | 1.5    |                                    |                      |
|                             | 九州   | 普  | ●2  | ●                | ●2   | ●2   | ●2    |             |        |       | ●発生期    |          | ●再生<br>前~始 |          |                | ●       | ●      | ●       |        |                                    |                      |

| 処理法                         | 地域名      | 作期     | ハ'エ | 一年<br>広葉マハ'イ | ホ'ルイ | ウ'リカ | ミ'カ'リ | ヘ'アモ'タ'カ | クロ'ク'イ | オモ'タ'カ | ヒ'ルム'シ'ロ | 藻類剥離 | セリ  | 処理時期                          | 使用<br>量・製品 | 砂<br>壌土       | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>cm/d | 使用上の<br>注意 |  |
|-----------------------------|----------|--------|-----|--------------|------|------|-------|----------|--------|--------|----------|------|-----|-------------------------------|------------|---------------|--------|--------|--------|------------|------------|--|
| X<br>KUHI-988K<br>-0.25kg 粒 | 北海道      |        | ○2  | ○            | ○始   | ○2   |       | ○前       |        |        | ○発生      | ○前   | ○再生 | +5～ハ'エ2L<br><br>満水周縁部<br>散布可能 | 25<br>g/a  |               | ○1.5   | ○      | ○      | 2          | (48)       |  |
|                             | 東北       |        | ○2  | ○            | ○2   | ○始   | ○始    | ○2       |        |        | ○期       | ●前   | ○前  |                               |            |               | ●      | ●      | ○      | 1.5        |            |  |
|                             | 北陸       |        |     |              |      |      |       |          |        |        |          |      | 始   |                               |            |               |        |        |        |            |            |  |
|                             | 関東<br>東海 | 早<br>普 |     |              |      |      |       |          |        |        |          |      |     |                               |            | 満水周縁部<br>散布可能 |        |        |        |            |            |  |
|                             | 近畿<br>中国 | 早<br>普 |     |              |      |      |       |          |        |        |          |      |     |                               |            |               |        |        |        |            |            |  |
|                             | 四国       | 早<br>普 |     |              |      |      |       |          |        |        |          |      |     |                               |            |               |        |        |        |            |            |  |
|                             | 九州       | 早<br>普 |     |              |      |      |       |          |        |        |          |      |     |                               |            |               |        |        |        |            |            |  |
|                             |          |        |     |              |      |      |       |          |        |        |          |      |     |                               |            |               |        |        |        |            |            |  |
|                             |          |        |     |              |      |      |       |          |        |        |          |      |     |                               |            |               |        |        |        |            |            |  |

|                             | 処理法  | 地域名      | 作期     | 1年<br>広葉<br>マハイ | ホリ | ウリカ     | ミヤ<br>ガリ | ヘラモ<br>ダカ | クロ<br>グ | オモ<br>カ | ヒルム<br>シ | 藻類<br>剥離 | セリ       | 処理時期                    | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土 | 壊<br>土 | 増<br>土 | 増<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意           |
|-----------------------------|------|----------|--------|-----------------|----|---------|----------|-----------|---------|---------|----------|----------|----------|-------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|----------------------|
| X<br>MK-243D(L)<br>-0.5kg 粒 | 土壌処理 | 北海道      |        |                 |    |         |          |           |         |         |          |          | 再生<br>前  | +5~10℃<br>湛水周縁部<br>散布可能 | 50<br>g/a      | ●      | ○      | ○      | ○      | 2               | (28)<br>(34)<br>(48) |
|                             |      | 東北       |        |                 |    |         |          |           |         |         |          |          | ○始       |                         |                |        |        |        |        |                 |                      |
|                             |      | 北陸       |        | ○2              | ○  | ○2      | ○2       | ○2        |         |         |          |          | ○始       |                         |                |        |        |        |        |                 |                      |
|                             |      | 関東<br>東海 | 早<br>普 | ○2<br>○         | ○  | ○2<br>○ | ○2<br>○  | ○2<br>○   |         |         |          | ○発<br>生期 | ○前<br>○  |                         |                |        |        |        |        |                 |                      |
|                             |      | 近畿<br>中国 | 早<br>普 | ●2<br>○         | ●  | ●2<br>○ | ●始<br>○  | ●2<br>○   |         |         |          | ●発<br>生期 | ●前<br>○  |                         |                |        |        |        |        |                 |                      |
|                             |      | 四国       | 早<br>普 | ●2<br>○         | ●  | ●2<br>○ | ●始<br>○  | ●2<br>○   |         |         |          | ●発<br>生期 | ●前<br>○  |                         |                |        |        |        |        |                 |                      |
|                             |      | 九州       | 早<br>普 | ○2<br>○         | ○  | ○2<br>○ | ○2<br>○  | ○2<br>○   |         |         |          | ○発<br>生期 | ○前<br>○  |                         |                |        |        |        |        |                 |                      |
|                             |      |          |        |                 |    |         |          |           |         |         |          |          | ○再<br>生前 |                         |                |        |        |        |        |                 |                      |
|                             |      |          |        |                 |    |         |          |           |         |         |          |          | ○再<br>生前 |                         |                |        |        |        |        |                 |                      |
|                             |      |          |        |                 |    |         |          |           |         |         |          |          | ○再<br>生前 |                         |                |        |        |        |        |                 |                      |
|                             |      |          |        |                 |    |         |          |           |         |         |          |          | ○再<br>生前 |                         |                |        |        |        |        |                 |                      |

|                           | 処理法  | 地域名      | 作期     | 1年<br>広葉<br>マハイ | ホリ | ウリカ | ミヤ<br>ガリ | ヘラモ<br>ダカ | クロ<br>グ | オモ<br>カ | ヒルム<br>シ | 藻類<br>剥離 | セリ      | 処理時期                    | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土 | 壊<br>土 | 増<br>土 | 増<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意 |
|---------------------------|------|----------|--------|-----------------|----|-----|----------|-----------|---------|---------|----------|----------|---------|-------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|------------|
| X<br>MK-243DS<br>-0.5kg 粒 | 土壌処理 | 北海道      |        | ○2              | ○  | ○始  | ○2       |           |         |         |          | ○発<br>生期 | ○前<br>○ | +5~10℃<br>湛水周縁部<br>散布可能 | 50<br>g/a      | ●      | ○      | ○      | ○      | 2               | (48)       |
|                           |      | 東北       |        | ○2              | ○  | ○2  | ○2       | ○2        | ○2      |         |          | ○期       | ○前<br>○ |                         |                |        |        |        |        |                 |            |
|                           |      | 北陸       |        |                 |    |     |          |           |         |         |          |          | 始       |                         |                |        |        |        |        |                 |            |
|                           |      | 関東<br>東海 | 早<br>普 |                 |    |     |          |           |         |         |          |          |         |                         |                |        |        |        |        |                 |            |
|                           |      | 近畿<br>中国 | 早<br>普 |                 |    |     |          |           |         |         |          |          |         |                         |                |        |        |        |        |                 |            |
|                           |      | 四国       | 早<br>普 |                 |    |     |          |           |         |         |          |          |         |                         |                |        |        |        |        |                 |            |
|                           |      | 九州       | 早<br>普 |                 |    |     |          |           |         |         |          |          |         |                         |                |        |        |        |        |                 |            |
|                           |      |          |        |                 |    |     |          |           |         |         |          |          |         |                         |                |        |        |        |        |                 |            |
|                           |      |          |        |                 |    |     |          |           |         |         |          |          |         |                         |                |        |        |        |        |                 |            |
|                           |      |          |        |                 |    |     |          |           |         |         |          |          |         |                         |                |        |        |        |        |                 |            |
|                           |      |          |        |                 |    |     |          |           |         |         |          |          |         |                         |                |        |        |        |        |                 |            |
|                           |      |          |        |                 |    |     |          |           |         |         |          |          |         |                         |                |        |        |        |        |                 |            |

|                          | 処理法  | 地域名      | 作期     | 1年<br>広葉<br>マハイ | ホリ | ウリカ     | ミヤ<br>ガリ | ヘラモ<br>ダカ | クロ<br>グ | オモ<br>カ | ヒルム<br>シ | 藻類<br>剥離 | セリ       | 処理時期                                         | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土 | 壊<br>土 | 増<br>土 | 増<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意           |
|--------------------------|------|----------|--------|-----------------|----|---------|----------|-----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|----------------------|
| X<br>MK-243N<br>-0.5kg 粒 | 土壌処理 | 北海道      |        | ○2              | ○  | ○始      | ○2       |           |         |         |          | ○発<br>生期 | ○前<br>○  | +5~10℃<br>湛水周縁部<br>散布可能<br>(東北・関東・<br>東海~九州) | 50<br>g/a      | ●      | ○      | ○      | ○      | 2               | (28)<br>(34)<br>(48) |
|                          |      | 東北       |        | ○2              | ○  | ○2      | ●始       | ○2        | ○2      |         |          | ○期       | ○前<br>○  |                                              |                |        |        |        |        |                 |                      |
|                          |      | 北陸       |        | ○2              | ○  | ○2      | ○2       | ○始        |         |         |          |          | ○再<br>生前 |                                              |                |        |        |        |        |                 |                      |
|                          |      | 関東<br>東海 | 早<br>普 | ○2<br>○         | ○  | ○2<br>○ | ○2<br>○  | ○2<br>○   |         |         |          | ○発<br>生期 | ○前<br>○  |                                              |                |        |        |        |        |                 |                      |
|                          |      | 近畿<br>中国 | 早<br>普 | ●2<br>○         | ●  | ●2<br>○ | ●始<br>○  | ●始<br>○   |         |         |          | ●発<br>生期 | ●前<br>○  |                                              |                |        |        |        |        |                 |                      |
|                          |      | 四国       | 早<br>普 | ●2<br>○         | ●  | ●2<br>○ | ●始<br>○  | ●始<br>○   |         |         |          | ●発<br>生期 | ●前<br>○  |                                              |                |        |        |        |        |                 |                      |
|                          |      | 九州       | 早<br>普 | ○2<br>○         | ○  | ○2<br>○ | ○2<br>○  | ○2<br>○   |         |         |          | ○発<br>生期 | ○前<br>○  |                                              |                |        |        |        |        |                 |                      |
|                          |      |          |        |                 |    |         |          |           |         |         |          |          | ○再<br>生前 |                                              |                |        |        |        |        |                 |                      |
|                          |      |          |        |                 |    |         |          |           |         |         |          |          | ○再<br>生前 |                                              |                |        |        |        |        |                 |                      |
|                          |      |          |        |                 |    |         |          |           |         |         |          |          | ○再<br>生前 |                                              |                |        |        |        |        |                 |                      |
|                          |      |          |        |                 |    |         |          |           |         |         |          |          | ○再<br>生前 |                                              |                |        |        |        |        |                 |                      |
|                          |      |          |        |                 |    |         |          |           |         |         |          |          | ○再<br>生前 |                                              |                |        |        |        |        |                 |                      |

|                          | 処理法  | 地域名      | 作期     | 1年<br>広葉<br>マハイ | ホリ | ウリカ | ミヤ<br>ガリ | ヘラモ<br>ダカ | クロ<br>グ | オモ<br>カ | ヒルム<br>シ | 藻類<br>剥離 | セリ      | 処理時期                    | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土 | 壊<br>土 | 増<br>土 | 増<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意 |
|--------------------------|------|----------|--------|-----------------|----|-----|----------|-----------|---------|---------|----------|----------|---------|-------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|------------|
| X<br>NII-801<br>-0.5kg 粒 | 土壌処理 | 北海道      |        | ○2              | ○  | ○始  | ○2       |           |         |         |          | ○発<br>生期 | ○前<br>○ | +5~10℃<br>湛水周縁部<br>散布可能 | 50<br>g/a      | ●      | ○      | ○      | ○      | 2               | (48)       |
|                          |      | 東北       |        | ○2              | ○  | ○2  | ○始       | ○2        |         |         |          | ○期       | ○前<br>○ |                         |                |        |        |        |        |                 |            |
|                          |      | 北陸       |        |                 |    |     |          |           |         |         |          |          | 始       |                         |                |        |        |        |        |                 |            |
|                          |      | 関東<br>東海 | 早<br>普 |                 |    |     |          |           |         |         |          |          |         |                         |                |        |        |        |        |                 |            |
|                          |      | 近畿<br>中国 | 早<br>普 |                 |    |     |          |           |         |         |          |          |         |                         |                |        |        |        |        |                 |            |
|                          |      | 四国       | 早<br>普 |                 |    |     |          |           |         |         |          |          |         |                         |                |        |        |        |        |                 |            |
|                          |      | 九州       | 早<br>普 |                 |    |     |          |           |         |         |          |          |         |                         |                |        |        |        |        |                 |            |
|                          |      |          |        |                 |    |     |          |           |         |         |          |          |         |                         |                |        |        |        |        |                 |            |
|                          |      |          |        |                 |    |     |          |           |         |         |          |          |         |                         |                |        |        |        |        |                 |            |
|                          |      |          |        |                 |    |     |          |           |         |         |          |          |         |                         |                |        |        |        |        |                 |            |
|                          |      |          |        |                 |    |     |          |           |         |         |          |          |         |                         |                |        |        |        |        |                 |            |
|                          |      |          |        |                 |    |     |          |           |         |         |          |          |         |                         |                |        |        |        |        |                 |            |

| 処理法                     | 地域名 | 作期 | ハ'エ | 一年広葉マ'ハ'イ | ホ'ルイ | ウ'リカ | ミ'カ'ヤ'リ | ヘ'ラ'オ'モ'タ'カ | クロ'グ'ワイ | オ'モ'グ'カ | ヒ'ル'ム'シ'ロ | 藻類腐離 | セリ   | 処理時期          | 使用量・製品 | 砂壌土 | 壤土 | 埴壌土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意 |
|-------------------------|-----|----|-----|-----------|------|------|---------|-------------|---------|---------|-----------|------|------|---------------|--------|-----|----|-----|----|----------|--------|
| X<br>NH-802<br>-0.5kg 粒 | 北海道 |    |     |           |      |      |         |             |         |         |           |      |      |               | 50 g/a |     |    |     |    |          | (28)   |
|                         | 東北  |    |     |           |      |      |         |             |         |         |           |      |      |               |        |     |    |     |    |          | (34)   |
|                         | 北陸  |    | ○2  | ○         | ○始   | ○始   | ○始      |             |         |         |           | ○前   |      | +5~ノ'エ2L      |        |     | ○  | ○   | ○  | 1.5      | (48)   |
|                         | 関東  | 早  |     |           |      |      |         |             |         |         |           | 発生期  |      | 湛水周縁部<br>散布可能 |        |     | ○  | ○   | ○  |          |        |
|                         | 東海  | 普  | ○2  | ○         | ○2   | ○始   | ○始      |             |         |         | ○前        |      | ○再生前 |               |        |     | ○  | ○   | ○  |          |        |
|                         | 近畿  | 早  |     |           |      |      |         |             |         |         |           |      | ○再生前 |               |        |     |    |     |    |          |        |
|                         | 中国  | 普  | ○2  | ○         | ○2   | ○始   | ○2      |             |         |         |           | ○前   | ○    |               |        |     | ○  | ○   | ○  | 1        |        |
|                         | 四国  | 早  |     |           |      |      |         |             |         |         |           |      | ○再生前 |               |        |     |    |     |    |          |        |
|                         | 普   | ○2 | ○   | ○2        | ○始   | ○2   |         |             |         |         |           | ○前   | ○再生前 |               |        |     | ○  | ○   | ○  |          |        |
|                         | 九州  | 早  |     |           |      |      |         |             |         |         |           | 発生期  |      |               |        |     |    |     |    |          |        |
|                         | 普   | ●2 | ●   | ●2        | ●2   | ●2   |         |             |         |         |           | ●前   | ●    |               |        | ●   | ●  | ●   | ●  | 1.5      |        |

一年生持続型

X MK-243S-0.5kg 粒 「縫」

## X I 生物除草剤

X I MTB-951 「縫」

## ジヤンボ剤

## II-2 移植前後土壌処理

| 処理法                      | 地域名 | 作期 | ハ'エ | 一年広葉マ'ハ'イ | ホ'ルイ | ウ'リカ | ミ'カ'ヤ'リ | ヘ'ラ'オ'モ'タ'カ | クロ'グ'ワイ | オ'モ'グ'カ | ヒ'ル'ム'シ'ロ | 藻類腐離 | セリ | 処理時期                       | 使用量・製品   | 砂壌土 | 壤土 | 埴壌土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意                      |
|--------------------------|-----|----|-----|-----------|------|------|---------|-------------|---------|---------|-----------|------|----|----------------------------|----------|-----|----|-----|----|----------|-----------------------------|
| II-2<br>KPP-2005<br>ジヤンボ | 北海道 |    | ○1  | ○         | ○始   |      |         | ○始          |         |         |           |      |    | +0~+5 (ノ'エ'エ1L)            | 50gx13/a | ●   | ○  | ○   | ○  | 2        | (45)                        |
|                          | 東北  |    | ○1  | ○         | ○始   |      |         | ○始          |         |         |           |      |    | +1~+5 (ノ'エ'エ1L)            |          | ○   | ○  | ○   | ○  | 1.5      | (46)                        |
|                          | 北陸  |    | ○1  | ○         | ○前   |      |         | ○前          |         |         |           |      |    | +1~+5 (ノ'エ'エ1L)            |          | ○   | ○  | ○   | ○  |          | 体系処理の<br>前50gx13/a<br>処理が可能 |
|                          | 関東  | 早  | ●前  | ●         | ●前   |      |         | ●前          |         |         |           |      |    | +1~+5 (ノ'エ'エ1L)            |          |     |    | ●   | ●  | 1        |                             |
|                          | 東海  | 普  | ○1  | ○         | ○始   |      |         | ○始          |         |         |           |      |    | +1~+5 (ノ'エ'エ1L)            |          |     |    |     |    |          |                             |
|                          | 近畿  | 早  | ●1  | ●         | ●始   |      |         | ●前          |         |         |           |      |    | +0~+5 (ノ'エ'エ1L)            |          |     |    |     |    |          |                             |
|                          | 中国  | 普  | ○1  | ○         | ○始   |      |         | ○前          |         |         |           |      |    |                            |          |     |    |     |    |          |                             |
|                          | 四国  | 早  | ●1  | ●         | ●始   |      |         | ●前          |         |         |           |      |    | 植代後~-4,<br>+1~+5 (ノ'エ'エ1L) |          | ○   | ○  | ○   | ○  | 2        |                             |
|                          | 普   | ○1 | ○   | ○始        |      |      | ○前      |             |         |         |           |      |    |                            |          | ○   | ○  | ○   | ○  | 2        |                             |
|                          | 九州  | 早  | ●1  | ●         | ●前   |      |         | ●前          |         |         |           |      |    |                            |          | ○   | ○  | ○   | ○  | 1.5      |                             |
|                          | 普   | ○1 | ○   | ○始        |      |      |         |             |         |         |           |      |    |                            |          | ○   | ○  | ○   | ○  | 1        |                             |

II-2 MAT-159 ジヤンボ 「縫」

| 処理法                    | 地域名 | 作期 | ハ'エ | 一年広葉マ'ハ'イ | ホ'ルイ | ウ'リカ | ミ'カ'ヤ'リ | ヘ'ラ'オ'モ'タ'カ | クロ'グ'ワイ | オ'モ'グ'カ | ヒ'ル'ム'シ'ロ | 藻類腐離 | セリ | 処理時期                       | 使用量・製品   | 砂壌土 | 壤土 | 埴壌土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意                |
|------------------------|-----|----|-----|-----------|------|------|---------|-------------|---------|---------|-----------|------|----|----------------------------|----------|-----|----|-----|----|----------|-----------------------|
| II-2<br>SW-972<br>ジヤンボ | 北海道 |    | ○1  | ○         | ○始   | ○始   |         |             |         |         |           |      |    | +1~+10 (ノ'エ'エ1L)           | 30gx13/a | ●   | ○  | ○   | ○  | 2        | (28)                  |
|                        | 東北  |    | ○1  | ○         | ○始   | ○始   |         |             |         |         |           |      |    | 植代後~-4,<br>+1~+5 (ノ'エ'エ1L) |          | ○   | ○  | ○   | ○  | 1.5      | (45)                  |
|                        | 北陸  |    | ○1  | ○         | ○始   | ○始   |         |             |         |         |           |      |    |                            |          | ○   | ○  | ○   | ○  | 2        | (46)                  |
|                        | 関東  | 早  | ○1  | ○         | ○始   | ○始   |         |             |         |         |           |      |    |                            |          | ○   | ○  | ○   | ○  | 1        | 一発型<br>除草剤として<br>使用可能 |
|                        | 東海  | 普  | ○1  | ○         | ○始   | ○始   |         |             |         |         |           |      |    |                            |          | ○   | ○  | ○   | ○  | 2        |                       |
|                        | 近畿  | 早  | ●1  | ●         | ●始   | ●前   |         |             |         |         |           |      |    |                            |          | ○   | ○  | ○   | ○  | 1        |                       |
|                        | 中国  | 普  | ○1  | ○         | ○始   | ○始   |         |             |         |         |           |      |    |                            |          | ○   | ○  | ○   | ○  | 2        |                       |
|                        | 四国  | 早  | ●1  | ●         | ●始   | ●前   |         |             |         |         |           |      |    |                            |          |     | ○  | ○   | ○  |          |                       |
|                        | 普   | ○1 | ○   | ○始        | ○始   |      |         |             |         |         |           |      |    |                            |          |     | ○  | ○   | ○  |          |                       |
|                        | 九州  | 早  | ○1  | ○         | ○始   | ○始   |         |             |         |         |           |      |    |                            |          |     | ○  | ○   | ○  | 1.5      |                       |
|                        | 普   | ○1 | ○   | ○始        | ○始   |      |         |             |         |         |           |      |    |                            |          |     | ○  | ○   | ○  |          |                       |

|                       | 処理法  | 地域名 | 作期 | ノビエ | 一年広葉ツバハイ | ホタルイ | ワリカ | ミヤガツリ | ヘラオモダ'カ | クログワイ | オモダ'カ | ヒルムシロ | 藻類剥離 | 処理時期                        | 使用量・製品       | 砂壌土 | 壤土 | 埴壌土 | 埴土 | 減水深cm/d | 使用上の注意               |
|-----------------------|------|-----|----|-----|----------|------|-----|-------|---------|-------|-------|-------|------|-----------------------------|--------------|-----|----|-----|----|---------|----------------------|
| II-2<br>ブタコロル<br>ジャンボ | 土壌処理 | 北海道 | ●  | 1   | ●        | ●    | 始   | ●     | 前       |       |       |       |      | +1~+5(ノビエIL)                | 50gx<br>13/a | ●   | ●  | ●   | ●  | 2       | (34)<br>(45)<br>(46) |
|                       |      | 東北  | ●  | 1   | ●        | ●    | 始   | ●     | 始       |       |       |       |      | 植代後~-4,<br>+1~+5<br>(ノビエIL) |              |     | ●  | ●   | ●  | 1       |                      |
|                       |      | 北陸  | ●  | 1   | ●        | ●    | 前   | ●     | 前       |       |       |       |      | 植代後~-4,<br>+1~+5(ノビエIL)     |              |     | ●  | ●   | ●  | 1.5     |                      |
|                       |      | 関東  | 早  | ●   | 始        | ●    | ●   | 前     | ●       | 前     |       |       |      |                             |              |     |    | ●   | ●  | ●       | 1                    |
|                       |      | 東海  | 普  | ●   | 1        | ●    | ●   | 始     |         |       |       |       |      |                             |              |     |    |     | ●  | ●       |                      |
|                       |      | 近畿  | 早  |     |          |      |     |       |         |       |       |       |      |                             |              |     |    |     |    |         |                      |
|                       |      | 中国  | 普  | ●   | 1        | ●    | ●   | 始     |         |       |       |       |      |                             |              |     |    | ●   | ●  | ●       |                      |
|                       |      | 四国  | 早  |     |          |      |     |       |         |       |       |       |      |                             |              |     |    |     |    |         |                      |
|                       |      |     | 普  | ●   | 1        | ●    | ●   | 始     |         |       |       |       |      |                             |              |     |    | ●   | ●  | ●       |                      |
|                       |      | 九州  | 早  |     |          |      |     |       |         |       |       |       |      | +1~+5<br>(ノビエIL)            |              |     |    |     |    |         |                      |
|                       |      |     | 普  | ●   | 1        | ●    | ●   | 始     | ●       | 始     |       |       |      |                             |              | ●   | ●  | ●   | ●  | 1.5     |                      |

## II-3 移植後土壌処理

|                        | 処理法  | 地域名 | 作期 | ノビエ | 一年広葉ツバハイ | ホタルイ | ワリカ | ミヤガツリ | ヘラオモダ'カ | クログワイ | オモダ'カ | ヒルムシロ | 藻類剥離 | 処理時期             | 使用量・製品       | 砂壌土 | 壤土 | 埴壌土 | 埴土 | 減水深cm/d | 使用上の注意               |
|------------------------|------|-----|----|-----|----------|------|-----|-------|---------|-------|-------|-------|------|------------------|--------------|-----|----|-----|----|---------|----------------------|
| II-3<br>SB-554<br>ジャンボ | 土壌処理 | 北海道 | ○  | 1   | ○        | ○    | 始   |       | ○       | 始     |       |       |      | +1~+5<br>(ノビエIL) | 50gx<br>13/a | ○   | ○  | ○   | ○  | 1.5     | (34)<br>(45)<br>(47) |
|                        |      | 東北  | ○  | 1   | ○        | ○    | 始   | ○     | 始       |       |       |       |      |                  |              | ○   | ○  | ○   | ○  |         |                      |
|                        |      | 北陸  | ○  | 1   | ○        | ○    | 始   | ○     | 前       |       |       |       |      |                  |              |     | ○  | ○   | ○  | 2       |                      |
|                        |      | 関東  | 早  |     |          |      |     |       |         |       |       |       |      |                  |              |     |    |     |    |         |                      |
|                        |      | 東海  | 普  | ○   | 1        | ○    | ○   | 始     | ○       | 始     |       |       |      |                  |              |     |    | ○   | ○  | ○       | 1                    |
|                        |      | 近畿  | 早  |     |          |      |     |       |         |       |       |       |      |                  |              |     |    |     |    |         |                      |
|                        |      | 中国  | 普  | ○   | 1        | ○    | ○   | 始     | ○       | 前     |       |       |      |                  |              |     |    | ○   | ○  | ○       | 1.5                  |
|                        |      | 四国  | 早  |     |          |      |     |       |         |       |       |       |      |                  |              |     |    |     |    |         |                      |
|                        |      |     | 普  | ○   | 1        | ○    | ○   | 始     | ○       | 前     |       |       |      |                  |              |     |    | ○   | ○  | ○       |                      |
|                        |      | 九州  | 早  |     |          |      |     |       |         |       |       |       |      | +3~+5<br>(ノビエIL) |              |     |    |     |    |         |                      |
|                        |      |     | 普  | ●   | 1        | ●    | ●   | 始     | ●       | 始     |       |       |      |                  |              | ●   | ●  | ●   | ●  |         |                      |

## II-5 適用時期拡大

|                          | 処理法  | 地域名 | 作期 | ノビエ | 一年広葉ツバハイ | ホタルイ | ワリカ | ミヤガツリ | ヘラオモダ'カ | クログワイ | オモダ'カ | ヒルムシロ | 藻類剥離 | 処理時期                          | 使用量・製品         | 砂壌土 | 壤土 | 埴壌土 | 埴土 | 減水深cm/d | 使用上の注意               |
|--------------------------|------|-----|----|-----|----------|------|-----|-------|---------|-------|-------|-------|------|-------------------------------|----------------|-----|----|-----|----|---------|----------------------|
| II-5<br>DEII-112<br>ジャンボ | 葉面処理 | 北海道 | ○  | 4   |          |      |     |       |         |       |       |       |      | +15~+35<br>(ノビエIL, 3L<br>~4L) | 50gx<br>2, 3/a | ○   | ○  | ○   | ○  | 2       | (21)<br>(45)<br>(47) |
|                          |      | 東北  | ○  | 4   |          |      |     |       |         |       |       |       |      |                               |                | ○   | ○  | ○   | ○  |         |                      |
|                          |      | 北陸  | ○  | 4   |          |      |     |       |         |       |       |       |      |                               |                | ○   | ○  | ○   | ○  |         |                      |
|                          |      | 関東  | 早  | ○   | 4        |      |     |       |         |       |       |       |      |                               |                | ○   | ○  | ○   | ○  |         |                      |
|                          |      | 東海  | 普  | ○   | 4        |      |     |       |         |       |       |       |      |                               |                | ○   | ○  | ○   | ○  |         |                      |
|                          |      | 近畿  | 早  | ●   | 4        |      |     |       |         |       |       |       |      |                               |                | ●   | ●  | ●   | ●  |         |                      |
|                          |      | 中国  | 普  | ○   | 4        |      |     |       |         |       |       |       |      |                               |                | ○   | ○  | ○   | ○  |         |                      |
|                          |      | 四国  | 早  | ●   | 4        |      |     |       |         |       |       |       |      |                               |                | ●   | ●  | ●   | ●  |         |                      |
|                          |      |     | 普  | ○   | 4        |      |     |       |         |       |       |       |      |                               |                | ○   | ○  | ○   | ○  |         |                      |
|                          |      | 九州  | 早  | ○   | 4        |      |     |       |         |       |       |       |      |                               |                | ○   | ○  | ○   | ○  |         |                      |
|                          |      |     | 普  | ○   | 4        |      |     |       |         |       |       |       |      |                               |                | ○   | ○  | ○   | ○  |         |                      |

## II-6-(1) クログワイ対象

|                   |      |       |       |
|-------------------|------|-------|-------|
| II-6-(1) NBA-092a | ジャンボ | 「実・継」 | VII参照 |
| II-6-(1) NBA-092b | ジャンボ | 「実・継」 | VII参照 |
| II-6-(1) SB-554   | ジャンボ | 「継」   |       |

## II-6-(2) オモダカ対象

|                   |      |       |       |
|-------------------|------|-------|-------|
| II-6-(2) HSA-971  | ジャンボ | 「実・継」 | VII参照 |
| II-6-(2) NBA-092a | ジャンボ | 「実・継」 | VII参照 |
| II-6-(2) NBA-092b | ジャンボ | 「実・継」 | VII参照 |

## II-6-(6) エノノサヤヌカグサ対象

|                   |      |       |       |
|-------------------|------|-------|-------|
| II-6-(6) NBA-092a | ジャンボ | 「実・継」 | VII参照 |
|-------------------|------|-------|-------|

## VII 一発処理剤

| 処理法                      | 地域名      | 作期 | ハ・エ | 一年<br>広葉<br>ツバキ | ホタル | ウリカ | ミ<br>ガ<br>ヤ<br>リ | ヘ<br>ラ<br>オ<br>モ<br>タ<br>カ | クロ<br>グ<br>リ | オ<br>モ<br>ガ<br>カ | ヒ<br>ル<br>ム<br>シ<br>ロ | 葉<br>表<br>剥<br>離 | セリ           | 処理時期       | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減<br>水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                   |
|--------------------------|----------|----|-----|-----------------|-----|-----|------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|------------------------------|
| VII<br>AC-014C<br>「ジャンボ」 | 北海道      |    | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○ 2 |                  | ○ 2                        |              | ○ 前              | ○ 前                   |                  |              | +5~ノビ I 2L | 50gx<br>27/a   | ○ 5    | ○      | ○      | ○      | ○      | 2                   | (28)<br>(34)<br>(45)<br>(47) |
|                          | 東北       |    | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○ 2 | ○ 2              | ○ 2                        |              |                  | ○ 前                   |                  |              |            |                | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |                     |                              |
|                          | 北陸       |    | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○ 2 | ○ 2              |                            |              |                  |                       | ○ 前              |              |            |                | ●      | ○      | ○      | ○      | ○      |                     |                              |
|                          | 関東<br>東海 | 早  | ○ 2 | ○               | ○ 始 | ○ 始 | ○ 始              |                            |              |                  | ○ 発<br>生<br>期         |                  |              |            |                | ●      | ●      | ○      | ○      | ○      | 1                   |                              |
|                          |          | 普  | ○ 2 | ○               | ○ 始 | ○ 始 | ○ 始              |                            |              |                  |                       |                  |              |            |                | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | 2                   |                              |
|                          | 近畿<br>中国 | 早  | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○ 始 | ○ 2              |                            |              |                  | ○ 発<br>生<br>期         |                  |              |            |                | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | 1                   |                              |
|                          |          | 普  | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○ 2 | ○ 2              |                            |              | ○ 前              |                       | ○ 前              |              |            |                | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | 1.5                 |                              |
|                          | 四国       | 早  | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○ 始 | ○ 2              |                            |              |                  | ○ 発<br>生<br>期         |                  |              |            |                |        | ○      | ○      | ○      | ○      | 1                   |                              |
|                          |          | 普  | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○ 2 | ○ 2              |                            |              | ○ 前              |                       | ○ 前              |              |            |                | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | 1.5                 |                              |
|                          | 九州       | 早  | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○ 2 | ○ 2              |                            |              |                  | ○ 発<br>生<br>期         |                  | 再生<br>前<br>始 |            |                | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | 1                   |                              |
|                          |          | 普  | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○ 2 | ○ 2              |                            |              | ○ 前              | ○ 前                   | ○ 前              | ○            |            |                | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | 1.5                 |                              |

オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(近畿・中国~九州)

| 処理法                         | 地域名      | 作期 | ハ・エ | 一年<br>広葉<br>ツバキ | ホタル | ウリカ | ミ<br>ガ<br>ヤ<br>リ | ヘ<br>ラ<br>オ<br>モ<br>タ<br>カ | クロ<br>グ<br>リ | オ<br>モ<br>ガ<br>カ | ヒ<br>ル<br>ム<br>シ<br>ロ | 葉<br>表<br>剥<br>離 | セリ                 | 処理時期       | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減<br>水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                   |
|-----------------------------|----------|----|-----|-----------------|-----|-----|------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|------------------------------|
| VII<br>AC-014C-50<br>「ジャンボ」 | 北海道      |    | ● 2 | ●               | ● 始 | ● 2 |                  | ● 始                        |              |                  | ● 発<br>生<br>期         | ● 前              | ● 再<br>生<br>前<br>始 | +3~ノビ I 2L | 50gx<br>13/a   |        | ● 1.5  | ●      | ●      | ●      | 2                   | (28)<br>(34)<br>(45)<br>(47) |
|                             | 東北       |    | ● 2 | ●               | ● 2 | ● 始 | ● 2              | ● 始                        |              |                  | ● 発<br>生<br>期         |                  | ●                  |            |                |        | ●      | ●      | ●      | ●      | 1                   |                              |
|                             | 北陸       |    | ● 2 | ●               | ● 始 | ● 始 | ● 始              |                            |              |                  |                       |                  | ● 始                |            |                |        | ●      | ●      | ●      | ●      | 1.5                 |                              |
|                             | 関東<br>東海 | 早  | ● 2 | ●               | ● 始 | ● 始 | ● 始              |                            |              |                  | ● 発<br>生<br>期         |                  |                    |            |                |        | ●      | ●      | ●      | ●      |                     |                              |
|                             |          | 普  | ● 2 | ●               | ● 始 | ● 始 | ● 始              |                            |              |                  |                       |                  |                    |            |                |        | ●      | ●      | ●      | ●      |                     |                              |
|                             | 近畿<br>中国 | 早  | ● 2 | ●               | ● 2 | ● 2 | ● 2              |                            |              |                  |                       |                  |                    |            |                |        | ●      | ●      | ●      | ●      |                     |                              |
|                             |          | 普  | ● 2 | ●               | ● 2 | ● 2 | ● 2              |                            |              |                  |                       |                  |                    |            |                |        | ●      | ●      | ●      | ●      | 2                   |                              |
|                             | 四国       | 早  | ● 2 | ●               | ● 2 | ● 2 | ● 2              |                            |              |                  |                       |                  |                    |            |                |        | ●      | ●      | ●      | ●      |                     |                              |
|                             |          | 普  | ● 2 | ●               | ● 2 | ● 2 | ● 2              |                            |              |                  |                       |                  |                    |            |                |        | ●      | ●      | ●      | ●      |                     |                              |
|                             | 九州       | 早  | ● 2 | ●               | ● 2 | ● 2 | ● 2              |                            |              |                  | ● 発<br>生<br>期         |                  | ● 再<br>生<br>前<br>始 |            |                |        | ●      | ●      | ●      | ●      |                     |                              |
|                             |          | 普  | ● 2 | ●               | ● 2 | ● 2 | ● 2              |                            |              |                  | ● 発<br>生<br>期         |                  | ●                  |            |                |        | ●      | ●      | ●      | ●      |                     |                              |

VII AC-014R 「ジャンボ」 「継」

VII AGH-008 「ジャンボ」 「継」

| 処理法                      | 地域名      | 作期 | ハ・エ | 一年<br>広葉<br>ツバキ | ホタル | ウリカ | ミ<br>ガ<br>ヤ<br>リ | ヘ<br>ラ<br>オ<br>モ<br>タ<br>カ | クロ<br>グ<br>リ | オ<br>モ<br>ガ<br>カ | ヒ<br>ル<br>ム<br>シ<br>ロ | 葉<br>表<br>剥<br>離 | セリ                 | 処理時期       | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減<br>水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                   |
|--------------------------|----------|----|-----|-----------------|-----|-----|------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|------------------------------|
| VII<br>AGH-987<br>「ジャンボ」 | 北海道      |    | ● 2 | ●               | ● 始 | ● 始 |                  | ● 始                        |              |                  | ● 発<br>生<br>期         | ● 前              | ● 再<br>生<br>前<br>始 | +5~ノビ I 2L | 50gx<br>13/a   |        | ● 1.5  | ●      | ●      | ●      | 2                   | (28)<br>(34)<br>(45)<br>(47) |
|                          | 東北       |    | ● 2 | ●               | ● 2 | ● 始 | ● 2              | ● 始                        |              |                  | ● 発<br>生<br>期         |                  | ●                  |            |                |        | ●      | ●      | ●      | ●      | 1.5                 |                              |
|                          | 北陸       |    | ● 2 | ●               | ● 2 | ● 始 | ● 始              |                            |              |                  |                       |                  | ● 始                |            |                |        | ●      | ●      | ●      | ●      | 2                   |                              |
|                          | 関東<br>東海 | 早  | ● 2 | ●               | ● 2 | ● 2 | ● 2              |                            |              |                  | ● 発<br>生<br>期         | ● 前              | ● 再<br>生<br>前<br>始 |            |                |        | ● 1    | ●      | ●      | ●      |                     |                              |
|                          |          | 普  | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○ 始 | ○ 始              |                            |              |                  | ○ 発<br>生<br>期         | ○ 前              | ○ 再<br>生<br>前<br>始 |            |                |        |        | ○      | ○      | ○      | 1                   |                              |
|                          | 近畿<br>中国 | 早  | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○ 2 | ○ 2              |                            |              |                  | ○ 発<br>生<br>期         | ○ 前              | ○ 再<br>生<br>前<br>始 |            |                |        | ●      | ○      | ○      | ○      | 1.5                 |                              |
|                          |          | 普  | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○ 2 | ○ 2              |                            |              |                  | ○ 発<br>生<br>期         | ○ 前              | ○ 再<br>生<br>前<br>始 |            |                |        | ○      | ○      | ○      | ○      |                     |                              |
|                          | 四国       | 早  | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○ 2 | ○ 2              |                            |              |                  | ○ 発<br>生<br>期         | ○ 前              | ○ 再<br>生<br>前<br>始 |            |                |        | ●      | ○      | ○      | ○      |                     |                              |
|                          |          | 普  | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○ 2 | ○ 2              |                            |              |                  | ○ 発<br>生<br>期         | ○ 前              | ○ 再<br>生<br>前<br>始 |            |                |        | ○      | ○      | ○      | ○      |                     |                              |
|                          | 九州       | 早  | ● 2 | ●               | ● 2 | ● 2 | ● 2              |                            |              |                  | ● 発<br>生<br>期         | ● 前              | ● 再<br>生<br>前<br>始 |            |                |        | ● 1.5  | ●      | ●      | ●      |                     |                              |
|                          |          | 普  | ○ 2 | ○               | ○ 始 | ○ 始 | ○ 始              |                            |              |                  | ○ 発<br>生<br>期         | ○ 前              | ○ 再<br>生<br>前<br>始 |            |                |        | ○      | ○      | ○      | ○      | 2                   |                              |

| 処理法                                         | 地域名      | 作期 | ハ・エ | 一年<br>広葉<br>ツバキ | ホタル | ウリカ | ミ<br>ガ<br>ヤ<br>リ | ヘ<br>ラ<br>オ<br>モ<br>タ<br>カ | クロ<br>グ<br>リ | オ<br>モ<br>ガ<br>カ | ヒ<br>ル<br>ム<br>シ<br>ロ | 葉<br>表<br>剥<br>離 | セリ                 | 処理時期       | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減<br>水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                   |
|---------------------------------------------|----------|----|-----|-----------------|-----|-----|------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|------------------------------|
| VII<br>HSA-971<br>「ジャンボ」<br>II-6-(2)<br>を併用 | 北海道      |    | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○ 2 |                  |                            |              | ● 前              | ○ 前                   | ○ 前              | ○ 再<br>生<br>前<br>始 | +5~ノビ I 2L | 50gx<br>13/a   |        | ○      | ○      | ○      | ○      | 1.5                 | (28)<br>(34)<br>(38)<br>(47) |
|                                             | 東北       |    | ○ 2 | ○               | ○ 始 | ○ 始 | ○ 始              | ○ 始                        |              | ● 前              |                       | ○ 前              | ○ 再<br>生<br>前<br>始 |            |                |        | ○      | ○      | ○      | ○      |                     |                              |
|                                             | 北陸       |    | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○ 始 | ○ 始              | ○ 始                        |              | ● 前              |                       |                  | ○ 再<br>生<br>前<br>始 |            |                |        | ○      | ○      | ○      | ○      | 2                   |                              |
|                                             | 関東<br>東海 | 早  | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○ 始 | ○ 始              |                            |              |                  | ○ 発<br>生<br>期         |                  | ○ 再<br>生<br>前<br>始 |            |                |        | ○      | ○      | ○      | ○      | 1                   |                              |
|                                             |          | 普  | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○ 2 | ○ 始              |                            |              | ● 前              |                       | ○ 前              | ○ 再<br>生<br>前<br>始 |            |                |        | ○      | ○      | ○      | ○      | 2                   |                              |
|                                             | 近畿<br>中国 | 早  | ● 2 | ●               | ● 2 | ● 始 | ● 始              |                            |              |                  | ● 発<br>生<br>期         |                  | ● 再<br>生<br>前<br>始 |            |                |        | ●      | ○      | ○      | ○      | 1.5                 |                              |
|                                             |          | 普  | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○ 2 | ○ 2              |                            |              | ● 前              |                       | ○ 前              | ○ 再<br>生<br>前<br>始 |            |                |        | ○      | ○      | ○      | ○      |                     |                              |
|                                             | 四国       | 早  | ● 2 | ●               | ● 2 | ● 始 | ● 始              |                            |              |                  | ● 発<br>生<br>期         |                  | ● 再<br>生<br>前<br>始 |            |                |        | ○      | ○      | ○      | ○      |                     |                              |
|                                             |          | 普  | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○ 2 | ○ 2              |                            |              | ● 前              |                       | ○ 前              | ○ 再<br>生<br>前<br>始 |            |                |        | ○      | ○      | ○      | ○      |                     |                              |
|                                             | 九州       | 早  | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○ 2 | ○ 2              |                            |              |                  | ○ 発<br>生<br>期         |                  | ○ 再<br>生<br>前<br>始 |            |                |        | ○      | ○      | ○      | ○      | 1                   |                              |
|                                             |          | 普  | ○ 2 | ○               | ○ 2 | ○ 2 | ○ 2              |                            |              | ● 始              | ○ 前                   | ○ 前              | ○ 再<br>生<br>前<br>始 |            |                |        | ○      | ○      | ○      | ○      | 1.5                 |                              |

オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(北陸~九州)

| 処理法                       | 地域名      | 作期     | ル・エ | 一年<br>広葉<br>マハイ | ナリイ | ウリカ | ミヤ<br>ダリ | ヘラモ<br>ダカ | クロガ<br>ワイ | モダ<br>カ | ヒルム<br>シロ | 藻類<br>剥離 | セリ       | 処理時期       | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意   |
|---------------------------|----------|--------|-----|-----------------|-----|-----|----------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|--------------|
| VII<br>KU11-883(改)<br>シャボ | 北海道      |        | ●2  | ●               | ●始  | ●2  |          | ●始        |           |         | ●発生<br>期  | ●前       | ●再生<br>前 | +3~1/2 I2L | 35gx<br>17/a   | ●       | ●      | ●      | ●      | 2               | (45)<br>(47) |
|                           | 東北       |        | ●2  | ●               | ●2  | ●始  | ●2       | ●始        |           |         | ●発生<br>期  | ●前       | ●再生<br>前 |            |                |         |        |        |        |                 |              |
|                           | 北陸       |        |     |                 |     |     |          |           |           |         |           |          | ●始       |            |                |         |        |        |        |                 |              |
|                           | 関東<br>東海 | 早<br>普 |     |                 |     |     |          |           |           |         |           |          |          |            |                |         |        |        |        |                 |              |
|                           | 近畿<br>中国 | 早<br>普 |     |                 |     |     |          |           |           |         |           |          |          |            |                |         |        |        |        |                 |              |
|                           | 四国       | 早<br>普 |     |                 |     |     |          |           |           |         |           |          |          |            |                |         |        |        |        |                 |              |
|                           | 九州       | 早<br>普 |     |                 |     |     |          |           |           |         |           |          |          |            |                |         |        |        |        |                 |              |
|                           |          |        |     |                 |     |     |          |           |           |         |           |          |          |            |                |         |        |        |        |                 |              |
|                           |          |        |     |                 |     |     |          |           |           |         |           |          |          |            |                |         |        |        |        |                 |              |
|                           |          |        |     |                 |     |     |          |           |           |         |           |          |          |            |                |         |        |        |        |                 |              |

| 処理法                       | 地域名      | 作期     | ル・エ | 一年<br>広葉<br>マハイ | ナリイ | ウリカ | ミヤ<br>ダリ | ヘラモ<br>ダカ | クロガ<br>ワイ | モダ<br>カ | ヒルム<br>シロ | 藻類<br>剥離 | セリ       | 処理時期       | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                   |
|---------------------------|----------|--------|-----|-----------------|-----|-----|----------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|------------------------------|
| VII<br>KU11-883(改)<br>シャボ | 北海道      |        |     |                 |     |     |          |           |           |         |           |          | ●再生<br>前 | +3~1/2 I2L | 35gx<br>17/a   |         |        |        |        |                 | (28)<br>(34)<br>(45)<br>(47) |
|                           | 東北       |        |     |                 |     |     |          |           |           |         |           |          | ●再生<br>前 |            |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                           | 北陸       |        | ●2  | ●               | ●始  | ●始  | ●始       |           |           |         |           |          | ●始       |            |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                           | 関東<br>東海 | 早<br>普 | ●2  | ●               | ●2  | ●始  | ●始       |           |           |         | ●発生<br>期  | ●前       | ●再生<br>前 |            |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                           | 近畿<br>中国 | 早<br>普 | ●2  | ●               | ●2  | ●2  | ●2       |           |           |         | ●発生<br>期  | ●前       | ●再生<br>前 |            |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                           | 四国       | 早<br>普 | ●2  | ●               | ●2  | ●2  | ●2       |           |           |         | ●発生<br>期  | ●前       | ●再生<br>前 |            |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                           | 九州       | 早<br>普 | ●2  | ●               | ●2  | ●2  | ●2       |           |           |         | ●発生<br>期  | ●前       | ●再生<br>前 |            |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                           |          |        |     |                 |     |     |          |           |           |         |           |          |          |            |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                           |          |        |     |                 |     |     |          |           |           |         |           |          |          |            |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                           |          |        |     |                 |     |     |          |           |           |         |           |          |          |            |                |         |        |        |        |                 |                              |

| 処理法                      | 地域名      | 作期     | ル・エ | 一年<br>広葉<br>マハイ | ナリイ | ウリカ | ミヤ<br>ダリ | ヘラモ<br>ダカ | クロガ<br>ワイ | モダ<br>カ | ヒルム<br>シロ | 藻類<br>剥離 | セリ       | 処理時期       | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                   |
|--------------------------|----------|--------|-----|-----------------|-----|-----|----------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|------------------------------|
| VII<br>KU11-975PD<br>シャボ | 北海道      |        |     |                 |     |     |          |           |           |         |           |          | ●再生<br>前 | +5~1/2 I2L | 25gx<br>17/a   |         |        |        |        | 1.5             | (28)<br>(34)<br>(45)<br>(47) |
|                          | 東北       |        |     |                 |     |     |          |           |           |         |           |          | ●再生<br>前 |            |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                          | 北陸       |        | ○2  | ○               | ○2  | ○2  | ○始       |           |           |         |           | ●前       | ●始       |            |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                          | 関東<br>東海 | 早<br>普 | ●2  | ●               | ●2  | ●2  | ●2       |           |           |         | ●発生<br>期  | ●前       | ●再生<br>前 |            |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                          | 近畿<br>中国 | 早<br>普 | ○2  | ○               | ○2  | ○始  | ○始       |           |           |         | ○期        | ○前       | ○再生<br>前 |            |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                          | 四国       | 早<br>普 | ○2  | ○               | ○2  | ○2  | ○2       |           |           |         |           | ○前       | ○始       |            |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                          | 九州       | 早<br>普 | ●2  | ●               | ●2  | ●2  | ●2       |           |           |         | ●発生<br>期  | ●前       | ●再生<br>前 |            |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                          |          |        | ○2  | ○               | ○2  | ○始  | ○始       |           |           |         | ○期        | ○前       | ○始       |            |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                          |          |        |     |                 |     |     |          |           |           |         |           |          |          |            |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                          |          |        |     |                 |     |     |          |           |           |         |           |          |          |            |                |         |        |        |        |                 |                              |

| 処理法                      | 地域名      | 作期     | ル・エ | 一年<br>広葉<br>マハイ | ナリイ | ウリカ | ミヤ<br>ダリ | ヘラモ<br>ダカ | クロガ<br>ワイ | モダ<br>カ | ヒルム<br>シロ | 藻類<br>剥離 | セリ       | 処理時期       | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意   |
|--------------------------|----------|--------|-----|-----------------|-----|-----|----------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|--------------|
| VII<br>KU11-975PK<br>シャボ | 北海道      |        | ○2  | ○               | ○2  | ○始  |          | ○始        |           |         | ○発生<br>期  | ○前       | ○再生<br>前 | +5~1/2 I2L | 25gx<br>17/a   |         | ○      | ○      | ○      | 1.5             | (45)<br>(47) |
|                          | 東北       |        | ○2  | ○               | ○2  | ○始  | ○始       | ○始        |           |         | ●発生<br>期  | ●前       | ●再生<br>前 |            |                |         |        |        |        |                 |              |
|                          | 北陸       |        |     |                 |     |     |          |           |           |         |           |          | ●始       |            |                |         |        |        |        |                 |              |
|                          | 関東<br>東海 | 早<br>普 |     |                 |     |     |          |           |           |         |           |          |          |            |                |         |        |        |        |                 |              |
|                          | 近畿<br>中国 | 早<br>普 |     |                 |     |     |          |           |           |         |           |          |          |            |                |         |        |        |        |                 |              |
|                          | 四国       | 早<br>普 |     |                 |     |     |          |           |           |         |           |          |          |            |                |         |        |        |        |                 |              |
|                          | 九州       | 早<br>普 |     |                 |     |     |          |           |           |         |           |          |          |            |                |         |        |        |        |                 |              |
|                          |          |        |     |                 |     |     |          |           |           |         |           |          |          |            |                |         |        |        |        |                 |              |
|                          |          |        |     |                 |     |     |          |           |           |         |           |          |          |            |                |         |        |        |        |                 |              |
|                          |          |        |     |                 |     |     |          |           |           |         |           |          |          |            |                |         |        |        |        |                 |              |

| 処理法                         | 地域名 | 作期 | バ' E | 一年<br>広葉<br>マハ'イ | ホ'カ'イ | ウ'カ'イ | ミ'カ'イ | ヘ'カ'イ | クロ'カ'イ | オ'カ'イ | ヒ'カ'イ | 藻類<br>剥離 | セリ     | 処理時期     | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                   |
|-----------------------------|-----|----|------|------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|----------|--------|----------|----------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|------------------------------|
| VII<br>MY-100DC(1)<br>ジ'ン'ボ | 北海道 |    |      |                  |       |       |       |       |        |       |       |          |        |          | 50gx<br>13/a   |         |        |        |        |                 | (28)<br>(34)<br>(45)<br>(47) |
|                             | 東北  |    |      |                  |       |       |       |       |        |       |       |          |        |          |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                             | 北陸  |    | ●2   | ●                | ●始    | ●始    | ●始    |       |        |       |       |          |        | +3~ノ'E2L |                |         | ●      | ●      | ●      | 1.5             |                              |
|                             | 関東海 | 早  | ●2   | ●                | ●2    | ●始    | ●始    |       |        |       |       | 発生期      | ●前     | ●再生前~始   |                |         |        |        |        | 1               |                              |
|                             | 普   | ●2 | ●    | ●2               | ●始    | ●始    |       |       |        |       |       | ●前       |        |          |                | ●       | ●      | ●      | ●      | 2               |                              |
|                             | 近畿中 | 早  |      |                  |       |       |       |       |        |       |       |          |        |          |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                             | 普   | ●2 | ●    | ●始               | ●始    | ●始    |       |       |        |       |       | ●前       |        |          |                |         | ●      | ●      | ●      | 1.5             |                              |
|                             | 四国  | 早  |      |                  |       |       |       |       |        |       |       |          |        |          |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                             | 普   | ●2 | ●    | ●始               | ●始    | ●始    |       |       |        |       |       | ●前       | ●再生前~始 | +5~ノ'E2L |                |         | ●      | ●      | ●      |                 |                              |
|                             | 九州  | 早  | ●2   | ●                | ●始    | ●始    | ●始    |       |        |       |       | ●発生期     | ●      |          |                | ●       | ●      | ●      | ●      | 2               |                              |
|                             | 普   | ●2 | ●    | ●2               | ●始    | ●始    | ●始    |       |        |       |       | ●        | ●      | +3~ノ'E2L |                | ●       | ●      | ●      | ●      | 1.5             |                              |

| 処理法                      | 地域名 | 作期   | バ' E | 一年<br>広葉<br>マハ'イ | ホ'カ'イ | ウ'カ'イ | ミ'カ'イ | ヘ'カ'イ | クロ'カ'イ | オ'カ'イ | ヒ'カ'イ | 藻類<br>剥離 | セリ | 処理時期       | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意           |
|--------------------------|-----|------|------|------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|----------|----|------------|----------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|----------------------|
| VII<br>MY-100MS<br>ジ'ン'ボ | 北海道 |      | ○1.5 | ○                | ○始    | ○始    |       |       |        |       |       |          |    | +3~ノ'E1.5L | 50gx<br>13/a   |         |        | ○      | ○      | 1.5             | (34)<br>(45)<br>(47) |
|                          | 東北  |      | ○1.5 | ○                | ○始    | ○前    | ○前    |       |        |       |       |          |    |            |                |         |        | ○      | ○      |                 |                      |
|                          | 北陸  |      | ○1.5 | ○                | ○始    | ○始    | ○始    |       |        |       |       |          |    |            |                | ●       | ●      | ○      | ○      |                 |                      |
|                          | 関東海 | 早    | ●1.5 | ●                | ●始    | ●始    | ●始    |       |        |       |       |          |    |            |                | ●       | ●      | ●      | ●      | 1               |                      |
|                          | 普   | ○1.5 | ○    | ○始               | ○始    | ○始    |       |       |        |       |       |          |    |            |                |         | ○      | ○      | ○      | 2               |                      |
|                          | 近畿中 | 早    | ●1.5 | ●                | ●始    | ●始    | ●始    |       |        |       |       |          |    |            |                |         |        |        |        | 1.5             |                      |
|                          | 普   | ○1.5 | ○    | ○始               | ○始    | ○始    |       |       |        |       |       |          |    |            |                |         | ○      | ○      | ○      | 1               |                      |
|                          | 四国  | 早    | ●1.5 | ●                | ●始    | ●始    | ●始    |       |        |       |       |          |    |            |                |         |        | ●      | ●      | 1.5             |                      |
|                          | 普   | ○1.5 | ○    | ○始               | ○始    | ○始    |       |       |        |       |       |          |    |            |                |         | ○      | ○      | ○      | 1               |                      |
|                          | 九州  | 早    |      |                  |       |       |       |       |        |       |       |          |    |            |                |         |        | ○      | ○      |                 |                      |
|                          | 普   | ○1.5 | ○    | ○始               | ○始    | ○始    |       |       |        |       |       |          |    |            |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 2               |                      |

| 処理法                      | 地域名 | 作期 | バ' E | 一年<br>広葉<br>マハ'イ | ホ'カ'イ | ウ'カ'イ | ミ'カ'イ | ヘ'カ'イ | クロ'カ'イ | オ'カ'イ | ヒ'カ'イ | 藻類<br>剥離 | セリ     | 処理時期     | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                   |
|--------------------------|-----|----|------|------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|----------|--------|----------|----------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|------------------------------|
| VII<br>MY-100NC<br>ジ'ン'ボ | 北海道 |    | ●2   | ●                | ●始    | ●2    |       | ●始    |        |       | ●発生期  | ●前       | ●再生前~始 | +5~ノ'E2L | 30gx<br>13/a   |         | ●      | ●      | ●      | 2               | (28)<br>(34)<br>(45)<br>(47) |
|                          | 東北  |    | ●2   | ●                | ●2    | ●2    | ●2    | ●始    |        |       | ●     |          | ●再生前~始 |          |                |         | ●      | ●      | ●      | 1.5             |                              |
|                          | 北陸  |    | ●2   | ●                | ●2    | ●始    | ●始    |       |        |       |       |          |        |          |                |         | ●      | ●      | ●      | 2               |                              |
|                          | 関東海 | 早  | ●2   | ●                | ●2    | ●始    | ●始    |       |        |       | ●発生期  | ●前       | ●再生前~始 |          |                |         |        |        |        | 1               |                              |
|                          | 普   | ●2 | ●    | ●2               | ●始    | ●始    |       |       |        |       | ●     | ●前       |        |          |                |         | ●      | ●      | ●      | 1.5             |                              |
|                          | 近畿中 | 早  |      |                  |       |       |       |       |        |       |       |          |        |          |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                          | 普   | ●2 | ●    | ●2               | ●2    | ●2    |       |       |        |       |       |          | ●      |          |                |         | ●      | ●      | ●      | 1               |                              |
|                          | 四国  | 早  | ●2   | ●                | ●2    | ●2    | ●2    |       |        |       |       |          | ●再生前~始 |          |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                          | 普   | ●2 | ●    | ●2               | ●2    | ●2    |       |       |        |       |       |          | ●      |          |                |         | ●      | ●      | ●      |                 |                              |
|                          | 九州  | 早  |      |                  |       |       |       |       |        |       |       |          |        |          |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                          | 普   | ●2 | ●    | ●2               | ●2    | ●2    |       |       |        |       | ●発生期  | ●        |        |          |                | ●       | ●      | ●      | ●      | 1.5             |                              |

| 処理法                                                                     | 地域名 | 作期 | バ' E | 一年<br>広葉<br>マハ'イ | ホ'カ'イ | ウ'カ'イ | ミ'カ'イ | ヘ'カ'イ | クロ'カ'イ | オ'カ'イ | ヒ'カ'イ | 藻類<br>剥離 | セリ     | 処理時期     | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|----------|--------|----------|----------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|------------------------------|
| VII<br>NBA-092a<br>ジ'ン'ボ<br><br>II-6-(1)<br>II-6-(2)<br>II-6-(6)<br>を併用 | 北海道 |    | ○2   | ○                | ○2    | ○2    |       | ○始    |        | ●前    | ○発生期  | ○前       | ○再生前~始 | +5~ノ'E2L | 40gx<br>13/a   | ○       | ○      | ○      | ○      | 1.5             | (38)<br>(42)<br>(45)<br>(47) |
|                                                                         | 東北  |    | ○2   | ○                | ○2    | ○始    | ○始    |       |        | ●前    | ○始    | ○前       | ○前     |          |                | ○       | ○      | ○      | ○      |                 |                              |
|                                                                         | 北陸  |    |      |                  |       |       |       |       |        |       |       |          | 始      |          |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                                                                         | 関東海 | 早  |      |                  |       |       |       |       |        |       |       |          |        |          |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                                                                         | 普   |    |      |                  |       |       |       |       |        |       |       |          |        |          |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                                                                         | 近畿中 | 早  |      |                  |       |       |       |       |        |       |       |          |        |          |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                                                                         | 普   |    |      |                  |       |       |       |       |        |       |       |          |        |          |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                                                                         | 四国  | 早  |      |                  |       |       |       |       |        |       |       |          |        |          |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                                                                         | 普   |    |      |                  |       |       |       |       |        |       |       |          |        |          |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                                                                         | 九州  | 早  |      |                  |       |       |       |       |        |       |       |          |        |          |                |         |        |        |        |                 |                              |
|                                                                         | 普   |    |      |                  |       |       |       |       |        |       |       |          |        |          |                |         |        |        |        |                 |                              |

クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(東北)  
オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(東北)

| 処理法                                                     | 地域名 | 作期 | ハ・E | 一年広葉マダハ | オサリ | ウサリ | ミヤガリ | ハラモダ | クログ | オモダ | ヒルシロ | 藻類剥離 | セリ  | 処理時期     | 使用量・製品       | 砂壌土 | 壤土 | 埴土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意                                       |
|---------------------------------------------------------|-----|----|-----|---------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|-----|----------|--------------|-----|----|----|----|----------|----------------------------------------------|
| VII<br>NBA-092b<br>「シャボ」<br>II-6-(1)<br>II-6-(2)<br>を併用 | 北海道 |    |     |         |     |     |      |      |     |     |      |      | 再生前 |          | 40gx<br>13/a |     |    |    |    |          | (28)<br>(34)<br>(38)<br>(42)<br>(45)<br>(47) |
|                                                         | 東北  |    |     |         |     |     |      |      |     |     |      |      | 再生前 |          |              |     |    |    |    |          |                                              |
|                                                         | 北陸  |    | ○2  | ○       | ○2  | ○始  | ○始   | ○始   |     |     |      |      | ○始  | +5~ノ'E2L |              | ○   | ○  | ○  | ○  | 1.5      |                                              |
|                                                         | 関東  | 早  | ○2  | ○       | ○2  | ○始  | ○2   |      |     |     | ○発生  | ○前   | ○   |          |              | ●   | ●  | ○  | ○  | 1        |                                              |
|                                                         | 東海  | 普  | ○2  | ○       | ○2  | ○2  | ○始   |      | ●始  | ●始  | ○期   | ○前   | ○   |          |              | ○   | ○  | ○  | ○  | 2        |                                              |
|                                                         | 近畿  | 早  | ○2  | ○       | ○2  | ○始  | ○2   |      |     |     | ○発生  | ○前   | ○   |          |              | ●   | ○  | ○  | ○  | 1.5      |                                              |
|                                                         | 中国  | 普  | ○2  | ○       | ○2  | ○2  | ○2   |      |     |     | ●発生  | ○前   | ○   |          |              | ●   | ○  | ○  | ○  |          |                                              |
|                                                         | 四国  | 早  | ○2  | ○       | ○2  | ○始  | ○2   |      |     |     | ○発生  | ○前   | ○   |          |              | ●   | ○  | ○  | ○  |          |                                              |
|                                                         |     | 普  | ○2  | ○       | ○2  | ○2  | ○2   |      |     |     | ●発生  | ○前   | ○   |          |              | ●   | ○  | ○  | ○  |          |                                              |
|                                                         | 九州  | 早  | ●2  | ●       | ●2  | ●2  | ●2   |      |     |     | ●発生  | ○前   | ●始  |          |              | ●   | ○  | ○  | ○  |          |                                              |
|                                                         |     | 普  | ○2  | ○       | ○2  | ○始  | ○2   |      | ●始  | ●始  | ○期   |      | ○   |          |              | ●   | ○  | ○  | ○  | 2        |                                              |

クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(関東・東海、九州)

オモダに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(関東・東海、九州)

| 処理法                     | 地域名 | 作期 | ハ・E | 一年広葉マダハ | オサリ | ウサリ | ミヤガリ | ハラモダ | クログ | オモダ | ヒルシロ | 藻類剥離 | セリ   | 処理時期 | 使用量・製品       | 砂壌土 | 壤土 | 埴土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意                       |
|-------------------------|-----|----|-----|---------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|------|------|--------------|-----|----|----|----|----------|------------------------------|
| VII<br>NBA-093<br>「シャボ」 | 北海道 |    | ○2  | ○       | ○2  | ○2  |      |      |     |     | ○発生  | ○前   | ○再生前 |      | 40gx<br>13/a |     | ○  | ○  | ○  | 1.5      | (28)<br>(34)<br>(45)<br>(47) |
|                         | 東北  |    | ○2  | ○       | ○2  |     | ○2   | ○2   |     |     | ○期   | ●前   | ○前   |      |              |     | ○  | ○  | ○  | 1        |                              |
|                         | 北陸  |    | ○2  | ○       | ○2  | ○始  | ○始   |      |     |     |      |      | 始    |      |              |     |    | ○  | ○  | 2        |                              |
|                         | 関東  | 早  |     |         |     |     |      |      |     |     | ○発生  |      | ○再生前 |      |              |     |    |    |    |          |                              |
|                         | 東海  | 普  | ○2  | ○       | ○始  | ○2  | ○始   |      |     |     | ○期   |      | ○    |      |              |     |    | ○  | ○  |          |                              |
|                         | 近畿  | 早  | ○2  | ○       | ○2  | ○始  | ○2   |      |     |     | ○発生  |      | ○始   |      |              |     | ○  | ○  | ○  | 1.5      |                              |
|                         | 中国  | 普  | ○2  | ○       | ○2  | ○2  | ○2   |      |     |     | ○発生  | ●前   | ○    |      |              |     | ○  | ○  | ○  |          |                              |
|                         | 四国  | 早  | ○2  | ○       | ○2  | ○始  | ○2   |      |     |     | ○発生  |      | ○再生前 |      |              |     | ○  | ○  | ○  |          |                              |
|                         |     | 普  | ○2  | ○       | ○2  | ○2  | ○2   |      |     |     | ○発生  | ●前   | ○    |      |              |     | ○  | ○  | ○  |          |                              |
|                         | 九州  | 早  | ●2  | ●       | ●2  | ●2  | ●2   |      |     |     | ●発生  | ○前   | ●始   |      |              |     | ●  | ○  | ○  |          |                              |
|                         |     | 普  | ○2  | ○       | ○2  | ○2  | ○2   |      |     |     | ○期   |      | ○    |      |              |     | ○  | ○  | ○  | 2        |                              |

| 処理法                     | 地域名 | 作期 | ハ・E | 一年広葉マダハ | オサリ | ウサリ | ミヤガリ | ハラモダ | クログ | オモダ | ヒルシロ | 藻類剥離 | セリ   | 処理時期 | 使用量・製品       | 砂壌土 | 壤土 | 埴土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意                       |
|-------------------------|-----|----|-----|---------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|------|------|--------------|-----|----|----|----|----------|------------------------------|
| VII<br>NBA-101<br>「シャボ」 | 北海道 |    | ○2  | ○       | ○2  | ○始  |      | ○前   |     |     | ○発生  | ○前   | ○再生前 |      | 40gx<br>13/a | ●5  | ○  | ○  | ○  | 2        | (28)<br>(34)<br>(45)<br>(47) |
|                         | 東北  |    | ○2  | ○       | ○始  | ○始  | ○始   |      |     |     | ○期   | ●前   | ○前   |      |              | ○   | ○  | ○  | ○  | 1.5      |                              |
|                         | 北陸  |    | ○2  | ○       | ○2  | ○始  |      |      |     |     |      |      | ○前   | ●始   |              |     | ○  | ○  | ○  | 2        |                              |
|                         | 関東  | 早  | ●2  | ●       | ●2  | ●2  | ●2   |      |     |     | ●発生  | ●前   | ○再生前 |      |              |     | ●  | ●  | ○  | 1        |                              |
|                         | 東海  | 普  | ○2  | ○       | ○2  | ○始  | ○始   |      |     |     | ○期   | ○前   | ○    |      |              |     | ○  | ○  | ○  |          |                              |
|                         | 近畿  | 早  | ○2  | ○       | ○2  | ○始  | ○2   |      |     |     | ○発生  |      | ○始   |      |              |     |    | ○  | ○  | 1.5      |                              |
|                         | 中国  | 普  | ○2  | ○       | ○2  | ○2  | ○2   |      |     |     | ○発生  | ○前   | ○    |      |              |     | ○  | ○  | ○  |          |                              |
|                         | 四国  | 早  | ○2  | ○       | ○2  | ○始  | ○2   |      |     |     | ○発生  |      | ○再生前 |      |              |     | ○  | ○  | ○  |          |                              |
|                         |     | 普  | ○2  | ○       | ○2  | ○2  | ○2   |      |     |     | ○発生  | ●前   | ○    |      |              |     | ○  | ○  | ○  |          |                              |
|                         | 九州  | 早  | ●2  | ●       | ●2  | ●2  | ●2   |      |     |     | ●発生  | ○前   | ●始   |      |              |     | ●  | ○  | ○  |          |                              |
|                         |     | 普  | ○2  | ○       | ○2  | ○始  | ○2   |      |     |     | ○期   | ○前   | ○    |      |              |     | ○  | ○  | ○  | 2        |                              |

VII NBA-101SB 「シャボ」 「緑」

| 処理法                     | 地域名 | 作期 | ハ・E | 一年広葉マダハ | オサリ | ウサリ | ミヤガリ | ハラモダ | クログ | オモダ | ヒルシロ | 藻類剥離 | セリ   | 処理時期 | 使用量・製品       | 砂壌土 | 壤土 | 埴土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意                       |
|-------------------------|-----|----|-----|---------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|------|------|--------------|-----|----|----|----|----------|------------------------------|
| VII<br>NC-377E<br>「シャボ」 | 北海道 |    | ○2  | ○       | ○2  | ○始  |      |      |     |     | ○発生  | ○前   | ○再生前 |      | 30gx<br>13/a | ●5  | ○  | ○  | ○  | 2        | (34)<br>(41)<br>(45)<br>(47) |
|                         | 東北  |    | ○2  | ○       | ○2  | ○2  | ○2   |      |     |     | ○期   |      | ○前   |      |              | ○   | ○  | ○  | ○  | 2        |                              |
|                         | 北陸  |    | ○2  | ○       | ○2  | ○2  | ○始   | ○始   |     |     |      |      | ○前   | ○始   |              |     | ●  | ●  | ○  | 1.5      |                              |
|                         | 関東  | 早  | ○2  | ○       | ○2  | ○2  | ○2   |      |     |     | ○発生  | ●前   | ○再生前 |      |              | ●   | ○  | ○  | ○  | 2        |                              |
|                         | 東海  | 普  | ○2  | ○       | ○始  | ○始  | ○始   |      |     |     | ○期   | ○前   | ○    |      |              | ○   | ○  | ○  | ○  |          |                              |
|                         | 近畿  | 早  | ○2  | ○       | ○2  | ○始  | ○2   |      |     |     | ○発生  |      | ○始   |      |              |     | ○  | ○  | ○  | 1.5      |                              |
|                         | 中国  | 普  | ○2  | ○       | ○2  | ○2  | ○2   |      |     |     | ○発生  | ●前   | ○    |      |              |     | ○  | ○  | ○  |          |                              |
|                         | 四国  | 早  | ○2  | ○       | ○2  | ○始  | ○2   |      |     |     | ○発生  | ●前   | ○    |      |              |     | ○  | ○  | ○  |          |                              |
|                         |     | 普  | ○2  | ○       | ○2  | ○2  | ○2   |      |     |     | ○発生  | ○前   | ○    |      |              |     | ○  | ○  | ○  |          |                              |
|                         | 九州  | 早  | ○2  | ○       | ○2  | ○2  | ○2   |      |     |     | ○発生  | ○前   | ○始   |      |              |     | ●  | ○  | ○  |          |                              |
|                         |     | 普  | ○2  | ○       | ○2  | ○2  | ○2   |      |     |     | ○期   |      | ○    |      |              |     | ●  | ○  | ○  | 2        |                              |

| 処理法                      | 地域名  | 作期       | ハ・エ    | 一年<br>広葉<br>マハ・イ | ホタルイ | ウリカ | ミヤ<br>ガ・グ | ヘラオモ<br>ダ・カ | クロガ<br>ワイ | オモガ<br>カ | ヒルムシ<br>ロ | 藻類<br>表層<br>剥離 | セリ       | 処理時期     | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                   |
|--------------------------|------|----------|--------|------------------|------|-----|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------|----------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|------------------------------|
| VII<br>NC-391(1)<br>ジャンボ | 土壌処理 | 北海道      | ●2     | ●                | ●始   | ●2  |           | ●始          |           |          | ●発生<br>期  | ●前             | ●再生<br>前 | +5~ノビE2L | 30gx<br>10/a   |        |        | ●      | ●      | ●      | 1               | (28)<br>(34)<br>(45)<br>(47) |
|                          |      | 東北       | ●2     | ●                | ●2   | ●始  | ●2        | ●始          |           |          | ●発生<br>期  | ●前             | ●再生<br>前 |          |                |        |        | ●      | ●      | ●      |                 |                              |
|                          |      | 北陸       | ●2     | ●                | ●始   | ●始  | ●始        |             |           |          |           |                | ●始       |          |                |        |        | ●      | ●      | ●      | 2               |                              |
|                          |      | 関東<br>東海 | 早<br>普 | ●2               | ●    | ●2  | ●始        | ●始          |           |          | ●発生<br>期  | ●前             | ●再生<br>前 |          |                |        |        | ●      | ●      | ●      |                 |                              |
|                          |      | 近畿<br>中国 | 早<br>普 | ●2               | ●    | ●2  | ●2        | ●2          |           |          |           |                | ●始       |          |                |        |        | ●      | ●      | ●      | 1               |                              |
|                          |      | 四国       | 早<br>普 | ●2               | ●    | ●2  | ●2        | ●2          |           |          |           |                | ●再生<br>前 |          |                |        |        | ●      | ●      | ●      |                 |                              |
|                          |      | 九州       | 早<br>普 | ●2               | ●    | ●2  | ●2        | ●2          |           |          | ●発生<br>期  | ●前             | ●始       |          |                |        |        | ●      | ●      | ●      | 1.5             |                              |
|                          |      |          |        |                  |      |     |           |             |           |          |           |                |          |          |                |        |        |        |        |        |                 |                              |
|                          |      |          |        |                  |      |     |           |             |           |          |           |                |          |          |                |        |        |        |        |        |                 |                              |
|                          |      |          |        |                  |      |     |           |             |           |          |           |                |          |          |                |        |        |        |        |        |                 |                              |

|                          | 処理法  | 地域名      | 作期 | ハ・エ | 一年<br>広葉<br>マハ・イ | ホタルイ | ウリカ | ミヤ<br>ガ・グ | ヘラオモ<br>ダ・カ | クロガ<br>ワイ | オモガ<br>カ | ヒルムシ<br>ロ | 藻類<br>表層<br>剥離 | セリ       | 処理時期     | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土   | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                   |     |   |  |
|--------------------------|------|----------|----|-----|------------------|------|-----|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------|----------|----------------|----------|--------|--------|--------|-----------------|------------------------------|-----|---|--|
| Ⅶ<br>NCII-903DEN<br>ジャンボ | 土壌処理 | 北海道      |    | ●2  | ●                | ●始   | ●2  |           | ●始          |           |          | ●発生<br>期  | ●前             | ●再生<br>前 | +5～ノビE2L | 40gx<br>10/a   |          | ●1.5   | ●      | ●      | 2               | (28)<br>(34)<br>(45)<br>(47) |     |   |  |
|                          |      | 東北       |    | ●2  | ●                | ●2   | ●始  | ●2        | ●始          |           |          | ●発生<br>期  | ●前             | ●再生<br>前 |          |                |          |        | ●      | ●      | ●               | 1                            |     |   |  |
|                          |      | 北陸       |    | ●2  | ●                | ●始   | ●始  | ●始        |             |           |          |           |                | ●始       |          |                |          |        |        | ●      | ●               | ●                            | 1.5 |   |  |
|                          |      | 関東<br>東海 | 早  |     |                  |      |     |           |             |           |          |           | ●発生<br>期       | ●前       |          |                | ●再生<br>前 |        |        |        |                 |                              |     |   |  |
|                          |      |          | 普  | ●2  | ●                | ●2   | ●始  | ●始        |             |           |          |           | ●発生<br>期       | ●前       |          |                | ●再生<br>前 |        |        | ●      | ●               | ●                            |     |   |  |
|                          |      | 近畿<br>中国 | 早  |     |                  |      | ●2  | ●始        | ●2          |           |          |           |                |          |          |                | ●始       |        |        |        | ●               | ●                            | ●   |   |  |
|                          |      |          | 普  | ●2  | ●                | ●2   | ●始  | ●2        |             |           |          |           |                |          |          |                | ●        |        |        |        | ●               | ●                            | ●   | 1 |  |
|                          |      | 四国       | 早  |     |                  |      | ●2  | ●始        | ●2          |           |          |           |                |          |          |                | ●再生<br>前 |        |        |        | ●               | ●                            | ●   |   |  |
|                          |      |          | 普  | ●2  | ●                | ●2   | ●始  | ●2        |             |           |          |           |                |          |          |                | ●        |        |        |        | ●               | ●                            | ●   |   |  |
|                          |      | 九州       | 早  |     |                  |      | ●2  | ●2        | ●2          |           |          |           |                | ●発生<br>期 |          |                | ●        | ●始     |        |        |                 | ●                            | ●   | ● |  |
| 普                        | ●2   |          | ●  | ●2  | ●2               | ●2   |     |           |             |           |          | ●発生<br>期  | ●              | ●        |          |                | ●1       | ●      | ●      | ●      | 1.5             |                              |     |   |  |

VII NH-001 ジャンボ「継」

VII NH-002 ジャンボ「継」

| 処理法                   | 地域名  | 作期       | ハ・エ    | 一年<br>広葉<br>マハ・イ | ホタルイ | ウリカ | ミヤ<br>ガ・グ | ヘラオモ<br>ダ・カ | クロガ<br>ワイ | オモガ<br>カ | ヒルムシ<br>ロ | 藻類<br>表層<br>剥離 | セリ       | 処理時期     | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意   |
|-----------------------|------|----------|--------|------------------|------|-----|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------|----------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|--------------|
| VII<br>NH-805<br>ジャンボ | 土壌処理 | 北海道      | ○2     | ○                | ○始   | ○始  |           |             |           |          | ○発生<br>期  | ○前             | ○再生<br>前 | +5~ノビE2L | 50gx<br>10/a   |        |        | ○      | ○      | ○      | 1.5             | (45)<br>(47) |
|                       |      | 東北       | ○2     | ○                | ○2   | ○始  | ○2        |             |           |          | ○発生<br>期  | ○前             | ○始       |          |                | ●      | ●      | ○      | ○      |        |                 |              |
|                       |      | 北陸       |        |                  |      |     |           |             |           |          |           |                |          |          |                |        |        |        |        |        |                 |              |
|                       |      | 関東<br>東海 | 早<br>普 |                  |      |     |           |             |           |          |           |                |          |          |                |        |        |        |        |        |                 |              |
|                       |      | 近畿<br>中国 | 早<br>普 |                  |      |     |           |             |           |          |           |                |          |          |                |        |        |        |        |        |                 |              |
|                       |      | 四国       | 早<br>普 |                  |      |     |           |             |           |          |           |                |          |          |                |        |        |        |        |        |                 |              |
|                       |      | 九州       | 早<br>普 |                  |      |     |           |             |           |          |           |                |          |          |                |        |        |        |        |        |                 |              |
|                       |      |          |        |                  |      |     |           |             |           |          |           |                |          |          |                |        |        |        |        |        |                 |              |
|                       |      |          |        |                  |      |     |           |             |           |          |           |                |          |          |                |        |        |        |        |        |                 |              |
|                       |      |          |        |                  |      |     |           |             |           |          |           |                |          |          |                |        |        |        |        |        |                 |              |

| 処理法                   | 地域名  | 作期       | ハ・エ    | 一年<br>広葉<br>マハ・イ | ホタルイ | ウリカ | ミヤ<br>ガ・グ | ヘラオモ<br>ダ・カ | クロガ<br>ワイ | オモガ<br>カ | ヒルムシ<br>ロ | 藻類<br>表層<br>剥離 | セリ       | 処理時期     | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 堆<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意                   |
|-----------------------|------|----------|--------|------------------|------|-----|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------|----------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|------------------------------|
| VII<br>NH-806<br>ジャンボ | 土壌処理 | 北海道      |        |                  |      |     |           |             |           |          |           |                |          | +5~ノビE2L | 50gx<br>10/a   |        |        |        |        |        |                 | (28)<br>(34)<br>(45)<br>(47) |
|                       |      | 東北       |        |                  |      |     |           |             |           |          |           |                |          |          |                |        |        |        |        |        |                 |                              |
|                       |      | 北陸       | ○2     | ○                | ○2   | ○2  | ○始        |             |           |          |           | ○前             |          |          |                |        | ○      | ○      | ○      | 1.5    |                 |                              |
|                       |      | 関東<br>東海 | 早<br>普 | ○2               | ○    | ○2  | ○始        | ○始          |           |          | ●発生<br>期  | ○前             | ○再生<br>前 |          |                |        | ○      | ○      | ○      | 1      |                 |                              |
|                       |      | 近畿<br>中国 | 早<br>普 | ●2               | ●    | ●2  | ●始        | ●2          |           |          | ●発生<br>期  | ○前             | ●始       |          |                |        | ○      | ○      | ○      | 1.5    |                 |                              |
|                       |      | 四国       | 早<br>普 | ○2               | ○    | ○2  | ○2        | ○2          |           |          | ○発生<br>期  | ○前             | ○始       |          |                |        | ○      | ○      | ○      | 1      |                 |                              |
|                       |      | 九州       | 早<br>普 | ●2               | ●    | ●始  | ●2        | ●始          |           |          | ●発生<br>期  | ○前             | ○始       |          |                | ●      | ●      | ●      | ●      | 1.5    |                 |                              |
|                       |      |          |        |                  |      |     |           |             |           |          |           |                |          |          |                |        |        |        |        |        |                 |                              |
|                       |      |          |        |                  |      |     |           |             |           |          |           |                |          |          |                |        |        |        |        |        |                 |                              |
|                       |      |          |        |                  |      |     |           |             |           |          |           |                |          |          |                |        |        |        |        |        |                 |                              |

| 処理法                    | 地域名      | 作期     | ハ・エ | 一年<br>広葉<br>マツハ | ホタル | クワカ | ミヤ<br>ガツリ | ヘラオモ<br>タガ | クログ<br>ワイ | オモガ<br>カ | ヒルム<br>シロ | 藻類<br>剥離 | セリ           | 処理時期      | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 植<br>土 | 減水<br>cm/d | 使用上の<br>注意                   |
|------------------------|----------|--------|-----|-----------------|-----|-----|-----------|------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|-----------|----------------|---------|--------|--------|--------|------------|------------------------------|
| VII<br>NII-906<br>ジヤンボ | 北海道      |        |     |                 |     |     |           |            |           |          |           |          | 再生<br>前      | +5~ノビ I2L | 50gx<br>13/a   |         |        |        |        |            | (28)<br>(34)<br>(45)<br>(47) |
|                        | 東北       |        |     |                 |     |     |           |            |           |          |           |          |              |           |                |         |        |        |        |            |                              |
|                        | 北陸       |        | ●2  | ●               | ●始  | ●始  | ●始        |            |           |          |           |          | ●始           |           |                |         | ●      | ●      | ●      | 1.5        |                              |
|                        | 関東<br>東海 | 早<br>普 | ●2  | ●               | ●2  | ●始  | ●始        |            |           |          | 発生<br>期   | ●前       | 再生<br>前      |           |                |         |        | ●      | ●      | 2          |                              |
|                        | 近畿<br>中国 | 早<br>普 | ●2  | ●               | ●2  | ●2  | ●2        |            |           |          |           | ●前       | 再生<br>前<br>始 |           |                |         | ●      | ●      | ●      | 1          |                              |
|                        | 四国       | 早<br>普 | ●2  | ●               | ●2  | ●2  | ●2        |            |           |          |           | ●前       | 再生<br>前      |           |                |         | ●      | ●      | ●      |            |                              |
|                        | 九州       | 早<br>普 | ●2  | ●               | ●2  | ●2  | ●2        |            |           |          | 発生<br>期   | ●        | 再生<br>前<br>始 |           |                | ●1      | ●      | ●      | ●      | 1.5        |                              |
|                        |          |        |     |                 |     |     |           |            |           |          |           |          |              |           |                |         |        |        |        |            |                              |
|                        |          |        |     |                 |     |     |           |            |           |          |           |          |              |           |                |         |        |        |        |            |                              |
|                        |          |        |     |                 |     |     |           |            |           |          |           |          |              |           |                |         |        |        |        |            |                              |

| 処理法                                  | 地域名      | 作期     | ハ・エ | 一年<br>広葉<br>マツハ | ホタル | クワカ | ミヤ<br>ガツリ | ヘラオモ<br>タガ | クログ<br>ワイ | オモガ<br>カ | ヒルム<br>シロ | 藻類<br>剥離 | セリ           | 処理時期      | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 植<br>土 | 減水<br>cm/d | 使用上の<br>注意                   |
|--------------------------------------|----------|--------|-----|-----------------|-----|-----|-----------|------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|-----------|----------------|---------|--------|--------|--------|------------|------------------------------|
| VII<br>ONC-381<br>(旧 NC-381)<br>ジヤンボ | 北海道      |        | ●2  | ●               | ●始  | ●始  |           | ●前         |           |          | 発生<br>期   | ●前       | 再生<br>前      | +5~ノビ I2L | 30gx<br>13/a   |         | ●5     | ●      | ●      | 2          | (28)<br>(34)<br>(45)<br>(47) |
|                                      | 東北       |        | ●2  | ●               | ●2  | ●始  | ●2        |            |           |          | ●         | ●前       | 再生<br>前      |           |                |         |        | ●      | ●      | 1          |                              |
|                                      | 北陸       |        | ●2  | ●               | ●始  | ●始  | ●始        |            |           |          |           |          | 始            |           |                |         | ●      | ●      | 1.5    |            |                              |
|                                      | 関東<br>東海 | 早<br>普 | ●2  | ●               | ●2  | ●始  | ●始        |            |           |          | 発生<br>期   | ●前       | 再生<br>前      |           |                |         |        | ●      | ●      | 1          |                              |
|                                      | 近畿<br>中国 | 早<br>普 | ●2  | ●               | ●2  | ●始  | ●始        |            |           |          |           | ●前       | 再生<br>前<br>始 |           |                |         | ●      | ●      | ●      | 1.5        |                              |
|                                      | 四国       | 早<br>普 | ●2  | ●               | ●2  | ●2  | ●2        |            |           |          |           | ●        | 再生<br>前      |           |                |         |        | ●      | ●      |            |                              |
|                                      | 九州       | 早<br>普 | ●2  | ●               | ●始  | ●始  | ●始        |            |           |          | 発生<br>期   | ●        | 再生<br>前<br>始 |           |                | ●       | ●      | ●      | ●      | 1.5        |                              |
|                                      |          |        |     |                 |     |     |           |            |           |          |           |          |              |           |                |         |        |        |        |            |                              |
|                                      |          |        |     |                 |     |     |           |            |           |          |           |          |              |           |                |         |        |        |        |            |                              |
|                                      |          |        |     |                 |     |     |           |            |           |          |           |          |              |           |                |         |        |        |        |            |                              |

VII SW-001④ ジヤンボ 「継」

VII SW-001④ ジヤンボ 「継」

| 処理法                   | 地域名      | 作期     | ハ・エ | 一年<br>広葉<br>マツハ | ホタル | クワカ | ミヤ<br>ガツリ | ヘラオモ<br>タガ | クログ<br>ワイ | オモガ<br>カ | ヒルム<br>シロ | 藻類<br>剥離 | セリ | 処理時期                                                          | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 植<br>土 | 減水<br>cm/d | 使用上の<br>注意                           |
|-----------------------|----------|--------|-----|-----------------|-----|-----|-----------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----|---------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|--------|--------|------------|--------------------------------------|
| VII<br>SW-952<br>ジヤンボ | 北海道      |        | ○2  | ○               | ○2  | ○2  |           | ●始         |           | ○前       | ○発生<br>期  | ○前       | ○  | +3~ノビ I2L<br>*Eノリノサカサ<br>2L<br>*①ジヤンボ<br>発生前<br>②コガサカサ<br>発生始 | 30gx<br>13/a   | ○1.5    | ○      | ○      | ○      | 2          | (36)<br>(40)<br>(42)<br>(45)<br>(47) |
|                       | 東北       |        | ○2  | ○               | ○2  | ○2  | ○始        | ○2         | ○前        | ○前       | ○発生<br>期  | ○前       | ○  |                                                               |                | ○       | ○      | ○      | ○      | 1.5        |                                      |
|                       | 北陸       |        |     |                 |     |     |           |            |           |          |           |          | 始  |                                                               |                |         |        |        |        |            |                                      |
|                       | 関東<br>東海 | 早<br>普 |     |                 |     |     |           |            |           |          |           |          |    |                                                               |                |         |        |        |        |            |                                      |
|                       | 近畿<br>中国 | 早<br>普 |     |                 |     |     |           |            |           |          |           |          |    |                                                               |                |         |        |        |        |            |                                      |
|                       | 四国       | 早<br>普 |     |                 |     |     |           |            |           |          |           |          |    |                                                               |                |         |        |        |        |            |                                      |
|                       | 九州       | 早<br>普 |     |                 |     |     |           |            |           |          |           |          |    |                                                               |                |         |        |        |        |            |                                      |
|                       |          |        |     |                 |     |     |           |            |           |          |           |          |    |                                                               |                |         |        |        |        |            |                                      |
|                       |          |        |     |                 |     |     |           |            |           |          |           |          |    |                                                               |                |         |        |        |        |            |                                      |
|                       |          |        |     |                 |     |     |           |            |           |          |           |          |    |                                                               |                |         |        |        |        |            |                                      |

クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(東北)

| 処理法                      | 地域名      | 作期     | ハ・エ | 一年<br>広葉<br>マツハ | ホタル | クワカ | ミヤ<br>ガツリ | ヘラオモ<br>タガ | クログ<br>ワイ | オモガ<br>カ | ヒルム<br>シロ | 藻類<br>剥離 | セリ      | 処理時期      | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>壌土 | 壤<br>土 | 堆<br>土 | 植<br>土 | 減水<br>cm/d | 使用上の<br>注意   |
|--------------------------|----------|--------|-----|-----------------|-----|-----|-----------|------------|-----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|----------------|---------|--------|--------|--------|------------|--------------|
| VII<br>SW-952P5⑤<br>ジヤンボ | 北海道      |        | ●2  | ●               | ●始  | ●始  |           | ●始         |           |          | ●発生<br>期  | ●前       | 再生<br>前 | +3~ノビ I2L | 35gx<br>13/2a  |         | ●5     | ●      | ●      | 2          | (45)<br>(47) |
|                          | 東北       |        | ●2  | ●               | ●2  | ●始  | ●2        |            |           |          | ●発生<br>期  | ●前       | 再生<br>前 |           |                |         |        | ●      | ●      | 1.5        |              |
|                          | 北陸       |        |     |                 |     |     |           |            |           |          |           |          | 始       |           |                |         |        |        |        |            |              |
|                          | 関東<br>東海 | 早<br>普 |     |                 |     |     |           |            |           |          |           |          |         |           |                |         |        |        |        |            |              |
|                          | 近畿<br>中国 | 早<br>普 |     |                 |     |     |           |            |           |          |           |          |         |           |                |         |        |        |        |            |              |
|                          | 四国       | 早<br>普 |     |                 |     |     |           |            |           |          |           |          |         |           |                |         |        |        |        |            |              |
|                          | 九州       | 早<br>普 |     |                 |     |     |           |            |           |          |           |          |         |           |                |         |        |        |        |            |              |
|                          |          |        |     |                 |     |     |           |            |           |          |           |          |         |           |                |         |        |        |        |            |              |
|                          |          |        |     |                 |     |     |           |            |           |          |           |          |         |           |                |         |        |        |        |            |              |
|                          |          |        |     |                 |     |     |           |            |           |          |           |          |         |           |                |         |        |        |        |            |              |

| 処理法                        | 地域名 | 作期 | ハ' E | 一年広葉マハ' I | ホ' R I | ウ' R I | ミ' ガ' ヲ | ヘ' ア' タ' カ | ク' ロ' ヲ | モ' タ' カ | ヒ' ル' シ' ロ | 葉類剥離 | セ' リ | 処理時期      | 使用量・製品            | 砂壌土 | 壤土 | 埴壌土 | 埴土 | 減水深 cm/d | 使用上の注意                       |
|----------------------------|-----|----|------|-----------|--------|--------|---------|------------|---------|---------|------------|------|------|-----------|-------------------|-----|----|-----|----|----------|------------------------------|
| VII<br>SW-952P5(1)<br>ジャンボ | 北海道 |    |      |           |        |        |         |            |         |         |            |      | 再生前  |           | 35g<br>x13<br>/2a |     |    |     |    |          | (28)<br>(34)<br>(45)<br>(47) |
|                            | 東北  |    |      |           |        |        |         |            |         |         |            |      | 再生前  |           |                   |     |    |     |    |          |                              |
|                            | 北陸  |    | ●2   | ●         | ●2     | ●始     | ●始      | ●始         |         |         |            |      | ●始   | +3~ハ' E2L |                   |     | ●  | ●   | ●  | 2        |                              |
|                            | 関東  | 早  |      |           |        |        |         |            |         |         |            | 発生期  | ●前   | ●再生前      |                   |     |    | ●   | ●  | ●        |                              |
|                            | 東海  | 普  | ●2   | ●         | ●2     | ●始     | ●始      |            |         |         | ●発生期       | ●前   | ●再生前 |           |                   |     |    | ●   | ●  | ●        |                              |
|                            | 近畿  | 早  |      |           |        |        |         |            |         |         |            |      | ●再生前 | ●始        |                   |     |    |     |    |          |                              |
|                            | 中国  | 普  | ●2   | ●         | ●2     | ●2     | ●2      |            |         |         |            | ●前   | ●始   |           |                   |     | ●  | ●   | ●  | 1        |                              |
|                            | 四国  | 早  |      |           |        |        |         |            |         |         |            |      | ●再生前 | ●始        |                   |     |    |     |    |          |                              |
|                            | 普   | ●2 | ●    | ●2        | ●2     | ●2     |         |            |         |         | ●前         | ●始   |      |           |                   |     | ●  | ●   | ●  |          |                              |
|                            | 九州  | 早  |      |           |        |        |         |            |         |         |            | 発生期  | ●再生前 | ●始        |                   |     |    |     |    |          |                              |
|                            | 普   | ●2 | ●    | ●2        | ●2     | ●2     |         |            |         |         | ●発生期       | ●前   | ●始   |           |                   | ●   | ●  | ●   | ●  | 1.5      |                              |

| 処理法                      | 地域名 | 作期 | ハ' E | 一年広葉マハ' I | ホ' R I | ウ' R I | ミ' ガ' ヲ | ヘ' ア' タ' カ | ク' ロ' ヲ | モ' タ' カ | ヒ' ル' シ' ロ | 葉類剥離 | セ' リ | 処理時期      | 使用量・製品            | 砂壌土 | 壤土 | 埴壌土 | 埴土  | 減水深 cm/d | 使用上の注意                       |
|--------------------------|-----|----|------|-----------|--------|--------|---------|------------|---------|---------|------------|------|------|-----------|-------------------|-----|----|-----|-----|----------|------------------------------|
| VII<br>TII-913CS<br>ジャンボ | 北海道 |    | ○2   | ○         | ○始     | ○始     |         | ○始         |         |         | ○発生期       | ○前   | ○再生前 |           | 50g<br>x13<br>/2a | ●   | ○  | ○   | ○   | 2        | (34)<br>(41)<br>(45)<br>(47) |
|                          | 東北  |    | ○2   | ○         | ○2     | ○始     | ○2      |            |         |         | ○発生期       | ○前   | ○再生前 |           |                   |     |    | ○   | ○   | 1.5      |                              |
|                          | 北陸  |    | ○2   | ○         | ○2     | ○始     | ○始      | ○始         |         |         |            | ○前   | ○始   | +3~ハ' E2L |                   |     | ○  | ○   | ○   |          |                              |
|                          | 関東  | 早  | ●2   | ●         | ●2     | ●2     | ●2      |            |         |         |            | ●発生期 | ●前   | ●再生前      |                   |     |    | ●   | ●   | 1        |                              |
|                          | 東海  | 普  | ○2   | ○         | ○2     | ○2     | ○始      |            |         |         | ○発生期       | ○前   | ○再生前 |           |                   |     | ○  | ○   | 1.5 |          |                              |
|                          | 近畿  | 早  | ●2   | ●         | ●2     | ●始     | ●2      |            |         |         | ●発生期       | ●前   | ●再生前 |           |                   |     | ●  | ●   |     |          |                              |
|                          | 中国  | 普  | ○2   | ○         | ○2     | ○始     | ○2      |            |         |         | ○発生期       | ○前   | ○始   |           |                   | ●   | ○  | ○   |     |          | *砂壌土は1.5Lまで(近畿・中国・四国)        |
|                          | 四国  | 早  | ●2   | ●         | ●2     | ●始     | ●2      |            |         |         | ●発生期       | ●前   | ●再生前 |           |                   | ●   | ●  | ●   |     |          |                              |
|                          | 普   | ○2 | ○    | ○2        | ○始     | ○2     |         |            |         |         | ○発生期       | ○前   | ○始   |           |                   | ●   | ○  | ○   |     |          |                              |
|                          | 九州  | 早  | ●2   | ●         | ●2     | ●2     | ●2      |            |         |         | ●発生期       | ●前   | ●再生前 |           |                   | ●   | ●  | ●   | 1   |          |                              |
|                          | 普   | ○2 | ○    | ○2        | ○2     | ○2     |         |            |         |         | ○発生期       | ○前   | ○始   |           |                   | ○   | ○  | ○   | 1.5 |          |                              |

|                           | 処理法  | 地域名 | 作期 | ハ' E | 一年広葉マハ' I | ホ' R I | ウ' R I | ミ' ガ' ヲ | ヘ' ア' タ' カ | ク' ロ' ヲ | モ' タ' カ | ヒ' ル' シ' ロ | 葉類剥離 | セリ  | 処理時期        | 使用量・製品       | 砂壌土 | 壤土 | 埴壌土 | 埴土 | 減水深<br>cm/d | 使用上の注意                       |                     |
|---------------------------|------|-----|----|------|-----------|--------|--------|---------|------------|---------|---------|------------|------|-----|-------------|--------------|-----|----|-----|----|-------------|------------------------------|---------------------|
| VII<br>AC-014C(1)<br>ジャンボ | 土壌処理 | 北海道 |    | ○1.5 | ○         | ○始     |        |         |            |         |         |            |      |     | +5~ハ' E1.5L | 50gx<br>13/a |     | ○  | ○   | ○  | 1           | (28)<br>(34)<br>(45)<br>(47) |                     |
|                           |      | 東北  |    | ○1.5 | ○         | ○始     | ○始     | ○始      |            |         |         |            |      |     |             |              |     |    |     | ○  | ○           | 1.5                          |                     |
|                           |      | 北陸  |    | ○2   | ○         | ○始     | ○始     |         |            |         |         |            |      |     |             | +5~ハ' E2L    |     |    | ○   | ○  |             |                              |                     |
|                           |      | 関東  | 早  |      |           |        |        |         |            |         |         |            |      | 発生期 |             |              |     |    |     |    |             |                              |                     |
|                           |      | 東海  | 普  | ○2   | ○         | ○始     | ●始     | ●始      |            |         |         |            | ●発生期 |     |             |              |     | ●  | ○   | ○  | ○           | 2                            | * 砂壌土は1.5Lまで(関東・東海) |
|                           |      | 近畿  | 早  |      |           |        |        |         |            |         |         |            |      |     |             |              |     |    |     |    |             |                              |                     |
|                           |      | 中国  | 普  | ○2   | ○         | ○始     | ○始     |         |            |         |         |            |      |     |             |              |     |    | ○   | ○  | ○           | 1                            |                     |
|                           |      | 四国  | 早  |      |           |        |        |         |            |         |         |            |      |     |             |              |     |    |     |    |             |                              |                     |
|                           |      | 普   | ○2 | ○    | ○始        | ○始     |        |         |            |         |         |            |      |     |             |              |     |    | ○   | ○  |             |                              |                     |
|                           |      | 九州  | 早  |      |           |        |        |         |            |         |         |            |      | 発生期 |             |              |     |    |     |    |             |                              |                     |
|                           | 普    | ○2  | ○  | ○2   | ○2        | ○2     |        |         |            |         | ○発生期    |            |      |     |             |              | ○   | ○  | ○   | ○  | 1.5         |                              |                     |

## IX 一年生持続型除草剤

## IX HOK-991 ジャンボ「継」

|                        | 処理法  | 地域名  | 作期   | ハ' E<br>広葉マハ' I | ホ' R I | ウ' R I | ミ' ガ' ヲ | ヘ' ア' タ' カ | ク' ロ' ヲ | オ' モ' タ' カ | ヒ' ル' シ' ロ | 葉類剥離 |  | 処理時期        | 使用量・製品            | 砂壌土 | 壤土 | 埴壌土 | 埴土 | 減水深<br>cm/d | 使用上の<br>注意           |  |
|------------------------|------|------|------|-----------------|--------|--------|---------|------------|---------|------------|------------|------|--|-------------|-------------------|-----|----|-----|----|-------------|----------------------|--|
| IX<br>SB-533P5<br>ジャンボ | 土壌処理 | 北海道  |      | ●1.5            | ●      | ●始     |         | ●始         |         |            |            |      |  | +1〜ハ' E1.5L | 30g<br>x13<br>/2a |     | ●  | ●   | ●  | 2           | (34)<br>(45)<br>(47) |  |
|                        |      | 東北   |      | ●1.5            | ●      | ●始     | ●始      |            |         |            |            |      |  |             |                   |     |    | ●   | ●  | 1           |                      |  |
|                        |      | 北陸   |      | ●1.5            | ●      | ●始     | ●始      |            |         |            |            |      |  |             |                   |     |    | ●   | ●  | 1.5         |                      |  |
|                        |      | 関東   | 早    |                 |        |        |         |            |         |            |            |      |  |             |                   |     |    |     |    |             |                      |  |
|                        |      | 東海   | 普    | ●1.5            | ●      | ●始     | ●前      |            |         |            |            |      |  |             |                   |     | ●  | ●   | ●  | 2           |                      |  |
|                        |      | 近畿   | 早    |                 |        |        |         |            |         |            |            |      |  |             |                   |     |    |     |    |             |                      |  |
|                        |      | 中国   | 普    | ●1.5            | ●      | ●始     | ●始      |            |         |            |            |      |  |             |                   |     |    | ●   | ●  | 1           |                      |  |
|                        |      | 四国   | 早    |                 |        |        |         |            |         |            |            |      |  |             |                   |     |    |     |    |             |                      |  |
|                        |      | 普    | ●1.5 | ●               | ●始     | ●始     |         |            |         |            |            |      |  |             |                   |     |    | ●   | ●  |             |                      |  |
|                        |      | 九州   | 早    |                 |        |        |         |            |         |            |            |      |  |             |                   |     |    |     |    |             |                      |  |
|                        | 普    | ●1.5 | ●    | ●始              | ●始     |        |         |            |         |            |            |      |  |             |                   | ●   | ●  | ●   |    |             |                      |  |

|                      | 処理法  | 地域名      | 作期     | 1年<br>広葉<br>マハイ | ホタテ | ウリカ | ミヤ<br>ガヤ | ヘラオ<br>モタ | クロ<br>ワイ | オモ<br>ガ | ヒル<br>シ | 藻類<br>剥離 | ヒ | 処理時期            | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意   |
|----------------------|------|----------|--------|-----------------|-----|-----|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|---|-----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|--------------|
| IX<br>SB-554<br>ジャンボ | 土壌処理 | 北海道      |        |                 |     |     |          |           |          |         |         |          |   |                 | 50gx<br>17/a   |        |        |        |        |                 | (45)<br>(47) |
|                      |      | 東北       |        |                 |     |     |          |           |          |         |         |          |   |                 |                |        |        |        |        |                 |              |
|                      |      | 北陸       |        |                 |     |     |          |           |          |         |         |          |   |                 |                |        |        |        |        |                 |              |
|                      |      | 関東<br>東海 | 早<br>普 |                 |     |     |          |           |          |         |         |          |   |                 |                |        |        |        |        |                 |              |
|                      |      | 近畿<br>中国 | 早<br>普 | ●1              | ●   | ●始  | ●前       |           |          |         |         |          |   | +1~+5<br>(7EIL) |                |        | ●      | ●      | ●      | 2               |              |
|                      |      | 四国       | 早<br>普 | ●1              | ●   | ●始  | ●前       |           |          |         |         |          |   |                 |                |        | ●      | ●      | ●      |                 |              |
|                      |      | 九州       | 早<br>普 |                 |     |     |          |           |          |         |         |          |   |                 |                |        |        |        |        |                 |              |

|                      | 処理法  | 地域名      | 作期     | 1年<br>広葉<br>マハイ | ホタテ | ウリカ | ミヤ<br>ガヤ | ヘラオ<br>モタ | クロ<br>ワイ | オモ<br>ガ | ヒル<br>シ | 藻類<br>剥離 | ヒ | 処理時期    | 使用<br>量・<br>製品 | 砂<br>土 | 壤<br>土 | 埴<br>土 | 埴<br>土 | 減水<br>深<br>cm/d | 使用上の<br>注意   |
|----------------------|------|----------|--------|-----------------|-----|-----|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|---|---------|----------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|--------------|
| IX<br>SW-965<br>ジャンボ | 土壌処理 | 北海道      | ○2     | ○               | ○始  | ○始  | ●始       |           |          |         |         |          |   | +3~7EIL | 50gx<br>17/a   | ●      | ○      | ○      | ○      | 2               | (45)<br>(47) |
|                      |      | 東北       | ○2     | ○               | ○2  | ○始  | ○始       |           |          |         |         |          |   |         |                | ○      | ○      | ○      | ○      | 1.5             |              |
|                      |      | 北陸       | ○2     | ○               | ○始  | ○始  |          |           |          |         |         |          |   |         |                | ○      | ○      | ○      | ○      | 1               |              |
|                      |      | 関東<br>東海 | 早<br>普 | ○2              | ○   | ○始  | ○始       |           |          |         |         |          |   |         |                | ●      | ●      | ○      | ○      |                 |              |
|                      |      | 近畿<br>中国 | 早<br>普 | ○2              | ○   | ○始  | ○始       |           |          |         |         |          |   |         |                | ○      | ○      | ○      | ○      | 2               |              |
|                      |      | 四国       | 早<br>普 | ○2              | ○   | ○始  | ○始       |           |          |         |         |          |   |         |                | ○      | ○      | ○      | ○      | 1.5             |              |
|                      |      | 九州       | 早<br>普 | ○2              | ○   | ○始  | ○始       |           |          |         |         |          |   |         |                | ●      | ○      | ○      | ○      | 2               |              |
|                      |      |          |        |                 |     |     |          |           |          |         |         |          |   |         |                | ○      | ○      | ○      | ○      | 1.5             |              |
|                      |      |          |        |                 |     |     |          |           |          |         |         |          |   |         |                | ○      | ○      | ○      | ○      |                 |              |
|                      |      |          |        |                 |     |     |          |           |          |         |         |          |   |         |                | ○      | ○      | ○      | ○      |                 |              |

## 水稻用除草剤

初期一発除草剤

**アワード** フロアブル  
クサトリ-E ジャンボ L

初・中期一発除草剤

**キングダム** フロアブル  
クサナイン フロアブル

初期除草剤

**一振田助** フロアブル  
**農将軍** フロアブル

**カルショット** フロアブル  
**シーゼット** フロアブル

**ビーンズ** 1キロ粒剤  
**ライガード** フロアブル  
**ロンゲット** フロアブル

**シング** 乳剤  
**レトリ** フロアブル

には、  
**ピリブチカルブ**<sup>®</sup>  
が使用されています。

**コニ**

**大日本インキ化学工業株式会社**  
東京都中央区日本橋3-7-20 ティックビル

水稻関係除草剤使用基準の表示について

1. 過年度、既に実用化の認められている適用草種・土壌条件に○を印した。  
 (本年度の試験の結果、特に拡大のない場合も含む)  
 草種欄の数字、字句で草種ごとの葉齢を示した。  
 [例：○始(発生始)、○2(2葉期まで)]  
 IV及びVの項目の地域名の○は、前年度までに実用化の認められている地域を示し、●は本年度新たに実用化の認められた地域を示した。  
 使用上の注意は別途一覧表の番号で記し、一覧表にない注意事項の場合は欄外に字句を記載した。
2. 本年度、新たに使用基準が作成された場合は、実用化可能となった適用草種・土壌に●を印し、処理時期および使用量を記載した。
3. 過年度の基準に適用条件拡大が可能となった場合  
 作 期 の 拡 大：拡大可能となった作期の適用草種・土壌に●を印した。  
                   地域判定欄は「実・継」  
 草 種 の 拡 大：拡大可能となった草種に●を印した。  
 葉 齢 の 拡 大：拡大可能となった葉齢に、アンダーラインを付した。  
                   (例：○2.5)  
                   処理時期、使用量の拡大：拡大部分にアンダーラインを付した。(例：+3~1/1 12L, 50~75ml/a)  
 土壌条件の拡大：拡大可能となった土壌に●を印した。
4. 「継」、「継?」、「中止」の場合は判定のみ記載した。

前年度までの試験経過欄( )内の記号

- A : 新規年度  
 A a : 新規年度(但し成分から作用性が予測される剤)  
 B : 他の栽培法、やや異なる処理法  
 C : 継続検討

## 使用上の注意一覧表

- (1) 低気温及び低水温は薬害の危険性があるので使用はさける。
- (2) 処理後2日以内に低温や降雨が予想される場合は使用をさける。
- (3) ごく浅植えの場合、薬害のおそれがあるので注意する。
- (4) 移植後の深水はさける。
- (5) 深水での処理はさける。
- (6) 散布は水稻になるべくかからないようにする。
- (7) 著しい高温条件下の時は、砂壤土ではクロロシスの発生が著しいので注意する。
- (8) トリアジン系除草剤の使用上の注意を守る。
- (9) MCP混合剤の注意事項を守る。
- (10) 処理後の灌水は48～72時間経過後に行う。
- (11) 処理後2日以内に降雨が予想される場合は使用をさしひかえる。
- (12) 落水もしくは浅水で使用する。
- (13) ミズガヤツリの多い水田では早めに散布する。
- (14) ミズガヤツリに対し遅い処理では、400g/aを処理する。
- (15) ホタルイ、ミズガヤツリ優占圃場では、400g/aで処理する。
- (16) ホタルイ多発田では早めに使用する。
- (17) 泥炭質土壌では、ウリカワに対する効果が低下することがある。
- (18) コナギ多発田では早めに処理する。
- (19) 一年生広葉雑草多発田では400g/aとし、特にヒメミソハギが多発する水田での使用はさける。
- (20) クログワイ防除はクログワイに有効な前処理剤との組み合わせで使用する。
- (21) 前処理剤との組み合わせで使用する。
- (22) 希釈水量は出来るだけ少なく茎葉に付着するように散布する。
- (23) ノリ面散布は避ける。
- (24) 流入、飛散等による水稻への薬害に注意する。
- (25) 周辺の作物に飛散しないように注意する。
- (26) 植付精度不良で根が露出する水田では使用しない。
- (27) ホタルイ多発田では、ホタルイに有効な中・後期剤との組み合わせで使用する。
- (28) 著しい多雨条件では除草効果が低下する場合があるので使用はさしひかえる。
- (29) コウキヤガラに有効な中・後期剤との組み合わせで使用する。
- (30) 水稻が水面に抽出してから使用する。
- (31) 短小苗、深水条件での使用はさける。
- (32) クログワイ防除はクログワイに有効な後期剤との組み合わせで使用する。
- (33) 広葉多発田での使用はさける。
- (34) 田植前に生育したミズガヤツリは、完全に防除してから使用する。
- (35) マツバイ多発田での使用はさける。
- (36) コウキヤガラ防除は、コウキヤガラに有効な剤との組み合わせで使用する。
- (37) クログワイ防除の場合、同一成分含有薬剤を初期剤として使用しないこと。
- (38) オモダカ防除は、オモダカに有効な剤との組み合わせで使用する。
- (39) ミズガヤツリ防除は、ミズガヤツリに有効な前処理剤との組み合わせで使用する。
- (40) シズイ防除は、シズイに有効な剤との組み合わせで使用する。
- (41) 散布後24時間以内から1日50mm以上の降雨が連続することが予想される場合は使用を差し控える。
- (42) クログワイ防除は、クログワイに有効な剤との組み合わせで使用する。
- (43) エゾノサヤヌカグサ防除は、エゾノサヤヌカグサに有効な剤との組み合わせで使用する。
- (44) クサネムが残草または後発生した場合は有効な後期剤を散布する。
- (45) 水深5～6cmの湛水条件で投入し、少なくとも1日間は十分な水位を維持する。
- (46) 移植前処理は田面水が澄んでから投入する。
- (47) 藻類または表層剥離の発生しやすい水田では有効な剤との体系で使用する。
- (48) 散布に均一性を必要としない。湛水周縁部散布は、藻類・表層剥離などの浮遊物のない条件で田面の露出しない十分な水深で行う。

## 平成11年度桑園関係 除草剤・生育調節剤試験成績概要

財団法人 日本植物調節剤研究協会

平成11年度桑園関係除草剤・生育調節剤試験成績の検討および判定は、桑園関係専門調査員尾暮正義氏及び市橋隆壽氏によって行われた。

本年度の委託試験は、除草剤1薬剤（5点）で

あった。

その判定結果および使用基準については、次の判定表に示す通りである。

### 平成11年度 桑園関係除草剤・生育調節剤試験供試薬剤および判定一覧

#### A. 除草剤

| 薬剤名<br>(商品名)<br>有効成分および<br>含有率(%)<br>[委託者]             | 作物名<br>(品種) | 試験の<br>種類<br>新・継<br>の別 | 試験実施場所<br>(数)                                       | 試験設計 [対象雑草]<br>処理時期<br>;薬量g・ml<水量L>/a<br>;処理方法等                                                                                   | 判<br>定  | 内<br>容                                                                          |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. MON-96A 液剤<br>グリホサートアンモニウム塩<br>41%<br><br>[日本モンサント] | 桑           | 適用性<br>継 続             | 福島蚕試、<br>栃木南河内、<br>長野南信農試、<br>徳島鴨島、<br>鹿児島蚕試<br>(4) | [雑草全般]<br>・秋冬期 雑草生育期<br>;25ml<2.5, 5L(少量散布ノズル, 10L)>, 50ml<2.5L(少量散布ノズル), 10L><br>;茎葉処理<br>対: ラウンドアップ® 液剤 25ml<br><2.5L(少量散布ノズル)> | 実・<br>継 | 実) [雑草全般]<br>秋冬期 雑草生育期<br>25~50ml/a<5~10L/a><br>茎葉処理<br>継)<br>・2.5L/a散布での効果の確認。 |

この草はなんだろう? 手軽に調べたい。

## 三二雑草図鑑

—— 耕地雑草ハンドブック ——

A5判 本体2,200円(税別)

耕地には主要なものだけで150種を超える雑草が生えてきます。これら雑草の防除の第一歩は草を知ることです。本書は、農耕地や樹園地などによく見られる雑草397種を写真とともに紹介した、草を知るための野帳版雑草図鑑です。

## 原色図鑑 芽ばえとたね

浅野 貞夫/著

A4判 本体9,800円(税別)

芽ばえの姿はどうなんだろう。本書は、植物の芽ばえのようすを克明に表した精密図版と、種・成植物の写真による植物の一生図鑑です。成植物のみの図鑑と異なり、芽ばえのようすから紹介しているため、植生などの調査にたいへん役に立つとの声が寄せられています。

全国農村教育協会

〒110-0016 東京都台東区台東1-26-6  
Tel. 03-3833-1821 Fax. 03-3833-1665

## 植調協会だより

◎ 会議開催日程のお知らせ

・平成12年度沖縄試験成績検討会

日時：平成13年4月10日(火)，13:30～16:00

場所：植調会館

〒110-0016 東京都台東区台東1-26-6

TEL 03-3832-4188 (代)

スギナにも  
カマドバスター速安

**スギナ**

●なんでも枯らすバスター  
バスターはほとんどすべての雑草に効果できめん。スギナ、ツユクサなどの問題雑草にも優れた効果を発揮します。

●速く効く、長く効くバスター  
バスターは速く効いて、しかも長く効く。〈速く〉〈長く〉という両方で満足できます。

●作物にやさしいバスター  
バスターは作物体の他の部分に移行して影響が出たり、後にまで影響することはありません。  
※バスターは非選択性ですので、作物の茎葉に飛散するとかかった場所に薬害を生じますので注意してください。

●使いやすいバスター  
バスターは普通物、魚毒性はA類相当(原体)です。また、土壤微生物によりすばやく分解されるので、土や環境に影響の少ない除草剤です。

# バスター<sup>®</sup> 液剤

®は登録商標

バスター普及会 / 日産化学工業(株) アベンティス クロップサイエンス ジャパン(株) 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1

財団法人 日本植物調節剤研究協会  
東京都台東区台東1丁目26番6号  
電話 東京(03)3832-4188 (代)

編集人 日本植物調節剤研究協会 会長 小林 仁  
発行人 植調編集印刷事務所 広田 伸七

平成13年3月発行  
植調第34巻第12号

定価420円(送料270円)  
(本体400円, 消費税20円)

東京都台東区台東1-26-6 全国農村教育協会  
発行所 植調編集印刷事務所  
電話 東京(03)3833-1821番(代)  
印刷所 新成印刷(有)

# 一発除草剤は「新時代へ」



早めに処理して長〜く効く

## ザ・ワンフロアブル・1キロ粒剤

田植直後から使える

**アワード**®フロアブル

処理幅が長い

**ロングゲット**®フロアブル

自己拡散型

**クラッシュ**®1キロ粒剤

ノビエ3葉期まで使える

**シェリフ**®1キロ粒剤

安心の初中期一発処理剤

**バトル**®1キロ粒剤

湛水直播水稻にも

**キックバイ**®1キロ粒剤

**ゴーサイン**®粒剤 **ハヤテ**®粒剤

▲ 武田薬品工業株式会社  
アグロカンパニー

〒103-8668 東京都中央区日本橋二丁目13番10号



*The miracles of science™*

## デュポン株式会社 農業製品事業部

東京本社 〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1 アルコタワー TEL.03-5434-6117

大阪支社 〒550-0002 大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービル4階 TEL.06-6449-3961

名古屋支店 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-24-30 名古屋三井ビル本館13階 TEL.052-571-7730

札幌事務所 〒060-0003 札幌市中央区北三条西2-10-2 札幌HSビル11階 TEL.011-251-3752

仙台事務所 〒980-0811 仙台市青葉区一番町2-7-17 朝日生命仙台一番町ビル2階 TEL.022-267-5326


福岡事務所 〒810-0001 福岡市中央区天神1-12-20 日之出東京海上ビルディング6階 TEL.092-761-7871

ボトルのままで、アゼから、水口から!!  
**水稻用初期除草剤**

# ショキニー<sup>®</sup> フロアブル

少量散布  
10アール当り  
300ml

初期にいいネ!



**初期除草は「カンタン」がいい。**

【使用時期】 ※本剤の使用時期は「移植直後からノビエ1葉期」、田植同時処理もできます。

|                                            |       |               |
|--------------------------------------------|-------|---------------|
| 散布適期                                       | 移植    | 7日後           |
| 北海道・東北・北陸、及び九州の早期栽培                        | 散布最適期 | ……→中期剤又は一発処理剤 |
| 少量散布の場合、及び通常散布の関東以西の普通期栽培、関東以西(九州を除く)の早期栽培 | 移植    | 5日後           |
|                                            | 散布最適期 | ……→中期剤又は一発処理剤 |

- 特長**
- 1.原液散布で省力・簡単。
  - 2.アゼナ、ホタルイにも卓効。
  - 3.持続効果に優れ、安定した除草効果。
  - 4.移植水稻に対する影響が少ない。



●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

お求めは皆様のJA(農協)へ



JAグループ

農 協

全 農

経 済 連

お問い合わせ・資料請求は



**クミアイ化学工業株式会社**

本社：東京都台東区池之端1-4-26 〒110-8782 TEL03-3822-5131

いのちの輝きを見つける  
**Meiji**



非選択性茎葉処理型除草剤  
 (ピアラホス除草剤群)

**ハービー液剤**  
**サポート水和剤**  
**インパルス水溶剤**



**明治製菓株式会社**

104-8002 東京都中央区京橋2-4-16