

平成12年度非農耕地関係 除草剤・生育調節剤試験成績概要

財団法人 日本植物調節剤研究協会

平成11年度非農耕地関係除草剤・生育調節剤試験成績検討会は、平成13年1月31日(水)に植調会館において開催された。

この検討会には、試験場関係者12名、委託関係者48名ほか、計76名の参集を得て、除草剤34薬剤

(162点)、生育調節剤1薬剤(5点)、展着剤1薬剤(5点)について、試験成績の報告と検討が行われた。

その判定結果および使用基準については、次の判定表に示す通りである。

平成12年度 非農耕地関係除草剤・生育調節剤試験供試薬剤および判定一覧

A. 除 草 剤

薬 剤 名 (商品名) 有効成分および 含有率(%) [委託者]	試験の 種 類 新・継 の 別	試験担当場所 (数)	試験設計 [対象雑草] 処理時期 ;薬量<水量L>/a ;処理方法等 ;比)比較薬剤	判 定	内 容
1. AKD-776-MC 70アブール剤 (カロンMC) ・DBN 15%	適用性 継 続	植調北海道 植調研 宇都宮大学 岐阜畜試 岡山北部	[スギナ] ・発生始期～摘期 (草丈10cm以下) ・発生摘期～生育期 (草丈30cm以下) 200ml<10, 20>, 300ml<20> 茎葉処理 対)カロンMC70アブール 300ml<10>	実・ 継	実) [一年生雑草、ヨモギ、ギンシ 等多年生広葉雑草] ・発生始期～生育初期 (草丈10cm以下) 300～400mL<10L>/a 茎葉・土壌処理 [スギナ] ・発生始期～春期生育期 (草丈30cm以下) 200～400mL<10～20L>/a 茎葉・土壌処理 継) 一年生イネ科雑草に対する処 理時期と効果の確認
2. AKD-7087 70アブール剤 ・DBN 12% ・スルフェントラゾン 2%	適用性 継 続	植調十勝 植調研 東日本G研 島根農試 福岡豊前	[一年生雑草、ギンシ、タンポポ、 ヨモギ等多年生広葉雑草、スギナ] ・発生始期～摘期 (草丈10cm以下) 200, 300, 400mL<10> 茎葉処理 対)カロン6.7粒剤 1000g	実・ 継	実) [一年生雑草、ヨモギ、ギンシ 等多年生広葉雑草、スギナ] ・発生始期～生育初期 (草丈10cm以下) 200～400mL<10L>/a 茎葉・土壌処理 継) 草種と薬量について
3. AKD-7103 粒剤 ・DBN 1.5% ・DCMU 1%	適用性 新 規	植調北海道 植調岩手 植調研 島根農試 山口徳佐	[一年生雑草、ギンシ、タンポポ、 ヨモギ等多年生広葉雑草、スギナ] ・発生前 ・発生始期(草丈10cm以下) 2000, 4000g 土壌処理 対)カッター-粒剤 2000g	実・ 継	実) [一年生雑草、ヨモギ、ギンシ 等多年生広葉雑草、スギナ] ・発生前～発生始期 (草丈10cm以下) 2000～4000g/a 土壌処理 継) 効果の確認
4. AKD-7111-MC 粒剤 ・DBN 3.5%	適用性 新 規	植調十勝 植調岩手 新潟畜産研 植調研 岐阜畜試 島根農試 植調福岡	[一年生雑草、ギンシ、タンポポ 等多年生広葉雑草、スギナ] ・発生前～発生始期 (草丈10cm以下) 800, 1000, 1200g 土壌処理 対)カロン6.7粒剤 1000g	実・ 継	実) [一年生雑草、スギナ] ・発生前～発生始期 (草丈10cm以下) 1000～1200g/a 土壌処理 継) 低薬量での効果の確認 多年生広葉雑草に対する効 果の確認

A. 除 草 剤 つづき

薬 剤 名 (商品名) 有効成分および 含有率(%) [委託者]	試験の 種 類 新・継 の 別	試験担当場所 (数)	試験設計 [対象雑草] 処理時期 ;薬量(水量L)/a ;処理方法等 ;比)比較薬剤	判 定	内 容
5. AKD-7111-MCL 粒剤 ・ DBN 3% [アケロネショウ]	適用性 新 規	植調十勝 植調岩手 新潟畜産研 植調研 長野畜試 岐阜畜試 植調福岡	[一年生雑草、ギシギシ、タンポポ、 等多年生広葉雑草、スギナ] ・発生前～発生始期 (草丈10cm以下) 800, 1000, 1200g 土壌処理 対)カロン6.7粒剤 1000g	実・ 継	実) [一年生雑草、スギナ] ・発生前～発生始期 (草丈10cm以下) 1000～1200g/a 土壌処理 継) 低薬量での効果の確認 多年生広葉雑草に対する効果の確認
6. F-702 液剤 ・ カルフェントラソニフル 0.5% ・ グリホサートイソプロピルアミン塩 20% [エフエムシー]	適用性 継 続	草地試 岐阜畜試 岡山北部 山口徳佐 植調福岡	[一年生雑草、チガヤ、ハルガヤ、ギシギシ、スライ、ヨモギ、ハマスガ等多年生雑草] ・生育期(草丈30cm以下) 50, 75, 100ml<10> 茎葉処理 対)バスタ液剤 50ml<10>	実・ 継	実) [一年生雑草、チガヤ、ヨモギ、ギシギシ等多年生雑草] ・生育期(草丈30cm以下) 50～100ml<10L>/a 茎葉処理 継) 草種と薬量について
7. HW-102 粒剤 ・ イソクロン 1% ・ DBN 2% [保土谷アグロ]	適用性 継 続	植調十勝 植調研 植調福岡	[一年生雑草、ヨモギ、タンポポ、クハハ等多年生広葉雑草、スギナ] ・生育初期(草丈20cm以下) 1500, 2000, 3000g 土壌処理 対)クアブランカ-粒剤 1500g	実・ 継	実) [一年生雑草、ヨモギ、ギシギシ等多年生広葉雑草、スギナ] ・生育初期(草丈20cm以下) 1500～3000g/a 土壌処理 継) 草種について
8. HW-103 粒剤 ・ イソクロン 1% ・ DBN 3% ・ DCMU 6% [保土谷アグロ]	適用性 継 続	植調研 島根農試	[一年生雑草、ヨモギ、タンポポ、クハハ等多年生広葉雑草、スギナ] ・生育初期(草丈20cm以下) 1000, 1500, 2000g 土壌処理 対)クアブランカ-粒剤 1500g	実	実) [一年生雑草、ヨモギ、ギシギシ等多年生広葉雑草、スギナ] ・生育初期(草丈20cm以下) 1000～2000g/a 土壌処理
9. HW-110 粒剤 ・ イソクロン 1% ・ MCPP 3% [保土谷アグロ]	適用性 継 続	植調北海道 植調岩手 植調研 島根農試 福岡豊前	[一年生雑草、ヨモギ、タンポポ、クハハ等多年生広葉雑草、スギナ] ・生育初期(草丈20cm以下) 1500, 2000, 3000g 土壌処理 対)クアブランカ-粒剤 1500g	実・ 継	実) [一年生雑草] ・生育初期(草丈20cm以下) 1500～2000g/a 土壌処理 [一年生雑草、ヨモギ、ギシギシ、スギナ] ・生育初期(草丈20cm以下) 2000～3000g/a 土壌処理 継) 低薬量での効果の確認 多年生広葉雑草に対する効果の確認
10. HW-112 粒剤 ・ カルブチレート 1.2% ・ DBN 2% [保土谷アグロ]	適用性 継 続	植調十勝 植調岩手 植調研 岐阜畜試 植調福岡	[一年生雑草、ヨモギ、タンポポ、クハハ等多年生広葉雑草、スギナ] ・生育初期(草丈20cm以下) 1500, 2000, 3000g 土壌処理 対)クアブランカ-粒剤 1500g	実・ 継	実) [一年生雑草、ヨモギ、ギシギシ等多年生広葉雑草、スギナ] ・生育初期(草丈20cm以下) 1500～3000g/a 土壌処理 継) 低薬量での効果の確認
11. HW-113 粒剤 ・ カルブチレート 1.2% ・ DBN 3% ・ DCMU 5% [保土谷アグロ]	適用性 継 続	植調十勝 植調岩手 植調研 岐阜畜試 植調福岡	[一年生雑草、ヨモギ、タンポポ、クハハ等多年生広葉雑草、スギナ] ・生育初期(草丈20cm以下) 1000, 1500, 2000g 土壌処理 対)クアブランカ-粒剤 1500g	実・ 継	実) [一年生雑草、ヨモギ、ギシギシ等多年生広葉雑草、スギナ] ・生育初期(草丈20cm以下) 1000～2000g/a 土壌処理 継) 草種について

A. 除 草 剤 つづき

薬 剤 名 (商品名) 有効成分および 含有率(%) [委託者]	試験の 種 類 新・継 の 別	試験担当場所 (数)	試験設計 [対象雑草] 処理時期 ; 薬量(水量L)/a ; 処理方法等 ; 比)比較薬剤	判 定	内 容
12.HW-122 粒剤 ・ 既知化合物A 0.5% ・ 既知化合物B 2% [保土谷ア'ロス]	作用性 新 規	植調研 (1)	[一年生雑草、ヨモギ、タンポポ、クロ ハ' - 等多年生広葉雑草、スギナ] ・ 生育初期 (草丈20cm以下) 1500, 2000, 3000g 土壌処理 (1) 対)クサブ'ランカ'粒剤 1500g	—	
	適用性 新 規	植調岩手 植調研 植調福岡 (3)	[一年生雑草、ヨモギ、タンポポ、クロ ハ' - 等多年生広葉雑草、スギナ] ・ 生育初期 (草丈20cm以下) 1500, 2000, 3000g 土壌処理 (3) 対)クサブ'ランカ'粒剤 1500g	継	継) 成分未公開 効果の確認 (とくに抑草期 間)
13.HW-123 粒剤 ・ 既知化合物A 0.7% ・ 既知化合物B 3% ・ 既知化合物C 5% [保土谷ア'ロス]	作用性 新 規	植調研 (1)	[一年生雑草、ヨモギ、タンポポ、クロ ハ' - 等多年生広葉雑草、スギナ] ・ 生育初期 (草丈20cm以下) 1000, 1500, 2000g 土壌処理 (1) 対)クサブ'ランカ'粒剤 1500g	—	
	適用性 新 規	植調岩手 植調研 植調福岡 (3)	[一年生雑草、ヨモギ、タンポポ、クロ ハ' - 等多年生広葉雑草、スギナ] ・ 生育初期 (草丈20cm以下) 1000, 1500, 2000g 土壌処理 (3) 対)クサブ'ランカ'粒剤 1500g	継	継) 成分未公開 効果の確認
14.HW-702 粒剤 ・ イソクロン 2.5% ・ DPA 15% [保土谷ア'ロス]	適用性 継 続	長野畜試 福岡豊前 (2)	[一年生雑草] ・ 生育期 (草丈30cm以下) 750, 1000, 1500g 土壌処理 対)クサブ'ランカ'粒剤 1500g	実 ・ 継	実) [一年生雑草、クロハ' -] ・ 発生前～生育期 (草丈30cm以下) 750～1500g/a 土壌処理 [カモガ'ヤ、チカ'ヤ、ヨモギ、ギ'シ'シ、 セイカアワダ'チリ等多年生雑草] ・ 発生前～生育期 (草丈30cm以下) 1500～2000g/a 土壌処理 継) スキ、キ' に対する効果につ いて
15.HW-953 粒剤 ・ DCMU 3% ・ DCBN 1.5% ・ シアジ'ン 1% [保土谷ア'ロス]	適用性 継 続	植調北海道 植調研 福岡豊前 (3)	[一年生雑草] ・ 発生前 ・ 生育初期 (草丈20cm以下) 1000, 1500, 2000g 土壌処理 対)クサブ'ランカ'粒剤 1000g	実 ・ 継	実) [一年生雑草] ・ 発生前～生育初期 (草丈20cm以下) 1000～2000g/a 土壌処理 [ヨモギ、ギ'シ'シ等多年生広葉雑 草、スギナ] ・ 発生前～生育初期 (草丈20cm以下) 2000～4000g/a 土壌処理 継) 低薬量 (一年生雑草対象) での効果の確認

A. 除 草 剤 つづき

薬 剤 名 (商品名) 有効成分および 含有率(%) [委託者]	試験の 種 類 新・継 の 別	試験担当場所 (数)	試験設計 [対象雑草] 処理時期 ; 薬量<水量L>/a ; 処理方法等 ; 比)比較薬剤	判 定	内 容
16. HW-953H 粒剤 ・ DCMU 6% ・ DCBN 3% ・ シアジン 2%	適用性 継 続	宇都宮大学 福岡豊前	[一年生雑草] ・ 生育初期 (草丈20cm以下) 750, 1000, 1500g 土壌処理 対)クサノランカ-粒剤 1000g	実・ 継	実) [一年生雑草] ・ 発生前～生育初期 (草丈20cm以下) 750～1500g/a 土壌処理 [ヨモギ、ギンシキシ等多年生広葉雑 草、スギナ] ・ 発生前～生育初期 (草丈20cm以下) 1500～2000g/a 土壌処理 継) 低薬量での多年生広葉雑草 に対する効果の確認
[保土谷アグロ]		(2)			
17. HW-973 粒剤 ・ DCMU 4% ・ DPA 10% ・ MCPP 4%	適用性 継 続	植調十勝 植調研 福岡豊前	[一年生雑草] ・ 発生前 ・ 生育初期 (草丈20cm以下) 750, 1000, 1500g 土壌処理 対)クサノランカ-粒剤 1000g	実・ 継	実) [一年生雑草] ・ 生育初期 (草丈20cm以下) 750～1500g/a 土壌処理 [ヨモギ、ギンシキシ等多年生広葉雑 草、スギナ] ・ 生育初期 (草丈20cm以下) 2000～3000g/a 土壌処理 継) 低薬量での効果の確認 (一 年生雑草、多年生雑草) 発生前処理の効果の確認
[保土谷アグロ]		(3)			
18. HW-992 粒剤 ・ テブチロン 0.8% ・ DBN 2%	適用性 継 続	植調北海道 新潟畜産研 植調研 岡山北部 山口徳佐	[一年生雑草、ヨモギ、タンポポ、クロ ハハ等多年生広葉雑草、スギナ] ・ 生育初期 (草丈20cm以下) 1500, 2000, 3000g 土壌処理 対)クサノランカ-粒剤 1500g	実・ 継	実) [一年生雑草、ヨモギ、ギンシ シ等多年生広葉雑草、スギナ] ・ 生育初期 (草丈20cm以下) 1500～3000g/a 土壌処理 継) 多年生広葉雑草に対する効 果の確認
[保土谷アグロ]		(5)			
19. HW-993 粒剤 ・ テブチロン 0.8% ・ DBN 3% ・ DCMU 6%	適用性 継 続	植調北海道 新潟畜産研 植調研 岡山北部 植調福岡	[一年生雑草、ヨモギ、タンポポ、クロ ハハ等多年生広葉雑草、スギナ] ・ 生育初期 (草丈20cm以下) 1000, 1500, 2000g 土壌処理 対)クサノランカ-粒剤 1500g	実・ 継	実) [一年生雑草、ヨモギ、ギンシ シ等多年生広葉雑草、スギナ] ・ 生育初期 (草丈20cm以下) 1000～2000g/a 土壌処理 継) 多年生広葉雑草に対する効 果の確認
[保土谷アグロ]		(5)			
20. MRS-195 液剤 (クサノロ、アリハス) ・ グリホサートイソプロピル アミン塩 41%	適用性 継 続	植調北海道 植調研 長野畜試 岐阜畜試 植調福岡	[ススキ、ササ類] ・ 生育期 (草丈100cm以下) 100ml<5> (50倍), 100ml<2.5> (25倍), 200ml<2.5> (12.5倍) 茎葉処理 対)ラントアップ液剤 100ml<2.5>	実・ 継	実) [雑草全般(スギナを除く)] ・ 生育期 (草丈50cm以下) 50～100ml<10L>/a [ススキ] ・ 生育期 (草丈100cm以下) 100～200ml<2.5～5L(専用ノズ ル使用)>/a 茎葉処理 継) ススキ、ササ類に対する効果の確 認 (年内及び根絶効果)
[MRS普及会(マストラ)]		(5)			
	適用性 継 続	植調北海道 植調研 宇都宮大学 岡山北部 植調福岡	[スギナ] ・ 生育期 (草丈20cm以下) 200ml<2.5, 5> 茎葉処理 対)ラントアップ液剤 200ml<5>	実・ 継	実) [スギナ] ・ 生育期 (草丈20cm程度) 200ml<2.5～5L(専用ノズル使 用)>/a 茎葉処理 継) 効果の確認 (年内及び根絶 効果)

A. 除 草 剤 つづき

薬 剤 名 (商品名) 有効成分および 含有率(%) [委託者]	試験の 種 類 新・継 の 別	試験担当場所 (数)	試験設計 [対象雑草] 処理時期 ; 薬量<水量L>/a ; 処理方法等 ; 比)比較薬剤	判 定	内 容
21. MRS-199 液剤 ・グリホサートイソプロピル アミン塩 1% [MRS普及会(マストラ)]	適用性 継 続	植調北海道 植調研 栃木酪農 島根農試 山口徳佐 (5)	[一年生雑草] ・生育期(草丈30cm以下) 2500, 4000ml<原液散布> 茎葉処理 対)ラウンドアップ®除草スプレー 2500ml<原液散布>	実	実) [一年生雑草] ・生育期(草丈30cm以下) 2500~4000ml/a<原液散布> 茎葉処理
22. MW-851 液剤 (ハビート) ・ピラフル 18% [明治製菓]	適用性 継 続	植調研 植調福岡 (2)	[ゼニコケ] ・生育期 75ml<10> 茎葉処理 対)ゼニコケ®液剤 5000ml<原液散布>	実	実) [ゼニコケ] ・生育期 75~150ml<10L>/a 茎葉処理
23. NH-007 フロアブル剤 ・ピラフルフェニル 0.16% ・グリホサートイソプロピル アミン塩 30% [日本農業]	適用性 新 規	植調十勝 植調岩手 植調研 東日本G研 山口徳佐 (5)	[雑草全般] ・生育期(草丈50cm以下) 50, 100, 200ml<10> 茎葉処理 対)バスタ液剤 50ml<10>	継	継) 効果の確認 草種と薬量について 散布水量(低水量)と効果 について
24. SB-5491 粒剤 ・カルブチレート 3% ・DBN 2% [エスディーエスバイオテック]	適用性 継 続	植調岩手 植調研 宇都宮大学 長野畜試 植調福岡 (5)	[雑草全般] ・生育期(草丈30cm以下) 1000, 1500, 2000g 土壌処理 対)バックアップ®粒剤 1000g	実・ 継	実) [一年生雑草、多年生広葉 雑草、スギナ] ・生育期(草丈30cm以下) 1000~2000g/a 土壌処理 継) 多年生イネ科雑草に対する効果 の確認
25. SUM-99 フロアブル剤 ・グリホサートイソプロピル アミン塩 30% ・フルミキサジン 1% [日本モンサント ・住友化学]	適用性 新 規	植調十勝 植調研 宇都宮大学 東日本G研 山口徳佐 (5)	[雑草全般] ・生育期(草丈30cm以下) 60, 80, 100ml<10> 茎葉処理 対)バスタ液剤 100ml<10>	継	継) 効果の確認 散布水量(低水量)と効果 について
26. SW-996 フロアブル剤 ・グリホサートイソプロピル アミン塩 26% ・アザフェニジン 11% [デュポン・三共]	適用性 継 続	植調十勝 茨城大学 植調研 東日本G研 山口徳佐 (5)	[雑草全般] ・生育期(草丈30cm以下) 50, 75, 100ml<10> 茎葉処理 対)三共の草枯らし 100ml<10>	実・ 継	実) [一年生雑草、多年生雑 草] ・生育期(草丈30cm以下) 50~100ml<10L>/a 茎葉処理 継) 草種について
27. YF-65L 液剤 (ブリアグロックス、マイゼット) ・ジクワツジプロミド 7% ・ハロコトジクロリド 5% [ゼネコ]	適用性 継 続	植調北海道 植調十勝 植調研 岐阜畜試 岡山北部 (5)	[多年生雑草、スギナ] ・生育期(草丈30cm以下) 100, 150, 200ml<10> 茎葉処理 対)バスタ液剤 100ml<10>	実・ 継	実) [多年生雑草] ・生育期(草丈30cm以下) 100~200ml<10L>/a 茎葉処理 継) 多年生雑草に対する効果の 確認 草量、散布水量と効果につ いて

A. 除 草 剤 つづき

薬 剤 名 (商品名) 有効成分および 含有率(%) [委託者]	試験の 種 類 新・継 の 別	試験担当場所 (数)	試験設計 [対象雑草] 処理時期 ; 薬量<水量L>/a ; 処理方法等 ; 比) 比較薬剤	判 定	内 容
28. ZK-121 液剤 ・ジクワットジプロミト 6.3% ・メチル・オキサ・ン(パ・ラ -ジクロリド'の別 名) 4.5% [セ・ネ]	適用性 新 規	植調十勝 植調研 岐阜畜試 島根農試 植調福岡 (5)	[雑草全般] ・生育期(草丈30cm以下) 100, 150, 200ml<10> 茎葉処理 対) プリグロックスL液剤 100ml<10>	実 ・ 継	実) [一年生雑草、多年生雑 草] ・生育期(草丈30cm以下) 100~200ml<10L>/a 茎葉処理 継) 多年生雑草に対する効果の 確認 草量、散布水量と効果につ いて
29. ZK-122 液剤 ・新規化合物 500g/L [セ・ネ]	適用性 新 規	植調北海道 植調十勝 植調岩手 植調研 植調福岡 (5)	[一年生雑草、チカ'ヤ、ヨモギ'、タンホ ホ'、ギ'シ'シ、クロハ' - 等多年生雑 草] ・生育期(草丈50cm以下) 25, 50, 100ml<5> (25mlは一年生雑草対象) 茎葉処理 対) ラント'アッ'ハイロ-ト' 液剤 50ml<5>	継	継) 成分未公開 効果の確認 草種と薬量について 散布水量と効果について
30. MR-001 液剤 ・グリホサートイソプロピ ルアミン塩 0.51% ・MCPイソプロピルアミン 塩 0.1% [日本モンサント、日産化 学工業]	適用性 新 規	植調岩手 植調研 栃木酪農 東日本G研 岡山北部 山口徳佐 (6)	[雑草全般] ・生育期(草丈30cm以下) 7.5, 10L<原液散布> 茎葉処理 対) サ'ゾ'ン液剤 100ml<10>	実 ・ 継	実) [一年生雑草、多年生雑 草] ・生育期(草丈30cm以下) 7.5~10L/a <原液散布> 茎葉処理 継) 専用ボトルの改良
31. EL-103 プロア'ル剤 ・テフ'チロン 50% [武田薬品工業]	適用性 新 規	植調岩手 植調研 植調福岡 (3)	[一年生雑草、多年生広葉雑 草] ・生育初期 40, 80ml<20> ・生育中期 80, 160ml<20> 茎葉処理 対) ハ-ビ'ック水和剤	継	継) 処理時期と効果の確認
32. SW-004 液剤 ・グリホサートナトリウム塩 13.5% ・テトラ'オン 20% [三共]	適用性 新 規	植調北海道 植調岩手 植調研 岡山北部 植調福岡 (5)	[雑草全般とくに多年生イネ科 雑草、サ'類] ・生育期 100, 200, 300ml<10> 茎葉処理 対) 三共の草枯らし 100ml<10> 対) フ'ノ'ック液剤 200ml<10>	継	継) 効果の確認 草種について

B. 生育調節剤

薬 剤 名 (商品名) 有効成分および 含有率(%) [委託者]	試験の 種 類 新・継 の 別	試験担当場所 (数)	試験設計 [目的:対象雑草] 処理時期 ;薬量<水量L>/a ;処理方法等 ;比)比較薬剤	判 定	内 容
1. SW-995 70アブール剤 ・グリホサートイソプロピル アミン塩 8% ・MCPBエチルエステル 4% [三共]	適用性 継 続	植調北海道 植調岩手 植調研 草地試 植調福岡 (5)	[雑草全般(スギ、ササ、イタドリ、 スギナを除く)]; 草丈抑制による 刈取軽減] ・生育期(草丈10~20cm; 4~5 月) 40, 60, 80ml<10> 茎葉処理 対)グリホサート液剤 70ml<10>	実・ 継	実) [雑草全般(スギ、ササ、イ タドリを除く)]; 草丈抑制による 刈込軽減] ・春期生育期(草丈10~20cm) 60~80ml<10L>/a 茎葉処理 継) 低薬量での効果の確認 適用植生の検討

C. 展 着 剤

薬 剤 名 (商品名) 有効成分および 含有率(%) [委託者]	試験の 種 類 新・継 の 別	試験担当場所 (数)	試験設計 [対象雑草] 処理時期 ;薬量<水量L>/a ;処理方法等 ;比)比較薬剤	判 定	内 容
1. AKD-9073 液剤 ・既存界面活性剤 [アグロネーション]	適用性 新 規	植調北海道 植調岩手 植調研 山口徳佐 植調福岡 (5)	[雑草全般] ・生育期 1000, 2000倍 ラウンドアップ、ブライロックSL、デ ザレートA等の茎葉処理剤に加用 対)アグロ液剤 1000倍加用	継	継) 使用目的の検討

D. 平成11年度 除草剤(多年生根絶)試験

薬 剤 名 (商品名) 有効成分および 含有率(%) [委託者]	試験の 種 類 新・継 の 別	試験担当場所 (数)	試験設計 [対象雑草] 処理時期 ;薬量<水量L>/a ;処理方法等 ;比)比較薬剤	判 定	内 容
1. SC-224 液剤 ・グリホサートイソプロピル アミン塩 38% [セネ]	適用性 継 続	植調十勝 植調研 宇都宮大学 岡山北部 植調福岡 (5)	[スギナ] ・生育期(草丈20cm程度) 200ml<2.5> 茎葉処理 対)ラウンドアップ液剤 200ml<5>	実	実) [スギナ] ・春期生育期(草丈20cm程度) 200ml<2.5L(専用ノズル使用)、 5~10L>/a 茎葉処理 連年処理でより高い効果が得 られる。
		植調十勝 植調研 植調福岡 (3)	[スギナ(連年処理)] ・生育期(草丈20cm程度) 昨年処理区に200ml<2.5, 5, 10> 茎葉処理(連年処理) 対)ラウンドアップ液剤 200ml<5>		
2. WOC-01 液剤 ・グリホサートイソプロピル アミン塩 41% [三共]	適用性 継 続	植調岩手 奈良高原 植調福岡 (3)	[スギナ] ・生育期(草丈20cm程度) 200ml<2.5, 5> 茎葉処理 対)ラウンドアップ液剤 200ml<5>	実	実) [スギナ] ・春期生育期(草丈20cm程度) 200ml<2.5~5L(専用ノズル使 用)/a 茎葉処理 連年処理でより高い効果が得 られる。
		植調岩手 植調研 植調福岡 (3)	[スギナ(連年処理)] ・生育期(草丈20cm程度) 昨年処理区に200ml<2.5, 5> 茎葉処理(連年処理) 対)ラウンドアップ液剤 200ml<5>		