

新 登 録 除 草 剤 一 覧

農林水産省生産局生産資材課

平成13年4月1日～平成13年10月31日

(1) 移植水稻

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	登録会社
ベンゾビシ クロン水和 剤	ショウエイ スフロ アブル	3-(2-クロロ-4-メシ ベンゾイル)-2-フェニ ルチオビシクロ[3.2. 1]オクタ-2-エン-4-オ ン・・・5.7%	水和 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツバ、イ オタメ	北陸	埴壌土 ～埴土 減水深 1.5cm/ 日以下	移植直後 ～移植後 5日 (ノビエ1葉 期まで)	500ml	原液湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 ベンゾビシ クロンを含 む農薬の 総使用回 数2回以内	(株)エス ・ディー・ エス バイオテック
						関東・ 東山・ 東海の 普通期 栽培地 帯	砂壌土 ～埴土 減水深 2cm/ 日以下				
						関東・ 東山・ 東海の 早期栽 培地帯	埴壌土 ～埴土 減水深 1cm/ 日以下				
						近畿・ 中国・ 四国の 普通期 栽培地 帯	壤土 ～埴土 減水深 1cm/ 日以下	植代後 ～移植前 4日 または 移植直後 ～移植後 5日 (ノビエ1葉 期まで)			
						九州の 普通期 栽培地 帯	砂壌土 ～埴土 減水深 2cm/ 日以下				
ベンゾビシ クロン粒剤	ショウエイ スフロ 粒剤	3-(2-クロロ-4-メシ ベンゾイル)-2-フェニ ルチオビシクロ[3.2. 1]オクタ-2-エン-4-オ ン・・・3.0%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツバ、イ オタメ	北陸	埴壌土 ～埴土 減水深 2cm/ 日以下	植代後 ～移植前 4日 または 移植直後 ～移植後 7日 (ノビエ1葉 期まで)	1 k g	湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 ベンゾビシ クロンを含 む農薬の 総使用回 数2回以内	(株)エス ・ディー・ エス バイオテック
						関東・ 東山・ 東海の 普通期 栽培地 帯	砂壌土 ～埴土 減水深 2cm/ 日以下	植代後 ～移植前 4日 または 移植直後 ～移植後 5日 (ノビエ1葉 期まで)			
						関東・ 東山・ 東海の 早期栽 培地帯	埴壌土 ～埴土 減水深 1cm/ 日以下	移植直後 ～移植後 5日 (ノビエ1葉 期まで)			
						近畿・ 中国・	壤土 ～埴土	植代後 ～移植前			

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
つづき						四国の普通期栽培地帯	減水深1cm/日以下	4日または移植直後～移植後5日(1/12葉期まで)			
						九州の普通期栽培地帯	砂壌土～埴土 減水深2cm/日以下				
						九州の早期栽培地帯	砂壌土～埴土 減水深1.5cm/日以下				
フェントラザミド・ベンゾピシロン・ベンゾフェナップ水和剤	テンカムテキプロアブル	4-(2-クロロフェニル)-N-エチル-4,5-ジヒドロ-5-オキソ-1H-テトラゾール-1-カルボキサミド・・・5.5% 3-(2-クロロ-4-メシルベンゾイル)-2-フェニルチオピシロン[3.2.1]オクタ-2-エン-4-オン・・・3.6% 2-[4-(2,4-ジクロロ-メトキシフェニル)-1,3-ジメチルピラゾール-5-イルオキシ]-4'-メチルアセトフェノン・・・18.2%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバ、イヌタビ、ウリカ、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ヘラオモダカ(北陸)	北海道	埴土～埴土 減水深2cm/日以下 但し、埴土は1.5cm/日以下	移植後5～20日(1/12.5葉期まで)	500ml	原液湛水散布本剤のみを使用する場合の使用回数1回 フェントラザミドを含む農薬の総使用回数1回 ベンゾピシロンを含む農薬の総使用回数2回以内 ベンゾフェナップを含む農薬の総使用回数1回	(株)エス・ディー・エス・バ・イテック、日本バ・イ・ル・ケミカル(株)
						東北	埴土～埴土 減水深1.5cm/日以下	移植後5～15日(1/12.5葉期まで)			
						北陸	埴土～埴土 減水深1.5cm/日以下				
フェントラザミド・ベンゾピシロン・ベンゾフェナップ水和剤	スマートプロアブル	4-(2-クロロフェニル)-N-エチル-4,5-ジヒドロ-5-オキソ-1H-テトラゾール-1-カルボキサミド・・・3.7% 3-(2-クロロ-4-メシルベンゾイル)-2-フェニルチオピシロン[3.2.1]オクタ-2-エン-4-オン・・・3.7% 2-[4-(2,4-ジクロロ-メトキシフェニル)-1,3-ジメチルピラゾール-5-イルオキシ]-4'-メチルアセトフェノン・・・14.7%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバ、イヌタビ、ウリカ、ミズガヤツリ(北海道を除く)	北海道	埴土～埴土 減水深2cm/日以下 但し、埴土は1.5cm/日以下	移植直後～移植後15日(1/12葉期まで)	500ml	原液湛水散布本剤のみを使用する場合の使用回数1回 フェントラザミドを含む農薬の総使用回数1回 ベンゾピシロンを含む農薬の総使用回数2回以内 ベンゾフェナップを含む農薬の総使用回数1回	(株)エス・ディー・エス・バ・イテック、日本バ・イ・ル・ケミカル(株)、クミアイ化学工業(株)
						東北	埴土～埴土 減水深1.5cm/日以下				
						北陸	埴土～埴土 減水深1cm/日以下	移植直後～移植後12日(1/12葉期まで)			
						関東・東山	砂壌土～埴土				

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 用 地 帯	適 用 土 壤	使用時期	10a 当り 使用量	使用方法	登録会社
つづき						東海の 普通期 栽培地 帯	減水深 2cm/日 以下				
						近畿・ 中国・ 四国の 普通期 栽培地 帯	壤土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下				
						九州の 普通期 栽培地 帯	砂壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下				
						九州の 早期裁 培地帯	砂壤土 ～埴土 減水深 1.5cm/ 日以下				
ブレチクロ ル・ベンジ ビシロン水 和剤	クサコントフロ アブル	2-クロロ-2', 6'-ジ エチル-N-(2-プロポ キシエチル)アセトアミド ・・・7.6% 3-(2-クロロ-4-メシル ベンジル)-2-フェニ ルチピシロン[3.2. 1]オタ-2-エン-4-オ ン・・・3.8%	水 和 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツバ イ、 オシロイ、 ミズガヤツリ (関東・東 山・東海 の普通 期、近畿・ 中国・四 国)、 ヘラオモカ (北海道、 九州の早 期)	北海道	砂壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下 但し、 砂壤土 では 1.5cm/ 日以下	移植直後 ～移植後 10日 (ノビ1.5 葉期まで)	500ml	原液湛水散布 又は水口施用 (関東・東山・ 東海) 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 ブレチクロ ルを含む農薬 の総使用回 数2回以内 ベンジピシ ロンを含む農薬 の総使用回 数2回以内	(株)エ ディー・エ ス バイテク ニ共(株)
						東北・ 北陸	砂壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下				
						関東・ 東山・ 東海の 普通期 栽培地 帯	砂壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下				
						関東・ 東山・ 東海の 早期裁 培地帯	砂壤土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下				
						近畿・ 中国・ 四国の 普通期 及び早 期栽培 地帯	砂壤土 ～埴土 減水深 1.5cm/ 日以下				
						九州の 普通期 栽培地 帯	砂壤土 ～埴土 減水深				

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使用時期	10a 当り 使用量	使用方法	登録会社
つづき							2cm/日 以下				
						九州の 早期栽 培地帯	砂壌土 ～埴土 減水深 1.5cm/ 日以下				
ベンゾビシ クロン・ベ ントキサ ン粒 剤	フォーカス ジョント ンボ	3-(2-クロロ-4-メチル ベンゾイル)-2-フェニ ルチオシクロ[3.2. 1]オクタ-2-エン-4-オ ン・・・4.0% 3-(4-クロロ-5-シクロ ペンチルオキシ-2-フルオ ロフェニル)-5-イソプロ ピリデン-1,3-オキサ ザリジン-2,4-ジオ ン・・・4.0%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツバ イ、ホ タテ、ミ ズガヤリ (北海道 を除く)、 ヘラオモ カ(北海道)	北海道 東北 北陸 関東・ 東山・ 東海の 普通期 栽培地 帯 近畿・ 中国・ 四国の 普通期 栽培地 帯	埴土 ～埴土 減水深 1.5cm/ 日以下 砂壌土 ～埴土 減水深 1.5cm/ 日以下 埴土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下 埴土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下 埴土 ～埴土 減水深 1.5cm/ 日以下	移植後 1～ 5日 (ビエ葉 期まで)	小包装10個 (500g)	水田に小包装 のまま投入 れる 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 ベンゾビシ クロンを含 む農薬の 総使用回 数2回以内 ベントキサ ンを含む 農薬の 総使用回 数2回以内	(株)エ ス・ ディ・ エ ス・ バ イ テック
ジメトリン ・ビラゲ レート・ブ レチア ロール・ベン フレート レト粒 剤	ウリホス ジャン ボ	2-メチルチオ-4-エチルア ミノ-6-(1,2-ジメチ ルプロピルアミノ)-s- トリアジン・・・1.0% 4-(2,4-ジクロロベン ゾイル)-1,3-ジメ チル-5-ヒラゲリル-p トルエンスルホネート・・・ 30.0% 2-クロロ-2',6'-ジ エチル-N-(2-プロポ キシエチル)アセトアニリド ・・・5.0% 2,3-ジヒドロ-3,3 -ジメチルベンゾフラン -5-イル=エタンスルホネ ート・・・5.0%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツバ イ、ホ タテ、 ヘラオモ カ、 ヒルメシ ロ、 エゾノサ サカ グサ、 アオミド ロ・ 藻類によ る表層剥 離	北海道	埴土 ～埴土 減水深 1.5cm/ 日以下	移植後 3～ 15日 (ビエ葉 期まで)	小包装10個 (600g)	水田に小包装 のまま投入 れる 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 ジメトリン を含む農薬 の総使用回 数2回以内 ビラゲレートを 含む農薬の 総使用回数 1回 ブレチア ロールを 含む農薬の 総使用回数 2回以内 ベンフレートを 含む農薬の 総使用回数 2回以内	北海三共 (株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
アニロホス・エトキシスルフロン・ダイムロン・ベンフレート粒剤	ビ'ンゴ'1粒剤	S-4-クロロ-N-イソプロピルカルバミコイルメチル=0,0-ジメチル=ホスホジチオアト・・・ 4.0% 1-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イル)-3-(2-エトキシフェノキシスルホニル)尿素・・・ 0.21% 1-(α , α -ジメチルペンシル)-3-(パラトリル)尿素・・・3.0% 2,3-ジヒドロ-3,3-ジメチルペンゾフラン-5-イル=エタンスルホナト・・・3.5%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバ、イ、オシロイ、ウリカワ、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ヘオモダカ(北海道)、ヒルムシロ(北海道、東北、関東・東山・東海)、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離(北海道、北陸、近畿・中国・四国)	北海道	壇壤土 ～壇土 減水深 2cm/日 以下	移植後 5～ 20日 (/ビ'12.5 葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 アニロホスを含む農業の総使用回数2回以内 エトキシスルフロンを含む農業の総使用回数2回以内 ダイムロンを含む農業の総使用回数3回以内 (本田では2回以内) ベンフレートを含む農業の総使用回数2回以内	アベ'ンティス クワ'グサイ ンス'ジョ'ギ (株)
						東北	壇土 ～壇土 減水深 1.5cm/ 日以下				
						北陸	壇壤土 ～壇土 減水深 1cm/日 以下	移植後 5～ 15日 (/ビ'12.5 葉期まで)			
						関東・東山・東海の普通期栽培地帯	壇土 ～壇土 減水深 1cm/日 以下				
						近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	砂壇土 ～壇土 減水深 1cm/日 以下				
			九州の普通期栽培地帯	壇土 ～壇土 減水深 1.5cm/ 日以下							
アニロホス・エトキシスルフロン・ベンフレート粒剤	キ'ビ'ンゴ'1粒剤	S-4-クロロ-N-イソプロピルカルバミコイルメチル=0,0-ジメチル=ホスホジチオアト・・・ 4.0% 1-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イル)-3-(2-エトキシフェノキシスルホニル)尿素・・・ 0.21% 2,3-ジヒドロ-3,3-ジメチルペンゾフラン-5-イル=エタンスルホナト・・・4.0%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバ、イ、オシロイ、ウリカワ、ヘオモダカ、ヒルムシロ、エ'ノ'サヤ'カ'グ'サ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	北海道	壇壤土 ～壇土 減水深 2cm/日 以下	移植後 5～ 20日 (/ビ'12.5 葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 アニロホスを含む農業の総使用回数2回以内 エトキシスルフロンを含む農業の総使用回数2回以内 ベンフレートを含む農業の総使用回数2回以内	アベ'ンティス クワ'グサイ ンス'ジョ'ギ (株)
アニロホス・エトキシスルフロン・ビ'ラ'スルフロ'ン'エ'粒剤	ハイ'コン'ビ'1粒剤	S-4-クロロ-N-イソプロピルカルバミコイルメチル=0,0-ジメチル=ホスホジチオアト・・・ 4.0% 1-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イル)-3-(2-エトキシフェノキシスルホニル)尿素・・・ 0.15% エチル=5-(4,6-ジメ	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバ、イ、オシロイ、ウリカワ、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ヘオモダカ(北海道、東北)、	北海道	壇壤土 ～壇土 減水深 2cm/日 以下	移植後 5～ 20日 (/ビ'12.5 葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 アニロホスを含む農業の総使用回数2回以内 エトキシスルフロンを含む農業	アベ'ンティス クワ'グサイ ンス'ジョ'ギ (株)、 日産化学工業(株)
						東北	壇壤土 ～壇土 減水深				

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	登録会社
つづき		トキシビ リミジン-2-イ ルカルバ モイルスルファメイ ル-1-メチルピラジ ル-4-カルボキシレート ...0.15%			ヒルムシロ (北海道、 東北、関 東・東山・ 東海)、 エゾノササ グサ (北海道) 等(東北 を除く)、 アオミドロ・ 藻類によ る表層は く離 (北陸を 除く)	北陸・ 関東・ 東山・ 東海の 普通期 栽培地 帯	1.5cm/ 日以下 壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下	移植後 5～ 15日 (/ビエ2.5 葉期まで)		の総使用回 数2回以内 ピラジスル フオン イヲを含む 農薬の総使 用回数1回	
					関東・ 東山・ 東海の 早期栽 培地帯		砂壤土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下				
					近畿・ 中国・ 四国の 普通期 栽培地 帯		砂壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下				
					九州の 普通期 栽培地 帯		壤土 ～埴土 減水深 1.5cm/ 日以下				
					九州の 早期栽 培地帯		壤土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下				
アニロホス・ピ ラジスルフオン イヲ粒剤	イネガート1 キロ粒剤	S-4-クロロ-N-イソ プロピルカルバニロイルメチ ル=0.0-シメチルホス ホジチオアト... 4.0% エチル=5-(4,6-ジメ トキシビリミジン-2-イ ルカルバモイルスルファメイ ル-1-メチルピラジ ル-4-カルボキシレート ...0.30%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマダライ、 ホタルイ、 ウリカワ (九州を 除く)、 ミズガヤツリ (北海道 を除く)、 ハオモダカ (北海道、 東北)、 ヒルムシロ (北陸を 除く)、 エゾノササ グサ (北海道) 等、 アオミドロ・ 藻類によ る表層は く離 (北海道、 関東以西)	北海道	埴壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下	移植後 5～ 20日 (/ビエ2.5 葉期まで)	1 k g	湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 アニロホス を含む農薬 の総使用回 数2回以内 ピラジスル フオン イヲを含む 農薬の総使 用回数1回	日産化学 工業(株)
					東北、 北陸		埴壤土 ～埴土 減水深 1.5cm/ 日以下	移植後 5～ 15日 (/ビエ2.5 葉期まで)			
					関東・ 東山・ 東海の 普通期 及び早 期栽培 地帯		壤土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下				
					近畿・ 中国・ 四国の 普通期 栽培地 帯		砂壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下				
					近畿・ 中国・ 四国の		壤土 ～埴土				

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
つづき						早期栽培地帯	減水深1cm/日以下				
						九州の普通期栽培地帯	砂壤土～埴土 減水深2cm/日以下				
アニコホス・エトキシスルフォン・ダイムロン粒剤	ゴクウジヤンボ	S-4-クロロ-N-イソプロピルカルバミロイルメチル=0,0-ジメチル=ホスホジチオアト・・・8.0% 1-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イル)-3-(2-エトキシフェニル)尿素・・・0.34% 1-(α , α -ジメチルベンジル)-3-(パラトリル)尿素・・・18.0%	粒剤	移植水稻	水田・一年生雑草及びマウバ、イ、オカ、ウリカ（東北を除く）、ミズガヤツリ（北海道を除く）、ヘラモロカ（東北）、ヒルムシロ（北海道、関東・東山・東海、九州）、ヤ（北陸を除く）、アミドロ・藻類による表層はく離（北海道、九州）	北海道	埴土～埴土 減水深1cm/日以下	移植後5～15日（ビエ2葉期まで）	小包装10個（500g）	水田に小包装のまま投げ入れる 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 アニコホスを含む農業の総使用回数2回以内 エトキシスルフォンを含む農業の総使用回数2回以内 ダイムロンを含む農業の総使用回数3回以内（本田では2回以内）	アベンティス クロップサイエンス ジャパン（株）
						東北	埴壤土～埴土 減水深1.5cm/日以下	移植後5～10日（ビエ1.5葉期まで）			
						北陸	埴土～埴土 減水深2cm/日以下				
						関東・東山・東海の普通期栽培地帯	埴土～埴土 減水深1cm/日以下	移植後5～12日（ビエ2葉期まで）			
						近畿・中国・四国の普通期栽培地帯					
						九州の普通期栽培地帯	埴土～埴土 減水深1.5cm/日以下				
アニコホス・ビラザスルフォン・エチル・プロモアチド粒剤	草かちどきジャンボ	S-4-クロロ-N-イソプロピルカルバミロイルメチル=0,0-ジメチル=ホスホジチオアト・・・6.4% エチル=5-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イル)カルバミロイルスルホニル-1-メチルビラザル-4-カルボキシルト・・・0.42% (RS)-2-プロモ-N-(α , α -ジメチルベンジル)-3,3-ジメチルプロピルアミド・・・12.0%	粒剤	移植水稻	水田・一年生雑草及びマウバ、イ、オカ、ウリカ（関東・東山・東海、九州）、ミズガヤツリ、ヒルムシロ（九州を除く）、ヤ（九州を除く）、アミドロ・藻類による表層はく離	関東・東山・東海の普通期栽培地帯	埴壤土～埴土 減水深1cm/日以下	移植後5～12日（ビエ2葉期まで）	小包装10個（500g）	水田に小包装のまま投げ入れる 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 アニコホスを含む農業の総使用回数2回以内 ビラザスルフォンを含む農業の総使用回数1回 プロモアチドを含む農業の総使用回数	住友化学工業(株) 日産化学工業(株)
						近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	埴土～埴土 減水深1.5cm/日以下				
						九州の普通期栽培地帯	埴土～埴土 減水深				

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社			
つづき					(関東・東山・東海)		2cm/日以下			数1回				
オキサジクロメホン・クロメフロップ・ピラゾスルフロニエチル粒剤	トレディアフロジャンボ	3-[1-(3,5-ジクロロフェニル)-1-メチルエチル]-3,4-ジヒドロ-6-メチル-5-フェニル-2H-1,3-オキサジン-4-オン・・・2.0% (RS)-2-(2,4-ジクロロ-m-トリルオキシ)プロピオンニリド・・・12.0% エチル=5-(4,6-ジメトキシ)リジン-2-イソカルバモイルスルファモイル)-1-メチルピラゾール-4-カルボキシレート・・・0.70%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツガイ、オシロイ、ウリカ、ミズガヤツリヒルムシロ(北海道を除く)、ヘラオダカ(北海道、東北)、ヒルムシロ(北陸、近畿・中国・四国を除く)、セリ(北陸を除く)、アミドロ・藻類による表層はく離(北海道、関東・東山・東海)	北海道	壤土～埴土 減水深2cm/日以下 但し、埴土では1.5cm/日以下	移植後5～15日 (ピエ2葉期まで)	小包装10個(300g)	水田に小包装のまま投げ入れる 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数1回 クロメフロップを含む農薬の総使用回数2回以内 ピラゾスルフロニエチルを含む農薬の総使用回数1回	日産化学工業(株)アベシイクロップサイエンス(株)、全国農業協同組合連合会			
						東北	壤土～埴土 減水深1.5cm/日以下							
						北陸	壤土～埴土 減水深2cm/日以下	移植後5～15日 (ピエ2葉期まで)						
						関東・東山・東海の普通期栽培地帯	壤土～埴土 減水深1.5cm/日以下							
						関東・東山・東海の早期栽培地帯	埴壤土～埴土 減水深1cm/日以下							
						近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	壤土～埴土 減水深1cm/日以下							
						九州の普通期栽培地帯	砂壤土～埴土 減水深1.5cm/日以下 但し、砂壤土では1cm/日以下							
						カフェンストロール・シハロホップ・チル・タムロン・ハロスルフロニエチル粒剤	レッドスターフロアブル	既登録薬剤に同じ						

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稻刈後・畑作・野菜作・永年生物作・非農耕地対象

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適地	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
ブタフェナシル乳剤	インスパイア乳剤	1-(アリルオキシカルボニル)-1-メチルエチル=2-クロロ-5-[1,2,3,6-テトラヒドロー-3-メチル-2,6-ジオキソ-4-(トリフルオロメチル)ピリミジン-1-イル]ベンゾアト...8.8%	乳剤	かんきつ	一年生広葉雑草			雑草生育期 (草丈20cm以下) 但し収穫7日前まで	160~240ml 希釈水量100 l	雑草茎葉散布 本剤のみを使用する場合の使用回数3回以内 ブタフェナシルを含む農薬の総使用回数3回以内	シンジェンジャパン(株)
グリホサートイソプロピルアミン塩・ブタフェナシル水和剤	レバントGT70アンプル	イソプロピルアミン塩=N-(ホスホノメチル)グリホサート...14.4% 1-(アリルオキシカルボニル)-1-メチルエチル=2-クロロ-5-[1,2,3,6-テトラヒドロー-3-メチル-2,6-ジオキソ-4-(トリフルオロメチル)ピリミジン-1-イル]ベンゾアト...3.6%	水和剤	かんきつりんご	一年生及び多年生雑草			雑草生育期 (草丈30cm以下) 但し収穫7日前まで	400~600ml 希釈水量100 l	雑草茎葉散布 本剤のみを使用する場合の使用回数3回以内 グリホサートを含む農薬の総使用回数3回以内 ブタフェナシルを含む農薬の総使用回数3回以内	シンジェンジャパン(株)
イワロン・DPA粒剤	ヨック田粒剤	3-(5-タリヤリ-ブチル-3-イソオキサゾール)-1,1-ジメチル尿素...2.5% 2,2-ジクロロ-2-ヒドロキシ-2-プロピル...15.0%	粒剤	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等	一年生雑草 多年生雑草			雑草発生前~生育期	7.5~10 kg 15~20 kg	全面土壌散布 本剤のみを使用する場合の使用回数3回以内 イワロンを含む農薬の総使用回数3回以内 DPAを含む農薬の総使用回数3回以内	保土谷ファーマ(株)
フザスルフロン粒剤	シバゲン粒剤0.1	1-(4,6-ジメチルピリミジン-2-イル)-3-(3-トリフルオロメチル-2-ヒドロキシ-2-プロピル)尿素...0.10%	粒剤	日本芝	一年生雑草 ヒメクグ			雑草発生前(芝生育期) 春期雑草発生前(芝生育期)	4~6 kg 5~8 kg	全面土壌散布 本剤のみを使用する場合の使用回数3回以内 フザスルフロンを含む農薬の総使用回数3回以内	石原産業(株)
				公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面等	一年生雑草			雑草発生前~発生始期	5~10 kg		
アザフェンジン・グリホサートトリメチウム塩水和剤	イノベーション70アンプル	2-(2,4-ジクロロ-5-アロ-2-イル)シフェニル-5,6,7,8-テトラヒドロー-1,2,4-トリアゾロ[4,3-a]ピリジン-3(2H)-オン...11.0% トリメチルスルホニウム=N-(ホスホノメチル)グリホサート	水和剤	かんきつ	一年生及び多年生雑草			雑草生育期 (草丈30cm以下) 但し収穫14日前まで	400~600ml 希釈水量100 l	雑草茎葉散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 アザフェンジンを含む農薬の総使用回数1回	デュボン(株)、丸和バイオケミカル(株)
				公園、				雑草生育	500~1000		

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 地 用 帯	適 土 用 壤	使用時期	10a 当り 使用量	使用方法	登録会社
つづき		-ト...28.0%		庭園、 堤とう、 駐車場、 道路、 運動場、 宅地、 鉄道等				期 (草丈30 cm以下)	ml 希釈水量 100 l	グリコートを 含む農薬の 総使用回数 3回以内	
アザフェン ジ-グリコ ネ-ト水和剤	スベ-ド'フロ ア'ル	2-(2,4-ジクロロ-5- -7'ロ7'-2-ニルキ シフェニル)-5,6,7,8- -ニトロロ-1,2,4- -トリアゾロ[4,3-a] ピリジン-3(2H)-オ ン...11.0% アノニウム=DL-ホモアラ ニン-4-イル(メチル)ホ スフィネート...13.0%	水和 剤	かんぎつ	一年生及 び多年生 雑草			雑草生育 期 (草丈30 cm以下) 但し収穫 21日前ま で	400~600ml 希釈水量 100 l	雑草茎葉散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 アザフェンジ ンを含む農 薬の総使用 回数1回 グリコネ-ト を含む農薬 の総使用回 数3回以内	三共(株) デュボン (株)、 アベンティ ス クロップ サイエンス (株)
				公園、 庭園、 堤とう、 駐車場、 道路、 運動場、 宅地、 のり面、 鉄道等				雑草生育 期 (草丈30 cm以下)	750~1500 ml 希釈水量 100 l		

新 刊

新しい切り口で雑草をとらえた観察図鑑

たのしい自然観察

雑草博士入門

岩瀬 徹・川名興／著
A5判 187ページ
本体1,500円

- 植物学用語をよく知らない児童・生徒にもわかるよう、内容のほとんどを写真で構成しました。
- 茎の切り口、葉のつき方、複葉のいろいろ、根や地下茎の形、ルーペで見た花や実など、従来の図鑑にはなかった視点から撮影された写真が満載されています。
- 大人が見ても十分たのしく、興味深い内容です。親子での雑草観察にも絶好の図鑑です。

野外観察ハンドブック

校庭のクモ・ダニ・アブラムシ

浅間 茂・石井規雄・松本嘉幸／著 A5判 240ページ 本体1,905円

校庭シリーズ7冊目に当たる
最新刊。環境調査上からも重
要な動物群を集めました。
ダニはササラダニなど土壌動
物を表しています。

全国農村教育協会
<http://www.zennokyo.co.jp>

〒110-0016 東京都台東区台東1-26-6
TEL 03-3833-1821 FAX 03-3833-1665