

# 平成13年度水稻作関係除草剤試験成績概要

財団法人 日本植物調節剤研究協会 技術部

平成13年度水稻作関係除草剤試験成績中央検討会は、平成13年12月6日、7日の2日間、池之端文化センターにおいて開催された。なお、適-1 試験成績検討会は、これに先立ち平成13年10月11日 台東1丁目区民館にて開催された。ここに、これらの成果の概要を報告する。

1) 第一次適用性試験(適-1)は、北海道地域(植調研北海道試験地)、東北地域(植調古川試験地)、北陸地域(植調新潟試験地)、関東地

域(植調研究所)、近畿・中国・四国地域(植調滋賀試験地)、九州地域(植調福岡試験地)の全国6地域および砂壤土(植調広島第一試験地)で36薬剤(のべ169点)について実施した。その判定結果は、第2表のとおりである。

2) 第二次適用性試験(適-2)の総点数はのべ1,872点であり、その内訳を第1表にまとめた。これら適-2試験の判定結果は、第3表のとおりである。

第1表 平成13年度適-2 試験実施点数

|                  |               |                         |              |
|------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| II-2(移植前後土壌処理)   | 11 剤 109 点    | VII-3(長期持続型一発処理剤)       | 1 剤 5 点      |
| II-3(移植後土壌処理)    | 4 剤 20 点      | X(0.5kg および 0.25kg 粒剤等) | 12 剤 175 点   |
| II-5(適用時期拡大)     | 6 剤 43 点      | X I (生物除草剤)             | 1 剤 23 点     |
| II-6(特殊雑草防除)     | のべ 57 剤 103 点 |                         |              |
| III (直播栽培用)      | 7 剤 21 点      | ジャンボ剤                   |              |
| IV (畦畔雑草用)       | 7 剤 36 点      | II-2(移植前後土壌処理)          | 3 剤 56 点     |
| V (耕起前雑草用)       | 2 剤 11 点      | II-3(移植後土壌処理)           | 1 剤 44 点     |
| 不耕起栽培用           | 2 剤 10 点      | II-5(適用時期拡大)            | 1 剤 3 点      |
| VI(休耕田用)         | 4 剤 22 点      | II-6(特殊雑草防除)            | のべ 34 剤 54 点 |
| VII-1(初期一発処理剤)   | 17 剤 118 点    | VII(一発処理剤)              | 33 剤 423 点   |
| VII-2(初・中期一発処理剤) | 51 剤 563 点    | IX(一年生持続型除草剤)           | 3 剤 33 点     |

第2表 平成13年度 水稻作関係除草剤適-1試験 成績判定結果一覧

注) 判定欄の記入については、◎:極めて有望、○:有望、□:可能性有り、△:再検討、×:見込みなし を表す。

| NO | 薬剤名・剤型<br>[委託者]                                     | 有効成分及び含有率<br>(%)                                                                                                                                                                                        | 実施場所別総合評価 |    |    |    |    |    | 中央判定結果<br>[今後の課題等] |                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                         | 北海道       | 古川 | 新潟 | 植調 | 滋賀 | 福岡 |                    |                                                                                                                                                                                                                |
| 1  | AVH-0047077 <sup>ア</sup> ル<br>[アベ <sup>ン</sup> ティス] | オキサジ <sup>ア</sup> リ <sup>ン</sup> :6.7<br>ベンゾ <sup>フ</sup> エナ <sup>ツ</sup> :15.4                                                                                                                         | □         | □  | ○  | □  | ○  | △  | □                  | □ 移植前土壌処理剤として<br>移植前(-4以前)、一年生雑草発生前<br>・オキサ <sup>リ</sup> 抑制期間について<br>・水稲への影響について                                                                                                                               |
| 2  | AVH-0067077 <sup>ア</sup> ル<br>[アベ <sup>ン</sup> ティス] | オキサジ <sup>ア</sup> リ <sup>ン</sup> :6.7<br>未公開(既知):6.7                                                                                                                                                    | □         | ○  | ○  | □  | △  | △  | □                  | □ 移植前土壌処理剤として<br>移植前(-4以前)、一年生雑草、オキサ <sup>リ</sup> 発生前<br>・水稲への影響について                                                                                                                                           |
| 3  | HSW-0127077 <sup>ア</sup> ル<br>[北海三共]                | オキサジ <sup>ア</sup> リ <sup>ン</sup> :10g/L<br>ベンゾ <sup>フ</sup> エナ <sup>ツ</sup> :100g/L<br>ブ <sup>ロ</sup> モ <sup>ア</sup> チ <sup>ト</sup> :120g/L                                                             | ◎         |    |    |    |    |    |                    | ◎ 移植後土壌処理剤として(北海道)<br>+0～+1 <sup>イ</sup> 1L<br>・刈 <sup>刈</sup> に対する効果について                                                                                                                                      |
| 4  | SB-528(L)7077 <sup>ア</sup> ル<br>[*科研・SDS]           | ダ <sup>イ</sup> ム <sup>ン</sup> :24<br>ベ <sup>ン</sup> ト <sup>キ</sup> サ <sup>リ</sup> ン :4 (W/V)                                                                                                            | □         | □  | ○  | ○  | ○  | □  | □                  | ○ 移植前後土壌処理剤として<br>移植前(-4以前)、移植後+1 <sup>イ</sup> 1L、オキサ <sup>リ</sup> 発生<br>始まで                                                                                                                                   |
| 5  | AVH-301-1kg 粒<br>[アベ <sup>ン</sup> ティス]              | 未公開(新規):3                                                                                                                                                                                               | □         | □  |    | ○  |    | ○  | △                  | ○ 混合母剤として、一発処理剤として<br>+5～+1 <sup>イ</sup> 1L、オキサ <sup>リ</sup> 2L(北海道・東北)、<br>+5～+1 <sup>イ</sup> 12.5L、オキサ <sup>リ</sup> 2.5L(関東・九州)<br>・砂壌土での水稲への影響・程度について<br>・北海道・東北での+1 <sup>イ</sup> 、オキサ <sup>リ</sup> 殺草薬について |
| 6  | AVH-302-1kg 粒<br>[アベ <sup>ン</sup> ティス]              | 未公開(新規):3<br>未公開(既知):0.7                                                                                                                                                                                | □         | □  |    | ○  |    | ○  | △                  | ○ 一発処理剤として<br>+5～+1 <sup>イ</sup> 12L、オキサ <sup>リ</sup> 2L(北海道・東北)、<br>+5～+1 <sup>イ</sup> 12.5L、オキサ <sup>リ</sup> 2.5L(関東・九州)<br>・砂壌土での水稲への影響・程度について<br>・北海道・東北での+1 <sup>イ</sup> 、オキサ <sup>リ</sup> 殺草薬について        |
| 7  | KUH-011K-1kg 粒<br>[クミ化]                             | ベンチオカ <sup>ブ</sup> :15<br>メフェナセ <sup>ツ</sup> :4.5<br>ベンスルフロンメチ <sup>ル</sup> :0.75<br>ブ <sup>ロ</sup> モ <sup>ア</sup> チ <sup>ト</sup> :9                                                                    | ○         | ○  |    |    |    |    |                    | ○ 一発処理剤として(北海道・東北)<br>+3～+1 <sup>イ</sup> 12.5L                                                                                                                                                                 |
| 8  | KUH-011D-1kg 粒<br>[クミ化]                             | ベンチオカ <sup>ブ</sup> :15<br>メフェナセ <sup>ツ</sup> :3<br>ベンスルフロンメチ <sup>ル</sup> :0.51<br>ブ <sup>ロ</sup> モ <sup>ア</sup> チ <sup>ト</sup> :9                                                                      |           |    |    | ○  | ○  | ○  | ○                  | ○ 一発処理剤として(北陸～九州)<br>+3～+1 <sup>イ</sup> 12.5L                                                                                                                                                                  |
| 9  | KUH-012K ジャンボ<br>[クミ化]                              | ベンチオカ <sup>ブ</sup> :35.7<br>メフェナセ <sup>ツ</sup> :10.7<br>ベンスルフロンメチ <sup>ル</sup> :1.8<br>ベンゾ <sup>ビ</sup> シ <sup>ロ</sup> ン :4.7                                                                           | ○         | ○  |    |    |    |    |                    | ○ 一発処理剤として(北海道・東北)<br>+3～+1 <sup>イ</sup> 12.5L                                                                                                                                                                 |
| 10 | KUH-012D ジャンボ<br>[クミ化]                              | ベンチオカ <sup>ブ</sup> :35.7<br>メフェナセ <sup>ツ</sup> :7.1<br>ベンスルフロンメチ <sup>ル</sup> :1.2<br>ベンゾ <sup>ビ</sup> シ <sup>ロ</sup> ン :4.7                                                                            |           |    |    | ○  | ○  | ○  | ◎                  | ○ 一発処理剤として(北陸～九州)<br>+3～+1 <sup>イ</sup> 12.5L                                                                                                                                                                  |
| 11 | KUH-013K-0.25kg<br>粒<br>[クミ化]                       | ビ <sup>リ</sup> ミ <sup>ナ</sup> バ <sup>ク</sup> メチ <sup>ル</sup> :1.8<br>ベ <sup>ン</sup> ト <sup>キ</sup> サ <sup>リ</sup> ン :8<br>ブ <sup>ロ</sup> モ <sup>ア</sup> チ <sup>ト</sup> :36<br>ベンスルフロンメチ <sup>ル</sup> :3 | ◎         | ○  |    |    |    |    |                    | ○ 一発処理剤として(北海道・東北)<br>+3～+1 <sup>イ</sup> 12.5L                                                                                                                                                                 |
| 12 | KUH-013D-0.25kg粒<br>[クミ化]                           | ビ <sup>リ</sup> ミ <sup>ナ</sup> バ <sup>ク</sup> メチ <sup>ル</sup> :1.8<br>ベ <sup>ン</sup> ト <sup>キ</sup> サ <sup>リ</sup> ン :8<br>ブ <sup>ロ</sup> モ <sup>ア</sup> チ <sup>ト</sup> :36<br>ベンスルフロンメチ <sup>ル</sup> :2 |           |    |    | ○  | ○  | ○  | ○                  | ○ 一発処理剤として(北陸～九州)<br>+3～+1 <sup>イ</sup> 12.5L                                                                                                                                                                  |

| No | 薬剤名 ・ 剤型<br>〔委託者〕                          | 有効成分及び含有率<br>(%)                                                           | 実施場所別総合評価 |     |     |     |     |     | 中央判定結果<br>〔今後の課題等〕                                                                                   |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                            |                                                                            | 北海道       | 青森県 | 新潟県 | 滋賀県 | 福岡県 | 広島県 |                                                                                                      |
| 13 | Mon-923-1kg 粒<br>〔*モンサント・デュポン〕             | ブタクロール :10<br>ベンシルフロメチル:0.75<br>プロモプチド :7.5                                | ◎         | □   |     |     |     |     | ○ 一発処理剤として（北海道・東北）<br>+0～/t <sup>1</sup> 11.5L<br>・ 水稻に対する影響について                                     |
| 14 | Mon-923 (L)-1kg 粒<br>〔*モンサント・デュポン〕         | ブタクロール :10<br>ベンシルフロメチル:0.51<br>プロモプチド :7.5                                |           |     | ○   | ○   | ○   | □   | ○ 一発処理剤として（北陸～九州）<br>+0～/t <sup>1</sup> 11.5L<br>・ 水稻に対する影響について（砂壌土等）                                |
| 15 | NBA-071DEH-1kg 粒<br>〔*日産・塩野義・タリ〕           | ピラリノスルフロエチル:0.3<br>フェントラザミド :2<br>シロホップブチル :1.5                            | □         | ○   | ○   | ○   | ○   | □   | ○ 一発処理剤として<br>+5～/t <sup>1</sup> 13L<br>・ 水稻に対する影響について（砂壌土等）                                         |
| 16 | NBA-093 (改) ジャンボ<br>〔*武田、ハ・イエル〕            | フェントラザミド :7.5<br>イマゾスルフロ :3                                                | ○         | ◎   | ○   | ◎   | ○   | ○   | ○ 一発処理剤として<br>+5～/t <sup>1</sup> 12.5L                                                               |
| 17 | NBA-131a-1kg 粒<br>〔*ハ・イエル・デュポン・<br>クミ化・北三〕 | フェントラザミド :2<br>ベンシルフロメチル:0.75<br>プロモプチド :9                                 | ○         | ◎   |     |     |     |     | ○ 一発処理剤として（北海道・東北）<br>+0～/t <sup>1</sup> 12L                                                         |
| 18 | NBA-131b-1kg 粒<br>〔*ハ・イエル・デュポン・クミ<br>化〕    | フェントラザミド :2<br>ベンシルフロメチル:0.51<br>ダイムロン :4.5<br>プロモプチド :7.5                 |           |     | ○   | ◎   | ○   | ◎   | ○ 一発処理剤として（北陸～九州）<br>+0～/t <sup>1</sup> 12L                                                          |
| 19 | NC-399-1kg 粒<br>〔*日産、シシエント〕                | ピラリノスルフロエチル :0.3<br>ピリフリクト (NOJ-100):1.5<br>カフェンストロール :1.5<br>未公開 (既知) :10 | ◎         | ◎   | ○   | ○   | △   | ○   | ○ 一発処理剤として<br>+5～/t <sup>1</sup> 13L<br>・ 水稻に対する影響について                                               |
| 20 | NCM-451 ジャンボ<br>〔*モンサント・日産〕                | ブタクロール :34<br>ピラリノスルフロエチル :0.7                                             | □         | ○   |     | ○   |     | ○   | ○ 一発処理剤として（北海道・東北・関<br>東・九州）+1～/t <sup>1</sup> 11.5L<br>・ 水稻に対する影響について                               |
| 21 | NH-101 ジャンボ<br>〔*日農・デュポン・三<br>菱〕           | ベンシルフロメチル:1.5<br>インダノファン :2.8<br>クロマプロップ :7                                | □         | ○   |     |     |     |     | ○ 一発処理剤として（北海道・東北）<br>+5～/t <sup>1</sup> 12.5L<br>・ /t <sup>1</sup> 1級草葉齢の確認                         |
| 22 | NH-102 フロアブル<br>〔*日農・デュポン・三<br>菱〕          | ベンシルフロメチル :1<br>インダノファン :2.8<br>クロマプロップ :7<br>未公開 (既知) :8                  |           |     | ○   | ○   | ○   | ○   | ○ 一発処理剤として（北陸～九州）<br>+5～/t <sup>1</sup> 12.5L                                                        |
| 23 | NH-104-1kg 粒<br>〔*日農・デュポン・三<br>菱〕          | ベンシルフロメチル :0.51<br>インダノファン :1.4<br>クロマプロップ :3.5<br>未公開 (既知) :4             |           |     | ○   | ○   | ○   | ○   | ○ 一発処理剤として（北陸～九州）<br>+5～/t <sup>1</sup> 12.5L                                                        |
| 24 | NSK-546707フル<br>〔*トクヤマ・SDS・八洲〕             | テニルクロール :5<br>ベンジビシクロン:4<br>クロマプロップ :6                                     | □         | ○   | ○   | ◎   | ○   | □   | ○ 一発処理剤として<br>+3～/t <sup>1</sup> 12.5L<br>・ 低温条件での/t <sup>1</sup> 1に対する効果について<br>・ 処理時期と刈刈に対する効果について |

| NO | 薬剤名 ・ 剤型<br>[委託者]                        | 有効成分及び含有率<br>(%)                                                      | 実施場所別総合評価 |     |     |     |     |     |     | 中央判定結果<br>[今後の課題等]                                                                                                     |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                          |                                                                       | 北海道       | 青森県 | 新潟県 | 滋賀県 | 福岡県 | 広島県 | 山口県 |                                                                                                                        |
| 25 | SL-954 ジェンボ<br>[※石原・SDS]                 | カフェンストロール : 4.2<br>ダ'イムロン : 8.4<br>ビ'ラジ'キシフェン : 20<br>ベ'ンゾ'ビ'シクロン : 4 | □         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○ 一発処理剤として<br>+3~+12L                                                                                                  |
| 26 | SW-002(L)フロアブル<br>[※三共・デ'ュボン]            | カフェンストロール : 5.5<br>ダ'イムロン : 10<br>ベ'ンスルフロメチル : 1<br>ブ'ロモ'チド' : 12     |           |     | ○   | ◎   | ○   | ○   | ○   | ○ 一発処理剤として (北陸~九州)<br>+3~+12L                                                                                          |
| 27 | SW-011P5(H) ジェンボ<br>[三共]                 | オキサジ'クロメチル : 3.4<br>シハロホ'ップ'チル : 8.6<br>ベ'ンスルフロメチル : 4.3              | ◎         | ○   |     |     |     |     |     | ○ 一発処理剤として (北海道・東北)<br>+3~+12L                                                                                         |
| 28 | SW-011P5(L) ジェンボ<br>[三共]                 | オキサジ'クロメチル : 3.4<br>シハロホ'ップ'チル : 8.6<br>ベ'ンスルフロメチル : 2.9              |           |     | ○   | ○   | ○   | ○   | □   | ○ 一発処理剤として (北陸~九州)<br>+3~+12L                                                                                          |
| 29 | SW-012(H)-1kg 粒<br>[※三共・デ'ュボン]           | ベ'ンスルフロメチル : 0.75<br>カフェンストロール : 3<br>ダ'イムロン : 6<br>ブ'ロモ'チド' : 6      | □         | □   |     |     |     |     |     | □ 一発処理剤として (北海道・東北)<br>+3~+12L<br>・ 12L 殺草薬齢について                                                                       |
| 30 | SW-012(L)-1kg 粒<br>[※三共・デ'ュボン]           | ベ'ンスルフロメチル : 0.51<br>カフェンストロール : 3<br>ダ'イムロン : 6<br>ブ'ロモ'チド' : 6      |           |     | □   | ○   | ○   | □   | ○   | ○ 一発処理剤として (北陸~九州)<br>+3~+12L<br>・ 12L 殺草薬齢の確認                                                                         |
| 31 | TH-005 ジェンボ<br>[武田]                      | イマ'ジ'スルフロ'ン : 1.8<br>ブ'レチラ'クロール : 12                                  | ○         | ◎   | ◎   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○ 一発処理剤として<br>+3~+12L                                                                                                  |
| 32 | THI-913CS ジェンボ<br>[武田]                   | イマ'ジ'スルフロ'ン : 1.8<br>カフェンストロール : 4.2<br>ダ'イムロン : 20<br>ベ'ンスル'タッ' : 32 |           |     |     |     |     | ○   |     | ○ 一発処理剤として (九州)<br>+3~+12L                                                                                             |
| 33 | YH-641-1kg 粒<br>[※八洲、エス'アイ'エス、<br>日産、三菱] | ビ'ラジ'スルフロ'ンエチル : 0.3<br>イン'ダ'ノ'ファン : 1.2<br>ベ'ンゾ'ビ'シクロン : 2           | ◎         | ◎   | ○   | ○   | △   | ○   | □   | ○ 一発処理剤として<br>+5~+12L<br>・ 水稻に対する影響について                                                                                |
| 34 | DASH-001'フル<br>[タ'ウケ'カル]                 | DASH-001 (新規) : 25g/器                                                 | ◎         | ○   | ○   | ○   | ○   | □   | ○   | ○ 茎葉処理剤として (落水茎葉散布)<br>+20~、+12L ~5L、+12L ~5L                                                                          |
| 35 | MK-243SM ジェンボ<br>[※三菱・八洲]                | イン'ダ'ノ'ファン : 3<br>シ'マトリン : 8<br>MCPB : 4.8                            |           | △   | □   | ○   | ○   |     |     | ○ 茎葉兼土壌処理剤として (北陸~四国)<br>+20~、+12L ~3.0L、+12L ~3.0L<br>・ 東北での効果について<br>・ 12L、+12L 殺草薬齢について<br>・ 多年生雑草に対する効果について        |
| 36 | SB-555-1kg 粒<br>[※SDS・タ'ウ]               | シハロホ'ップ'チル : 1.8<br>ベ'ンゾ'ビ'シクロン : 2<br>シ'マトリン : 4.5                   | △         | △   | □   | ○   | □   |     |     | □ 茎葉兼土壌処理剤として (北陸~四国)<br>+20~、+12L ~3.0L、+12L ~3.0L<br>・ 北海道・東北での効果・薬害について<br>・ 12L、+12L 殺草薬齢について<br>・ 多年生雑草に対する効果について |

第3表 平成13年度 水稻関係除草剤適-2試験成績判定結果一覧

| 区 分                 | 実・継                                                                                                                          | 継                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ⅱ-2 移植前後土壌処理        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                |
| Ⅱ-2-(1)             | CG-113 EW, <u>KPP-2008 乳(EW)</u> ,<br>YH-562 フロアブル, <u>ブタクロール-1kg 粒</u> ,<br>SB-528 フロアブル                                    | AVH-004 フロアブル, SB-528① フロアブル,<br>AVH-006 フロアブル                                                                                                                                                                                 |
| Ⅱ-2-(2)             | KPP-2005⑥ フロアブル(少量散布),<br>RYH-118-1kg 粒,<br>YH-562 フロアブル(少量散布)                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |
| Ⅱ-3 移植後土壌処理         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                |
| Ⅱ-3-(1)             | KH-183 粒                                                                                                                     | HSW-012 フロアブル                                                                                                                                                                                                                  |
| Ⅱ-3-(2)             | SL-970 フロアブル(少量散布)                                                                                                           | MY-100MS フロアブル(少量散布)                                                                                                                                                                                                           |
| Ⅱ-5 適用時期拡大          | KUH-983-1kg 粒, <u>SB-551-1kg 粒</u> ,<br>SW-973-1kg 粒, <u>モリネートSM-1kg 粒</u> ,<br>YH-591-1kg 粒                                 | SB-555-1kg 粒                                                                                                                                                                                                                   |
| Ⅱ-6-(1) クログワイ対象     | KUH-958 フロアブル, <u>NC-339-1kg 粒</u>                                                                                           | AC-014A-1kg 粒, AVH-002-1kg 粒,<br>KPP-2005⑥ フロアブル(少量散布),<br>KUH-972D フロアブル, KUH-972K フロアブル,<br>KUH-985 フロアブル, KUH-985① フロアブル,<br>KUH-986D-0.25kg 粒, NH-803 フロアブル,<br>NH-804 フロアブル, SW-002 フロアブル                                 |
| Ⅱ-6-(2) オモダカ対象      | AC-014A-1kg 粒, <u>DHN-971 フロアブル</u> ,<br><u>MY-100DC フロアブル</u> , <u>NC-339-1kg 粒</u> ,<br><u>SW-002 フロアブル</u> , SW-973-1kg 粒 | AVH-002-1kg 粒, KUH-972D フロアブル,<br>KUH-972K フロアブル, KUH-985 フロアブル,<br>KUH-985① フロアブル, KUH-986D-0.25kg 粒,<br>NH-803 フロアブル, NH-804 フロアブル                                                                                           |
| Ⅱ-6-(5) シズイ対象       | <u>NC-390 フロアブル</u> , <u>SB-556 フロアブル</u> ,<br><u>SW-002 フロアブル</u>                                                           | KUH-972K フロアブル, KUH-985 フロアブル,<br>SW-991-1kg 粒                                                                                                                                                                                 |
| Ⅱ-6-(6) エゾノサヤヌカグサ対象 | <u>HSW-001 フロアブル</u> , <u>SW-991-1kg 粒</u>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |
| Ⅱ-6-(7) クサネム対象      | KUH-911 液, <u>NH-803 フロアブル</u> ,<br><u>NH-804 フロアブル</u> , SW-973-1kg 粒                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |
| Ⅱ-6-(8) コウキヤガラ対象    | SB-528 フロアブル                                                                                                                 | SW-002 フロアブル, TH-913⑥ 粒                                                                                                                                                                                                        |
| Ⅱ-6-(10) その他        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                |
| ミズアオイ               |                                                                                                                              | AC-014A-1kg 粒, HOK-983 フロアブル,<br>HSW-001 フロアブル, KPP-2008 乳(EW),<br>KUH-003K-0.25kg 粒,<br>KUH-958 フロアブル(少量散布),<br>KUH-992-0.25kg 粒, NH-003-1kg 粒,<br>NH-803 フロアブル, SB-528 フロアブル,<br>SB-533 フロアブル, SB-556 フロアブル,<br>ブタクロール-1kg 粒 |
| イボクサ                |                                                                                                                              | NH-804 フロアブル, SB-533 フロアブル                                                                                                                                                                                                     |
| Ⅲ 直播栽培              | AGH-925-1kg 粒, CDS-941 フロアブル,<br>CDS-941① フロアブル, <u>モリネートSM-1kg 粒</u> ,<br><u>SW-973-1kg 粒</u> , KUH-931-1kg 粒               | TH-913NCS フロアブル                                                                                                                                                                                                                |
| 不耕起直播               | WOC-01 液, <u>ブタクロール 乳</u>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |

| 区 分                                                   | 実・継                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 継                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV 畦畔雑草                                               | 刈取代用 AK-01 液, <u>NH-007 フロアブル</u> ,<br><u>SUM-99 フロアブル</u> , YF-65① 液<br>刈取軽減 SW-995 フロアブル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ZK-122 液, MON-001 液                                                                                                                                                |
| V 耕起前                                                 | <u>NH-007 フロアブル</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ZK-122 液                                                                                                                                                           |
| VI 休耕田                                                | <u>NH-501 フロアブル</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ZK-122 液, MON-001 液,<br>ASH-001 CE                                                                                                                                 |
| VII-1 初期一発処理剤                                         | AGH-975 フロアブル, <u>AVH-002-1kg 粒</u> ,<br><u>HSW-001 フロアブル</u> , MY-100MS フロアブル,<br>NBA-076a-1kg 粒, NBA-076b-1kg 粒,<br>NBA-096a フロアブル, NBA-096b フロアブル,<br><u>NC-385SB 顆粒水和</u> , PSS①D-1kg 粒,<br>SB-533 フロアブル, HOK-983 フロアブル,<br>HSW-941-1kg 粒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mon-923-1kg 粒, Mon-923①-1kg 粒,<br>NBA-131a-1kg 粒, NBA-131b-1kg 粒                                                                                                   |
| VII-2 初・中期一発処理剤                                       | CH-906①-1kg 粒, DHN-971 フロアブル,<br>HJ-943-1kg 粒, <u>KUH-004D-1kg 粒</u> ,<br><u>KUH-004K-1kg 粒</u> , KUH-972D フロアブル,<br>KUH-972K フロアブル, KUH-985 フロアブル,<br>KUH-985① フロアブル, MY-100DC フロアブル,<br>MY-100DC① フロアブル,<br><u>MY-100DC-1kg (IHOK-204-1kg) 粒</u> ,<br><u>MY-100DC①-1kg (IHOK-205-1kg) 粒</u> ,<br>MY-100N 顆粒水和, MY-100NC 顆粒水和,<br>MY-100NC-1kg 粒, MY-100NDC-1kg 粒,<br><u>MY-100TSC フロアブル</u> , NBA-071-1kg 粒,<br>NBA-073-1kg 粒, NBA-941S-1kg 粒,<br>NC-339 顆粒水和, NC-339-1kg 粒,<br>NC-385 顆粒水和, NC-390 フロアブル,<br><u>NH-003-1kg 粒</u> , <u>NH-004-1kg 粒</u> ,<br>NH-803 フロアブル, NH-804 フロアブル,<br>NOJ-101-1kg 粒, NOJ-102 顆粒水和,<br>NOJ-103-1kg 粒, NOJ-104-1kg 粒,<br>SB-556 フロアブル, SW-002 フロアブル,<br><u>SW-002① フロアブル</u> , SW-991-1kg 粒,<br><u>TH-001 フロアブル</u> , TH-913HSK-1kg 粒,<br><u>TH-913NCS フロアブル</u> , MY-100TS フロアブル, | KUH-011D-1kg 粒, KUH-011K-1kg 粒,<br>NBA-071DEH-1kg 粒, NSK-546 フロアブル,<br>SW-012①-1kg 粒, SW-012①-1kg 粒,<br>YH-641-1kg 粒, AVH-302-1kg 粒,<br>NH-102 フロアブル, NH-104-1kg 粒 |
| VII-3 長期持続型一発処理剤                                      | AC-014A-1kg 粒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |
| X 0.5kgおよび0.25kg粒剤等<br>移植後土壌処理<br>一発処理剤<br><br>一年生持続型 | KUH-992-0.25kg 粒<br>AKD-7105-0.5kg 粒, <u>KUH-003D-0.25kg 粒</u> ,<br><u>KUH-003K-0.25kg 粒</u> , KUH-986D-0.25kg 粒,<br>KUH-986K-0.25kg 粒, MK-243N-0.5kg 粒,<br>NH-801-0.5kg 粒, NH-802-0.5kg 粒<br>MK-243S-0.5kg 粒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUH-013D-0.25kg 粒, KUH-013K-0.25kg 粒                                                                                                                               |
| X I 生物除草剤                                             | MTB-951                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |

ジャンボ剤

| 区 分                          | 実・継                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 継                                                                                                          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ⅱ-2 移植前後土壌処理                 | KPP-2005, <u>MAT-159</u> ,<br>ブ'タクロール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |
| Ⅱ-3 移植後土壌処理                  | <u>CG-113(改)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
| Ⅱ-5 適用時期拡大                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MK-243SM                                                                                                   |
| Ⅱ-6-(1) クログワイ対象              | <u>SB-554</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AC-014R, KPP-2005,<br>KUH-883(改), KUH-883①(改),<br>KUH-975PD, KUH-975PK,<br>NH-806, SW-952P5⑨,<br>SW-952P5① |
| Ⅱ-6-(2) オモダカ対象               | <u>SW-952P5⑩</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AC-014R, KUH-883(改),<br>KUH-883①(改), KUH-975PD,<br>KUH-975PK, NH-806,<br>SW-952P5①                         |
| Ⅱ-6-(5) シズイ対象                | <u>SW-952P5⑩</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SB-554                                                                                                     |
| Ⅱ-6-(6) エゾノサヤヌカグサ対象          | <u>SW-952P5⑩</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
| Ⅱ-6-(8) コウキヤガラ対象             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SW-952P5⑩                                                                                                  |
| Ⅱ-6-(10) その他<br>タウコギ<br>イボクサ | <u>ONC-381</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NH-806                                                                                                     |
| Ⅶ 一発処理剤                      | AC-014C①, <u>AC-014R</u> ,<br>AGH-987, <u>DKH-001 (旧NH-001)</u> ,<br><u>DKH-002 (旧NH-002)</u> , HSA-971,<br>KUH-883(改), KUH-883①(改),<br>KUH-975PD, KUH-975PK,<br><u>MY-100DC⑨</u> , MY-100DC①,<br>MY-100MS, MY-100NC,<br>NBA-101, NC-391①,<br>NCH-903DEH, NH-805,<br>NH-806, ONC-381,<br>SB-554, SW-952P5⑨,<br>SW-952P5①, TH-913CS,<br><u>THI-913CS</u> | KUH-012D, KUH-012K,<br>NH-101, SL-954,<br>SW-011P5⑨, SW-011P5①,<br>TH-005, NBA-093(改)                      |
| Ⅸ 一年生持続型                     | SW-965, SB-533P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HOK-991                                                                                                    |

注): 1) 本年度新規に使用基準を作成されたものは、薬剤名にアンダーラインを記した。

2) 本年度は「実」、「継?」及び「中止」と判定された薬剤はなかった。

## 平成13年度 水稻作関係除草剤使用基準一覧表

## II-2 移植前後土壌処理

II-2-(1) AVH-004 フロアブル 「継」

II-2-(1)

CG-113 EW

| 地域名                     | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ'ヤ<br>ツツ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                    | 使用量                        | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------------------------|----------|--------------------|------|------------|--------------|------|-------|------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------|---------------|
| 北海道                     | ○1       | ○                  | ○始   | ●前         |              |      |       |      |       |    |                 | +0～+5(ノビエ1L)            | 10ml/a/<br>散布液量<br>50ml/a) | ●       | ○             |
| 東北                      | ○1       | ○                  | ○始   |            | ○始           |      |       |      |       |    |                 | 植代後～+4,+0～<br>+5(ノビエ1L) |                            |         | ○             |
| 北陸                      | ○1       | ○                  | ○始   |            | ○始           |      |       |      |       |    |                 |                         |                            | ●       | ○             |
| 関東・東海                   | 早○<br>普○ | ○1                 | ○    | ○始         |              | ●始   |       |      |       |    |                 |                         |                            | ○       | ○             |
| 近・中・四                   | 早●<br>普○ | ○1                 | ○    | ○始         |              | ○始   |       |      |       |    |                 |                         |                            | ●       | ○             |
| 九州                      | 早○<br>普○ | ○1                 | ○    | ○始         |              | ○始   |       |      |       |    |                 |                         |                            | ○       | ○             |
| 使用上の注意:(13) 減水深:2cm/日以下 |          |                    |      |            |              |      |       |      |       |    |                 |                         |                            |         |               |

II-2-(1)

KPP-2008 乳(EW)

| 地域名                       | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ'ヤ<br>ツツ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                    | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|---------------------------|----------|--------------------|------|------------|--------------|------|-------|------|-------|----|-----------------|-------------------------|--------|---------|---------------|
| 北海道                       | ●1       | ●                  | ●始   | ●前         |              |      |       |      |       |    |                 | +0～+5(ノビエ1L)            | 50ml/a |         | ●             |
| 東北                        | ●1       | ●                  | ●始   |            | ●始           |      |       |      |       |    |                 | 植代後～+4,+0～<br>+5(ノビエ1L) |        |         | ●             |
| 北陸                        | ●1       | ●                  | ●始   |            | ●始           |      |       |      |       |    |                 |                         |        |         | ●             |
| 関東・東海                     | 早●<br>普● | ●1                 | ●    | ●始         | ●始           |      |       |      |       |    |                 |                         |        |         | ●             |
| 近・中・四                     | 早●<br>普● | ●1                 | ●    | ●始         | ●始           |      |       |      |       |    |                 |                         |        |         | ●             |
| 九州                        | 早●<br>普● | ●1                 | ●    | ●始         | ●始           |      |       |      |       |    |                 |                         |        |         | ●             |
| 使用上の注意:(5)(6) 減水深:2cm/日以下 |          |                    |      |            |              |      |       |      |       |    |                 |                         |        |         |               |

II-2-(1) SB-528(Ⅰ) フロアブル 「継」

II-2-(1)

YH-562 フロアブル

| 地域名                   | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ'ヤ<br>ツツ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                  | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-----------------------|----------|--------------------|------|------------|--------------|------|-------|------|-------|----|-----------------|-----------------------|--------|---------|---------------|
| 北海道                   | ○1       | ○                  | ○始   | ○始         |              |      |       |      |       |    | ○前              | +0～+5(ノビエ1L)          | 50ml/a |         | ○             |
| 東北                    | ○1.5     | ○                  | ○始   | ○始         |              |      |       |      |       |    | ○前              | +0～ノビエ1.5L            |        | ○       | ○             |
| 北陸                    | ○1.5     | ○                  | ○始   |            |              |      |       |      |       |    | ○前              |                       |        | ○       | ○             |
| 関東・東海                 | 早○<br>普○ | ○1.5               | ○    | ○始         |              |      |       |      |       |    | ○前              | 植代後～+4,+0～<br>ノビエ1.5L |        | ○       | ○             |
| 近・中・四                 | 早○<br>普○ | ○1                 | ○    | ○始         |              |      |       |      |       |    |                 | +0～+5(ノビエ1L)          |        | ○       | ○             |
| 九州                    | 早○<br>普○ | ○1                 | ○    | ○始         |              |      |       |      |       |    |                 |                       |        |         | ○             |
| 田植同時散布可能(東北～近畿・中国・四国) |          |                    |      |            |              |      |       |      |       |    |                 |                       |        |         |               |
| 使用上の注意: 減水深:2cm/日以下   |          |                    |      |            |              |      |       |      |       |    |                 |                       |        |         |               |

## II-2-(1)

フタクロール-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                    | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|----------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|-------|----|-----------------|-------------------------|--------|---------|---------------|
| 北海道   | ○1       | ○                 | ○始   | ○前         |            |      |       |      |       |    |                 | +1～+5(ノビエ1L)            | 100g/a | ●       | ○             |
| 東北    | ○1       | ○                 | ○始   |            | ○始         |      |       |      |       |    |                 | 植代後～+4,+1～<br>+5(ノビエ1L) |        |         | ○             |
| 北陸    | ○1       | ○                 | ○始   |            | ○始         |      |       |      |       |    |                 |                         |        | ●       | ○             |
| 関東・東海 | 早○<br>普○ | ○1                | ○    | ○始         | ○始         |      |       |      |       |    |                 |                         |        | ○       | ○             |
| 近・中・四 | 早○<br>普○ | ○1                | ○    | ○始         | ○始         |      |       |      |       |    |                 | +1～+5(ノビエ1L)            |        |         | ○             |
| 九州    | 早●<br>普○ | ○1                | ○    | ○始         | ●始         |      |       |      |       |    |                 | 植代後～+4,+1～<br>+5(ノビエ1L) |        | ○       | ○             |

使用上の注意:(26)北陸 減水深:2cm/日以下

## II-2-(1)

SB-528 フロアブル

| 地域名   | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離     | 処理時期                    | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|----------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|-------|----|---------------------|-------------------------|--------|---------|---------------|
| 北海道   | ○1       | ○                 | ○始   | ○始         |            |      |       |      |       |    |                     | 植代後～+4,+0～<br>+5(ノビエ1L) | 50ml/a | ○       | ○             |
| 東北    | ○1       | ○                 | ○始   | ○始         | ○始         |      | ○前    |      |       |    | シズイ:発生前<br>コウキヤガラ:前 |                         |        | ○       | ○             |
| 北陸    | ○1       | ○                 | ○始   | ○始         | ○始         |      |       |      |       |    |                     |                         |        | ○       | ○             |
| 関東・東海 | 早○<br>普○ | ○1                | ○    | ○始         | ○始         |      | ○前    |      |       |    |                     |                         |        | ○       | ○             |
| 近・中・四 | 早○<br>普○ | ○1                | ○    | ○始         | ○始         |      | ○前    |      |       |    |                     |                         |        | ○       | ○             |
| 九州    | 早○<br>普○ | ○1                | ○    | ○始         | ○始         |      | ○前    |      |       |    | コウキヤガラ:発<br>生始      |                         |        | ○       | ○             |

水口処理可能(北海道, 東北, 関東・東海～九州) 田植同時散布可能(関東・東海, 近畿・中国・四国)  
 クログワイ防除は、クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(東北, 関東・東海～九州)  
 コウキヤガラ防除は、コウキヤガラに有効な一発処理剤との体系で使用する。

使用上の注意:(5)(13)(36)(40)(42) 減水深:2cm/日以下

## II-2-(1) AVH-006 フロアブル 「縦」

## II-2-(2)

KPP-2005(Ⅱ) フロアブル(少量散布)

| 地域名   | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                    | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|----------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|-------|----|-----------------|-------------------------|--------|---------|---------------|
| 北海道   | ○1       | ○                 | ○始   |            |            |      |       |      |       |    |                 | +0～+5(ノビエ1L)            | 30ml/a | ○       | ○             |
| 東北    | ○1       | ○                 | ○始   |            | ○前         |      |       |      |       |    |                 | 植代後～+4,+0～<br>+5(ノビエ1L) |        | ○       | ○             |
| 北陸    | ○1       | ○                 | ○始   |            | ○始         |      |       |      |       |    |                 |                         |        | ○       | ○             |
| 関東・東海 | 早○<br>普○ | ○1                | ○    | ○始         | ○始         |      |       |      |       |    |                 |                         |        | ○       | ○             |
| 近・中・四 | 早○<br>普○ | ○1                | ○    | ○始         | ○始         |      |       |      |       |    |                 |                         |        | ○       | ○             |
| 九州    | 早○<br>普○ | ○1                | ○    | ○始         | ○始         |      |       |      |       |    | コウキヤガラ:発<br>生始  |                         |        | ○       | ○             |

一発処理型除草剤の前処理として少量散布(30ml/a)が可能。

使用上の注意:(36) 減水深:2cm/日以下

## II-2-(2)

RYH-118-1kg 粒

| 地域名                    | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロク'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                    | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|------------------------|----------|-------------------|------|------------|--------------|------|--------|------|-------|----|-----------------|-------------------------|--------|---------|---------------|
| 北海道                    | ○1       | ○                 |      |            |              |      |        |      |       |    |                 | +0～+5(ノビエ1L)            | 100g/a | ○       | ○             |
| 東北                     | ○1       | ○                 |      |            |              |      |        |      |       |    |                 | 植代後～+4,+0～<br>+5(ノビエ1L) |        | ○       | ○             |
| 北陸                     | ○1       | ○                 |      |            |              |      |        |      |       |    |                 |                         |        | ○       | ○             |
| 関東・東海                  | 早○<br>菅○ | ○1                | ○    |            |              |      |        |      |       |    |                 |                         |        | ○       | ○             |
| 近・中・四                  | 早○<br>菅○ | ○1                | ○    |            |              |      |        |      |       |    |                 |                         |        | ○       | ○             |
| 九州                     | 早○<br>菅○ | ○1                | ○    |            |              |      |        |      |       |    |                 |                         |        | ○       | ○             |
| 一発処理型除草剤の前処理として使用する。   |          |                   |      |            |              |      |        |      |       |    |                 |                         |        |         |               |
| 使用上の注意:(5) 減水深:2cm/日以下 |          |                   |      |            |              |      |        |      |       |    |                 |                         |        |         |               |

## II-2-(2)

YH-562 フロアブル(少量散布)

| 地域名                                                   | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロク'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                    | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------------------------------------------------------|----------|-------------------|------|------------|--------------|------|--------|------|-------|----|-----------------|-------------------------|--------|---------|---------------|
| 北海道                                                   | ○1       | ○                 | ○始   | ○前         |              |      |        |      |       |    | ○前              | +0～+5(ノビエ1L)            | 30ml/a | ○       | ○             |
| 東北                                                    | ○1       | ○                 | ○始   | ○始         |              |      |        |      |       |    |                 | 植代後～+4,+0～<br>+5(ノビエ1L) |        | ○       | ○             |
| 北陸                                                    | ○1       | ○                 | ○始   |            |              |      |        |      |       |    |                 |                         |        | ○       | ○             |
| 関東・東海                                                 | 早●<br>菅● | ●1                | ●    | ●始         |              |      |        |      |       |    | ●前              |                         |        | ●       | ●             |
| 近・中・四                                                 | 早<br>菅   |                   |      |            |              |      |        |      |       |    |                 |                         |        |         |               |
| 九州                                                    | 早<br>菅   |                   |      |            |              |      |        |      |       |    |                 |                         |        |         |               |
| 水口処理可能(東北) 一発処理型除草剤の前処理として少量散布(30ml/a)が可能。(北海道～関東・東海) |          |                   |      |            |              |      |        |      |       |    |                 |                         |        |         |               |
| 使用上の注意: 減水深:2cm/日以下                                   |          |                   |      |            |              |      |        |      |       |    |                 |                         |        |         |               |

## II-3 移植後土壌処理

II-3-(1) HSW-012 フロアブル 「継」

## II-3-(1)

KH-183 粒

| 地域名                 | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロク'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|---------------------|----------|-------------------|------|------------|--------------|------|--------|------|-------|----|-----------------|------------|--------|---------|---------------|
| 北海道                 | ○1.5     | ○                 | ○始   | ○始         |              |      |        |      |       |    | ○始              | +3～ノビエ1.5L | 300g/a | ○       | ○             |
| 東北                  | ○1.5     | ○                 | ○始   | ○前         |              |      |        |      |       |    | ○始              |            |        | ○       | ○             |
| 北陸                  | ○1.5     | ○                 | ○始   | ○前         |              |      |        |      |       |    | ○始              |            |        | ○       | ○             |
| 関東・東海               | 早●<br>菅○ | ○1.5              | ○    | ○始         |              |      |        |      |       |    | ○始              |            |        | ○       | ○             |
| 近・中・四               | 早●<br>菅○ | ○1.5              | ○    | ○始         |              |      |        |      |       |    | ○始              |            |        | ○       | ○             |
| 九州                  | 早●<br>菅○ | ○1.5              | ○    | ○始         |              |      |        |      |       |    | ○始              |            |        | ○       | ○             |
| 使用上の注意: 減水深:2cm/日以下 |          |                   |      |            |              |      |        |      |       |    |                 |            |        |         |               |

II-3-(2) MY-100MS フロアブル(少量) 「継」

II-3-(2)

SL-970 フロアブル(少量散布)

| 地域名   | ノビエ    | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                                | 使用量    | 砂<br>埃<br>土 | 埃<br>土<br>～<br>埃<br>土 |
|-------|--------|-------------------|------|------------|--------------|------|-------|------|-------|----|-----------------|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------------|
| 北海道   | ○前     | ○                 | ○前   |            |              |      |       |      |       |    |                 | +0～+5(ノビエ発生<br>前)                   | 30ml/a |             | ○                     |
| 東北    | ○1     | ○                 | ○始   |            |              |      |       |      |       |    |                 | +0～+5(ノビエ1L)                        |        | ○           | ○                     |
| 北陸    | ○1     | ○                 | ○始   |            |              |      |       |      |       |    |                 |                                     |        | ○           | ○                     |
| 関東・東海 | 早<br>○ | ○1*               | ○    | ○始         |              |      |       |      |       |    |                 | +0～+5(ノビエ1L) (*:<br>早期はノビエ始まで)      |        | ○           | ○                     |
| 近・中・四 | 早<br>○ | ○1*               | ○    | ○始         |              |      |       |      |       |    |                 | +0～+5(ノビエ1L) (*:<br>砂埃土はノビエ始ま<br>で) |        | ○           | ○                     |
| 九州    | 早<br>○ |                   |      |            |              |      |       |      |       |    |                 |                                     |        |             |                       |

一発処理型除草剤の前処理として少量散布(30ml/a)が可能。

使用上の注意:

減水深:2cm/日以下

II-5 適用時期拡大

II-5

KUH-983-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ         | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期               | 使用量    | 砂<br>埃<br>土 | 埃<br>土<br>～<br>埃<br>土 |
|-------|-------------|-------------------|------|------------|--------------|------|-------|------|-------|----|-----------------|--------------------|--------|-------------|-----------------------|
| 北海道   | ○4          |                   |      |            |              |      |       |      |       |    |                 | +15～+35(ノビエ<br>4L) | 100g/a |             | ○                     |
| 東北    | ○4          |                   |      |            |              |      |       |      |       |    |                 |                    |        | ○           | ○                     |
| 北陸    | ○4          |                   |      |            |              |      |       |      |       |    |                 |                    |        |             | ○                     |
| 関東・東海 | 早<br>○      | ○4                |      |            |              |      |       |      |       |    |                 |                    |        |             | ○                     |
| 近・中・四 | 早<br>●<br>○ | ○4                |      |            |              |      |       |      |       |    |                 |                    |        | ○           | ○                     |
| 九州    | 早<br>○      | ○4                |      |            |              |      |       |      |       |    |                 |                    |        | ○           | ○                     |

使用上の注意:(21)

減水深:2cm/日以下

II-5

SB-551-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ    | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                 | 使用量    | 砂<br>埃<br>土 | 埃<br>土<br>～<br>埃<br>土 |
|-------|--------|-------------------|------|------------|--------------|------|-------|------|----------|----|-----------------|----------------------|--------|-------------|-----------------------|
| 北海道   |        |                   |      |            |              |      |       |      |          |    |                 |                      | 100g/a |             |                       |
| 東北    |        |                   |      |            |              |      |       |      |          |    |                 |                      |        |             |                       |
| 北陸    |        |                   |      |            |              |      |       |      |          |    |                 |                      |        |             |                       |
| 関東・東海 | 早<br>● | ●3                | ●    | ●3         | ●2           | ●2   |       |      | ●発生<br>期 |    |                 | +20～+30(ノビエ3L<br>まで) |        |             | ●                     |
| 近・中・四 | 早<br>● | ●3                | ●    | ●3         | ●2           | ●2   |       |      | ●発生<br>期 |    |                 |                      |        |             | ●                     |
| 九州    | 早<br>● | ●3                | ●    | ●3         | ●2           |      |       |      | ●発生<br>期 |    |                 |                      |        | ●           | ●                     |

使用上の注意:(1)(9)(21)

減水深:2cm/日以下

II-5 SB-555-1kg 粒 「継」

## II-5

SN-973-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 |                              | 処理時期                          | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|----------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|----|-----------------|------------------------------|-------------------------------|--------|---------|---------------|
| 北海道   | ○3.5     | ○                  | ○3   | ○2         |            | ○3   |       | ○始   | ○発生<br>期 |    | ○始              | エゾノサヤスカグ<br>サ:2L             | +20～+30(イネ5L以<br>降、ノビエ3.5Lまで) | 100g/a | ○       | ○             |
| 東北    | ○3.5     | ○                  | ○2   | ○始         | ○2         |      | ○始    | ○始   |          |    |                 | シズイ:発生始～<br>3cm<br>ツクコキ:本葉2L |                               |        | ○       | ○             |
| 北陸    | ○3.5     | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       | ●始   |          |    |                 |                              |                               |        | ○       | ○             |
| 関東・東海 | 早○<br>普○ | ○3.5               | ○    | ○3         |            | ○3   | ○始    | ○始   | ●発生<br>期 |    | ○始              | クサネム:発生始<br>～3葉              |                               |        | ○       | ○             |
| 近・中・四 | 早○<br>普○ | ○3.5               | ○    | ○3         |            | ○3   | ○始    | ○始   | ○発生<br>期 |    | ○始              | クサネム:発生始<br>～3葉              |                               |        | ○       | ○             |
| 九州    | 早○<br>普○ | ●3.5               | ●    | ●3         | ●始         | ●3   | ●3    |      | ●発生<br>期 |    | ●始              |                              |                               |        | ●       | ●             |

クロクワイ防除は、クロクワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(東北、関東・東海、近畿・中国・四国)

使用上の注意:(1)(8)(9)(21)(38)(40)(42) 減水深:2cm/日以下

## II-5

モリネットSM-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロクワイ | オモダカ              | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 |                        | 処理時期                          | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|----------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------|------------------------|-------------------------------|--------|---------|---------------|
| 北海道   | ○2.5     | ○                  | ○3   | ○4         |            | ○4   |       |                   |       |    | ○前              |                        | +20～+25(イネ5L以<br>降、ノビエ2.5Lまで) | 100g/a | ○       | ○             |
| 東北    | ○3.5     | ○                  | ○3   | ○4         | ○3         | ○4   |       | ○矢じり<br>葉1～<br>2L |       |    | ○発生<br>期        |                        |                               |        | ○       | ○             |
| 北陸    | ○3.5     | ○                  | ○3   | ○4         | ○3         | ○4   |       | ○矢じり<br>葉1～<br>2L |       |    | ○発生<br>期        |                        |                               |        | ○       | ○             |
| 関東・東海 | 早○<br>普○ | ○3.5               | ○    | ○3         |            | ○3   | ○4    |                   |       |    | ○前              | クサネム:+20～<br>+30(本葉3L) |                               |        | ○       | ○             |
| 近・中・四 | 早○<br>普○ | ○3.5               | ○    | ○3         |            | ○3   | ○4    |                   |       |    | ○前              | クサネム:+20～<br>+30(本葉3L) |                               |        | ○       | ○             |
| 九州    | 早○<br>普○ | ○3.5               | ○    | ○3         |            | ○3   |       |                   |       |    | ○始              |                        |                               |        | ○       | ○             |

使用上の注意:(1)(8)(9)(21)(39) 減水深:2cm/日以下

## II-5

YH-591-1kg 粒

| 地域名                              |  | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期                                            | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |   |
|----------------------------------|--|----------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|-------|----|-----------------|--|-------------------------------------------------|--------|---------|---------------|---|
| 北海道                              |  | ○3       | ○                  | ○2   |            |            | ○2   |       |      |       |    | ○始              |  | +20～+30(イネ5L以<br>降、ノビエ3Lまで)                     | 100g/a |         | ○             |   |
| 東北                               |  | ○3       | ○                  | ○2   |            | ○始         | ○始   |       |      |       |    |                 |  |                                                 |        |         | ○             | ○ |
| 北陸                               |  | ○3       | ○                  | ○2   |            | ○始         | ○2   |       |      |       |    | ○前              |  |                                                 |        |         | ○             | ○ |
| 関東・東海                            |  | 早○<br>普○ | ○3                 | ○    | ○3         | ○3         | ○3   |       |      |       |    | ○始              |  |                                                 |        |         | ○             | ○ |
| 近・中・四                            |  | 早○<br>普○ | ○3*                | ○    | ○3         | ○3         | ○3   |       |      |       |    | ○始              |  | +20～+30(イネ5L以降、<br>ノビエ3Lまで) (*早期は<br>ノビエ2.5Lまで) |        |         |               | ○ |
| 九州                               |  | 早<br>普   |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |                                                 |        |         |               |   |
| 使用上の注意:(1)(8)(9)(21) 減水深:2cm/日以下 |  |          |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |                                                 |        |         |               |   |

## II-6-(1) クログワイ対象

II-6-(1) AC-014A-1kg 粒 「継」

II-6-(1) AVH-002-1kg 粒 「継」

II-6-(1) KPP-2005⑩ フロアフル(少量) 「継」

## II-6-(1)

KUH-958 フロアフル

| 地域名                                                                        | 対象雑草: クログワイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量    |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------|
| 北海道                                                                        |             |                 | 50ml/a |
| 東北                                                                         | ○           | 前               |        |
| 北陸                                                                         |             |                 |        |
| 関東・東海                                                                      | ○           | 前               |        |
| 近・中・四                                                                      |             |                 |        |
| 九州                                                                         |             |                 |        |
| クログワイ防除は、クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(東北、関東・東海)<br>使用上の注意:(42) |             |                 |        |

II-6-(1) KUH-972D フロアフル 「継」

II-6-(1) KUH-972K フロアフル 「継」

II-6-(1) KUH-985 フロアフル 「継」

II-6-(1) KUH-985⑪ フロアフル 「継」

II-6-(1) KUH-986D-0.25kg 粒 「継」

## II-6-(1)

NC-339-1kg 粒

| 地域名                                                              | 対象雑草: クログワイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量    |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------|
| 北海道                                                              |             |                 | 100g/a |
| 東北                                                               | ●           | 前               |        |
| 北陸                                                               |             |                 |        |
| 関東・東海                                                            | ●           | 始               |        |
| 近・中・四                                                            | ●           |                 |        |
| 九州                                                               | ●           |                 |        |
|                                                                  |             |                 |        |
| クログワイ防除は、クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意:(42) |             |                 |        |

II-6-(1) NH-803 フロアフル 「継」

II-6-(1) NH-804 フロアフル 「継」

II-6-(1) SW-002 フロアフル 「継」



## II-6-(2)

NC-339-1kg 粒

| VE-333 1kg 注                                                                |           |                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|
| 地域名                                                                         | 対象雑草：オモダカ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量    |
| 北海道                                                                         | ●         | 前               | 100g/a |
| 東北                                                                          | ●         |                 |        |
| 北陸                                                                          | ●         | 始               |        |
| 関東・東海                                                                       | ●         |                 |        |
| 近・中・四                                                                       | ●         |                 |        |
| 九州                                                                          | ●         |                 |        |
| オモダカ防除は、オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(東北、関東・東海～九州)<br>使用上の注意：(38) |           |                 |        |

II-6-(2) NH-803 フロアフル 「継」

II-6-(2) NH-804 フロアフル 「継」

## II-6-(2)

SW-002 フロアフル

| 地域名         | 対象雑草: オモダカ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量    |
|-------------|------------|-----------------|--------|
| 北海道         | ●          | 前               | 50ml/a |
| 東北          |            |                 |        |
| 北陸          |            |                 |        |
| 関東・東海       |            |                 |        |
| 近・中・四       |            |                 |        |
| 九州          |            |                 |        |
| 使用上の注意:(38) |            |                 |        |

## II-6-(2)

SW-973-1kg 粒

| 地域名         | 対象雑草: オモダカ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量    |
|-------------|------------|-----------------|--------|
| 北海道         | ○          | 始               | 100g/a |
| 東北          | ○          |                 |        |
| 北陸          | ●          |                 |        |
| 関東・東海       | ○          |                 |        |
| 近・中・四       | ○          |                 |        |
| 九州          |            |                 |        |
| 使用上の注意:(38) |            |                 |        |

## II-6-(5) シズイ対象

II-6-(5) KUH-972K フロアフル 「継」

II-6-(5) KUH-985 フロアフル 「継」

## II-6-(5)

NC-390 フロアブル

| 地域名         | 対象雑草: シズイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量    |
|-------------|-----------|-----------------|--------|
| 北海道         |           |                 | 50ml/a |
| 東北          | ●         | 発生始～3cm         |        |
| 北陸          |           |                 |        |
| 関東・東海       |           |                 |        |
| 近・中・四       |           |                 |        |
| 九州          |           |                 |        |
| 使用上の注意:(40) |           |                 |        |

## II-6-(5)

SB-556 フロアブル

| 地域名         | 対象雑草: シズイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量    |
|-------------|-----------|-----------------|--------|
| 北海道         |           |                 | 50ml/a |
| 東北          | ●         | 発生始～3cm         |        |
| 北陸          |           |                 |        |
| 関東・東海       |           |                 |        |
| 近・中・四       |           |                 |        |
| 九州          |           |                 |        |
| 使用上の注意:(40) |           |                 |        |

## II-6-(5)

SW-002 フロアブル

| 地域名         | 対象雑草：シズイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量    |
|-------------|----------|-----------------|--------|
| 北海道         |          |                 | 50ml/a |
| 東北          | ●        | 発生始～3cm         |        |
| 北陸          |          |                 |        |
| 関東・東海       |          |                 |        |
| 近・中・四       |          |                 |        |
| 九州          |          |                 |        |
| 使用上の注意：(40) |          |                 |        |

II-6-(5) SW-991-1kg 粒 「雑」

## II-6-(6) エゾノサヤヌカグサ対象

## II-6-(6)

HSW-001 フロアブル

HSR-001

| 地域名     | 対象雑草：エゾノサヤヌカグサ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量    |
|---------|----------------|-----------------|--------|
| 北海道     | ●              | 2L              | 50ml/a |
| 東北      |                |                 |        |
| 北陸      |                |                 |        |
| 関東・東海   |                |                 |        |
| 近・中・四   |                |                 |        |
| 九州      |                |                 |        |
| 使用上の注意： |                |                 |        |

## II-6-(6)

SW-991-1kg 粒

| 地域名     | 対象雑草：エゾノサヤヌカグサ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量    |
|---------|----------------|-----------------|--------|
| 北海道     | ●              | 2L              | 100g/a |
| 東北      |                |                 |        |
| 北陸      |                |                 |        |
| 関東・東海   |                |                 |        |
| 近・中・四   |                |                 |        |
| 九州      |                |                 |        |
| 使用上の注意： |                |                 |        |

## II-6-(7) クサネム対象

II-6-(7)

KUH-911 液

| 地域名         | 対象雑草：クサネム | 処理時期(対象雑草の生育時期)   | 使用量                  |
|-------------|-----------|-------------------|----------------------|
| 北海道         |           |                   | 2.5～5ml/a(散布液量10L/a) |
| 東北          |           |                   |                      |
| 北陸          |           |                   |                      |
| 関東・東海       | ○         | 草丈40cm以下(+35～+50) |                      |
| 近・中・四       | ○         |                   |                      |
| 九州          |           |                   |                      |
| 使用上の注意：(12) |           |                   |                      |

II-6-(7)

NH-803 フロアフル

| 地域名     | 対象雑草：クサネム | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量    |
|---------|-----------|-----------------|--------|
| 北海道     |           |                 | 50ml/a |
| 東北      | ●         | 発生始             |        |
| 北陸      |           |                 |        |
| 関東・東海   |           |                 |        |
| 近・中・四   |           |                 |        |
| 九州      |           |                 |        |
| 使用上の注意： |           |                 |        |

II-6-(7)

NH-804 フロアフル

| 地域名     | 対象雑草：クサネム | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量    |
|---------|-----------|-----------------|--------|
| 北海道     |           |                 | 50ml/a |
| 東北      |           |                 |        |
| 北陸      |           |                 |        |
| 関東・東海   | ●         | 発生始             |        |
| 近・中・四   |           |                 |        |
| 九州      |           |                 |        |
| 使用上の注意： |           |                 |        |

## Ⅱ-6-(7)

SV-973-1kg 粒

| 地域名     | 対象雑草: クサネム | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量    |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 北海道     |            |                 | 100g/a |
| 東北      |            |                 |        |
| 北陸      |            |                 |        |
| 関東・東海   | ○          | 発生始～3葉          |        |
| 近・中・四   | ●          |                 |        |
| 九州      |            |                 |        |
| 使用上の注意: |            |                 |        |

## Ⅱ-6-(8) コウキヤガラ対象

Ⅱ-6-(8)

SB-528 フロアフル

| 地域名                                           | 対象雑草: コウキヤガラ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量    |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|--------|
| 北海道                                           |              |                 | 50ml/a |
| 東北                                            | ●            | 前               |        |
| 北陸                                            |              |                 |        |
| 関東・東海                                         |              |                 |        |
| 近・中・四                                         |              |                 |        |
| 九州                                            | ○            | 始               |        |
| コウキヤガラ防除はコウキヤガラに有効な一発処理剤との体系で使用する。<br>使用上の注意: |              |                 |        |

Ⅱ-6-(8) SW-002 フロアフル 「継」

Ⅱ-6-(8) TH-913 粒 「継」

## Ⅱ-6-(10) その他

ミズアオイ

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Ⅱ-6-(10) AC-014A-1kg 粒 「継」     | Ⅱ-6-(10) HOK-983 フロアフル 「継」     |
| Ⅱ-6-(10) HSW-001 フロアフル 「継」     | Ⅱ-6-(10) KPP-2008 乳(EW) 「継」    |
| Ⅱ-6-(10) KUH-003K-0.25kg 粒 「継」 | Ⅱ-6-(10) KUH-958 フロアフル(少量) 「継」 |
| Ⅱ-6-(10) KUH-992-0.25kg 粒 「継」  | Ⅱ-6-(10) NH-003-1kg 粒 「継」      |
| Ⅱ-6-(10) NH-803 フロアフル 「継」      | Ⅱ-6-(10) SB-528 フロアフル 「継」      |
| Ⅱ-6-(10) SB-533 フロアフル 「継」      | Ⅱ-6-(10) SB-556 フロアフル 「継」      |
| Ⅱ-6-(10) フタクロール-1kg 粒 「継」      |                                |

イボクサ

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Ⅱ-6-(10) NH-804 フロアフル 「継」 | Ⅱ-6-(10) SB-533 フロアフル 「継」 |
|---------------------------|---------------------------|

## Ⅲ 直播栽培

## Ⅲ

AGH-925-1kg 粒

| 地域名                                                                     | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期             | 使用量    | 砂<br>壤土    | 埴<br>土 |   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|------------------|--------|------------|--------|---|
| 北海道                                                                     | ○3  | ○                  | ○2   |            |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |  | イネ1L～ノビエ3L       | 100g/a |            | ○      |   |
| 東北                                                                      | ○3  | ○                  | ○2   | ○2         |            | ○2   |       |      |          |            |                 |  |                  |        |            |        | ○ |
| 北陸                                                                      | ○3  | ○                  | ○2   |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |                  |        |            |        | ○ |
| 関東・東海                                                                   | ○3  | ○                  | ○2   |            |            | ○2   |       |      |          |            |                 |  | イネ1.5L～ノビエ<br>3L |        |            | ○      |   |
| 近・中・四                                                                   | ○3  | ○                  | ○2   |            |            | ○2   |       |      |          |            |                 |  |                  |        | イネ1L～ノビエ3L |        | ○ |
| 九州                                                                      | ○3  | ○                  | ○2   |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |                  |        |            |        | ○ |
| 湛水直播(北海道, 東北, 北陸, 九州)<br>イネの根が露出する条件では葉害を生ずる。<br>使用上の注意:<br>減水深:2cm/日以下 |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |                  |        |            |        |   |

## Ⅲ

CDS-941 フロアフル

| 地域名                                                    | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>タカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期               | 使用量    | 砂<br>壤土 | 埴土<br>～<br>埴土 |
|--------------------------------------------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|-------|----|-----------------|--|--------------------|--------|---------|---------------|
| 北海道                                                    |      |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  | イネ1.5L～ノビエ<br>2.5L | 50ml/a |         |               |
| 東北                                                     | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○2         |            |      |       |      |       |    |                 |  |                    |        |         | ○             |
| 北陸                                                     |      |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |                    |        |         |               |
| 関東・東海                                                  |      |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |                    |        |         |               |
| 近・中・四                                                  |      |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |                    |        |         |               |
| 九州                                                     |      |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |                    |        |         |               |
| 湛水直播<br>イネの根が露出する条件では葉害を生ずる。<br>使用上の注意：<br>減水深:2cm/日以下 |      |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |                    |        |         |               |

## Ⅲ

CDS-941Ⅰ フロアフル

| 地域名                                                        | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>クカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期               | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |   |
|------------------------------------------------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|-------|----|-----------------|--|--------------------|--------|---------|---------------|---|
| 北海道                                                        |      |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  | イネ1.5L～ノビエ<br>2.5L | 50ml/a |         |               |   |
| 東北                                                         |      |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |                    |        |         |               |   |
| 北陸                                                         | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●始         |      |       |      |       |    |                 |  |                    |        |         | ●             | ● |
| 関東・東海                                                      | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ●2         |      |       |      |       |    |                 |  |                    |        |         |               | ○ |
| 近・中・四                                                      | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         |      |       |      |       |    |                 |  |                    |        |         |               | ○ |
| 九州                                                         |      |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |                    |        |         |               |   |
| 湛水直播(北陸)<br>イネの根が露出する条件では葉害を生ずる。<br>使用上の注意:<br>減水深:2cm/日以下 |      |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |                    |        |         |               |   |

Ⅲ TH-913NCS フロアフル 「継」

## Ⅲ

モリネットSM-1kg 粒

| 地域名                              | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロク'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期                        | 使用量    | 砂<br>壤土 | 埴土<br>～<br>埴土 |
|----------------------------------|------|--------------------|------|------------|--------------|------|--------|------|-------|----|-----------------|--|-----------------------------|--------|---------|---------------|
| 北海道                              |      |                    |      |            |              |      |        |      |       |    |                 |  |                             | 100g/a |         |               |
| 東北                               | ○3.5 | ○                  | ○2   |            |              |      |        |      |       |    |                 |  | イネ5L以降、ノビエ<br>3.5L          |        |         | ○             |
| 北陸                               | ○3   | ○                  | ○2   |            |              |      |        |      |       |    |                 |  | +30～+45(イネ6L以<br>降、ノビエ3Lまで) |        |         | ○             |
| 関東・東海                            | ○3.5 | ○                  | ○3   |            |              |      |        |      |       |    |                 |  | イネ5L～ノビエ<br>3.5L            |        |         | ○             |
| 近・中・四                            | ○3.5 | ○                  | ○始   |            |              |      |        |      |       |    |                 |  |                             |        |         | ○             |
| 九州                               |      |                    |      |            |              |      |        |      |       |    |                 |  |                             |        |         |               |
| 湛水直播(北陸, 近畿・中国・四国)               |      |                    |      |            |              |      |        |      |       |    |                 |  |                             |        |         |               |
| 使用上の注意:(1)(8)(9)(21) 減水深:2cm/日以下 |      |                    |      |            |              |      |        |      |       |    |                 |  |                             |        |         |               |

## Ⅲ

SW-973-1kg 粒

| 地域名                                 | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズカヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期             | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------------------------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|-------|----|-----------------|--|------------------|--------|---------|---------------|
| 北海道                                 |      |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |                  | 50ml/a |         |               |
| 東北                                  | ●3   | ●                  | ●2   |            |            |      |       |      |       |    |                 |  | イネ5L～ノビエ3L       |        |         | ●             |
| 北陸                                  | ●3.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         |      |       |      |       |    |                 |  | イネ5L～ノビエ<br>3.5L |        |         | ●             |
| 関東・東海                               |      |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |                  |        |         |               |
| 近・中・四                               |      |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |                  |        |         |               |
| 九州                                  |      |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |                  |        |         |               |
| 使用上の注意:(1)(8)(9)(21)<br>減水深:2cm/日以下 |      |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |                  |        |         |               |

## Ⅲ

KUH-931-1kg 粒

| 地域名                  | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロク'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期             | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|----------------------|-----|--------------------|------|------------|--------------|------|--------|------|----------|------------|-----------------|--|------------------|--------|---------|---------------|
| 北海道                  |     |                    |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |  |                  | 100g/a |         |               |
| 東北                   | ○3  | ○                  | ○2   | ○2         | ○2           | ○2   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |  | イネ1.5L～ノビエ<br>3L |        |         | ○             |
| 北陸                   |     |                    |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |  |                  |        |         |               |
| 関東・東海                |     |                    |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |  |                  |        |         |               |
| 近・中・四                |     |                    |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |  |                  |        |         |               |
| 九州                   |     |                    |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |  |                  |        |         |               |
| イネの根が露出する条件では葉害を生ずる。 |     |                    |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |  |                  |        |         |               |
| 使用上の注意：減水深：2cm/日以下   |     |                    |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |  |                  |        |         |               |

## Ⅲ 不耕起直播栽培

## Ⅲ不耕起直播

## WOC-01 液

| 地域名                      | 対象雑草名   | 処理時期         | 使用量(散布液量)           | 適用土壌 |
|--------------------------|---------|--------------|---------------------|------|
| 北海道                      |         |              |                     |      |
| 東北                       | ○ 一年生雑草 | 播種前10日～イネ出芽前 | 25～50ml/a(散布液量5L/a) | 全土壌  |
| 北陸                       |         |              |                     |      |
| 関東・東海                    | ○ 一年生雑草 | 播種前30日～イネ出芽前 | 25～50ml/a(散布液量5L/a) | 全土壌  |
| 近・中・四                    | ○       |              |                     |      |
| 九州                       | ●       |              |                     |      |
| 乾田条件で使用する<br>使用上の注意:(25) |         |              |                     |      |

## Ⅲ不耕起直播

## フタクロール 乳

| 地域名                                                                           | 対象雑草名   | 処理時期              | 使用量(散布液量)                 | 適用土壌  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|-------|
| 北海道                                                                           |         |                   |                           |       |
| 東北                                                                            |         |                   |                           |       |
| 北陸                                                                            |         |                   |                           |       |
| 関東・東海                                                                         | ● 一年生雑草 | 播種直後～イネ出芽前(雑草発生前) | 100～150ml/a(散布液量5～7.5L/a) | 壤土～埴土 |
| 近・中・四                                                                         | ●       |                   |                           |       |
| 九州                                                                            | ●       |                   |                           |       |
| 乾田条件で使用する。(関東・東海～九州)<br>出芽直前から出芽揃期までに湿润状態が続くと苗立不良の恐れがある。(関東・東海～九州)<br>使用上の注意: |         |                   |                           |       |

## Ⅳ 畦畔雑草

## 刈取代用

## Ⅳ

## AK-01 液

| 地域名             | 対象雑草名        | 処理時期            | 使用量(散布液量)                                            | 適用土壌 |
|-----------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------|------|
| 北海道             | ○ 全草種(スサを除外) | 雑草生育期(草丈30cm以下) | 一年生雑草:25～50ml/a<br>多年生雑草:50～100ml/a<br>(散布液量5～10L/a) | 全土壌  |
| 東北              | ○            |                 |                                                      |      |
| 北陸              | ○            |                 |                                                      |      |
| 関東・東海           | ○            |                 |                                                      |      |
| 近・中・四           | ○            |                 |                                                      |      |
| 九州              | ○            |                 |                                                      |      |
| 使用上の注意:(23)(24) |              |                 |                                                      |      |

## IV

## NH-007 フロアブル

NH-00770777

| 地域名             |   | 対象雑草名       | 処理時期            | 使用量(散布液量)            | 適用土壌 |
|-----------------|---|-------------|-----------------|----------------------|------|
| 北海道             | ● | 全草種(スギナを除く) | 雑草生育期(草丈30cm以下) | 40～60ml/a(散布液量10L/a) | 全土壌  |
| 東北              | ● |             |                 |                      |      |
| 北陸              | ● |             |                 |                      |      |
| 関東・東海           | ● |             |                 |                      |      |
| 近・中・四           | ● |             |                 |                      |      |
| 九州              | ● |             |                 |                      |      |
| 使用上の注意:(23)(24) |   |             |                 |                      |      |

## IV

## SUM-99 フロアブル

SUM-99 70777L

| 地域名             |   | 対象雑草名       | 処理時期            | 使用量(散布液量)            | 適用土壌 |
|-----------------|---|-------------|-----------------|----------------------|------|
| 北海道             | ● | 全草種(スギナを除く) | 雑草生育期(草丈30cm以下) | 40～60ml/a(散布液量10L/a) | 全土壌  |
| 東北              | ● |             |                 |                      |      |
| 北陸              | ● |             |                 |                      |      |
| 関東・東海           | ● |             |                 |                      |      |
| 近・中・四           | ● |             |                 |                      |      |
| 九州              | ● |             |                 |                      |      |
| 使用上の注意:(23)(24) |   |             |                 |                      |      |

## IV

## YF-65① 液

| 地域名             |   | 対象雑草名 | 処理時期            | 使用量(散布液量)                                            | 適用土壌 |
|-----------------|---|-------|-----------------|------------------------------------------------------|------|
| 北海道             | ○ | 全草種   | 雑草生育期(草丈30cm以下) | 一年生雑草:60～100ml/a<br>多年生雑草:100～200ml/a<br>(散布液量10L/a) | 全土壌  |
| 東北              | ○ |       |                 |                                                      |      |
| 北陸              | ● |       |                 |                                                      |      |
| 関東・東海           | ○ |       |                 |                                                      |      |
| 近・中・四           | ○ |       |                 |                                                      |      |
| 九州              | ● |       |                 |                                                      |      |
| 使用上の注意:(23)(24) |   |       |                 |                                                      |      |

IV ZK-122 液 「雑」

IV MON-001 液 「雑」

刈取軽減

IV

SW-995 フロアブル

| 地域名             |   | 対象雑草名                      | 処理時期                    | 使用量(散布液量)            | 適用土壌 |
|-----------------|---|----------------------------|-------------------------|----------------------|------|
| 北海道             | ○ | 全草種(スサキを除く多年生雑草主体の群落で使用する) | 雑草生育期又は刈取後再生期(草丈20cm以下) | 40～80ml/a(散布液量10L/a) | 全土壌  |
| 東北              | ○ |                            |                         |                      |      |
| 北陸              | ○ |                            |                         |                      |      |
| 関東・東海           | ○ |                            |                         |                      |      |
| 近・中・四           | ○ |                            |                         |                      |      |
| 九州              | ○ |                            |                         |                      |      |
| 年1回使用(近畿・中国・四国) |   |                            |                         |                      |      |
| 使用上の注意:(24)     |   |                            |                         |                      |      |

## V 耕起前

V

NH-007 フロアブル

| 地域名          |   | 対象雑草名 | 処理時期                | 使用量(散布液量)            | 適用土壌 |
|--------------|---|-------|---------------------|----------------------|------|
| 北海道          | ● | 全草種   | 耕起前30～10日(草丈30cm以下) | 40～60ml/a(散布液量10L/a) | 全土壌  |
| 東北           | ● |       |                     |                      |      |
| 北陸           | ● |       |                     |                      |      |
| 関東・東海        | ● |       |                     |                      |      |
| 近・中・四        | ● |       |                     |                      |      |
| 九州           | ● |       |                     |                      |      |
| 使用上の注意: (25) |   |       |                     |                      |      |

V ZK-122 液 「雑」

## VI 休耕田

VI

Nri-501 フロアブル

| 地域名         |   | 対象雑草名       | 処理時期            | 使用量(散布液量)                                   | 適用土壌 |
|-------------|---|-------------|-----------------|---------------------------------------------|------|
| 北海道         | ● | 全草種(スサキを除く) | 雑草生育期(草丈50cm以下) | 50～100ml/a(散布液量10L/a)<br>(多年生雑草は75～100ml/a) | 全土壌  |
| 東北          | ● |             |                 |                                             |      |
| 北陸          | ● |             |                 |                                             |      |
| 関東・東海       | ● |             |                 |                                             |      |
| 近・中・四       | ● |             |                 |                                             |      |
| 九州          | ● |             |                 |                                             |      |
| 使用上の注意:(25) |   |             |                 |                                             |      |

VI ZK-122 液 「雑」

VI MON-001 液 「雑」

VI ASH-001 CE 「雑」

## VII-1 初期一発処理剤

## VII-1

AGH-975 フロアブル

| 地域名                      |        | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモダ'カ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期       | 使用量    | 砂<br>壤土 | 埴<br>土 |
|--------------------------|--------|------|-------------------|------|------------|-------------|------|--------|-------|-------|----|-----------------|--|------------|--------|---------|--------|
| 北海道                      |        | ○1.5 | ○                 | ○始   |            |             | ○2   |        |       |       |    |                 |  | +0～ノビエ1.5L | 50ml/a | ○       | ○      |
| 東北                       |        | ○1.5 | ○                 | ○2   | ○始         | ○始          | ○始   |        |       |       |    |                 |  |            |        | ○       | ○      |
| 北陸                       |        | ○1.5 | ○                 | ○2   | ○始         | ○始          | ○始   |        |       |       |    |                 |  |            |        | ●       | ○      |
| 関東・東海                    | 早<br>普 | ○1.5 | ○                 | ○始   |            | ○始          | ○始   |        |       |       |    |                 |  |            |        | ○       | ○      |
| 近・中・四                    | 早<br>普 | ○1.5 | ○                 | ○始   |            | ○始          | ○始   |        |       |       |    |                 |  |            |        |         | ○      |
| 九州                       | 早<br>普 | ○1.5 | ○                 | ○始   |            | ○始          | ○始   |        |       |       |    |                 |  |            |        | ○       | ○      |
| 田植同時散布可能(東北、北陸、関東・東海～九州) |        |      |                   |      |            |             |      |        |       |       |    |                 |  |            |        |         |        |
| 使用上の注意:(34) 減水深:2cm/日以下  |        |      |                   |      |            |             |      |        |       |       |    |                 |  |            |        |         |        |

## VII-1

AVH-002-1kg 粒

| 地域名                |        | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモタ'カ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期       | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|--------------------|--------|------|--------------------|------|------------|-------------|------|--------|-------|----------|------------|-----------------|--|------------|--------|---------|---------------|
| 北海道                |        | ●1.5 | ●                  | ●始   | ●始         |             | ●始   |        |       | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  | +3～ノビエ1.5L | 100g/a |         | ●             |
| 東北                 |        | ●1.5 | ●                  | ●始   | ●始         | ●始          | ●始   |        |       | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  |            |        |         | ●             |
| 北陸                 |        |      |                    |      |            |             |      |        |       |          |            |                 |  |            |        |         |               |
| 関東・東海              | 早<br>普 |      |                    |      |            |             |      |        |       |          |            |                 |  |            |        |         |               |
| 近・中・四              | 早<br>普 |      |                    |      |            |             |      |        |       |          |            |                 |  |            |        |         |               |
| 九州                 | 早<br>普 |      |                    |      |            |             |      |        |       |          |            |                 |  |            |        |         |               |
| 使用上の注意：減水深:2cm/日以下 |        |      |                    |      |            |             |      |        |       |          |            |                 |  |            |        |         |               |

## VII-1

HSW-001 フロアブル

| 地域名         |        | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>タカ | ミス'カヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモタ'カ | ヒルムシロ    | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 |                  | 処理時期     | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>へ<br>埴土 |  |
|-------------|--------|-----|--------------------|------|------------|-------------|------|--------|-------|----------|----|-----------------|------------------|----------|--------|---------|---------------|--|
| 北海道         |        | ●2  | ●                  | ●始   | ●始         |             | ●始   |        |       | ●発生<br>期 |    | ●前              | エゾノサキスガク<br>サ:2L | +0～ノビエ2L | 50ml/a | ●       | ●             |  |
| 東北          |        |     |                    |      |            |             |      |        |       |          |    |                 |                  |          |        |         |               |  |
| 北陸          |        |     |                    |      |            |             |      |        |       |          |    |                 |                  |          |        |         |               |  |
| 関東・東海       | 早<br>普 |     |                    |      |            |             |      |        |       |          |    |                 |                  |          |        |         |               |  |
| 近・中・四       | 早<br>普 |     |                    |      |            |             |      |        |       |          |    |                 |                  |          |        |         |               |  |
| 九州          | 早<br>普 |     |                    |      |            |             |      |        |       |          |    |                 |                  |          |        |         |               |  |
| 使用上の注意:     |        |     |                    |      |            |             |      |        |       |          |    |                 |                  |          |        |         |               |  |
| 減水深:2cm/日以下 |        |     |                    |      |            |             |      |        |       |          |    |                 |                  |          |        |         |               |  |

VII-1 Mon-923-1kg 粒 「継」

VII-1 Mon-923①-1kg 粒 「継」

## VII-1

MY-100MS フロアブル

| 地域名                       |        | ノビエ       | 一年生<br>広葉・<br>マツバイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガイ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期       | 使用量    | 砂<br>壤<br>土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|---------------------------|--------|-----------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|-------|----|-----------------|--|------------|--------|-------------|---------------|
| 北海道                       |        | ●1.5      | ●                  | ●始   | ●始         |            | ●始   |       |      |       |    |                 |  | +0～ノビエ1.5L | 50ml/a |             | ●             |
| 東北                        |        | ●1.5      | ●                  | ●始   | ●始         | ●始         | ●始   |       |      |       |    |                 |  |            |        |             | ●             |
| 北陸                        |        | ●1.5      | ●                  | ●始   |            | ●始         | ●始   |       |      |       |    |                 |  |            |        |             | ●             |
| 関東・東海                     | 早<br>普 | ●<br>○1.5 | ○                  | ○始   |            | ○始         | ●始   |       |      |       |    |                 |  |            |        |             | ○             |
|                           | 早<br>普 | ○1.5      | ○                  | ○始   |            | ○始         | ○始   |       |      |       |    |                 |  |            |        |             | ○             |
| 九州                        |        | 早<br>普    | ●<br>○1.5          | ○    | ○始         |            | ○始   | ○始    |      |       |    |                 |  |            |        |             | ○             |
| 田植同時散布可能(近畿・中国・四国・九州)     |        |           |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |            |        |             |               |
| 使用上の注意: (34) 減水深: 2cm/日以下 |        |           |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |            |        |             |               |

## VII-1

NBA-076a-1kg 粒

| 地域名                                                                                                                      | ノビエ    | 一年生<br>広葉・<br>マツバイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズカヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |                 | 処理時期     | 使用量    | 砂<br>壤<br>土 | 壤土<br>～<br>埴土 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|-----------------|----------|--------|-------------|---------------|--|
| 北海道                                                                                                                      | ○2     | ○                  | ○2   |            |            | ○2   |       | ○前   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | エノノサヤスガ<br>サ:2L | +0～ノビエ2L | 100g/a | ○           | ○             |  |
| 東北                                                                                                                       | ○2     | ○                  | ○2   | ○2         | ○2         | ○始   | ○前    | ○始   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | シズイ:発生始<br>～3cm |          |        | ○           | ○             |  |
| 北陸                                                                                                                       |        |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                 |          |        |             |               |  |
| 関東・東海                                                                                                                    | 早<br>普 |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                 |          |        |             |               |  |
|                                                                                                                          |        |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                 |          |        |             |               |  |
| 近・中・四                                                                                                                    | 早<br>普 |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                 |          |        |             |               |  |
| 九州                                                                                                                       | 早<br>普 |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                 |          |        |             |               |  |
| 田植同時散布可能<br>クログワイ防除は、クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(東北)<br>オモダカ防除は、オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(東北) |        |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                 |          |        |             |               |  |
| 使用上の注意:(38)(42) 減水深:2cm/日以下                                                                                              |        |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                 |          |        |             |               |  |

## VII-1

NBA-076b-1kg 粒

| 地域名                                                                                                                                                                         | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツバイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズカヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期     | 使用量    | 砂<br>壤<br>土 | 埴<br>土<br>～<br>埴<br>土 |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|----------|--------|-------------|-----------------------|---|
| 北海道                                                                                                                                                                         |          |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  | +0～ノビエ2L | 100g/a |             |                       |   |
| 東北                                                                                                                                                                          |          |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          |        |             |                       |   |
| 北陸                                                                                                                                                                          | ○2       | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      |          | ○再生<br>前～始 |                 |  |          |        |             | ○                     | ○ |
| 関東・東海                                                                                                                                                                       | 早○<br>普○ | ○2                 | ○    | ○2         |            | ○2   | ○始    | ○始   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  |          |        |             | ○                     | ○ |
| 近・中・四                                                                                                                                                                       | 早○<br>普○ | ○2                 | ○    | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  |          |        |             | ○                     | ○ |
| 九州                                                                                                                                                                          | 早○<br>普○ | ○2                 | ○    | ○2         |            | ○2   | ○始    | ○始   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  |          |        |             | ○                     | ○ |
| 田植同時散布可能<br>クログワイ防除は、クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(関東・東海、九州)<br>オモダカ防除は、オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(関東・東海、九州)<br>使用上の注意:(28)(34)(38)(42) 減水深:2cm/日以下 |          |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          |        |             |                       |   |

## VII-1

NBA-096a フロアブル

| 地域名                                                                                                                                                                    | ノビエ    | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |                  | 処理時期     | 使用量    | 砂<br>壤<br>土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------------|----------|--------|-------------|---------------|
| 北海道                                                                                                                                                                    | ○2     | ○                  | ○2   |            |            | ○2   |       | ○前   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | エゾノサヤスカク<br>サ:2L | +0～ノビエ2L | 50ml/a | ○           | ○             |
| 東北                                                                                                                                                                     | ○2     | ○                  | ○2   | ○2         | ○始         | ○始   | ○前    | ○前   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | シズイ:発生始<br>～3cm  |          |        | ○           | ○             |
| 北陸                                                                                                                                                                     |        |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                  |          |        |             |               |
| 関東・東海                                                                                                                                                                  | 早<br>普 |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                  |          |        |             |               |
| 近・中・四                                                                                                                                                                  | 早<br>普 |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                  |          |        |             |               |
| 九州                                                                                                                                                                     | 早<br>普 |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                  |          |        |             |               |
| 水口処理可能(東北) 田植同時散布可能<br>クログワイ防除は、クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(東北)<br>オモダカ防除は、オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(東北)<br>使用上の注意:(38)(40)(42) 減水深:2cm/日以下 |        |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                  |          |        |             |               |

## VII-1

NBA-096b フロアブル

| 地域名                                                                                                                                                                                              | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期     | 使用量    | 砂<br>壤<br>土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|----------|--------|-------------|---------------|
| 北海道                                                                                                                                                                                              |          |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          | 50ml/a |             |               |
| 東北                                                                                                                                                                                               |          |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          |        |             |               |
| 北陸                                                                                                                                                                                               | ○2       | ○                  | ○2   |            | ○始         | ○始   |       |      |          | ○再生<br>前～始 | ○前              |  | +0～ノビエ2L |        | ○           | ○             |
| 関東・東海                                                                                                                                                                                            | 早○<br>普○ | ○2                 | ○    | ○始         | ○2         | ○始   | ○始    | ○始   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  |          |        | ○           | ○             |
| 近・中・四                                                                                                                                                                                            | 早○<br>普○ | ○2                 | ○    | ○2         | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  |          |        | ○           | ○             |
| 九州                                                                                                                                                                                               | 早○<br>普○ | ○2                 | ○    | ○2         | ○2         | ○2   | ○始    | ○始   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  |          |        | ○           | ○             |
| 水口処理可能(北陸) 田植同時散布可能(関東・東海～九州)<br>クログワイ防除は、クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(関東・東海,九州)<br>オモダカ防除は、オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(関東・東海,九州)<br>使用上の注意:(28)(34)(38)(42) 減水深:2cm/日以下 |          |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          |        |             |               |

VII-1 NBA-131a-1kg 粒 「継」

VII-1 NBA-131b-1kg 粒 「継」

## VII-1

NC-385SB 顆粒水和

| 地域名                 | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期     | 使用量                      | 砂<br>壤<br>土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|---------------------|----------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|----------|--------------------------|-------------|---------------|
| 北海道                 | ●2       | ●                  | ●2   | ●始         |            | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  | +0～ノビエ2L | 8g/a(散<br>布液量<br>50ml/a) |             | ●             |
| 東北                  | ●2       | ●                  | ●2   | ●始         | ●始         | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  |          |                          |             | ●             |
| 北陸                  |          |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          |                          |             |               |
| 関東・東海               | 早●<br>普● | ●2                 | ●    | ●2         | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  | +0～ノビエ2L |                          |             | ●             |
| 近・中・四               | 早<br>普   |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          |                          |             |               |
| 九州                  | 早<br>普   |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          |                          |             |               |
| 使用上の注意: 減水深:2cm/日以下 |          |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          |                          |             |               |

## VII-1

PSS④D-1kg 粒

| 地域名                               |          | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガギ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期 | 使用量                    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |   |
|-----------------------------------|----------|----------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|------|------------------------|---------|---------------|---|
| 北海道                               |          |          |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |      | 100g/a<br><br>+0～ノビエ2L |         |               |   |
| 東北                                |          | ○2       | ○                  | ○2   | ○始         | ○始         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 |            | ○前              |  |      |                        |         | ○             | ○ |
| 北陸                                |          | ○2       | ○                  | ○2   |            | ○始         | ○始   |       |      |          |            | ○前              |  |      |                        |         | ○             | ○ |
| 関東・東海                             | 早○<br>普○ | ○2       | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 |            | ○前              |  |      |                        |         | ○             | ○ |
| 近・中・四                             | 早○<br>普○ | ○2       | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  |      |                        |         | ○             | ○ |
| 九州                                |          | 早○<br>普○ | ○2                 | ○    | ○2         |            | ○2   | ○2    |      | ○発生<br>期 |            | ○前              |  |      |                        | ○       | ○             |   |
| 田植同時散布可能(東北、関東・東海)                |          |          |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |      |                        |         |               |   |
| 使用上の注意:(3)(28)(34)<br>減水深:2cm/日以下 |          |          |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |      |                        |         |               |   |

## VII-1

SB-533 フロアフル

| 地域名                         | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期       | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-----------------------------|----------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|----|-----------------|--|------------|--------|---------|---------------|
| 北海道                         | ○1.5     | ○                 | ○始   | ○始         |            |      |       |      | ●発生<br>期 |    |                 |  | +0～ノビエ1.5L | 50ml/a | ○       | ○             |
| 東北                          | ○1.5     | ○                 | ○始   |            | ○始         |      |       |      | ●発生<br>期 |    |                 |  |            |        | ○       | ○             |
| 北陸                          | ○1.5     | ○                 | ○始   |            | ○始         |      |       |      | ●発生<br>期 |    |                 |  |            |        | ○       | ○             |
| 関東・東海                       | 早○<br>普○ | ○1.5              | ○    | ○始         |            | ○始   |       |      | ●発生<br>期 |    |                 |  |            |        | ○       | ○             |
| 近・中・四                       | 早○<br>普○ | ○1.5              | ○    | ○始         |            | ○始   |       |      | ●発生<br>期 |    |                 |  |            |        | ○       | ○             |
| 九州                          | 早○<br>普○ | ○1.5              | ○    | ○2         | ○前         | ●始   |       |      | ●発生<br>期 |    |                 |  |            |        | ○       | ○             |
| 区として 田植同時散布可能(東北、関東・東海)     |          |                   |      |            |            |      |       |      |          |    |                 |  |            |        |         |               |
| 使用上の注意:(34)(41) 減水深:2cm/日以下 |          |                   |      |            |            |      |       |      |          |    |                 |  |            |        |         |               |

## VII-1

HOK-983 フロアフル

| 地域名                 | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期     | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|---------------------|----------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|-------|----|-----------------|--|----------|--------|---------|---------------|
| 北海道                 | ○2       | ○                 | ○始   | ○始         |            |      |       |      |       |    | ○前              |  | +0～ノビエ2L | 50ml/a | ○       | ○             |
| 東北                  |          |                   |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |          |        |         |               |
| 北陸                  |          |                   |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |          |        |         |               |
| 関東・東海               | 早○<br>普○ |                   |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |          |        |         |               |
| 近・中・四               | 早○<br>普○ |                   |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |          |        |         |               |
| 九州                  | 早○<br>普○ |                   |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |          |        |         |               |
| 区として                |          |                   |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |          |        |         |               |
| 使用上の注意: 減水深:2cm/日以下 |          |                   |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |          |        |         |               |

## VII-1

HSW-941-1kg 粒

| 地域名                 | ノビエ    | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 |                 | 処理時期     | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>塩土 |
|---------------------|--------|-------------------|------|------------|-------------|------|--------|------|----------|----|-----------------|-----------------|----------|--------|---------|---------------|
| 北海道                 | ○2     | ○                 | ○2   | ○2         |             | ○2   |        |      | ○発生<br>期 |    | ○前              | エゾノササカガ<br>サ:2L | +0～ノビエ2L | 100g/a | ○       | ○             |
| 東北                  |        |                   |      |            |             |      |        |      |          |    |                 |                 |          |        |         |               |
| 北陸                  |        |                   |      |            |             |      |        |      |          |    |                 |                 |          |        |         |               |
| 関東・東海               | 早<br>普 |                   |      |            |             |      |        |      |          |    |                 |                 |          |        |         |               |
| 近・中・四               | 早<br>普 |                   |      |            |             |      |        |      |          |    |                 |                 |          |        |         |               |
| 九州                  | 早<br>普 |                   |      |            |             |      |        |      |          |    |                 |                 |          |        |         |               |
| 田圃同時散布可能            |        |                   |      |            |             |      |        |      |          |    |                 |                 |          |        |         |               |
| 使用上の注意: 減水深:2cm/日以下 |        |                   |      |            |             |      |        |      |          |    |                 |                 |          |        |         |               |

## VII-2 初・中期一発処理剤

## VII-2

CH-906Q-1kg 粒

| 地域名                                                                                                                   | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |                | 処理時期       | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>塩土 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------|------------|-------------|------|--------|------|----------|------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|---------------|
| 北海道                                                                                                                   |          |                   |      |            |             |      |        |      |          |            |                 |                |            | 100g/a |         |               |
| 東北                                                                                                                    |          |                   |      |            |             |      |        |      |          |            |                 |                |            |        |         |               |
| 北陸                                                                                                                    | ○2.5     | ○                 | ○2   |            | ○2          | ○2   |        | ○前   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                | +5～ノビエ2.5L |        | ○       | ○             |
| 関東・東海                                                                                                                 | 早○<br>普○ | ○2.5              | ○    | ○2         | ○2          | ○2   | ○始     | ○始   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                |            |        | ○       | ○             |
| 近・中・四                                                                                                                 | 早○<br>普○ | ○2.5              | ○    | ○2         | ○2          | ○2   |        | ○前   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                |            |        | ○       | ○             |
| 九州                                                                                                                    | 早○<br>普○ | ○2.5              | ○    | ○2         | ○2          | ○2   | ○始     | ○始   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | コウキヤガラ:発<br>生始 |            |        | ○       | ○             |
| クログワイ防除は、クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(関東・東海、九州)<br>オモダカ防除は、オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(北陸～九州) |          |                   |      |            |             |      |        |      |          |            |                 |                |            |        |         |               |
| 使用上の注意:(34)(36)(38)(41)(42) 減水深:2cm/日以下                                                                               |          |                   |      |            |             |      |        |      |          |            |                 |                |            |        |         |               |

## VII-2

DHN-971 フロアフル

| 地域名                                                               | ノビエ    | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |                 | 処理時期       | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>塩土 |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------|------------|-------------|------|--------|------|----------|------------|-----------------|-----------------|------------|--------|---------|---------------|
| 北海道                                                               | ○2.5   | ○                 | ○2   |            |             | ○2   |        | ●前   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | エゾノササカガ<br>サ:2L | +0～ノビエ2.5L | 50ml/a | ○       | ○             |
| 東北                                                                | ○2.5   | ○                 | ○2   | ○2         | ○2          | ○2   |        | ●始   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                 |            |        | ○       | ○             |
| 北陸                                                                |        |                   |      |            |             |      |        |      |          |            |                 |                 |            |        |         |               |
| 関東・東海                                                             | 早<br>普 |                   |      |            |             |      |        |      |          |            |                 |                 |            |        |         |               |
| 近・中・四                                                             | 早<br>普 |                   |      |            |             |      |        |      |          |            |                 |                 |            |        |         |               |
| 九州                                                                | 早<br>普 |                   |      |            |             |      |        |      |          |            |                 |                 |            |        |         |               |
| 水口処理可能(東北)<br>オモダカ防除は、オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(東北) |        |                   |      |            |             |      |        |      |          |            |                 |                 |            |        |         |               |
| 使用上の注意:(38) 減水深:2cm/日以下                                           |        |                   |      |            |             |      |        |      |          |            |                 |                 |            |        |         |               |

Ⅶ-2

HJ-943-1kg 粒

| 地域名                                                                                                                      | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズカヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |            | 処理時期   | 使用量 | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|--------|-----|---------|---------------|
| 北海道                                                                                                                      | ○2.5     | ○                  | ○2   | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +5～ノビエ2.5L | 100g/a |     | ○       |               |
| 東北                                                                                                                       | ○2.5     | ○                  | ○2   | ●始         | ○2         | ○2   | ○前    | ○前   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |        | ●   | ○       |               |
| 北陸                                                                                                                       | ○2.5     | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       | ○前   |          | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |        |     | ○       |               |
| 関東・東海                                                                                                                    | 早○<br>普○ | ○2.5               | ○    | ○2         |            | ○2   | ○始    | ○始   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |        |     | ○       | ○             |
| 近・中・四                                                                                                                    | 早○<br>普○ | ○2.5               | ○    | ○2         |            | ○2   | ○始    | ○始   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |        |     | ○       | ○             |
| 九州                                                                                                                       | 早○<br>普○ | ○2.5               | ○    | ○2         |            | ○2   | ○始    | ○始   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |        |     | ○       | ○             |
| クログワイ防除は、クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(東北・関東・東海～九州)<br>オモダカ防除は、オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(東北～九州) |          |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |        |     |         |               |
| 使用上の注意: (28)(34)(38)(42) 減水深: 2cm/日以下                                                                                    |          |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |        |     |         |               |

Ⅶ-2

KUH-004D-1kg 粒

| 地域名                            | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期     | 使用量    | 砂<br>壤土 | 埴土<br>～<br>埴土 |   |
|--------------------------------|----------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|----------|--------|---------|---------------|---|
| 北海道                            |          |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  | +5～ノビエ3L | 100g/a |         |               |   |
| 東北                             |          |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          |        |         |               |   |
| 北陸                             | ●3       | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      |          | ●再生<br>前～始 |                 |  |          |        |         |               | ● |
| 関東・東海                          | 早●<br>普● | ●3                 | ●    | ●2         |            | ●2   | ●2    |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  |          |        |         |               | ● |
| 近・中・四                          | 早●<br>普● | ●3                 | ●    | ●2         |            | ●2   | ●2    |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  |          |        |         |               | ● |
| 九州                             | 早●<br>普● | ●3                 | ●    | ●2         |            | ●2   | ●2    |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  |          |        | ●       | ●             |   |
| 使用上の注意: (28) (34) 減水深: 2cm/日以下 |          |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          |        |         |               |   |

Ⅶ-2

KUH-004K-1kg 粒

| 地域名                |        | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツバイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>タカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期     | 使用量    | 砂<br>壤土 | 埴土<br>～<br>埴土 |   |
|--------------------|--------|-----|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|----------|--------|---------|---------------|---|
| 北海道                |        | ●3  | ●                  | ●2   | ●2         |            | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  | +5～ノビエ3L | 100g/a |         | ●             |   |
| 東北                 |        | ●3  | ●                  | ●2   | ●始         | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  |          |        |         |               | ● |
| 北陸                 |        |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          |        |         |               |   |
| 関東・東海              | 早<br>普 |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          |        |         |               |   |
| 近・中・四              | 早<br>普 |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          |        |         |               |   |
| 九州                 |        |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          |        |         |               |   |
| 使用上の注意：減水深：2cm/日以下 |        |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          |        |         |               |   |

Ⅶ-2 KUH-011D-1kg 粒 「継」

Ⅶ-2 KUH-011K-1kg 粒 「継」

## VII-2

KUH-972D フロアブル

| ※(中)・(注)・(注)・(注)            |  |          |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          |        |         |               |   |   |
|-----------------------------|--|----------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|----------|--------|---------|---------------|---|---|
| 地域名                         |  | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>タカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期     | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |   |   |
| 北海道                         |  |          |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  | +0～ノビエ3L | 50ml/a |         |               |   |   |
| 東北                          |  |          |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          |        |         |               |   |   |
| 北陸                          |  | ○3       | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      |          | ●再生<br>前～始 |                 |  |          |        |         |               | ○ | ○ |
| 関東・東海                       |  | 早○<br>普○ | ○3                 | ○    | ○2         |            | ○2   | ○2    |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  |          |        |         |               | ○ | ○ |
| 近・中・四                       |  | 早○<br>普○ | ○3                 | ○    | ○2         |            | ○2   | ○2    |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  |          |        |         | ○             | ○ |   |
| 九州                          |  | 早○<br>普○ | ○3                 | ○    | ○2         |            | ○2   | ○2    |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  |          |        |         | ○             | ○ |   |
| 田植同時散布可能(近畿・中国・四国)          |  |          |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          |        |         |               |   |   |
| 使用上の注意:(28)(34) 減水深:2cm/日以下 |  |          |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          |        |         |               |   |   |

## VII-2

KUH-972K フロアブル

| KCH-912K 7.07.17   |  |        |                    |      |            |            |      |       |      |          |            | 処理時期            | 使用量 | 砂<br>壤土  | 壤土<br>～<br>埴土 |  |   |   |
|--------------------|--|--------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|-----|----------|---------------|--|---|---|
| 地域名                |  | ノビエ    | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |     |          |               |  |   |   |
| 北海道                |  | ○3     | ○                  | ○2   |            |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |     | +5～ノビエ3L | 50ml/a        |  | ○ |   |
| 東北                 |  | ○3     | ○                  | ○2   | ○2         | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |     |          |               |  | ○ | ○ |
| 北陸                 |  |        |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |     |          |               |  |   |   |
| 関東・東海              |  | 早<br>普 |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |     |          |               |  |   |   |
| 近・中・四              |  | 早<br>普 |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |     |          |               |  |   |   |
| 九州                 |  | 早<br>普 |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |     |          |               |  |   |   |
| 使用上の注意：減水深:2cm/日以下 |  |        |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |     |          |               |  |   |   |

## VII-2

KUH-985 フロアブル

| 地域名                 |        |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            | 処理時期            | 使用量      | 砂<br>壤土 | 埴土<br>～<br>埴土 |               |
|---------------------|--------|-----|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|----------|---------|---------------|---------------|
| 地域名                 |        | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期     | 使用量     | 砂<br>壤土       | 埴土<br>～<br>埴土 |
| 北海道                 |        | ○3  | ○                  | ○2   | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +5～ノビエ3L | 50ml/a  | ○             | ○             |
| 東北                  |        | ○3  | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ●前              |          |         | ○             | ○             |
| 北陸                  |        |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |         |               |               |
| 関東・東海               | 早<br>普 |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |         |               |               |
| 近・中・四               | 早<br>普 |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |         |               |               |
| 九州                  | 早<br>普 |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |         |               |               |
| 使用上の注意: 減水深:2cm/日以下 |        |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |         |               |               |

Ⅶ-2

KUH-985① フロアブル

| 地域名             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期     | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>植土 |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--------------------|------|------------|-------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|----------|--------|---------|---------------|
| 北海道             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                    |      |            |             |      |       |      |          |            |                 |          | 50ml/a |         |               |
| 東北              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                    |      |            |             |      |       |      |          |            |                 |          |        |         |               |
| 北陸              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○3       | ○                  | ○2   |            | ○2          | ○2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 | +5～ノビエ3L |        | ●       | ○             |
| 関東・東海           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 早○<br>普○ | ○3                 | ○    | ○2         |             | ○2   | ○2    |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |          |        | ○       | ○             |
| 近・中・四           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 早●<br>普○ | ○3                 | ○    | ○2         |             | ○2   | ○2    |      | ●発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ●前              |          |        | ○       | ○             |
| 九州              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 早○<br>普○ | ○3                 | ○    | ○2         |             | ○2   | ○2    |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |          | ○      | ○       |               |
| 使用上の注意:(28)(34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                    |      |            |             |      |       |      |          |            |                 |          |        |         |               |
| 減水深:2cm/日以下     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                    |      |            |             |      |       |      |          |            |                 |          |        |         |               |

Ⅶ-2

MY-100DC① フロアブル

| 地域名                         |  | ノビエ    | 一年生<br>広葉・<br>マツバイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |                   | 処理時期                                 | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>植土 |
|-----------------------------|--|--------|--------------------|------|------------|-------------|------|--------|------|----------|------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|--------|---------|---------------|
| 北海道                         |  | ○2.5   | ○                  | ○2   | ○始         |             | ○始   |        | ●前   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | エゾ'ノサヤスカグ<br>サ:2L | +0～ノ'ビエ2.5L                          | 50ml/a | ○       | ○             |
| 東北                          |  | ○2.5   | ○                  | ○2   | ○始         | ○2          | ○始   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | シズイ:発生始<br>～3cm   | +0～ノ'ビエ2.5L(砂<br>壤土は+5～ノ'ビエ<br>2.5L) |        | ●       | ○             |
| 北陸                          |  |        |                    |      |            |             |      |        |      |          |            |                 |                   |                                      |        |         |               |
| 関東・東海                       |  | 早<br>普 |                    |      |            |             |      |        |      |          |            |                 |                   |                                      |        |         |               |
| 近・中・四                       |  | 早<br>普 |                    |      |            |             |      |        |      |          |            |                 |                   |                                      |        |         |               |
| 九州                          |  | 早<br>普 |                    |      |            |             |      |        |      |          |            |                 |                   |                                      |        |         |               |
| 水口処理可能(東北)                  |  |        |                    |      |            |             |      |        |      |          |            |                 |                   |                                      |        |         |               |
| 使用上の注意:(38)(40) 減水深:2cm/日以下 |  |        |                    |      |            |             |      |        |      |          |            |                 |                   |                                      |        |         |               |

Ⅶ-2

MY-100DC① フロアブル

| 地域名                                 | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズガイ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ      | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |               | 処理時期                               | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>植土 |   |
|-------------------------------------|----------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|------------|------------|-----------------|---------------|------------------------------------|--------|---------|---------------|---|
| 北海道                                 |          |                    |      |            |            |      |       |      |            |            |                 |               | +0～ノビエ2.5L(砂<br>壤土は+5～ノビエ<br>2.5L) | 50ml/a |         |               |   |
| 東北                                  |          |                    |      |            |            |      |       |      |            |            |                 |               |                                    |        |         |               |   |
| 北陸                                  | ○2.5     | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      |            |            |                 |               |                                    |        |         | ●             | ○ |
| 関東・東海                               | 早○<br>普○ | ○2.5               | ○    | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期～始 | ○再生<br>前～始 | ○前              |               |                                    |        |         | ○             | ○ |
| 近・中・四                               | 早○<br>普○ | ○2.5               | ○    | ○2         |            | ○2   | ○2    |      | ○発生<br>期～始 | ○再生<br>前～始 | ○前              |               |                                    |        | ○       | ○             |   |
| 九州                                  | 早○<br>普○ | ○2.5               | ○    | ○2         | ○前         | ○2   | ○2    |      | ○発生<br>期～始 | ○再生<br>前～始 | ○前              | コキヤガラ:発<br>生始 |                                    |        | ○       | ○             |   |
| 使用上の注意:(28)(34)(36)(41) 減水深:2cm/日以下 |          |                    |      |            |            |      |       |      |            |            |                 |               |                                    |        |         |               |   |

## VII-2

MY-100DC-1kg 粒 (H12まで HOK-204-1kg 粒)

| 地域名                 | ノビエ    | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>タカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモタカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|---------------------|--------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|--------|---------|---------------|
| 北海道                 | ●2.5   | ●                  | ●2   | ●始         |            | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | +5～ノビエ2.5L | 100g/a | ●       | ●             |
| 東北                  | ●2.5   | ●                  | ●2   | ●始         | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |        | ●       | ●             |
| 北陸                  |        |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |        |         |               |
| 関東・東海               | 早<br>普 |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |        |         |               |
| 近・中・四               | 早<br>普 |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |        |         |               |
| 九州                  | 早<br>普 |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |        |         |               |
| 使用上の注意: 減水深:2cm/日以下 |        |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |        |         |               |

## VII-2

MY-100DC①-1kg 粒 (H12まで HOK-205-1kg 粒)

| 地域名                         | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>タカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモタカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-----------------------------|----------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|--------|---------|---------------|
| 北海道                         |          |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            | 100g/a |         |               |
| 東北                          |          |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |        |         |               |
| 北陸                          | ●2.5     | ●                  | ●2   |            | ●始         | ●始   |       |      |          | ●再生<br>前～始 |                 | +5～ノビエ2.5L |        |         | ●             |
| 関東・東海                       | 早●<br>普● | ●2.5               | ●    | ●2         | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |        | ●       | ●             |
| 近・中・四                       | 早●<br>普○ | ○2.5               | ○    | ○2         | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |        |         | ○             |
| 九州                          | 早●<br>普● | ●2.5               | ●    | ●2         | ●前         | ●2   | ●2    |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |        | ●       | ●             |
| 使用上の注意:(28)(34) 減水深:2cm/日以下 |          |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |        |         |               |

## VII-2

MY-100N 顆粒水和 (H8まで RYH-110 顆粒水和)

| 地域名                          | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>タカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモタカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量                                                        | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|------------------------------|----------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 北海道                          | ○2.5     | ○                  | ○2   |            |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +0～ノビエ2.5L | 4g/a(散<br>布液量25<br>～<br>50ml/a)<br>(北陸は<br>散布液量<br>50ml/a) |         | ○             |
| 東北                           | ○2.5     | ○                  | ○2   | ○始         | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |            |                                                            | ○       | ○             |
| 北陸                           | ○2.5     | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      |          | ○再生<br>前～始 |                 |            |                                                            |         | ○             |
| 関東・東海                        | 早○<br>普○ | ○2.5               | ○    | ○2         | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |            |                                                            | ○       | ○             |
| 近・中・四                        | 早○<br>普○ | ○2.5               | ○    | ○2         | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |                                                            | ○       | ○             |
| 九州                           | 早○<br>普○ | ○2.5               | ○    | ○2         | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |                                                            | ○       | ○             |
| 田植同時散布可能(北海道、関東・東海、近畿・中国・四国) |          |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |                                                            |         |               |
| 使用上の注意:(28)(34) 減水深:2cm/日以下  |          |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |                                                            |         |               |

Ⅶ-2

MY-100NC 顆粒水和

| 地域名                         | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>タカ | ミス'ガ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期       | 使用量                      | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |   |
|-----------------------------|----------|-------------------|------|------------|--------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|------------|--------------------------|---------|---------------|---|
| 北海道                         | ○2.5     | ○                 | ○2   | ○始         |              | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  | +5～ノビエ2.5L | 8g/a(散<br>布液量<br>50ml/a) |         | ○             |   |
| 東北                          | ○2.5     | ○                 | ○2   | ○始         | ○2           | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  |            |                          |         | ●             | ○ |
| 北陸                          | ●2.5     | ●                 | ●2   |            | ●2           | ●2   |       |      |          | ●再生<br>前～始 | ●前              |  |            |                          |         |               | ● |
| 関東・東海                       | 早○<br>普○ | ○2.5              | ○    | ○2         |              | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  |            |                          |         | ●             | ○ |
| 近・中・四                       | 早●<br>普○ | ○2.5              | ○    | ○2         |              | ○2   |       |      | ●発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  |            |                          |         | ●             | ○ |
| 九州                          | 早●<br>普○ | ○2.5              | ○    | ○2         | ●前           | ○2   | ○2    |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |  |            |                          |         | ○             | ○ |
| 使用上の注意:(28)(34) 減水深:2cm/日以下 |          |                   |      |            |              |      |       |      |          |            |                 |  |            |                          |         |               |   |

Ⅶ-2

MY-100NC-1kg 粒

| 地域名                         | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>タカ | ミス'ガ'<br>ツリ | ウリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期       | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |   |
|-----------------------------|----------|--------------------|------|------------|-------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|------------|--------|---------|---------------|---|
| 北海道                         | ○2.5     | ○                  | ○2   | ○始         |             | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  | +5～ノビエ2.5L | 100g/a | ●       | ○             |   |
| 東北                          | ○2.5     | ○                  | ○2   | ○始         | ○2          | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  |            |        |         | ○             |   |
| 北陸                          | ●2.5     | ●                  | ●2   |            | ●2          | ●2   |       |      |          |            |                 |  |            |        |         | ●             |   |
| 関東・東海                       | 早●<br>普○ | ○2.5               | ○    | ○2         | ○2          | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ●前              |  |            |        |         | ●             | ○ |
|                             | 近・中・四    | 早●<br>普○           | ○2.5 | ○          | ○2          | ○2   | ○2    |      | ●発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  |            |        |         | ●             | ○ |
| 九州                          | 早●<br>普● | ●2.5               | ●    | ●2         | ●前          | ●2   | ●2    |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  |            |        | ●       |               |   |
| 使用上の注意:(28)(34) 減水深:2cm/日以下 |          |                    |      |            |             |      |       |      |          |            |                 |  |            |        |         |               |   |

Ⅶ-2

MY-100NDC-1kg 粒

| 地域名                         | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>タカ | ミツガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモタカ | ヒルムシロ      | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期     | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-----------------------------|----------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|------------|------------|-----------------|--|----------|--------|---------|---------------|
| 北海道                         | ○3       | ○                  | ○2   | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期   | ○再生<br>前～始 | ○前              |  | +5～ノビエ3L | 100g/a | ●       | ○             |
| 東北                          | ○3       | ○                  | ○2   | ○2         | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期   | ○再生<br>前～始 | ○前              |  |          |        | ●       | ○             |
| 北陸                          | ○3       | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○再生<br>前～始 | ○前         |                 |  |          |        | ●       | ○             |
| 関東・東海                       | 早●<br>普○ | ○3                 | ○    | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期   | ○再生<br>前～始 | ●前              |  |          |        | ●       | ○             |
| 近・中・四                       | 早●<br>普○ | ○3                 | ○    | ○2         |            | ○2   |       |      | ●発生<br>期   | ○再生<br>前～始 | ○前              |  |          |        | ●       | ○             |
| 九州                          | 早●<br>普○ | ○3                 | ○    | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期   | ○再生<br>前～始 |                 |  |          |        | ○       | ○             |
| 使用上の注意:(28)(34) 減水深:2cm/日以下 |          |                    |      |            |            |      |       |      |            |            |                 |  |          |        |         |               |

## VII-2

MY-100TSC フロアフル

| 地域名                 | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロゲワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>塩土 |
|---------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|--------|---------|---------------|
| 北海道                 | ●2.5 | ●                  | ●2   | ●2         |            | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | +0～ノビエ2.5L | 50ml/a |         | ●             |
| 東北                  | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●始         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |        |         | ●             |
| 北陸                  | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●始         | ●始   |       |      |          | ●再生<br>前～始 |                 |            |        |         | ●             |
| 関東・東海               | 早普●  | ●2.5               | ●    | ●2         | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |        |         | ●             |
| 近・中・四               | 早普   |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |        |         |               |
| 九州                  | 早普   |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |        |         |               |
| 使用上の注意: 減水深:2cm/日以下 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |        |         |               |

## VII-2

NBA-071-1kg 粒

| 地域名                         | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロゲワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>塩土 |
|-----------------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|--------|---------|---------------|
| 北海道                         | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +5～ノビエ2.5L | 100g/a |         | ○             |
| 東北                          | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○2         | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |        | ●       | ○             |
| 北陸                          | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      |          | ○再生<br>前～始 | ●前              |            |        | ●       | ○             |
| 関東・東海                       | 早普○  | ○2.5               | ○    | ○2         | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |        | ○       | ○             |
| 近・中・四                       | 早普○  | ○2.5               | ○    | ○2         | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |        | ○       | ○             |
| 九州                          | 早普○  | ○2.5               | ○    | ○2         | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |        | ○       | ○             |
| 使用上の注意:(28)(34) 減水深:2cm/日以下 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |        |         |               |

VII-2 NBA-071DEH-1kg 粒 「継」

## VII-2

NBA-073-1kg 粒

| 地域名                         | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロゲワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>塩土 |
|-----------------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|--------|---------|---------------|
| 北海道                         | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +5～ノビエ2.5L | 100g/a |         | ○             |
| 東北                          | ○2.5 | ○                  | ○2   | ●始         | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |            |        | ○       | ○             |
| 北陸                          | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ●発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ●前              |            |        | ●       | ○             |
| 関東・東海                       | 早普○  | ○2.5               | ○    | ○2         | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |        | ○       | ○             |
| 近・中・四                       | 早普○  | ○2.5               | ○    | ○2         | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |        | ○       | ○             |
| 九州                          | 早普○  | ○2.5               | ○    | ○2         | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |        | ○       | ○             |
| 使用上の注意:(28)(34) 減水深:2cm/日以下 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |        |         |               |

## VII-2

NBA-941S-1kg 粒

| 地域名                    |        | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガ'<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期     | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>塩土 |  |  |  |
|------------------------|--------|-----|--------------------|------|------------|-------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|----------|--------|---------|---------------|--|--|--|
| 北海道                    |        | ○3  | ○                  | ○2   | ○2         |             | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  | +5～ノビエ3L | 100g/a | ●       | ○             |  |  |  |
| 東北                     |        | ○3  | ○                  | ○2   | ○始         | ○2          | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  |          |        |         |               |  |  |  |
| 北陸                     |        |     |                    |      |            |             |      |       |      |          |            |                 |  |          |        |         |               |  |  |  |
| 関東・東海                  | 早<br>普 |     |                    |      |            |             |      |       |      |          |            |                 |  |          |        |         |               |  |  |  |
| 近・中・四                  | 早<br>普 |     |                    |      |            |             |      |       |      |          |            |                 |  |          |        |         |               |  |  |  |
| 九州                     | 早<br>普 |     |                    |      |            |             |      |       |      |          |            |                 |  |          |        |         |               |  |  |  |
| 使用上の注意：<br>減水深：2cm/日以下 |        |     |                    |      |            |             |      |       |      |          |            |                 |  |          |        |         |               |  |  |  |

## VII-2

NC-339 顆粒水和

| 地域名                                 |          | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ      | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |                  | 処理時期       | 使用量                                                    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>塩土 |
|-------------------------------------|----------|----------|--------------------|------|------------|--------------|------|-------|------|------------|------------|-----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 北海道                                 |          | ○2.5     | ○                  | ○2   | ○2         |              |      |       | ○前   | ○発生<br>期   | ○再生<br>前～始 | ○前              | エゾノサヤスカグ<br>サ:2L | +5～ノビエ2.5L | 4g/a(散布液量25<br>～<br>50ml/a)<br>(北陸は<br>散布液量<br>50ml/a) | ○       | ○             |
| 東北                                  |          | ○2.5     | ○                  | ○2   | ○2         | ○2           | ○2   |       |      | ○発生<br>期   | ○再生<br>前～始 |                 | シズイ:発生始<br>～3cm  |            |                                                        |         |               |
| 北陸                                  |          | ○2.5     | ○                  | ○2   | ○2         | ○2           | ○2   |       |      | ○再生<br>前～始 | ○前         |                 |                  |            |                                                        |         |               |
| 関東・東海                               | 早○<br>普○ | ○2.5     | ○                  | ○2   |            | ○2           | ○2   |       |      | ○発生<br>期   | ○再生<br>前～始 | ○前              |                  |            |                                                        |         |               |
|                                     | 早○<br>普○ | ○2.5     | ○                  | ○2   |            | ○2           | ○2   |       |      | ○発生<br>期   | ○再生<br>前～始 | ○前              |                  |            |                                                        |         |               |
| 九州                                  |          | 早○<br>普○ | ○2.5               | ○    | ○2         |              | ○2   |       |      | ○発生<br>期   | ○再生<br>前～始 | ○前              |                  |            | ○                                                      | ○       |               |
| 使用上の注意:(28)(34)(38)(40) 減水深:2cm/日以下 |          |          |                    |      |            |              |      |       |      |            |            |                 |                  |            |                                                        |         |               |

## VII-2

NC-339-1kg 粒

| 地域名                                                                                                               | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>タカ | ミス'ガ'<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |                 | 処理時期       | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>塩土 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------|------------|-------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|-----------------|------------|--------|---------|---------------|---|
| 北海道                                                                                                               | ○2.5     | ○                  | ○2   | ○2         |             | ○2   |       | ●前   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                 | +5～ノビエ2.5L | 100g/a |         | ○             |   |
| 東北                                                                                                                | ○2.5     | ○                  | ○2   |            | ○2          | ○2   | ●前    | ●前   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | シズイ:発生始<br>～3cm |            |        |         | ○             |   |
| 北陸                                                                                                                | ○2.5     | ○                  | ○2   |            | ○2          | ○2   |       | ●始   | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |                 |            |        |         | ○             |   |
| 関東・東海                                                                                                             | 早○<br>普○ | ○2.5               | ○    | ○2         | ○2          | ○2   | ●始    | ●始   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                 |            |        |         | ○             | ○ |
| 近・中・四                                                                                                             | 早○<br>普○ | ○2.5               | ○    | ○2         | ○2          | ○2   | ●始    | ●始   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                 |            |        |         | ○             | ○ |
| 九州                                                                                                                | 早○<br>普○ | ○2.5               | ○    | ○2         | ○2          | ○2   | ●始    | ●始   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                 |            |        |         | ○             | ○ |
| クログワイ防除は、クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>オモダカ防除は、オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(東北、関東・東海～九州) |          |                    |      |            |             |      |       |      |          |            |                 |                 |            |        |         |               |   |
| 使用上の注意:(28)(34)(38)(40)(42) 減水深:2cm/日以下                                                                           |          |                    |      |            |             |      |       |      |          |            |                 |                 |            |        |         |               |   |

## VII-2

## NC-385 顆粒水和

| 地域名             |         |      |   |    |    |    |    |  |  |          |            | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツバイ | ホタルイ       | ヘラオモ<br>ダカ                      | ミス'ガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ       | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期 | 使用量 | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>塩土 |
|-----------------|---------|------|---|----|----|----|----|--|--|----------|------------|-----|--------------------|------------|---------------------------------|-------------|------|-------------|------|-------|----|-----------------|--|------|-----|---------|---------------|
| 北海道             |         | ○2.5 | ○ | ○2 | ○2 |    | ○2 |  |  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前  |                    | +5～ノビエ2.5L | 6g/a(散<br>布液量25<br>～<br>50ml/a) | ○           | ○    |             |      |       |    |                 |  |      |     |         |               |
| 東北              |         | ○2.5 | ○ | ○2 | ○2 | ○2 | ○2 |  |  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前  |                    |            |                                 | ○           | ○    |             |      |       |    |                 |  |      |     |         |               |
| 北陸              |         | ○2.5 | ○ | ○2 | ○始 | ○2 | ○2 |  |  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |     |                    |            |                                 | ●           | ○    |             |      |       |    |                 |  |      |     |         |               |
| 関東・東海           | 早<br>普○ | ○2.5 | ○ | ○2 |    | ○2 | ○2 |  |  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前  |                    |            |                                 | ○           | ○    |             |      |       |    |                 |  |      |     |         |               |
| 近・中・四           | 早<br>普○ | ○2.5 | ○ | ○2 |    | ○2 | ○2 |  |  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前  |                    |            |                                 | ○           | ○    |             |      |       |    |                 |  |      |     |         |               |
| 九州              | 早<br>普○ | ○2.5 | ○ | ○2 |    | ○2 | ○2 |  |  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前  |                    |            |                                 | ○           | ○    |             |      |       |    |                 |  |      |     |         |               |
| 使用上の注意:(28)(34) |         |      |   |    |    |    |    |  |  |          |            |     |                    |            |                                 |             |      | 減水深:2cm/日以下 |      |       |    |                 |  |      |     |         |               |

## VII-2

## NC-390 フロアブル

| 地域名                                |  | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツバイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |                 | 処理時期     | 使用量    | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>塩土 |   |
|------------------------------------|--|----------|--------------------|------|------------|-------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|-----------------|----------|--------|---------|---------------|---|
| 北海道                                |  | ○3       | ○                  | ○2   |            |             | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                 | +5～ノビエ3L | 50ml/a | ○       | ○             |   |
| 東北                                 |  | ○3       | ○                  | ○2   | ●始         | ○2          | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | シズイ:発生始<br>～3cm |          |        | ○       | ○             |   |
| 北陸                                 |  | ○3       | ○                  | ○2   |            | ○2          | ○2   |       |      |          | ○再生<br>前～始 | ○前              |                 |          |        |         | ○             |   |
| 関東・東海                              |  | 早●<br>普○ | ○3                 | ○    | ○2         |             | ○2   | ○2    |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                 |          |        |         | ○             |   |
| 近・中・四                              |  | 早○<br>普○ | ○3                 | ○    | ○2         |             | ○2   | ○2    |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                 |          |        |         | ○             | ○ |
| 九州                                 |  | 早●<br>普○ | ○3                 | ○    | ○2         |             | ○2   | ○2    |      |          | ○再生<br>前～始 | ○前              |                 |          |        |         | ●             | ○ |
| 使用上の注意:(34)(40)(41)<br>減水深:2cm/日以下 |  |          |                    |      |            |             |      |       |      |          |            |                 |                 |          |        |         |               |   |

## VII-2

## NH-003-1kg 粒

| JST 005 1kg 粒          |  |        |                    |      |             |             |      |       |       |          |            |                 |  |            |        |         |               |   |
|------------------------|--|--------|--------------------|------|-------------|-------------|------|-------|-------|----------|------------|-----------------|--|------------|--------|---------|---------------|---|
| 地域名                    |  | ノビエ    | 一年生<br>広葉・<br>マツバイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダ'カ | ミス'ガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダ'カ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期       | 使用量    | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>塩土 |   |
| 北海道                    |  | ●2.5   | ●                  | ●2   | ●始          |             | ●2   |       |       | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  | +5～ノビエ2.5L | 100g/a |         | ●             |   |
| 東北                     |  | ●2.5   | ●                  | ●2   |             | ●始          | ●始   |       |       | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  |            |        |         |               | ● |
| 北陸                     |  |        |                    |      |             |             |      |       |       |          |            |                 |  |            |        |         |               |   |
| 関東・東海                  |  | 早<br>普 |                    |      |             |             |      |       |       |          |            |                 |  |            |        |         |               |   |
| 近・中・四                  |  | 早<br>普 |                    |      |             |             |      |       |       |          |            |                 |  |            |        |         |               |   |
| 九州                     |  | 早<br>普 |                    |      |             |             |      |       |       |          |            |                 |  |            |        |         |               |   |
| 使用上の注意：<br>減水深：2cm/日以下 |  |        |                    |      |             |             |      |       |       |          |            |                 |  |            |        |         |               |   |

## VII-2

NH-004-1kg 粒

| 地域名                         |        | ノビエ    | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>へ<br>増土 |  |   |
|-----------------------------|--------|--------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|--------|---------|---------------|--|---|
| 北海道                         |        |        |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 | +5～ノビエ2.5L | 100g/a |         |               |  |   |
| 東北                          |        |        |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |        |         |               |  |   |
| 北陸                          |        | ●2.5   | ●                  | ●2   |            | ●始         | ●始   |       |      |          |            |                 |            |        |         |               |  | ● |
| 関東・東海                       | 早<br>普 | ●2.5   | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 |            |        |         |               |  | ● |
|                             | 早<br>普 | ●2.5   | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |        |         |               |  | ● |
| 九州                          |        | 早<br>普 | ●2.5               | ●    | ●2         |            | ●2   | ●2    |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |        |         |               |  | ● |
| 使用上の注意:(28)(34) 減水深:2cm/日以下 |        |        |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |        |         |               |  |   |

## VII-2

NH-803 フロアブル

| 地域名                 |        | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスカギ<br>ツリ | ウリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |          | 処理時期       | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>へ<br>増土 |  |
|---------------------|--------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|----------|------------|--------|---------|---------------|--|
| 北海道                 |        | ○2.5 | ○                  | ○2   | ●始         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |          | +5～ノビエ2.5L | 50ml/a | ○       | ○             |  |
| 東北                  |        | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○2         | ○2         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | クサネム:発生始 |            |        | ○       | ○             |  |
| 北陸                  |        |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |            |        |         |               |  |
| 関東・東海               | 早<br>普 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |            |        |         |               |  |
| 近・中・四               | 早<br>普 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |            |        |         |               |  |
| 九州                  | 早<br>普 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |            |        |         |               |  |
| 水口処理可能(東北)          |        |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |            |        |         |               |  |
| 使用上の注意: 減水深:2cm/日以下 |        |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |            |        |         |               |  |

## VII-2

NH-804 フロアブル

| 地域名                         | ノビエ      |      | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |          | 処理時期       | 使用量    | 砂<br>壤土 | 増土<br>へ<br>増土 |   |   |
|-----------------------------|----------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|----------|------------|--------|---------|---------------|---|---|
| 北海道                         |          |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          | +5～ノビエ2.5L | 50ml/a |         |               |   |   |
| 東北                          |          |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |            |        |         |               |   |   |
| 北陸                          | ○2.5     | ○    | ○2                 |      | ○2         | ○2         |      |       |      |          | ●再生<br>前～始 | ○前              |          |            |        |         |               | ○ |   |
| 関東・東海                       | 早○<br>普○ | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○2         | ○2         |      |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | クサネム;発生始 |            |        |         |               | ● | ○ |
| 近・中・四                       | 早○<br>普○ | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○2         | ○2         |      |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |          |            |        |         |               | ● | ○ |
| 九州                          | 早○<br>普○ | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○2         | ○2         |      |       |      | ○発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ○前              |          |            |        | ○       | ○             |   |   |
| 使用上の注意:(28)(34) 減水深:2cm/日以下 |          |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |            |        |         |               |   |   |

## VII-2

## NOJ-101-1kg 粒

| 図107 1kg 種                      |  |          |                    |      |            |              |      |        |      |          |            | 処理時期 | 使用量      | 砂<br>壤土 | 埴土<br>～<br>埴土 |                 |
|---------------------------------|--|----------|--------------------|------|------------|--------------|------|--------|------|----------|------------|------|----------|---------|---------------|-----------------|
| 地域名                             |  | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>グカ | ミス'カ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモグカ | ヒルムシロ    | セリ         |      |          |         |               | 藻類・<br>表層<br>剥離 |
| 北海道                             |  | ○3       | ○                  | ○2   |            |              | ○2   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前   | +5～ノビエ3L | 100g/a  | ○             | ○               |
| 東北                              |  | ○3       | ○                  | ○2   | ○2         | ○2           | ○2   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前   |          |         | ○             | ○               |
| 北陸                              |  | ○3       | ○                  | ○2   |            | ○2           | ○2   |        |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |      |          |         |               | ○               |
| 関東・東海                           |  | 早○<br>普○ | ○3                 | ○    | ○2         | ○2           | ○2   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前   |          |         | ○             | ○               |
| 近・中・四                           |  | 早●<br>普○ | ○3                 | ○    | ○2         | ○2           | ○2   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前   |          |         | ○             | ○               |
| 九州                              |  | 早○<br>普○ | ○3                 | ○    | ○2         | ○2           | ○2   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前   |          |         | ○             | ○               |
| 使用上の注意:(28)(34)(41) 減水深:2cm/日以下 |  |          |                    |      |            |              |      |        |      |          |            |      |          |         |               |                 |

## VII-2

## NOJ-102 顆粒水和

| 表 10: 緑化率       |          |                    |      |            |              |      |        |      |          |            |                 | 処理時期        | 使用量<br>10g/a(散布液量<br>50ml/a) | 砂<br>壤土 | 埴土<br>～<br>埴土 |
|-----------------|----------|--------------------|------|------------|--------------|------|--------|------|----------|------------|-----------------|-------------|------------------------------|---------|---------------|
| 地域名             | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>タカ | ミス'カ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモタカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |             |                              |         |               |
| 北海道             | ○3       | ○                  | ○2   | ●2         |              | ○2   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |             |                              |         |               |
| 東北              | ○3       | ○                  | ○2   | ○2         | ○2           | ○2   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ●前              |             |                              |         |               |
| 北陸              | ○3       | ○                  | ○2   |            | ○2           | ○2   |        |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ○前              |             |                              |         |               |
| 関東・東海           | 早○<br>普○ | ○3                 | ○    | ○2         |              | ○2   | ○2     |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |             |                              |         |               |
| 近・中・四           | 早●<br>普○ | ○3                 | ○    | ○2         |              | ○2   | ○2     |      | ●発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |             |                              |         |               |
| 九州              | 早●<br>普○ | ○3                 | ○    | ○2         |              | ○2   | ○2     |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |             |                              |         |               |
| 使用上の注意:(28)(34) |          |                    |      |            |              |      |        |      |          |            |                 | 減水深:2cm/日以下 |                              |         |               |

## VII-2

## NOJ-103-1kg 粒

| 地域名         |        |    |   |    |    |    |    |  |  |          |            | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ   | ヘラオモ<br>グカ | ミス'カ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモグカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期 | 使用量 | 砂<br>壤土 | 壤土<br>へ<br>埴土 |
|-------------|--------|----|---|----|----|----|----|--|--|----------|------------|-----|--------------------|--------|------------|--------------|------|--------|------|-------|----|-----------------|------|-----|---------|---------------|
| 北海道         |        | ○3 | ○ | ○2 |    |    | ○2 |  |  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前  | +5～ノビエ3L           | 100g/a |            |              | ○    | ○      |      |       |    |                 |      |     |         |               |
| 東北          |        | ○3 | ○ | ○2 | ○2 | ○2 |    |  |  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前  |                    |        |            |              |      | ○      | ○    |       |    |                 |      |     |         |               |
| 北陸          |        |    |   |    |    |    |    |  |  |          |            |     |                    |        |            |              |      |        |      |       |    |                 |      |     |         |               |
| 関東・東海       | 早<br>普 |    |   |    |    |    |    |  |  |          |            |     |                    |        |            |              |      |        |      |       |    |                 |      |     |         |               |
|             |        |    |   |    |    |    |    |  |  |          |            |     |                    |        |            |              |      |        |      |       |    |                 |      |     |         |               |
| 近・中・四       | 早<br>普 |    |   |    |    |    |    |  |  |          |            |     |                    |        |            |              |      |        |      |       |    |                 |      |     |         |               |
| 九州          | 早<br>普 |    |   |    |    |    |    |  |  |          |            |     |                    |        |            |              |      |        |      |       |    |                 |      |     |         |               |
| 使用上の注意:     |        |    |   |    |    |    |    |  |  |          |            |     |                    |        |            |              |      |        |      |       |    |                 |      |     |         |               |
| 減水深:2cm/日以下 |        |    |   |    |    |    |    |  |  |          |            |     |                    |        |            |              |      |        |      |       |    |                 |      |     |         |               |

Ⅶ-2

NOJ-104-1kg 粒

| 地域名                         | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダ'カ | ミス'カ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモダ'カ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期     | 使用量    | 砂<br>壌土 | 埴土<br>～<br>埴土 |   |
|-----------------------------|----------|--------------------|------|-------------|--------------|------|--------|-------|----------|------------|-----------------|----------|--------|---------|---------------|---|
| 北海道                         |          |                    |      |             |              |      |        |       |          |            |                 |          | 100g/a |         |               |   |
| 東北                          |          |                    |      |             |              |      |        |       |          |            |                 |          |        |         |               |   |
| 北陸                          | ○3       | ○                  | ○2   |             | ○2           | ○2   |        |       | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 | +5～ノビエ3L |        |         | ○             |   |
| 関東・東海                       | 早○<br>普○ | ○3                 | ○    | ○2          |              | ○2   |        |       | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |          |        |         | ○             | ○ |
| 近・中・四                       | 早●<br>普○ | ○3                 | ○    | ○2          |              | ○2   |        |       | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |          |        |         | ○             | ○ |
| 九州                          | 早○<br>普○ | ○3                 | ○    | ○2          | ○2           | ○2   |        |       | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |          |        | ○       | ○             |   |
| 使用上の注意:(28)(34) 減水深:2cm/日以下 |          |                    |      |             |              |      |        |       |          |            |                 |          |        |         |               |   |

Ⅶ-2 NSK-546 フロアフル 「継」

Ⅶ-2

SB-556 フロアフル

| 地域名                             | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダ'カ | ミス'カ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモダ'カ | ヒルムシロ    | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離   | 処理時期       | 使用量    | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|---------------------------------|----------|--------------------|------|-------------|--------------|------|--------|-------|----------|----|-------------------|------------|--------|---------|---------------|
| 北海道                             | ○2.5     | ○                  | ○2   | ●2          |              | ○2   |        |       | ●発生<br>期 |    | エゾ'ノサヤスカ'<br>サ:2L | +0～ノビエ2.5L | 50ml/a | ○       | ○             |
| 東北                              | ○2.5     | ○                  | ○2   | ●始          | ○2           | ○始   |        |       | ●発生<br>期 |    | シズ'イ:発生始<br>～3cm  |            |        | ○       | ○             |
| 北陸                              | ○2.5     | ○                  | ○2   |             | ○始           | ○始   |        |       | ●発生<br>期 |    |                   |            |        | ○       | ○             |
| 関東・東海                           | 早○<br>普○ | ○2.5               | ○    | ○2          |              | ○2   | ○2     |       |          |    |                   |            |        | ○       | ○             |
| 近・中・四                           | 早○<br>普○ | ○2.5               | ○    | ○2          |              | ○2   | ○2     |       |          |    |                   |            |        | ○       | ○             |
| 九州                              | 早○<br>普○ | ○2.5               | ○    | ○2          | ●前           | ○2   | ○2     |       | ●発生<br>期 |    |                   |            |        | ○       | ○             |
| 水口処理可能(北海道～北陸, 九州)              |          |                    |      |             |              |      |        |       |          |    |                   |            |        |         |               |
| 使用上の注意:(28)(34)(40) 減水深:2cm/日以下 |          |                    |      |             |              |      |        |       |          |    |                   |            |        |         |               |

Ⅶ-2

SW-002 フロアフル

| 地域名                        |        | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マフハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダ'カ | ミス'カ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモダ'カ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |                  | 処理時期       | 使用量    | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |  |
|----------------------------|--------|------|--------------------|------|-------------|--------------|------|--------|-------|----------|------------|-----------------|------------------|------------|--------|---------|---------------|--|
| 北海道                        |        | ○2.5 | ○                  | ○2   | ●始          |              | ○2   |        | ●前    | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | エゾノサヤスカガ<br>サ:2L | +3～ノビエ2.5L | 50ml/a | ●       | ○             |  |
| 東北                         |        | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○始          | ○2           | ○2   |        |       | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | シズイ:発生始<br>～3cm  |            |        | ●       | ○             |  |
| 北陸                         |        |      |                    |      |             |              |      |        |       |          |            |                 |                  |            |        |         |               |  |
| 関東・東海                      | 早<br>普 |      |                    |      |             |              |      |        |       |          |            |                 |                  |            |        |         |               |  |
| 近・中・四                      | 早<br>普 |      |                    |      |             |              |      |        |       |          |            |                 |                  |            |        |         |               |  |
| 九州                         | 早<br>普 |      |                    |      |             |              |      |        |       |          |            |                 |                  |            |        |         |               |  |
| 水口処理可能                     |        |      |                    |      |             |              |      |        |       |          |            |                 |                  |            |        |         |               |  |
| 使用上の注意:(38)(40)減水深:2cm/日以下 |        |      |                    |      |             |              |      |        |       |          |            |                 |                  |            |        |         |               |  |

## VII-2

SW-002①フロアブル

| 地域名                 | ノビエ    | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期       | 使用量    | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|---------------------|--------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|-------|----|-----------------|--|------------|--------|---------|---------------|
| 北海道                 |        |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |            | 50ml/a |         |               |
| 東北                  |        |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |            |        |         |               |
| 北陸                  | ●2.5   | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●始   |       |      |       |    |                 |  | +3～ノビエ2.5L |        |         | ●             |
| 関東・東海               | 早<br>普 |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |            |        |         |               |
| 近・中・四               | 早<br>普 |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |            |        |         |               |
| 九州                  | 早<br>普 |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |            |        |         |               |
| 使用上の注意: 減水深:2cm/日以下 |        |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |            |        |         |               |

VII-2 SW-012②-1kg 粒 「継」

VII-2 SW-012③-1kg 粒 「継」

## VII-2

SW-991-1kg 粒

| 地域名                           | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズカヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 |                 | 処理時期       | 使用量    | 砂<br>壤土 | 埴土<br>～<br>埴土 |   |
|-------------------------------|----------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|----|-----------------|-----------------|------------|--------|---------|---------------|---|
| 北海道                           | ○2.5     | ○                  | ○2   | ●始         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 |    | ○前              | エゾノササカガ<br>サ:2L | +5～ノビエ2.5L | 100g/a | ●       | ○             |   |
| 東北                            | ●2       | ●                  | ●2   | ●始         | ●始         | ●始   |       |      | ●発生<br>期 |    |                 |                 | +5～ノビエ2L   |        |         | ●             |   |
| 北陸                            | ○2.5     | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      |          |    | ●前              |                 | +5～ノビエ2.5L |        |         | ○             |   |
| 関東・東海                         | 早●<br>普○ | ○2.5               | ○    | ○2         | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 |    | ●前              |                 |            |        |         | ●             | ○ |
| 近・中・四                         | 早●<br>普○ | ○2.5               | ○    | ○2         | ○2         | ○2   |       |      |          |    |                 |                 |            |        |         | ●             | ○ |
| 九州                            | 早●<br>普○ | ○2.5               | ○    | ○2         | ●前         | ○2   | ○2    |      | ○発生<br>期 |    |                 |                 |            |        |         | ●             | ○ |
| 使用上の注意: (28)(34) 減水深: 2cm/日以下 |          |                    |      |            |            |      |       |      |          |    |                 |                 |            |        |         |               |   |

## VII-2

TH-001フロアブル

| 地域名                         |        | ノビエ    | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期       | 使用量    | 砂<br>壤土 | 宥<br>土 |   |
|-----------------------------|--------|--------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|------------|--------|---------|--------|---|
| 北海道                         |        | ●2.5   | ●                  | ●2   | ●2         |            | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 |  | +5～ノビエ2.5L | 50ml/a |         | ●      |   |
| 東北                          |        | ●2.5   | ●                  | ●2   | ●始         | ●始         | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  |            |        |         |        | ● |
| 北陸                          |        | ●2.5   | ●                  | ●2   |            | ●始         | ●始   |       |      |          |            |                 |  |            |        |         |        | ● |
| 関東・東海                       | 早<br>普 | ●2.5   | ●                  | ●2   | ●2         | ●2         |      |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  |            |        |         |        | ● |
|                             | 近・中・四  | 早<br>普 | ●2.5               | ●    | ●2         | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  |            |        |         |        | ● |
| 九州                          |        | 早<br>普 | ●2.5               | ●    | ●2         | ●始         | ●2   | ●2    |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  |            |        |         |        | ● |
| 使用上の注意:(28)(34) 減水深:2cm/日以下 |        |        |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |        |         |        |   |

## VII-2

TH-913HSK-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |                  | 処理時期                    | 使用量    | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>塩土 |
|-------|----------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------|---------|---------------|
| 北海道   | ○2.5     | ○                 | ○2   | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | エノノサヤスカグ<br>サ:2L | +5～ノビエ2.5L              | 100g/a | ○       | ○             |
| 東北    | ○2.5     | ○                 | ○2   | ○2         | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 | コウキヤガラ:発<br>生始   | ±0～ノビエ2.5L(砂<br>壌土は±5～) |        | ○       | ○             |
| 北陸    | ○2.5     | ○                 | ○2   | ○2         | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |                  |                         |        | ○       | ○             |
| 関東・東海 | 早○<br>普○ | ○2.5              | ○    | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                  | +0～ノビエ2.5L              |        | ○       | ○             |
| 近・中・四 | 早○<br>普○ | ○2.5              | ○    | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                  |                         |        | ○       | ○             |
| 九州    | 早○<br>普○ | ○2.5              | ○    | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | コウキヤガラ:発<br>生始   |                         |        | ○       | ○             |

使用上の注意:(28)(34)(36)

減水深:2cm/日以下

## VII-2

TH-913NCSフロアフル

| 地域名   | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期     | 使用量    | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>塩土 |
|-------|----------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|----------|--------|---------|---------------|
| 北海道   | ●3       | ●                 | ●2   | ●2         |            | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  | +5～ノビエ3L | 50ml/a |         | ●             |
| 東北    | ●3       | ●                 | ●2   | ●始         | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  |          |        |         | ●             |
| 北陸    | ●3       | ●                 | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      |          |            |                 |  |          |        |         | ●             |
| 関東・東海 | 早●<br>普● | ●3                | ●    | ●2         |            | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 |  |          |        |         | ●             |
| 近・中・四 | 早●<br>普● | ●3                | ●    | ●2         |            | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  |          |        |         | ●             |
| 九州    | 早●<br>普● | ●3                | ●    | ●前         | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 |  |          |        |         | ●             |

使用上の注意:(28)(34)

減水深:2cm/日以下

VII-2 YH-641-1kg 粒 「継」

## VII-2

MY-100TSフロアフル

| 地域名   | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |                 | 処理時期       | 使用量    | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>塩土 |
|-------|----------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|-----------------|------------|--------|---------|---------------|
| 北海道   | ○2.5     | ○                 | ○2   | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                 | +0～ノビエ2.5L | 50ml/a | ○       | ○             |
| 東北    | ○2.5     | ○                 | ○2   | ○2         | ○2         | ○2   | ○前    | ○始   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | シズイ:発生始<br>～3cm |            |        | ○       | ○             |
| 北陸    | ○2.5     | ○                 | ○2   | ○2         | ○2         | ○2   |       |      |          | ○再生<br>前～始 | ○前              |                 |            |        | ○       | ○             |
| 関東・東海 | 早○<br>普○ | ○2.5              | ○    | ○2         |            | ○2   | ○前    | ○始   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                 |            |        | ○       | ○             |
| 近・中・四 | 早○<br>普○ | ○2.5              | ○    | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                 |            |        | ○       | ○             |
| 九州    | 早○<br>普○ | ○2.5              | ○    | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                 |            |        | ○       | ○             |

水口処理可能(北海道, 東北, 関東・東海～九州) 田植同時散布可能(北海道, 北陸)  
 クログワイ防除は、クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(東北, 関東・東海)  
 オモダカ防除は、オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(東北, 関東・東海)

使用上の注意:(28)(34)(38)(40)(42)

減水深:2cm/日以下

VII-2 AVH-302-1kg 粒 「継」

VII-2 NH-102 フロアブル 「継」

VII-2 NH-104-1kg 粒 「継」

## VII-3 長期持続型一発処理剤

VII-3

AC-014A-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハヤ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量    | 砂<br>壤<br>土 | 壤土<br>～<br>壤土 |
|-------|----------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|----|-----------------|------------|--------|-------------|---------------|
| 北海道   | ○1.5     | ○                  | ○2   | ○2         |            | ○2   |       | ○前   | ○発生<br>期 |    | ○前              | +0～ノビエ1.5L | 100g/a | ○           | ○             |
| 東北    | ○1.5     | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 |    | ○前              |            |        |             | ○             |
| 北陸    | ○1.5     | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      |          |    | ○前              |            |        |             | ○             |
| 関東・東海 | 早○<br>普○ | ○1.5               | ○    | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 |    | ○前              |            |        | ○           | ○             |
| 近・中・四 | 早○<br>普○ | ○1.5               | ○    | ○2         |            | ○2   |       | ○前   | ○発生<br>期 |    | ○前              |            |        |             | ○             |
| 九州    | 早○<br>普○ |                    |      |            |            |      |       |      |          |    |                 |            |        |             |               |

田植同時散布可能(北海道～近畿・中国・四国)

オモダカ防除は、オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(近畿・中国・四国)

使用上の注意:(38)

減水深:2cm/日以下

## X 0.5kgおよび0.25kg粒剤等

X(移植後土壌処理)

KUH-992-0.25kg 粒

| 地域名   | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハヤ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期         | 使用量   | 砂<br>壤<br>土 | 壤土<br>～<br>壤土 |
|-------|----------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|-------|----|-----------------|--|--------------|-------|-------------|---------------|
| 北海道   | ○1       | ○                  | ○始   | ○前         |            |      |       |      |       |    |                 |  | +1～+5(ノビエ1L) | 25g/a | ○           | ○             |
| 東北    | ○1       | ○                  | ○始   | ○始         | ○前         |      |       |      |       |    |                 |  |              |       | ●           | ○             |
| 北陸    | ○1       | ○                  | ○始   |            | ○始         |      |       |      |       |    |                 |  |              |       | ●           | ○             |
| 関東・東海 | 早●<br>普○ | ○1                 | ○    | ○始         | ●始         |      |       |      |       |    |                 |  |              |       |             | ○             |
| 近・中・四 | 早●<br>普○ | ○始                 | ○    | ○始         | ○始         |      |       |      |       |    |                 |  | +1～+5(ノビエ始)  |       | ●           | ○             |
| 九州    | 早●<br>普○ | ○始                 | ○    | ○始         | ○始         |      |       |      |       |    |                 |  |              |       | ○           | ○             |

湛水周縁部散布可能

一発処理型除草剤の前処理として使用する。

使用上の注意:(28)(34)(48)

減水深:2cm/日以下

X(一発処理剤)

AKD-7105-0.5kg 粒 (H11まで NC-386-0.5kg 粒)

| 地域名   | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロク'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期     | 使用量   | 砂<br>壤土 | 壤土<br>へ<br>壤土 |
|-------|----------|-------------------|------|------------|-------------|------|--------|------|----------|------------|-----------------|----------|-------|---------|---------------|
| 北海道   | ○2       | ○                 | ○始   | ○前         |             | ○始   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○始              | +5～ノビエ2L | 50g/a |         | ○             |
| 東北    | ○2       | ○                 | ○2   | ●始         | ○2          | ○始   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ●始              |          |       |         | ○             |
| 北陸    | ○2       | ○                 | ○2   | ○始         | ○始          | ○始   |        |      |          | ●再生<br>前～始 | ●始              |          |       |         | ○             |
| 関東・東海 | 早○<br>普○ | ○2                | ○    | ○2         |             | ○2   | ○始     |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○始              |          |       |         | ○             |
| 近・中・四 | 早●<br>普○ | ○2                | ○    | ○2         |             | ○2   | ○2     |      | ●発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○始              |          |       |         | ○             |
| 九州    | 早●<br>普○ | ○2                | ○    | ○2         | ●始          | ○2   | ○始     |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○始              |          |       |         | ○             |

湛水周縁部散布可能

使用上の注意:(34)(41)(48)

減水深:2cm/日以下

X(一発処理剤)

KUH-003D-0.25kg 粒

| 地域名   | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロク'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量   | 砂<br>壤土 | 壤土<br>へ<br>壤土 |
|-------|----------|-------------------|------|------------|-------------|------|--------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------|---------|---------------|
| 北海道   |          |                   |      |            |             |      |        |      |          |            |                 | +1～ノビエ2.5L | 25g/a |         |               |
| 東北    |          |                   |      |            |             |      |        |      |          |            |                 |            |       |         |               |
| 北陸    | ●2.5     | ●                 | ●2   |            | ●始          | ●始   |        |      |          | ●再生<br>前～始 |                 |            |       |         | ●             |
| 関東・東海 | 早●<br>普● | ●2.5              | ●    | ●2         |             | ●2   | ●2     |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |       |         | ●             |
| 近・中・四 | 早●<br>普● | ●2.5              | ●    | ●2         |             | ●2   | ●2     |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |       |         | ●             |
| 九州    | 早●<br>普● | ●2                | ●    | ●2         |             | ●2   | ●2     |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |       | ●       | ●             |

湛水周縁部散布可能

使用上の注意:(28)(34)(48)

減水深:2cm/日以下

X(一発処理剤)

KUH-003K-0.25kg 粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロク'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量   | 砂<br>壤土 | 壤土<br>へ<br>壤土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|-------------|------|--------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------|---------|---------------|
| 北海道   | ●2.5 | ●                 | ●2   | ●始         |             | ●2   |        |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | +3～ノビエ2.5L | 25g/a |         | ●             |
| 東北    | ●2.5 | ●                 | ●2   | ●始         | ●2          | ●始   |        |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |       |         | ●             |
| 北陸    |      |                   |      |            |             |      |        |      |          |            |                 |            |       |         |               |
| 関東・東海 | 早普   |                   |      |            |             |      |        |      |          |            |                 |            |       |         |               |
| 近・中・四 | 早普   |                   |      |            |             |      |        |      |          |            |                 |            |       |         |               |
| 九州    | 早普   |                   |      |            |             |      |        |      |          |            |                 |            |       |         |               |

湛水周縁部散布可能

使用上の注意:(48)

減水深:2cm/日以下

X(一発処理剤) KUH-013D-0.25kg 粒 「継」

X(一発処理剤) KUH-013K-0.25kg 粒 「継」

## X(一発処理剤)

KLH-986D-0.25kg 粒

| 地域名   | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロク'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                     | 使用量   | 砂<br>壤土 | 壤土<br>へ<br>植土 |
|-------|----------|--------------------|------|------------|--------------|------|--------|------|----------|------------|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------------|
| 北海道   |          |                    |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |                          | 25g/a |         |               |
| 東北    |          |                    |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |                          |       |         |               |
| 北陸    | ○2.5     | ○                  | ○2   |            | ○始           | ○始   |        |      |          | ○再生<br>前～始 |                 | +1～ノビエ2.5L               |       | ○       | ○             |
| 関東・東海 | 早○<br>普○ | ○2.5               | ○    | ○2         | ○2           | ○2   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |                          |       | ○       | ○             |
| 近・中・四 | 早●<br>普○ | ○2.5               | ○    | ○2         | ○2           | ○2   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +1～ノビエ2.5L (砂<br>壤土は+5～) |       | ○       | ○             |
| 九州    | 早○<br>普○ | ○2.5               | ○    | ○2         | ○2           | ○2   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ●前              | +1～ノビエ2.5L               |       | ○       | ○             |

湛水周縁部散布可能

使用上の注意:(34)(41)(48)

減水深:2cm/日以下

## X(一発処理剤)

KLH-986K-0.25kg 粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロク'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量   | 砂<br>壤土 | 壤土<br>へ<br>植土 |
|-------|------|--------------------|------|------------|--------------|------|--------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------|---------|---------------|
| 北海道   | ○2   | ○                  | ○始   | ○前         |              | ○2   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +5～ノビエ2L   | 25g/a |         | ○             |
| 東北    | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○2         | ○始           | ○始   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +5～ノビエ2.5L |       | ○       | ○             |
| 北陸    |      |                    |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |            |       |         |               |
| 関東・東海 | 早普   |                    |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |            |       |         |               |
| 近・中・四 | 早普   |                    |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |            |       |         |               |
| 九州    | 早普   |                    |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |            |       |         |               |

湛水周縁部散布可能

使用上の注意:(48)

減水深:2cm/日以下

## X(一発処理剤)

MK-243N-0.5kg 粒

| 地域名   | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロク'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                       | 使用量   | 砂<br>壤土 | 壤土<br>へ<br>植土 |
|-------|----------|--------------------|------|------------|--------------|------|--------|------|----------|------------|-----------------|----------------------------|-------|---------|---------------|
| 北海道   | ○2       | ○                  | ○2   | ●始         |              | ○2   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +5～ノビエ2L                   | 50g/a |         | ○             |
| 東北    | ○2.5     | ○                  | ○2   | ○2         | ○2           | ○始   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ●前              | +5～ノビエ2.5L                 |       |         | ○             |
| 北陸    | ○2.5     | ○                  | ○2   |            | ○2           | ○2   |        |      |          | ●再生<br>前～始 | ●前              |                            |       |         | ○             |
| 関東・東海 | 早○<br>普○ | ○2.5               | ○    | ○2         | ○2           | ○2   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                            |       | ●       | ○             |
| 近・中・四 | 早○<br>普○ | ○2.5               | ○    | ○2         | ○2           | ○2   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                            |       | ●       | ○             |
| 九州    | 早○<br>普○ | ○2.5               | ○    | ○2         | ○2           | ○2   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +5～ノビエ2.5L (早<br>期は～ノビエ2L) |       | ○       | ○             |

湛水周縁部散布可能

使用上の注意:(28)(34)(48)

減水深:2cm/日以下

## X(一発処理剤)

NH-801-0.5kg 粒

| 地域名                     | ノビエ    | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>グカ | ミス'カ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモグ'カ | ヒルムシロ      | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量   | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------------------------|--------|--------------------|------|------------|--------------|------|--------|-------|------------|------------|-----------------|------------|-------|---------|---------------|
| 北海道                     | ○2     | ○                  | ○2   | ○始         |              | ○2   |        |       | ○発生<br>前～始 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +5～ノビエ2L   | 50g/a | ○       | ○             |
| 東北                      | ○2.5   | ○                  | ○2   |            | ○2           | ○始   |        |       | ●発生<br>期   | ●再生<br>前～始 | ●前              | +5～ノビエ2.5L |       | ●       | ○             |
| 北陸                      |        |                    |      |            |              |      |        |       |            |            |                 |            |       |         |               |
| 関東・東海                   | 早<br>普 |                    |      |            |              |      |        |       |            |            |                 |            |       |         |               |
| 近・中・四                   | 早<br>普 |                    |      |            |              |      |        |       |            |            |                 |            |       |         |               |
| 九州                      | 早<br>普 |                    |      |            |              |      |        |       |            |            |                 |            |       |         |               |
| 湛水周縁部散布可能               |        |                    |      |            |              |      |        |       |            |            |                 |            |       |         |               |
| 使用上の注意:(48) 減水深:2cm/日以下 |        |                    |      |            |              |      |        |       |            |            |                 |            |       |         |               |

## X(一発処理剤)

NH-802-0.5kg 粒

| 地域名                             | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>グカ | ミス'カ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモグ'カ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期     | 使用量   | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|---------------------------------|----------|--------------------|------|------------|--------------|------|--------|-------|----------|------------|-----------------|----------|-------|---------|---------------|
| 北海道                             |          |                    |      |            |              |      |        |       |          |            |                 |          | 50g/a |         |               |
| 東北                              |          |                    |      |            |              |      |        |       |          |            |                 |          |       |         |               |
| 北陸                              | ○2       | ○                  | ○2   |            | ○?           | ○始   |        |       |          | ●再生<br>前～始 | ○前              | +5～ノビエ2L |       | ●       | ○             |
| 関東・東海                           | 早●<br>普○ | ○2                 | ○    | ○2         | ○2           | ○2   |        |       | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ●前              |          |       | ●       | ○             |
| 近・中・四                           | 早●<br>普○ | ○2                 | ○    | ○2         | ○2           | ○2   |        |       | ●発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |          |       | ●       | ○             |
| 九州                              | 早●<br>普○ | ○2                 | ○    | ○2         | ○2           | ○2   |        |       | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |          |       | ○       | ○             |
| 湛水周縁部散布可能                       |          |                    |      |            |              |      |        |       |          |            |                 |          |       |         |               |
| 使用上の注意:(28)(34)(48) 減水深:2cm/日以下 |          |                    |      |            |              |      |        |       |          |            |                 |          |       |         |               |

## X(一年生持続型)

MK-243S-0.5kg 粒

| 地域名                             | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>グカ | ミス'カ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモグ'カ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量   | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|---------------------------------|----------|--------------------|------|------------|--------------|------|--------|-------|-------|----|-----------------|------------|-------|---------|---------------|
| 北海道                             | ●1.5     | ●                  | ●始   | ●始         |              |      |        |       |       |    |                 | +3～ノビエ1.5L | 50g/a |         | ●             |
| 東北                              | ●1.5     | ●                  | ●始   | ●始         |              |      |        |       |       |    |                 |            |       |         | ●             |
| 北陸                              | ●1.5     | ●                  | ●始   |            | ●始           |      |        |       |       |    |                 |            |       |         | ●             |
| 関東・東海                           | 早●<br>普● | ●1.5               | ●    | ●始         |              |      |        |       |       |    |                 |            |       |         | ●             |
| 近・中・四                           | 早●<br>普● | ●1.5               | ●    | ●始         |              | ●始   |        |       |       |    |                 |            |       |         | ●             |
| 九州                              | 早●<br>普● | ●1.5               | ●    | ●始         | ●前           |      |        |       |       |    |                 |            |       | ●       | ●             |
| 湛水周縁部散布可能                       |          |                    |      |            |              |      |        |       |       |    |                 |            |       |         |               |
| 使用上の注意:(28)(34)(48) 減水深:2cm/日以下 |          |                    |      |            |              |      |        |       |       |    |                 |            |       |         |               |

## X I 生物除草剤

XI

MTB-951

| 地域名                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ノビエ     | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期                 | 使用量                        | 砂<br>壤<br>土 | 埴<br>土 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|-------|----|-----------------|--|----------------------|----------------------------|-------------|--------|
| 北海道                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ●2      |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  | ノビエ1L～2L             | 60g/a(散<br>布液量<br>500ml/a) |             | ●      |
| 東北                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ●2      |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |                      |                            |             | ●      |
| 北陸                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ●2      |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |                      |                            |             | ●      |
| 関東・東海                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 早<br>普● | ●1.5               |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  | +4(ノビエ始)～ノ<br>ビエ1.5L |                            |             | ●      |
| 近・中・四                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 早<br>普● | ●1.5               |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |                      |                            |             | ●      |
| 九州                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 早<br>普  |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |                      |                            |             |        |
| ノビエが完全に水没する条件で処理し、7日間程度は水深を維持する。<br>本剤は微生物を利用したノビエ専用除草剤であり、効果が変動しやすい。<br>使用上の注意: 減水深:2cm/日以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |                      |                            |             |        |

## ジャンボ剤

## II-2 移植前後土壌処理

II-2

KPP-2005 ジャンボ

| 地域名                        | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズ'カ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロク'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期                                  | 使用量          | 砂<br>壤<br>土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|----------------------------|----------|-------------------|------|------------|--------------|------|--------|------|-------|----|-----------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| 北海道                        | ○1       | ○                 | ○始   | ○始         |              |      |        |      |       |    |                 |  | +0～+5(ノビエ1L)                          | 50g×1コ<br>/a | ○           | ○             |
| 東北                         | ○1       | ○                 | ○始   | ○始         | ○前           |      |        |      |       |    |                 |  | 植代後～-4,+1～<br>+5(ノビエ1L)               |              | ○           | ○             |
| 北陸                         | ○1       | ○                 | ○前   |            | ○前           |      |        |      |       |    |                 |  |                                       |              | ●           | ○             |
| 関東・東海                      | 早○<br>普○ | ○1                | ○    | ○始         | ○前           |      |        |      |       |    |                 |  | 植代後～-4,+0～<br>+5(ノビエ1L)(早期は<br>+0を除く) |              |             | ○             |
| 近・中・四                      | 早○<br>普○ | ○1                | ○    | ○始         | ○前           |      |        |      |       |    |                 |  | 植代後～-4,+1～<br>+5(ノビエ1L)               |              | ○           | ○             |
| 九州                         | 早○<br>普○ | ○1                | ○    | ○始         | ○前           |      |        |      |       |    |                 |  |                                       |              | ○           | ○             |
| 体系処理の前処理として50g×1コ/a処理が可能   |          |                   |      |            |              |      |        |      |       |    |                 |  |                                       |              |             |               |
| 使用上の注意:(45)(46)減水深:2cm/日以下 |          |                   |      |            |              |      |        |      |       |    |                 |  |                                       |              |             |               |

II-2

MAT-159 ジャンボ

| 地域名                             |    | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロク'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期                    | 使用量          | 砂<br>壤<br>土 | 埴<br>土 |   |
|---------------------------------|----|-----|-------------------|------|------------|--------------|------|--------|------|-------|----|-----------------|--|-------------------------|--------------|-------------|--------|---|
| 北海道                             |    | ●1  | ●                 | ●始   | ●前         |              |      |        |      |       |    |                 |  | +1～+5(ノビエ1L)            | 50g×1コ<br>/a |             | ●      |   |
| 東北                              |    | ●1  | ●                 | ●始   | ●始         | ●前           |      |        |      |       |    |                 |  | 植代後～-4,+1～<br>+5(ノビエ1L) |              |             | ●      |   |
| 北陸                              |    | ●1  | ●                 | ●始   |            | ●前           |      |        |      |       |    |                 |  |                         |              |             | ●      |   |
| 関東・東海                           | 早普 | ●1  | ●                 | ●始   | ●始         |              |      |        |      |       |    |                 |  |                         |              |             |        | ● |
|                                 | 早普 | ●1  | ●                 | ●始   | ●始         |              |      |        |      |       |    |                 |  |                         |              |             |        | ● |
| 九州                              |    | 早普  | ●1                | ●    | ●始         | ●始           |      |        |      |       |    |                 |  |                         |              |             | ●      | ● |
| 使用上の注意:(34)(45)(46) 減水深:2cm/日以下 |    |     |                   |      |            |              |      |        |      |       |    |                 |  |                         |              |             |        |   |

II-2

フタクロール ジャンボ

| 地域名                             | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>グカ | ミズカヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                    | 使用量          | 砂<br>壤<br>土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|---------------------------------|----------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|-------|----|-----------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|
| 北海道                             | ○1       | ○                 | ○始   | ○前         |            |      |       |      |       |    |                 | +1～+5(ノビエ1L)            | 50g×1コ<br>/a | ●           | ○             |
| 東北                              | ○1       | ○                 | ○始   |            | ○始         |      |       |      |       |    |                 | 植代後～-4,+1～<br>+5(ノビエ1L) |              |             | ○             |
| 北陸                              | ○1       | ○                 | ○始   |            | ○前         |      |       |      |       |    |                 |                         |              | ●           | ○             |
| 関東・東海                           | 早○<br>普○ | ○1                | ○    | ○始         | ○前         |      |       |      |       |    |                 |                         |              |             | ○             |
| 近・中・四                           | 早●<br>普○ | ○1                | ○    | ○始         |            | ●始   |       |      |       |    |                 |                         |              |             | ○             |
| 九州                              | 早●<br>普○ | ○1                | ○    | ○始         |            | ○始   |       |      |       |    |                 |                         |              |             | ○             |
| 使用上の注意:(34)(45)(46) 減水深:2cm/日以下 |          |                   |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |                         |              |             |               |

## Ⅱ-3 移植後土壌処理

Ⅱ-3

CG-113(改) ジャンボ

| 地域名                        |         | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハヤ | ホタルイ | ヘラオモ<br>グカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期         | 使用量          | 砂<br>壤<br>土 | 壤土<br>～<br>壤土 |
|----------------------------|---------|-----|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|-------|----|-----------------|--|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 北海道                        |         | ●1  | ●                  | ●始   | ●前         |            |      |       |      |       |    |                 |  | +1～+5(ノビエ1L) | 30g×1コ<br>/a |             | ●             |
| 東北                         |         | ●1  | ●                  | ●始   | ●始         | ●始         |      |       |      |       |    |                 |  |              |              |             | ●             |
| 北陸                         |         | ●1  | ●                  | ●始   |            | ●始         |      |       |      |       |    |                 |  |              |              |             | ●             |
| 関東・東海                      | 早<br>蕾● | ●1  | ●                  | ●始   |            | ●始         |      |       |      |       |    |                 |  |              |              |             | ●             |
| 近・中・四                      | 早<br>蕾● | ●1  | ●                  | ●始   |            | ●始         |      |       |      |       |    |                 |  |              |              |             | ●             |
| 九州                         | 早<br>蕾● | ●1  | ●                  | ●始   |            | ●始         |      |       |      |       |    |                 |  |              |              | ●           | ●             |
| 使用上の注意:(34)(45)減水深:2cm/日以下 |         |     |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |              |              |             |               |

## Ⅱ-5 適用時期拡大

Ⅱ-5 MK-243SM ジャンボ 「継」

## II-6-(1) クログワイ対象

|                              |
|------------------------------|
| II-6-(1) AC-014R ジャンボ 「雑」    |
| II-6-(1) KPP-2005 ジャンボ 「雑」   |
| II-6-(1) KUH-883(改) ジャンボ 「雑」 |
| II-6-(1) KUH-883(改) ジャンボ 「雑」 |
| II-6-(1) KUH-975PD ジャンボ 「雑」  |
| II-6-(1) KUH-975PK ジャンボ 「雑」  |
| II-6-(1) NH-806 ジャンボ 「雑」     |

## II-6-(1)

SB-554 ジャンボ

| 地域名                                                                        | 対象雑草: クログワイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                        |             |                 | 50g×1コ/a |
| 東北                                                                         | ●           | 前               |          |
| 北陸                                                                         |             |                 |          |
| 関東・東海                                                                      | ●           | 前               |          |
| 近・中・四                                                                      |             |                 |          |
| 九州                                                                         |             |                 |          |
| クログワイ防除は、クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(東北、関東・東海)<br>使用上の注意:(42) |             |                 |          |

|                               |
|-------------------------------|
| II-6-(1) SW-952P5(改) ジャンボ 「雑」 |
| II-6-(1) SW-952P5(改) ジャンボ 「雑」 |

## II-6-(2) オモダカ対象

|                              |
|------------------------------|
| II-6-(2) AC-014R ジャンボ 「雑」    |
| II-6-(2) KUH-883(改) ジャンボ 「雑」 |
| II-6-(2) KUH-883(改) ジャンボ 「雑」 |
| II-6-(2) KUH-975PD ジャンボ 「雑」  |
| II-6-(2) KUH-975PK ジャンボ 「雑」  |
| II-6-(2) NH-806 ジャンボ 「雑」     |

## II-6-(2)

SW-952P5(改) ジャンボ

| 地域名     | 対象雑草: オモダカ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量       |
|---------|------------|-----------------|-----------|
| 北海道     | ●          | 前               | 35g×1コ/2a |
| 東北      |            |                 |           |
| 北陸      |            |                 |           |
| 関東・東海   |            |                 |           |
| 近・中・四   |            |                 |           |
| 九州      |            |                 |           |
| 使用上の注意: |            |                 |           |

II-6-(2) SW-952P5⑩ ジャンボ 「雑」

#### II-6-(5) シズイ対象

II-6-(5) SB-554 ジャンボ 「雑」

II-6-(5)

SW-952P5⑩ ジャンボ

| 地域名         | 対象雑草: シズイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量       |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| 北海道         |           |                 | 35g×1コ/2a |
| 東北          | ●         | 発生始～3cm         |           |
| 北陸          |           |                 |           |
| 関東・東海       |           |                 |           |
| 近・中・四       |           |                 |           |
| 九州          |           |                 |           |
| 使用上の注意:(40) |           |                 |           |

#### II-6-(6) エゾノサヤヌカグサ対象

II-6-(6)

SW-952P5⑩ ジャンボ

| 地域名     | 対象雑草: エゾノサヤヌカグサ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量       |
|---------|-----------------|-----------------|-----------|
| 北海道     | ●               | 2L              | 35g×1コ/2a |
| 東北      |                 |                 |           |
| 北陸      |                 |                 |           |
| 関東・東海   |                 |                 |           |
| 近・中・四   |                 |                 |           |
| 九州      |                 |                 |           |
| 使用上の注意: |                 |                 |           |

#### II-6-(8) コウキヤガラ対象

II-6-(8) SW-952P5⑩ ジャンボ 「雑」

#### II-6-(10) その他

イボクサ

II-6-(10) NH-806 ジャンボ 「雑」

タウコギ

II-6-(10)

ONC-381 ジャンボ

| 地域名     | 対象雑草: タウコギ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量      |
|---------|------------|-----------------|----------|
| 北海道     |            |                 | 30g×1コ/a |
| 東北      | ●          | 子葉期             |          |
| 北陸      |            |                 |          |
| 関東・東海   |            |                 |          |
| 近・中・四   |            |                 |          |
| 九州      |            |                 |          |
| 使用上の注意: |            |                 |          |

## VII 一発処理剤

VII

AC-014C① シャンボ

| 地域名                                 | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツバイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>グカ | ミズカヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 |          | 処理時期       | 使用量          | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------------------------------------|----------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|----|-----------------|----------|------------|--------------|---------|---------------|
| 北海道                                 | ○1.5     | ○                  | ○始   |            |            |      |       |      |          |    |                 |          | +5～ノビエ1.5L | 50g×1コ<br>/a |         | ○             |
| 東北                                  | ○2       | ○                  | ○始   | ●始         | ○始         | ○始   |       |      | ●発生<br>期 |    |                 | +3～ノビエ2L | ●          |              | ○       |               |
| 北陸                                  | ○2       | ○                  | ○始   |            | ●始         | ○始   |       |      |          |    |                 |          |            |              | ●       | ○             |
| 関東・東海                               | 早●<br>普○ | ○2                 | ○    | ○始         | ○始         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 |    |                 |          |            |              | ○       | ○             |
| 近・中・四                               | 早●<br>普○ | ○2                 | ○    | ○始         | ●始         | ○始   |       |      |          | ●前 |                 |          |            |              |         | ○             |
| 九州                                  | 早●<br>普○ | ○2                 | ○    | ○2         | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 |    |                 |          | +5～ノビエ2L   |              | ○       | ○             |
| 使用上の注意:(28)(34)(45)(47) 減水深:2cm/日以下 |          |                    |      |            |            |      |       |      |          |    |                 |          |            |              |         |               |

VII

AC-014R シャンボ

| 地域名                                 |       | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツバイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>グカ | ミズカヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロクワイ | オモグカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期     | 使用量          | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |   |
|-------------------------------------|-------|-----|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|----------|--------------|---------|---------------|---|
| 北海道                                 |       | ●2  | ●                  | ●2   | ●始         |            | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  | +3～ノビエ2L | 20g×1コ<br>/a |         | ●             |   |
| 東北                                  |       | ●2  | ●                  | ●2   |            | ●始         | ●始   |       |      | ●発生<br>期 |            | ●前              |  |          |              |         |               | ● |
| 北陸                                  |       | ●2  | ●                  | ●始   |            | ●始         | ●始   |       |      |          |            |                 |  |          |              |         |               | ● |
| 関東・東海                               | 早普●   | ●2  | ●                  | ●2   |            | ●始         | ●始   |       |      | ●発生<br>期 |            | ●前              |  |          |              |         |               | ● |
|                                     | 近・中・四 | 早普● | ●2                 | ●    | ●2         |            | ●2   | ●2    |      |          |            |                 |  |          |              |         |               | ● |
| 九州                                  |       | 早普● | ●2                 | ●    | ●2         | ●前         | ●2   | ●始    |      |          |            |                 |  |          |              | ●       | ●             |   |
| 使用上の注意:(28)(34)(45)(47) 減水深:2cm/日以下 |       |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          |              |         |               |   |

VII

AGH-987 シャンボ

| 地域名                                 | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツバイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>グカ | ミス'カ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロク'ワイ | オモクガ | ヒルムシロ      | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期     | 使用量          | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |   |
|-------------------------------------|----------|--------------------|------|------------|--------------|------|--------|------|------------|------------|-----------------|----------|--------------|---------|---------------|---|
| 北海道                                 | ○2       | ○                  | ○始   | ○始         |              | ○始   |        |      | ○発生<br>期   | ○再生<br>前～始 | ○前              | +5～ノビエ2L | 50g×1コ<br>/a |         | ○             |   |
| 東北                                  | ○2       | ○                  | ○2   | ○始         | ○2           | ○始   |        |      | ○発生<br>期   | ○再生<br>前～始 |                 |          |              |         |               | ○ |
| 北陸                                  | ○2       | ○                  | ○2   |            | ○始           | ○2   |        |      | ●再生<br>前～始 |            |                 |          |              |         | ●             | ○ |
| 関東・東海                               | 早○<br>普○ | ○2                 | ○    | ○2         | ○2           | ○2   |        |      | ○発生<br>期   | ○再生<br>前～始 | ○前              |          |              |         | ○             | ○ |
| 近・中・四                               | 早●<br>普○ | ○2                 | ○    | ○2         | ○2           | ○2   |        |      | ○発生<br>期   | ○再生<br>前～始 | ○前              |          |              |         | ○             | ○ |
| 九州                                  | 早○<br>普○ | ○2                 | ○    | ○2         | ○2           | ○2   |        |      | ○発生<br>期   | ○再生<br>前～始 | ○前              |          | ○            | ○       | ○             |   |
| 使用上の注意:(28)(34)(45)(47) 減水深:2cm/日以下 |          |                    |      |            |              |      |        |      |            |            |                 |          |              |         |               |   |

## Ⅶ

DKH-001 ジャンボ (H12まで NH-001 ジャンボ)

| 地域名                         |        | ノビエ    | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期       | 使用量          | 砂<br>壤<br>土 | 壤土<br>～<br>塩土 |
|-----------------------------|--------|--------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|------------|--------------|-------------|---------------|
| 北海道                         |        | ●1.5   | ●                 | ●始   | ●始         |            | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  | +3～ノビエ1.5L | 50g×1コ<br>/a |             | ●             |
| 東北                          |        | ●1.5   | ●                 | ●始   |            | ●始         | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  |            |              |             | ●             |
| 北陸                          |        |        |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |              |             |               |
| 関東・東海                       | 早<br>普 |        |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |              |             |               |
|                             | 早<br>普 |        |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |              |             |               |
| 九州                          |        | 早<br>普 |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |              |             |               |
| 使用上の注意:(45)(47) 減水深:2cm/日以下 |        |        |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |              |             |               |

## Ⅶ

DKH-002 ジャンボ (H12まで NH-002 ジャンボ)

| 地域名                                 | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期       | 使用量          | 砂<br>壤<br>土 | 壤土<br>へ<br>埋土 |
|-------------------------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|-------|------------|-----------------|--|------------|--------------|-------------|---------------|
| 北海道                                 |      |                    |      |            |            |      |       |      |       |            |                 |  | +3～ノビエ1.5L | 50g×1コ<br>/a |             |               |
| 東北                                  |      |                    |      |            |            |      |       |      |       |            |                 |  |            |              |             |               |
| 北陸                                  | ●1.5 | ●                  | ●始   |            | ●始         | ●始   |       |      |       |            |                 |  |            |              |             | ●             |
| 関東・東海                               | 早普●  | ●1.5               | ●    | ●始         |            | ●始   | ●始    |      |       |            | ●前              |  |            |              |             | ●             |
| 近・中・四                               | 早普●  | ●1.5               | ●    | ●始         |            | ●始   | ●始    |      |       | ●再生<br>前～始 | ●前              |  |            |              |             | ●             |
| 九州                                  | 早普●  | ●1.5               | ●    | ●2         |            | ●始   | ●始    |      |       | ●発生<br>期   | ●再生<br>前～始      |  |            | ●            | ●           |               |
| 使用上の注意:(28)(34)(45)(47) 減水深:2cm/日以下 |      |                    |      |            |            |      |       |      |       |            |                 |  |            |              |             |               |

## Ⅶ

HSA-971 ジャンボ

| 地域名                                                    |  | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期 | 使用量 | 砂<br>壤<br>土 | 壤土<br>へ<br>埋土 |    |
|--------------------------------------------------------|--|----------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------|-----|-------------|---------------|----|
| 北海道                                                    |  | ○2       | ○                 | ○2   |            |            | ○2   |       | ○前   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |      |     |             |               |    |
| 東北                                                     |  | ○2       | ○                 | ○2   | ○始         | ○始         | ○始   |       | ○前   | ●発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |      |     |             |               |    |
| 北陸                                                     |  | ○2       | ○                 | ○2   | ○始         | ○始         | ○2   |       | ○前   |          | ●再生<br>前～始 |                 |      |     |             |               |    |
| 関東・東海                                                  |  | 早○<br>普○ | ○2                | ○    | ○2         |            | ○始   | ○2    |      | ○前       | ○発生<br>期   | ○再生<br>前～始      |      |     |             |               | ●前 |
| 近・中・四                                                  |  | 早○<br>普○ | ○2                | ○    | ○2         |            | ○2   | ○2    |      | ○前       | ○発生<br>期   | ○再生<br>前～始      |      |     |             |               | ●前 |
| 九州                                                     |  | 早○<br>普○ | ○2                | ○    | ○2         |            | ○2   | ○2    |      | ○始       | ○発生<br>期   | ○再生<br>前～始      |      |     |             |               | ○前 |
| オモダカ防除は、オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。(北陸～九州) |  |          |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |      |     |             |               |    |
| 使用上の注意:(28)(34)(38)(45)(47) 減水深:2cm/日以下                |  |          |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |      |     |             |               |    |

Ⅶ KUH-012D ジャンボ 「継」

Ⅶ KUH-012K ジャンボ 「継」

## Ⅶ

KUH-883(改) シャンボ

| 地域名                         |  | ノビエ    | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量          | 砂<br>壤土 | 埴<br>土 |  |
|-----------------------------|--|--------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|--------------|---------|--------|--|
| 北海道                         |  | ○2     | ○                 | ○始   | ○始         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +3～ノビエ2L   | 35g×1コ<br>/a |         | ○      |  |
| 東北                          |  | ○2.5   | ○                 | ○2   | ○始         | ○2         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +3～ノビエ2.5L |              |         | ○      |  |
| 北陸                          |  |        |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |              |         |        |  |
| 関東・東海                       |  | 早<br>普 |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |              |         |        |  |
| 近・中・四                       |  | 早<br>普 |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |              |         |        |  |
| 九州                          |  | 早<br>普 |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |              |         |        |  |
| 使用上の注意:(45)(47) 減水深:2cm/日以下 |  |        |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |              |         |        |  |

## Ⅶ

KUH-883(改) シャンボ

| 地域名                     | ノビエ     |      | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ     | ヒルムシロ      | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量          | 砂<br>壤土 | 埴土<br>～<br>埴土 |   |
|-------------------------|---------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|----------|------------|----|-----------------|------------|--------------|---------|---------------|---|
| 北海道                     |         |      |                    |      |            |            |      |       |          |            |    |                 | +3～ノビエ2.5L | 35g×1コ<br>/a |         |               |   |
| 東北                      |         |      |                    |      |            |            |      |       |          |            |    |                 |            |              |         |               |   |
| 北陸                      | ○2.5    | ○    | ○2                 |      | ○2         | ○始         |      |       | ●発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |    |                 |            |              |         | ●             | ○ |
| 関東・東海                   | 早●<br>○ | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○2         | ○2         |      |       | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前 |                 |            |              |         | ●             | ○ |
| 近・中・四                   | 早●<br>○ | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○2         | ○2         |      |       | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ●前 |                 |            |              |         |               | ○ |
| 九州                      | 早●<br>○ | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○2         | ○2         |      |       | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前 |                 |            |              | ○       | ○             |   |
| 使用上の注意:(28)(34)(45)(47) |         |      |                    |      |            |            |      |       |          |            |    |                 |            |              |         |               |   |
| 減水深:2cm/日以下             |         |      |                    |      |            |            |      |       |          |            |    |                 |            |              |         |               |   |

## Ⅶ

KUH-975PD シャンボ

| 地域名                                   |         | ノビエ       | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>グカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量          | 砂<br>壤土 | 埴土<br>～<br>埴土 |   |
|---------------------------------------|---------|-----------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|--------------|---------|---------------|---|
| 北海道                                   |         |           |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 | +1～ノビエ2.5L | 25g×1コ<br>/a |         |               |   |
| 東北                                    |         |           |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |              |         |               |   |
| 北陸                                    |         | ○2.5      | ○                  | ○2   |            | ○始         | ○2   |       |      |          | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |              |         | ●             | ○ |
| 関東・東海                                 | 早<br>蕾○ | ○2.5      | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |              |         | ○             | ○ |
| 近・中・四                                 | 早<br>蕾○ | ●<br>○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ●発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            | ○            | ○       | ○             |   |
| 九州                                    | 早<br>蕾○ | ○2.5      | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            | ○            | ○       | ○             |   |
| 使用上の注意: (28)(34)(45)(47) 減水深: 2cm/日以下 |         |           |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |              |         |               |   |

## VII

KUH-975PK シャンボ

| 地域名                        |  | ノビエ    | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期       | 使用量          | 砂<br>壤土 | 埴土<br>～<br>埴土 |
|----------------------------|--|--------|-------------------|------|------------|-------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|------------|--------------|---------|---------------|
| 北海道                        |  | ○2     | ○                 | ○2   | ○始         |             | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  | +5～ノビエ2L   | 25g×1コ<br>/a |         | ○             |
| 東北                         |  | ○2.5   | ○                 | ○2   | ○始         | ○始          | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  | +5～ノビエ2.5L |              |         | ○             |
| 北陸                         |  |        |                   |      |            |             |      |       |      |          |            |                 |  |            |              |         |               |
| 関東・東海                      |  | 早<br>普 |                   |      |            |             |      |       |      |          |            |                 |  |            |              |         |               |
| 近・中・四                      |  | 早<br>普 |                   |      |            |             |      |       |      |          |            |                 |  |            |              |         |               |
| 九州                         |  | 早<br>普 |                   |      |            |             |      |       |      |          |            |                 |  |            |              |         |               |
| 使用上の注意:(45)(47)減水深:2cm/日以下 |  |        |                   |      |            |             |      |       |      |          |            |                 |  |            |              |         |               |

## VII

MY-100DC① シャンボ

| 地域名                         |  | ノビエ    | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダ'カ | ミズ'カヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモダ'カ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期     | 使用量          | 砂<br>壤土 | 壤土<br>へ<br>埴土 |  |
|-----------------------------|--|--------|--------------------|------|-------------|-------------|------|--------|-------|----------|------------|-----------------|--|----------|--------------|---------|---------------|--|
| 北海道                         |  | ●2     | ●                  | ●始   | ●始          |             | ●始   |        |       | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  | +3～ノビエ2L | 50g×1コ<br>/a |         | ●             |  |
| 東北                          |  | ●2     | ●                  | ●2   | ●始          | ●始          | ●始   |        |       | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  |          |              | ●       | ●             |  |
| 北陸                          |  |        |                    |      |             |             |      |        |       |          |            |                 |  |          |              |         |               |  |
| 関東・東海                       |  | 早<br>普 |                    |      |             |             |      |        |       |          |            |                 |  |          |              |         |               |  |
| 近・中・四                       |  | 早<br>普 |                    |      |             |             |      |        |       |          |            |                 |  |          |              |         |               |  |
| 九州                          |  | 早<br>普 |                    |      |             |             |      |        |       |          |            |                 |  |          |              |         |               |  |
| 使用上の注意:(45)(47) 減水深:2cm/日以下 |  |        |                    |      |             |             |      |        |       |          |            |                 |  |          |              |         |               |  |

## VII

MY-100DC② シャンボ

| 地域名                                 |  | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期             | 使用量          | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |   |
|-------------------------------------|--|----------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|------------------|--------------|---------|---------------|---|
| 北海道                                 |  |          |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  | +3～ノビエ2L         | 50g×1コ<br>/a |         |               |   |
| 東北                                  |  |          |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |                  |              |         |               |   |
| 北陸                                  |  | ○2       | ○                 | ○2   |            | ○始         | ○始   |       |      |          |            |                 |  |                  |              |         |               | ○ |
| 関東・東海                               |  | 早○<br>普○ | ○2                | ○    | ○2         |            | ○始   | ○始    |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  |                  |              |         | ○             | ○ |
| 近・中・四                               |  | 早●<br>普○ | ○2                | ○    | ○2         |            | ○2   | ○始    |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ○前              |  |                  |              |         |               | ○ |
| 九州                                  |  | 早○<br>普○ | ○2                | ○    | ○2         |            | ○始   | ○始    |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |  | +3～ノビエ2L(早期は+5～) |              |         | ○             | ○ |
| 使用上の注意:(28)(34)(45)(47) 減水深:2cm/日以下 |  |          |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |                  |              |         |               |   |

## Ⅵ

MY-100MS シャンボ

| 地域名                             |        | ノビエ    | 一年生<br>広葉・<br>マツバイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ'<br>ツリ | ウリカワ | クロク'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量          | 砂<br>壤土 | 埴土<br>～<br>埴土 |   |
|---------------------------------|--------|--------|--------------------|------|------------|-------------|------|--------|------|-------|----|-----------------|------------|--------------|---------|---------------|---|
| 北海道                             |        | ○1.5   | ○                  | ○始   | ●始         |             | ○始   |        |      |       |    |                 | +3～ノビエ1.5L | 50g×1コ<br>/a |         | ○             |   |
| 東北                              |        | ○1.5   | ○                  | ○始   |            | ○前          | ○始   |        |      |       |    |                 | +1～ノビエ1.5L |              |         | ○             | ○ |
| 北陸                              |        | ○1.5   | ○                  | ○始   |            | ○始          | ○始   |        |      |       |    |                 | +3～ノビエ1.5L |              |         |               | ○ |
| 関東・東海                           | 早<br>蕾 | ○1.5   | ○                  | ○始   |            | ○始          | ○始   |        |      |       |    |                 |            |              |         | ○             | ○ |
|                                 | 早<br>蕾 | ○1.5   | ○                  | ○始   |            | ○始          | ○始   |        |      |       |    |                 | +1～ノビエ1.5L |              |         |               | ○ |
| 九州                              |        | 早<br>蕾 | ○1.5               | ○    | ○始         |             | ○始   | ○始     |      |       |    |                 | +3～ノビエ1.5L |              |         | ○             | ○ |
| 使用上の注意:(34)(45)(47) 減水深:2cm/日以下 |        |        |                    |      |            |             |      |        |      |       |    |                 |            |              |         |               |   |

## Ⅶ

MY-100NC シャンボ

| 地域名                                     |  | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハヒ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズカヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期     | 使用量          | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |   |   |
|-----------------------------------------|--|----------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|----------|--------------|---------|---------------|---|---|
| 北海道                                     |  | ○2       | ○                  | ○始   | ○始         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  | +5～ノビエ2L | 30g×1コ<br>/a |         | ○             |   |   |
| 東北                                      |  | ○2       | ○                  | ○2   | ○始         | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |  |          |              |         |               | ○ |   |
| 北陸                                      |  | ○2       | ○                  | ○2   |            | ○始         | ○2   |       |      |          | ●再生<br>前～始 | ●前              |  |          |              |         |               | ● | ○ |
| 関東・東海                                   |  | 早○<br>普○ | ○2                 | ○    | ○2         |            | ○2   | ○始    |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  |          |              |         |               |   | ○ |
| 近・中・四                                   |  | 早●<br>普○ | ○2                 | ○    | ○2         |            | ○2   | ○2    |      | ●発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |  |          |              |         |               |   | ○ |
| 九州                                      |  | 早●<br>普○ | ○2                 | ○    | ○2         |            | ○2   | ○2    |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ●前              |  |          |              |         |               | ○ | ○ |
| 使用上の注意:(28)(34)(41)(45)(47) 減水深:2cm/日以下 |  |          |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          |              |         |               |   |   |

## Ⅷ

NBA-101 シャンボ

| 地域名                                 | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハヒ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロク'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ      | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期       | 使用量          | 砂<br>壤土 | 壤土<br>埴土 |
|-------------------------------------|----------|--------------------|------|------------|--------------|------|--------|------|------------|------------|-----------------|--|------------|--------------|---------|----------|
| 北海道                                 | ○2       | ○                  | ○2   | ○前         |              | ○始   |        |      | ○発生<br>期   | ○再生<br>前～始 | ○前              |  | +5～ノビエ2L   | 40g×1コ<br>/a | ○       | ○        |
| 東北                                  | ○2       | ○                  | ○始   |            | ○始           | ○始   |        |      | ○発生<br>期   | ○再生<br>前～始 | ○前              |  |            |              | ○       | ○        |
| 北陸                                  | ○2       | ○                  | ○2   |            | ○始           | ○2   |        |      | ○再生<br>前～始 | ○前         |                 |  |            |              | ○       | ○        |
| 関東・東海                               | 早○<br>普○ | ○2                 | ○    | ○2         | ○2           | ○2   |        |      | ○発生<br>期   | ○再生<br>前～始 | ○前              |  |            |              | ○       | ○        |
| 近・中・四                               | 早●<br>普○ | ○2.5               | ○    | ○2         | ○2           | ○2   |        |      | ●発生<br>期   | ○再生<br>前～始 | ○前              |  | +5～ノビエ2.5L |              | ●       | ○        |
| 九州                                  | 早○<br>普○ | ○2                 | ○    | ○2         | ○2           | ○2   |        |      | ○発生<br>期   | ○再生<br>前～始 | ○前              |  | +5～ノビエ2L   |              | ○       | ○        |
| 使用上の注意:(28)(34)(45)(47) 減水深:2cm/日以下 |          |                    |      |            |              |      |        |      |            |            |                 |  |            |              |         |          |

## Ⅶ

NC-391Q ジャンボ

| 地域名                                 |         | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>タカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期     | 使用量          | 砂<br>壌<br>土 | 埴<br>土<br>～<br>埴<br>土 |
|-------------------------------------|---------|-----|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|----------|--------------|-------------|-----------------------|
| 北海道                                 |         | ○2  | ○                 | ○始   | ○始         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +5～ノビエ2L | 30g×1コ<br>/a | ●           | ○                     |
| 東北                                  |         | ○2  | ○                 | ○2   | ○始         | ○2         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |          |              | ●           | ○                     |
| 北陸                                  |         | ○2  | ○                 | ○2   |            | ○始         | ○始   |       |      |          | ○再生<br>前～始 |                 |          |              |             | ○                     |
| 関東・東海                               | 早<br>普○ | ○2  | ○                 | ○2   |            | ○始         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |          |              | ●           | ○                     |
| 近・中・四                               | 早<br>普○ | ○2  | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ●発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |          |              |             | ○                     |
| 九州                                  | 早<br>普○ | ○2  | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |          |              | ○*          | ○                     |
| *:砂埴土は早期を除く(九州)                     |         |     |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |              |             |                       |
| 使用上の注意:(28)(34)(45)(47) 減水深:2cm/日以下 |         |     |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |              |             |                       |

## Ⅶ

NCH-903DEH ジャンボ

| 地域名                                 |          | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>タカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期     | 使用量          | 砂<br>壌<br>土 | 壤<br>土<br>～<br>埴<br>土 |   |
|-------------------------------------|----------|-----|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|----------|--------------|-------------|-----------------------|---|
| 北海道                                 |          | ○2  | ○                 | ○始   | ○始         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  | +5～ノビエ2L | 40g×1コ<br>/a |             | ○                     |   |
| 東北                                  |          | ○2  | ○                 | ○2   | ○始         | ○2         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |  |          |              |             |                       | ○ |
| 北陸                                  |          | ○2  | ○                 | ○始   |            | ○始         | ○始   |       |      |          | ○再生<br>前～始 |                 |  |          |              |             |                       | ○ |
| 関東・東海                               | 早<br>普○  | ○2  | ○                 | ○2   |            | ○始         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  |          |              |             |                       | ○ |
| 近・中・四                               | 早●<br>普○ | ○2  | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○始   |       |      | ●発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |  |          |              |             |                       | ○ |
| 九州                                  | 早<br>普○  | ○2  | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |  |          |              |             | ○                     | ○ |
| 使用上の注意：(28)(34)(45)(47) 減水深：2cm/日以下 |          |     |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          |              |             |                       |   |

Ⅶ NH-101 ジャンボ 「継」

## Ⅶ

NH-805 ジャンボ

| 地域名                         |        | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期     | 使用量          | 砂<br>壌<br>土 | 埴<br>土<br>～<br>埴<br>土 |   |
|-----------------------------|--------|-----|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|----------|--------------|-------------|-----------------------|---|
| 北海道                         |        | ○2  | ○                  | ○始   | ●始         |            | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  | +5～ノビエ2L | 50g×1コ<br>/a |             | ○                     |   |
| 東北                          |        | ○2  | ○                  | ○2   | ●始         | ○2         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ●前              |  |          |              |             | ○                     | ○ |
| 北陸                          |        |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          |              |             |                       |   |
| 関東・東海                       | 早<br>普 |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          |              |             |                       |   |
| 近・中・四                       | 早<br>普 |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          |              |             |                       |   |
| 九州                          | 早<br>普 |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          |              |             |                       |   |
| 使用上の注意：(45)(47) 減水深：2cm/日以下 |        |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          |              |             |                       |   |

## VII

NH-806 シャンボ

| 地域名                                 | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズカヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期                        | 使用量          | 砂<br>壤<br>土 | 埴<br>土 |   |
|-------------------------------------|----------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|-----------------------------|--------------|-------------|--------|---|
| 北海道                                 |          |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  | +5～ノビエ2L                    | 50g×1コ<br>/a |             |        |   |
| 東北                                  |          |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |                             |              |             |        |   |
| 北陸                                  | ○2       | ○                  | ○2   |            | ○始         | ○2   |       |      |          | ●再生<br>前～始 | ○前              |  |                             |              |             |        | ○ |
| 関東・東海                               | 早○<br>普○ | ○2                 | ○    | ○2         |            | ○始   | ○始    |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  |                             |              |             |        | ○ |
| 近・中・四                               | 早○<br>普○ | ○2.5               | ○    | ○2         |            | ○2   | ○2    |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  | +5～ノビエ2.5L                  |              |             | ○      |   |
| 九州                                  | 早○<br>普○ | ○2.5*              | ○    | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  | +5～ノビエ2.5L(*:<br>早期は～ノビエ2L) |              | ○           | ○      |   |
| 使用上の注意:(28)(34)(45)(47) 減水深:2cm/日以下 |          |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |                             |              |             |        |   |

## VII

ONC-381 シャンボ (H11まで NC-381 シャンボ)

| 地域名                                 | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロク'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期     | 使用量          | 砂<br>壤<br>土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------------------------------------|----------|--------------------|------|------------|-------------|------|--------|------|----------|------------|-----------------|----------|--------------|-------------|---------------|
| 北海道                                 | ○2       | ○                  | ○始   | ○前         |             | ○始   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +5～ノビエ2L | 30g×1コ<br>/a |             | ○             |
| 東北                                  | ○2       | ○                  | ○2   | ●始         | ○2          | ○始   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | タコキ:子葉期         |          |              |             | ○             |
| 北陸                                  | ○2       | ○                  | ○2   |            | ○始          | ○始   |        |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |          |              | ●           | ○             |
| 関東・東海                               | 早○<br>普○ | ○2                 | ○    | ○2         |             | ○始   | ○始     |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |          |              | ●           | ○             |
| 近・中・四                               | 早●<br>普○ | ○2                 | ○    | ○2         |             | ○2   | ○2     |      | ●発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |          |              | ●           | ○             |
| 九州                                  | 早●<br>普○ | ○2                 | ○    | ○2         |             | ○2   | ○始     |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ●前              |          |              | ○           | ○             |
| 使用上の注意:(28)(34)(45)(47) 減水深:2cm/日以下 |          |                    |      |            |             |      |        |      |          |            |                 |          |              |             |               |

## VII

SB-554 シャンボ

| 地域名                                 | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロク'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期         | 使用量          | 砂<br>壤<br>土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------------------------------------|----------|--------------------|------|------------|-------------|------|--------|------|----------|----|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 北海道                                 |          |                    |      |            |             |      |        |      |          |    |                 |              | 50g×1コ<br>/a |             |               |
| 東北                                  |          |                    |      |            |             |      |        |      |          |    |                 |              |              |             |               |
| 北陸                                  |          |                    |      |            |             |      |        |      |          |    |                 |              |              |             |               |
| 関東・東海                               | 早普       |                    |      |            |             |      |        |      |          |    |                 |              |              |             |               |
| 近・中・四                               | 早●<br>普○ | ○1                 | ○    | ○始         |             | ○前   | ●前     |      | ●発生<br>期 |    |                 | +1～+5(ノビエ1L) |              | ●           | ○             |
| 九州                                  | 早●<br>普● | ●1.5               | ●    | ●始         |             | ●前   | ●前     |      | ●発生<br>期 |    |                 | +1～ノビエ1.5L   |              | ●           | ●             |
| 使用上の注意:(28)(34)(45)(47) 減水深:2cm/日以下 |          |                    |      |            |             |      |        |      |          |    |                 |              |              |             |               |

VII SL-954 シャンボ 「継」

VII SW-011P5⑩ シャンボ 「継」

VII SW-011P5⑪ シャンボ 「継」

## Ⅶ

SW-952P5⑩ シャンボ

| 地域名                         | ノビエ    | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |                  | 処理時期     | 使用量           | 砂<br>壌<br>土 | 壤土<br>へ<br>殖土 |
|-----------------------------|--------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------------|----------|---------------|-------------|---------------|
| 北海道                         | ○2     | ○                 | ○始   | ○始         |            | ○始   |       | ●前   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | エゾノサヤスカク<br>サ:2L | +3～ノビエ2L | 35g×1コ<br>/2a |             | ○             |
| 東北                          | ○2     | ○                 | ○2   | ●始         | ○2         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | シズイ:発生始<br>～3cm  |          |               | ●           | ○             |
| 北陸                          |        |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                  |          |               |             |               |
| 関東・東海                       | 早<br>普 |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                  |          |               |             |               |
| 近・中・四                       | 早<br>普 |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                  |          |               |             |               |
| 九州                          | 早<br>普 |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                  |          |               |             |               |
| 使用上の注意:(45)(47) 減水深:2cm/日以下 |        |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                  |          |               |             |               |

## Ⅶ

SW-952P5⑪ シャンボ

| 地域名                                 | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期     | 使用量           | 砂<br>壌<br>土 | 壤土<br>へ<br>殖土 |
|-------------------------------------|----------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|----------|---------------|-------------|---------------|
| 北海道                                 |          |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          | 35g×1コ<br>/2a |             |               |
| 東北                                  |          |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          |               |             |               |
| 北陸                                  | ○2       | ○                 | ○2   | ○始         | ○2         | ○2   |       |      | ●発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |  | +3～ノビエ2L |               | ●           | ○             |
| 関東・東海                               | 早●<br>普○ | ○2                | ○    | ○2         |            | ○2   | ○2    |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  |          |               | ●           | ○             |
| 近・中・四                               | 早●<br>普○ | ○2                | ○    | ○2         |            | ○2   | ○2    |      | ●発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  |          |               | ●           | ○             |
| 九州                                  | 早●<br>普○ | ○2                | ○    | ○2         |            | ○2   | ○2    |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ●前              |  |          |               | ○           | ○             |
| 使用上の注意:(28)(34)(45)(47) 減水深:2cm/日以下 |          |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          |               |             |               |

Ⅶ TH-005 シャンボ 「継」

## Ⅶ

TH-913CS シャンボ

| 地域名                                 | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期     | 使用量          | 砂<br>壌<br>土 | 壤土<br>へ<br>殖土 |
|-------------------------------------|----------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|----------|--------------|-------------|---------------|
| 北海道                                 | ○2       | ○                 | ○始   | ○始         |            | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  | +3～ノビエ2L | 50g×1コ<br>/a | ○           | ○             |
| 東北                                  | ○2       | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  |          |              |             | ○             |
| 北陸                                  | ○2       | ○                 | ○2   | ○始         | ○始         | ○2   |       |      |          | ●再生<br>前～始 | ○前              |  |          |              | ●           | ○             |
| 関東・東海                               | 早●<br>普○ | ○2                | ○    | ○2         |            | ○2   | ○2    |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  |          |              |             | ○             |
| 近・中・四                               | 早●<br>普○ | ○2                | ○    | ○2         |            | ○2   | ○始    |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  |          |              | ○           | ○             |
| 九州                                  | 早●<br>普○ | ○2                | ○    | ○2         |            | ○2   | ○2    |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  |          |              | ○           | ○             |
| 使用上の注意:(34)(41)(45)(47) 減水深:2cm/日以下 |          |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          |              |             |               |

VII

THI-913CS ジャンボ

| 地域名                                 | ノビエ    | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期     | 使用量          | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------------------------------------|--------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 北海道                                 |        |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          | 50g×1コ<br>/u |         |               |
| 東北                                  |        |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |              |         |               |
| 北陸                                  |        |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |              |         |               |
| 関東・東海                               | 早<br>普 |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |              |         |               |
| 近・中・四                               | 早<br>普 |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |              |         |               |
| 九州                                  | 早<br>普 | ●2                | ●    | ●2         | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | +3～ノビエ2L |              | ●       | ●             |
| 使用上の注意:(28)(34)(45)(47) 減水深:2cm/日以下 |        |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |              |         |               |

VII NBA-093(改) ジャンボ 「継」

IX 一年生持続型除草剤

IX HOK-991 ジャンボ 「継」

IX

SW-965 ジャンボ

| 地域名                         |        | ノビエ    | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期     | 使用量          | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-----------------------------|--------|--------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|-------|----|-----------------|--|----------|--------------|---------|---------------|
| 北海道                         |        | ○2     | ○                 | ○始   | ○始         |            | ○始   |       |      |       |    |                 |  | +3～ノビエ2L | 50g×1コ<br>/a | ○       | ○             |
| 東北                          |        | ○2     | ○                 | ○2   | ○始         |            | ○始   |       |      |       |    |                 |  |          |              | ○       | ○             |
| 北陸                          |        | ○2     | ○                 | ○2   |            |            | ○2   |       |      |       |    |                 |  |          |              | ●       | ○             |
| 関東・東海                       | 早<br>普 | ○2     | ○                 | ○始   |            |            | ○始   |       |      |       |    |                 |  |          |              | ○       | ○             |
|                             | 早<br>普 | ○2     | ○                 | ○始   |            |            | ○始   |       |      |       |    |                 |  |          |              | ○       | ○             |
| 九州                          |        | 早<br>普 | ○2                | ○    | ○2         |            | ○2   |       |      |       |    |                 |  |          |              | ○       | ○             |
| 使用上の注意:(45)(47) 減水深:2cm/日以下 |        |        |                   |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |          |              |         |               |

IX

SB-533P5 ジャンボ

| 地域名                                 | ノビエ      | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期       | 使用量           | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------------------------------------|----------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|----|-----------------|--|------------|---------------|---------|---------------|
| 北海道                                 | ○1.5     | ○                 | ○始   | ○始         |            |      |       |      | ●発生<br>期 |    |                 |  | +1～ノビエ1.5L | 30g×1コ<br>/2a |         | ○             |
| 東北                                  | ○1.5     | ○                 | ○始   |            | ○始         |      |       |      | ●発生<br>期 |    |                 |  |            |               |         | ○             |
| 北陸                                  | ○1.5     | ○                 | ○始   |            | ○始         |      |       |      | ●発生<br>期 |    |                 |  |            |               | ●       | ○             |
| 関東・東海                               | 早●<br>普○ | ○1.5              | ○    | ○始         | ○始         |      |       |      |          |    |                 |  |            |               | ○       | ○             |
| 近・中・四                               | 早●<br>普○ | ○1.5              | ○    | ○始         | ○始         |      |       |      |          |    |                 |  |            |               | ●       | ○             |
| 九州                                  | 早●<br>普○ | ○1.5              | ○    | ○始         | ○始         |      |       |      |          |    |                 |  |            |               | ○       | ○             |
| 使用上の注意:(34)(41)(45)(47) 減水深:2cm/日以下 |          |                   |      |            |            |      |       |      |          |    |                 |  |            |               |         |               |

|                    |
|--------------------|
| 水稲関係除草剤使用基準の表示について |
|--------------------|

1. 過年度、既に実用化の認められている作期・適用草種・土壌条件に○を印した。  
 (本年度の試験の結果、特に拡大のない場合も含む)  
 草種欄の数字、字句で草種ごとの葉齢を示した。  
 [例：○始(発生始)、○2(2葉期まで)]  
 使用上の注意は別途一覧表の番号で記し、一覧表にない注意事項の場合は  
 字句を備考欄に記載した。
2. 本年度、新たに使用基準が作成された場合は、実用化可能となった作期・適用草種・土壌に●を印し、処理時期および使用量を記載した。
3. Ⅲ(不耕起直播), IV, V, VIの試験区分において、地域名の○は、前年度までに実用化の認められている地域を示し、●は本年度新たに実用化の認められた地域を示した。
4. 過年度の基準に適用条件拡大が可能となった場合、  
 作 期 の 拡 大：拡大可能となった作期に●を印した。  
 草 種 の 拡 大：拡大可能となった草種に●を印した。  
 葉 齢 の 拡 大：拡大可能となった葉齢に、アンダーラインを付した。  
 (例：○2.5)  
 処理時期、使用量の拡大：拡大内容のある部分にアンダーラインを付した。  
 土 壌 条 件 の 拡 大：拡大可能となった土壌に●を印した。
5. 「継」、「継?」、「中止」の場合は判定のみ記載した。

## 使用上の注意一覧

- (1) 低気温及び低水温は薬害の危険性があるので使用はさける。
- (2) 処理後2日以内に低温や降雨が予想される場合は使用をさける。
- (3) ごく浅植えの場合、薬害のおそれがあるので注意する。
- (4) 移植後の深水はさける。
- (5) 深水での処理はさける。
- (6) 散布は水稻になるべくかからないようにする。
- (7) 著しい高温条件下の時は、砂壤土ではクロロシスの発生が著しいので注意する。
- (8) トリアジン系除草剤の使用上の注意を守る。
- (9) MCP混合剤の注意事項を守る。
- (10) 処理後の灌水は48～72時間経過後に行う。
- (11) 処理後2日以内に降雨が予想される場合は使用をさしひかえる。
- (12) 落水もしくは浅水で使用する。
- (13) ミズガヤツリの多い水田では早めに散布する。
- (14) ミズガヤツリに対し遅い処理では、400g/aを処理する。
- (15) ホタルイ、ミズガヤツリ優占圃場では、400g/aで処理する。
- (16) ホタルイ多発田では早めに使用する。
- (17) 泥炭質土壤では、ウリカワに対する効果が低下することがある。
- (18) コナギ多発田では早めに処理する。
- (19) 一年生広葉雑草多発田では400g/aとし、特にヒメシソハギが多発する水田での使用はさける。
- (20) クログワイ防除はクログワイに有効な前処理剤との組み合わせで使用する。
- (21) 前処理剤との組み合わせで使用する。
- (22) 希釈水量は出来るだけ少なく茎葉に付着するように散布する。
- (23) ノリ面散布は避ける。
- (24) 流入、飛散等による水稻への薬害に注意する。
- (25) 周辺の作物に飛散しないように注意する。
- (26) 植付精度不良で根が露出する水田では使用しない。
- (27) ホタルイ多発田では、ホタルイに有効な中・後期剤との組み合わせで使用する。
- (28) 著しい多雨条件では除草効果が低下する場合があるので使用はさしひかえる。
- (29) コウキヤガラに有効な中・後期剤との組み合わせで使用する。
- (30) 水稻が水面に抽出してから使用する。
- (31) 短小苗、深水条件での使用はさける。
- (32) クログワイ防除はクログワイに有効な後期剤との組み合わせで使用する。
- (33) 広葉多発田での使用はさける。
- (34) 田植前に生育したミズガヤツリは、完全に防除してから使用する。
- (35) マツバイ多発田での使用はさける。
- (36) コウキヤガラ防除は、コウキヤガラに有効な剤との組み合わせで使用する。
- (37) クログワイ防除の場合、同一成分含有薬剤を初期剤として使用しないこと。
- (38) オモダカ防除は、オモダカに有効な剤との組み合わせで使用する。
- (39) ミズガヤツリ防除は、ミズガヤツリに有効な前処理剤との組み合わせで使用する。
- (40) シズイ防除は、シズイに有効な剤との組み合わせで使用する。
- (41) 散布後24時間以内から1日50mm以上の降雨が連続することが予想される場合は使用を差し控える。
- (42) クログワイ防除は、クログワイに有効な剤との組み合わせで使用する。
- (43) エゾノサヤヌカグサ防除は、エゾノサヤヌカグサに有効な剤との組み合わせで使用する。
- (44) クサネムが残草または後発生した場合は有効な後期剤を散布する。
- (45) 水深5～6cmの湛水条件で投入し、少なくとも1日間は十分な水位を維持する。
- (46) 移植前処理は田面水が澄んでから投入する。
- (47) 藻類または表層剥離の発生しやすい水田では有効な剤との体系で使用する。
- (48) 散布に均一性を必要としない。湛水周縁部散布は、藻類・表層剥離などの浮遊物のない条件で、田面の露出しない十分な水深で行う。
- (49) 畦畔から本田に侵入したキシウスズメノヒエには全体にかける。