

新 登 録 除 草 剤 一 覧

農林水産省生産局生産資材課

平成13年11月1日～平成14年3月31日

(1) 移植水稻

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使用時期	10a 当り 使用量	使用方法	登録会社
オキシジクロメ ボン・クロメア ロップ・ビラ ゾスルフロネ チル水和剤	トレディアフラ ス顆粒	3-[1-(3,5-ジクロ ロフェニル)-1-メチルエチ ル]-3,4-ジヒドロ 6-メチル-5-フェニル-2 H-1,3-オキサゾール-4 -オン・・・7.5% (RS)-2-(2,4-ジ クロロ- <i>m</i> -トリルオキシ) プロピオンニトリル・・・ 44.0% エチル=5-(4,6-ジメ トキシビリジン)-2-イ ルカルホモイルスルファマイ ド)-1-メチルピラゾール- 4-カルボキシラート・・・ 2.6%	水和 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツバ、イ ネタリイ、 ウリカワ、 ミズガヤツリ (北海道 を除く)、 ヘラオモタカ (北海道、 東北)、 ヒルムシロ (近畿・中 国・四国 を除く)、 セリ、 アオミドロ、 藻類によ る表層は く離 (九州を 除く)	北海道	壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下 但し、 埴土は 1.5cm/ 日以下	移植後 5～ 20日 (/ビエ2.5 薬期まで)	80g 希釈水量 500ml	湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 オキシジクロメ ボンを含む農薬 の総使用回 数1回 クロメアロップ を含む農薬 の総使用回 数2回以内 ビラゾスルフロ ネチルを含む農 薬の総使用 回数1回	日産化学 工業(株) アベントリス クロップサイ エンスオパキ (株)、 全国農業 協同組合 連合会
						東北	埴壤土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下	移植後 5～ 15日 (/ビエ2.5 薬期まで)			
						関東・ 東山・ 東海の 普通期 栽培地 帯	埴壤土 ～埴土 減水深 1.5cm/ 日以下				
						関東・ 東山・ 東海の 早期裁 培地帯	埴壤土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下				
						近畿・ 中国・ 四国の 普通期 栽培地 帯	埴土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下				
						九州の 普通期 栽培地 帯	砂壤土 ～埴土 減水深 1.5cm/ 日以下 但し、 砂壤土 は1cm/ 日以下				
オキシジクロメ ボン・クロメア ロップ・ビラ ゾスルフロネ チル粒剤	トレディアフラ ス1キロ粒剤	3-[1-(3,5-ジクロ ロフェニル)-1-メチルエチ ル]-3,4-ジヒドロ 6-メチル-5-フェニル-2 H-1,3-オキサゾール-4 -オン・・・0.80% (RS)-2-(2,4-ジ クロロ- <i>m</i> -トリルオキシ) プロピオンニトリル・・・ 3.5% エチル=5-(4,6-ジメ トキシビリジン)-2-イ ルカルホモイルスルファマイ ド)-1-メチルピラゾール- 4-カルボキシラート・・・ 2.6%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツバ、イ ネタリイ、 ウリカワ、 ミズガヤツリ (北海道 を除く)、 ヘラオモタカ (北海道、 東北)、 ヒルムシロ (近畿・中 国・四国 を除く)	北海道	壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下 但し、 埴土は 1.5cm/ 日以下	移植後 5～ 20日 (/ビエ2.5 薬期まで)	1kg	湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 オキシジクロメ ボンを含む農薬 の総使用回 数1回 クロメアロップ を含む農薬 の総使用回 数2回以内 ビラゾスルフロ ネチルを含む農 薬の総使用 回数1回	日産化学 工業(株) アベントリス クロップサイ エンスオパキ (株)、 全国農業 協同組合 連合会
						東北	埴壤土 ～埴土 減水深 1.5cm/ 日以下	移植後 5～ 15日			

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
つづき		ル-4-カルボキシアート・ ・0.30%			を除く) り、 アオミドロ・ 藻類による表層はく離 (関東・東 山・東海 を除く)		減水深 2cm/日 以下	(ハ)エ2.5 葉期まで)		エチルを含む農 薬の総使用 回数1回	
						関東・東 山・東海 の普通期 栽培地帯	壤土 ～埴土 減水深 1.5cm/ 日以下				
						近畿・中 国・四 国の普通 期栽培地 帯	埴土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下				
オキサジクロメ ホソ・クロメフ ロップ・シハロ ホップ・ブチル ・ビラゾスル フロネチル粒 剤	トレデ'イワイ ト'1キロ粒 剤	3-[1-(3,5-シ'クロ ロフェニル)-1-メチルエチ ル]-3,4-シ'ヒト'ロ- 6-メチル-5-フェニル-2 H-1,3-オキサジ'ン-4 -オン・0.60% (RS)-2-(2,4-シ' クロロ-メトリルオキシ) ブ'ロビ'オンア'ニト'・ 3.5% ブ'チル=(R)-2-[4- (4-シア'ノ-2-フルオロフ ェノキシ)フェニル]ブ'ロ ビ'オナト'・1.5% エチル=5-(4,6-シ'メ トキシビ'リミジ'ン-2-イ ルカルハ'モイルスル'フア'イ ル)-1-メチルビ'ラゾ'- ル-4-カルボ'キシアート ・0.30%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツバ'イ、 オタ'イ、 ウリ'カ、 ミ'カ'ヤツリ (北海道 を除く)、 ヘラモ'ダ'カ (北海道、 東北)、 ヒルムシロ (近畿・中 国・四国 を除く) り、 アオミドロ・ 藻類による 表層はく離 (関東・東 山・東海、 九州を除 く)	北海道	埴壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下	移植後 5～ 25日 (ハ)エ3葉 期まで)	1kg	湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 オキサジ'クロメ'ホ ソを含む農薬 の総使用回 数1回 クロメフ'ロップ' を含む農薬 の総使用回 数2回以内 シハロホ'ップ'ブ'チル を含む農薬 の総使用回 数3回以内 ビラゾ'スル'フロ ネチルを含む農 薬の総使用 回数1回	日産化学 工業(株) アベンティ ス クロップ'サイ エンス'シオ'ナ'キ' (株)、 全国農業 協同組合 連合会、 タ'カ'キ'ニ'ニ 日本(株)
						東北	埴壤土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下	移植後 5～ 20日 (ハ)エ3葉 期まで)			
						北陸、 関東・東 山・東海 の普通期 栽培地帯	埴土 ～埴土 減水深 1.5cm/ 日以下				
						近畿・中 国・四 国の普通 期栽培地 帯	埴土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下				
						九州の 普通期 栽培地 帯	砂壤土 ～埴土 減水深 1.5cm/ 日以下 但し、 砂壤土 は1cm/ 日以下				
インダ'ノファン ・ビラゾ'スル フロネチル ・ブ'ロモブ'チ ト'粒剤	キリダ'グ'エス ジ'ヤンホ'	(RS)-2-[2-(3-ク ロロフェニル)-2,3-エ ポ'キシブ'ロビ'ル]-2- エチルインダ'ノ'-1,3- ジ'オン・4.0% エチル=5-(4,6-シ'メ トキシビ'リミジ'ン-2-イ ルカルハ'モイルスル'フア'イ ル)-1-メチルビ'ラゾ'- ル-4-カルボ'キシアート ・70% (RS)-2-ブ'ロモ-N- (α,α-シ'メチルハ'	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツバ'イ、 オタ'イ、 ウリ'カ、 ミ'カ'ヤツリ (北海道 を除く)、 ヘラモ'ダ'カ (北海道、 東北)、 ヒルムシロ (北陸、近	北海道	埴壤土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下	移植後 5～ 15日 (ハ)エ2葉 期まで)	小包装10個 (300g)	水田に小包装 のまま投げ入 れる 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 インダ'ノファン を含む農薬 の総使用回 数2回以内 ビラゾ'スル'フロ ネチルを含む農	日産化学 工業(株) 三菱化学 (株)、 八洲化学 工業(株)
						東北	埴土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下				

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 地	適 用 土	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	登録会社
つづき		シジ'ル)-3, 3-ジ'メ ル'チル'アミト'... 20.0%			畿・中国・ 四国を除く) せ(北陸 を除く)、 アミト'ロ・ 藻類によ る表層は く離 (北海道、 関東・東 山・東海、 九州)	北陸・ 関東・ 東山・ 東海の 普通期 栽培地 帯	壤土 ～壇土 減水深 2cm/日 以下	移植後 5～ 12日 (/ヒ'エ2葉 期まで)		薬の総使用 回数1回 プロモ'チト'を 含む農薬の 総使用回数 1回	
						近畿・ 中国・ 四国の 普通期 栽培地 帯	壇土 ～壇土 減水深 1cm/日 以下				
						九州の 普通期 栽培地 帯	砂壇土 ～壇土 減水深 1.5cm/ 日以下				
シハロップ 'チル'ヒ'ラ 'スル'フロン 'エ 'チル'フ'ロモ 'チト'・メ 'エナセト粒 '剤	リボ'ルハ'ー 'ス1キロ粒 '剤	フ'チル=(R)-2-[4- (4-シ'ア)-2-フル'オ 'フ'エ'キシ]フ'エ'キシ]フ'ロ 'ビ'オ'ート...1.5% エ'チル=5-(4, 6-シ'メ 'トキシ'リ'シ'ン-2-イ 'ル'カルハ'モイル'スル'フ'アモイ 'ル)-1-メ'チル'ビ'ラソ'ー 'ル-4-カル'ホ'キシラート・ ...0.30% (RS)-2-フ'ロモ'N- (α, α-ジ'メ'チル'ハ 'ン'シ'ル)-3, 3-ジ'メ 'ル'フ'チル'アミト'... 6.0% 2-ヘ'ン'ソ'チ'アソ'ー'ル- 2-イル'オキシ'N-メ'チル'ア 'セト'ア'ニト'...7.5%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草 び'マツ'ハイ 'ネ'ル'イ、 'ウ'リ'ウ'リ、 'ミ'カ'ヤツリ (北海道 を除く) ヘ'ラ'オモ'ガ'カ 'ヒ'ル'ム'シ'ロ、 'セ'リ、 'ア'ミト'ロ・ 藻類に る表層 く離	北海道	壇土 ～壇土 減水深 2cm/日 以下 但し、 壇土は 1.5cm/ 日以下	移植後 5～ 25日 (/ヒ'エ3葉 期まで)	1kg	湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 シハロップ'フ'チル を含む農薬 の総使用回 数3回以内 ビ'ラソ'スル'フ'ロ 'ン'エ'チル'を含む農 薬の総使用 回数1回 プロモ'チト'を 含む農薬の 総使用回数 1回 メ'エナセトを 含む農薬の 総使用回数 2回以内	日産化学 工業(株)
						東北	壇壇土 ～壇土 減水深 1.5cm/ 日以下	移植後 5～ 20日 (/ヒ'エ3葉 期まで)			
ブ'レ'チ'ラ'クロ 'ル'乳'剤	エリ'シ'ヤン'EW '乳'剤	2-クロ'ロ-2', 6'-ジ' 'エ'チル'N-(2-フ'ロ'ホ' 'キシ'エ'チル)ア'セト'ア'ニト' ...37.0%	乳 剤	移植水稻	水田一年 生雑草 び'マツ'ハイ 'ネ'ル'イ、 'ミ'カ'ヤツリ (東北・北 陸・近畿・ 中国・四 国・九州)	北海道	壇土 ～壇土 減水深 2cm/日 以下 但し、 壇土は 1.5cm/ 日以下	移植直後 ～移植後 5日 (/ヒ'エ1葉 期まで)	100ml 希釈水量 500ml	湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 ブ'レ'チ'ラ'クロ'ル を含む農薬 の総使用回 数2回以内	シン'ジ'エン タ'ジ'ヤ'バン (株)
						東北	壇壇土 ～壇土 減水深 2cm/日 以下	植代後 ～移植前 4日 又は 移植直後 ～移植後 5日 (/ヒ'エ1葉 期まで)			
						北陸	壇土 ～壇土 減水深 1.5cm/ 日以下				
						関東・ 東山・	砂壇土 ～壇土				

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	登録会社
つづき						東海の 普通期 栽培地 帯	減水深 2cm/日 以下				
						関東・ 東山・ 東海の 早期裁 培地帯	砂壌土 ～壇土 減水深 1cm/日 以下				
						近畿・ 中国・ 四国の 普通期 栽培地 帯	壇土 ～壇土 減水深 1cm/日 以下				
						九州の 普通期 及び早 期栽培 地帯	砂壌土 ～壇土 減水深 1.5cm/ 日以下				
オキサシ・クロメ ボン・クロメア ロップ・ヘン スルフロンメチル 粒剤	ミスターホーム ン・シ・ヤンホ	3-[1-(3, 5-ジ・クロ ロフェニル)-1-メチルエチ ル]-3, 4-ジ・ヒト・ロー 6-メチル-5-フェニル-2 H-1, 3-オキサシ・ソ-4 -オン・・・1.6% (RS)-2-(2, 4-ジ・ クロロ-m-トリルオキシ) フ・ロヒ・オンアニト・・・ 7.0% メチル=α-(4, 6-ジ・ メトキシビ・リミシ・ソ-2- イルカルバ・モイルスルファモ イル)-オトリフト・・・ 1.02%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツバ・イ、 おカキ、 ワカバ、 ヒルムシロ (関東・東 山・東海 の普通 期、九州) サリ(関東・ 東山・東 海、九州) アオミドロ・ 藻類によ る表層は く離 (関東・東 山・東海 の普通 期、近畿・ 中国・四 国の普通 期)	北陸	壇土 ～壇土 減水深 1.5cm/ 日以下	移植後 3～ 10日 (/ヒ・エ2葉 期まで)	小包装10個 (500g)	水田に小包装 のまま投げ入 れる 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 オキサシ・クロメ アロップ を含む農薬 の総使用回 数1回 クロメア ロップ を含む農薬 の総使用回 数2回以内 ヘンスルフロ ンメチル を含む農薬 の総使用回 数2回以内	北興化学 工業(株) デュボン (株)、 全国農業 協同組合 連合会
ヘンスルフロ ンメチル・ヘン チオカーブ・メ ア	ウルフエース シ・ヤンホ	メチル=α-(4, 6-ジ・ メトキシビ・リミシ・ソ-2- イルカルバ・モイルスルファモ イル)-オトリフト・・・ 1.02%	剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツバ・イ、	北海道	壇土 ～壇土	移植後 3～ 15日	小包装10個 (350g)	水田に小包装 のまま投げ入 れる	クミアイ 化学工業 (株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10 a 当り使用量	使用方法	登録会社
エナセット剤		イル-オートルート・・・2.15% S-(4-クロロベンジル)-N,N-ジエチルチオカーバメート・・・43.0% 2-ベンゾチアゾール-2-イルオキシ-N-メチルアセトニリド・・・13.0%			ホタルイ、 グリカ、 ミスカヤツリ (東北)、 ヘラモカ、 ヒルムシロ、 セリ、 アオミドロ・藻類による表層剥離		減水深 2cm/日 以下 但し、 壤土は 1.5cm/日 以下	(/ビ'エ2葉期まで)		本剤のみを使用する場合の使用回数1回 ベンソフロノメチルを含む農薬の総使用回数2回以内 ベンチカーブを含む農薬の総使用回数1回 メナセットを含む農薬の総使用回数2回以内	
ベンスルフロノメチル・ベンチカーブ・メナセット剤	ウルフェスジヤン	メチル-α-(4,6-ジメトキシビリジ)ン-2-イルカルバモイルスルファモイル-オートルート・・・1.45% S-(4-クロロベンジル)-N,N-ジエチルチオカーバメート・・・43.0% 2-ベンゾチアゾール-2-イルオキシ-N-メチルアセトニリド・・・8.6%	剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバ、 ホタルイ、 グリカ、 ミスカヤツリ ヒルムシロ (北陸を除く)、 セリ、 アオミドロ・藻類による表層剥離	北陸	壇壤土～壇土 減水深 1.5cm/日以下	移植後 3～12日 (/ビ'エ2葉期まで)	小包装10個(350g)	水田に小包装のまま投げ入れる 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 ベンソフロノメチルを含む農薬の総使用回数2回以内 ベンチカーブを含む農薬の総使用回数1回 メナセットを含む農薬の総使用回数2回以内	クミアイ化学工業(株)
						関東・東山・東海の普通期栽培地帯	壇土～壇土 減水深 2cm/日以下	移植後 5～12日 (/ビ'エ2葉期まで)			
						近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	壇土～壇土 減水深 1.5cm/日以下				
						九州の普通期栽培地帯	砂壇土～壇土 減水深 1.5cm/日以下				
テニクロール・ビラゾスルフロネチル・ビラゾチカルブ粒剤	たんぽにボシヤン	2-クロロ-N-(3-メキシ-2-テニル)-2',6'-ジメチルアセトニリド・・・6.7% エチル=5-(4,6-ジメトキシビリジ)ン-2-イルカルバモイルスルファモイル-1-メチルビラゾール-4-カルボキシラート・・・0.70% O-3-tert-ブチルフェニル=6-メトキシ-2-ビリジ(メチル)チオカルバメート・・・16.7%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバ、 ホタルイ、 グリカ、 ミスカヤツリ ヒルムシロ (北陸を除く)、 セリ、 アオミドロ・藻類による表層剥離	北海道	壇土～壇土 減水深 2cm/日以下 但し、 壤土は 1.5cm/日以下	移植後 5～15日 (/ビ'エ2葉期まで)	小包装10個(300g)	水田に小包装のまま投げ入れる 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 テニクロールを含む農薬の総使用回数2回以内 ビラゾスルフロネチルを含む農薬の総使用回数1回 ビラゾチカルブを含む農薬の総使用回数2回以内	日産化学工業(株) 大塚化学(株)、 (株)トクヤマ、 大日本インキ化学工業(株)
						東北	壇壤土～壇土 減水深 1cm/日以下				
						北陸、 関東・東山・東海の普通期栽培地帯	壇土～壇土 減水深 1.5cm/日以下	移植後 5～12日 (/ビ'エ2葉期まで)			

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 用 地 帯	適 用 土 壤	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	登録会社
つづき						関東・ 東山・ 東海の 早期栽 培地帯	壇壤土 ～壇土 減水深 1cm/日 以下				
						近畿・ 中国・ 四国の 普通期 栽培地 帯	壇土 ～壇土 減水深 1cm/日 以下				
						九州の 普通期 栽培地 帯	砂壇土 ～壇土 減水深 1.5cm/ 日以下				
カフェンスト ー・ダ [®] イムロ ン・ベン スルフロ ンメチル 粒剤	クサトリエス5 袋Hジ [®] ヤ ン ホ [®]	N, N-ジ [®] エチル-3-メ チルスルホニル-1H-1, 2, 4-トリアゾ [®] -ル-1- カルボキ [®] シミト [®] ... 12.0% 1-(α , α -ジ [®] メチル ベンジ [®] ル)-3-(ハ トリル)尿素... 25.7% メチル= α -(4, 6-ジ [®] メトキシ [®] リジ [®] ン-2- イルカルバ [®] モイルスルファ モイル)-オ [®] トルア [®] ト... 4.3%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツバ [®] イ、 ホタルイ、 ウリカワ、 ミス [®] ガ [®] ヤツリ (東北)、 ヒルムシロ、 ヘラモタ [®] カ (北海道) セリ、 アオミ [®] ロ、 藻類によ る表層剥 離	北海道	壇土 ～壇土 減水深 2cm/日 以下 但し、 壇土は 1.5cm/ 日以下	移植後 3～ 15日 (/ビ [®] エ2葉 期まで)	小包装5個 (175g)	水田に小包装 のまま投げ入 れる 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 カフェンスト ー・ダ [®] イム ロンを含む 農薬の総使 用回数1回 ダ [®] イムロ ンを含む農 薬の総使用 回数3回以 内(本田期は 2回以内) ベンスルフロ ンメチルを 含む農薬の 総使用回数 2回以内	三共(株) デュボン (株)
カフェンスト ー・ダ [®] イムロ ン・ベン スルフロ ンメチル 粒剤	クサトリエス5 袋Lジ [®] ヤ ン ホ [®]	N, N-ジ [®] エチル-3-メ チルスルホニル-1H-1, 2, 4-トリアゾ [®] -ル-1- カルボキ [®] シミト [®] ... 12.0% 1-(α , α -ジ [®] メチル ベンジ [®] ル)-3-(ハ トリル)尿素... 25.7% メチル= α -(4, 6-ジ [®] メトキシ [®] リジ [®] ン-2- イルカルバ [®] モイルスルファ モイル)-オ [®] トルア [®] ト... 2.9%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツバ [®] イ、 ホタルイ、 ウリカワ、 ミス [®] ガ [®] ヤツリ ヒルムシロ、 ヘラモタ [®] カ (北陸)、 近畿・ 中国・ 四国の 普通期 栽培地 帯 (関東・東 山・東海、 九州) セリ、 アオミ [®] ロ、 藻類によ る表層剥 離	北陸、 関東・ 東山・ 東海の 普通期 栽培地 帯	壇土 ～壇土 減水深 2cm/日 以下	移植後 3～ 15日 (/ビ [®] エ2葉 期まで)	小包装5個 (175g)	水田に小包装 のまま投げ入 れる 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 カフェンスト ー・ダ [®] イム ロンを含む 農薬の総使 用回数1回 ダ [®] イムロ ンを含む農 薬の総使用 回数3回以 内(本田期は 2回以内) ベンスルフロ ンメチルを 含む農薬の 総使用回数 2回以内	三共(株) デュボン (株)
プレチラクロ ー・ベン ゾ [®] ビ シクロ ン粒 剤	クサコント5袋 ジ [®] ヤン ホ [®]	2-クロロ-2', 6'-ジ [®] エチル-N-(2-ブ [®] ロホ [®] キシエチル)ア [®] ト [®] ニ [®] リ ト [®] ...26.8% 3-(2-クロロ-4-メ シル ベンジ [®] ル)-2-フ エニ	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツバ [®] イ、 ホタルイ、 ミス [®] ガ [®] ヤツリ (北海道)	北海道	壇土 ～壇土 減水深 2cm/日 以下	移植後 1～ 10日 (/ビ [®] エ1.5 葉期まで)	小包装5個 (150g)	水田に小包装 のまま投げ入 れる 本剤のみを 使用する場 合の使用回	三共(株) (株)エス ・ディー ・エス ・バ [®] イ ・テック

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
つづき		アゼピシロ [3. 2. 1] オクタ-2-エン-4-オノ...13. 4%			を除く)、ヘラオモタカ (北海道)		但し、壤土は 1. 5cm/日以下			数 1 回 アレチクローラを含む農薬の総使用回数 2 回以内 ベンゾピシロンを含む農薬の総使用回数 2 回以内	
						東北	壇壤土 ～壇土 減水深 1cm/日以下				
						北陸	壤土 ～壇土 減水深 1. 5cm/日以下				
						関東・東山・東海の普通期栽培地帯	砂壤土 ～壇土 減水深 2cm/日以下				
						近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	壤土 ～壇土 減水深 1cm/日以下				
						九州の普通期栽培地帯	砂壤土 ～壇土 減水深 1cm/日以下				
カフェンストローラ・シクロスルファミロン・ダ・イムロン粒剤	ネカベシヤンホ	N, N-ジエチル-3-メチルスルホニル-1H-1, 2, 4-トリアゾール-1-カルボキサミド... 4. 2% 1-[2-(シクロプロピルカルボニル)アミノ]スルホニル]-3-(4, 6-ジメトキシピリミジン-2-イル)尿素... 0. 90% 1-(α, α-ジメチルベンジル)-3-(パラトリル)尿素... 9. 0%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及び ビマツバ、イ、ホタルイ、ウリカワ (北海道を除く)、ミズガヤツリ (東北、関東・東山・東海、九州)、ヒルムシロ (関東・東山・東海、九州)	北海道 壇土 ～壇土 減水深 1cm/日以下 東北 壇壤土 ～壇土 減水深 1. 5cm/日以下 関東・東山・東海の普通期栽培地帯 砂壤土 ～壇土 減水深 2cm/日以下 北陸 壤土 ～壇土 減水深	移植後 5 ～ 12 日 (1/2エ1. 5 薬期まで) 移植後 5 ～ 10 日 (1/2エ1. 5 薬期まで) 移植後 5 ～ 12 日 (1/2エ2 薬	小包装10個 (500g)	水田に小包装のまま投げ入れる 本剤のみを使用する場合の使用回数 1 回 カフェンストローラを含む農薬の総使用回数 1 回 シクロスルファミロンを含む農薬の総使用回数 1 回 ダ・イムロンを含む農薬の総使用回数 3 回以内 (本田期は 2 回以内)	ビーエーエスファアロ (株)	

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	登録会社
つづき							1.5cm/ 日以下	期まで			
						近畿・ 中国・ 四国の 普通期 栽培地 帯	壤土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下				
						九州の 普通期 栽培地 帯	砂壤土 ～埴土 減水深 1.5cm/ 日以下				
ビ'ラゾ'スル フロネチル・ビ' リミノ'バ'ックメ チル・ベ'ントキ チゾ'ン水和 剤	デ'ミタス顆 粒	エチル=5-(4,6-ジ'メ トキシビ'リミジ'ン-2-イ ルカルバ'モイルスルファミ ル)-1-メチルビ'ラゾ'- ル-4-カルボ'キシラート・ ...3.5% メチル=2-(4,6-ジ'メ トキシビ'リミジ'ン-2-イ ルオキシ)-6-(1-メトキ シイミエチル)ベ'ンゾ'エ ート...5.0% 3-(4-クロロ-5-シクロ ペンチルオキシ-2-フルオ ロフェニル)-5-イソブ'ロ ビ'リデ'ン-1,3-オキシ リゾ'ン-2,4-ジ'オ ン...33.0%	水 和 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツバ'イ、 ホタルイ、 ウリカワ、 ミス'ガ'ヤツリ (北海道 を除く)、 ヒルムシロ (北陸を 除く)、 セリ(北陸 を除く)、 アオミ'ロ・ 藻類によ る表層剥 離(関東・ 東 山・、東 海、九州 を除く)	北海道	壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下 但し、 埴土は 1.5cm/ 日以下	移植後 5～ 25日 (/ビ'エ3葉 期まで)	60 g 希釈水量 500ml	湛水散布 本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 ビ'ラゾ'スルフロネ チルを含む農 薬の総使用 回数1回 ビ'リミノ'バ'ックメチル を含む農薬 の総使用回 数2回以内 ベ'ントキゾ'ン を含む農薬 の総使用回 数2回以内	日産化学 工業(株) クミアイ 化学工業 (株)
						東北	埴壤土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下	移植後 5～ 20日 (/ビ'エ3葉 期まで)			
						北陸、 関東・ 東山・ 東海の 普通期 栽培地 帯	壤土 ～埴土 減水深 2cm/日 以下				
						近畿・ 中国・ 四国の 普通期 栽培地 帯	壤土 ～埴土 減水深 1cm/日 以下				
						九州の 普通期 栽培地 帯	砂壤土 ～埴土 減水深 1.5cm/ 日以下 但し、 砂壤土 は1cm/ 日以下	移植後 5～ 15日 (/ビ'エ2.5 葉期まで)			

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稻刈後・畑作・野菜作・永年生物・非農耕地対象

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 地	適 用 帯	適 用 土 壤	使用時期	10a 当り 使用量	使用方法	登録会社
グリホサートイソプロピルアミン塩液剤	グリーバース除草スプレー、クサトリセー除草スプレー	イソプロピルアンモニウム-N-(ホスホノメチル)グリホサート・・・1.0%	液剤	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面等	一年生雑草				雑草生育期 (草丈30cm以下)	24～40ml /㎡ (原液散布)	雑草茎葉散布 本剤のみを使用する場合の使用回数3回以内 グリホサートを含む農薬の総使用回数3回以内	(株)マルゼン化工、ニューファム(株)
オキサジアルギル水和剤	フェナックスフロアール	5-tert-ブチル-3-[2,4-ジクロロ-5-(7-プロパ-2-イルオキシ)フェニル]-1,3,4-オキサジアゾール-2(3H)-オン・・・34.5%	水和剤	日本芝	一年生雑草				春期雑草発生前 (芝生育期)	100～200ml 希釈水量 200～300 l	全面土壌散布 本剤のみを使用する場合の使用回数2回以内 オキサジアルギルを含む農薬の総使用回数2回以内	アヘンティスクロップサイエンス(株)
シクロスルフアロン水和剤	タフアルアップDG	1-[2-(シクロプロピルカルボニル)アニリノスルホニル]-3-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イル)尿素・・・66.0%	水和剤	日本芝	畑地一年生広葉雑草				春期芝生育期 (雑草発生前～生育初期)	30～60 g 希釈水量 200～250 l	全面土壌散布 本剤のみを使用する場合の使用回数1回 シクロスルフアロンを含む農薬の総使用回数3回以内	ビーマーエスファクト(株)
ブタミホス乳剤	タフラー乳剤80	既登録薬剤に同じ										住友化学工業(株)

日本帰化植物写真図鑑

清水矩宏・森田弘彦・廣田伸七／編著 B6判 548頁 本体価格 4,300円

●帰化植物630余種を1,700余点のカラー写真で紹介。飼料作物畑の雑草害と対策も解説

ヒエという植物

本書は、ヒエの植物としての側面、農耕地の雑草としての側面、食料としての側面など、多面的にヒエを解説した。15人の専門家が分担執筆。

藪野友三郎／監修
山口 裕文／編集
A5判 208ページ
本体 3,500円

全国農村教育協会
<http://www.zennokyo.co.jp>

〒110-0016 東京都台東区台東1-26-6
TEL03-3833-1821 FAX03-3833-1665