

新 登 録 除 草 剤 一 覧

農林水産省生産局生産資材課

平成14年4月1日～平成14年10月31日

(1) 移植水稻

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
プレチラクロール・ベンゾフェナップ水和剤	ユニハーブフロアブル	2-[4-(2,4-ジクロロ-m-トリエチル)-1,3-ジメチルピラゾール-5-イルオキシ]-4-メチルセトフェノン ・・・20% 2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(2-プロポキシエチル)アセトアニリド ・・・5%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバ、イネ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、(北海道、東北)	全域の普通期栽培地帯及び関東・東山・東海の早期栽培地帯	砂壤土～埴土 減水深2cm/日以下	植代時～移植前4日まで	500mL	原液湛水散布 本剤の使用回数1回 プレチラクロールを含む農業の総使用回数2回以内 ベンゾフェナップを含む農業の総使用回数1回	シジエンタジヤン(株)
						近畿・中国・四国、九州の早期栽培地帯	埴土～埴土 減水深1cm/日以下				
						全域(北海道を除く)の普通期栽培地帯及び関東・東山・東海の早期栽培地帯	砂壤土～埴土 減水深2cm/日以下	移植直後～移植後5日(ヒエ1葉期まで)			
						近畿・中国・四国、九州の早期栽培地帯	砂壤土～埴土 減水深1.5cm/日以下				
						北海道	埴土～埴土 減水深2cm/日以下				
ブタクロール・ベントキサゾン乳剤	サキドリEW	2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(プロトキシメチル)アセトアニリド ・・・12% 3-(4-クロロ-5-シクロペンチルオキシ-2-フルオロフェニル)-5-イソプロピルピリジン-2,4-ジオン ・・・4%	乳剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバ、イネ、ミズガヤツリ	東北	埴土～埴土 減水深1cm/日以下	植代時～移植前4日	500mL	原液湛水散布 本剤の使用回数1回 ブタクロールを含む農業の総使用回数1回 ベントキサゾンを含む農業の使用回数1回	科研製薬(株) ケミイ化学工業(株)
						北陸	埴土～埴土 減水深1.5cm/日以下				
						関東・東山・東海の普通期栽培地帯	埴土～埴土 減水深2cm/日以下				
						近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	埴土～埴土 減水深1cm/日以下				

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 地 用 帯	適 土 用 壤	使用時期	10a 当り 使用量	使用方法	登録会社
ブタクロ ール粒剤	マーシェ ット 1 キ ロ粒剤	2-クロロ-2',6'-ジ エチル-N-(7-トキシメ チル)アセチアミド ...10%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマダバ イ、ウリ ハ、ウリ ハ、ミズ ガヤ ツリ(北海 道、九州 は除く)、 ヘオモダ カ (北海道)	北海道	壤土～ 埴土 (減水深 2cm/日 以下、た だし埴 土では 1.5cm/ 日以下)	移植後1 ～5日(ノ ビエ1葉期 まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用回 数 1 回 ブタクロールを 含む農薬の総使 用回数 1 回	日本モンサ ント(株)
						東北	埴土～ 埴土 (減水深 2cm/日 以下)	植代後～ 移植前4 日又は移 植後1～5 日(ノビエ1 葉期ま で)			
						北陸	埴土～ 埴土 (減水深 2cm/日 以下)				
						関東・東 山・東海 の普通期 栽培地帯	砂埴土 ～埴土 (減水深 2cm/日 以下)	移植後1 ～5日(ノ ビエ1葉期 まで)			
						関東・東 山・東海 の早期栽 培地帯	埴土～ 埴土 (減水深 2cm/日 以下)				
						近畿・中 国・四国 の普通期 栽培地帯	埴土～ 埴土 (減水深 1cm/日 以下)				
						九州の普 通期栽培 地帯	砂埴土 ～埴土 (減水深 1.5cm/ 日以下、 ただし 砂埴土 では1cm /日以下)				

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使用時期	10a当り 使用量	使用方法	登録会社
ブタクロ ール粒剤	マーシェ ットジャ ンボ	2-クロロ-2', 6'-ジ エチル-N-(7'-トキシ ル)アセトアニリド ...20%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツバ イ、オシ ロイ、ウ リカ リ、ミ ズガ ヤ ツ(東北、 北陸、関 東・東山・ 東海、九 州)、ヘ ラオ ダカ(北海 道)	北海道	壤土～ 埴土(減 水深2cm /日以下、 但し 埴土では1.5cm /日以下)	移植後1 ～5日(ノ ビ1葉期 まで)	小包装 (パック) 10個(500 g)	水田に小包装 (パック)のまま 投げ入れる 本剤の使用回数 1回 ブタクロールを 含む農薬の総使 用回数1回	日本モンサ ント(株)
						東北	埴壤土 ～埴土 (減水深 1cm/日 以下)	植代後～ 移植前4 日または 移植後1 ～5日(ノ ビ1葉期 まで)			
						北陸	埴土～ 埴土 (減水深 1.5cm/ 日以下)				
						関東・東 山・東海 の普通期 及び早期 栽培地帯	埴壤土 ～埴土 (減水深 1cm/日 以下)				
						近畿・中 国・四国 の普通期 栽培地帯	埴土～ 埴土 (減水深 1cm/日 以下)				
						九州の普 通期栽培 地帯	埴土～ 埴土 (減水深 1.5cm/ 日以下)	移植後1 ～5日(ノ ビ1葉期 まで)			
シハロホ ップブチ ル・ジメ タメトリ ン・ピラ ゾスルフ ロンエチ ル・プレ チクロ ール粒剤	ホクト1 キロ粒剤	ブチル(R)-2-[4- (4-シアリ-2-フルオ ロエチル)フェニル]ア ニリン ...1.8% 2-メチル-4-エチル ミノ-6-(1, 2-ジメ チル)ピロリジン)- ス ...0.6% エチル=5-(4, 6-ジ メチル)ピロリジン-2-イ ソプロピルモイルス フェニル)-1-メチル ピロリジン- ...0.3% 2-クロロ-2', 6'-ジ エチル-N-(2-ア ニリン) キニリン)アセト アニリド ...4.5%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツバ イ、オシ ロイ、ウ リカ リ、ミ ズガ ヤ ツ、ヘ ラオ ダカ(北海 道、東北) オシロイ(近 畿・中国・ 四国の早 期、九州 を除く)、 ヒルシロ、セ リ クロイ、 (北海道、 近畿・中 国・四国 の早期、 九州を除 く) エノヤサ ダカ(北海 道)、ズイ (東北) アニリン 類による 表層はく 離	北海道、 東北、北 陸、関東 以西の普 通期栽培 地帯	砂壤土 ～埴土 (減水深 2cm/日 以下)	移植後5 ～20日(ノ ビ3葉期 まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用回数 1回 シハロホップブチ ルを含む農薬の 総使用回数3 回以内 ジメタメリンを 含む農薬の総使 用回数2回以 内 ピラゾスルフロン エチルを含む農 薬の総使用回数 1回 プレチクロールを 含む農薬の総 使用回数2回 以内	シンジェン タ ジャパン(株)
						関東以西 の早期裁 培地帯	砂壤土 ～埴土 (減水深 1.5cm/ 日以下)				

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
シハロホップブチル・ジメタメトリン・ピラゾスルフロンエチル・プレチラクロール粒剤	ホクト粒剤	プチル=(R)-2-[4-(4-ジフ/2-フルオロフェニル)フェニル]プロピオート ……0.6% 2-メチルチオ-4-エチルアミノ-6-(1,2-ジメチルプロピル)アミノ)-s-トリアジン ……0.6% エチル=5-(4,6-ジメトキシ)リミジン-2-イソカルバモイルスルファモイル)-1-メチルピラゾール-4-カルボキシル-0.04 2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(2-プロポキシエチル)アセトアニリド ……15.5%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバ、イヌハゼ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラモダカ(北海道)オモダカ(東北)、ヒルムシロ、セリ、クダマ、(北海道を除く)、アミドロ・藻類による表層はく離	北海道	壤土～埴土(減水深2cm/日以下)	移植後5～20日(ビエ3葉期まで)	3kg	湛水散布 本剤の使用回数1回 シハロホップブチルを含む農薬の総使用回数3回以内 ジメタメトリンを含む農薬の総使用回数2回以内 ピラゾスルフロンエチルを含む農薬の総使用回数1回 プレチラクロールを含む農薬の総使用回数2回以内	シジェンジャパン(株)
						東北、北陸、関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯	壤土～埴土(減水深1.5cm/日以下)				
						近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	壤土～埴土(減水深1.5cm/日以下)				
ピラゾレート・フェントラザミド・ベンゾビシクロン水和剤	ウエスフロアブル	4-(2,4-ジクロロベンゾイル)-1,3-ジメチル-5-ヒドロキシピラゾール-6-ニトロ ……26.1% 4-(2-クロロフェニル)-N-シクロヘキシル-N-エチル-4,5-ジヒドロ-5-オキソ-1H-テトラゾール-1-カルボキシル ……3.5% 3-(2-クロロ-4-メチルベンゾイル)-2-フェニルチオピシクロン[3,2,1]オクタ-2-エン-4-オン ……3.5%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバ、イヌハゼ、ウリカワ、ヘラモダカ、ヒルムシロ、エノネ、ササガ	北海道	砂壤土～埴土	移植直後～15日(ビエ2葉期まで)	500mL	原液湛水散布 本剤の使用回数1回 ピラゾレートをを含む農薬の総使用回数1回 フェントラザミドを含む農薬の総使用回数1回 ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数2回以内	北海三共(株)
ジメタメトリン・ピリプチカルブ・プレチラクロール・ベンスルフロンメチル水和剤	クサナインフロアブル	2-メチルチオ-4-エチルアミノ-6-(1,2-ジメチルプロピル)アミノ)-s-トリアジン ……1% 0-3-tert-ブチルフェニル=6-メトキシ-2-ピリジル(メチル)チオカルバマート ……10% 2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(2-プロポキシエチル)アセトアニリド ……7% メチル=α-(4,6-ジメトキシ)リミジン-2-イソカルバモイルスルファモイル)-o-トリアート ……1%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバ、イヌハゼ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ(北陸を除く)、セリ、アミドロ・藻類による表層はく離	北陸	砂壤土～埴土(減水深2cm/日以下)	移植直後～移植後15日(ビエの2.5葉期まで、但し近畿・中国・四国の早期栽培地帯はビエの2葉期まで)	500mL	原液湛水散布 本剤の使用回数1回 ジメタメトリンを含む農薬の総使用回数2回 ピリプチカルブを含む農薬の総使用回数2回以内 プレチラクロールを含む農薬の総使用回数2回以内 ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内	シジェンジャパン(株)
						関東・東山・東海の普通期栽培地帯	砂壤土～埴土(減水深2cm/日以下、但し砂壤土では1cm/日以下)				
						関東・東山・東海の早期栽培地帯	砂壤土～埴土(減水深2cm/日以下)				
						近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯	壤土～埴土(減水深1cm/日以下)				
						九州の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～埴土(減水深2cm/日以下)				

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
ジメタメトリン・ピリプチカルブ・プレチラクロール・ベンスルフロンメチル水和剤	クサナインフロアブル	2-メチル-4-エチル-6-(1,2-ジメチル-6-メトキシ-2-ヒドロキシ)エチル)-5-トリアジン ...1% 0-3-tert-ブチル-6-エチル-6-メトキシ-2-ヒドロキシ(メチル)チオカルバマート ...10% 2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(2-プロポキシエチル)アセトアニリド ...7% メチル-α-(4,6-ジメトキシ)リジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-オートラート ...1.4%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツガイ、オタネ、ウリカワ、ミズガヤツリ(東北)、ヘラセダカ(北陸)、ヒルムシロ、セネテオミドロ・藻類による表層はく離	北海道	壤土～埴土(減水深2cm/日以下、但し埴土は減水深1.5cm/日以下)	移植直後～移植後20日(ビエ2.5葉期まで)	500mL	原液湛水散布 本剤の使用回数1回 ジメタメトリンを含む農薬の総使用回数1回 ピリプチカルブを含む農薬の総使用回数2回以内 プレチラクロールを含む農薬の総使用回数2回以内 ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内	シンジエタジャパン(株)
						東北	埴土～埴土(減水深2cm/日以下)	移植直後～移植後15日(ビエ2.5葉期まで)			
ブタクロール・プロモブチド・ベンゾフェナップ水和剤	ハチクフロアブル	2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(プロキシメチル)アセトアニリド ...15% (RS)-2-プロモ-N-(α,α-ジメチルベンジル)-3,3-ジメチルプロピルアミド ...12% 2-[4-(2,4-ジクロロ-m-トリイール)-1,3-ジメチルピラゾール-5-イルオキシ]-4'-メチルアセトフェニル ...12%	水和剤	移植	水田一年生雑草及びマツガイ家オタネ、ヘラセダカ、アオミドによる表層はく離	北海道	砂埴土～埴土(減水深2cm/日以下)	移植直後～移植後15日(ビエ2.5葉期まで)	500mL	原液湛水散布 本剤の使用回数1回 ブタクロールを含む農薬の総使用回数1回 プロモブチドを含む農薬の総使用回数1回以内 ベンゾフェナップを含む農薬の総使用回数1回	北興化学工業(株)
カフェンストロール・ダイムロン・ピラソレート・ベンゾビシクロン粒剤	イネエース1キログラム粒剤	N,N-ジエチル-3-メチルホルム 11-(α,α-ジメチルベンジル)-3-(パラトリル)尿素 ...6% 4-(2,4-ジクロロベンジル)-1,3-ジメチル-5-ヒドロキシ-2-トリエンシホネート ...12% 3-(2-クロロ-4-メチルベンジル)-2-フェニルチオピリジン[3.2.1]オクタ-2-エン-4-オン ...2%	粒状	移植水稻	水田一年生雑草及びマツガイ、オタネ、ウリカワ、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ヒルムシ	北海道	埴土～埴土(減水深2cm/日以下、但し埴土は1.5cm/日以下)	移植後5～20日(ビエ2.5葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用回数1回 カフェンストロールを含む農薬の総使用回数1回 ダイムロンを含む農薬の総使用回数3回以内(本田では2回以内) ピラソレートを含む農薬の総使用回数1回 ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数2回以内	
						北陸	埴土～埴土(減水深2cm/日以下)	移植後5～15日(ビエ2.5葉期まで)			
						関東・東山・東海の普通期栽培地帯	埴土～埴土(減水深2cm/日以下)	移植後5～12日(ビエ2.5葉期まで)			
						近畿・中国・四国、九州の普通期栽培地帯	埴土～埴土(減水深1cm/日以下)	移植後5～15日(ビエ2.5葉期まで)			

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 地 帯	適 用 場 所	使用時期	10a当り 使用量	使用方法	登録会社
オキサジ クロメホ ン・クロ メブロッ プ・ビリ ミノバク クメチル ・ベン ス ルフロ ンメチル 剤	バットフ ルエース 250g グラム	3-[1-(3,5-ジクロ ロフェニル)-1-メチルエ チル]-3,4-ジヒドロ- 6-メチル-5-フェニル-2 H-1,3-オキサジン-4 -オン ・・・1.6% (RS)-2-(2,4-ジ クロロ-m-トリオキシ) プロピオンアミド ・・・14% メチル=2-(4,6-ジメ トキシビリジン-2-イ ルオキシ)-6-(1-メト キシメチル)ベンゾエ ート ・・・1.8% メチル=α-(4,6-ジ メトキシビリジン-2- イルカルバモイルスル ファモイル)-o-トルア ート ・・・3%	粒 状	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツバ イ、オ タカイ、ウ リカ ワ、ミ スガヤ ツリ(東 北)、ヘ ラオ タ、ヒ ルムシ ロ、セ リ、ア オミ ド・ロ ・藻類 によ る表層 はく 離	北海道	壤土～ 埴土	移植後3 ～20日(ノ ビ12.5葉 期まで)	250g	原液湛水散布 又は湛水周縁 散布 本剤の使用回 数1回 オキサジクロメ ホンを 含む農業の総 使用回数1回 クロメブロッ プを含む農業 の総使用回数2 回 ビリミノバク メチルを含む 農業の総使用 回数2回以内 ベンスルフロ ンメチルを含 む農業の総使 用回数2回	ケイイ化学 工業(株) 全国農業 協同組合 連合会 デューン(株)
						東北		移植後3 ～15日(ノ ビ12.5葉 期まで)			
オキサジ クロメホ ン・クロ メブロッ プ・ビリ ミノバク クメチル ・ベン ス ルフロ ンメチル 剤	バットフ ルエース 1250g グラム	3-[1-(3,5-ジクロ ロフェニル)-1-メチルエ チル]-3,4-ジヒドロ- 6-メチル-5-フェニル-2 H-1,3-オキサジン-4 -オン ・・・1.6% (RS)-2-(2,4-ジ クロロ-m-トリオキシ) プロピオンアミド ・・・14% メチル=2-(4,6-ジメ トキシビリジン-2-イ ルオキシ)-6-(1-メト キシメチル)ベンゾエ ート ・・・1.8% メチル=α-(4,6-ジ メトキシビリジン-2- イルカルバモイルスル ファモイル)-o-トルア ート ・・・2%	粒 状	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツバ イ、オ タカイ、ウ リカ ワ、ミ スガヤ ツリ、ヒ ルムシ ロ(北陸 を除く)、 セリ、ア オミ ド・ロ ・藻類 によ る表層 はく 離 (北陸 を除く)	北陸、関 東・東山・ 東海、近 畿・中国・ 四国の普 通期栽培 地帯及び 関東・東 山・東海 の早期裁 培地帯	壤土～ 埴土	移植後1 ～15日(ノ ビ12.5葉 期まで)	250g	原液湛水散布 又は湛水周縁 散布 本剤の使用回 数1回 オキサジクロメ ホンを 含む農業の総 使用回数1回 以内 クロメブロッ プを含む農業 の総使用回数2 回以内 ビリミノバク メチルを含む 農業の総使用 回数2回以内 ベンスルフロ ンメチルを含 む農業の総使 用回数2回以 内	ケイイ化学 工業(株) 全国農業 協同組合 連合会 デューン(株)
						九州の普 通期 及び早期 栽培地帯	砂壤土 ～埴土	移植後1 ～12日(ノ ビ12葉期 まで)			
ダイムロ ン・ビリ ミノバク クメチル ・ベン ス ルフロ ンメチル ・ペン トキ サゾン粒 剤	フォーマ ット1キ ロ粒剤7 5	1-(α,α-ジメチル ベンジル)-3-(ハ ロトリル)尿素 ・・・3% メチル=2-(4,6-ジメ トキシビリジン-2-イ ルオキシ)-6-(1-メト キシメチル)ベンゾエ ート ・・・0.6% メチル=α-(4,6-ジ メトキシビリジン-2- イルカルバモイルスル ファモイル)-o-トルア ート ・・・0.75% 3-(4-クロロ-5-クロ ロペンチルオキシ)-2-フル オロフェニル)-5-イソ プロピル)-1,3-オキサ ジン-2,4-ジオ ン ・・・2%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツバ イ、オ タカイ、ウ リカ ワ、ミ スガヤ ツリ(東 北)、ヘ ラオ タ、ヒ ルムシ ロ、セ リ、ア オミ ド・ロ ・藻類 によ る表層 はく 離	北海道	壤土～ 埴土	移植後5 ～25日(ノ ビ13葉期 まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用回 数1回 ダイムロンを含 む農業の総使 用回数3回以 内(本田では2 回以内) ビリミノバク メチルを含む 農業の総使用 回数2回 ベンスルフロ ンメチルを含 む農業の総使 用回数2回 ペントキサ ゾンを 含む農業の総 使用回数2回	ケイイ化学 工業(株)
						東北		移植後5 ～20日(ノ ビ13葉期 まで)			

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
ダイムロン・ピリミノバックメチル・ベンスルフロンメチル・ベントキサゾン粒剤	フォーマット1キロ粒剤51	1-(α , α -ジメチルベンジル)-3-(パラトリル)尿素 ...3% メチル=2-(4,6-ジメトキシ)リジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-0-トリブート ...0.6% メチル= α -(4,6-ジメトキシ)リジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-0-トリブート ...0.51% 3-(4-クロロ-5-シクロペンチルオキシ-2-フルオロフェニル)-5-イソプロピルピリジン-1,3-ビス(2,4-ジオニ) ...2%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバ、イカリ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルシロ(北陸を除く)、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離(北陸を除く)	北陸、関東・東山・東海、近畿・中国・四国の普通期栽培地帯及び関東・東山・東海の早期栽培地帯	壤土～埴土	移植後5～20日(ビイ3葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用回数1回 グライロンを含む農薬の総使用回数3回(本田では2回以内) ピリミバックメチルを含む農薬の総使用回数2回 ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回 ベントキサゾンの総使用回数2回	ケイイ化学工業(株)
インダノファン・クロメプロップ・ベンスルフロンメチル粒剤	ダイナマン1キロ粒剤75	(RS)-2-[2-(3-クロロフェニル)-2,3-エポキシプロピル]-2-エチルインダン-1,3-ジオン ...1.4% (RS)-2-(2,4-ジクロロ-6-トリルオキシ)プロピルオニド ...3.5% メチル= α -(4,6-ジメトキシ)リジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-0-トリブート ...0.75%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバ、イカリ、ウリカワ、ミズガヤツリ(東北)、ヒルシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	北海道 東北	壤土～埴土	移植後5～20日(ビイ2.5葉期まで) 移植後5～15日(ビイ2.5葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用回数1回 インダノファンを含む農薬の総使用回数2回以内 クロメプロップを含む農薬の総使用回数2回以内 ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内	
インダノファン・クロメプロップ・	ダイナマン1キロ粒剤51	(RS)-2-[2-(3-クロロフェニル)-2,3-エポキシプロピル]-2-エチルインダン-1,3-ジオン ...1.4% (RS)-2-(2,4-ジクロロ-6-トリルオキシ)プロピルオニド ...3.5% メチル= α -(4,6-ジメトキシ)リジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-0-トリブート ...0.75%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバ、イカリ、ウリカワ、ミズガヤツリ(北陸を除く)、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離(北陸を除く)	北陸、関東・東山・東海、近畿・中国・四国の普通期栽培地帯及び関東・東山・東海の早期栽培地帯	壤土～埴土	移植後5～20日(ビイ3葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用回数1回 インダノファンを含む農薬の総使用回数2回以内 クロメプロップを含む農薬の総使用回数2回以内 ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内	日本農業(株) 三菱化学(株) デュボン(株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
オキサジクロメホン・クロメプロップ・ベンスルフロンメチル粒剤	ミスターホームランジャンボ	3-[1-(3,5-ジクロロフェニル)-1-メチルエチル]-3,4-ジヒドロ-6-メチル-5-フェニル-2H-1,3-オキサジノン-4-オン ...1.6% (RS)-2-(2,4-ジクロロ-m-トリルオキシ)プロピルオニド ...7% メチル=α-(4,6-ジメトキシ)リジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-o-トルアト ...1.5%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバ、オシロイ、ウリカ、ミズガヤツリ(東北)、ヘラモダカ、ヒルムシロ、アオミドロ・藻類による表層はく離	北海道	壤土～埴土	移植後3～10日(ノビE2葉期まで)	小包装(ノック)10個(500g)	水田に小包装(ノック)のまま投げ入れる 本剤の使用回数1回 オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数1回 クロメプロップを含む農薬の総使用回数2回 ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回	北興化学工業(株) デュボン(株) 全国農業協同組合連合会
						東北	砂埴土～埴土				
オキサジクロメホン・クロメプロップ・ベンスルフロンメチル粒剤	ミスターホームラン1キロ粒剤75	3-[1-(3,5-ジクロロフェニル)-1-メチルエチル]-3,4-ジヒドロ-6-メチル-5-フェニル-2H-1,3-オキサジノン-4-オン ...0.8% (RS)-2-(2,4-ジクロロ-m-トリルオキシ)プロピルオニド ...3.5% メチル=α-(4,6-ジメトキシ)リジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-o-トルアト ...0.75%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバ、オシロイ、ウリカ、ミズガヤツリ(東北)、ヘラモダカ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	北海道	砂埴土～埴土	移植後5～20日(ノビE2.5葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用回数1回 オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数1回 クロメプロップを含む農薬の総使用回数2回 ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回	北興化学工業(株) デュボン(株) 全国農業協同組合連合会
						東北		移植後5～15日(ノビE2.5葉期まで)			
オキサジクロメホン・クロメプロップ・ベンスルフロンメチル粒剤	ミスターホームラン1キロ粒剤51	3-[1-(3,5-ジクロロフェニル)-1-メチルエチル]-3,4-ジヒドロ-6-メチル-5-フェニル-2H-1,3-オキサジノン-4-オン ...0.8% (RS)-2-(2,4-ジクロロ-m-トリルオキシ)プロピルオニド ...3.5% メチル=α-(4,6-ジメトキシ)リジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-o-トルアト ...0.51%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草、マツバ、オシロイ、ウリカ、ミズガヤツリ、ヘラモダカ(九州)、ヒルムシロ(北陸を除く)、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離(北陸を除く)	北陸	壤土～埴土	移植後5～15日(ノビE2.5葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用回数1回 オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数1回 クロメプロップを含む農薬の総使用回数2回以内 ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内	北興化学工業(株) デュボン(株) 全国農業協同組合連合会
						関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯	砂埴土～埴土				
						近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯	埴土～埴土				
						九州の普通期及び早期栽培地帯	砂埴土～埴土				

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用地帯	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
カフェンストロール・シクロスルファミロン・ダイムロン粒剤	ネビロスーラジカルジャンボ	N, N-ジエチル-3-メチルサルホニル-1H-1, 2, 4-トリアゾール-1-カルボキサミド ...15% 1-[2-(シクロプロピルカルボニル)アミノ]ピロリジン-3-(4, 6-ジメチル)リミジン-2-イル尿素 ...3% 1-(α , α -ジメチルベンジル)-3-(パラトリル)尿素 ...30%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草, マダヒ, ヨリカ, シノガヤツリ(北海道を除く), ヲホセグサ(北海道, 九州), ヒルムシロ(北海道, 東北, 関東・東山・東海), セリ(北海道), アミドロ・藻類による表層はく離(北海道, 東北, 関東・東山・東海)	北海道, 東北	壤土～埴土	移植後3～15日(ビイ2葉期まで)	小包装(パック)10個(500g)	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる 本剤の使用回数1回 カフェンストロールを含む農薬の総使用回数1回 シクロスルファミロンを含む農薬の総使用回数1回 ダイムロンを含む農薬の総使用回数3回(本田は2回以内)	ビイ・エス・アイファグ(株)
						北陸, 関東・東山・東海, 近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	九州の普通期栽培地帯	移植後3～12日(ビイ2葉期まで)			
イマゾスルフロロン・オキサジクロメホン・クロメプロップ・ダイムロン水和剤	サラブレッドRX	1-(2-クロロイミダゾ[1, 2-a]ピリジン-3-イル)サルホニル-3-(4, 6-ジメチル)リミジン-2-イル尿素 ...1.7% 3-[1-(3, 5-ジクロロフェニル)-1-メチルエチル]-3, 4-ジヒドロ-6-メチル-5-フェニル-2H-1, 3-オキサジン-4-オン ...1.2% (RS)-2-(2, 4-ジクロロ-m-トリフルオロメチル)ピロリジン-2-イル尿素 ...6.6% 1-(α , α -ジメチルベンジル)-3-(パラトリル)尿素 ...9.5%	水和剤	移植水稻	一年生雑草, マダヒ, ヨリカ, シノガヤツリ(北海道を除く), ヲホセグサ(北海道), ヒルムシロ(北陸を除く), セリ, アミドロ・藻類による表層はく離(北陸を除く)	北海道	壤土～埴土	移植直後～移植後20日(ビイ2.5葉期まで)	500mL	原液湛水散布 本剤の使用回数1回 イマゾスルフロロンを含む農薬の総使用回数2回以内 オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数2回以内 クロメプロップを含む農薬の総使用回数2回以内 ダイムロンを含む農薬の総使用回数3回以内(本田では2回以内)	全国農業協同組合連合会 武田薬品工業(株)
						東北, 北陸, 関東・東山・東海の普通期栽培地帯		移植直後～移植後15日(ビイ2.5葉期まで)			
イマゾスルフロロン・カフェンストロール・ベンゾピシクロン水和剤	イッテツフロアブル	1-(2-クロロイミダゾ[1, 2-a]ピリジン-3-イル)サルホニル-3-(4, 6-ジメチル)リミジン-2-イル尿素 ...1.7% N, N-ジエチル-3-メチルサルホニル-1H-1, 2, 4-トリアゾール-1-カルボキサミド ...5.7% 3-(2-クロロ-4-メチルベンジル)ピロリジン[3, 2, 1]オキサジン-2-イル-4-オン ...3.8%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草, マダヒ, ヨリカ, シノガヤツリ(北海道を除く), ヲホセグサ(北海道, 東北, 九州), ヒルムシロ(北陸を除く), セリ(北陸を除く), アミドロ・藻類による表層はく離(北海道, 東北を除く)	北海道	壤土～埴土	移植後5～20日(ビイ2.5葉期まで)	500mL	原液湛水散布 本剤の使用回数1回 イマゾスルフロロンを含む農薬の総使用回数2回以内 カフェンストロールを含む農薬の総使用回数1回 ベンゾピシクロンを含む農薬の総使用回数2回以内	(株)エス・ディ・エス・バイファグ 武田薬品(株)
						全域(北海道を除く)の普通期栽培地帯 九州の早期栽培地帯		移植後5～15日(ビイ2.5葉期まで)			

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 地 帯	適 用 場	使用時期	10a当り 使用量	使用方法	登録会社
ピラソス ルフロ ンエチル・ フェント ラザミド ・ベンゾ ビシクロ ン水和剤	ダブルス ターS B 顆粒	エチル=5-(4,6-ジメ トキシ)ピリジン-2-イ ルカルバモイルスルファモイ ル)-1-メチルピラゾ ル-4-カルボキシラート ・・・2.6% '4-(2-クロロフェニル) -N-シクロヘキシル-N-エ チル-4,5-ジヒドロ- 5-オキソ-1H-テトラゾ ル-1-カルボキサミド ・・・25% 3-(2-クロロ-4-メチル ベンゾイル)-2-フェニ ルチオピシクロ[3.2. 1]オクタ-2-エン-4-オ ン ・・・25%	水 和 剤	移植水稻	水田一年 生雑草、 マツバ、ホ タルイ、ツリ カミズガヤツリ (北海道 を除く)、 ヘラオモダ カ(北海道、 東北)、ヒル ムシロ、セリ、ア オミドロ・藻 類による表 層はく離	北海道 東北、関 東・東 山・東 海の普通 期栽培地 帯	壤土～ 埴土	移植直後 ～15日(ノ ビイ2葉期 まで) 移植直後 ～12日(ノ ビイ2葉期 まで)	500mL	湛水散布本剤 の使用回数1 回 ビラゾスルフロ ンを含む農薬 の総使用回数 1回 フェントラザミド を含む農薬の 総使用回数1回 ベンゾビシクロ ンを含む農薬 の総使用回数2 回	日産化学 工業(株) (株)エス・ディ ー・エス・バイ ワック
カフェン ストロー ル・シハ ロホップ ブチル・ ピラソス ルフロ ンエチル粒 剤	テクノス ターワイ ドジャン ボ	N,N-ジエチル-3-メ チルスルホニル-1H-1, 2,4-トリアゾール-1- カルボキサミド ・・・5.25% ブチル=(R)-2-[4- (4-シアノ-2-フルオロ エノキシ)フェノキシ]プロ ピオナート ・・・3.8% エチル=5-(4,6-ジメ トキシ)ピリジン-2-イ ルカルバモイルスルファモイ ル)-1-メチルピラゾ ル-4-カルボキシラート ・・・0.525%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草、マ ツバ、ホ タルイ、ヘラ オモダカ(北 海道、東北) ツリカミズ ガヤツリ(北 海道を除く)、 セリ、ア オミドロ・藻 類による表 層はく離(北 海道、関東・ 東山・東 海)	北海道 東北、北 陸、関東・ 東山・東 海、近畿・ 中国・四 国の普通 期栽培地 帯及び近 畿・中国・ 四国の早 期栽培地 帯 九州の普 通期栽培 地帯	壤土～ 埴土 砂壤土 ～埴土	移植後5 ～12日(ノ ビイ2葉期 まで) 移植後5 ～12日(ノ ビイ2葉期 まで)	小包装 (パック)10 個(400g)	水田に小包装 (パック)のまま 投げ入れる 本剤の使用回 数1回 カフェンストロー ルを含む農薬 の総使用回数1回 シハロホップブ チルを含む農薬 の総使用回数3 回 ビラゾスルフロ ンを含む農薬 の総使用回数 3回(本田は 2回以内)	日産化学 工業(株) (株)エス・ディ ー・エス・バイ ワック 明治製菓 (株)

— 防除指導手帳 —

企画・編集／JA全農肥料農薬部
B6判(ポケット判) 350頁 3,500円(税込)

主要作物(稲、麦、豆類、芋類、野菜、果樹)の病気・害虫・
雑草をカラー写真で掲載し、病徴と診断。害虫の形態・生態
と被害、雑草の形態及び防除のポイントと適用薬剤を解説。

全国農村教育協会

〒110-0016 東京都台東区台東1-26-6
Tel.03-3833-1821 Fax.03-3833-1665

(2) 水田耕起前・水田畔畔・休耕田・水稲刈後・畑作・野菜作・永年生物作・非農耕地対象

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
カルフェントラゾンエチル・グリホサートアンモニウム塩水和剤	マスターズ	(RS)-エチル=2-クロロ-3-[2-クロロ-5-(4-ジフルオロメチル-4,5-ジヒドロ-3-メチル-5-オキソ-1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)-4-フルオロフェニル]プロピオネート ...0.7% アンモニウムN-(ホスホメチル)グリナート ...25%	水和剤	みかんりんごなしぶどう	畑地一年生雑草及び多年生雑草			雑草生育期(草丈30cm以下)収穫7日前まで	300~500g 希釈水量100L	雑草茎葉散布 本剤の使用回数3回以内 カルフェントラゾンエチルを含む農薬の総使用回数3回以内 グリホサートを含む農薬の総使用回数3回以内	エフエムシー・ケミカル(株)
アラクロールマイクロカプセル剤	ハブーンフロアブル	2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(メキシチル)アセトアニリド ...40%	水和剤	日本芝西洋芝(ブルグラス)	一年生雑草			春期雑草発生前(芝生育期)	600~1000 mL 希釈水量200~300 L	全面土壌散布 本剤のみを使用する場合の使用回数3回以内 アラクロールを含む農薬の総使用回数3回以内	日産化学工業(株) 薬理研グループ
クミルロン水和剤	マックワンプロアブル	1-(2-クロロベンジル)-3-(1-メチル-1-フェニルエチル)ウレア ...45%	水和剤	西洋芝(ベントグラス,ブルグラス)	スミカタビラ			芝生育期(雑草発生前)	1~2L 希釈水量200~300L	全面土壌散布 本剤のみを使用する場合の使用回数2回以内 クミルロンを含む農薬の総使用回数2回以内	丸紅(株)
フルチアセットメチル乳剤	ベルベカット乳剤	メチル=2-クロロ-4-フルオロ-5-(5,6,7,8-テトラヒドロ-3-オキソ-1H,3H-[1,3,4]オキサジアゾリン-1-イル)アミドフェニル]アセート ...5%	乳剤	とうもろこし飼料用とうもろこし	イビ	関東以西		イビ3~5葉期(とうもろこし4葉期以降)(但し、は種後30日まで)	5~10mL 希釈水量100L	雑草茎葉散布 本剤の使用回数1回以内 フルチアセットメチルを含む農薬の総使用回数1回以内	ケイアイ化学工業(株)
カルフェントラゾンエチル水和剤	タスクD F	(RS)-エチル=2-クロロ-3-[2-クロロ-5-(4-ジフルオロメチル-4,5-ジヒドロ-3-メチル-5-オキソ-1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)-4-フルオロフェニル]プロピオネート ...36.5%	水和剤	小麦(秋播)	ヤムグラ	関東以西	全土壌(砂土を除く)	ヤムグラ2~4節期(但し、収穫30日前まで)	3~4g 希釈水量100~200L	雑草茎葉散布 本剤の使用回数2回以内 カルフェントラゾンエチルを含む農薬の総使用回数2回以内	エフエムシー・ケミカル(株)
				日本芝	一年生広葉雑草			秋期芝生育期(雑草発生始期~生育初期)(雑草3葉期まで)	10~20g 希釈水量100~200L		
TCTP水和剤	ダクター水和剤	2,3,5,6-テトラフルオロベンゾ酸ジメチル ...75%	水和剤	芝(こうらいしばのしば)	一年生イネ科雑草		洪積火山灰土壌	雑草発生前	2~3kg 希釈水量300L	全面土壌散布 本剤のみを使用する場合の使用回数2回以内 TCTPを含む農薬の総使用回数3回以内	株式会社ダイオキア

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適地	用帯	適土	用境	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
カルフェントラゾンエチル・グリホサートイソプロピルアミン塩液剤	マスターズME	(RS)-エチル-2-クロロ-3-[2-クロロ-5-(4-ジフルオロメチル-4,5-ジヒドロ-3-メチル-5-オキソ-1H-1,2,4-トリアゾ-1-イル)-4-フルオロフェニル]プロピオネート ...0.5% イソプロピルアンモニウム-N-(フルオロメチル)グリナート ...20%	液剤	みかん りんご なし ぶどう	一年生及び多年生雑草					雑草生育期(草丈30cm以下) 収穫7日前まで	400～600mL 希釈水量 100L	雑草茎葉散布 本剤の使用回数3回以内 カルフェントラゾンエチルを含む農薬の総使用回数3回以内 グリホサートを含む農薬の総使用回数3回以内	エフエス・エス・エス(株) 日産化学工業(株)
			水田畦畔	雑草生育期(草丈30cm以下) 収穫14日前まで						500～600mL 希釈水量 100L	雑草茎葉散布 本剤の使用回数2回以内 カルフェントラゾンエチルを含む農薬の総使用回数2回以内 グリホサートを含む農薬の総使用回数2回以内		
			公園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面等	雑草生育期(草丈30cm以下)						500～1000mL 希釈水量 100L	雑草茎葉散布 本剤の使用回数3回以内 カルフェントラゾンエチルを含む農薬の総使用回数3回以内 グリホサートを含む農薬の総使用回数3回以内		
メコプロップPカリウム塩液剤	スコリテック液剤	(R)-2-(4-クロロ-6-トリフルオロメチル)プロピオン酸カリウム ...52%	液剤	日本芝 西洋芝 (ブルグラス)	一年生及び多年生広葉雑草					芝生育期(雑草生育期)	250～500mL 希釈水量 200L	雑草茎葉散布 本剤の使用回数3回以内 メコプロップPを含む農薬の総使用回数3回以内	ビー・エー・エス・エフ(株) 日本曹達(株)
イソキサベン・デニルクロール水和剤	ウイガード水和剤	N-[3-(1-エチル-1-メチルプロピル)イソキサベン-5-イル]-2,6-ジメチルベンゾアミド ...5% 2-クロロ-N-(3-メチルシ-2-チニル)-2',6'-ジメチルアセトアニリド ...50%	水和剤	日本芝	畑地一年生雑草					芝生育期(雑草発生前)	0.2～0.4g/m ² 希釈水量 200～300L/m ²	散布 本剤の使用回数2回以内 イソキサベンを含む農薬の総使用回数2回以内 デニルクロールを含む農薬の総使用回数2回以内	株式会社 北興化学工業(株)
カルブチレート粒剤	オールキラー粒剤	3-(3,3-ジメチルホルイド)フェルタキシリン-プロピルカルバマート ...2%	粒剤	宅地、駐車場、道路等	一年生雑草及び多年生広葉雑草					雑草生育初期	20～40g/m ²	全面土壌散布 本剤のみを使用する場合の使用回数2回以内 カルブチレートを含む農薬の総使用回数2回以内	株式会社 エス・ディ・エス・バイテック

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適地	用帯	適用場	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
イソワロン・MCPP粒剤	グラスジャンク粒剤	3-(5-ターシャリブチル-3-イソオキサリル)-1,1-ジメチル尿素 ...1% α-(2-メチル-4-クロロフェニル)プロピオン酸カリウム ...3%	粒剤	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、鉄道等	一年生雑草 ギョウジャ、スギナ、ヨモギ				雑草発生前～生育初期	15～20kg 20～30kg	全面土壌散布 本剤のみを使用する場合の使用回数3回以内 イカリノを含む農薬の総使用回数3回以内 MCPPを含む農薬の総使用回数3回以内	保土谷7ゲロ隊 レインボ-薬品株

MC-100 (オキサジクロロメノン含有)
JAグループ推奨ヒエ剤。初年度10万ヘクタール達成

水稲用初・中期一発処理除草剤

長く、よく効くホームランシリーズ!!



ミスターホームラン
フロアブル/Lフロアブル

- ①ノビエ2.5葉期まで効果がある。
- ②ノビエに対する効果がながく持続する。
- ③稲への安全性が高い。



ホームラン
A1キロ粒剤36/1キロ粒剤51

JAグループ
農協 全農 経済連



北興化学工業株式会社
〒103-8341 東京都中央区日本橋本石町4-4-20
<http://www.hokkochem.co.jp/>

◎は登録商標

最新 除草剤・生育調節剤解説1998年版

企画・編集／財団法人 日本植物調節剤研究協会
B5判 年度別・各5,000円（本体・税別）

1998年版は水田除草剤16剤、畑地・非農耕地除草剤5剤、水稲倒伏軽減剤1剤。1999年版は水田除草剤16剤、畑地除草剤1剤、芝生除草剤9剤を掲載。

全国農村教育協会

〒110-0016 東京都台東区台東1-26-6
TEL03-3833-1821 FAX03-3833-1665