

新 登 録 除 草 剤 一 覧

農林水産省生産局生産資材課

平成14年11月1日～平成15年3月31日

(1) 移植水稻

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
ブレチラクロール粒剤	エリジャンジャンボ	2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(2-プロポキシエチル)アミド ...15.0%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ オシロイ ミズガヤツリ(北海道を除く) ハラモダカ(北海道、東北)	全域(九州を除く)の普通期栽培地帯	壤土～埴土	移植後1日～5日 (/ビ'11葉期まで)	小包装10個 (300g)	水田に小包装のまま投げ入れる 本剤の使用回数1回 ブレチラクロールを含む農薬の総使用回数2回以内	シジエンタジャパン(株)
カフェンストロー・ダイムロン・プロモブチド・ベンズルフロンメチル水和剤	ラクダープロシフロアブル	N,N-ジエチル-3-メチルスルホニル-1H-1,2,4-トリアゾール-1-カルボキサミド ...5.5% 1-(α,α-ジメチルベンジル)-3-(N'ナトリウム)尿素 ...10.0% (RS)-2-プロモ-N-(α,α-ジメチルベンジル)-3-ジメチルプロピルアミド ...12.0% メチル-α-(4,6-ジメチルピリミジン-2-イルカルバモイル)スルファモイル-0-オートルブート ...1.0%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ オシロイ ワリカ ミズガヤツリ	北陸	壤土～埴土	移植後3日～15日 (/ビ'12.5葉期まで)	500mL	原液湛水散布 本剤の使用回数1回 カフェンストローを含む農薬の総使用回数1回 ダイムロンを含む農薬の総使用回数3回以内(本田期は2回以内) プロモブチドを含む農薬の総使用回数1回 ベンズルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内	三共(株) デューン(株)
カフェンストロー・シクロスルフアムロン・ダイムロン粒剤	レオンジャンボ	N,N-ジエチル-3-メチルスルホニル-1H-1,2,4-トリアゾール-1-カルボキサミド ...4.2% 1-[2-(シクロプロピルカルボニル)アミド]スルホニル-3-(4,6-ジメチルピリミジン-2-イル)尿素 ...0.90% 1-(α,α-ジメチルベンジル)-3-(N'ナトリウム)尿素 ...0.9%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ オシロイ ワリカ(北海道を除く) ミズガヤツリ(東北、関東・東山・東海、九州) ヒルムシ(関東・東山・東海、九州)	北海道 東北 関東・東山・東海の普通期栽培地帯 北陸	埴土～埴土 減水深1cm/日以下 埴土～埴土 減水深2cm/日以下 砂埴土～埴土 減水深2cm/日以下 埴土～埴土 減水深1.5cm/日以下	移植後3日～12日 (/ビ'11.5葉期まで) 移植後5日～12日 (/ビ'11.5葉期まで) 砂埴土では移植後5日～10日 (/ビ'11.5葉期まで) 移植後5日～12日 (/ビ'12葉期まで)	小包装10個 (500g)	水田に小包装のまま投げ入れる 本剤の使用回数1回 カフェンストローを含む農薬の総使用回数1回 シクロスルフアムロンを含む農薬の総使用回数1回 ダイムロンを含む農薬の総使用回数3回以内(本田期は2回以内)	住商7グローインターナショナル

移植水稻 つづき

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
カフェンストロール・シクロスルフアムロン・ダイムロン粒剤 つづき	レオンジャンボ	N-ジエチル-3-メチルスルホニル-1H-1,2,4-トリアジン-6-イルカルバミド ・・・4.2% 1-[2-(シクロプロピルカルボニル)アミノ]スルホニル-3-(4,6-ジメチルピリミジン-2-イル)尿素 ・・・0.90% 1-(α , α -ジメチルベンジル)-3-(p-トリル)尿素 ・・・9.0%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草 マダヒ オシロイ ワカ ワカ(北海道を除く) ミズガヤツリ(東北、関東・東山・東海、九州) ヒルムシロ(関東・東山・東海、九州)	近畿・中国・四国の普通期栽培地帯 九州の普通期栽培地帯	壤土～埴土 減水深1cm/日以下 砂壤土～埴土 減水深1.5cm/日以下	移植後5日～12日 (/ビ12葉期まで)	小包装10個 (500g)	水田に小包装のまま投げ入れる 本剤の使用回数1回 カフェンストロールを含む農薬の総使用回数1回 シクロスルフアムロンを含む農薬の総使用回数1回 ダイムロンを含む農薬の総使用回数3回以内(本田期は2回以内)	住商770 インタナショナル
プレチラクロール・ベンスルフロンメチル粒剤	ルーキー1キログラム剤75	2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(2-プロポキシエチル)アセトニド ・・・6.0% メチル= α -(4,6-ジメチルピリミジン-2-イル)カルバモイルスルホニル-0-トリブト ・・・0.75%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草 マダヒ オシロイ ワカ ミズガヤツリ ヘラモダカ ヒルムシロ クログワイ オダカ ゼリ シイ(東北) エノササダグサ(北海道) アオミドロ・藻類による表層はく離	北海道 東北	砂壤土～埴土 砂壤土では減水深1.5cm/日以下 埴土～埴土では減水深2cm/日以下 埴土～埴土 減水深2cm/日以下	移植後5日～15日 (/ビ12葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用回数1回 プレチラクロールを含む農薬の総使用回数2回以内 ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内	シジエンタ ジャパン(株)
ピラゾスルフロンエチル・ピリフタリド・プレチラクロール粒剤	アピロスター1キログラム剤	エチル=5-(4,6-ジメチルピリミジン-2-イル)カルバモイルスルホニル-1-メチルピラゾール-4-カルボキシラート ・・・0.30% (RS)-7-(4,6-ジメチルピリミジン-2-イルチオ)-3-メチル-2-ベンゾフラン-1(3H)-オン ・・・1.8% 2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(2-プロポキシエチル)アセトニド ・・・1.8%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草 マダヒ オシロイ ワカ ミズガヤツリ ヘラモダカ ヒルムシロ(北陸、関東・東山・東海の早期を除く) ゼリ アオミドロ・藻類による表層はく離(北陸を除く)	北海道 東北 北陸 関東・東山・東海の早期栽培地帯	砂壤土～埴土 減水深2cm/日以下 砂壤土は減水深1.5cm/日以下 埴土～埴土 減水深1cm/日以下 砂壤土～埴土 減水深2cm/日以下 砂壤土は減水深1cm/日以下	移植後5日～25日 (/ビ13葉期まで) 移植後5日～20日 (/ビ13葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用回数1回 ピラゾスルフロンエチルを含む農薬の総使用回数1回 ピリフタリドを含む農薬の総使用回数1回 プレチラクロールを含む農薬の総使用回数2回以内	シジエンタ ジャパン(株) 日産化学工業(株)

移植水稻 つづき

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
ピラソス スルフロ ンエチル・ ビリフタ リド・ブ レチラク ロール粒 剤 つづき	アピロスター 1 キロ粒剤	エチル=5-(4,6-ジメチルピリミジン-2-イルカルバモイルスルファミル)-1-メチルピラゾール-4-カルボキシレート ...0.30% (RS)-7-(4,6-ジメチルピリミジン-2-イルチオ)-3-メチル-2-ベンゾフラン-1(3H)-オン ...1.8% 2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(2-プロポキシエチル)アミノニトリド ...1.8%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ オシロイ ワカ ミズガヤツリ (北海道を除く) ハオモダカ(東北) ヒムシロ(北陸、関東・東山・東海の早期を除く) オシロイ・藻類による表層はく離(北陸を除く)	関東・東山・東海、近畿・中国・四国の普通期栽培地帯及び九州の早期栽培地帯 九州の普通期栽培地帯	砂壤土～埴土 減水深2cm/日以下 埴壤土～埴土 減水深1cm/日以下	移植後5日～20日 (ビエ3葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用回数1回 ビラソススルフロンエチルを含む農薬の総使用回数1回 ビリフタリドを含む農薬の総使用回数1回 ブレチラクロールを含む農薬の総使用回数2回以内	シジエンタジャパン(株) 日産化学工業(株)
ピラソス スルフロ ンエチル・ ビリフタ リド・ブ レチラク ロール水 和剤	アピロフライン顆粒	エチル=5-(4,6-ジメチルピリミジン-2-イルカルバモイルスルファミル)-1-メチルピラゾール-4-カルボキシレート ...2.1% (RS)-7-(4,6-ジメチルピリミジン-2-イルチオ)-3-メチル-2-ベンゾフラン-1(3H)-オン ...18.0% 2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(2-プロポキシエチル)アミノニトリド ...18.0%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ オシロイ ワカ ミズガヤツリ (北海道を除く) ハオモダカ(東北) ヒムシロ(北陸、近畿・中国・四国を除く) オシロイ(北陸を除く) オシロイ・藻類による表層はく離(東北を除く)	北海道 東北 北陸 関東・東山・東海の早期栽培地帯 関東・東山・東海、の普通期栽培地帯 近畿・中国・四国、九州の普通期栽培地帯	埴土～埴土 減水深2cm/日以下 埴土は減水深1.5cm/日以下 埴土～埴土 減水深1.5cm/日以下 埴壤土～埴土 減水深1cm/日以下 埴土～埴土 減水深2cm/日以下 埴土～埴土 減水深1cm/日以下	移植後5日～25日 (ビエ3葉期まで) 移植後5日～20日 (ビエ3葉期まで)	100g 希釈水量500mL	湛水散布 本剤の使用回数1回 ビラソススルフロンエチルを含む農薬の総使用回数1回 ビリフタリドを含む農薬の総使用回数1回 ブレチラクロールを含む農薬の総使用回数2回以内	シジエンタジャパン(株) 日産化学工業(株)

移植水稻 つづき

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
ピラソスルフロンエチル・ピリフタリド・ベンスルフロンメチル粒剤	アピロトップ1キロ粒剤 51	(RS)-7-(4,6-ジメトキシビリミジン-2-イルチオ)-3-メチル-2-ベンゾフラン-1(3H)-オン ...18.0% 2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(2-プロポキシエチル)アセトニリド ...18.0% メチル=α-(4,6-ジメトキシビリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-o-トリアート ...0.51%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ オシロイ ワカ ミズガヤツリ ヘラモダカ (九州の早期) ヒルムシロ(北陸を除く) ササ(北陸を除く) アオミドロ・藻類による表層はく離(北陸,九州の普通期を除く)	関東・東山・東海・東海の早期栽培地帯	埴壌土～埴土 減水深1cm/日以下	移植後5日～15日 (/ビ12.5葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用回数1回 ピリフタリドを含む農業の総使用回数1回 プレタクロールを含む農業の総使用回数2回以内 ベンスルフロンメチルを含む農業の総使用回数2回以内	シンジェンタジャパン(株)
						九州の早期栽培地帯	砂壌土～埴土 減水深2cm/日以下				
						北陸	埴土～埴土 減水深2cm/日以下	移植後5日～20日 (/ビ13葉期まで)			
						関東・東山・東海・近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	砂壌土～埴土 減水深2cm/日以下				
						九州の普通期栽培地帯	埴土～埴土 減水深1cm/日以下				
アジムスルフロン・ピラソスルフロンエチル・ピリフタリド・ベンスルフロンメチル粒剤	アピロトップA1キロ粒剤 36	1-(4,6-ジメトキシビリミジン-2-イル)-3-[1-メチル-4-(2-メチル-2H-テトラゾール-5-イル)ピラゾール-5-イル]スルホニル尿素 ...0.060% (RS)-7-(4,6-ジメトキシビリミジン-2-イルチオ)-3-メチル-2-ベンゾフラン-1(3H)-オン ...18.0% 2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(2-プロポキシエチル)アセトニリド ...18.0% メチル=α-(4,6-ジメトキシビリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-o-トリアート ...0.51%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ オシロイ ワカ ミズガヤツリ (東北) ヘラモダカ (東北) ヒルムシロ ササ アオミドロ・藻類による表層はく離	北海道	砂壌土～埴土 減水深2cm/日以下 砂壌土は減水深1.5cm/日以下	移植後5日～25日 (/ビ13葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用回数1回 アジムスルフロンを含む農業の総使用回数1回 ピリフタリドを含む農業の総使用回数1回 プレタクロールを含む農業の総使用回数2回以内 ベンスルフロンメチルを含む農業の総使用回数2回以内	シンジェンタ(株)
						東北	砂壌土～埴土 減水深1.5cm/日以下	移植後5日～20日 (/ビ13葉期まで)			

移植水稻 つづき

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
イマゾスルフロン・カフェンストロール・ダイムロン・ピリフタリド水和剤	アピロイール・グロアブル	1-(2-クロロイミダゾ[1,2-a]ピリジン-3-イル)スルホニル-3-(4,6-ジメトキシピリジン-2-イル)尿素 ...1.7% N,N-ジエチル-3-メチルスルホニル-1H-1,第穂に ...2.8% 1-(α,α-ジメチルベンジル)-3-(ピリタリド)尿素 ...18.0% (RS)-7-(4,6-ジメトキシピリジン-2-イルチオ)-3-チル-2-ベンゾフラン-1(3H)-オン ...2.8%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草 マダバイ オタリ ミダガヤリ (北海道を除く) ヘラモダカ (北海道、東北、九州) ヒルシロ(北陸を除く) ヤリ(北陸を除く) アオミドロ・藻類による表層はく離(北海道、東北、近畿・中国・四国)	北海道	壤土～埴土	移植後5日～25日 (ビエ13葉期まで)	500mL	原液湛水散布 本剤の使用回数1回 イマゾスルフロンを含む農薬の総使用回数2回以内 カフェンストロールを含む農薬の総使用回数1回 ダイムロンを含む農薬の総使用回数3回以内(本田期は2回以内) ピリフタリドを含む農薬の総使用回数1回	住化武田農業(株)イ・エ・イ行
						全域(北海道、九州を除く)の普通期栽培地帯		移植後5日～20日 (ビエ13葉期まで)			
						九州の普通期及び早期栽培地帯		移植後5日～17日 (ビエ13葉期まで)			
プロモブチド・ベントキサゾン剤	ショキニール250グラム	(RS)-2-(2,4-ジクロロ-m-トリルオキシ)プロピオンアミド ...24.0% 3-(4-クロロ-5-シロペンチルオキシ)-5-イソプロピル-1,3-オキサジリジン-2,4-ジオン ...6.0%		移植水稻	水田一年生雑草 マダバイ オタリ ミダガヤリ (北海道を除く) ヘラモダカ (北海道、東北)	北海道、東北、北陸	砂壤土～埴土	移植後1日～5日 (ビエ1葉期まで)	250g	湛水散布又は湛水周縁散布 本剤の使用回数1回 プロモブチドを含む農薬の総使用回数1回 ベントキサゾンを含む農薬の総使用回数2回以内	ケイ科学工業(株)
						関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯	埴土～埴土				
						近畿・中国・四国、九州の早期及び早期栽培地帯	砂壤土～埴土	移植後1日～5日			
クロメブロップ・プレチラクロール粒剤	センテ粒剤	(RS)-2-(2,4-ジクロロ-m-トリルオキシ)プロピオンアミド ...1.5% 2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(2-プロボキシエチル)アセトアミド ...1.5%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草 マダバイ オタリ ミダガヤリ ヘラモダカ	全域の普通期及び早期栽培地帯	壤土～埴土 減水深2cm/日以下	移植後3日～10日 (ビエ1.5葉期まで)	3kg	湛水散布 本剤の使用回数1回 クロメブロップを含む農薬の総使用回数2回以内 プレチラクロールを含む農薬の総使用回数2回以内	ハイエロップサイエンス(株)
						全域の普通期栽培地帯					
クロメブロップ・テニルクロール水和剤	ターシャールカットフロアブル	(RS)-2-(2,4-ジクロロ-m-トリルオキシ)プロピオンアミド ...6.0% 2-クロロ-N-(3-メトキシ-2-エニル)-2',6'-ジメチルアセトアミド ...4.0%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草 マダバイ オタリ	北海道	砂壤土～埴土 減水深2cm/日以下 砂壤土は減水深1.5cm/日以下	移植直後～移植後10日 (ビエ1.5葉期まで)	500mL	原液湛水散布 本剤の使用回数1回 クロメブロップを含む農薬の総使用回数2回以内 テニルクロールを含む農薬の総使用回数2回以内	ハイエロップサイエンス(株)

移植水稻 つづき

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用地帯	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
クロメブ ロップ・ テニル クロール水 和剤 つづき	ターシャ ルカット フロアブ ル	(RS)-2-(2,4- ジクロロ-m-トリホ シ)7'0'ビ'オンア リド ...6.0% 2-クロロ-N-(3-メ キシ-2-テニル)-2', 6'-ジメチルアセト アリド ...4.0%	水和 剤	移植水稻	水田一年 生雑草 マツバ イ ネ	北陸、関 東・東山 ・東海、 九州の普 通期栽培 地帯	砂壤土 ～埴土 減水深2 cm/日以下	植代後～ 移植前4日 又は 移植直後 ～移植後 10日 (ビ'1.5 葉期まで)	500mL	原液湛水散 布 本剤の使用 回数1回 クロメブ ロップを 含む農薬の 総使用回数2 回以内 テニルクロールを 含む農薬の総 使用回数2回 以内	バ'イェル ロ プ ア'サイエ ンス (株)
						東北、近 畿・中国 ・四国の 普通期裁 培地帯	砂壤土 ～埴土 減水深 1.5cm/ 日以下				
						関東・東 山・東 海、近畿 ・中国・ 四国の早 期栽培地 帯	埴土～ 埴土 減水深1 cm/日以下				
						九州の早 期栽培地 帯	砂壤土 ～埴土 減水深1 cm/日以下				

(2) 水田耕起前・水田畔畔・休耕田・水稲刈後・畑作・野菜作・永年生物作・非農耕地対象

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用地帯	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
イソウロ ン・MC PP粒剤	グラスジ ャック粒 剤	3-(5-ターシャリ-ブチ ル-3-イソキサリル) -1,1-ジメチル尿素 ...1.0% α-(2-メチル-4-クロ ロフェニル)7'0'ビ'オン 酸カリウム ...3.0%	粒 剤	公園、庭 園、提と う、駐車 場、道 路、運動 場、宅 地、鉄道 等	一年生雑 草	—	—	雑草発生 前～発生 初期	15～20kg	全面土壌散布 本剤の使用回 数3回以内 イソロンを含む 農薬の総使用 回数3回以内 MCPPを含む農 薬の総使用回 数3回以内	保土ヶ谷 ア'ロ(株)
					ギ'シ'シ ス'ナ 3'キ'				20～30kg		
イソウロ ン・MC PP粒剤	グラスジ ャック粒 剤	3-(5-ターシャリ-ブチ ル-3-イソキサリル) -1,1-ジメチル尿素 ...1.0% α-(2-メチル-4-クロ ロフェニル)7'0'ビ'オン 酸カリウム ...3.0%	粒 剤	家の周り の有用な 植物を植 えない場 所	一年生雑 草	—	—	雑草生育 初期 (草丈20c m以下)	15～20g/m ²	全面土壌散布 本剤の使用回 数3回以内 イソロンを含む 農薬の総使用 回数3回以内 MCPPを含む農 薬の総使用回 数3回以内	バ'イ'ボ'-薬 品
					ギ'シ'シ ス'ナ 3'キ'				20～30g/m ²		

水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稲刈後・畑作・野菜作・永年生作物・非農耕地対象 つづき

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適地	用帯	適用場	使用時期	10 a 当り使用量	使用方法	登録会社
グリホサートイソプロピルアミン塩・MCPB水和剤	クサビカフロアブル	イソプロピルアミン塩=N-(ホスホノメチル)グリホサート ・・・8.0% 2-メチル-4-クロロフェノキシ酢酸17% ・・・4.0%	水和剤	水田畦畔	一年生及び多年生雑草 (草丈抑制による刈込軽減)	—	—	—	雑草生育期 移植前まで	600～800mL 希釈水量100L	雑草茎葉散布 本剤の使用回数2回以内 グリホサートを含む農薬の総使用回数2回以内 MCPPを含む農薬の総使用回数3回以内	三共㈱
				公園 庭園 提とう 駐車場 道路 運動場 宅地のり 面鉄道等					雑草生育期 (草丈20cm以下)		雑草茎葉散布 本剤の使用回数3回以内 グリホサートを含む農薬の総使用回数2回以内 MCPPを含む農薬の総使用回数3回以内	
グルホシネート液剤	バスタ液剤	既登録薬剤に同じ										バリエックロップサイエンス(株)
メタミトロン水和剤	ハーブラック顆粒水和剤	4-アミノ-3-メチル-6-フェニル-1,2,4-トリアジン-5(4H)-オン ・・・70.0%	水和剤	てんさい (移植栽培)	畑地一年生広葉雑草	全域	—	—	移植活着後 雑草発生始期 収穫60日前まで	400～600g 希釈水量100L	雑草茎葉散布又は全面土壌散布 本剤の使用回数3回以内 メタミトロンを含む農薬の総使用回数3回以内	バリエックロップサイエンス(株)
グリホサートイソプロピル塩液剤	ハイフーノン液剤 ピラサート液剤 コンパカレール液剤 ハーブ・ニート液剤	イソプロピルアミン塩=N-(ホスホノメチル)グリホサート ・・・41%	液剤	キャベツはくさいだいこん	畑地一年生雑草	—	—	—	雑草生育期 (草丈30cm以下) 耕起7日前まで	250～500mL 希釈水量100L	雑草茎葉散布 本剤の使用回数1回 グリホサートを含む農薬の総使用回数1回	ワロン カミカル インダストリアル カンパニー リミテッド ビラキム コーポレーション シズ・インターナショナル・コーポレーション フォワード インターナショナル リミテッド
				水田畦畔	一年生雑草				雑草生育期 (草丈30cm以下) 収穫14日前まで		雑草茎葉散布 本剤の使用回数2回以内 グリホサートを含む農薬の総使用回数2回以内	
					水田耕起前				一年生雑草		雑草生育期 耕起20日～10日前まで	

水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稻刈後・畑作・野菜作・永年生物・非農耕地対象 つづき

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適地	適用土壌	使用時期	10 a 当り使用量	使用方法	登録会社
グリホサートイソプロピル塩液剤 つづき	ハイフーノン液剤 ピラサート液剤 コンパカレール液剤 ハーブ・ニート液剤	イソプロピルアミン塩 =N-(ホスホナチル)グリシナート ・・・41%	液剤	なしりんごかんきつ	一年生雑草	—	—	雑草生育期 (草丈30cm以下) 収穫7日前まで	250～500mL	雑草茎葉散布 本剤の使用回数3回以内 グリホサートを含む農薬の総使用回数3回以内	フロン カミル インダストリアル カンパニー リミテッド ビラキム コーポレーション シズ・インタナショナル・コーポレーション フォワード インタナショナル リミテッド
					多年生雑草				500～1000mL		
					公園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面等			一年生雑草	500mL		
								多年生雑草	希釈水量100L		
				スギナ	1回			希釈水量50～100L			
					雑草生育期			2000mL 希釈水量50～100L			
				造林地(地ごしらえ)	スサキ、ササキ等の多年生雑草 落葉雑かん木			生育盛期以降(夏～秋期)	1000mL 希釈水量30～100L	雑草木茎葉散布 本剤の使用回数1回 グリホサートを含む農薬の総使用回数1回	
									林地	クス、アジ等のつる類	

水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稲刈後・畑作・野菜作・永年生作物・非農耕地対象 つづき

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
DCPA乳剤	スタム乳剤35	既登録薬剤に同じ									ダウ・ケミカル(株)
グリホサートイソプロピルアミン塩液剤	モンサントラウンドアップ	既登録薬剤に同じ									日本モンサント(株)
グリホサートアンモニウム塩液剤	モンサントラウンドアップハイロード	既登録薬剤に同じ									日本モンサント(株)
ブタクロール乳剤	モンサントマーシエット乳剤	既登録薬剤に同じ									日本モンサント(株)
アラクロール乳剤	モンサントラッソー乳剤	既登録薬剤に同じ									日本モンサント(株)

お知らせ

— 月刊「植調」購読料値上げのお願い —

月刊「植調」をご購読いただきありがとうございます。

「植調」は昭和42年5月に創刊。日本における除草剤、生育調節剤の唯一の情報誌として各方面の皆様方に親しまれて36年間。現在通巻第419号まで発行することができました。これもひとえに皆様方のご支援、ご協力によるものと厚くお礼を申し上げます。

さて、「植調」の購読料は昭和60年第19巻1号から1部定価400円に改定し、以来18年間据置きでやって参りました。この間の物価上昇は著しいものがありましたが、経営努力によって現在まで維持してきましたが、遂に限界に達しました。経済状況が厳しい折りに誠に心苦しくは思いますが、37巻1号より定価500円＋消費税25円に改定させていただきます。

何卒、諸般の事情をご賢察の上ご諒承下さいますようお願い申し上げます。

植調編集印刷事務所 広田伸七