

新 登 録 除 草 剤 一 覧

農林水産省消費・安全局農産安全管理課

平成15年4月1日～平成15年10月30日

(1) 移植水稻

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地域	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
ビラゾレート・ブタクロール粒剤	クサカリン粒剤35	4-(2,4-ジクロロペンゾイル)-1,3-ジメチル-5-ビラゾリル-プロピルエンスルホネート ・・・8.0% 2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(プロトキシメチル)アゼトアニリン ・・・3.5%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及び ビマツバイ、 ホタルイ、 ウリカリ、 ヘラオモダカ ミスガヤツリ、 ヒルムシロ	北海道 東北 北陸	砂壤土～埴土	移植後 1～ 10日 (ノビエ1.5 葉期まで)	3～4kg (但し砂壤土は3kg)	湛水散布 本剤の使用回数1回 ビラゾレートを含む農薬の総使用回数1回 ブタクロールを含む農薬の総使用回数1回	三共アグロ(株)
						関東以西の普通期及び早期栽培地帯		移植後 1～ 10日 (ノビエ2.0 葉期まで)	3kg		
ビラゾレート・ブタクロール粒剤	クサカリン粒剤25	4-(2,4-ジクロロペンゾイル)-1,3-ジメチル-5-ビラゾリル-プロピルエンスルホネート ・・・6.0% 2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(プロトキシメチル)アゼトアニリン ・・・2.5%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及び ビマツバイ、 ホタルイ、 ウリカリ、 ヘラオモダカ ミスガヤツリ、 ヒルムシロ、 オモダカ(関東・東山・東海)	全域の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～埴土	移植直後～移植後 10日 (但し九州の普通期は移植後7日まで) (ノビエ1.5 葉期まで)	3～4kg	湛水散布 本剤の使用回数1回 ビラゾレートを含む農薬の総使用回数1回 ブタクロールを含む農薬の総使用回数1回	三共アグロ(株)
オキサシ・アゾン乳剤	ロンスター乳剤	5-ターシャリブチル-3-(2,4-ジクロロ-5-イソプロポキシフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール-2(3H)-オン ・・・12.0%	乳剤	移植水稻	水田一年生雑草及び ビマツバイ	全域の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～埴土 (減水深 2cm/日以下)	植代時～移植4日前まで	500mL	原液湛水散布 本剤の使用回数1回 オキサシ・アゾンを 含む農薬の総使用回数1回	ハ・イエルック フサイエンス(株)
				直播水稻		全域(北海道を除く)の普通期及び早期栽培地帯	埴土～埴土(極端な漏水田を除く)	湛水直播の植代時～は種4日前まで	350～500mL		

(1) 移植水稻

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
ビ ^レ リミノバ ^ク クメチル粒剤	ワンスターシ ¹ キ ^ロ 粒剤	メチル=2-(4,6-ジ ^メ トキシビ ^レ リミ ^ン 2-イ ^ル オキシ)-6-(1-メ ^ト キシイミ ^ノ エチル)ベン ^ゾ エ ^ー ト ……1.2%	粒剤	移植水稻	ノ ^ビ エ	北海道、北陸、関東・東山・東海の普通期栽培地帯	壤土～埴土	移植後15～35日(ノ ^ビ エ4葉期まで)(移植前後の初期除草剤との体系で使用)	1kg	湛水散布 本剤の使用回数1回 ビ ^レ リミノバ ^ク クメチルを含む農薬の総使用回数2回以内	日本農薬(株)
						東北、近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～埴土				
						九州の普通期栽培地帯					
ベン ^ゾ ビ ^レ シクロン・ベ ^ン トキザ ^ン 粒剤	フォーカスショ ^ト シ ^ン ホ ^ン	3-(2-クロロ-4-メ ^シ ルベン ^ゾ イ ^ル)-2-フェ ^ニ ルチ ^ロ ビ ^レ シクロ ^ン [3,2,1]オク ^タ 2-エ ^ン 4-オ ^ン ……4.0% 3-(4-クロロ-5-シクロベン ^チ ルオ ^キ シ-2-フル ^オ ロフェ ^ニ ル)-5-イ ^ソ プロ ^ピ リテ ^ン -1,3-オ ^キ ザ ^ン リジ ^ン -2,4-ジ ^オ ン ……4.0%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマ ^ツ バ ^イ 、オ ^タ ル ^イ 、ミ ^ス ガ ^ヤ ツ ^リ (北海道を除く)、ヘ ^ラ オ ^モ タ ^カ (北海道、九州)、ウ ^リ カ ^ワ (近畿・中国・四国、九州)、ヒ ^ル ム ^シ ロク ^ロ グ ^ワ イ(東北、関東・東山・東海)	北海道	壤土～埴土	移植直後～移植後10日(ノ ^ビ エ1.5葉期まで)	小包装(パ ^ッ ク)10個(500g)	水田に小包装(パ ^ッ ク)のまま投げ入れる 本剤の使用回数1回 ベン ^ゾ ビ ^レ シクロンを含む農薬の総使用回数2回以内 ベ ^ン トキザ ^ン を含む農薬の総使用回数2回以内	科研製薬(株) 北興化学(株)
						東北	砂壤土～埴土				
						北陸	壤土～埴土				
						関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯					
						近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～埴土	移植直後～移植後5日(ノ ^ビ エ1葉期まで)			
						九州の普通期及び早期栽培地帯		移植直後～移植後10日(ノ ^ビ エ1.5葉期まで)			

(1) 移植水稻

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
シハロホップ・ ブチル・ジメ タメトリン・ヒ ラゾ・スルフロ ンエチル・ブレ チラクロール粒 剤	ホクト1キロ粒 剤	ブチル=(R)-2-[4-(4-シアノ-2-フルオロフェノキシ)フェノキシ]プロピオナート ・・・1.8% 2-メチルチオ-4-エチルアミノ-6-(1,2-ジメチルプロピル)ピリジン-2-イルカルバモイルスルファモイル-1-メチルピラゾール-4-カルボキシラート ・・・0.60% エチル=5-(4,6-ジメトキシ)リジン-2-イルカルバモイルスルファモイル-1-メチルピラゾール-4-カルボキシラート ・・・0.30% 2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(2-プロポキシエチル)アセトアミド ・・・4.5%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバ、オタカイ、ウリカ、ミズガヤツリ、ヘラオモカ(北海道、東北)	北海道、東北、北陸、関東以西の普通期栽培地帯	砂壤土～埴土 (減水深2cm/日以下)	移植後5～20日(ヒエ3葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用回数1回 シハロホップ・ブチルを含む農薬の総使用回数3回以内 ジメタメトリンを含む農薬の総使用回数2回以内 ヒラゾ・スルフロンエチルを含む農薬の総使用回数1回 ブレチラクロールを含む農薬の総使用回数2回以内	ハ・イェルクロップ・サイエンス(株)
					オモカ(近畿・中国・四国の早期、九州を除く) ヒルムシロ、セリ、クロクワイ(北海道、近畿・中国・四国の早期、九州を除く) エゾノササカゲサ(北海道) シズイ(東北) アオミドロ・藻類による表層はく離	関東以西の早期栽培地帯	砂壤土～埴土 (減水深1.5cm/日以下)				

日本雑草学会第43回大会・講演会のご案内

日本雑草学会の大会・講演会が下記の日時・場所で開催されます。一般の方の参加も大歓迎ですので、多数の方の参加をお待ちしております。

- 期日 平成16年4月17日(土) 一般講演・ポスター発表・小集会等(9時30分開始予定)、総会、懇親会
4月18日(日) 一般講演・ポスター発表・小集会等

●会場および大会に関する問合せ

会場：岩手大学 学生センター(岩手県盛岡市上田3-18-8)

大会に関する問合せ

大会委員長 伊藤一幸 大会幹事 梨木 守

〒020-0198 岩手県盛岡市厨川字赤平4 東北農業研究センター

E-mail: conf2004@wssj.jp Tel: 019-643-3562 Fax: 019-641-7794

●講演会参加費等

参加費：会員 2,000円、非会員 3,000円、学生(会員・非会員共) 1,000円。

講演要旨：3,000円。

●懇親会

4月17日(土) 17時30分より、岩手大学中央食堂にて行います。

会費：一般会員・非会員 前納 5,000円(3月26日まで)、当日 6,000円

学生 2,000円(前納・当日とも)

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稻刈後・畑作・野菜作・永年生作物・非農耕地対象

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適地	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
グリホサート液剤	バスタ液剤 0.2	アンモニウムDL-ホモアラニン-4-イル(メチル)ホスフィケート・・・0.20%	液剤	公園、庭園、駐車場、宅地、墓地等	一年生及び多年生雑草			雑草生育期	100mL/m ² (原液散布)	雑草茎葉散布 本剤の使用回数3回以内 グリホサートを含む農薬の総使用回数3回以内	バリエルクロップ・サイエンス(株)
グリホサートイソプロピルアミン塩・ビラフルフェンエチル水和剤	サンタールト007	イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホメチル)グリホサート・・・30.0% エチル=2-クロロ-5-(4-クロロ-5-シフルオロメトキシ-1-メチルピラゾール-3-イル)-4-フルオロフェニルセタート・・・0.16%	水和剤	かんきつ、りんご、なし、もも、ぶどう	一年生及び多年生雑草			雑草生育期(草丈30cm以下) (収穫7日前まで)	400～600mL 希釈水量100L	雑草茎葉散布 本剤の使用回数3回以内 グリホサートを含む農薬の総使用回数3回以内 ビラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数3回以内	日本農薬(株)
				だいこん	畑地一年生雑草			雑草生育期(草丈30cm以下) (耕起またはは種7日前)		雑草茎葉散布 本剤の使用回数1回 グリホサートを含む農薬の総使用回数1回 ビラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数1回	
				キャベツ				雑草生育期(草丈30cm以下) (耕起または定植7日前)			
				水田畦畔	一年生雑草及び多年生雑草			雑草生育期(草丈30cm以下) (収穫14日前まで)		雑草茎葉散布 本剤の使用回数2回以内 グリホサートを含む農薬の総使用回数2回以内 ビラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数2回以内	
				水田耕起前	一年生雑草			雑草生育期 (耕起前20～10日)		雑草茎葉散布 本剤の使用回数1回 グリホサートを含む農薬の総使用回数1回 ビラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数1回	

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稻刈後・畑作・野菜作・永年生物・非農耕地対象

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
グリホサートイソプロピルアミン塩・ピラフルフェンエチル水和剤 つづき	サンタールト007	イソプロピルアミン塩 =N-(ホスホメチル)グリホサート ・・・30.0% エチル=2-クロロ-5-(4-クロロ-5-ジフルオロメトキシ-1-メチルピラゾール-3-イル)-4-フルオロフェニルアセテート ・・・0.16%	水和剤	公園、庭園、堤とう、道路、運動場、宅地、鉄道、のり面等	一年生及び多年生雑草			雑草生育期(草丈50cm以下)	500～1000mL 希釈水量 100L	雑草茎葉散布 本剤の使用回数3回以内 グリホサートを含む農薬の総使用回数3回以内 ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数3回以内	日本農薬(株)
テブチクロン水和剤	ハービックSC	1-(5-tert-ブチル-1,3,4-チアジアゾール-2-イル)-1,3-ジメチル尿素 ・・・42.0%	水和剤	駐車場、道路、運動場、宅地、鉄道軌道内	一年生雑草及び多年生雑草			雑草発生前～発生始期 生育中期	400～800mL 希釈水量 100～200L 800～1600mL 希釈水量 200～400L	雑草茎葉散布又は全面土壌散布 本剤の使用回数3回以内 テブチクロンを含む農薬の総使用回数3回以内	ダウ・ケミカル日本(株) 住化武田農薬(株)
トリフロキシスルフロナトリウム塩水和剤	モメント顆粒水和剤	1-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イル)-3-[3-(2,2,2-トリフルオロエトキシ)-2-ヒドロキシメチルホル]尿素ナトリウム塩 ・・・72.0%	水和剤	日本芝	一年生広葉雑草 一年生雑草			春期～夏期 雑草発生初期～生育期 秋期～冬期 雑草発生初期～生育期	3～6g 散布水量 150～250L	雑草茎葉散布又は全面土壌散布 本剤の使用回数2回以内 トリフロキシスルフロナトリウム塩を含む農薬の総使用回数2回以内	シンジエンタジヤバン(株)
イソキサベンフロラスラム水和剤	ターザインプロDF	N-[3-(1-エチル-1-メチルアミノ)イソキサゾール-5-イル]-2,6-ジメトキシベンゾアミド ・・・60.0% 2',4,6'-トリフルオロ-7-メトキシ[1,2,4]トリアゾロ[1,5-c]ピリミジン-2-スルホンアミド ・・・4.0%	水和剤	日本芝	一年生及び多年生広葉雑草			芝育成期(雑草発生初期)	30～50mL 散布水量 150～200L	雑草茎葉散布又は全面土壌散布 本剤の使用回数2回以内 イソキサベンを含む農薬の総使用回数2回以内 フロラスラムを含む農薬の総使用回数2回以内	ダウ・ケミカル日本(株)
アシュラム液剤	アッシュラン液剤	N'-メトキシカルボニルスルファニルアミドナトリウム ・・・37.0%	液剤	日本芝	畑地一年生雑草			秋～春期(芝発芽前) 芝生育期(雑草生育初期)	1000～1250mL 希釈水量 200～300L 400～600mL 希釈水量 200～300L	散布(茎葉兼土壌処理) 本剤の使用回数3回以内 アシュラムを含む農薬の総使用回数3回以内	ハインレックプロサイエンス(株)

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稻刈後・畑作・野菜作・永年生物作・非農耕地対象

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用地帯	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社	
アシェラム液剤 つづき	アシェラム液剤	N'-メトキシカルボニルアルファニルアミドナトリウム ・・・37.0%	液剤	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面等	一年生雑草			雑草生育期	1000～2000 mL 希釈水量 100～200L	散布（茎葉処理） 本剤の使用回数 3 回以内 アシェラムを含む農薬の総使用回数 3 回以内	ハ・イェルクロック サイエンス（株）	
					多年生広葉雑草			2000～3000 mL 希釈水量 100～200L				
					多年生イネ科雑草			3000～5000 mL 希釈水量 100～200L				
					クヌ			5000mL 希釈水量 100～200L				
				すぎ（下刈り）	スギ			6月	20倍 300mL/株（径30cmの株）	局所散布（茎葉処理） 本剤の使用回数 3 回以内 アシェラムを含む農薬の総使用回数 3 回以内		
					アレチノギク、カラムシ、シロイ等の大型雑草			雑草発生期	20倍 希釈水量 60L			散布（茎葉処理） 本剤の使用回数 3 回以内 アシェラムを含む農薬の総使用回数 3 回以内
					クヌ			6～7月	10倍 50L			
ベンディメタリン水和剤	グリーンケア顆粒水和剤	N-(1-エチルプロピル)-3,4-ジメチル-2,6-ジニトロアニリン ・・・53.0%	水和剤	日本芝	一年生雑草（ネク科を除く）			雑草発生前	300～600g 希釈水量 200～300L	全面土壌散布 本剤の使用回数 3 回以内 ベンディメタリンを含む農薬の総使用回数 3 回以内	エス・ディー・エス・ハイオテック（株）	
バラコート液剤	グラモキソンS	1,1'-ジメチル-4,4'-ビビリジリウムジクロリド ・・・24.0%	液剤	水稻	水田一年生雑草			秋期稲刈取後又は春期水田荒起 1 か月前から直前まで	200～400mL 希釈水量 50～150L	雑草茎葉散布（直播水稻は乾田状態で雑草茎葉散布） 本剤の使用回数 2 回以内 バラコートを含む農薬の総使用回数 2 回以内	シンジエンタージャパン（株）	
					マヅハイ			稲刈取後又は春耕前				

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稻刈後・畑作・野菜作・永年生作物・非農耕地対象

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適地	用 帯	用 壤	使用時期	10 a 当り使用量	使用方法	登録会社	
パ ^ラ コート液剤 つづき	ク ^ラ モキシソンS	1, 1'-シ ^{メチル} -4, 4'-ビ ^{リジ} リウムシ ^{クロリド} ・・・24. 0%	液 剤	水 稲	クロ ^グ ワイ				稲刈取後 クロ ^グ ワイの塊茎形成前から形成初期まで	200～400mL 希 積 水 量 50～150L	雑草茎葉散布 (直播水稲は乾田状態で雑草茎葉散布) 本剤の使用回数 2 回以内 パ ^ラ コートを含む農薬の総使用回数 2 回以内	シンジ ^{エンタ} シ ^{ャパン} ㈱	
					ミス ^ガ ヤツリ				稲刈取後 ミス ^ガ ヤツリの塊茎形成前から形成初期まで				
									春期耕起前(しろかき前の雑草発生揃期)	300～400mL 希 積 水 量 50～150L			
					直播水稲				水田一年生雑草、 畑地一年生雑草	乾田直播のは種前	200～300mL 希 積 水 量 50～150L		
					水稲 (苗代)					雑草生育期・整地前	300mL 希 積 水 量 50～150L		
					水稲 (休耕田)					雑草生育期	200～300mL 希 積 水 量 50～150L		
					麦類				畑地一年生雑草 (冬生雑草)	は種前	50～150L		雑草茎葉散布 本剤の使用回数 1 回 パ ^ラ コートを含む農薬の総使用回数 1 回
					ばれいしょ				畑地一年生雑草	萌芽直前	100～200mL 希 積 水 量 50～150L		
					ぶどう、 おうとう、 うめ、 びわ、 りんご、 なし、 かき、 もも、 かんきつ、 くり				果樹園下草一年生雑草、 オ ^{チャド} 、 ク ^{ローパー} 等 牧草	雑草生育期 収穫30日前まで	150～300mL 希 積 水 量 50～150L		雑草茎葉散布 本剤の使用回数 5 回以内 パ ^ラ コートを含む農薬の総使用回数 5 回以内

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稲刈後・畑作・野菜作・永年生物・非農耕地対象

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用環境	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
パラコート液剤 つづき	グラムキソンS	1,1'-ジメチル-4,4'-ビピリジリウムジクロリド ・・・24.0%	液剤	キャベツ、はなやさい、はくさい、レタス、パセリ、セリ、アスパラガス、みつば、ほうれんそう、ねぎ、だいこん、かぶ、にんじん、ごぼう、たまねぎ、かんしよ、さといも、やまのいも	畑地一年生雑草			は種前又は植付前及び収穫後、畦間処理では収穫30日前までの雑草生育期	150～300mL 希釈水量 50～150L	雑草茎葉散布本剤の使用回数3回以内 パラコートを含む農薬の総使用回数3回以内	シシエントジャパン(株)
				トマト、ピーマン、すいか、かぼちゃ、メロン、まくわうり、しろうり、きゅうり、なす				は種前又は植付前及び収穫後、畦間処理では収穫14日前までの雑草生育期			
				いちご				定植前又は畦間処理では収穫120日前までの雑草生育期			
				こんにゃく				植付後から萌芽直前及び畦間処理では収穫30日前までの雑草生育期	200～300mL 希釈水量 50～150L	雑草茎葉散布本剤の使用回数3回以内 パラコートを含む農薬の総使用回数3回以内	
				茶				摘採7日前まで			

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稻刈後・畑作・野菜作・永年生物・非農耕地対象

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 地	用 帯	適 用 壤	使用時期	10a 当り 使用量	使用方法	登録会社
バ・ラコート液 剤 つづき	ク・ラモキシノS	1, 1'-ジ・メチル-4, 4'- ビ・ス・リシ・リウムジ クロリド ・・・24.0%	液 剤	桑	畑地一年 生雑草				春期萌芽 前又は伐 採後	200～300mL 希釈水量 50～150L	雑草茎葉散布 本剤の使用回 数3回以内 バ・ラコートを含む 農薬の総使用 回数3回以内	シシ・エンタ ジ・ヤパン(株)
				牧野(造 成)	一般雑草				火入前	200～500mL 希釈水量 50～150L		
				公園、 庭園、 堤とう、 駐車場、 宅地、 のり面等	一年生雑 草				雑草生育 期	300～500mL 希釈水量 50～150L		
ホセチル・ホ・リ カー・バ・メート 水和剤	コーレット水 和剤	アルミニウムトリス(エチル =ホスホナート) ・・・25.0% ビ・ス・ジ・メチルジ・オカル バ・モイルジ・ンクエチレン ビ・ス・ジ・オカル・バ・メート ・・・50.0%	水 和 剤	芝(ヘント グラス)	藻類				藻類発生 時	2000～3000 g 希釈水量 1000L	散布 本剤の使用回 数8回以内 ホセチルを含む農 薬の総使用回 数8回以内 ホ・リカー・バ・メートを含 む農薬の総 使用回数8回 以内	ハ・イエルクロッ プ・サイエンス (株)

この草はなんだろう? 手軽に調べたい。

三二雑草図鑑

耕地雑草ハンドブック

A5判 本体2,200円(税別)

耕地には主要なものだけで150種を超える雑草が生えてきます。これら雑草の防除の第一歩は草を知ることです。本書は、農耕地や樹園地などによく見られる雑草397種を写真とともに紹介した、草を知るための野帳版雑草図鑑です。

原色図鑑 芽ばえとたね

浅野 貞夫／著

A4判 本体9,800円(税別)

芽ばえの姿はどうなんだろう。本書は、植物の芽ばえのようすを克明に表した精密図版と、種・成植物の写真による植物の一生図鑑です。成植物のみの図鑑と異なり、芽ばえのようすから紹介しているため、植生などの調査にたいへん役に立つとの声が寄せられています。

全国農村教育協会

〒110-0016 東京都台東区台東1-26-6
Tel.03-3833-1821 Fax.03-3833-1665