

平成15年度水稻作関係除草剤試験成績概要

財団法人 日本植物調節剤研究協会 技術部

平成15年度水稻作関係除草剤試験成績中央検討会は、平成15年12月11日、12日の2日間、池之端文化センターにおいて開催された。なお、適1試験成績検討会は、これに先立ち平成15年10月16日 台東1丁目区民館にて開催された。ここに、これらの成果の概要を報告する。

1) 第一次適用性試験(適1)は、北海道地域(植調北海道試験地)、東北地域(植調古川試験地)、北陸地域(植調新潟試験地)、関東地域

(植調研究所)、近畿・中国・四国地域(植調滋賀試験地)、九州地域(植調福岡試験地)の全国6地域および砂壤土(植調広島第一試験地)で38薬剤(のべ206点)について実施した。その判定結果は、第2表のとおりである。

2) 第二次適用性試験(適2)の総点数はのべ2,150点であり、その内訳を第1表にまとめた。これら適2試験の判定結果は、第3表のとおりである。

第1表 平成15年度適2試験実施点数

A-1 移植栽培(一発処理)	144 剤 1,423 点	A-4 特殊雑草対象 内訳	
A-2 移植栽培(体系処理:初期)	22 剤 197 点	イボクサ	8 剤 15 点
A-3 移植栽培(体系処理:中後期)	16 剤 145 点	エンノサヤヌカグサ	5 剤 8 点
A-4 移植栽培(特殊雑草対象)	のべ 155 剤 267 点	オモダカ	28 剤 64 点
B 直播栽培	31 剤 100 点	クサネム	1 剤 3 点
C 畦畔雑草	2 剤 10 点	クログワイ	40 剤 85 点
E 休耕田	1 剤 4 点	コウキヤガラ	2 剤 3 点
F 生物除草剤	1 剤 2 点	シズイ	13 剤 19 点
その他	1 剤 2 点	ミズアオイ	19 剤 18 点
		SU 抵抗性コナギ	13 剤 13 点
		SU 抵抗性ホタルイ	26 剤 39 点

第2表 平成15年度 水稻作関係除草剤適1試験 成績判定結果一覧

注) 判定欄の記入については、◎：極めて有望、○：有望、□：可能性有り、△：再検討、×：見込みなし を表す。

NO	薬剤名・剤型 [委託者]	有効成分及び含有率 (%)	実施場所別総合評価						中央判定 [今後の検討課題]
			北海道	北川	新潟	滋賀	福岡	広島砂壌土	
1	BAG-032 シヤンホ [BASFアグロ]	カフェンストール :10.5 シクロスルフアモン :2.25 タムロン :22.5 ベソゾビシクロン:10	□	○	○	○	○	○	○ 一発処理で +3～ノビエ2L, ホタルイ2L [ウリカワに対する効果の変動について]
2	BCH-031-1kg 粒 [ハイエル]	AVH-301 :3 オキサシクロメホン:0.8	□	□	○	○	◎	○	□ (北海道・東北) 一発処理で +5～ノビエ2L, ホタルイ2L ○ (北陸以南) 一発処理で +5～ノビエ2.5L, ホタルイ2L [低温条件でのノビエ殺草葉齢限界]
3	BCH-032-1kg 粒 [ハイエル]	AVH-301 :3 フェントラサミト :3	□	□	○	○	◎	◎	□ (北海道・東北) 一発処理で +5～ノビエ2.5L, ホタルイ2L ○ (北陸以南) 一発処理で +5～ノビエ2.5L, ホタルイ2L [年次変動の確認]
4	BCH-033-1kg 粒 [ハイエル]	AVH-301:3 メフェナセット:12	△	□	○	○	◎	○	□ (北海道・東北) 一発処理で +5～ノビエ2.5L, ホタルイ2L ○ (北陸以南) 一発処理で +5～ノビエ2.5L, ホタルイ2L [低温条件での効果と薬害の確認]
5	BCH-034-1kg 粒 [*ハイエル, 住化]	フェントラサミト :2 イマゾスルフロン :0.9 プロモフチト :9 タムロン :4.5	□	◎	○	○	◎	○	○ 一発処理で +0～ノビエ2L, ホタルイ2L [年次変動の確認]
6	BCH-035-1kg 粒 [*ハイエル, 住化]	フェントラサミト :3 イマゾスルフロン :0.9 プロモフチト :9	□	○	○	○	○	○	○ 一発処理で +0～ノビエ2.5L, ホタルイ2L [年次変動の確認]
7	DBH-1291 乳 [東部韓農]	メタミホップ (新規):3.3	○	◎	○	○	○	○	○ ノビエ専用中後期剤として +20～+40, ノビエ6L [年次変動の確認]
8	DKH-311-1kg 粒 [テュホソ]	フェントラサミト :3 プロモフチト :9 ベソスルフロメチル:0.75	○	○					○ (北海道・東北) 一発処理で +3～ノビエ2.5L, ホタルイ2L [年次変動の確認]
9	HOK-0301-1kg 粒 [北興]	フェントラサミト :3 ベソゾフェナップ :8 ベソフレート :5	○	□	○	○	◎	□	○ 一発処理で +5～ノビエ2.5L, ホタルイ2L [ウリカワに対する効果の変動について]
10	HOK-201D-1kg 粒 [*北興, テュホソ]	HOK-201 :2.5 ベソスルフロメチル:0.75	□	□					□ (北海道・東北) 一発処理で +5～ノビエ2.5L, ホタルイ2L [不効草種に対する対応について]
11	HOK-201DS-1kg 粒 [*北興, テュホソ]	HOK-201 :2.5 ベソスルフロメチル:0.51 タムロン :4.5			○	○	△	□	○ (北陸以南) 一発処理で +5～ノビエ2.5L, ホタルイ2L [不効草種に対する対応について]
12	HOK-222-1kg 粒 [*北興, テュホソ]	ベソスルフロメチル:0.75 オキサシクロメホン :0.8 クロメフロップ :3 プロモフチト :6	□	□					□ (北海道・東北) 一発処理で +5～ノビエ2.5L, ホタルイ2L [薬害要因について]

NO	薬剤名 ・ 剤型 [委託者]	有効成分及び含有率 (%)	実施場所別総合評価							中央判定 [今後の検討課題]
			北海道	青森県	新潟県	福井県	滋賀県	福岡県	広島県	
13	HOK-223-1kg 粒 [*北興, デュボン]	ベンズルフロニメチル:0.51 オキサジクロメホン :0.8 クロメフ ロップ :3 プロモフチト :6			○	○	□	○	○	□ (北陸以南) 一発処理で +5～ノビエ2.5L, ホタルイ2L [被害要因について]
14	KPP-444-1kg 粒 [科研]	プロモフチト :9 ベンズルフロニメチル:0.75 ベントキサゾン :3.9	○	○						□ (北海道・東北) 一発処理で +0～ノビエ1.5L, ホタルイ始 [1.5Lノビエ効果, 残効期間]
15	KPP-444①-1kg 粒 [科研]	プロモフチト :9 ベンズルフロニメチル:0.51 ベントキサゾン :3.9			○	○	○	□	○	□ (北陸以南) 一発処理で +0～ノビエ1.5L, ホタルイ始 [1.5Lノビエ効果, 残効期間]
16	KUH-013K-1kg 粒 [*タミ化, デュボン, 科研]	ビリミノバクメチル:0.45 ベントキサゾン :2 プロモフチト :9 ベンズルフロニメチル :0.51	○	○						○ (北海道・東北) 一発処理で +3～ノビエ3L, ホタルイ2L [年次変動の確認]
17	KUH-013D-1kg 粒 [*タミ化, デュボン, 科研]	ビリミノバクメチル:0.45 ベントキサゾン :2 プロモフチト :9 ベンズルフロニメチル :0.75			○	○	○	□	○	○ (北陸以南) 一発処理で +3～ノビエ3L, ホタルイ2L [年次変動の確認]
18	KUH-023K ジェンボ [*タミ化, SDS]	カフェンストール :8.4 ベンゾビシクロン:8 ベンズルフロニメチル:2	○	○						□ (北海道) 一発処理で +5～ノビエ2L, ホタルイ2L ○ (東北) 一発処理で +5～ノビエ2.5L, ホタルイ2L [低温条件での効果の確認]
19	KUH-023D ジェンボ [*タミ化, SDS]	カフェンストール :12 ベンゾビシクロン:8 ベンズルフロニメチル:3			○	○	○	□	○	○ (北陸以南) 一発処理で +3～ノビエ2.5L, ホタルイ2L [年次変動の確認]
20	KUH-031 粒 [タミ化]	ビリミノバクメチル:0.4 ベンツゾン :11	○	○	○	○	○	□	○	○ 体系処理(中後期)で +15～+40, ノビエ4L, ホタルイ4L [水条件と効果の安定性について]
21	KUH-032-0.25kg 粒 [*タミ化, SDS]	カフェンストール :8.4 ベンゾビシクロン:8	△	○	○	○	○	□	○	△ (北海道) ○ (東北以南) 一発処理で +3～ノビエ2L, ホタルイ2L [低温条件での効果の確認]
22	NC-606-1kg 粒 [日産]	ビラゾスルフロニエチル:0.3 オキサジクロメホン :0.8 ベンゾビシクロン :2 ジメタメリン :0.6	□	◎	○	○	◎	○	○	○ 一発処理で +5～ノビエ2.5L, ホタルイ2L [年次変動の確認]
23	NH-301-1kg 粒 [日農]	オキサジクロメホン:0.6 クロメフ ロップ :3.5 プロモフチト :6	□	□	□	□	○	□	□	□ 一発処理で +0～ノビエ2.5L, ホタルイ2L [対象草種と処理適期について]
24	NH-302 フロアブル [日農]	オキサジクロメホン:1.2 クロメフ ロップ :7 プロモフチト :18	□	□	□	○	○	□	□	□ 一発処理で +0～ノビエ2.5L, ホタルイ2L [対象草種と処理適期について]
25	SB-566 フロアブル [SDS]	カフェンストール :3 タイムロン :8 ベンゾビシクロン:4(W/V)	□	○	○	○	○	○	○	○ 体系処理で初期に使用する剤として +0～ノビエ1.5L, ホタルイ2L [年次変動の確認]

NO	薬剤名・剤型 [委託者]	有効成分及び含有率 (%)	実施場所別総合評価							中央判定 [今後の検討課題]
			北海道	北川	新潟	滋賀	福岡	広島	砂土	
26	SB-566-1kg 粒 [SDS]	カフェストール : 1.5 ダ・イロン : 4 ベンゾ・ヒシクロン : 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	○ 体系処理で初期に使用する剤として +0～ノビエ 1.5 L, ホタルイ 2 L [年次変動の確認]
27	SW-031①-1kg 粒 [*三共, テ・ユホ・ン]	アエロホス : 4.5 ダ・イロン : 4.5 ベンスルフロメチル : 0.51					△	☐	☐	□ (近畿以西) 一発処理で +3～ノビエ 2.5 L, ホタルイ 2 L [効果の安定性について]
28	SW-032 フロアブル [*三共, テ・ユホ・ン]	フェントラサ・ミト : 6 プロモフ・チト : 18 ベンスルフロメチル : 1.4	☐	☐						○ (北海道・東北) 一発処理で +3～ノビエ 2.5 L, ホタルイ 2 L [年次変動の確認]
29	SW-032① フロアブル [*三共, テ・ユホ・ン]	フェントラサ・ミト : 6 プロモフ・チト : 18 ベンスルフロメチル : 1			☐	☐	☐	☐	☐	○ (北陸以南) 一発処理で +3～ノビエ 2.5 L, ホタルイ 2 L [年次変動の確認]
30	TH-001-1kg 粒 [*住化武田, SDS]	イマゾ・スルフロ : 0.9 カフェストール : 3 ベンゾ・ヒシクロン : 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	○ 一発処理で +5～ノビエ 2.5 L, ホタルイ 2 L [年次変動の確認]
31	TH-122-1kg 粒 [住化武田]	イマゾ・スルフロ : 0.9 オキサシ・クロメホ : 0.8 ベンゾ・ヒシクロン : 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	○ 一発処理で +5～ノビエ 2.5 L, ホタルイ 2 L [年次変動の確認]
32	TH-421 シ・ヤンホ [住化武田]	イマゾ・スルフロ : 2.25 オキサシ・クロメホ : 1.5 ベンゾ・ヒシクロン : 5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	○ 一発処理で +5～ノビエ 2.5 L, ホタルイ 2 L [年次変動の確認]
33	TH-547-1kg 粒 [住化武田]	TH-547(新規) : 0.7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	○ 一発処理で +5～ノビエ 2.5 L, ホタルイ 2 L [効果の安定性について]
34	YH-650 フロアブル [八洲]	ビ・ラクロニル : 3.6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	□ 体系処理で移植前後に使用する剤として 移植前～ノビエ 1.5 L [ノビエ, 広葉の残効期間について]
35	YH-650-1kg 粒 [八洲]	ビ・ラクロニル : 1.8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	□ 体系処理で移植前後に使用する剤として 移植前～ノビエ 1.5 L [ノビエ, 広葉の残効期間について]
36	SB-563①-1kg 粒 [SDS]	カフェストール : 3 ダ・イロン : 6 ベンスルフロメチル : 0.75 ベンゾ・ヒシクロン : 2	☐	☐						□ (北海道・東北) 一発処理で +3～ノビエ 2.5 L, ホタルイ 2 L [2.5 L ノビエに対する効果の確認]
37	SB-563①-1kg 粒 [SDS]	カフェストール : 3 ダ・イロン : 6 ベンスルフロメチル : 0.51 ベンゾ・ヒシクロン : 2			☐	☐	☐	☐	☐	□ (北陸以南) 一発処理で +3～ノビエ 2.5 L, ホタルイ 2 L [2.5 L ノビエに対する効果の確認]
38	SYJ-150 フロアブル [シンジ・エンタ]	ビ・リフタリト : 2.9 ブ・レチクロール : 11.5 ベンスルフロメチル : 1.4	☐	☐						○ (北海道・東北) 一発処理で +5～ノビエ 3 L, ホタルイ 2 L □ (北陸以南) 一発処理で +5～ノビエ 2.5 L, ホタルイ 2 L [生育の進んだホタルイ, ミズガヤツリ への効果の確認]

第3表 平成15年度 水稻関係除草剤適-2試験成績判定結果一覧

区 分	実・継		継	
A-1 一発処理	AC-014C① シャンボ,	AC-014R シャンボ,	BAG-032 シャンボ,	BCH-031-1kg 粒,
	AGH-925-1kg 粒,	AVH-002-1kg 粒,	BCH-032-1kg 粒,	BCH-033-1kg 粒,
	BAG-021 シャンボ,	HOK-221 シャンボ,	BCH-034-1kg 粒,	BCH-035-1kg 粒,
	HOK-222 フロアフル,	HOK-223 フロアフル,	DKH-311-1kg 粒,	HOK-0301-1kg 粒,
	HOK-991 シャンボ,	HSW-001 フロアフル,	HOK-201D フロアフル,	HOK-201DS フロアフル,
	KUH-003D シャンボ,	KUH-003D-0.25kg 粒,	HOK-222-1kg 粒,	HOK-223-1kg 粒,
	KUH-003K シャンボ,	KUH-003K-0.25kg 粒,	HOK-225-1kg 粒,	KPP-444-1kg 粒,
	KUH-004D-1kg 粒,	KUH-011D-1kg 粒,	KPP-444①-1kg 粒,	KUH-023D シャンボ,
	KUH-011K-1kg 粒,	KUH-013D シャンボ,	KUH-023K シャンボ,	KUH-032-0.25kg 粒,
	KUH-013D-0.25kg 粒,	KUH-013D-1kg 粒,	NC-606-1kg 粒,	NH-301-1kg 粒,
	KUH-013K シャンボ,	KUH-013K-0.25kg 粒,	NH-302 フロアフル,	SB-563①-1kg 粒,
	KUH-013K-1kg 粒,	KUH-021-1kg 粒,	SB-563①-1kg 粒,	SW-031①-1kg 粒,
	KUH-023D フロアフル,	KUH-023D-0.25kg 粒,	SW-032 フロアフル,	SW-032① フロアフル,
	KUH-023K フロアフル,	KUH-023K-0.25kg 粒,	SYJ-150 フロアフル,	TH-122-1kg 粒,
	KUH-985 フロアフル,	KUH-985① フロアフル,	TH-421 シャンボ,	TH-547-1kg 粒
	Mon-923-1kg 粒,	Mon-923①-1kg 粒,		
	MY-100D フロアフル,	MY-100D-1kg 粒,		
	MY-100DC-1kg 粒,	MY-100DC① シャンボ,		
	MY-100DC① シャンボ,	MY-100DC①-1kg 粒,		
	MY-100MS シャンボ,	MY-100MS フロアフル,		
	MY-100NC シャンボ,	MY-100NC 顆粒水和,		
	MY-100NC-1kg 粒,	MY-100NDC-1kg 粒,		
	MY-100TSC フロアフル,	NBA-071-1kg 粒,		
	NBA-071DEH-1kg 粒,	NBA-073-1kg 粒,		
	NBA-074-1kg 粒,	NBA-076b-1kg 粒,		
	NBA-093(改) シャンボ,	NBA-096b フロアフル,		
	NBA-101 シャンボ,	NBA-101SB シャンボ,		
	NBA-131a-1kg 粒,	NBA-131b-1kg 粒,		
	NBA-141a-1kg 粒,	NBA-141b-1kg 粒,		
	NBA-142-1kg 粒,	NBA-941S-1kg 粒,		
	NC-339-1kg 粒,	NC-385 顆粒水和,		
	NC-385SB 顆粒水和,	NC-385SB-1kg 粒,		
	NC-390 フロアフル,	NC-391① シャンボ,		
	NC-397-1kg 粒,	NC-604 フロアフル,		
	NCH-903DEH シャンボ,	NH-003-1kg 粒,		
	NH-101 シャンボ,	NH-102 フロアフル,		
	NH-104-1kg 粒,	NH-803 フロアフル,		
	NH-806 シャンボ,	NOJ-101-1kg 粒,		
	NOJ-103-1kg 粒,	NOJ-104-1kg 粒,		
	ONC-381 シャンボ,	PSS①D-1kg 粒,		
	SB-526 フロアフル,	SB-526-1kg 粒,		
	SB-533P5(改) シャンボ,	SB-554 シャンボ,		
	SB-554 フロアフル,	SB-556 フロアフル,		
	SB-559①-1kg 粒,	SB-559①-1kg 粒,		
	SL-954 シャンボ,	SW-002① フロアフル,		
	SW-005 フロアフル,	SW-005① フロアフル,		
	SW-012①-1kg 粒,	SW-012①-1kg 粒,		

区 分	実・継		継	
A-1 一発処理 つづき	SW-023㊦-1kg 粒, SW-024㊦ シャンボ, SW-952㊦ シャンボ, SYJ-108 シャンボ, TH-001㊦ フロアブル, TH-913NCS フロアブル, YH-641-1kg 粒, YH-652-1kg 粒,	SW-023㊦-1kg 粒, SW-024㊦ シャンボ, SW-991-1kg 粒, TH-001 フロアブル, TH-001-1kg 粒, YH-546 フロアブル, YH-652 フロアブル, YH-655-1kg 粒		
A-2 体系(初期)	AVH-006 フロアブル, CG-113(改) シャンボ, KH-183㊦-1kg 粒, KPP-2008-1kg 粒, MAT-159 シャンボ, RYH-118-1kg 粒, YH-562 フロアブル, ブタクロール シャンボ,	CG-113 EW, HSW-012 フロアブル, KPP-2008 乳(EW), KPP-2011 フロアブル, MY-100MS フロアブル(少量), SB-528㊦ フロアブル, YH-651 フロアブル, ブタクロール-1kg 粒	G-315B 乳, SB-566 フロアブル, YH-650 フロアブル,	HSW-012 フロアブル(少量), SB-566-1kg 粒, YH-650-1kg 粒
A-3 体系(中後期)	DASH-001 SC, KUH-011K-1kg 粒, MCP・BAS(Na) 粒, MY-100DC㊦-1kg 粒, NC-329-1kg 粒, SB-551-1kg 粒, YH-591-1kg 粒, モリネートSM シャンボ	KUH-011D-1kg 粒, KUH-983-1kg 粒, MK-243SM シャンボ, NBA-071-1kg 粒, NH-806 シャンボ, TH-001 フロアブル, YH-653-1kg 粒,	DBH-1291 乳	
A-4 イボクサ	KUH-911 液, NH-104-1kg 粒,	NH-102 フロアブル, SB-533 フロアブル	NH-003-1kg 粒, SB-556 フロアブル,	SB-533P5(改) シャンボ, SW-991-1kg 粒
A-4 エゾノサヤヌカグサ	AVH-002-1kg 粒, NH-003-1kg 粒,	NBA-131a-1kg 粒, SL-954 シャンボ		
A-4 オモダカ	AC-014A-1kg 粒, KUH-003K-0.25kg 粒, KUH-004K-1kg 粒, MY-100DC㊦ フロアブル, NH-003-1kg 粒, SW-002㊦ フロアブル,	KUH-003D-0.25kg 粒, KUH-004D-1kg 粒, MY-100DC-1kg 粒, MY-100DC㊦-1kg 粒, NOJ-101-1kg 粒, TH-001 フロアブル	KUH-003D シャンボ, KUH-013D-0.25kg 粒, KUH-013K-0.25kg 粒, Mon-923-1kg 粒, MY-100NC 顆粒水和, NBA-131b-1kg 粒, NC-385SB 顆粒水和, NH-101 シャンボ, NH-104-1kg 粒, NOJ-104-1kg 粒,	KUH-013D-0.25kg 粒, MK-243D-1kg 粒, Mon-923㊦-1kg 粒, NBA-131a-1kg 粒, NC-385SB 顆粒水和, NH-102 フロアブル, NOJ-103-1kg 粒, YH-641-1kg 粒
A-4 クサネム	KUH-911 液			
A-4 クログワイ	AC-014A-1kg 粒, KUH-003D-0.25kg 粒, KUH-004D-1kg 粒, KUH-958 フロアブル, MAT-159 シャンボ, MY-100DC-1kg 粒, MY-100DC㊦-1kg 粒, NOJ-101-1kg 粒, YH-651 フロアブル,	AVH-002-1kg 粒, KUH-003K-0.25kg 粒, KUH-004K-1kg 粒, KUH-985㊦ フロアブル, MY-100DC フロアブル, MY-100DC㊦ フロアブル, NH-003-1kg 粒, SW-002㊦ フロアブル, YH-652 フロアブル	FSS-115 粒, KUH-003D シャンボ, KUH-013K-0.25kg 粒, Mon-923-1kg 粒, MY-100NC-1kg 粒, NBA-071-1kg 粒, NBA-131b-1kg 粒, NH-101 シャンボ, NH-104-1kg 粒, NOJ-104-1kg 粒, TH-001㊦ フロアブル,	KPP-2008 乳(EW), KUH-013D-0.25kg 粒, MK-243D-1kg 粒, Mon-923㊦-1kg 粒, MY-100NDC-1kg 粒, NBA-131a-1kg 粒, NC-390 フロアブル, NH-102 フロアブル, NOJ-103-1kg 粒, TH-001 フロアブル, YH-641-1kg 粒
A-4 コウキヤガラ	SL-954 シャンボ		TH-001 フロアブル	

区 分	実・継	継
A-4 シズイ	<u>KUH-003K-0.25kg 粒</u> , <u>KUH-004K-1kg 粒</u> , <u>KUH-013K-0.25kg 粒</u> , <u>Mon-923-1kg 粒</u> , <u>NH-003-1kg 粒</u> , <u>NH-803 フロアフル</u> , <u>NOJ-101-1kg 粒</u> , <u>SB-533 フロアフル</u> , <u>SB-554 シャンボ</u> , <u>SL-954 シャンボ</u> , <u>TH-001 フロアフル</u>	MCP・BAS(Na) 粒, NOJ-103-1kg 粒
A-4 ミズアオイ	<u>AGH-975 フロアフル</u> , <u>HSW-012 フロアフル</u> , <u>KUH-003K-0.25kg 粒</u> , <u>KUH-013K-0.25kg 粒</u> , <u>Mon-923-1kg 粒</u> , <u>SB-533P5(改) シャンボ</u> , <u>TH-001 フロアフル</u> , <u>YH-591-1kg 粒</u>	AVH-002-1kg 粒, CG-113(改) シャンボ, NBA-131a-1kg 粒, NC-397-1kg 粒, SL-954 シャンボ, TH-547-1kg 粒, YH-546 フロアフル, YH-641-1kg 粒, YH-650-1kg 粒, YH-652 フロアフル
A-4 SU-Rコナギ	<u>AVH-002-1kg 粒</u> , <u>NBA-131b-1kg 粒</u> , <u>SB-554 フロアフル</u> , <u>SL-954 シャンボ</u> , <u>YH-546 フロアフル</u>	AC-014A-1kg 粒, Mon-923①-1kg 粒, NBA-141b-1kg 粒, NH-102 フロアフル, NH-104-1kg 粒, TH-547-1kg 粒, YH-641-1kg 粒, YH-650-1kg 粒
A-4 SU-Rホタルイ	<u>AGH-975 フロアフル</u> , <u>AVH-002-1kg 粒</u> , <u>CG-113(改) シャンボ</u> , <u>HSW-012 フロアフル</u> , <u>Mon-923-1kg 粒</u> , <u>MY-100DC① フロアフル</u> , <u>MY-100MS フロアフル</u> , <u>NBA-131a-1kg 粒</u> , <u>SB-533 フロアフル</u> , <u>SB-554 フロアフル</u> , <u>SB-556 フロアフル</u> , <u>SL-954 シャンボ</u> , <u>SW-002① フロアフル</u> , <u>TH-001 フロアフル</u> , <u>YH-652 フロアフル</u>	DKH-311-1kg 粒, MY-100NC 顆粒水和, NBA-131b-1kg 粒, NBA-141a-1kg 粒, NBA-141b-1kg 粒, NH-102 フロアフル, NH-104-1kg 粒, SW-002 フロアフル, SW-024② シャンボ, SW-024① シャンボ, TH-547-1kg 粒
B 直播栽培	AGH-925-1kg 粒, B-3015 乳, B-3015P 乳, B-3015P 粒, KUH-972D フロアフル, KUH-985 フロアフル, KUH-985① フロアフル, NBA-941-1kg 粒, <u>NBA-941S-1kg 粒</u> , NBA-942b-1kg 粒, <u>PSS①D-1kg 粒</u> , SW-002 フロアフル, <u>SW-002① フロアフル</u> , SW-973-1kg 粒, <u>TH-913NCS フロアフル</u> , YF-65① 液, <u>ブタクロール 乳</u>	KUH-011D-1kg 粒, KUH-011K-1kg 粒, KUH-013D-0.25kg 粒, KUH-013K-0.25kg 粒, KUH-962-1kg 粒, KUH-983-1kg 粒, MY-100DC① フロアフル, MY-100TSC フロアフル, NBA-071-1kg 粒, NC-331 水和剤, NC-385SB 顆粒水和, NH-102 フロアフル, SB-556 フロアフル, SW-991-1kg 粒
C 畦畔	<u>2,4-PA 液</u>	AH-01 液剤
E 休耕田	<u>NH-007 フロアフル</u>	
F 生物除草剤	MTB-951	
その他	<u>DEH-112 乳(EW)</u>	

注): 1) 本年度新規に使用基準を作成されたものは、薬剤名にアンダーラインを記した。

2) 本年度は「実」、「継?」及び「中止」と判定された薬剤はなかった。

※ 薬剤名はアルファベット順に記載した。

平成15年度 水稻作関係除草剤使用基準一覧表

A 移植栽培

A-1 一発処理

A-1

AC-014C① シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤 土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2	○	○始	○始		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2L	50g×10 ³ /10a	●	○
東北	○2	○	○始	○始	○始	○始			○発生 期					○	○
北陸	○2	○	○始		○始	○始			○発生 期					○	○
関東・東海	○2	○	○始		○始	○始			○発生 期	●前				○	○
近・中・四	○2	○	○2		○2	○始			○発生 期	○前				○	○
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○前				○	○
減水深：2cm/日以下 使用上の注意： 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。															

A-1

AC-014R シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤 土	壤土 ～ 埴土	
北海道	○2	○	○2	○始		○2		○前※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2L	20g×10 ³ /10a	○	○	
東北	○2	○	○2		○2	○始	○前※	○前※	○発生 期		○前				○	○
北陸	○2	○	○2		○2	○始		○前※	○発生 期						○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○始	○前※	○前※	○発生 期		○前				○	○
近・中・四	○2	○	○2		○2	○2	○前※	○前※	○発生 期		○前				○	○
九州	○2	○	○2	○前	○2	○始	○前※	○前※	○発生 期		○前				○	○

※:オモダカ・クロクワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深：2cm/日以下

使用上の注意： 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
オモダカ・クロクワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

AGH-925-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤 土	壤土 ～ 埴土	
北海道	○3*	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ3L(※: 砂壤土は～2.5L)	1kg/10a	○	○	
東北	○3	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○	
北陸	○3	○	○2		○2	○2				○再生 前～始	○前			○	○	
関東・東海	○3*	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ3L(※: 砂壤土は～2.5L)			○	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
九州	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
減水深：2cm/日以下 使用上の注意： 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。																

A-1

AVH-002-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヒ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 填土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始		○前※	○発生 期	○再生 前～始	○前	エゾ'ノサヤズカ' サ:2L	+3～ノビエ1.5L	1kg/10a	●	○
東北	○1.5	○	○始	○始	○始	○始	○前※	○前※	○発生 期	○再生 前～始	○前	SLI抵抗性ホタル イ:1L				○
北陸	○1.5	○	○始		○始	○始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	●始			○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性コナギ; 子葉期			●	○
近・中・四																
九州																

※:オモダカ・クロクワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: オモダカ・クロクワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

BAG-021 'ジャンボ'

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヒ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 填土
北海道														25g×10コ /10a		
東北	●2	●	●始	●始	●始	●始			●発生 期		●前		+1～ノビエ2L			●
北陸	●2	●	●始		●始	●始			●発生 期							●
関東・東海	●2	●	●始		●2	●始					●前				●	●
近・中・四																
九州																

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

A-1 BAG-032 'ジャンボ' 「継」

A-1 BCH-031-1kg 粒 「継」

A-1 BCH-032-1kg 粒 「継」

A-1 BCH-033-1kg 粒 「継」

A-1 BCH-034-1kg 粒 「継」

A-1 BCH-035-1kg 粒 「継」

A-1 DKH-311-1kg 粒 「継」

A-1 HOK-0301-1kg 粒 「継」

A-1 HOK-201D フロアブル 「継」

A-1 HOK-201DS フロアブル 「継」

A-1
HOK-991 シャンボ

ROR-997 シンボル												処理時期	使用量	砂 壤 土	壤土 ～ 埴土	
地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離					
北海道	○1.5	○	○始	○始								+3～ノビエ1.5L	50g×10 ³ /10a		○	
東北	○1.5	○	○始	○始	○始										○	
北陸	○1.5	○	○始		○始										○	
関東・東海	○1.5	○	○始		○前	○始									○	○
近・中・四	○1.5	○	○始		○始	○始									○	○
九州	○1.5	○	○始		○始	○始									○	○
減水深: 2cm/日以下																
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。																
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。																
5cm程度の水深で散布する。																
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。																

A-1
HSW-001 フロアブル

ISW-001/レノフル																		
地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量	砂 壤 土	壤土 ～ 埴土		
北海道	○2.5	○	○2	○始		○2			○発生 期		○前	エゾ'ノサヤスダグサ:2L ミズ'アオイ:1L	+0～ノビエ2.5L	500ml/10a	○	○		
東北																	○	
北陸																	○	
関東・東海																	○	
近・中・四																	○	
九州																○		
田植同時散布可能 水口処理可能																		
減水深: 2cm/日以下																		
使用上の注意:																		

A-1 KPP-444-1kg 粒 「雑」

A-1 KPP-444①-1kg 粒 「雑」

A-1
KUH-003D シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤 土	壤土 ～ 埴土	
北海道												+3～ノビエ2.5L	25g×10 ³ /10a			
東北																
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2				○再生 前～始					○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始					○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
九州	○2.5	○	○2	○前	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。																

A-1

KUH-003D-0.25kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													250g/10a		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※		○発生 期	○再生 前～始		+1～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始	○発生 期	○再生 前～始	○前	+1～ノビエ2.5L (砂壤土は+5～)		○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+1～ノビエ2.5L		○	○
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 湛水周縁部散布可能 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。 湛水周縁部散布では藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足を生じることがある。 オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。															

A-1

KUH-003K シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○始		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L	25g×10 ³ /10a	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。															

A-1

KUH-003K-0.25kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○始		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L	250g/10a	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○2	●前※	●前※	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ・草丈3cm		○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 湛水周縁部散布可能 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 湛水周縁部散布では藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足を生じることがある。 オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。															

A-1

KUH-004D-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズ'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 〜 壤土
北海道													1kg/10a		
東北															
北陸	○3	○	○2		○2	○2	●始※			○再生 前〜始		±0〜ノビエ3L		○	○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前〜始	○前	+5〜ノビエ3L		○	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2	●始※	●始	○発生 期	○再生 前〜始	○前			○	○
九州	○3	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前〜始	○前			○	○

※:オモダカ・クロクワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クロクワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

KUH-011D-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズ'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 〜 壤土
北海道													1kg/10a		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			●発生 期	○再生 前〜始	●前	±0〜ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前〜始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前〜始	○前			●	○
九州	○2.5	○	○2	○前	○2	○2			○発生 期	○再生 前〜始	○前			○	○

田植同時散布可能(北陸、関東・東海、近畿・中国・四国、九州)
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

KUH-011K-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズ'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 〜 壤土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前〜始	○前	±0〜ノビエ2.5L	1kg/10a	●	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○2			○発生 期	○再生 前〜始	○前			○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

田植同時散布可能(北海道、東北)
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意:

A-1

KUH-013D ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズ'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 〜 壤土
北海道													25g×10 ³ /10a		
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前〜始		+3〜ノビエ2.5L		●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前〜始				●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2				●再生 前〜始	●前				●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前〜始	●前			●	●

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。

A-1

KUH-013D-0.25kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													250g/10a		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

湛水周縁部散布可能(北陸, 関東・東海, 近畿・中国・四国, 九州)
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 湛水周縁部散布では藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと, 部分的な薬害や効果不足を生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

KUH-013D-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg/10a		
東北															
北陸	●3	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+3～ノビエ3L			●
関東・東海	●3	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
近・中・四	●3	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
九州	●3	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

KUH-013K シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●始		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+3～ノビエ2.5L	25g×10a /10a	●	●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと, 部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

A-1

KUH-013K-0.25kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○始		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L	250g/10a	●	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

湛水周縁部散布可能
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 湛水周縁部散布では藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと, 部分的な薬害や効果不足を生じることがある。
 シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

KUH-013K-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量	砂 壤 土	壤土 ～ 壤土
北海道	●3	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前		+3～ノビエ3L	1kg/10a		●
東北	●3	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前					●
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

A-1

KUH-021-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量	砂 壤 土	壤土 ～ 壤土
北海道	●3	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前		+3～ノビエ3L	1kg/10a		●
東北	●3	●	●3		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前					●
北陸	●3	●	●3		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始						●
関東・東海	●3	●	●3		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始						●
近・中・四	●3	●	●3		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前					●
九州	●3	●	●3		●3	●3			●発生 期	●再生 前～始						●

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1 KUH-023D シャンボ 「継」

A-1

KUH-023D フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量	砂 壤 土	壤土 ～ 壤土
北海道														500ml/10a		
東北																
北陸	●2.5	●	●2		●始	●2			●発生 期	●再生 前～始			+3～ノビエ2.5L			●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始						●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前					●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●	●

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

KUH-023D-0.25kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													250g/10a		
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始		+3～ノビエ2.5L			●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●

湛水周縁部散布可能

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 湛水周縁部散布では藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足を生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果がある。

A-1 KUH-023K シャンボ 「継」

A-1

KUH-023K フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+5～ノビエ2.5L	500ml/10a		●
東北	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-1

KUH-023K-0.25kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+5～ノビエ2.5L	250g/10a		●
東北	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

湛水周縁部散布可能

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 湛水周縁部散布では藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足を生じることがある。

A-1 KUH-032-0.25kg 粒 「継」

A-1

KUH-985 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダ'カ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤 土	壤土 ～ 壤土
北海道	○3	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ3L	500ml/10a	○	○
東北	○3	○	○2	●前	○2	○2	○前※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ3L		○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

※:オモダカ・クロクワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
田植同時散布可能(東北)
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: オモダカ・クロクワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

KUH-985①フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダ'カ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤 土	壤土 ～ 壤土
北海道													500ml/10a		
東北															
北陸	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	●前	+0～ノビエ3L		○	○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○3	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

※:オモダカ・クロクワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
田植同時散布可能(北陸、関東・東海、近畿・中国・四国、九州)
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クロクワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

Mon-923-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダ'カ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤 土	壤土 ～ 壤土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ1.5L	1kg/10a	●	○
東北	○1.5	○	○始	○始	○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前				○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

Mon-923①-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダ'カ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤 土	壤土 ～ 壤土
北海道													1kg/10a		
東北															
北陸	○1.5	○	○始		○始	○始			●発生 期	●再生 前～始	○前	+0～ノビエ1.5L			○
関東・東海(善)	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
近・中・四(善)	○1.5	○	○始		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前				○
九州	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前				○

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1
MY-100D フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツツ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													500ml/10a		
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L			○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:															

A-1
MY-100D-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツツ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg/10a		
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L			○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:															

A-1
MY-100DC-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツツ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○始		○2		●前	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)	1kg/10a	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○2	●前※	●前※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。															

A-1
MY-100DC⑩ ジェンボ'

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツツ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2	○	○始	○始		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2L	50g×10 ² /10a	○	○
東北	○2	○	○2	○始	○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。															

A-1

MY-100DC① シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壌土	壤土 ～ 壤土	
北海道												+3～ノビエ2L	50g×10 ³ /10a			
東北																
北陸	○2	○	○2		○2	○始									●	○
関東・東海	○2	○	○2		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
近・中・四	○2	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前					○
九州	○2	○	○2		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始		+3～ノビエ2L (早 期は+5～)		○	○	
減水深：2cm/日以下																
使用上の注意： 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。																

A-1

MY-100DC①-1kg 粒

WT-100DCU-1kg 板																
地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壌土	壤土 ～ 壤土	
北海道												+0～ノビエ2.5L (砂壌土は+5～)	1kg/10a			
東北																
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2				○再生 前～始					○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始	○発生 期	○再生 前～始	○前			+0～ノビエ2.5L (砂壌土は+5～)	○	○
九州	○2.5	○	○2	○前	○2	○2	●始※	●始※	○再生 前～始	○再生 前～始	○前			+5～ノビエ2.5L	○	○
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。																
減水深: 2cm/日以下																
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。																
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。																
オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。																

A-1

MY-100MS シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始						+1～ノビエ1.5L	50g×10 ³ /10a	○	○
東北	○1.5	○	○始		○前	○始								○	○
北陸	○1.5	○	○始		○始	○始								○	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	○始								○	○
近・中・四	○1.5	○	○始		○始	○始								○	○
九州	○1.5	○	○始		○始	○始								○	○
減水深：2cm/日以下 使用上の注意： 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。															

A-1
MY-100MS フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダ'カ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壌 土	壤土 ～ 壤土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始						+0～ノビエ1.5L	500ml/10a	○	○
東北	○1.5	○	○始	○始	○始	○始								○	○
北陸	○1.5	○	○始		○始	○始								●	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	○始					SU抵抗性ホタル イLL			○	○
近・中・四	○1.5	○	○始		○始	○始								○	○
九州	○1.5	○	○始		○始	○始								○	○
田植同時散布可能(近畿・中国・四国、九州)															
減水深: 2cm/日以下															
使用上の注意: 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。															

A-1
MY-100NC シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダ'カ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壌 土	壤土 ～ 壤土
北海道	○2	○	○始	○始		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2L	30g×10 ³ /10a	○	○
東北	○2	○	○2	○始	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○2	○	○2		○始	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
減水深: 2cm/日以下															
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な葉害や効果不足が生じることがある。															

A-1
MY-100NC 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダ'カ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壌 土	壤土 ～ 壤土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	80g /10a(散布 液量 500ml/10a)	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L (砂壌土は+5～)		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L (砂壌土は+5～)		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		○	○
九州	○2.5	○	○2	○前	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
田植同時散布可能(北海道、東北)															
減水深: 2cm/日以下															
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。															

A-1
MY-100NC-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダ'カ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壌 土	壤土 ～ 壤土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L (砂壌土は+5～)	1kg/10a	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L (砂壌土は+5～)		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+1～ノビエ2.5L (砂壌土は+5～)		○	○
九州	○2.5	○	○2	○前	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		○	○
田植同時散布可能(関東・東海)															
減水深: 2cm/日以下															
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。															

A-1

MY-100NDC-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 壤土
北海道	○3	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ3L	1kg/10a	○	○
東北	○3	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○3	○	○2		○2	○2				○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガツリには効果が劣る。

A-1

MY-100TSC フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 壤土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	500ml/10a	○	○
東北	○2.5	○	○2	●前	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四 (普)	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●

田植同時散布可能(北海道・東北・北陸・関東・東海・近畿・中国・四国・九州)

水口処理可能(東北)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガツリには効果が劣る。

A-1

NBA-071-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 壤土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	エノノサヤヌカ'サ: 2L	1kg/10a	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L (砂壤土は+5～)		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		○	○

田植同時散布可能(東北・北陸・関東・東海)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガツリには効果が劣る。

A-1

NBA-071DEH-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 壤土
北海道	○3	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ3L	1kg/10a		○
東北	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
北陸	○3	○	○2		○2	○2									○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始					○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○
九州	○3	○	○2	○始	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガツリには効果が劣る。

A-1

NBA-073-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤 土	壤 土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	1kg/10a		○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L (砂壤土は+5～)		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L (砂壤土は+5～)		○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		○	○
田植同時散布可能(東北、北陸、関東・東海、近畿・中国・四国)															
減水深: 2cm/日以下															
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。															

A-1

NBA-074-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤 土	壤 土
北海道	○2	○	○始			○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2L	1kg/10a		○
東北	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○2	○	○2		○始	○始								○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
近・中・四	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
田植同時散布可能(東北、北陸～近畿・中国・四国、九州)															
減水深: 2cm/日以下															
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。															

A-1

NBA-076b-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤 土	壤 土
北海道													1kg/10a		
東北															
北陸	○2	○	○2		○2	○2				○再生 前～始		+0～ノビエ2L		○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2	○	○2		○2	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
田植同時散布可能 ※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。															
減水深: 2cm/日以下															
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。 オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。															

A-1

NBA-093(改) ジャンボ'

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○始		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	40g×100 /10a	●	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			●発生 期	○再生 前～始	●前			●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	●前			●	○
近・中・四 (幹)	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	●前			●	○
九州 (幹)	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

A-1

NBA-096b プロアール

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													500ml/10a		
東北															
北陸	○2	○	○2		○始	○始				○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2L		○	○
関東・東海	○2	○	○始		○2	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

水口処理可能(北陸) 田植同時散布可能(北陸、関東・東海～九州)
 ※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

NBA-101 ジャンボ'

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2	○	○2	○前		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2L	40g×100 /10a	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2				○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

A-1
NBA-101SB シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+1～ノビエ2.5L	30g×10コ /10a		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始					●
関東・東海	●2	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+1～ノビエ2L			●
近・中・四															
九州															
減水深：2cm/日以下 使用上の注意： 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。															

A-1
NBA-131a-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2	○	○2	○始		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2L	1kg/10a	●	○
東北	○2	○	○2		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															
田植同時散布可能(北海道, 東北) 減水深：2cm/日以下 使用上の注意：															

A-1
NBA-131b-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg/10a		
東北															
北陸	○2	○	○2		○2	○始				○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2L		●	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
近・中・四	○2	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2	○	○2	○前	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
田植同時散布可能(北陸, 関東・東海, 近畿・中国・四国, 九州) 減水深：2cm/日以下 使用上の注意： 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。															

A-1
NBA-141a-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+3～ノビエ2.5L	1kg/10a		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+0～ノビエ2.5L			●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															
減水深：2cm/日以下 使用上の注意：															

A-1

NBA-141b-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土 ～ 壤土
北海道													1kg/10a	
東北														
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始		+0～ノビエ2.5L		●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始		+3～ノビエ2.5L		●
近・中・四 (管)	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始				●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガツリには効果が劣る。

A-1

NBA-142-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土 ～ 壤土
北海道													1kg/10a	
東北	●2	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+0～ノビエ2L		●
北陸	●2	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始				●
関東・東海	●2	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始				●
近・中・四 (管)	●2	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始				●
九州	●2	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+0～ノビエ2L (ただし早期は+1～)		●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガツリには効果が劣る。

A-1

NBA-941S-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土 ～ 壤土
北海道	○3	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ3L	1kg/10a	○
東北	○3	○	○2	○始	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○
北陸	●3	●	●2		●2	●2								●
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○
近・中・四	●3	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始				●
九州	●3	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガツリには効果が劣る。

A-1

NC-339-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土 ～ 壤土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		○前※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	1kg/10a	○
東北	○2.5	○	○2		○2	○2	○前※	○前※	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズ'イ:発生始～ 3cm		○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2		○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○

※: オモダカ・クロクワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガツリには効果が劣る。

オモダカ・クロクワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

NC-385 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 塩土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	60g /10a(散布 液量250～ 500ml/10a)	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壤土は+5～、水口 処理は+5～)		○	○
北陸	○2.5	○	○2	○始	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壤土は+5～、水口 処理は+5～)		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

顆粒のまま水口処理が可能(東北～近畿・中国・四国)
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-385SB 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 塩土
北海道	○2.5	○	○2	○始		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	80g/10a(散布 液量500ml/10a)	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			●発生 期	○再生 前～始				●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○
九州 (普)	●2	●	●2		●2	●2			●発生 期	○再生 前～始	●前	+0～ノビエ2L		●	●

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-385SB-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 塩土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+5～ノビエ2.5L	1kg/10a		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+0～ノビエ2.5L			●
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期			+5～ノビエ2.5L			●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四 (普)	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-390 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 塩土
北海道	○3	○	○2			○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ3L	500ml/10a	○	○
東北	○3	○	○2	○始	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ発生始～ 3cm		○	○
北陸	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

水口処理可能(東北、関東・東海～近畿・中国・四国)
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

NC-391① ジェンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2	○	○始	○始		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2L	30g×10a /10a	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			●発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○*	○

*：早期は砂壤土を除く(九州)

減水深：2cm/日以下

使用上の注意： 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

A-1

NC-397-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ1.5L	1kg/10a		○
東北	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前				○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深：2cm/日以下

使用上の注意：

A-1

NC-604 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+5～ノビエ2.5L	500ml/10a		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期						●
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深：2cm/日以下

使用上の注意：

A-1 NC-606-1kg 粒 「縦」

A-1
NCH-903DEH シ'ヤン'ボ'

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量	砂 壌 土	壤 土
北海道	○2	○	○始	○始		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前		+5～ノビエ2L	40g×10 ³ /10a		○
東北	○3	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前		+5～ノビエ3L			○
北陸	○3	○	○2		○2	○2				○再生 前～始						○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前					○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前					○
九州	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

A-1
NH-003-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量	砂 壌 土	壤 土
北海道	○2.5	○	○2	○始		○2		●前	○発生 期	○再生 前～始	○前	ミス'カヤ:1L エゾ'ノヤヌカ'サ:2L	+5～ノビエ2.5L	1kg/10a	○	○
東北	○2.5	○	○2		○2	○始	●前※	●前※	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズ'イ:草丈3cm			○	○
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

※:オモダカ・クロク'ワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: オモダカ・クロク'ワイ・シズ'イ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1
NH-101 シ'ヤン'ボ'

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量	砂 壌 土	壤 土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前		+5～ノビエ2.5L	50g×10 ³ /10a	●	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				●	○
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

A-1
NH-102 フロア'ル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量	砂 壌 土	壤 土
北海道														500ml/10a		
東北																
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			●発生 期	○再生 前～始	●前		+5～ノビエ2.5L		●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	イ'ズ'サ:再生始			●	○
近・中・四 (普)	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意:

A-1
NH-104-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg/10a		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			●発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ2.5L		●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	休クサ:再生始		●	○
近・中・四 (管)	○2.5	○	○2		○2	○2				○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

A-1 NH-301-1kg 粒 「継」

A-1 NH-302 フロアブル 「継」

A-1
NH-803 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		○前	○発生 期	○再生 前～始	○前	エゾノササユギ:2L ミスアオイ:1L	+0～ノビエ2.5L	500ml/10a	○ ○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○前※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	クサネム:発生始 シズイ草:3cm	+5～ノビエ2.5L		○ ○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

水口処理可能(東北)
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1
NH-806 ジェンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													50g×10 ³ /10a		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2				○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		○ ○	
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2		○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	休クサ:再生始		○ ○	
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○ ○	
九州	○2.5*	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L(*: 早期は～ノビエ2L)		○ ○	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

NOJ-101-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○3	○	○2	○2		○2		●前	○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ3L	1kg/10a	○	○
東北	○3	○	○2	○2	○2	○2	●前※	●前※	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズメ草丈3cm		○	○
北陸	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2	●前※	●前※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2	●前※		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

※:オモダカ・クロクワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クロクワイ・シズメ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

NOJ-103-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○3	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ3L	1kg/10a	○	○
東北	○3	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意:

A-1

NOJ-104-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg/10a		
東北															
北陸	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ3L		○	○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○3	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

ONC-381 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2	○	○2	○始		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2L	30g×10 ^コ /10a	○	○
東北	○2	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	タウコギ:子葉期			○	○
北陸	○2	○	○2		○始	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		○	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

A-1

PSS①D-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 堆土
北海道													1kg/10a		
東北	○2	○	○2	○始	○始	○始			○発生 期		○前	+0～ノビエ2L		○	○
北陸	○2	○	○2		○始	○始			●発生 期		○前			○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期		○前			○	○
近・中・四	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期		○前			○	○

田植同時散布可能(東北, 北陸, 関東・東海)
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 浅植え、植付け精度不良で根が露出すると被害を生じることがある。

A-1

SB-526 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 堆土
北海道	●2	●	●始	●2					●発生 期			+3～ノビエ2L	500ml/10a		●
東北	●2	●	●2	●始	●2				●発生 期						●
北陸	●2	●	●2		●始				●発生 期						●
関東・東海	●2	●	●2		●始				●発生 期						●
近・中・四 (普)	●2	●	●2		●始				●発生 期					●	●
九州	●2	●	●2		●始				●発生 期						●

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

SB-526-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 堆土
北海道	●2	●	●2	●2					●発生 期			+3～ノビエ2L	1kg/10a		●
東北	●2	●	●2	●始	●2				●発生 期						●
北陸	●2	●	●2		●始				●発生 期						●
関東・東海	●2	●	●2		●始				●発生 期						●
近・中・四	●2	●	●2		●2				●発生 期						●
九州	●2	●	●2		●始				●発生 期					●	●

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

SB-533P5(改) シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 堆土
北海道	○1.5	○	○始	○始					○発生 期		ミズアオイ1L	+1～ノビエ1.5L	50g×5コ /10a	●	○
東北	○1.5	○	○始		○始				○発生 期			+0～ノビエ1.5L		●	○
北陸	○1.5	○	○始		○始				○発生 期					●	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始									○	○
近・中・四	○1.5	○	○始		○始									●	○
九州 (普)	○1.5	○	○始		○始				○発生 期			+1～ノビエ1.5L		●	○

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。

A-1

SB-554 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1.5	○	○始	○始					○発生 期				+0～ノビエ1.5L	50g×10コ /10a	●	○
東北	○1.5	○	○始		○始		○前※		○発生 期		シズイ草丈3cm				●	○
北陸	○1.5	○	○始		○始				○発生 期						●	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始		○前※		○発生 期						●	○
近・中・四	○1.5	○	○始		○前	○前			○発生 期				+0～ノビエ1.5L		○	○
九州	○1.5	○	○始	○前	○前	○前			○発生 期				+0～ノビエ1.5L		○	○

※:クロクワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
 クロクワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

SB-554 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●1.5	●	●始	●始					●発生 期		SU抵抗性ホタル イ:1.5L		+0～ノビエ1.5L	500ml/10a		●
東北	●1.5	●	●始		●始				●発生 期							●
北陸	●1.5	●	●始		●始											●
関東・東海	●1.5	●	●始		●始				●発生 期		SU抵抗性コナ イ:1L					●
近・中・四 (替)	○1.5	○	○始		○始	○前							+0～ノビエ1.5L		●	○
九州	○1.5	○	○始	○前	○始	●前			○発生 期				+0～ノビエ1.5L		●	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

SB-556 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期		エゾノサヤスカサ:2L ミスアオイ:1L		+0～ノビエ2.5L	500ml/10a	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期		シズイ発生始～ 3cm				○	○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生 期						○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2					SU抵抗性ホタル イ:2L				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期						○	○
九州	○2.5	○	○2	○前	○2	○2			○発生 期						○	○

水口処理可能(北海道～北陸, 九州)
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

SB-559⑩-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヒ	ネタリイ	ヘラオモ タ'カ	ミス'ガ'ヤ ツリ	クリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量	砂 壤 土	壤土 ～ 植土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前		+5～ノビエ2.5L	1kg/10a		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前					●
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

A-1

SB-559⑩-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヒ	ネタリイ	ヘラオモ タ'カ	ミス'ガ'ヤ ツリ	クリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量	砂 壤 土	壤土 ～ 植土
北海道														1kg/10a		
東北																
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始			+3～ノビエ2.5L			●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始						●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始						●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始						●

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1 SB-563⑩-1kg 粒 「縫」

A-1 SB-563⑩-1kg 粒 「縫」

A-1

SL-954 シ'ヤンボ'

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヒ	ネタリイ	ヘラオモ タ'カ	ミス'ガ'ヤ ツリ	クリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量	砂 壤 土	壤土 ～ 植土
北海道	○2	○	○2	○始		○2			○発生 期			エゾノササユリ2L, SU抵抗性3cm2L	+3～ノビエ2L	50g×10 ³ /10a	●	○
東北	○2	○	○2	○始	○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	シズ'イ、草丈3cm SU抵抗性3cm2L			●	○
北陸	○2	○	○2		○始	○始			●発生 期						●	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○始			○発生 期			SU抵抗性コキ'2L, SU抵抗性3cm2L			●	○
近・中・四 (善)	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期						○	○
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期		○前	コウキヤガラ:発生始			○	○

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。
コウキヤガラ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

SW-002①フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													500ml/10a		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●前				+3～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海 (普)	○2.5	○	○2		○2	○2		○発生 前～始	○再生 前～始	○前	SU抵抗性モタル イ2L			●	○
近・中・四 (普)	○2.5	○	○2		○2	○2		○発生 前～始	○再生 前～始	○前				●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2		○発生 前～始	○再生 前～始	○前				○	○

※:クロクワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
水口処理可能(北陸)
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クロクワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

SW-005 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+3～ノビエ2.5L	500ml/10a		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

A-1

SW-005⑤ フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													500ml/10a		
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2						+3～ノビエ2.5L			●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四 (普)	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

SW-012③-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○始		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L	1kg/10a	●	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前				○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

A-1
SW-012①-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg/10a		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			●発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L		●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	●再生 前～始	●前			●	○
近・中・四 (幹)	○2.5	○	○2		○2	○2			●発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。															

A-1
SW-023②-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+3～ノビエ2.5L	1kg/10a		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:															

A-1
SW-023③-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg/10a		
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+3～ノビエ2.5L		●	
関東・東海 (管)	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	
近・中・四 (管)	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。															

A-1
SW-024④'ジャンボ'

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+3～ノビエ2.5L	40g×10 ³ /10a		●
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。															

A-1

SW-024① シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													40g×10 ^コ /10a		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+3～ノビエ2.5L		●	○
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
近・中・四（普）	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
減水深：2cm/日以下															
使用上の注意： 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。															

A-1 SW-031①-1kg 粒 「継」

A-1 SW-032 フロアフル 「継」

A-1 SW-032① フロアフル 「継」

A-1

SW-952① シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													30g×10 ^コ /10a		
東北															
北陸	○2	○	○2	○2	○始	○2		○始※	○発生 期	○再生 前～始		+3～ノビエ2L		○	○
関東・東海	○2	○	○2		○始	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始				○	○
近・中・四	○2	○	○2		○2	○2	○始※	○前※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5*	○	○2		○2	○2	○始※	○前※	○発生 期	○再生 前～始	コウキヤガラ:発生始	+3～ノビエ2.5L(※ただし早期は出来ず)		○	○
※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。 オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。															

A-1

SW-991-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土	
北海道	○2.5	○	○2	○始		○2			○発生 期		○前	エゾノサヤヌカダサ:2L	1kg/10a	○	○	
東北	○2	○	○2	○始	○始	○始			○発生 期			+5～ノビエ2L			○	
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2					○前	+5～ノビエ2.5L			○	
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期		○前				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2									○	○
九州	○2.5	○	○2	○前	○2	○2			○発生 期						○	○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。																

A-1
SYJ-108 シェンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●3	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●始	+5～ノビエ3L	30g×10a /10a		●
東北	●3	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
北陸	●3	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
関東・東海 (昔)	●3	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四 (昔)	●3	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
九州 (昔)	●3	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

A-1 SYJ-150 フロアブル 「経」

A-1
TH-001 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		●前	○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	500ml/10a	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○2		●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2	○始	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 水口処理可能 (東北)
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1
TH-001① フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道												+3～ノビエ2L	500ml/10a		
東北															
北陸	●2	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
関東・東海	●2	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四	●2	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
九州	●2	●	●2		●始	●2			●発生 期	●再生 前～始				●	●

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

TH-001-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前		+5～ノビエ2.5L	1kg/10a		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前					●
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始						●
関東・東海																
近・中・四																
九州																

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-1 TH-122-1kg 粒 「継」

A-1 TH-421 シェンボ 「継」

A-1 TH-547-1kg 粒 「継」

A-1

TH-913NCS フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○3	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前		+5～ノビエ3L	500ml/10a	○	○
東北	○3	○	○2	○始	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
北陸	○3	○	○2		○2	○2				○再生 前～始					○	○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始					○	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
九州	○3	○	○2	○前	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始					○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

YH-546 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○始		○2							+3～ノビエ2.5L	500ml/10a		○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始							+3～ノビエ2.5L			○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始									●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○始					SU抵抗性コナ キ:2L		+3～ノビエ2.5L		○	○
近・中・四 (善)	○2.5	○	○2		○2	○始									●	○
九州	○2.5	○	○2	○前	○2										●	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

YH-641-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダ'カ	ミス'ガ ツツ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	1kg/10a	●	○
東北	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前				○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			●発生 期	○再生 前～始					○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
近・中・四（管）	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前				○
九州															

減水深：2cm/日以下
使用上の注意：

A-1

YH-652 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダ'カ	ミス'ガ ツツ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期		SU抵抗性ホタル イ:2L	+5～ノビエ2.5L	500ml/10a		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期		SU抵抗性ホタル イ:2L				●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2	●始※		●発生 期						●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2	●始※		●発生 期						●
近・中・四（管）	●2.5	●	●2		●2	●2	●前		●発生 期						●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●前					●

※：クロクワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深：2cm/日以下
使用上の注意： 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
クロクワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

YH-652-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダ'カ	ミス'ガ ツツ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg/10a		
東北	●2.5	●	●2	●始	●始	●始			●発生 期			+5～ノビエ2.5L			●
北陸															
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期			+5～ノビエ2.5L			●
近・中・四															
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期			+5～ノビエ2.5L		●	●

減水深：2cm/日以下
使用上の注意： 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

YH-655-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダ'カ	ミス'ガ ツツ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg/10a		
東北	●2	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+0～ノビエ2L			●
北陸	●2	●	●始		●始	●始									●
関東・東海	●2	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四（管）	●2	●	●2		●2	●始			●発生 期						●
九州	●2	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+1～ノビエ2L		●	●

減水深：2cm/日以下
使用上の注意： 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-2 体系処理(初期)

A-2

AVH-006 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツツ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤 土	壤 土 ～ 堆 土
北海道													500ml/10a		
東北	○1	○	○始								○前	植代後～4, +0～ +5(ノビエ1L)		●	○
北陸	●1	●	●始											●	●
関東・東海 (昔)	○1	○	○始								○前				○
近・中・四 (昔)	○1	○	○始								○前				○
九州 (昔)	○1	○	○始								●前			●	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 深水条件では薬害を生じることがある。

A-2

CG-113 EW

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツツ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤 土	壤 土 ～ 堆 土
北海道	○1	○	○始	○始								+0～+5(ノビエ1L)	100ml/10a (原液)	○	○
東北	○1	○	○始		○始							植代後～4, +0～ +5(ノビエ1L)	または 500ml/10a 以下の 散布液量 に希釈)	○	○
北陸	○1	○	○始		○始									○	○
関東・東海	○1	○	○始		○始									○	○
近・中・四	○1	○	○始		○始									○	○
九州	○1	○	○始		○始									○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-2

CG-113(改) ジェンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツツ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤 土	壤 土 ～ 堆 土
北海道	○1	○	○始	○前							SU抵抗性ホタルイ: 前	+0～+5(ノビエ1L) (砂壤土は+1～)	30g×10a /10a	○	○
東北	○1	○	○始	○始	○始							植代後～4, +1～ +5(ノビエ1L)		●	○
北陸	○1	○	○始		○始							植代後～4, +0～ +5(ノビエ1L)		○	○
関東・東海	○1	○	○始		○始									●	○
近・中・四	○1	○	○始		○始							植代後～4, +0～ +5(ノビエ1L) (砂壤土 は+1～)		○	○
九州	○1	○	○始		○始							植代後～4, +1～ +5(ノビエ1L)		○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

A-2 G-315B 乳 「継」

A-2

HSW-012 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツツ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤 土	壤 土 ～ 堆 土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始			○発生 期		ミズアオイ: 始 SU抵抗性ホタルイ: 1.5L	+0～ノビエ1.5L	500ml/10a	●	○
東北															
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-2 HSW-012 フロアブル (少量散布) 「縦」

A-2

KH-183(○) 1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●1.5	●	●始	●始							●始	+3～ノビエ1.5L	1kg/10a		●
東北	●1.5	●	●始	●始							●始	植代後～4,+3～ ノビエ1.5L			●
北陸	●1.5	●	●始		●始						●始				●
関東・東海 (管)	●1.5	●	●始		●始						●始				●
近・中・四 (管)	●1.5	●	●始		●始						●始				●
九州	●1.5	●	●始		●始						●始				●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-2

KPP-2008 乳(EW)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1	○	○始	○前							ミス'ア'イ:始	+0～+5(ノビエ1L)	500ml/10a	○	○
東北	○1	○	○始		○始							植代後～4,+0～ +5(ノビエ1L)		●	○
北陸	○1	○	○始		○始									○	○
関東・東海	○1	○	○始		○始									○	○
近・中・四	○1	○	○始		○始									○	○
九州	○1	○	○始		○始									○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 深水条件では薬害を生じることがある。
イネに付着すると軽微な薬害を生じることがある。

A-2

KPP-2008-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●1	●	●始	●始								+0～+5(ノビエ1L)	1kg/10a		●
東北	●1	●	●始	●前	●始							植代後～4,+0～ +5(ノビエ1L)			●
北陸	●1	●	●始		●始										●
関東・東海	●1	●	●始		●始										●
近・中・四 (管)	●1	●	●始		●始										●
九州	●1	●	●始		●始										●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 深水条件では薬害を生じることがある。

A-2

KPP-2011 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1	○	○始	○始								+0～+5(ノビエ1L)	500ml/10a	●	○
東北	○1	○	●始		●前							植代後～4,+0～ +5(ノビエ1L)			○
北陸	○1	○	○始		○前							植代後～4,+0～ +5(ノビエ1L)		●	○
関東・東海 (管)	○1	○	○前		○前							植代後～4,+0～ +5(ノビエ1L)		●	○
近・中・四 (管)	○1	○	○始		○前							植代後～4,+0～ +5(ノビエ1L)		●	○
九州	●1	●	●始		●始									●	●

一発処理型除草剤の前処理として使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 深水条件では薬害を生じることがある。

A-2

MAT-159 ジェンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壌土	壤土 へ 壤土
北海道	○1	○	○始	○始								+1～+5(ノビエ1L)	50g×10a /10a	○	○
東北	○1	○	○始	○始	○前							植代後～+4,+1～ +5(ノビエ1L)		●	○
北陸	○1	○	○始		○前									○	○
関東・東海	○1	○	○始		○始	●前※									○
近・中・四	○1	○	○始		○始									○	○
九州	○1	○	○始		○始									○	○

※:クロクワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

クロクワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-2

MY-100MS フロアブル(少量散布)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壌土	壤土 へ 壤土
北海道	○1	○	○始	○始		○始						+0～+5(ノビエ1L)	300ml/10a		○
東北	○1	○	○始	○始	○始	●始								●	○
北陸	○1	○	○始		○始	○始									○
関東・東海(昔)	○1	○	○始		○始	○始									○
近・中・四(昔)	○1	○	○始		○始	○始						+0～+5(ノビエ1L) (砂壌土は+4～)		○	○
九州	○1	○	○始		○始							+0～+5(ノビエ1L)		○	○

一発処理型除草剤の前処理として少量散布(300ml/10a)が可能。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-2

RYH-118-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壌土	壤土 へ 壤土
北海道	○1	○										+0～+5(ノビエ1L)	1kg/10a	○	○
東北	○1	○										植代後～+4,+0～ +5(ノビエ1L)		○	○
北陸	○1	○												○	○
関東・東海	○1	○												○	○
近・中・四	○1	○												○	○
九州	○1	○												○	○

一発処理型除草剤の前処理として使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 深水条件では薬害を生じることがある。

A-2

SB-528① フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壌土	壤土 へ 壤土
北海道	○1	○	○始	○始								+0～+5(ノビエ1L)	500ml/10a	●	○
東北	○1	○	○始	●前								植代後～+4,+0～ +5(ノビエ1L)		●	○
北陸	○1	○	○始		○前							植代後～+4,+0～ +5(ノビエ1L)		●	○
関東・東海	○1	○	○始		○始									●	○
近・中・四	○1	○	○始		○始									○	○
九州	○1	○	○始	○前	○始									○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-2 SB-566 フロアブル 「継」

A-2 SB-566-1kg 粒 「継」

A-2
YH-562 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 壤土
北海道	○1	○	○始	○始							○前	+0～+5(ノビエ1L)	500ml/10a		○
東北	○1.5	○	○始	○始							○前	+0～ノビエ1.5L		○	○
北陸	○1.5	○	○始								○前			○	○
関東・東海	○1.5	○	○始								○前	植代後～+4,+0～ ノビエ1.5L		○	○
近・中・四	○1	○	○始									+0～+5(ノビエ1L)		○	○
九州	○1	○	○始												○

田植同時散布可能(東北～近畿・中国・四国)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-2 YH-650 フロアブル 「継」

A-2 YH-650-1kg 粒 「継」

A-2
YH-651 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 壤土
北海道													500ml/10a		
東北															
北陸															
関東・東海	●1.5	●	●始		●始		●前※				●始	植代後～+4,+0～ ノビエ1.5L			●
近・中・四															
九州															

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-2
アタロール シンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 壤土
北海道	○1	○	○始	○前								+1～+5(ノビエ1L)	50g×10 ³ /10a	○	○
東北	○1	○	○始		○始							植代後～+4,+1～ +5(ノビエ1L)		○	○
北陸	○1	○	○始		○前									○	○
関東・東海	○1	○	○始		○前										○
近・中・四	○1	○	○始		○始									○	○
九州	○1	○	○始		○始									○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

A-2

ブタクロール-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 塩土
北海道	○1	○	○始	○前							ミス'ア'イ:始	+1～+5(ノビエ1L)	1kg/10a	○	○
東北	○1	○	○始		○始							植代後～+4,±0～ +5(ノビエ1L) (砂壤土 は+1～)		○	○
北陸	○1	○	○始		○始							植代後～+4,±0～ +5(ノビエ1L)		○	○
関東・東海	○1	○	○始		○始							植代後～+4,±1～ +5(ノビエ1L)		○	○
近・中・四	○1	○	○始		○始									○	○
九州	○1	○	○始		○始									○	○

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 浅植え, 植え付け精度不良等で根が露出すると薬害を生じることがある。

A-3 体系処理(中後期)

A-3

DASH-001 SC

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 塩土
北海道													100ml/10a (散布液量 100L/10a)		
東北	●5	●	●花茎 抽出始	●4	●4	●4						+25～+40(イ6L 以降,ノビエ5Lまで)		●	
北陸	●5	●	●花茎 抽出始		●4	●5								●	
関東・東海	●5	●	●花茎 抽出始		●5	●5		●生育 期	●生育 期					●	
近・中・四 (管)	●5	●	●花茎 抽出始		●4	●4								●	
九州	●5	●	●花茎 抽出始		●6	●6		●生育 期	●生育 期					●	

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 落水もしくは浅水で管理し、2日間以上入水しない。
前処理剤との組合せで使用する。

A-3 DBH-1291 乳 「継」

A-3

KUH-011D-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 塩土
北海道													1kg/10a		
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
九州	●2.5	●	●2	●前	●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組合せで使用する。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3

KUH-011K-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 へ 壤土
北海道													1kg/10a		
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+15～+25(ノビエ 2.5L)		●	●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組合せで使用する

A-3

KUH-983-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 へ 壤土
北海道	○4											+15～+35(ノビエ 4L)	1kg/10a	●	○
東北	○4													○	○
北陸	○4													●	○
関東・東海 (善)	○4													●	○
近・中・四	○4													○	○
九州 (善)	○4													○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

MCP-BAS(Na) 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 へ 壤土
北海道		○生育 期	○4	○5								幼穂形成始期	3～ 4kg/10a		○
東北		○生育 期	○4	○6	●6	●塊茎 形成前				●増殖 期		有効分けつ終止期 ～幼穂形成前期	(北陸・九 州の砂壤 土は 3kg/10a)		○
北陸		○生育 期	○4	○5	●6	●塊茎 形成前			●発生 期					●	○
関東・東海		○生育 期	○4		○6	○塊茎 形成前								○	○
近・中・四		○生育 期	○4		○6	○塊茎 形成前									○
九州		○生育 期	○5		○6	○塊茎 形成前								●	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。

降雨などにより散布後2日間以上落水もしくは浅水状態が維持されないと効果が低下することがある。

A-3

MK-243SM シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 へ 壤土
北海道	●2.5	●	●2	●3		●2					●始	+20～+30(イネ5L以 降、ノビエ2.5Lまで)	50g×10 ³ /10a		●
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○2					○前				○
北陸	●2.5	●	●2		●始	●2									●
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2					○前				○
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

暑い高温条件では薬害を生じることがある。

散布後の低温および急激な気温の上昇により薬害を生じることがある。

前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

MY-100DC①-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカリ	クロク'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg/10a		
東北															
北陸															
関東・東海															
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		●	●
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

NBA-071-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカリ	クロク'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg/10a		
東北															
北陸															
関東・東海															
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		●	●
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

NC-329-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカリ	クロク'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg/10a		
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	シズイ発生始～3cm コウキヤガラ発生始 クワコキ:本葉1葉期	+15～+25(ノビエ 2.5L)	●	●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組合せで使用する。

コウキヤガラ・シズイ防除は、有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3

NH-806 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカリ	クロク'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													50g×10 ³ /10a		
東北															
北陸															
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2		●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前	イボ'サ:再生始	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)	●	●
近・中・四															
九州															

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

前処理剤との組合せで使用する。

オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3
SB-551-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 塩土
北海道													1kg/10a		
東北															
北陸	○3	○	○3		○2	○2						+20～+30(イネ5L以 降,ノビエ3Lまで)		●	○
関東・東海	○3	○	○3		○2	○2				○発生 期				○	○
近・中・四	○3	○	○3		○2	○2				○発生 期				○	○
九州	○3	○	○3		○2					○発生 期				○	○

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の低温および急激な気温の上昇により薬害を生じることがある。
前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3
TH-001 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 塩土
北海道													500ml/10a		
東北															
北陸															
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		●	●
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3
YH-591-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 塩土
北海道	○3	○	○2			○2					○始	ミス'ア'イ:4L	1kg/10a		○
東北	○3	○	○2		○始	○始								○	○
北陸	○3	○	○2		○始	○2					○前			○	○
関東・東海	○3	○	○3		○3	○3					○始			○	○
近・中・四	○3	○	○3		○3	○3					○始				○
九州															

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 著しい高温条件では薬害を生じることがある。
散布後の低温および急激な気温の上昇により薬害を生じることがある。
前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3
YH-653-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 塩土
北海道	●3.5	●	●3	●3		●3					●始	+20～+30(イネ5L以 降,ノビエ3.5Lまで)	1kg/10a		●
東北															
北陸	●3.5	●	●3		●2	●2			●発生 期			+20～+30(イネ5L以 降,ノビエ3.5Lまで)			●
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 著しい高温条件では薬害を生じることがある。
散布後の低温および急激な気温の上昇により薬害を生じることがある。
前処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 イボクサ
SB-533 フロアブル

地域名	対象雑草： イボクサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道			500ml/10a
東北			
北陸			
関東・東海	●	再生始	
近・中・四			
九州			
使用上の注意：			

A-4 イボクサ SB-533P5(改)ジャンボ 「雑」

A-4 イボクサ SB-556 フロアブル 「雑」

A-4 イボクサ SW-991-1kg 粒 「雑」

A-4 特殊雑草対象(エゾノサヤヌカグサ)

A-4 エゾノサヤヌカグサ
AVH-002-1kg 粒

地域名	対象雑草: エゾノサヤヌカグサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道	●	2L	1kg/10a
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 エゾノサヤヌカグサ
NBA-131a-1kg 粒

地域名	対象雑草： エゾノサヤヌカグサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道	●	2L	1kg/10a
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 エゾノサヤヌカグサ
NH-003-1kg 粒

地域名	対象雑草: エゾノサヤヌカグサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道	●	2L	1kg/10a
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 エゾノサヤヌカグサ
SL-954 ジャンボ

地域名	対象雑草: エゾノサヤヌカグサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道	●	2L	50g×10 ³ /10a
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 特殊雑草対象(オモダカ)

A-4 オモダカ

AC-014A-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量
北海道	○	前	※	1kg/10a
東北	○	前	※	
北陸	○	前	※	
関東・東海	○	前	※	
近・中・四	○	前	※	
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ KUH-003D シ'ヤンボ 「糞」

A-4 オモダカ

KUH-003D-0.25kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量
北海道				250g/10a
東北				
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始		
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

KUH-003K-0.25kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量
北海道				250g/10a
東北	●	前	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

KUH-004D-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量
北海道				1kg/10a
東北				
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始		
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

KUH-004K-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量
北海道				1kg/10a
東北	●	前	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ KUH-013D-0.25kg 粒 「糞」

A-4 オモダカ KUH-013K-0.25kg 粒 「糞」

A-4 オモダカ MK-243D-1kg 粒 「継」

A-4 オモダカ Mon-923-1kg 粒 「継」

A-4 オモダカ Mon-923①-1kg 粒 「継」

A-4 オモダカ
MY-100DC-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量
北海道	●	前		1kg/10a
東北	●	前	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
MY-100DC①フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量
北海道				500ml/10a
東北				
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始		
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
MY-100DC①-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量
北海道				1kg/10a
東北				
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始		
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ MY-100NC 顆粒水和 「継」

A-4 オモダカ NBA-131a-1kg 粒 「継」

A-4 オモダカ NBA-131b-1kg 粒 「継」

A-4 オモダカ NC-385SB 顆粒水和 「継」

A-4 オモダカ
NH-003-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量
北海道	●	前		1kg/10a
東北	●	前	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ NH-101 シェンボ 「継」

A-4 オモダカ NH-102 フロアブル 「継」

A-4 オモダカ NH-104-1kg 粒 「継」

A-4 オモダカ
NOJ-101-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量
北海道	●	前		1kg/10a
東北	●	前	※	
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ NOJ-103-1kg 粒 「継」

A-4 オモダカ NOJ-104-1kg 粒 「継」

A-4 オモダカ
SW-002①フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量
北海道				500ml/10a
東北				
北陸	●	前		
関東・東海				
近・中・四				
九州				

使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
TH-001フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量
北海道	●	前		1kg/10a
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ YH-641-1kg 粒 「継」

A-4 特殊雑草対象(クサネム)

A-4 クサネム
KUH-911 液

地域名	対象雑草: クサネム	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
全域	○	草丈40cm以下(±30~+50) (九州は草丈30cm以下)	25~50ml/10a(散布液量100L/10a) 展着剤加用

使用上の注意: 落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。

A-4 特殊雑草対象(クログワイ)

A-4 クログワイ
AC-014A-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量
北海道				1kg/10a
東北	○	前	※	
北陸				
関東・東海	○	前	※	
近・中・四	○	前		
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
AVH-002-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量
北海道				1kg/10a
東北	○	前	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ FSS-115 粒 「縦」

A-4 クログワイ KPP-2008 乳(EW) 「縦」

A-4 クログワイ KUH-003D シャンボ 「縦」

A-4 クログワイ
KUH-003D-0.25kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量
北海道				250g/10a
東北				
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
KUH-003K-0.25kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量
北海道				250g/10a
東北	●	前	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
KUH-004D-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量
北海道				1kg/10a
東北	●	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
KUH-004K-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量
北海道				1kg/10a
東北	●	前	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ KUH-013D-0.25kg 粒 「縦」

A-4 クログワイ KUH-013K-0.25kg 粒 「雑」

A-4 クログワイ
KU-958 フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量
北海道				500ml/10a
東北	○	前	※	
北陸	●	前	※	
関東・東海	○	前	※	
近・中・四	○	前	※	
九州	○	前	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
KU-985 ① フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量
北海道				500ml/10a
東北				
北陸				
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	○	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
MAT-159 ジャンク

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量
北海道				50g×10㍻/10a
東北				
北陸				
関東・東海	●	前	※	
近・中・四				
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ MK-243D-1kg 粒 「雑」

A-4 クログワイ Mon-923-1kg 粒 「雑」

A-4 クログワイ Mon-923 ①-1kg 粒 「雑」

A-4 クログワイ
MY-100DC フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量
北海道				500mi/10a
東北	●	前	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
MY-100DC-1kg 粒

※1000C 1kg 粒				
地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量
北海道				1kg/10a
東北	●	前	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
MY-100DC①フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量
北海道				500ml/10a
東北				
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
MY-100DC①-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量
北海道				1kg/10a
東北				
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ MY-100NC-1kg 粒 「継」

A-4 クログワイ MY-100NDC-1kg 粒 「継」

A-4 クログワイ NBA-071-1kg 粒 「継」

A-4 クログワイ NBA-131a-1kg 粒 「継」

A-4 クログワイ NBA-131b-1kg 粒 「継」

A-4 クログワイ NC-390 フロアブル 「継」

A-4 クログワイ
NH-003-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量
北海道				1kg/10a
東北	●	前	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ NH-101 ジャンボ 「継」

A-4 クログワイ NH-102 フロアブル 「継」

A-4 クログワイ NH-104-1kg 粒 「継」

A-4 クログワイ
NOJ-101-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量
北海道				1kg/10a
東北	●	前	※	
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	前	※	
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ NOJ-103-1kg 粒 「継」

A-4 クログワイ NOJ-104-1kg 粒 「継」

A-4 クログワイ
SW-002①フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量
北海道				500ml/10a
東北				
北陸	●	始	※	
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ TH-001フロアブル 「継」

A-4 クログワイ TH-001①フロアブル 「継」

A-4 クログワイ YH-641-1kg 粒 「継」

A-4 クログワイ
YH-651フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量
北海道				500ml/10a
東北				
北陸	●	前	※	
関東・東海	●	前	※	
近・中・四	●	前		
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
YH-652フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量
北海道				500ml/10a
東北				
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	前		
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 特殊雑草対象(コウキヤガラ)

A-4 コウキヤガラ
SL-954シヤンボ

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道			50g×10≧/10a
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州	●	始	
使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。			

A-4 コウキヤガラ TH-001フロアブル 「継」

A-4 特殊雑草対象(シズイ)

A-4 シズイ

KUH-003K-0.25kg 粒

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道			250g/10a
東北	●	草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意: シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 シズイ

KUH-004K-1kg 粒

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道			1kg/10a
東北	●	草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意: シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 シズイ

KUH-013K-0.25kg 粒

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道			250g/10a
東北	●	草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意: シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 シズイ MCP-BAS(Na) 粒 「継」

A-4 シズイ

Mon-923-1kg 粒

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道			1kg/10a
東北	●	草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意: シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 シズイ

NH-003-1kg 粒

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道			1kg/10a
東北	●	草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意: シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 シズイ
TH-001 フロアブル

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道			500ml/10a
東北	●	草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意: シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 特殊雑草対象(ミズアオイ)

A-4 ミズアオイ
AGH-975 フロアブル

地域名	対象雑草: ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道	●	1L	500ml/10a
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 ミズアオイ AVH-002-1kg 粒 「縦」

A-4 ミズアオイ CG-113(改)ジャンボ 「縦」

A-4 ミズアオイ
HSW-012 フロアブル

地域名	対象雑草: ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道	●	始	500ml/10a
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 ミズアオイ
KUH-003K-0.25kg 粒

地域名	対象雑草: ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道	●	始	250g/10a
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 ミズアオイ
KUH-013K-0.25kg 粒

地域名	対象雑草: ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道	●	1L	250g/10a
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 ミズアオイ
Mon-923-1kg 粒

MOR-923 1kg 粒			
地域名	対象雑草： ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道	●	始	1kg/10a
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意・			

A-4 ミズアオイ NBA-131a-1kg 粒 「継」

A-4 ミズアオイ NC-397-1kg 粒 「継」

A-4 ミズアオイ
SB-533F5(改)ジャンボ

SB-535F3(4Q) ノリホ			
地域名	対象雑草: ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道	●	1L	50g×5マ/10a
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 ミズアオイ SL-954 ジャンボ 「継」

A-4 ミズアオイ
TH-001 フロアブル

地域名	対象雑草： ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道	●	1L	500ml/10a
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意：			

A-4 ミズアオイ TH-547-1kg 粒 「継」

A-4 ミズアオイ YH-546 フロアブル 「継」

A-4 ミズアオイ
YH-591-1kg 粒

地域名	対象雑草: ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道	●	4L	1kg/10a
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意: 前処理剤との組合せで使用する。			

A-4 ミズアオイ YH-641-1kg 粒 「継」

A-4 ミズアオイ YH-650-1kg 粒 「継」

A-4 ミズアオイ YH-652 フロアブル 「継」

A-4 特殊雑草対象(SU抵抗性コナギ)

A-4 SU抵抗性コナギ AC-014A-1kg 粒 「継」

A-4 SU抵抗性コナギ

AVH-002-1kg 粒

地域名	対象雑草: SU抵抗性コナギ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道			1kg/10a
東北			
北陸			
関東・東海	●	子葉期	
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 SU抵抗性コナギ Mon-923①-1kg 粒 「継」

A-4 SU抵抗性コナギ

NBA-131b-1kg 粒

地域名	対象雑草: SU抵抗性コナギ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道			1kg/10a
東北			
北陸			
関東・東海	●	1L	
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 SU抵抗性コナギ NBA-141b-1kg 粒 「継」

A-4 SU抵抗性コナギ NH-102 フロアフル 「継」

A-4 SU抵抗性コナギ NH-104-1kg 粒 「継」

A-4 SU抵抗性コナギ

SB-554 フロアフル

地域名	対象雑草: SU抵抗性コナギ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道			500ml/10a
東北			
北陸			
関東・東海	●	1L	
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 SU抵抗性コナギ

SL-954 ジェンボ

地域名	対象雑草: SU抵抗性コナギ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道			50g×10÷/10a
東北			
北陸			
関東・東海	●	2L	
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 SU抵抗性コナギ TH-547-1kg 粒 「継」

A-4 SU抵抗性コナギ
YH-546 フロアブル

地域名	対象雑草: SU抵抗性コナギ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道			500ml/10a
東北			
北陸			
関東・東海	●	2L	
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 SU抵抗性コナギ YH-641-1kg 粒 「継」

A-4 SU抵抗性コナギ YH-650-1kg 粒 「継」

A-4 特殊雑草対象(SU抵抗性ホタルイ)

A-4 SU抵抗性ホタルイ
AGH-975 フロアブル

地域名	対象雑草: SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道			500ml/10a
東北	●	2L	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 SU抵抗性ホタルイ
AVH-002-1kg 粒

地域名	対象雑草: SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道			1kg/10a
東北	●	1L	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 SU抵抗性ホタルイ
CG-113(改) ジャンボ

地域名	対象雑草: SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道	●	前	30g×10≒/10a
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意: 有効な剤との組み合わせで使用する。			

A-4 SU抵抗性ホタルイ DKH-311-1kg 粒 「継」

A-4 SU抵抗性ホタルイ
HSW-012 フロアブル

地域名	対象雑草: SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道	●	1.5L	500ml/10a
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 SU抵抗性ホタルイ

Mon-923-1kg 粒

地域名	対象雑草： SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道	●	1L	1kg/10a
東北	●	1L	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意：			

A-4 SU抵抗性ホタルイ

MY-100DC①フロアブル

地域名	対象雑草: SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道			500ml/10a
東北			
北陸			
関東・東海	●	1L	
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 SU抵抗性ホタルイ

MY-100MSフロアブル

地域名	対象雑草： SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道			500ml/10a
東北			
北陸			
関東・東海	●	1L	
近・中・四			
九州			
使用上の注意：			

A-4 SU抵抗性ホタルイ MY-100NC 顆粒水和 「継」

A-4 SU抵抗性ホタルイ

NBA-131a-1kg 粒

地域名	対象雑草： SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道	●	2L	1k/10a
東北	●	2L	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意：			

A-4 SU抵抗性ホタルイ NBA-131b-1kg 粒 「継」

A-4 SU抵抗性ホタルイ NBA-141a-1kg 粒 「継」

A-4 SU抵抗性ホタルイ NBA-141b-1kg 粒 「継」

A-4 SU抵抗性ホタルイ NH-102フロアブル 「継」

A-4 SU抵抗性ホタルイ NH-104-1kg 粒 「継」

A-4 SU抵抗性ホタルイ
SB-533 フロアブル

地域名	対象雑草： SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道			500ml/10a
東北			
北陸			
関東・東海	●	1L	
近・中・四			
九州			
使用上の注意：			

A-4 SU抵抗性ホタルイ
SB-554 フロアブル

地域名	対象雑草: SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道	●	1.5L	500ml/10a
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 SU抵抗性ホタルイ
SB-556 フロアブル

地域名	対象雑草： SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道			500ml/10a
東北			
北陸			
関東・東海	●	2L	
近・中・四			
九州			
使用上の注意：			

A-4 SU抵抗性ホタルイ
SL-954 シャンボ

地域名	対象雑草： SU抵抗性ホタルイ	処理時期 (対象雑草の生育時期)	使用量
北海道	●	2L	50g×10㎡/10a
東北	●	2L	
北陸			
関東・東海	●	2L	
近・中・四			
九州			
使用上の注意：			

A-4 SU抵抗性ホタルイ SW-002 フロアブル 「継」

A-4 SU抵抗性ホタルイ
SW-002㊦ フロアブル

地域名	対象雑草: SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量
北海道			500ml/10a
東北			
北陸			
関東・東海	●	2L	
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 SU抵抗性ホタルイ SW-024㊦ シャンボ 「継」

A-4 SU抵抗性ホタルイ SW-024㊦ シャンボ 「継」

B

B-3015P 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤 土	壤土 ～ 埴土
全域	○始	○										播種直後～イネ出 芽前(～ノビエ始)	4～ 6kg/10a	○	○

乾田・落水状態で全面土壌散布

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

B KUH-011D-1kg 粒 「継」

B KUH-011K-1kg 粒 「継」

B KUH-013D-0.25kg 粒 「継」

B KUH-013K-0.25kg 粒 「継」

B KUH-962-1kg 粒 「継」

B

KUH-972D フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤 土	壤土 ～ 埴土
北陸～九州	○3*	○	○2		○2	○2				○再生 前～始	○前	イネ1L～ノビエ 3L*(※九州は 2.5Lまで)	500ml/10a	●	○

湛水直播

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では葉害を生じる。

B KUH-983-1kg 粒 「継」

B

KUH-985 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤 土	壤土 ～ 埴土
北海道、東北	○3	○	○2		●2							イネ1.5L～ノビエ 3L	500ml/10a		○

湛水直播

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では葉害を生じる。

B

KUH-985① フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤 土	壤土 ～ 埴土
北陸～九州	○3*	○	○2		○2	○2				○再生 前～始	○前	イネ1L*～ノビエ3L *(※九州は2.5Lま で) (※砂壤土は1.5L～)	500ml/10a	●*	○

湛水直播

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では葉害を生じる。

B MY-100DC① フロアブル 「継」

B MY-100TSC フロアブル 「継」

B NBA-071-1kg 粒 「継」

B

NBA-941-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
全域 (北海道を除く)	○3	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始		イネ1L～ノビエ3L (東北はイネ1.5L ～)	1kg/10a	●*	○
＊砂壤土は九州を除く 湛水直播(関東・東海・九州) 湛水条件で使用する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。															

B

NBA-941S-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
全域 (北海道を除く)	●3	●	●2		●2					●再生 前～始		イネ1L～ノビエ3L (東北はイネ1.5L ～)	1kg/10a		●
湛水直播 湛水条件で使用する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。															

B

NBA-942b-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北陸～九州	○3	○	○2		○2	○2				○再生 前～始		イネ1L～ノビエ3L (＊砂壤土はイネ 1.5L～)	1kg/10a	●*	○
湛水直播(関東・東海・九州) 湛水条件で使用する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。															

B NC-331 水和剤 「継」

B NC-385SB 顆粒水和 「継」

B NH-102 フロアフル 「継」

B

PSS①D-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
全域 (九州を除く)	●2	●	●2			●2			●発生 期			イネ1.5L～ノビエ2L	1kg/10a		●
湛水直播 湛水条件で使用する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。 前処理剤との組み合わせで使用する。															

B SB-556 フロアフル 「継」

B

SW-002 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルム'シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 壤土
北海道, 東北	○2.5	○	○2										イネ1.5L～ノビエ 2.5L	500ml/10a		○

湛水直播

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

SW-002① フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルム'シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 壤土
北陸～近畿・中 国・四国	●2.5	●	●2		●2								イネ1L～ノビエ2.5L	500ml/10a		●

湛水直播

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

SW-973-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルム'シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 壤土
東北～近畿・中 国・四国	○3.5	○	○2		○2	●2			●発生 期				イネ5L～ノビエ 3.5L	1kg/10a		○

湛水直播(関東・東海、近畿・中国・四国)

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 著しい高温条件では薬害を生じることがある。
 散布後の低湿および急激な気湿の上昇により薬害を生じることがある。
 前処理剤との組み合わせで使用する。

B SW-991-1kg 粒 「継」

B

TH-913NCS フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルム'シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 壤土
全域	●3	●	●2		●2	●2				●再生 前～始			イネ1L～ノビエ3L (北海道～北陸は イネ1.5L～)	500ml/10a		●

湛水直播

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

YF-65① 液

地域名	対象雑草	処理時期	使用量(散布液量)	適用土壌
全域	○ 一年生雑草	雑草生育期 播種前14日～播種後7日(イネ出芽前)	600～1000ml/10a (散布液量100L/10a)	全土壌

乾田状態で茎葉散布

使用上の注意:

B
ブタクロール乳

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
東北、関東・東 海～九州	●前	●前	●前									入水前10日～2日 (休出芽期以 降)	500～1000 ml/10a (散布液量 100L/10a)		●
本剤処理前に発生した雑草は防除しておく。 乾田状態で全面土壌散布 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:															

C 畦畔雑草

C
2,4-PA 液

地域名		対象雑草	処理時期	使用量(散布液量)	適用土壌
全域	●	広葉雑草およびスギナ	雑草生育期(草丈30cm以下)	100～200ml/10a (散布液量100L/10a)	全土壌
使用上の注意: のり面には使用しない。 水田内に流入または飛散すると被害を生じる。					

C AH-01 液剤 「雑」

E 休耕田

E
NH-007 フロアブル

地域名		対象雑草	処理時期	使用量(散布液量)	適用土壌
全域	●	全草種	雑草生育期(草丈50cm以下)	500～1000ml/10a (散布液量100L/10a)	全土壌
使用上の注意:					

F 生物除草剤

F
MTB-951

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量	適用土壌
北海道	○2											ノビエ1L～2L	600g/10a 散布液量 5L/10a)	全土壌
東北	○2													
北陸	○2													
関東・東海（管）	○1.5											+4（ノビエ始）～ノ ビエ1.5L		
近・中・四（管）	○1.5													
九州	○1.5													
ノビエが完全に水没する条件で処理し、7日間程度は水深を維持する。 本剤は微生物を利用したノビエ専用除草剤であり効果が変動しやすい。 減水深：2cm/日以下 使用上の注意：														

その他

その他

DEH-112 乳(EW)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツリ	クシカワ	クロク'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量	適用土壌
北海道	●5												播種後10日～ノ ビエ5L	100ml/10a (散布液量 100L/10a)	
東北															
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															
機械移植育苗に使用する															
使用上の注意:															

水稲関係除草剤使用基準の表示について

- 過年度、既に実用化の認められている適用草種・土壌条件に○を印した。
(本年度の試験の結果、特に拡大のない場合も含む)
草種欄の数字、字句で草種ごとの葉齢を示した。[例:○始(発生始)、○2(2葉期まで)]
作期に限定がある場合は、地域名の後に適用作期を普通期:(普), 早期:(早)と記した。
使用上の注意は別途一覧表に沿って文章で備考欄に記載した。
- 本年度、新たに使用基準が作成された場合は、実用化可能となった適用草種・土壌に●を印し、
処理時期及び使用量を記載した。
C(畦畔), D(耕起前), E(休耕田)の試験区分において、判定欄の○は前年度までに実用化の
認められている地域を示す。
- 過年度の基準に適用条件拡大が可能となった場合、
作 期 の 拡 大 : 作期の限定がなくなった場合、作期の記載を取消線で消した。(例:(普))
草 種 の 拡 大 : 拡大可能となった草種に●を印した。
葉 齢 の 拡 大 : 拡大可能となった葉齢に、アンダーラインを付した。(例:○2.5)
処理時期, 使用量の拡大 : 拡大部分にアンダーラインを付した。(例: +3～ノビエ2L, 50～75ml/a)
土 壌 条 件 の 拡 大 : 拡大可能となった土壌に●を印した。

前年までの試験経過欄()内の記号

- A 新規年度
Aa 新規年度(但し成分から作用性が予測される剤)
B 他の栽培法、やや異なる処理法
C 継続検討

- 既登録薬剤については薬剤名覧[]内に商品名を記載した。
- 必要に応じて参考となる使用基準を載せた。