

新 登 録 除 草 剤 一 覧

農林水産省消費・安全局農産安全管理課
平成15年11月1日～平成16年5月31日

(1) 移植水稻

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
ピラゾスルフロンエチル・フェントラザミド・ベンゾビシクロン水和剤	ダブルスター S B 顆粒	エチル=5-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-1-メチルピラゾール-4-カルボキシラート ・・・2.6% 4-(2-クロロフェニル)-N-シクロヘキシル-N-エチル-4,5-ジヒドロ-5-オキソ-1H-テトラゾール-1-カルボキシラート ・・・25.0% 3-(2-クロロ-4-メシロペンゾイル)-2-フェニルチオビシクロ[3.2.1]オクタ-2-エン-4-オン ・・・25.0%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草 マウバ イ オカバ イ ウリカ ミズカヤツリ (北海道を除く) ヘラオモタカ (北海道、東北) ヒルムシロ(北陸を除く) セリ アオミドロ・藻類による表層はく離(北陸を除く)	北海道	砂壤土～塩土	移植直後～移植後20日 (ノビエ2.5葉期まで)	80g 希釈水量 500mL	湛水散布又は無人ヘリコプターによる滴下 本剤の使用回数1回 ピラゾスルフロンエチルを含む農薬の総使用回数1回 フェントラザミドを含む農薬の総使用回数1回 ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数2回以内	バリエルックアグサイエンス ㈱
						東北、関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯					
						北陸、近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯	塩土～塩土	移植直後～移植後15日 (ノビエ2.5葉期まで)			
クミルロン・ベントキサゾン剤	草笛ジャンボ	1-(2-クロロベンゾイル)-3-(1-メチル-1-フェニルエチル)ウレア ・・・15.0% 3-(4-クロロ-5-シクロペンチルオキシ-2-フルオロフェニル)-5-イソプロピルピチン-1,3-オキサゾリジン-2,4-ジオン ・・・4.5%		移植水稻	水田一年生雑草 マウバ イ オカバ イ ミズカヤツリ ヘラオモタカ (北海道)	全域の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～塩土	植代後～移植前4日又は移植直後～移植後5日 (ノビエ1葉期まで)	20個 (1kg)	水田に投げ入れる 本剤の使用回数1回 クミルロンを含む農薬の総使用回数2回以内 ベントキサゾンを含む農薬の総使用回数2回以内	丸紅 ㈱
						水田一年生雑草 マウバ イ オカバ イ ミズカヤツリ (北海道を除く) ヘラオモタカ (北海道、東北) クログワイ (東北、関東・東山・東海、近畿・中国・四国、九州)		北海道			
						全域(北海道を除く)の普通期及び早期栽培地帯		植代後～移植前4日又は移植直後～移植後5日 (ノビエ1葉期まで) (移植後に使用する除草剤との体系で使用)			

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
クミルロン・ペントキサゾン水和剤	草笛フロアブル	1-(2-クロロ-5-シロホ-ンチルオキシ-2-フルオロフェニル)-5-イソプロピルピリジン-1,3-オキサゾリジン-2,4-ジオン ・・・27.4% 3-(4-クロロ-5-シロホ-ンチルオキシ-2-フルオロフェニル)-5-イソプロピルピリジン-1,3-オキサゾリジン-2,4-ジオン ・・・8.2%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草 マツバ オタカイ ミスガヤツリ ヘラオモガカ (北海道、東北)	全域の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～埴土	植代後～移植前4日又は移植直後～移植後5日(1/12葉期まで、但し、近畿・中国・四国、九州は、1/12葉発生始期まで)	500mL	原液湛水散布 本剤の使用回数1回 クミルロンを含む農薬の総使用回数2回以内 ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数2回以内	丸紅(株)
					水田一年生雑草 マツバ オタカイ ミスガヤツリ (北海道を除く) ウツギガラ (九州) クログワイ (東北、関東・東山・東海、近畿・中国・四国、九州)	北海道		移植直後～移植後5日(1/12葉期まで) (移植後に使用する除草剤との体系で使用)	300mL (少量散布)		
						全域(北海道を除く)の普通期及び早期栽培地帯		植代後～移植前4日又は移植直後～移植後5日(1/12葉期まで) (移植後に使用する除草剤との体系で使用)			
ダイムロン・フェントラザミド・プロモブチド・ベンスルフロンメチル粒剤	イノーバDX1キログラム剤51	1-(α , α -ジメチルベンジル)-3-(パラトリル)尿素 ・・・4.5% 4-(2-クロロフェニル)-N-シクロヘキシル-N-エチル-4,5-ジヒドロ-5-オキソ-1H-テトラゾール-1-カルボキサミド ・・・2.0% (RS)-2-プロモ-N-(α , α -ジメチルベンジル)-3,3-ジメチルプロピルアミド ・・・7.5% メチル- α -(4,6-ジメチルピリジン-2-イルカルバモイルスルファミル)-オートレート ・・・0.51%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草 マツバ オタカイ ウツギ ミスガヤツリ ヘラオモガカ (九州) ヒルムシロ(北陸を除く) セリ(北陸を除く) アオビロ 藻類による表層はく離(北陸を除く)	北陸、関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯 近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯 九州の普通期及び早期栽培地帯	壤土～埴土 砂壤土～埴土 壤土～埴土	移植直後～移植後15日(1/12葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用回数1回 ダイムロンを含む農薬の総使用回数3回以内(本時期は2回以内) フェントラザミドを含む農薬の総使用回数1回 プロモブチドを含む農薬の総使用回数1回 ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内	バリエクロップ・サイエンス(株) デュポン(株) クミイ化学工業(株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
フェントラザミド・プロモブチド・ペンシルフロンメチル粒剤	イノーバ D X 1 キロ粒剤 75	4-(2-クロロフェニル)-N-シクロヘキシル-N-エチル-4,5-ジヒドロ-5-オキソ-1H-テトラゾール-1-カルボキサミド ・・・2.0% (RS)-2-プロモ-N-(α , α -ジメチルベンジル)-3,3-ジメチルプロピルアミド ・・・9.0% メチル= α -(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-オートルブート ・・・0.75%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草 マツバ オカキ ウリカ ミズカヤツリ (東北) ヘラオモダカ (北海道) ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類による表層はく離	北海道、東北	壤土～塩土	移植直後～移植後15日 (/ビ'エ2葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用回数1回 フェントラザミドを含む農薬の総使用回数1回 プロモブチドを含む農薬の総使用回数1回 ペンシルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内	バ'イエルクロップサイエンス(株) デ'ュボン(株) ク'アイ化学工業(株) 北海三共(株)
オキサジクロメホン・ペンシルフロンメチル水和剤	ホームランフロアブル	3-[1-(3,5-ジクロロフェニル)-1-メチルエチル]-3,4-ジヒドロ-6-メチル-5-フェニル-2H-1,3-オキサジン-4-オン ・・・1.2% メチル= α -(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-オートルブート ・・・1.4%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草 マツバ オカキ ウリカ ミズカヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類による表層はく離	東北	壤土～塩土	移植直後～移植後15日 (/ビ'エ2.5葉期まで)	500mL	原液湛水散布 本剤の使用回数1回 オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数2回以内 ペンシルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内	北興化学工業(株) デ'ュボン(株)
オキサジクロメホン・クロメブロップ・ピリミノバックメチル・ペンシルフロンメチル剤	バットフルユースジャンボ	3-[1-(3,5-ジクロロフェニル)-1-メチルエチル]-3,4-ジヒドロ-6-メチル-5-フェニル-2H-1,3-オキサジン-4-オン ・・・1.6% (RS)-2-(2,4-ジクロロ- <i>m</i> -トリルオキシ)プロピルオニゾール ・・・14.0% メチル=2-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イルオキシ)-6-(1-メトキシミノエチル)ベンゾエート ・・・1.8% メチル= α -(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-オートルブート ・・・3.0%		移植水稻	水田一年生雑草 マツバ オカキ ウリカ ミズカヤツリ (東北) ヘラオモダカ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類による表層はく離	北海道 東北	砂壤土～塩土	移植後3～20日 (/ビ'エ2.5葉期まで) 移植後3～15日 (/ビ'エ2.5葉期まで)	小包装(パック)10個(250g)	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる 本剤の使用回数1回 オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数2回以内 クロメブロップを含む農薬の総使用回数2回以内 ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数2回以内 ペンシルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内	ク'アイ化学工業(株) デ'ュボン(株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
オキサジクロメホン・クロメプロップ・ピリミノバックメチル・ペンシルフロンメチル剤	パットフルエースレジヤンボ	3-[1-(3,5-ジクロロフェニル)-1-メチルエチル]-3,4-ジヒドロ-6-メチル-5-フェニル-2H-1,3-オキサジン-4-オン ...1.6% (RS)-2-(2,4-ジクロロ-6-トリフルオロメチル)プロピオンニトリド ...14.0% メチル=2-(4,6-ジメトキシ)ピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-オートルブート ...1.8% メチル=α-(4,6-ジメトキシ)ピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-オートルブート ...2.0%		移植水稻	水田一年生雑草 マツバ ホタルイ ウリカ ミスガヤツリ ヒルムシロ(北陸を除く) ゼリ アオミドロ 藻類による表層はく離(近畿・中国・四国,九州)	北陸, 関東・東山・東海, 九州の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～埴土	移植後3～15日 (/ヒ)±2.5葉期まで)	小包装(パック)10個(250g)	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる 本剤の使用回数1回 オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数2回以内 クロメプロップを含む農薬の総使用回数2回以内 ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数2回以内 ペンシルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内	クミイ化学工業(株) デボン(株)
						近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯		移植後3～15日 (/ヒ)±2.5葉期まで、但し砂壤土は移植後5～15日)			
ピリミノバックメチル・プロモプチド・ペンシルフロンメチル・ペントキサゾン剤	トップガン250グラム	メチル=2-(4,6-ジメトキシ)ピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-オートルブート ...1.8% (RS)-2-プロモ-N-(α, α-ジメチルベンジル)-3,3-ジメチルプロピルアミド ...36.0% メチル=α-(4,6-ジメトキシ)ピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-オートルブート ...3.0% 3-(4-クロロ-5-ジクロロフェニル)-5-イソプロピルピリジン-1,3-オキサジン-2,4-ジオン ...8.0%		移植水稻	水田一年生雑草 マツバ ホタルイ ウリカ ミスガヤツリ(東北) ヘラオミダカ ヒルムシロ ゼリ アオミドロ 藻類による表層はく離	北海道	壤土～埴土	移植後3～20日 (/ヒ)±2.5葉期まで)	250g	湛水散布又は湛水周縁散布 本剤の使用回数1回 ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数2回以内 プロモプチドを含む農薬の総使用回数1回 ペンシルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内 ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数2回以内	クミイ化学工業(株) 科研製薬(株) デボン(株)
						東北	砂壤土～埴土	移植後3～15日 (/ヒ)±2.5葉期まで)			

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	登録会社
ピリミノ バックメ チル・ブ ロモブチ ド・ペン スルフロ ンメチル ・ベン トキサゾ ン 剤	トップガ ンL 25 0 グラム	メチル-2-(4,6-ジ メトキシ)ピリミジン-2 -イルオキシ)-6-(1- メトキシイミダゾール)ペ ンゾート ...1.8% (RS)-2-プロモ-N -(α , α -ジメチル ベンジル)-3,3-ジ メチルプロピルアミド ...36.0% メチル- α -(4,6-ジ メトキシ)ピリミジン -2-イルカルバモイルス ルプロアミド)-オート ...2.0% 3-(4-クロロ-5-シ クロペンチルオキシ)-2-フ ルオロフェニル)-5-イソ プロピルピリジン-1,3 -ジメチルピリジン-2, 4-ジオン ...8.0%		移植水稻	水田一年 生雑草 マツバ イ ネ コ ノ ミ ヤ ブ ミ ス カ ヤ ブ ヒ ル シ ロ セ リ ア オ ミ ト ロ ・ 藻類による 表層は く離(北 陸, 関東・ 東山・東 海, 九州)	関東・東山 ・東海の普 通期及び 早期栽培 地帯	壤土～ 埴土	移植後3～ 15日 (/ビエ2.5 葉期まで)	250g	湛水散布又は 湛水周縁 散布 本剤の使用 回数1回 ピリミノバックメ チルを含む農薬 の総使用回 数2回以内 プロモブチドを 含む農薬の 総使用回数1 回 ペンスルフロ ンメチルを 含む農薬の 総使用回 数2回以内 ベントキサゾ ンを含む農 薬の総使用 回数2回以 内	クアイ化学 工業(株) 科研製薬 (株) デューン(株)
プロモブ チド・ペン スルフロ ンメチル ・ベン チオカー ブ・メフ エナセツ ト粒剤	パワーウ ルフ1キ ロ粒剤7 5	(RS)-2-プロモ-N -(α , α -ジメチル ベンジル)-3,3-ジ メチルプロピルアミド ...9.0% メチル- α -(4,6-ジ メトキシ)ピリミジン -2-イルカルバモイルス ルプロアミド)-オート ...0.75% S-(4-クロロベンジ ル)-N,N-ジエチルチ オカーブメート ...15.0% 2-ベンゾチアゾール -2-イルオキシ-N-メ チルアセトアミド ...4.5%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草 マツバ イ ネ コ ノ ミ ヤ ブ ミ ス カ ヤ ブ ヒ ル シ ロ セ リ ア オ ミ ト ロ ・ 藻類による 表層は く離	北海道	壤土～ 埴土	移植後3～ 20日 (/ビエ2.5 葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用 回数1回 プロモブチドを 含む農薬の 総使用回数1 回 ペンスルフロ ンメチルを 含む農薬の 総使用回 数2回以内 ベンチオカー ブを含む農 薬の総使用 回数1回 メフエナセツ を含む農薬 の総使用回 数2回以 内	クアイ化学 工業(株) デューン(株)
プロモブ チド・ペン スルフロ ンメチル ・ベン チオカー ブ・メフ エナセツ ト粒剤	パワーウ ルフ1キ ロ粒剤5 1	(RS)-2-プロモ-N -(α , α -ジメチル ベンジル)-3,3-ジ メチルプロピルアミド ...9.0% メチル- α -(4,6-ジ メトキシ)ピリミジン -2-イルカルバモイルス ルプロアミド)-オート ...0.51% S-(4-クロロベンジ ル)-N,N-ジエチルチ オカーブメート ...15.0% 2-ベンゾチアゾール -2-イルオキシ-N-メ チルアセトアミド ...3.0%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草 マツバ イ ネ コ ノ ミ ヤ ブ ミ ス カ ヤ ブ ヒ ル シ ロ(関 東・東山・ 東海, 近 畿・中国・ 四国, 九 州) セ リ ア オ ミ ト ロ ・ 藻類による 表層は く離(関 東・東山・ 東海, 近 畿・中国・ 四国, 九 州)	北陸 関東・東山 ・東海, 九 州の普通 期及び早 期栽培地 帯	壤土～ 埴土 砂壤土 ～埴土	移植後3～ 15日 (/ビエ2.5 葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用 回数1回 プロモブチドを 含む農薬の 総使用回数1 回 ペンスルフロ ンメチルを 含む農薬の 総使用回 数2回以内 ベンチオカー ブを含む農 薬の総使用 回数1回 メフエナセツ を含む農薬 の総使用回 数2回以 内	クアイ化学 工業(株) デューン(株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
オキサジ アゾン・ ブタクロ ール乳剤	デルカッ ト乳剤	5-ターシャリ-ブチル 3-(2,4-ジクロロ- 5-イソプロポキシフェ ニル)-1,3,4-オキサ ジアゾール-2(3H) -オン ...8.0% 2-クロロ-2',6'- ジエチル-N-(7-トキ シメチル)アセトニトリド ...12.0%	乳 剤	移植水稻	水田一年 生雑草 マツバ イ ホタル イ ヘラオモ タカ ミ ス カ ヤツリ	全域の普 通期及び 早期栽培 地帯	砂壤土 ～壇土	植代時 (移植4日 前まで)	500mL	植代時に原 液のまま散 布し混和す る。 または、植 代直後原液 のまま散布 し、ただち に整地板で 均平作業を 行う。 本剤の使用 回数1回 オキサジア ゾンを 含む農薬の 総使用回数1 回 ブタクロ ールを含む 農薬の総 使用回数2回 以内	日産化学 工業(株)
インダノ ファン・ クロメブ ロップ・ ダイムロ ン・ベン スルフロ ンメチル 粒剤	ダイナマ ンD1キ ロ粒剤5 1	(RS)-2-[2-(3- クロロフェニル)-2,3- エポキシプロピル]- 2-エチルインダノ-1, 3-ジオン ...1.4% (RS)-2-(2,4- ジクロロ-5-トリオキ シ)プロピルオニトリ ド ...3.5% 1-(α , α -ジメチ ルベンジル)-3- (パラトリル)尿素 ...4.0% メチル= α -(4,6- ジメトキシピリミジン -2-イルカルバモイルス ルファモイル)-オートル ア ート ...0.51%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草 マツバ イ ホタル イ ウリ カ ミ ス カ ヤツリ ヒルムシロ(北 陸,近畿・中 国・四 国を除 く) ゼ アオミ ト ロ ・ 藻類によ る表層は く離(北 陸を除 く)	北陸, 関東・東 山・東 海の普 通期及 び早期 栽培地 帯	壇土 ～ 壇土	移植後5 ～15日 (ビエ2.5 葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用 回数1回 インダノ ファンを 含む農薬 の総使用 回数2回 以内 クロメ ブ ロップを 含む農薬 の総使用 回数2回 以内 ダイム ロンを 含む農薬 の総使用 回数3回 以内(本 田では 2回以内) ベン スルフロ ンメチル を含む農 薬の総使 用回数2 回以内	日本農薬 (株) デューン(株)
エトキシ スルフロ ン・オキ サジアゾ ン・ベン フレセー ト粒剤	ロングシ ョット1 キロ粒剤	1-(4,6-ジメトキシ ピリミジン-2-イル) -3-(2-エトキシフェ ニル)尿素 ...0.17% 5-ターシャリ-ブチル 3-(2,4-ジクロロ- 5-イソプロポキシフェ ニル)-1,3,4-オキサ ジアゾール-2(3H) -オン ...4.5% 2,3-ジヒドロ-3, 3-ジメチルベンゾ フラン-5-イル=エタンス ル ホ ート ...4.0%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草 マツバ イ ホタル イ ウリ カ ミ ス カ ヤツリ ヘラオモ タカ ヒルムシ ロ ゼ アオミ ト ロ ・ 藻類によ る表層は く離	北海道 東北	壇土 ～ 壇土	移植後3 ～12日 (ビエ1.5 葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用 回数1回 エトキシ スルフロ ンを 含む農薬 の総使用 回数2回 以内 オキサ ジア ゾンを 含む農薬 の総使用 回数1回 ベン フレ セー トを 含む農薬 の総使用 回数2回 以内	ハイエ ル クロ ッ プ サイ エ ン ス (株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用地帯	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
ダイムロン・ベントキサゾン水和剤	ダッシュワンフロアブル	1-(α , α -ジメチルヘンシ)ル)-3-(バトリル)尿素 ・・・22.9% 3-(4-クロロ-5-シクロヘンチルオキシ)-2-フルオロフェニル)-5-イソプロピル)-1,3-オキサゾリジン)-2,4-ジエオン ・・・3.8%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ オタカイ ミスガヤツリ (北海道, 東北を除く) ヘオモダカ (北海道, 九州)	北海道 東北, 北陸, 関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯	壤土～埴土 砂埴土～埴土	移植直後～移植後5日 (1/12エ1葉期まで) 植代後～移植前4日又は 移植直後～移植後5日 (1/12エ1葉期まで)	500mL	原液湛水散布 本剤の使用回数1回 ダイムロンを含む農薬の総使用回数3回以内(本田では2回以内) ベントキサゾンを含む農薬の総使用回数2回以内	科研製薬(株) (株)エス・ディー・エス・バイ オテック 北興化学工業(株)
フェントラザミド・プロモブチド・ベンスルフロメチル粒剤	クサトリ-DXジヤンボH	4-(2-クロロフェニル)-N-シクロヘキシル-N-エチル-4,5-ジヒドロ-5-オキソ-1H-テトラゾール-1-カルボキサミド ・・・7.5% (RS)-2-プロモ-N-(α , α -ジメチルヘンシ)ル)-3,3-ジメチル-7-チルアミド ・・・15.0% メチル- α -(4,6-ジメトキシヒ)リミジン-2-イソカルバモイルスルファモイル)-オートルート ・・・1.87%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ オタカイ ウリカ ミスガヤツリ ヘオモダカ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類による表層はく離	東北	埴土～埴土	移植後5～12日 (1/12エ2葉期まで)	小包装(パック) 10個 (400g)	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる 本剤の使用回数1回 フェントラザミドを含む農薬の総使用回数1回 プロモブチドを含む農薬の総使用回数1回 ベンスルフロメチルを含む農薬の総使用回数2回以内	三共アグロ(株) デューボン(株)
フェントラザミド・プロモブチド・ベンスルフロメチル粒剤	クサトリ-DXジヤンボL	4-(2-クロロフェニル)-N-シクロヘキシル-N-エチル-4,5-ジヒドロ-5-オキソ-1H-テトラゾール-1-カルボキサミド ・・・7.5% (RS)-2-プロモ-N-(α , α -ジメチルヘンシ)ル)-3,3-ジメチル-7-チルアミド ・・・15.0% メチル- α -(4,6-ジメトキシヒ)リミジン-2-イソカルバモイルスルファモイル)-オートルート ・・・1.27%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ オタカイ ウリカ ミスガヤツリ	北陸	埴土～埴土	移植後5～12日 (1/12エ2葉期まで)	小包装(パック) 10個 (400g)	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる 本剤の使用回数1回 フェントラザミドを含む農薬の総使用回数1回 プロモブチドを含む農薬の総使用回数1回 ベンスルフロメチルを含む農薬の総使用回数2回以内	三共アグロ(株) デューボン(株)

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 用 地 帯	適 用 土 壤	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	登録会社
インダノ ファン・ クロメブ ロップ・ ダイムロ ン・ベン スルフロ ンメチル 水和剤	ダイナマ ンDフロ アブル	(RS)-2-[2-(3- クロロフェニル)-2,3- エポキシプロピル]- 2-エチルヘキサン-1, 3-ジオール ・・・2.8% (RS)-2-(2,4- ジクロロ-5-トリオキ シ)プロピルエーテ ル ・・・7.0% 1-(α , α -ジメチ ルベンジル)-3- (パトリル)尿素 ・・・8.0% メチル- α -(4,6- ジメチルピリミジン -2-イルカルバモイルス ルファモイル)-オート ・・・1.0%	水 和 剤	移植水稻	水田一年 生雑草 マツバ イ オカ イ ワカ ミ ス カ ヤ ツ リ ヒル ム シ ロ (北 陸を除 く) セ リ ア ミ ト ロ ・ 藻類によ る表層は く離(北 陸を除 く)	北陸、 関東・東山 ・東海の普 通期及び 早期栽培 地帯 近畿・中国 ・四国の普 通期栽培 地帯	壤土～ 埴土	移植後5～ 15日 (/ヒ ² エ2.5 葉期まで)	500mL	原液湛水散 布 本剤の使用 回数1回 インダノファンを 含む農薬の 総使用回数2 回以内 クロメブ ロップ を 含む農薬の 総使用回数2 回以内 ダイムロンを 含む農薬の 総使用回数3回 以内(本田で は2回以内) ベンスルフロ ンメチル を含む農薬 の総使用回 数2回以内	日本農薬 ㈱ デューボン㈱
インダノ ファン・ ベンスル フロ ンメ チル 粒剤	クサスト ップ1キ ロ粒剤7 5	(RS)-2-[2-(3- クロロフェニル)-2,3- エポキシプロピル]- 2-エチルヘキサン-1, 3-ジオール ・・・1.5% メチル- α -(4,6- ジメチルピリミジン -2-イルカルバモイルス ルファモイル)-オート ・・・0.75%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草 マツバ イ オカ イ ヘ ラ モ タ カ ワ カ リ ワ ミ ス カ ヤ ツ リ (東北) セ リ ア ミ ト ロ ・ 藻類によ る表層は く離	北海道 東北	壤土～ 埴土	移植後5～ 20日 (/ヒ ² エ2.5 葉期まで) 移植後5～ 15日 (/ヒ ² エ2.5 葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用 回数1回 インダノファンを 含む農薬の 総使用回数2 回以内 ベンスルフロ ンメチル を含む農薬 の総使用回 数2回以内	日本農薬 ㈱ デューボン㈱
プレチラ クロール ・ベンゾ ビシクロ ン粒剤	クサコン トE 5袋 ジャンボ	2-クロロ-2',6'- ジエチル-N-(2-ブ ロムキシル)アミ ノ ・・・16.0% 3-(2-クロロ-4-メ チルベンジル)-2-ブ ロムオキシシクロ[3. 2.1]オクタン-2-エ ン-4-オール ・・・8.0%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草 マツバ イ オカ イ ミ ス カ ヤ ツ リ (北海道 を除く) ヘ ラ モ タ カ (北海道) ヒル ム シ ロ (北 海道、東 北、北陸、 九州)	北海道 東北、 北陸 関東・東山 ・東海の普 通期及び 早期栽培 地帯 近畿・中国 ・四国の普 通期及び 早期栽培 地帯 九州の普 通期栽培 地帯	壤土～ 埴土 砂壤土 ～埴土 壤土～ 埴土	移植後1～ 10日 (/ヒ ² エ1.5 葉期まで) 移植直後 ～10日 (/ヒ ² エ1.5 葉期まで) 移植後1～ 10日 (/ヒ ² エ1.5 葉期まで)	小包装 (パック) 5個 (250g)	水田に小包 装(パック)の まま投げ入 れる 本剤の使用 回数1回 プレチラクロールを 含む農薬の 総使用回数2 回以内 ベンゾビシクロ ンを含む農薬 の総使用回 数2回以内	三共アグロ ㈱ ㈱エス・デー ーエス・ハイ オテック

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
カフェンストロール・ダイムロン・プロモブチド・ペンシルフロノメチル粒剤	ラクダエプロ1キロ粒剤 75	N,N-ジエチル-3-メチルスルホニル-1H-1,2,4-トリアゾール-1-カルボキサミド ...3.0% 1-(α , α -ジメチルヘンシル)-3-(β -ラトリル)尿素 ...6.0% (RS)-2-プロモ-N-(α , α -ジメチルヘンシル)-3,3-ジメチルアミド ...6.0% メチル= α -(4,6-ジメトキシヒリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-オートルブート ...0.75%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草 マウバ オカライ ヘラモカ ミスガヤリ (東北) ウリカ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類による表層はく離	北海道 東北	壤土～埴土	移植後3～20日 (/ハエ2.5葉期まで) 移植後3～15日 (/ハエ2.5葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用回数1回 カフェンストロールを含む農薬の総使用回数1回 ダイムロンを含む農薬の総使用回数3回以内(本田では2回以内) プロモブチドを含む農薬の総使用回数1回 ペンシルフロノメチルを含む農薬の総使用回数2回以内	三共アグロ(株) デューボン(株)
カフェンストロール・ダイムロン・プロモブチド・ペンシルフロノメチル粒剤	ラクダエプロ1キロ粒剤 51	N,N-ジエチル-3-メチルスルホニル-1H-1,2,4-トリアゾール-1-カルボキサミド ...3.0% 1-(α , α -ジメチルヘンシル)-3-(β -ラトリル)尿素 ...6.0% (RS)-2-プロモ-N-(α , α -ジメチルヘンシル)-3,3-ジメチルアミド ...6.0% メチル= α -(4,6-ジメトキシヒリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-オートルブート ...0.51%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草 マウバ オカライ ヘラモカ ミスガヤリ ウリカ ヒルムシロ(関東・東山・東海,九州) セリ(関東・東山・東海を除く) アオミドロ・藻類による表層はく離(関東・東山・東海を除く)	北陸, 関東以西の普通期栽培地帯及び関東・東山・東海,九州の早期栽培地帯	壤土～埴土	移植後3～15日 (/ハエ2.5葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用回数1回 カフェンストロールを含む農薬の総使用回数1回 ダイムロンを含む農薬の総使用回数3回以内(本田では2回以内) プロモブチドを含む農薬の総使用回数1回 ペンシルフロノメチルを含む農薬の総使用回数2回以内	三共アグロ(株) デューボン(株)
オキサジクロメホン・ペンシルフロノメチル粒剤	ホームラン1キロ粒剤 75	3-[1-(3,5-ジクロロフェニル)-1-メチルエチル]-3,4-ジヒドロ-6-メチル-5-フェニル-2H-1,3-オキサジン-4-オン ...0.80% メチル= α -(4,6-ジメトキシヒリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-オートルブート ...0.75%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草 マウバ オカライ ヘラモカ ミスガヤリ ウリカ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類による表層はく離	東北	壤土～埴土	移植後5～15日 (/ハエ2.5葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用回数1回 オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数2回以内 ペンシルフロノメチルを含む農薬の総使用回数2回以内	北興化学工業(株) デューボン(株)
ドレクスレラモノセラス剤	タスマート	ドレクスレラ モノセラス MTB-951株の分生子 ...5×10 ⁷ 個/g		移植水稻	/ハエ	北海道, 東北, 北陸 関東・東山・東海, 近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	壤土～埴土	/ハエ1葉期～2葉期 /ハエ発生始期～/ハエ1.5葉期	包装① 500g 包装② 600g	湛水土壌散布	三井化学(株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用地帯	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
ベンゾビシクロン・ペントキサゾン水和剤	ブレッサフロアブル	3-(2-クロロ-4-メチルベンゾキシ)シクロ[3.2.1]オクタ-2-エン-4-オン ...3.9% 3-(4-クロロ-5-シクロペンチルオキシ)シクロ[3.2.1]オクタ-2-エン-4-オン ...3.9%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ オタカイ ミスガヤツリ ヘラオモダカ (九州) ウリカワ(近畿・中国・四国) ヒルムシロ(九州)	近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	九州の普通期及び早期栽培地帯	移植直後～移植後5日 (/ビエ)葉期まで) 移植直後～移植後10日 (/ビエ)1.5葉期まで)	500mL	原液湛水散布 本剤の使用回数1回 ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数2回以内 ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数2回以内	科研製薬(株) (株)エス・ディー・エス・ハイ オテック 北興化学工業(株)
インダノファン・ピラゾスルフロンエチル・ベンゾビシクロン粒剤	ボス1キログラム粒剤	(RS)-2-[2-(3-クロロフェニル)-2,3-エポキシプロピル]-2-エチルインカン-1,3-ジオン ...1.2% エチル=5-(4,6-ジメチルピリジン-2-イル)カルボモイルスルファイル)-1-メチルピラゾール-4-カルボキシラート ...0.30% 3-(2-クロロ-4-メチルベンゾキシ)シクロ[3.2.1]オクタ-2-エン-4-オン ...2.0%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ オタカイ ウリカワ ミスガヤツリ ヘラオモダカ (北海道を除く) (北海道) ヒルムシロ(北陸を除く) ゼリ アオミドロ・藻類による表層はく離(北陸を除く)	北海道	東北、北陸、関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯、近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	移植後5日～20日 (/ビエ)2.5葉期まで) 移植後5日～15日 (/ビエ)2.5葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用回数1回 インダノファンを含む農薬の総使用回数2回以内 ピラゾスルフロンエチルを含む農薬の総使用回数1回 ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数2回以内	日産化学工業(株) 日本農薬(株) (株)エス・ディー・エス・ハイ オテック 八洲化学工業(株)
インダノファン・クミルロン・ベンゾフェナップ粒剤	ラクリーンジャンボ	(RS)-2-[2-(3-クロロフェニル)-2,3-エポキシプロピル]-2-エチルインカン-1,3-ジオン ...2.0% 1-(2-クロロベンゾイル)-3-(1-メチル-1-フェニルエチル)ウレア ...20.0% 2-[4-(2,4-ジクロロメトキシ)フェニル]-1,3-ジメチルピラゾール-5-イルオキシ -4'-メチルアセトフェノン ...12.0%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ オタカイ ヘラオモダカ (北海道、東北) ミスガヤツリ (北海道を除く) ウリカワ(関東以西)	北海道、東北、北陸	関東・東山・東海、近畿・中国・四国、九州の普通期及び早期栽培地帯	移植後3日～10日 (/ビエ)1.5葉期まで)	小包装(パック) 10個(500g)	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる 本剤の使用回数1回 インダノファンを含む農薬の総使用回数2回以内 クミルロンを含む農薬の総使用回数2回以内 インダノファンを含む農薬の総使用回数1回	北興化学工業(株)
ペンタゾン粒剤	BASF バサグラ ン粒剤 (ナトリウム塩)	既登録薬剤に同じ									BASFアグロ(株)
ペンタゾン液剤	BASF バサグラ ン液剤 (ナトリウム塩)	既登録薬剤に同じ									BASFアグロ(株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用地帯	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
テニクロール・ベントキサゾン水和剤	スピンドロアブル	2-(4-クロロ-5-メチル-2-ピリジン-6-イル)メチルピリジン-2-イル ・・・2.9% 3-(4-クロロ-5-メチル-2-ピリジン-6-イル)メチルピリジン-2-イル ・・・2.9%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草 マツハイ ホタルイ(東北を除く) ミスガヤツリ(北海道、東北を除く) ヘラオモダカ(北海道)	北海道、東北、北陸、関東・東山・東海、近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	壤土～埴土	移植直後～移植後5日 (/ヒ・エ1葉期まで) 植代後～移植前4日又は移植直後～移植後5日 (/ヒ・エ1葉期まで)	500mL	原液湛水散布 本剤の使用回数1回 テニクロールを含む農薬の総使用回数2回以内 ベントキサゾンを含む農薬の総使用回数2回以内	科研製薬(株) 住化武田農薬(株)
オキサジアゾン・ピラゾスルフロンエチル・プロモブチド粒剤	キラ星1キログラム粒剤	5-ターシャリ-フル-3-(2,4-ジクロロ-5-イソプロポキシフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール-2(3H)-オン ・・・4.5% エチル=5-(4,6-ジメチルピリジン-2-イル)カルバモイルスルファモイル-1-メチルピリジン-4-カルボキシレート ・・・0.30% (RS)-2-プロモ-N-(α , α -ジメチルベンジル)-3,3-ジメチルブチルアミド ・・・6.0%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草 マツハイ ホタルイ ホタルイ ミスガヤツリ(東北) ヘラオモダカ(北海道) ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類による表層はく離	北海道東北	壤土～埴土	移植後3日～12日 (/ヒ・エ1.5葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用回数1回 オキサジアゾンを含む農薬の総使用回数1回 ピラゾスルフロンエチルを含む農薬の総使用回数1回 プロモブチドを含む農薬の総使用回数1回	日産化学工業(株)
インダノファン・クロメプロップ・ベンズスルフロンメチル粒剤	ダイナマンジャンボ	(RS)-2-[2-(3-クロロフェニル)-2,3-エポキシプロピル]-2-エチルインダン-1,3-ジオン ・・・2.8% (RS)-2-(2,4-ジクロロ-6-メトキシシ)プロピルオニオン ・・・7.0% メチル= α -(4,6-ジメチルピリジン-2-イル)カルバモイルスルファモイル-1-メチルピリジン-4-カルボキシレート ・・・1.5%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草 マツハイ ホタルイ ヘラオモダカ ミスガヤツリ(東北) ホタルイ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類による表層はく離	北海道東北	壤土～埴土	移植後5日～15日 (/ヒ・エ2.5葉期まで)	小包装(パック)10個(500g)	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる 本剤の使用回数1回 インダノファンを含む農薬の総使用回数2回以内 クロメプロップを含む農薬の総使用回数2回以内 ベンズスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内	日本農薬(株) デューン(株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
ダイムロン・ペントキサゾン粒剤	クサバンチ 1 キロ粒剤	1-(α , α -ジメチルペンチル)-3-(β -トリフルオロメチル)尿素 ...15.0% 3-(4-クロロ-5-シクロペンチルオキシ)-2-フルオロフェニル)-5-イソプロピルピリジン-1,3-ジオキサジン-2,4-ジオン ...2.0%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ オシロイ ミズカヤツリ (東北) ヘラオキガキ (北海道、東北、北陸)	東北	砂壤土～埴土 (減水深2cm/日以下)	植代後～移植前4日又は移植直後～移植後5日 (/ヒエ1葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用回数1回 ダイムロンを含む農薬の総使用回数3回以内(本田では2回以内) ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数2回以内	八洲化学工業㈱
						北陸	埴土～埴土 (減水深2cm/日以下)				
						北海道	砂壤土～埴土 (減水深2cm/日以下、但し砂壤土では減水深1.5cm/日以下)	移植直後～移植後5日 (/ヒエ1葉期まで)			
						関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯	埴土～埴土 (減水深2cm/日以下)				
						近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯	埴土～埴土 (減水深1cm/日以下)				
						九州の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～埴土 (減水深2cm/日以下)				

日本帰化植物写真図鑑

清水矩宏・森田弘彦・廣田伸七／編著 B6判 548頁 本体価格 4,300円

●帰化植物630余種を1,700余点のカラー写真で紹介。飼料作物畑の雑草害と対策も解説

ヒエという植物

本書は、ヒエの植物としての側面、農耕地の雑草としての側面、食料としての側面など、多面的にヒエを解説した。15人の専門家が分担執筆。

藪野友三郎／監修
山口 裕文／編集
A5判 208ページ
本体 3,500円

全国農村教育協会
<http://www.zennokyo.co.jp>

〒110-0016 東京都台東区台東1-26-6
TEL03-3833-1821 FAX03-3833-1665

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稻刈後・畑作・野菜作・永年生作物・非農耕地対象

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適地	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
DCMU 水和剤	ジウロン 水和剤	3-(3,4-ジクロロフェニル)-1,1-ジメチル尿素・・・80.0%	水和剤	陸稲	畑地一年生雑草	—	—	は種直後	60～100g 希釈水量 100L	全面土壌散布 本剤の使用回数1回 DCMUを含む農薬の総使用回数1回	大塚化学 株
				だいずあずき				は種直後～発芽前	70～100g 希釈水量 100L		
				らっかせい				は種直後	60～100g 希釈水量 100L		
				ばれいしよ				植付後～萌芽前	70～100g 希釈水量 100L		
				らっきょう				植付覆土後	60～100g 希釈水量 100L		
				さとうきび				植付覆土後又は培土後	100～150g 希釈水量 70～100L		
				麦(冬作)	ヤエムグラ			ヤエムグラ発芽揃期	60～70g 希釈水量 100L		
					畑地一年生雑草			雑草発生前	100～200g 希釈水量 100L		
				りんごなしもかきかんきつぶどうおうとううめ				雑草生育期	200～400g 希釈水量 100L	ノニ系展着剤を加えて雑草茎葉散布 本剤の使用回数1回 DCMUを含む農薬の総使用回数1回	
				あま(単作)				子葉展開期	60～80g 希釈水量 100L	全面土壌散布 本剤の使用回数1回	
				桑				雑草発生前	100～200g 希釈水量 100L	DCMUを含む農薬の総使用回数1回	
				公園、庭園、提とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面等	一年生雑草				60～200g 希釈水量 100L	全面土壌散布 本剤の使用回数3回以内 DCMUを含む農薬の総使用回数3回以内	
								雑草生育期	200～400g 希釈水量 100L	ノニ系展着剤を加えて雑草茎葉散布 本剤の使用回数3回以内 DCMUを含む農薬の総使用回数3回以内	

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 地 帯	適 土 壤	使用時期	10a 当り 使用量	使用方法	登録会社
I C P 乳 剤	プロバイ ド C E	イソプロピル-N-(3- クロロフェニル)カーバメー ト ・・・50.0%	乳 剤	日本芝	スズメノカタ ビラ			芝生育期 秋期雑草 発生前	300～400mL 希釈水量 200～300L	全面土壌散布 本剤の使用回 数2回以内 IPCを含む農 薬の総使用回 数2回以内	保土谷化 学工業㈱
								芝生育期 秋期雑草 発生始期 (スズメノカタ ビラ3葉期 以内)	400～800mL 希釈水量 200～300L		
イソウロ ン・DB N・DC MU粒剤	ワイドウ エイ E 粒 剤	3-(5-ターシャリブチ ル-3-イソキサゾリル) -1,1-ジメチル尿素 3-(3,4-ジクロロフェ ニル)-1,1-ジメチル 尿素 ・・・1.0% 2,6-ジクロロベンゾ ニトリル3-(3,4-ジクロ ロフェニル)-1,1-ジ メチル尿素 ・・・3.0% 3-(5-ターシャリブチ ル-3-イソキサゾリル) -1,1-ジメチル尿素 ・・・6.0%	粒 剤	公園 庭園 駐車場 道路 運動場 鉄道 宅地等	一年生雑 草及び多 年生広葉 雑草, スギナ	—	—	雑草発生 前～生育 初期	10～20kg	全面土壌散布 本剤の使用回 数3回以内 イソウロンを含む 農薬の総使用 回数3回以内 DBNを含む農 薬の総使用回 数3回以内 DDMUを含む農 薬の総使用回 数3回以内	㈱日本ケ ーシング カーテン
イソウロ ン・DB N・DC MU粒剤	ネコソギ エース A 粒剤	2,6-ジクロロベンゾ ニトリル ・・・1.0% 3-(3,4-ジクロロフェ ニル)-1,1-ジメチル 尿素 ・・・3.0% 3-(5-ターシャリブチ ル-3-イソキサゾリル) -1,1-ジメチル尿素 ・・・6.0%	粒 剤	公園 庭園 駐車場 道路 運動場 鉄道 宅地等	一年生雑 草及び多 年生広葉 雑草, スギナ	—	—	雑草発生 前～生育 初期	10～20kg	全面土壌散布 本剤の使用回 数3回以内 イソウロンを含む 農薬の総使用 回数3回以内 DBNを含む農 薬の総使用回 数3回以内 DDMUを含む農 薬の総使用回 数3回以内	レイボア薬 品㈱
イソウロ ン・DB N粒剤	ロニー粒 剤	3-(5-ターシャリブチ ル-3-イソキサゾリル) -1,1-ジメチル尿素 ・・・1.0% 2,6-ジクロロベンゾ ニトリル ・・・2.00%	粒 剤	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 鐵道等	一年生雑 草及び多 年生広葉 雑草, スギナ	—	—	雑草発生 前～生育 期	15～30kg	全面土壌散布 本剤の使用回 数3回以内 イソウロンを含む 農薬の総使用 回数3回以内 DBNを含む農 薬の総使用回 数3回以内	㈱日本ケ ーシング カーテン

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適地	用途	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
グリホサートカリウム塩液剤	タッチダウン i Q	カリウム-N-(ホスホノメチル)グリホサート ...43.0%	液剤	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 鉄道のり面等	一年生雑草	—	—	雑草生育期(草丈50cm以下)	250~500mL 希釈水量 25~50L	雑草茎葉散布 本剤の使用回数3回以内 グリホサートカリウム塩を含む農薬の総使用回数3回以内	シジエンタジャパン㈱
					多年生雑草				500~1000mL 希釈水量 25~50L		
テブチウロン・DBN粒剤	マスターI-V粒剤	1-(5-tert-ブチル-1,3,4-チアジアゾール-2-イル)-1,3-ジメチル尿素 ...0.80% 2,6-ジクロロベンゾニトリル ...2.00%	粒剤	公園 庭園 駐車場 道路 運動場 鉄道 宅地等	一年生雑草及び多年生広葉雑草, スギナ	—	—	雑草発生前~生育初期	15~30kg	全面土壌散布 本剤の使用回数3回以内 テブチロンを含む農薬の総使用回数3回以内 DBNを含む農薬の総使用回数3回以内	㈱日本ケミカル・カネーデン
テブチウロン・DBN・DDMU粒剤	マスターI-T粒剤	1-(5-tert-ブチル-1,3,4-チアジアゾール-2-イル)-1,3-ジメチル尿素 ...0.80% 2,6-ジクロロベンゾニトリル ...3.0% 3-(3,4-ジクロロフェニル)-1,1-ジメチル尿素 ...3.0% 3-(5-ターシャリブチル-3-イソキサゾリル)-1,1-ジメチル尿素 ...6.0%	粒剤	公園 庭園 駐車場 道路 運動場 鉄道 宅地等	一年生雑草	—	—	雑草発生前~生育初期	7.5~10kg	全面土壌散布 本剤の使用回数3回以内 テブチロンを含む農薬の総使用回数3回以内 DBNを含む農薬の総使用回数3回以内 DDMUを含む農薬の総使用回数3回以内	レイボ-薬品㈱
					一年生雑草及び多年生広葉雑草, スギナ				10~20kg		
メトリブジン・DBN・DDMU粒剤	ラーチH粒剤	4-アミノ-6-ターシャリブチル-3-(メチル)-1,2,4-トリアジン-5(4H)-オン ...0.7% 2,6-ジクロロベンゾニトリル ...3.0% 3-(3,4-ジクロロフェニル)-1,1-ジメチル尿素 ...5.0%	粒剤	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 鉄道等	一年生雑草及び多年生広葉雑草, スギナ	—	—	生育初期(草丈20cm以下)	10~20kg	全面土壌散布 本剤の使用回数2回以内 トリブジンを含む農薬の総使用回数2回以内 DBNを含む農薬の総使用回数3回以内 DDMUを含む農薬の総使用回数3回以内	レイボ-薬品㈱
メトリブジン・DBN・DDMU粒剤	ザッソノ粒剤	4-アミノ-6-ターシャリブチル-3-(メチル)-1,2,4-トリアジン-5(4H)-オン ...0.70% 2,6-ジクロロベンゾニトリル ...3.0% 3-(3,4-ジクロロフェニル)-1,1-ジメチル尿素 ...5.0%	粒剤	家の周りの有用な植物を植えない場所	一年生雑草及び多年生広葉雑草, スギナ	—	—	生育初期(草丈20cm以下)	10~20g/m ²	全面土壌散布 本剤の使用回数2回以内 トリブジンを含む農薬の総使用回数2回以内 DBNを含む農薬の総使用回数3回以内 DDMUを含む農薬の総使用回数3回以内	ハインクロップサイエンス㈱

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適地	適用	適土	適壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
メトリブジン・DBN・DDCMU 粒剤	クサノン DX 粒剤	4-アミノ-6-クサリ- ブチル-3-(メチルチオ) -1,2,4-トリアジン- 5(4H)-オン ・・・0.70% 2,6-ジクロロベンゾ ニトリル ・・・3.0% 3-(3,4-ジクロロフェ ニル)-1,1-ジメチル 尿素 ・・・5.0%	粒 剤	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 鉄道等	一年生雑 草及び多 年生広葉 雑草, スギナ	—	—	—	—	生育初期 (草丈20c m以下)	10～20kg	全面土壌散布 本剤の使用回 数2回以内 メトリブジンを含 む農薬の総使 用回数2回以 内 DBNを含む農 薬の総使用回 数3回以内 DDMUを含む農 薬の総使用回 数3回以内	住化タカ 園芸㈱
メトリブジン・DBN 粒剤	ラーチ粒 剤	4-アミノ-6-クサリ- ブチル-3-(メチルチオ) -1,2,4-トリアジン- 5(4H)-オン ・・・0.50% 2,6-ジクロロベンゾ ニトリル ・・・2.0%	粒 剤	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 鉄道等	一年生雑 草及び多 年生広葉 雑草, スギナ	—	—	—	—	生育初期 (草丈20c m以下)	15～30kg	全面土壌散布 本剤の使用回 数2回以内 メトリブジンを含 む農薬の総使 用回数2回以 内 DBNを含む農 薬の総使用回 数3回以内	㈱日本カ リーシアン ターゲッ ン
メトリブジン・DBN 粒剤	GF 草退 治 V 粒剤	4-アミノ-6-クサリ- ブチル-3-(メチルチオ) -1,2,4-トリアジン- 5(4H)-オン ・・・0.50% 2,6-ジクロロベンゾ ニトリル ・・・2.0%	粒 剤	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 鉄道等	一年生雑 草及び多 年生広葉 雑草, スギナ	—	—	—	—	生育初期 (草丈20c m以下)	15～30kg	全面土壌散布 本剤の使用回 数2回以内 メトリブジンを含 む農薬の総使 用回数2回以 内 DBNを含む農 薬の総使用回 数3回以内	住化タカ 園芸㈱
カフェン ストロー ル・レナ シル水和 剤	ウェーブ ル顆粒水 和剤	N,N-ジエチル-3-メ チルスルホニル-1H-1, 2,4-トリアジン-6- カルボキサミド ・・・45.0% 3-シクロヘキシル-5,6- トリメチレンウラシル ・・・25.0%	水 和 剤	日本芝	一年生雑 草	—	—	—	—	雑草発生 前～発生 初期(3葉 期まで) (芝生育 期)	200～400mL 希釈水量 200～300L	全面土壌散布 本剤の使用回 数2回以内 カフェンストロー ルを含む農薬の総 使用回数2回 以内 レナシルを含む農 薬の総使用回 数2回以内	タミヤ化学 工業㈱ ㈱理研カ リー
カルブチ レート・ DBN 粒 剤	シタガリ ンD	3-(3,3-ジメチルウレ イド)フェニル-3-メ チルカルバマート ・・・3.0% 2,6-ジクロロベンゾ ニトリル ・・・2.0%	粒 剤	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面 鉄道等	一年生雑 草及び多 年生広葉 雑草, スギナ	—	—	—	—	生育期 (草丈30c m以下)	10～20kg	全面土壌散布 本剤の使用回 数2回以内 カルブチレートを含 む農薬の総使 用回数2回以 内 DBNを含む農 薬の総使用回 数2回以内	㈱エス・イ ーエス バ イ オテック

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適地	用帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
MCPP 液剤	MCPP-AL シバキープAL	α -(2-メチル-4-クロロフェニル)プロピオン酸カリウム ・・・0.25%	液剤	日本芝 (こうらいしば)	畑地一年生広葉雑草	—	—	—	雑草生育期	100～200mL (原液散布)	雑草茎葉散布 本剤の使用回数3回以内	ニューファム(株)日本グリーンアクト・ガーデン・薬品(株)
				公園庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地のり面等	スギナ				雑草生育期(草丈30cm以下)	150～200mL (原液散布)	MCPPを含む農薬の総使用回数3回以内	
グリホサートイソプロピルアミン塩液剤	クサトローゼ	イソプロピル N-アミノエタノール N-(ホスホノメチル)グリホネート ・・・41.0%	液剤	公園庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 鉄道のり面等	一年生雑草	—	—	—	雑草生育期(草丈50cm以下)	500mL 希釈水量 100L	雑草茎葉散布 本剤の使用回数3回以内 グリホサートを含む農薬の総使用回数3回以内	(株)M&M
					多年生雑草				1000mL 希釈水量 100L			
					ススキ				生育期(草丈100cm以下)	1000～2000 mL 希釈水量 25～50L		
					スギナ				生育期(草丈20cm程度)	2000mL 希釈水量 25～50L		
イマザビル剤	ケイビンエース	イソプロピル N-アミノエタノール N-(RS)-2-(4-イソプロピル-4-メチル-5-オキソ-2-イミダゾリル-2-イル)ニコチネート ・・・10本当り 100mg	—	すぎ・ひのき (下刈り代用) 造林地	クサ	—	—	—	萌芽期～生育期	1株当り1～3本	クサの根本、又はなるべく根元に近い茎にあらかじめ本剤を差し込むために適当な穴をあけ、本剤を薬の露出部全部が隠れるよう差し込む。	(株)日本グリーンアクト・ガーデン
				公園庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地のり面等							クサの根本、又はなるべく根元に近い茎にあらかじめ本剤を差し込むために適当な穴をあけ、本剤を薬の露出部全部が隠れるよう差し込む。 本剤の使用回数1回 イマザビルを含む農薬の総使用回数1回	
プロマシル粒剤	ネコソギトップ	5-プロモ-3-セコンタリ-プロチル-6-メチルウラシル ・・・5.0%	粒剤	鉄道敷 運動場 道路 駐車場 宅地 畜舎敷地 工場敷地等	一年生雑草	—	—	—	雑草発生前～生育期	5～15g/㎡	全面均一散布 本剤の使用回数1回	レインボ-薬品(株)
					多年生雑草					15g/㎡	プロマシルを含む農薬の総使用回数1回	

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 地	用 荷	適 土	用 壤	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	登録会社
プロマシ ル粒剤	クサダウ ンフォル テ	5-フ'ロモ-3-セコンダ リ-フ'チル-6-メチルウ シ ...41.0%	粒 剤	鉄道敷 運動場 道路 駐車場 宅地 畜舎敷地 工場敷地 等	一年生雑 草	—	—	—	—	雑草発生 前～生育 期	5～15g/㎡	全面均一散布	北興産業 ㈱
					多年生雑 草						15g/㎡	本剤の使用回 数1回 フ'ロマシ ルを含む 農薬の総使用 回数1回	
グリホサ ートイソ プロピル アミン塩 液剤	グリホキ ング	イソフ'ロピ'ルアンモニウ ム=N-(ホスホ'リチル)グ リシナート ...41.0%	液 剤	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 鉄道の り面等	一年生雑 草	—	—	—	—	雑草生育 期(草丈5 0cm以下)	500mL	雑草茎葉散布	㈱シンス イ
					多年生広 葉雑草						希釈水量 100L	本剤の使用回 数3回以内	
					スギ						1000mL	グリホサートを含 む農薬の総使用 回数3回以 内	
					スギナ						希釈水量 100L		
グリホサ ートイソ プロピル アミン塩 液剤	キャピタ ルグリホ サート 41%	イソフ'ロピ'ルアンモニウ ム=N-(ホスホ'リチル)グ リシナート ...41.0%	液 剤	水田畦畔	一年生雑 草	—	—	—	—	雑草生育 期(草丈3 0cm以下 但し収穫 14日前ま で)	250～500mL	雑草茎葉散布	㈱キャ'タル ・イ'チ・マル・ロ ク
					多年生雑 草						希釈水量 通常散布 100L 少量散布 25L	本剤の使用回 数2回以内 グリホサートを含 む農薬の総使用 回数2回以 内	
				水田耕起 前	一年生雑 草					雑草生育 期(耕起2 0～10前)	500～1000m L	希釈水量 通常散布 100L 少量散布 25L	
					休耕田						250～500mL	雑草茎葉散布	
											希釈水量 100L	本剤の使用回 数1回 グリホサートを含 む農薬の総使用 回数1回	
										雑草生育 期(草丈5 0cm以下)		雑草茎葉散布	
												本剤の使用回 数2回以内 グリホサートを含 む農薬の総使用 回数2回以 内	

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適地	適用帯	適用壌	使用時期	10 a 当り使用量	使用方法	登録会社
グリホサートイソプロピルアミン塩液剤 つづき	キャピタルグリホサート41% つづき	イソプロピルアミンモリムリン酸塩(N-メチル)グリホサート・・・41.0%	液剤	りんご なし かき ぶどう もも	一年生雑草	—	—	—	雑草生育期(草丈30cm以下 但し収穫7日前まで)	250～500mL 希釈水量 通常散布 50～100L 少量散布 25～50L	雑草茎葉散布 本剤の使用回数3回以内 グリホサートを含む農薬の総使用回数3回以内	
					多年生雑草				500～1000mL 希釈水量 通常散布 50～100L 少量散布 25～50L			
				だいず	畑地一年生雑草				雑草生育期(草丈30cm以下 は種後出芽前まで)	250～500mL 希釈水量 通常散布 50～100L 少量散布 25～50L	雑草茎葉散布 本剤の使用回数1回 グリホサートを含む農薬の総使用回数1回	
									雑草生育期但し耕起7日前まで	250～500mL 希釈水量 100L		
									ねぎ	雑草生育期(草丈30cm以下 但し収穫7日前まで)		
					雑草生育期(草丈30cm以下) 畦間処理(収穫30日前まで)						雑草茎葉散布 本剤の使用回数2回以内 グリホサートを含む農薬の総使用回数3回以内	
				公園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 鉄道のり面等	一年生雑草				雑草生育期	500mL 希釈水量 通常散布 100L 少量散布 25L	雑草茎葉散布 本剤の使用回数3回以内 グリホサートを含む農薬の総使用回数3回以内	
					多年生雑草				1000mL 希釈水量 通常散布 100L 少量散布 25L			
					スギナ				生育盛期	2000mL 希釈水量 少量散布 25～50L		

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
グリホサートイソプロピルアミン塩液剤 つづき	キャピタルグリホサート41% つづき	イソプロピルアミン塩 =N-(ホスホノメチル)グリホサート ...41.0%	液剤	林地	クス	—	—	春期又は秋期	1株当たり1~2mL 原液又は2倍液	株頭注入処理	
					落葉雑かん木			5~10月	1カ所当たり1mL 樹径10cm以下: 2~3カ所 樹径10~20cm以下: 4~8カ所 樹径20cm以上: 10カ所	立木注入処理	
イマザビル・グリホサートイソプロピルアミン塩液剤	リプロ液剤	イソプロピルアミン塩 =(RS)-2-(4-イソプロピル-4-メチル-5-オキソ-2-イミダゾリル-2-イル)ニコチナート ...8.0% イソプロピルアミン塩 =N-(ホスホノメチル)グリホサート ...21.0%	液剤	鉄道敷工場敷地(タンクヤード等) 駐車場等	一年生雑草及び多年生雑草	—	—	雑草生育期(草丈30cm以下)	1~2L 希釈水量100L	雑草茎葉散布 本剤の使用回数2回以内 イマザビルを含む農薬の総使用回数2回以内	BASF770 株
					スギナ				2L 希釈水量100L	グリホサートを含む農薬の総使用回数3回以内	
ベスロジン粒剤	家庭園芸用バナフィン粒剤2.5	N-プロピル-N-エチル- α, α -トリフルオロ-2,6-ジニトロ-4-プロピルベンゼン ...2.5%	粒剤	日本芝 西洋芝(ペンタグラース、ブルーグラス)	一年生イネ雑草	—	—	秋冬の雑草発生前	7~10kg	散布 本剤の使用回数2回以内	北興産業 株
								春夏の雑草発生前	10~16kg	ベスロジンを含む農薬の総使用回数2回以内	
グリホサートイソプロピルアミン塩液剤	草退治シヤワー	イソプロピルアミン塩 =N-(ホスホノメチル)グリホサート ...1.0%	液剤	公園庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地のり面等	一年生雑草	—	—	雑草生育期(草丈30cm以下)	25~40L (原液散布)	雑草茎葉散布 本剤の使用回数3回以内 グリホサートを含む農薬の総使用回数3回以内	住化タタ 園芸 株
ターバシル・DBN粒剤	グラスジャックス粒剤	2,6-ジクロロベンゾニトリル ...2.0% 3-ターシャリブチル-5-クロロ-6-メチルウラシル ...3.0%	粒剤	公園庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 鉄道等	一年生雑草 多年生広葉雑草(セイタカアワダチソウを除く) スギナ	—	—	生育初期(草丈20cm以下)	10~20kg	全面土壌散布 本剤の使用回数1回 ターバシルを含む農薬の総使用回数1回 DBNを含む農薬の総使用回数3回以内	株日本タタリー・アグロ・デデン
グリホサートナトリウム塩・テトラビオン液剤	フレビオン液剤	2,2,3,3-テトラフルオロプロピルオキシ酸ナトリウム ...20.0% ナトリウム-N-(ホスホノメチル)グリホサート ...13.5%	液剤	公園庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地のり面 鉄道等	多年生雑草(スギナを除く)	—	—	雑草生育初期(草丈50~100cm)	1~3L 希釈水量100L	雑草茎葉散布 本剤の使用回数2回以内 グリホサートを含む農薬の総使用回数3回以内 テトラビオンを含む農薬の総使用回数2回以内	三共770 株