

新 登 録 除 草 剤 一 覧

農林水産省消費・安全局農産安全管理課
平成16年6月1日～平成16年10月30日

(1) 移植水稻

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 用 地 帯	適 用 土 壤	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	登録会社
ジメタメ トリン・ ピラゾレ ート・ブ レチラク ロール・ プロモブ チド粒剤	クサトッ タ1キロ 粒剤	2-メチルチオ-4-エチル アミノ-6-(1,2-ジ メチルプロピルアミノ) -s-トリアジン ・・・0.60% 4-(2,4-ジクロロ ペンシル)-1,3- ジメチル-5-ヒドロ キシル-プロピルエンスルホネ ート ・・・12.0% 2-クロロ-2',6'- ジエチル-N-(2-ブ ロモキシエチル)アセトア ニリド ・・・4.5% (RS)-2-ブプロモ-N -(α , α -ジメチル ペンシル)-3,3- ジメチルプロピルアミド ・・・6.0%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草 マツバイ オキライ ウリカワ ミスガヤツリ ヘラオモダカ (東北) ヒルムシロ(北 陸を除 く) ササ(近畿・ 中国・四 国) アオミドロ・ 藻類によ る表層は く離	全域(北 海道を除 く)の普 通期及び 早期栽培 地帯	砂壤土 ～埴土	移植直後 ～移植後1 0日 (/ヒト2葉 期まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用 回数1回 ジメタメリンを 含む農薬の 総使用回数2 回以内 ピラゾレート を含む農薬の 総使用回数1 回 ブレチラロール を含む農薬の 総使用回数2 回以内 ブプロモチド を含む農薬の 総使用回数1 回	九州三共 興
ジメタメ トリン・ ピラゾレ ート・ブ レチラク ロール・ プロモブ チド粒剤	クサトッ タ1キロ 粒剤	2-メチルチオ-4-エチル アミノ-6-(1,2-ジ メチルプロピルアミノ) -s-トリアジン ・・・0.20% 4-(2,4-ジクロロ ペンシル)-1,3- ジメチル-5-ヒドロ キシル-プロピルエンスルホネ ート ・・・4.0% 2-クロロ-2',6'- ジエチル-N-(2-ブ ロモキシエチル)アセトア ニリド ・・・1.5% (RS)-2-ブプロモ-N -(α , α -ジメチル ペンシル)-3,3- ジメチルプロピルアミド ・・・2.0%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草 マツバイ オキライ ウリカワ ミスガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ(東 北,北陸 及び関東 以西の普 通期栽培 地帯) アオミドロ・ 藻類によ る表層は く離	東北, 北陸, 関東・東山 ・東海の普 通期及び 早期栽培 地帯	壤土～ 埴土 (減水深 2cm/日 以下)	移植直後 ～移植後1 0日 (/ヒト2葉 期まで)	3kg	湛水散布 本剤の使用 回数1回 ジメタメリンを 含む農薬の 総使用回数2 回以内 ピラゾレート を含む農薬の 総使用回数1 回 ブレチラロール を含む農薬の 総使用回数2 回以内 ブプロモチド を含む農薬の 総使用回数1 回	九州三共 興
						近畿以西 の普通期 及び早期 栽培地帯	埴土～ 埴土 (減水深 1.5cm/ 日以下)				

(1) 移植水稻 つづき

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
カフェンストロー ル・ダイ ムロン・ ベンスル フロシメ チル水和 剤	クサトリ エース L フロアブ ル	N, N-ジエチル-3-メ チルスルホニル-1H- 1, 2, 4-トリアゾール -1-カルボキシミド ・・・5.5% 1-(α , α -ジメチ ルベンジリル)-3- (パラトリル)尿素 ・・・10.0% メチル- α -(4, 6- ジメトキシピリミジン -2-イルカルボモイルス ルファモイル)-オートメ ト ・・・1.0%	水和 剤	移植水稻	水田一年 生雑草 マツバ イ オタ イ ウリ カ ミズ ガ ヤ ツ ヒル ム シ ロ オモ カ ク ロ ク ワ イ (北陸を 除く) セ リ コ ウ キ ヤ ラ (九州の 普通期栽 培地帯) ア オ ミ ト ロ ・ 藻類によ る表層は く離	北陸、関東 ・東山・東 海の普通 期栽培地 帯	砂壤土 ～埴土 (減水深 2cm/日 以下)	移植後3～ 15日まで (/ビエ2.5 期まで)	500mL	原液湛水散 布又は水口 施用 本剤の使用 回数1回 カフェンスト ロールを含 む農薬の総 使用回数1 回 タ イ ム ロ ン を 含 む 農 薬 の 総 使用回数3回 以内(本田期 は2回以内) ベ ン ス ル フ ロ シ メ チ ル を 含 む 農 薬 の 総 使用回 数2回以内	三共アグロ ㈱
						関東・東山 ・東海の早 期栽培地 帯	砂壤土 ～埴土 (減水深 1cm/日 以下)				
						近畿・中国 ・四国の早 期栽培地 帯	砂壤土 ～埴土 (減水深 1cm/日 以下)				
						近畿・中国 ・四国の普 通期栽培 地帯	砂壤土 ～埴土 (減水深 1.5cm/ 日以下)				
						九州の普 通期及び 早期栽培 地帯	砂壤土 ～埴土 (減水深 2cm/日 以下)				
						北陸	砂壤土 ～埴土				
				直播水稻	水田一年 生雑草 マツバ イ オタ イ ミズ ガ ヤ ツ	関東・東山 ・東海、 近畿・中国 ・四国	埴土～ 埴土	湛水直播 の稲1.5葉 期～/ビエ 2.5葉期ま で(但し、 収穫90日 前まで)	1kg		
						北陸	砂壤土 ～埴土	移植後5～ 15日 (/ビエ2.5 葉期まで)			
カフェン ストロー ル・ダイ ムロン・ ベンスル フロシメ チル粒剤	クサトリ エース 1 キロ粒剤 51	N, N-ジエチル-3-メ チルスルホニル-1H- 1, 2, 4-トリアゾール -1-カルボキシミド ・・・3.0% 1-(α , α -ジメチ ルベンジリル)-3- (パラトリル)尿素 ・・・6.0% メチル- α -(4, 6- ジメトキシピリミジン -2-イルカルボモイルス ルファモイル)-オートメ ト ・・・0.51%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草 マツバ イ オタ イ ウリ カ ミズ ガ ヤ ツ ヒル ム シ ロ オモ カ ク ロ ク ワ イ (関東・東 山・東 海、九 州) コ ウ キ ヤ ラ (九州) ア オ ミ ト ロ ・ 藻類によ る表層は く離	北陸 関東以西 の普通期 及び早期 栽培地帯	砂壤土 ～埴土	移植後5～ 15日 (/ビエ2.5 葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用 回数1回 カフェンスト ロールを含 む農薬の総 使用回数1 回 タ イ ム ロ ン を 含 む 農 薬 の 総 使用回数3回 以内(本田期 は2回以内) ベ ン ス ル フ ロ シ メ チ ル を 含 む 農 薬 の 総 使用回 数2回以内	三共アグロ ㈱

(1) 移植水稻 つづき

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	登録会社
シハロホ ップブチ ル・ピラ ゾスルフ ロンエチ ル・フェ ントラザ ミド粒剤	トリプル スター 1 キロ粒剤	ブチル(R)-2-[4- -(4-シアノ-2-フル ロフェニル)フェニル] プロピオン酸 ・・・1.5% エチル=5-(4,6-ジ メトキシ)リジン-2- -イソカルバモイルス テロイド)-1-メチルピ ラゾール-4-カルボキ シレート ・・・0.30% 4-(2-クロロフェニル) -N-シクロヘキシル-N- エチル-4,5-ジメチ ル-5-オキソ-1H-テ トラゾール-1-カルボキ サミド ・・・2.0%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草 マツバ イ ネグサ ス ミ ス ガ キ ツ リ ミ ス ガ キ ツ リ (北海道を除く) の普通 期及び 早期栽 培地帯 ヒメシロ(北 陸を除く) セリ(北陸 を除く) アミト ロ・ 藻類によ る表層は く離(北 陸、関東 ・東山・東 海を除く)	北海道	壤土～ 埴土	移植後5～ 25日 (/ヒエ3葉 期まで) 移植後5～ 20日 (/ヒエ3葉 期まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用 回数1回 シハロホップ・ブチル を含む農薬 の総使用回数3 回以内 ピラゾスルフロンエ チルを含む農 薬の総使用 回数1回 フェントラザミド を含む農薬 の総使用回数1 回	日産化学 ㈱ タケウケミカル 日本㈱
オキサジ クロメホ ン・クロ メブロッ プ・シク ロスルフ アムロン 粒剤	草仁ジャ ンボ	3-[1-(3,5-ジ クロロフェニル)-1-メチル エチル]-3,4-ジ メチル-5-フ ェニル-2H-1,3-オ キサジン-4-オン ・・・2.0% (RS)-2-(2,4- ジクロロ-6-トリ フルオロメチル フェニル)プロ ピオン酸 ・・・14.0% 1-[2-(シクロ プロピル)カル ボキシル]ア ニリン ・・・3.4% 6-ジメトキシ リジン-2-イソ カルバモイル 尿素 ・・・1.8%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草 マツバ イ ネグサ ス ミ ス ガ キ ツ リ ミ ス ガ キ ツ リ (北海道を除く) の普通 期及び 早期栽 培地帯 ヒメシロ(北 陸を除く) セリ(北陸 を除く) アミト ロ・ 藻類によ る表層は く離(北 陸、関東 ・東山・東 海を除く)	関東・東山 ・東海の普 通期及び 早期栽培 地帯	砂壤土 ～埴土	移植後1～ 15日 (/ヒエ2葉 期まで)	10個 (250g)	水田に小包 装(パック)の まま投げ入 れる 本剤の使用 回数1回 オキサジクロ メホンを含む 農薬の総使用 回数2回以内 クロメブロッ プを含む農薬 の総使用回数 2回以内 シクロスルフ アムロンを含 む農薬の総使 用回数1回	BASFファ ルマ ㈱ 全国農業 協同組合 連合会
オキサジ クロメホ ン・クロ メブロッ プ・ダイ ムロン・ ベンスル フロンメ チル粒剤	ホクコー ミスター ホームラ ンD L ジャンボ	3-[1-(3,5-ジ クロロフェニル)-1-メチル エチル]-3,4-ジ メチル-5-フ ェニル-2H-1,3-オ キサジン-4-オン ・・・1.2% (RS)-2-(2,4- ジクロロ-6-トリ フルオロメチル フェニル)プロ ピオン酸 ・・・7.0% 1-(α,α-ジ メチル-β- ヒドロキシ)エ チル)-3-(パラトリル)尿 素 ・・・9.0% メチル=α-(4,6- ジメトキシ)リ ジン-2-イソカ ルバモイルス テロイド)-1- メチルピラ ゾール-4-カル ボキシレート ・・・1.02%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草 マツバ イ ネグサ ス ミ ス ガ キ ツ リ ミ ス ガ キ ツ リ (北海道を除く) の普通 期及び 早期栽 培地帯 ヒメシロ(北 陸を除く) セリ(北陸 を除く) アミト ロ・ 藻類によ る表層は く離(九 州)	北陸 関東・東山 ・東海、近 畿・中国・ 四国の普 通期及び 早期栽培 地帯 九州の早 期及び普 通期栽培 地帯	壤土～ 埴土 砂壤土 ～埴土 壤土～ 埴土	移植後～3 ～10日 (/ヒエ2葉 期まで)	10個 (500g)	水田に小包 装(パック)の まま投げ入 れる 本剤の使用 回数1回 オキサジクロ メホンを含む 農薬の総使用 回数2回以内 クロメブロッ プを含む農薬 の総使用回数 2回以内 ダイムロンを 含む農薬の総 使用回数3回 以内(本田期 は2回以内) ベンスルフ ロンメチルを 含む農薬の総 使用回数2回 以内	北興化学 工業㈱ デューン ㈱ 全国農業 協同組合 連合会

(1) 移植水稻 つづき

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
クロメブロップ・テニクロール・ベンゾビシクロン水和剤	草若丸フロアブル	(RS)-2-(2,4-ジクロロ-m-トリルキシ)プロピオンエリト ・・・5.7%	水和剤	移植水稻	一年生広葉雑草 マツバ オカ ワカ (九州を除く) ミズガヤ (北海道を除く) ヘオモダカ (北海道、東北、九州)	北海道	壤土～埴土	移植後3～20日 (/ヒ ² 2.5 葉期まで)	500mL	原液湛水散布 本剤の使用回数1回 クロメブロップを含む農薬の総使用回数2回以内 テニクロールを含む農薬の総使用回数2回以内 ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数2回以内	八洲化学工業(株)
		2-クロロ-N-(3-メチル-2-ピリジル)-2',6'-ジメチルアセト ・・・4.8%				東北、北陸		移植後3～15日 (/ヒ ² 2.5 葉期まで)			
		3-(2-クロロ-4-メチルペンゾイ)ル-2-フェニルチオピシクロン[3.2.1]オクタ-2-エン-4-オン ・・・3.8%				関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～埴土	移植後3～15日 (/ヒ ² 2.5 葉期まで)			
						近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	壤土～埴土				
カフエンストロール・ベンゾビシクロン水和剤	テロスフロアブル	N,N-ジエチル-3-メチルピリミジン-1H-1,2,4-トリアゾール-1-カルボキサミド ・・・4.2%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草 マツバ オカ ワカ (北海道を除く) ヒルムシロ ヘオモダカ (北海道、東北)	北海道、東北	壤土～埴土	移植後3～15日 (/ヒ ² 2.5 葉期まで)	500mL	原液湛水散布 本剤の使用回数1回 カフエンストロールを含む農薬の総使用回数1回 ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数2回以内	タミヤ化学工業(株) (株)エス・ディ ー・エス・バイ オテック
		3-(2-クロロ-4-メチルペンゾイ)ル-2-フェニルチオピシクロン[3.2.1]オクタ-2-エン-4-オン ・・・4.0%				北陸、関東以西(近畿・中国・四国を除く)の普通期及び早期栽培地帯		移植後3～12日 (/ヒ ² 2.5 葉期まで)			
						近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	砂壤土～埴土				
カフエンストロール・ベンゾスルフロメチル・ベンゾビシクロン水和剤	テラガードフロアブル	N,N-ジエチル-3-メチルピリミジン-1H-1,2,4-トリアゾール-1-カルボキサミド ・・・6.0%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草 マツバ オカ ワカ ミズガヤ (東北) ヘオモダカ (北海道) ヒルムシロ ゼリ アオミドロ・藻類による表層はく離	北海道	壤土～埴土	移植後5～20日 (/ヒ ² 2.5 葉期まで)	500mL	原液湛水散布 本剤の使用回数1回 カフエンストロールを含む農薬の総使用回数1回 ベンゾスルフロメチルを含む農薬の総使用回数2回以内 ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数2回以内	タミヤ化学工業(株) (株)エス・ディ ー・エス・バイ オテック
		メチル=α-(4,6-ジメチルピリジン-2-イルカバモイルスルファモイル)-オート ・・・1.5%				東北		移植後5～15日 (/ヒ ² 2.5 葉期まで)			

(1) 移植水稻 つづき

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
カフェンストロール・ベンズスルフロンメチル・ベンゾビシクロン水和剤	テラガードLフロアブル	N,N-ジエチル-3-メチル-5-ヒドロキシ-1H-1,2,4-トリアジン-6-イル-4-カルボキシミド ・・・4.2% メチル-α-(4,6-ジメチル-2-ピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-オトリアート ・・・1.0% 3-(2-クロロ-4-メチルベンゾイル)-2-フェニルチオピリジン[3,2,1]オクタ-2-エン-4-オン ・・・4.0%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草 マツバ オカキ ウリカ ミズカヤツリ ヒルシロ セリ アオミドロ・藻類による表層はく離(近畿・中国・四国・九州)	北陸、関東以西(九州を除く)の普通期及び早期栽培地帯 九州の普通期及び早期栽培地帯	壤土～埴土 砂壤土～埴土	移植後3～15日 (/ヒ ² エ2.5薬期まで)	500mL	原液湛水散布 本剤の使用回数1回 カフェンストロールを含む農薬の総使用回数1回 ベンズスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内 ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数2回以内	クマヰイ化学工業㈱ ㈱エス・ディ ーエス・ハ イ テック
ピラゾスルフロンエチル・フェントラザミド・ベンゾビシクロン粒剤	ダブルスターSBジャンボ	エチル-5-(4,6-ジメチル-2-ピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-1-メチルピラゾール-4-カルボキシミド ・・・0.70% 4-(2-クロロフェニル)-N-シクロヘキシル-N-エチル-4,5-ジヒドロ-5-オキソ-1H-テトラゾール-1-カルボキシミド ・・・6.7% 3-(2-クロロ-4-メチルベンゾイル)-2-フェニルチオピリジン[3,2,1]オクタ-2-エン-4-オン ・・・6.7%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草 マツバ オカキ ウリカ ミズカヤツリ (北海道を除く) ヘラモタカ(北海道、東北) ヒルシロ セリ アオミドロ・藻類による表層はく離(北海道を除く)	北海道 東北、北陸 関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯	壤土～埴土	移植後1～20日 (/ヒ ² エ2.5薬期まで) 移植後1～15日 (/ヒ ² エ2.5薬期まで) 移植後1～12日 (/ヒ ² エ2.5薬期まで)	10個(300g)	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる 本剤の使用回数1回 ピラゾスルフロンエチルを含む農薬の総使用回数1回 フェントラザミドを含む農薬の総使用回数1回 ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数2回以内	日産化学工業㈱ ハイクロップサイエンス㈱
ピラゾスルフロンエチル・フェントラザミド・ベンゾビシクロン粒剤	ダブルスターSB1キログラム粒剤	エチル-5-(4,6-ジメチル-2-ピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-1-メチルピラゾール-4-カルボキシミド ・・・0.30% 4-(2-クロロフェニル)-N-シクロヘキシル-N-エチル-4,5-ジヒドロ-5-オキソ-1H-テトラゾール-1-カルボキシミド ・・・3.0% 3-(2-クロロ-4-メチルベンゾイル)-2-フェニルチオピリジン[3,2,1]オクタ-2-エン-4-オン ・・・2.0%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草 マツバ オカキ ウリカ ミズカヤツリ (北海道を除く) ヘラモタカ(北海道、東北) ヒルシロ セリ (北陸を除く) アオミドロ・藻類による表層はく離(北海道、東北、九州)	北海道 東北 北陸、関東以西の普通期栽培地帯、 関東・東山・東海及び九州の早期栽培地帯	壤土～埴土	移植後5～20日 (/ヒ ² エ2.5薬期まで) 移植直後～15日 (/ヒ ² エ2.5薬期まで) 移植後5～15日 (/ヒ ² エ2.5薬期まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用回数1回 ピラゾスルフロンエチルを含む農薬の総使用回数1回 フェントラザミドを含む農薬の総使用回数1回 ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数2回以内	日産化学工業㈱ ハイクロップサイエンス㈱

(1) 移植水稻 つづき

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 用 地 帯	適 用 土 壤	使用時期	10a 当り 使用量	使用方法	登録会社
ピリミノ バックメ チル・ブ ロモブチ ド・ベン スルフロ ンメチル ・ベント キサゾン 粒剤	トップガ ンGT1 キロ粒剤 75	メチル=2-(4,6-ジ メトキシ)リジン-2 -イルオキシ)-6-(1- メトキシメチル)ペ ンゾエート ...0.45% (RS)-2-プロモ-N -(α , α -ジメチル ペンゾル)-3,3- ジメチルプロピルアミ ド ...9.0% メチル= α -(4,6- ジメトキシ)リジン -2-イルカルバモイルス ルファモイル)-オート ...0.75% 3-(4-クロロ-5-シ クロペンチルオキシ-2-フ ルオロフェニル)-5-イソ プロピルピリジン-1,3 -オキサゾリジン-2, 4-ジオン ...2.0%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草 マツハイ オタカイ ウリカワ ミスガヤツリ (東北) ヒルムシロ セリ ヘラモダカ アオミドロ・ 藻類によ る表層は く離	北海道	壤土～ 埴土	移植後3～ 25日 (ノビエ3葉 期まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用 回数1回 ピリミノバック メチルを含む農 薬の総使用 回数2回以内 プロモブチドを 含む農薬の 総使用回数1 回 ベンスルフロ ンメチルを 含む農薬 の総使用回 数2回以内 ベントキサゾン を含む農薬の 総使用回数2 回以内	クマイ化学 工業㈱ 科研製薬 ㈱ デューボン㈱
						東北		移植後3～ 20日 (ノビエ3葉 期まで)			
ピリミノ バックメ チル・ブ ロモブチ ド・ベン スルフロ ンメチル ・ベント キサゾン 粒剤	トップガ ンGT1 キロ粒剤 51	メチル=2-(4,6-ジ メトキシ)リジン-2 -イルオキシ)-6-(1- メトキシメチル)ペ ンゾエート ...0.45% (RS)-2-プロモ-N -(α , α -ジメチル ペンゾル)-3,3- ジメチルプロピルアミ ド ...9.0% メチル= α -(4,6- ジメトキシ)リジン -2-イルカルバモイルス ルファモイル)-オート ...0.51% 3-(4-クロロ-5-シ クロペンチルオキシ-2-フ ルオロフェニル)-5-イソ プロピルピリジン-1,3 -オキサゾリジン-2, 4-ジオン ...2.0%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草 マツハイ オタカイ ウリカワ ミスガヤツリ ヒルムシロ セリ アオミドロ・ 藻類によ る表層は く離	北陸、 関東・東山 ・東海の普 通期及び 早期栽培 地帯	壤土～ 埴土	移植後3～ 20日 (ノビエ3葉 期まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用 回数1回 ピリミノバック メチルを含む農 薬の総使用 回数2回以内 プロモブチドを 含む農薬の 総使用回数1 回 ベンスルフロ ンメチルを 含む農薬 の総使用回 数2回以内 ベントキサゾン を含む農薬の 総使用回数2 回以内	クマイ化学 工業㈱ 科研製薬 ㈱ デューボン㈱
						近畿・中国 ・四国の普 通期及び 早期栽培 地帯					
						九州の普 通期及び 早期栽培 地帯	砂壤土 ～埴土	移植後3～ 17日 (ノビエ3葉 期まで)			

(1) 移植水稻 つづき

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
ピリミノバックメチル・プロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペントキサゾン剤	トップガンシジャンボ	メチル-2-(4,6-ジメトキシピリジン-2-イル)オキシ-6-(1-メトキシイミノエチル)ペンゾエート ...1.8% (RS)-2-プロモ-N-(α , α -ジメチルペンシル)-3,3-ジメチルプロピルアミド ...36.0% メチル- α -(4,6-ジメトキシピリジン-2-イル)カルバモイルスルファモイル)-オートレート ...3.0% 3-(4-クロロ-5-シクロペンチル)オキシ-2-フルオロフェニル)-5-イソプロピルピリジン-1,3-オキサゾールピリジン-2,4-ジエー ...8.0%		移植水稻	水田一年生雑草 マツバ オタカイ ウリカワ ミズガヤツリ(東北) ヘオモガカ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類による表層はく離	北海道	壤土～埴土	移植後3～20日 (/ヒ)2.5 葉期まで)	10個 (250g)	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる	クマイ化学工業㈱ 科研製薬㈱ デュボン㈱
						東北	砂壤土～埴土	移植後3～15日 (/ヒ)2.5 葉期まで)		本剤の使用回数1回 ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数2回以内 プロモブチドを含む農薬の総使用回数1回 ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内 ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数2回以内	
ピリミノバックメチル・プロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペントキサゾン剤	トップガンシジャンボ	メチル-2-(4,6-ジメトキシピリジン-2-イル)オキシ-6-(1-メトキシイミノエチル)ペンゾエート ...1.8% (RS)-2-プロモ-N-(α , α -ジメチルペンシル)-3,3-ジメチルプロピルアミド ...36.0% メチル- α -(4,6-ジメトキシピリジン-2-イル)カルバモイルスルファモイル)-オートレート ...2.0% 3-(4-クロロ-5-シクロペンチル)オキシ-2-フルオロフェニル)-5-イソプロピルピリジン-1,3-オキサゾールピリジン-2,4-ジエー ...8.0%		移植水稻	水田一年生雑草 マツバ オタカイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ(近畿・中国・四国を除く) セリ アオミドロ・藻類による表層はく離(近畿・中国・四国、九州)	北陸、関東・東山・東海、九州の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～埴土	移植後3～15日 (/ヒ)2.5 葉期まで)	10個 (250g)	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる	クマイ化学工業㈱ 科研製薬㈱ デュボン㈱
						近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯	壤土～埴土			本剤の使用回数1回 ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数2回以内 プロモブチドを含む農薬の総使用回数1回 ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内 ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数2回以内	
カフェンストロール・ベンスルフロンメチル・ペンゾピシクロン剤	テラガード250グラム	N,N-ジエチル-3-メチルスルホニル-1H-1,2,4-トリアゾール-1-カルボキサミド ...12.0% メチル- α -(4,6-ジメトキシピリジン-2-イル)カルバモイルスルファモイル)-オートレート ...3.0% 3-(2-クロロ-4-メシホペンチル)-2-フルエニチオピシクロン[3,2,1]オクタン-2-エン-4-オン ...8.0%		移植水稻	水田一年生雑草 マツバ オタカイ ウリカワ ミズガヤツリ(東北) ヘオモガカ(北海道) ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類による表層はく離	北海道	壤土～埴土	移植後5～20日 (/ヒ)2.5 葉期まで)	250g	湛水散布又は湛水周縁散布	クマイ化学工業㈱ ㈱エス・ディー・エス・バイ オテック
						東北		移植後5～15日 (/ヒ)2.5 葉期まで)		本剤の使用回数1回 カフェンストロールを含む農薬の総使用回数1回 ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内 ペンゾピシクロンを含む農薬の総使用回数2回以内	

(1) 移植水稻 つづき

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	登録会社
カフェン ストロー ル・ベン スフロ ンメチル ・ベンゾ ビシクロ ン剤	テラガー ドL25 0グラム	N, N-ジ ¹ エチル-3-メ チルスルホニル-1H- 1, 2, 4-トリアゾ-ル -1-カルボキシミド ・・・8.4% メチル=α-(4, 6- ジ ² メトキシ ³ リミジン -2-イルカルバモイルス ルファミル)-オート ート ・・・2.0% 3-(2-クロロ-4-メ ルヘンゾ ⁴ イル)-2-フ ェニルオビ ⁵ シクロ[3, 2, 1]オクサ-2-エノ 4-オン ・・・8.0%		移植水稻	水田一年 生雑草 マツバイ おたけ ウリカ ミ ⁶ ガ ⁷ ヤツ ヒルムシロ セリ アオミ ⁸ ロ 藻類によ る表層は く離(近 畿・中国・ 四国・九 州)	北陸、 関東・東山 ・東海の普 通期及び 早期栽培 地帯	壤土～ 埴土	移植後3～ 15日 (/ヒ ⁹ エ2.5 葉期まで)	250g	湛水散布又は湛水周縁 散布 本剤の使用 回数1回 カフェンストロー ルを含む農薬の 総使用回数1 回 ベンスフロ ンメチル を含む農薬 の総使用回 数2回以内 ベンゾビ ¹⁰ シクロ ンを含む農薬 の総使用回 数2回以内	クマヤ化学 工業(株) 特 ¹¹ ス・テ ¹² イ ー・ス バ ¹³ イ オテック
ジメタメ トリン・ ピラゾス ルフロン エチル・ ピリフタ リド・ブ レチラク ロール粒 剤	アビロフ アインD ジャンボ	2-メチルチオ-4-エチル アミノ-6-(1, 2-ジ ¹ メチルプロピ ² ル ³ ミ) -8-トリアジン ・・・2.0% エチル=5-(4, 6-ジ ⁴ メトキシ ⁵ リミジン-2 -イルカルバモイルスル ファミル)-1-メチル ⁶ ラゾール-4-カルボキ シラート ・・・0.70% (RS)-7-(4, 6- ジ ⁷ メトキシ ⁸ リミジン -2-イルチオ)-3-メ ル-2-ヘンゾ ⁹ フラン 1(3H)-オン ・・・5.0% 2-クロロ-2', 6'- ジ ¹⁰ エチル-N-(2-ブ ロ ¹¹ キエチル)アセト ニリト ¹² ・・・15.0%		移植水稻	水田一年 生雑草 マツバイ おたけ ウリカ ミ ¹³ ガ ¹⁴ ヤツ (北海道 を除く) ヘラモタ ¹⁵ カ (北海道, 東北) ヒルムシロ セリ アオミ ¹⁶ ロ 藻類によ る表層は く離(北 陸, 関東・ 東山・東 海を除 く)	北海道	壤土～ 埴土	移植後5～ 25日 (/ヒ ¹⁷ エ3葉 期まで)	10個 (300g)	水田に小包 装(パック)の まま投げ入 れる 本剤の使用 回数1回 ジメタトリンを 含む農薬の 総使用回数2 回以内 ピラゾスルフ ロンエチル を含む農薬 の総使用回 数1回 ピリフタリド ¹⁸ を含む農薬 の総使用回数 1回 ブレチラク ロールを 含む農薬の 総使用回数2 回以内	シンジエンタ シヤパン(株) 日産化学 工業(株)

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稻刈後・畑作・野菜作・永年生物・非農耕地対象

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
カルフェントラゾンエチル水和剤	タスクDF	(RS)-エチル=2-クロロ-3-[2-クロロ-5-(4-ジ'フルオロメチル-4,5-ジ'ヒト'ロ-3-メチル-5-オキソ-1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)-4-フルオロフェニル]プロピオネート ・・・36.5%	水和剤	小麦(秋播)	ヤムグ'ラ	関東以西	全土壌(砂土を除く)	ヤムグ'ラ 2～4葉期(但し、収穫30日前まで)	3～4g 希釈水量 100～200L	雑草茎葉散布 本剤の使用回数2回以内 カルフェントラゾンエチルを含む農薬の総使用回数2回以内	石原ハ'イサイエンス(株)
				日本芝	一年生広葉雑草	—	—	秋期芝生育期(雑草発生始期～生育初期)(雑草3葉期まで)	10～20g 希釈水量 100～200L	散布 本剤の使用回数2回以内 カルフェントラゾンエチルを含む農薬の総使用回数2回以内	
ビアラホス液剤	S Tハービー液剤	既登録薬剤に同じ									住化武田農薬(株)
グリホサートイソプロピルアミン塩・ピラフルフェンエチル水和剤	キングスター	イソ'ロ'ビ'ルアンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート ・・・30.0% エチル=2-クロロ-5-(4-クロロ-5-ジ'フルオロメトキシ-1-メチルピ'ラゾール-3-イル)-4-フルオロフェニルセグレート ・・・0.16%	水和剤	公園庭園 堤とう 道路宅地 運動場 鉄道のり面等	一年生及び多年生雑草	—	—	雑草生育期(草丈50cm以下)	500～1000mL 希釈水量 100L	雑草茎葉散布 本剤の使用回数3回以内 グリホサートを含む農薬の総使用回数3回以内 ピ'ラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数3回以内	㈱ニチノ緑化

新刊

草地科学実験・調査法

A4判 611ページ

定価(本体7,000円+税)

「草地」に関わるさまざまな実験・調査法を横断的かつ体系的に集大成した大部。本書では、牧草等の実験・調査法にとどまらず、飼料、家畜、土壌、気象、統計法など草地全般にわたる手法の実際を解説する。さらに近年の機器やソフトウェアの進展に伴い、大きく進化している実験・調査法のすべてを取り込むことにより、研究の基礎から応用まで幅広い分野を網羅。

全国農村教育協会

〒110-0016 東京都台東区台東1-26-6 ホームページ <http://www.zennokyo.co.jp>
電話(本社)03-3833-1821(出版部)03-3839-9160 FAX 03-3833-1665