


# 調 植

第38巻第11号



ケチヨウセンアサガオ(アメリカチヨウセンアサガオ)の種子(*Datura meteloides* Dunal)長さ5mm

財団法人 日本植物調節剤研究協会編


## 新規水田用初期除草剤

# 初ベクサー® フロアブル 1キロ粒剤

(R) 科研製薬(株) 商標登録

### 特長

- ◆すぐれた経済性
- ◆中期剤・一発処理剤の効果安定に
- ◆水稻に対して安心
- ◆環境に対して安心



低コスト  
稲作に!



JAグループ  
農協 | 全農 | 経済連  
◎は登録商標です



三井東圧農薬株式会社  
東京都中央区日本橋1-12-8

## SU抵抗性雑草\*も、田植同時におまかせ!

SU抵抗性  
ホタルイに!

SU抵抗性  
アゼナ類に!

SU抵抗性  
コナギに!

SU抵抗性雑草に効く、田植同時処理除草剤

バイエル

# イナバ®DX

1キロ粒剤

- 田植後に行っていた従来の除草作業が省略できます。
- 田植同時散粒機で均一散布が可能。安定した効果が期待できます。
- 田植と同時に除草剤散布が完了。散布適期を逃しません。

ムラなくまけて、効果長もち



®は登録商標

\*SU抵抗性雑草とは? 多くの水稻用除草剤に含まれるSU剤(スルホニルウレア系除草剤)に、抵抗性を持つ雑草のことを「SU抵抗性雑草」と呼んでいます。


- 使用前にはラベルをよく読んで下さい。●ラベル記載以外には使用しないで下さい。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。



Bayer CropScience

バイエルクロップサイエンス株式会社  
東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262  
www.bayercropscience.co.jp

## 卷頭言



## 臭化メチルの不可欠用途申請に対する主要国の対応

財団法人 日本植物調節剤研究協会 評議員  
社団法人 日本くん蒸技術協会理事・事務局長

楯谷昭夫

広範囲な土壌病害虫の防除と除草に高い効果を有し、扱い易い臭化メチルは、2005年からその生産は、不可欠用途と検疫処理を除いて全廃された。2004年11月にチェコ首都プラハで、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書第16回締約国会合が開催され、2005年分の臭化メチルの不可欠用途規制除外の数量が決定された。日本は、キュウリ、メロン、スイカ、ピーマンの土壌伝染性ウィルス（CGMMVとPMMoV）の防除およびクリに付着するクリシギゾウムシのくん蒸処理のため臭化メチルが不可欠であるとして申請していたが、1991年の生産レベルの基準値（6,107トン）の12.2%に相当する748トンが申請通り認められた。12.2%という数字は、フランスについて少ないもので、日本が早くから臭化メチルの全廃を視野に入れ代替剤の開発に相当努力をしたことを意味する。

米国は、トマト、イチゴ、ピーマン、芝生、切り花、果樹と林木の苗木用などの土壌消毒、カカオと小麦等のくん蒸処理とハム工場のくん蒸のため不可欠用途として10,753.997トン申請し、9,526.313トンが決議された。これは、基準値（25,529トン）の37.3%に相当する。2004年の規制数量が30%であるから、全廃となる2005年に30%を超えることに対しECははじめ各国から非難する声が高く上がった。しかしながら、米国は、土壌病害虫を一発で完全に処理できる代替剤はない、主要代替剤の使用規制が厳しい、代替剤を用いても処理後定植までに少なくとも1ヶ月を要し、その経済的実用性は非常に小さいことからこれほどの申請に至ったと主張した。米国は、オゾン層を保護することは重要なこと、しかしながら、米国農産物が2014年まで臭化メチルを使用できる中南米諸国の農産物と競争し、自国の農業を保護し、米国消費者を保護することも重要であるとし、37.3%はこ

のバランスを示す大きさであると主張した。この主張は、自国の産業の保護を優先し京都議定書に批准しないことと一脈相通じるものがある。しかしながら、2006年には、開発途上国のための多国間基金の枠組みと臭化メチルの規制スケジュールの見直しを論議することになっているが、途上国は米国が得た不可欠用途数量を見れば、途上国の規制スケジュールの前倒しに理解を得られるか不安視する向きが大きい。

他方、EUは25カ国中10カ国がイチゴ、トマトの土壌消毒と穀類のくん蒸のため不可欠用途として臭化メチルを5,754.361トン申請した。第16回締約国会合では4,392.764トンが決議されたが、その後ヨーロッパ委員会（EC）は代替剤の有無を独自に精査し、2005年の不可欠用途数量は2,777トンとすることを提案し、EUはこれを承認した。申請数量の大きいスペインは、決議数量の80%を、イタリアは65%を返上したとの話である。折角決議されたものを返上するわけであるから、スペインとイタリアの農家の気持ちが察せられる。EUでは臭化メチルを使用するときには、その放出を削減するため難透過性フィルム（VIF）を使用しなければならない。EUがいかに環境保全に重点を置いているか想像に難くない。日本、米国とEUは不可欠用途申請への対応に少なからず温度差が感じられる。

2004年は日本では夏の猛暑、10を超える台風の本土襲来、新潟県中越大地震と自然災害に見舞われた。海外では年末にスマトラ島沖大地震が発生した。これらの自然災害は人類の産業活動に基づく地球温暖化とオゾン層破壊とは関わりのないことを願いつつ、また、産業活動と環境保全のバランスを図る一層の努力が求められる。

## 目 次

( 第 38 卷 第 11 号 )

### 巻 頭 言

臭化メチルの不可欠用途申請に対する主要国の  
対応…………… 1

＜(財)日本植物調節剤研究協会 評議員  
(株)日本くん蒸技術協会理事・事務局長  
楯谷昭夫＞

平成 16 年度水稻関係除草剤試験成績

概要…………… 14

＜(財)日本植物調節剤研究協会 技術部＞

植調協会だより…………… 86

メフェナセット開発物語…………… 3

ーその 4:メフェナセットからフェントラザミドへ、  
そして未来へー

＜バイエルクロップサイエンス株式会社  
研究本部技術顧問 安井一臣＞

[旧社名: 日本特殊農薬製造株式会社 (通称: 特農)  
前社名: 日本バイエルアグロケム株式会社 (通称: NBA)]

## よりよい農業生産のために。三共アグロの農薬



●時代先どり、ジャンボな省力  
投げ込むだけの一発処理除草剤

**クサトリエース®** Hジャンボ®  
Lジャンボ®

●効きめの長〜い  
初・中期一発処理除草剤

**ラクダー®**  
Hフロアブル・Lフロアブル

●効きめの長〜い  
初・中期一発処理除草剤!!

**ラクダープロ®**  
フロアブル・Lフロアブル・1キロ粒剤75/51

●三共の優れた製剤技術から生まれた  
グリホサート液剤

**三共の草枯らし®**

●移植前後に使える  
初期除草剤

**シング®** 乳剤

●SU抵抗性雑草(ホタルイ等)に3成分で効果がある  
投げ込み型一発処理除草剤

**クサトリードX®** ジャンボ®H  
ジャンボ®L

●ノビエ3.5葉期まで使える  
新しい中期除草剤

**ザーベックス®DX** 1キロ粒剤

●使いやすい  
初期一発処理除草剤

**ミスラッシャ®** 粒剤  
1キロ粒剤

●SU抵抗性の  
アゼナ・ホタルイに!

**クサコント®** フロアブル

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

**三共アグロ株式会社**  
SANKYO 〒113-0033 東京都文京区本郷4-23-14  
<http://www.sankyo-agro.com/>

---

## メフェナセット開発物語

### ーその4：メフェナセットからフェントラザミドへ、そして未来へー

バイエルクロップサイエンス株式会社 研究本部技術顧問 安井一臣  
[旧社名：日本特殊農薬製造株式会社（通称：特農）]  
前社名：日本バイエルアグロケム株式会社（通称：NBA）]

---

#### VI メフェナセットからフェントラザミドへ

##### 1 新しい時代の除草剤を目指して

どの業界においても、ある企業が大型ヒット商品の開発に成功すると、ライバル各社はその商品が開拓した市場を目指して、同様の性能を持つ商品の開発にしのぎを削るのは世の常である。前述のように特農がパートナー企業と共同で、メフェナセットを基盤にした「初・中期一発処理剤」という新しい分野の開拓に踏み出したのは1987年からであった。その頃からライバル各社でも、メフェナセットのような適用時期幅が広いノビエ防除剤の開発に力を入れるようになってきた。誤解を恐れずに述べると、メフェナセットはライバル各社にとって水稻除草剤研究開発のひとつの目標となり、私たちは追う立場から追われる立場になったと自負している。何事においても、追われる立場でその座を維持するのは容易なことではない。

1990年前後から、メフェナセット剤の普及が順調に進む中で、私たちに課せられた新しい命題は、初・中期一発処理剤という分野で、自分たちが獲得した地位をいかにして維持・発展させるかという途方もなく大きなものであった。その一方、メフェナセットの開発を手掛けた当初から、その後継薬剤の必要性も認識していたので、メフェナセットの開発と平行して、後継剤の探索にも着手していたことも事実である。

そのような状況の中で、特農は1991（平3）年に創業50周年を迎え、社名を「日本特殊農薬製造株式会社」から「日本バイエルアグロケム株式会社（通称：NBA）」に改名した。ちょうどその頃、大きな期待を背に受けて開発が進んでいた超大型殺虫剤「イミダクロプリド（アドマイヤー）」が産声をあげようとしていた。言うなれば、この改名は会社の新しい出発と更なる飛躍を祈念したものに他ならない。

私たち除草剤の研究開発部門でも、メフェナセット剤の順調な普及に浮かれることなく、次の飛躍に向けた研究開発目標を設定するのが急務の課題であった。

関係各界に向けての創業50周年と社名変更披露を兼ねたサイエンティフィック・シンポジウムやパーティーに続き、記念行事の最後の催しとして社内向けの祝賀会が開かれたのは1991（平3）年4月19日のことであった。その翌日、筆者は次の研究開発目標を協議するためドイツの本部に向けて出発した。出張予定期間は3ヶ月で、バイエル社・農業関連グループ全体の除草剤研究開発目標の見直しと、新しい目標の設定が主な任務であった。ドイツでの協議は自分が担当する分野だけでなく、新規化合物合成研究の分野開拓、将来予想される農薬の安全性の評価と規制、製造や流通、営業、稲作の将来像や世界の食糧問題など多岐にわたり、言葉の壁

に苦しむのみならず、自分の視野の狭さと知識の少なさを痛感したが、スペインやイタリアの大規模稲作をはじめ、ヨーロッパのコメ料理、EUの農業や食糧政策などを広く学ぶ機会にも恵まれた。

私たちは、追われる立場でトップ・ランナーとして走り続ける秘訣は、ライバル各社に目標とされる自分たちの製品を超える性能を有する新製品を、自分たちの手で開発することだと考えていた。

水稻除草剤の研究開発目標に関する私たち日本からの提案は以下の3点であった。


- ① メフェナセットより更に広い適用時期幅に加え、低薬量で安定した防除効果を持つ、メフェナセットの後継化合物。
- ② ベンスルフロンメチルに代表されるような、ノビエ剤との優れた混合特性を持ち、それとは異なる作用機構を有する新規化合物。
- ③ 広い適用草種スペクトラムを持ち、一成分で一発処理剤として成り立つことができる新規化合物。

このような要件を満たす化合物の検索は容易なことではないが、メフェナセットの開発という成果が色あせていないこの時期が、困難ではあるが新しい課題に挑戦するチャンスでもあった。ドイツでの議論は時として暗礁に乗り上げるような事態にもなった。その論点は「目標が高すぎはしないか？」ということであった。議論を重ねた結果として、私たちの提案は受け入れられたが、この提案は自ら茨の道に踏み出すという決意の表明でもあった。このような経緯を経て、私たちの新しい挑戦は始まった。それは1991年7月のことであった。

## 2 フェントラザミドを選抜する

私たちは新しい3つの研究開発目標に向かってスタートしたが、困難を極めるような目標の設定であるにも関わらず、その模様はいま振り返っても意外なほど静かな幕開けであった。これはメフェナセットを開発したという自信と、長期的な取り組みでなければ達成できない目標の高さが交じり合った複雑な雰囲気醸し出したものであったように思える。関係者全員が長期戦を覚悟したにちがいない。

時間的には相前後するが、第一の目標であるメフェナセット後継剤の新芽のようなテトラゾール化合物をはじめて見つけたのは、1991年4月のことであった。私自身はメフェナセットを選抜した当時のことに思いを馳せ、次の目標達成がそう遠くないところにあるような感じを持った。だが、新芽のような化合物からフェントラザミドにたどり着くまでの道のりは困難を極めた。初期段階で誘導化された化合物は、除草活性とイネに対する選択性、あるいは人畜や環境に対する安全性に明らかな相関性が見出せない状態であった。私自身は大風呂敷を広げた手前、多少の焦りを感じたが、現場の研究者は誰も落ち着いた雰囲気ですべての仕事に取り組んでいた。この段階で、誘導化研究に抜群のアイデアを出し続けた「五島敏男」、困難な誘導化研究を地道にリードした「柳顯彦」、常に信頼性の高いスクリーニングをリードした「伊藤整志」、圃場条件下で冷静に化合物を評価した「加持集



YRC2388 (フェントラザミド fentrazamide)  
4-(2-chlorophenyl)-N-cyclohexyl-N-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazole-1-carboxamide

三」の諸氏は特段の働きをした。このような過程を経て、YRC2388（後のフェントラザミド）にたどり着いたのは1992年12月8日であった。

この段階で、ドイツ・バイエル本社の担当者として、“この化合物を開発するかどうか”で一悶着があった。その論点は、“メフェナセットとの共食い”についての懸念であった。私たちはNBAとバイエル社の上層部に対し、低薬量でメフェナセットに匹敵するノビエ防除効果があることに加え、移植稲に対する選択性が優れているので田植え同時処理が可能であること、直播栽培での使用が可能であること、および中国や東南アジアの諸国の水田強害雑草である *Leptochloa chinensis*（日本名：アゼガヤ）に高い活性があること、そして何よりも、メフェナセットを目標にしているライバル会社の新剤による挑戦を受けて立つには、メフェナセットとフェントラザミドの併存が重要であることを強調した。このように幾つかのハードルはあったが、この化合物の開発にゴーサインが出たのは1993（平5）年の秋のことであった。この段階でも特段の働きをした仲間がいる。それは、共食い回避のシナリオ作りをした「原田竹夫」、混合剤の共同開発をパートナー会社と呼びかけた「宮内浩」、そして、この化合物の開発プロジェクト・リーダーを務めた「宇川和博」の諸氏である。私自身は今でも焦りを感じた“自分の不明”を恥じているが、NBA社内にはそれぞれの分野で卓抜した実力を持つ人材が多くいることを実感した。

フェントラザミドの長所の中でも、特に田植え同時処理の可能性については上層部の関心を引いたが、現実の問題として、具体的な処理方法については宿題を残したままの見切り発車であった。その当時、既に田植え同時処理機とし

て「マキチャン」と「滴下マン」が市販されていたが、フェントラザミド剤への適用にはコストや汎用性の面から不向きと判断していたので、新しい処理機の開発という畑違いの課題にも頭を悩ませた。ちょうどその頃、殺虫剤の研究開発を担当していた「坪井真一」とヤマト農磁（株）の「根本正久」の両氏が、市販の田植え機に簡単に取り付けられる「低価格の田植同時処理装置」というアイディアを持ち込んできた。その後、幾多の改良を経て、現在の“イノベーター”に至ったが、我々にとっては、まさに“僥倖”という他ない。二人はフェントラザミド開発の陰の功労者である。いい友を持つ幸せとは、このようなことをいうのだろう。

私がフェントラザミドの研究開発に多少とも関わったのはこの辺りまでで、会社の組織改革や人事異動などもあり、研究開発の現場から離れることになったが、その後の研究開発は若い後輩たちにより活発に続けられている。そのような訳で、フェントラザミド剤の開発経緯についての詳細な記述は、それを担当した若い後輩たちの手に委ねるが、その概要だけを述べると、ベンスルフロンメチル混合剤（イノーバ粒剤など）、ピラゾスルフロンエチル混合剤（ダブルスター粒剤など）、シクロスルフアムロン混合剤（ビッグシュア粒剤）などの委託試験を1994（平6）年度より開始し、これら第一グループ剤の登録を取得したのは2000（平12）年12月のことであった。2001年から普及・営業活動を開始し、2005年1月現在、粒剤だけでなく、ジャンボ剤やフロアブル剤、顆粒剤など剤型の違いも含めると、延べ12剤が市場にある。日本の水稻栽培面積およびメフェナセットとフェントラザミド両剤の普及面積は図-6に示す通りである。特にフェントラザミド剤が飛躍の兆しを見




図-6 メフェナセット剤、フェントラザミド剤の最近の普及実績

せている。これからの成長が楽しみである。

また、先に掲げた高い研究開発目標の②、③についても、着々と目標の達成に近づいているということである。OBの一人として頼もしく思うと同時に、メフェナセットの開発以来、腰を据えた研究開発が力強く続けられていることに、大きな誇りと感慨を禁じえない。

## VII これからの日本の農業、世界の農業（一人のOBが思うこと）

### 1 国連2004国際コメ年を終えて

2004年は国連が定める「国際コメ年」であった。その幕開けにあたり、国連が発表した声明は以下のような格調高いものである。

#### 国際コメ年にあたって（要旨）

国連総会は、コメが世界の半数以上の人々の主食であることを鑑み、貧困及び栄養不良の解消におけるコメの役割について、社会理解を高める必要性を認識し、国際的に合意された開発目標の達成に向かって、食料安全保障の確保と貧困の撲滅にコメが果たす役割に対し、世界の注意を喚起していくことを再確認し、

1. 2004年を国際コメ年とすることを決定し
2. 各国政府及びその他の関連組織と協力して国際コメ年の実施の促進と目的の達成に最大限の努力をするよう要請する。

国連の呼びかけにより、日本国内はもとより、諸外国でもその趣旨に沿った国際研究会議やシンポジウム、子どもたちや一般市民を対象とした展示会や体験学習会などが数多く開催された。幸運なことに筆者も日本委員会の末席に名を連ねる機会を得て、多彩な催し

に参加し多くのことを学ぶことができた。

このような催しのキーワードは、コメの安定生産の新技术、食料としてのコメの栄養価値、コメの流通経済、国際政策と管理、食料安全保障、食料援助と技術援助、ゲノム塩基配列の完全解説、将来の生産量と必要量、開発途上国の食料事情と生活環境、稲作に使える水資源の制約、不良環境下での稲作、気候変動、水田稲作の多面的機能、コメの品質改善、新しい育種戦略、遺伝子組換えコメの可能性と問題点、生産性向上、病虫害総合防除（IPM）、ポストハーベスト管理、環境との調和、総合的生物多様性管理（IBM）、NERICAとAerobic Rice、農耕地土壌の劣化と改善、モンスーン・アジアの農業と乾燥地農業、小規模家族農業と大規模近代農業、コメの安全と安心、都市住民や子供たちの農業体験など、極めて広範囲にわたるものであった。これらのキーワードに逐一蛇足を加えなくても、読者諸賢にはどのような議論が繰り広げられたか、容易に想像頂けるものと思う。

日本の農業政策が旧農業基本法から新食料・農業・農村基本法になったのは1999年7月であった。この法律は理念法で、①農村の振興、②農業の持続的発展、③食料の安定供給の確保、④多面的機能の十分な発揮、という4つの柱で構成されている。この理念を俯瞰的に総括すると、日本農業の衰退を食い止め、活性化に転じよう

とする意図が読み取れる。実務的には、この法律に基づいて「食料・農業・農村基本計画」が策定され、具体的な農業政策が実行に移される。2000年3月に策定された向こう5年間を目途とする第一次基本計画に、日本の食料自給率を2010年までに現状の40%から45%に改善するという注目すべき政策が織り込まれた。この数字の妥当性はともかく、自給率の改善という新しい政策には、多くの農業関係者が注目し期待を抱いたに違いない。しかし、現在進められている第二次基本計画策定の中間議論において、この自給率改善目標は数年間の先送りになる雲行きである。さらにWTOやFTAなど多くの国際交渉の場でも、日本の主張と立場は年を追うごとに弱くなっているように感じられる。新しい食料・農業・農村基本法は日本国土の保全と日本国民への食料の生産と供給を保障することを謳ったものであるが、この根底が揺らぐような懸念を持つのは私だけであろうか。

ある大手食品会社が“ふるさと”という言葉から何をイメージするか？という大がかりな世論調査を行った。その結果は、一位が田んぼ、それに、小川、山、海、森・林という言葉が続いた。日本人の心の原風景に“米”というものが根強く刻み込まれていることが容易に理解できる。

今、日本の水田の1/3以上は米を作るという本来の役割を果たすことなく、減反、休耕、転作、あるいは耕作放棄されている。その一方、棚田地域を散策していると、耕作放棄された田んぼの隣で、米作りを続ける老夫婦が、一株、二株の稲株を丹念に補植している姿にしばしば出くわす。このような姿を見るにつけ、日本農業が抱える問題の根の深さを考えずにはいられない。

世界の食料や人口、環境、資源問題など幅広い分野で地球の将来につき多くの警告を発しているレスター・ブラウンの著書「誰が中国を養うのか (Who will feed China)」が発表されたのは1995年であった。これを受けて、中国は多くの国際会議などで、時には特に発言を求め、「中国を養うのは中国自身である」と強調したそうである。事実、その後の数年間、国内農産物の生産量は増加した。だが、ここ数年間の驚異的な中国経済の成長は、商・工業への農地や水資源の転用を促し、食糧生産は減少に転じ始めた。さらに、国民一人当たりのGDPがある一定の水準を超えると、主食穀類の消費が減少するというセオリーがここでも当てはまり、インディカ米については余剰傾向がうかがえるようになってきた。ごく最近の報告や発表から察すると、中国の長期的食料自給率は80%程度で推移するものと思われる。

最近の新聞報道によると、中国人口は2005年1月5日に13億人に達した。今後もしばらくは人口増加と経済成長が続くと予想されているので、それにともなう食料消費量の増加と、動物性食品への嗜好の変化は、世界の食料事情に大きな影響を及ぼし続けるだろう。

同じ人口大国・稲作大国であるインドにおいても、十分な食料の安定生産・安定供給という未来図は描きにくい。食文化と宗教上の理由から、経済成長が直ちに食肉消費の増加という結果にはつながらないと思われるが、それほど遠くない将来、その人口が中国を追い越すのは確実視されている。国内に貧困と食料不足という困難を抱えながらの農産物輸出には、常に危うさが付きまとう。

国際コメ年の多くの催しに参加した大方の人々は、米が持つ食料としての価値と、持続的生産

が可能な数少ない穀物であることを改めて認識したに違いない。その重要性はアジア・モンスーン地域にとどまらず、アフリカにおけるNERICAやラテン・アメリカにおけるAerobic Riceにも当てはまる。2004年11月、つくば市で行われた「世界コメ研究会議」で“Rice as key resource to save our planet (地球を救う鍵となる資源、コメ)”という言葉が登場した。この言葉が持つ意味はとてつもなく広くて深いように思われる。私たちはこの言葉の意味を多角的に理解することが重要であると確信している。

## 2 21世紀は農業の時代

1990年代の後半から「21世紀は農業の時代」という言葉が、多くの場で使われるようになった。この言葉の裏には、21世紀の食料事情に対する漠然とした不安に加え、モノの豊かさと暮らしの便利さを求めて走り続けた過去50～60年の間に失った重大な「何か」を取り戻したい、という思いも含まれているように思われる。だが、モノの豊かな社会で暮らし快適さを覚えた先進国の私たちが、食料や資源の消費を減らすことだけによって、持続可能な社会の構築に舵を切り替えるということは容易なことではない。「モノの豊かさから心の豊かさへ」というチャッチフレーズは、理屈としては理解できるが、食料や資源の節約という発想だけでは、社会的合意に至るのはほとんど不可能なことのよう思える。さらに、中国に代表される発展途上国の、モノの豊かさを求めた経済成長が加わってくる（もはや中国を発展途上国と呼ぶのはふさわしくないが）。いたずらに社会不安を煽っても、問題解決には至らない。高度な知識を積み上げるといふヒト特有の行為によって手に入れた科学技術を駆使して、問題解決を図る以外に道は

ないだろう。

食料問題の軽減に関しては、バイオテクノロジー研究の成果を最大限に利用することも大きな一つの選択肢と考えられる。独立行政法人・農業生物資源研究所が中心となって進めた「国際イネゲノム解読プロジェクト (IRGSP)」は2004年12月、イネゲノム全塩基配列の解読を終了した。3億7千万塩基対を99.99%という高精度で解読するという大偉業である。この成果を受けて、2005年からグリーンテクノ計画がスタートする。この計画では、3年以内に病害虫抵抗性や不良環境耐性遺伝子などの特定や機能を解明し、5年以内に今後の品種改良につながる優良系統稲の作出を目指すという。このことは、これまでの基礎研究から、いよいよ遺伝子組換えイネの開発をはじめとする、本格的な実用化研究の時代が来たことを意味するように理解している。

日本における遺伝子組換えイネの開発に関しては、先年発表されたように、①どこでも（低温、高温、乾燥、不良土壌などに対するストレスに強い遺伝子組換えイネの作出）、②誰でも（病虫害抵抗性イネ、直播栽培適合性イネの作出）、③美味しく（コメの美味しさの定義づけはむずかしいが、それぞれの国や地域で美味しいコメがある）、④たくさん（安定多収は食料としてのコメの増産のみならず、家畜飼料やバイオマス生産の観点からも重要）という4つの基本方針に沿って研究が進められるだろう。

遺伝子組換え作物の社会的受け入れに関する議論も、この数年活発に行われているが、多くの場で感じることは、科学的な理解に基づかない感情的な言葉の応酬である。種の壁を越えて遺伝子のやり取りができるという科学技術に、ある種の不気味さや不自然さを感じる人たちの

気持ちもよく理解できる。だが、遺伝子組換え作物の積極的な利用も考えなければならない社会状況を作ったのは、急激な人口増加に加え、モノの豊かさを求めて激走した私たち現代人の社会活動の結果である。これから、科学的理解に基づいた遺伝子組換えイネの社会的認知 (PA) に向けての活動もますます活発化するだろう。この分野の研究成果が、世界のコメ安定生産にどのような影響をもたらすかは予断を許さないが、植物防疫の分野にも大きな変化がもたらされるであろうことは容易に想像できる。

これとは別に、2004年12月、中国が世界に先駆け、この1～2年中に遺伝子組換えイネの実用栽培をスタートさせるという新聞報道が流れた。この組換えイネはBt-Riceであったようである。新聞報道の直後、中国は1～2年中の実用栽培ということを公に否定したが、遺伝子組換えイネが世界のコメ生産システムに組み込まれる日が近いことを印象づけるできごとであった。

何はともあれ、いろいろな意味で、21世紀が農業の世紀であることに異論はない。

### 3 植物防疫技術の変化と革新

CO<sub>2</sub>の削減を目的とした「京都議定書」は、CO<sub>2</sub>排出大国である米国の離脱、中国およびインドの削減免除という大きな課題を残しながらも、ロシアの参加によって、2004年から国際的効力を持つことになった。CO<sub>2</sub>に次ぎ削減を求められる温室効果ガスはメタンであろう。大気中のメタン1分子当たりの温室効果はCO<sub>2</sub>のその数倍にも及ぶ。メタンの主な発生源は、湖沼や湿地、稲作水田、油田・ガス田、反芻家畜の消化過程、糞尿・し尿・有機廃棄物の処理過程からの放出などである。稲作水田からの排出

量は全体の約30%に達するという研究報告もあり、この分野での対策も急務の課題となってきた。最近の研究により、稲作中期における2～3回の落水・中干しや田畑輪換がメタンの発生削減に大きな効果があることが明らかになった。これからは灌漑稲作期間中の“数回の中干し”が、当たり前の技術として組み込まれるようになるだろう。そうなれば、稲作水田の防除対象雑草種や、その発生パターンも大きく変化するに違いない。それとともに、除草剤にも新しい要件が求められるようになるだろう。例えていえば、湛水→浅水→表土乾燥→再湛水、というような水管理の変化にも耐えて効果が持続する除草剤の必要性などが考えられる。古代米ブームや農産物のさらなる国際化を考えると、雑草イネや野生イネの防除が現実的な問題となることも視野に入れておく必要がある。その場合には、除草剤耐性イネと非選択性除草剤の組み合わせが現実の課題になるかも知れない。減農薬や有機栽培の拡大、IPMの進歩などに関連して、病虫害や雑草の要防除水準の見直しも必要になるだろう。除草剤と殺菌・殺虫剤の同時施用や新しい施用技術の開発が必要となることも予想される。

最近のマスコミ紙上に、CSR (Company's Social Responsibilities) という言葉が時々登場するようになった。この言葉の意味はまだ確定しているようには思えないが、従来の「企業の社会的責任」とは異なる意味を含んでいるように感じている。かつては、農家の（ひいては社会の）ために、こういう薬剤や技術を開発しなければならない、という使命感が私たちの研究開発の大きな原動力であった。これからも、この使命感が基本であることに変わりはないが、“科学技術の独善と暴走を許してはいけない”

という一項も加えなければならない時代を迎えているようにも思う。具体的な例は差し控えるが、多くの読者諸賢には、この意味をよく理解して頂けると確信する。

#### 4 コメの可能性に未来を託す

「ヒトは飢えずに環境を守れるか?」。これは現代社会に突きつけられた大きな命題である。21世紀に生きる私たちは、食料の持続的安定増産と環境の修復という、基本的に相反する2つの課題を同時に解決していかなければならない。

中国やインドを代表とする人口大国、アメリカやオーストラリアに代表される農業大国での農産物生産は、おおむね乾燥地農業を基盤としている。乾燥地農業の利点は、太陽のエネルギーを最大限に利用できること、病気の被害が極端に少ないこと、および数種の特定害虫の防除で事足りることなどである。その一方、最大の問題点は、多くのケースにおいて水収支の大幅赤字のもとで農業が行われていることである。

「水の惑星」と呼ばれる地球において、“21世紀最大の資源問題は水不足”という現実、皮肉といえば皮肉であるが、私たち人類は何を問いかけられているか? 前述の“相反する2つの課題”の解決の一つの鍵が、コメという作物の裏に隠れているような気がするのは私だけだろうか。言うまでもなく、田んぼはコメを作る装置である。日本に限らず、アジア・モンスーン地域に暮らす人々は、気が遠くなるような長い世代にわたって、田んぼで主に自給的稲作を続けてきた。そこでは一株の稲、一本の稲穂が特別な意味を持っていたに違いない。このような足元を見つめた日々の暮らしが、持続的食料生産の礎であったことは疑う余地がない。今日、水田稲作が持つ、水を貯める機能、地下水を涵

養する機能、土壌流亡を軽減する機能、土砂災害を防止する機能、多様な生き物に棲家を提供する機能、人々の心を和ませる景観を維持する機能等等、いわゆる“多面的機能”あるいは“外部効果”というものが注目されるようになってきたが、これまで営々と稲作を続けてきた祖先たちは、そのようなことは考えもしなかったに違いない。それ故に、これまでコメの価格には多面的機能や外部効果の価値は含まれてこなかった。だが、幸いにして私たち人類はその価値に気づいた。このかけがえのない機能を、最大限に生かせるかどうか、人類の未来を左右すると言っても過言ではないだろう。

「米さえあれば何とかなる」。これは私が子供の頃、故郷の祖父母に聞いた言葉である。もう半世紀以上も昔のことである。祖父母は米作りを生業として、田舎の片隅で土に這いつくばりながら、つつましい人生を送ったが、この言葉は私の人生観や生き方に少なからぬ影響を与えた。祖父母のこの一言は、国際化された現在に生きる私たちにとっても、改めて深く考えてみるだけの示唆に富む言葉のように思えてならない。

#### おわりに

プロジェクトXは多くの困難を克服しつつ、チームワークを大切にしながら、いろいろな分野で大プロジェクトを成功に導いた感動を伝えるNHKの人気番組である。私も涙して画面を見る視聴者の一人であるが、多くの場合、幾多のハードルを乗り越えてプロジェクトを成功裏に達成したという感動で番組が締めくくられる。それ故、この番組の中ではほとんど紹介されないが、このような大プロジェクト遂行の過程で生まれた新技術や多くの知見と経験、困難を乗

り越えたという自信などは、貴重な財産としてそれに続く若い世代に引き継がれているに違いない。

1963（昭38）年に始まった特農時代の除草剤研究開発は、多くの波乱を乗り越えながらも、今では新生バイエルクロップサイエンス㈱のビジネスの大きな柱に成長し定着している。これは、それぞれの過程で学んだ知識や技術、経験などを積み重ね、その上に時代に相応した適切な判断や修正を加えながら、ある種の共有財産というようなものを地道に構築してきた結果だと思っている。これが伝統を作るということかも知れない。私も、この行為に参加できた喜びを感じ、それを誇りに思う関係者の一人である。その一方、伝統というものは常に新しく塗り替えていかなければ、直ぐに色あせてしまうものでもあるようにも思っている。

20世紀、特に後半の半世紀に科学技術は大きく前進した。時を同じくして、科学技術分野は高度に細分化・専門化され、それぞれの分野で大きな成果をあげてきた。この成果のおかげで、現在の豊かな生活がもたらされたのは紛れもない事実である。しかし、多くの成果を統合する社会システムの構築が未完成のまま、それぞれの分野で得られた成果を競いあった結果、環境や資源問題に代表される、予想外のマイナス面も明らかになってきた。私たちが関わる植物防疫の分野もその例外ではない。時として「人類の生存そのものが環境破壊である」という意見を聞くことがある。しかし、思考の停止と有効な活動の停滞を促すような、この種の意見に与する必要はない。これからの時代に重要なことは、総合科学・学際科学の進歩とそこから得られる総合知・総合判断力ではないかと考えている。雑草防除を含む広い意味での植物防疫分野でも、

私たちを引き継ぐ次世代の後輩たちが、ささいな目先の変化に一喜一憂することなく、専門分野に閉じこもらない広い視野と高い見識に基づく判断と行動によって、長い世代にわたる人類の幸福につながる、持続可能な農業生産システムの確立に大きな力を発揮してもらいたいと切に願っている。プロジェクトXの一つの番組みだけで終わらせてはならない。

### 謝辞

植調協会のご好意により、4回にわたって主にメフェナセットの開発にまつわる裏話を、思いつくままに書き並べてきた。改めて述べるまでもなく、この薬剤は多くの人たちの指導と支援によって世に出ることができた。本文中では取り上げなかったが、格別のご指導を頂いた方々として、宮原益次（九州農試、農研センター）、江口末馬（九州農試）、芝山秀次郎（農研センター、佐賀大学）、森田弘彦（九州農試）、杉山薫（静岡農試）、大西功男（滋賀農試）、金山廣（佐賀農試）、近内誠登、竹内安智（以上、宇都宮大学）、臼井健二、松本宏、小林勝一郎、横尾政雄（以上、筑波大学）の諸氏のお名前がたちどころに浮かんでくる〔（ ）内は特にお世話になった当時の職場〕。その他にも、植調協会や道府県の農業関係研究機関の方々など、ご厚情を頂いた諸氏の名前を数え上げると枚挙に暇がない。

また、植調協会元会長・鈴木照麿氏には折あるごとに励ましの言葉を頂いていた。数年前に鬼籍に入られたが、改めてご冥福をお祈りする。現会長・小林仁氏には、執筆中、終始にわたってアドバイスと励ましを頂いた。

社内においてもK. Stubauer、上山功夫両本部長はもとより、数多くの上司に恵まれ、除草

剤研究部をはじめ、多くの関係部門の同僚たちと苦楽を共にした。特に委託試験関係では、元同僚の栗原一雄氏が奮迅の働きをした。さらに、国外でも、バイエル社が本部を置くドイツだけでなく、韓国、中国、台湾、タイ、フィリピン、アメリカ、イタリア、スペイン、フランスなど、多くの国々の上司や同僚たちと、同じ目標に向かって挑戦することができた。我が身の幸運を思うと共に、その貢献度の小ささに思い至らずにはられない。

本稿の執筆にあたっては、竹下孝史、中島岳彦、伊藤博敏、中坪繁和、前田実男、坂田晃の諸氏から貴重な統計資料や情報の提供を受けた。各方面でお世話になった関係各位には、改めて心から感謝申し上げる。

新しい除草剤の研究開発という任務にあって、苦しい状況に直面したときはいつも、自分たちが手掛けた薬剤が農家の水田で実際に使用される場面を夢見た。幸いにして、この夢は正夢になった。多くの農家から「使っているよ。あの薬はいいね」という声をたくさんもらった。これ以上の幸せはない。天の神に感謝の祈りを捧げたい。

最後になったが、植調協会の濱村謙史朗氏には、いつも柔らかな言葉で適切なアドバイスを頂いた。書き流しにも等しい拙稿が、曲がりなりにも体裁の取れた印刷物に仕上がったのは、ひとえに濱村氏の尽力の賜物である。この気持ちを表す適切な感謝の言葉が思い浮かばない。

(完)

## 雑草調査に役立つ



# 写真で見る植物用語

岩瀬徹・大野啓一／著 A5判 定価(本体2,200円＋税)

- やっかいな用語を実物写真付きで解説してあり、目で見て納得できます。
- 植物のどこを、どう見ればいいのか、「見方のポイント」がよくわかります。

■ 植物の体の成り立ち：植物の体の成り立ちや生活史に関する用語を取り上げました。


■ 花と種子：種子植物の花のつくりと、それが果実・種子へと至る過程や、種子の散布のしくみ等に関する用語を取り上げました。

■ 環境と生活：植物の個体の形や生活する姿を、環境との関係から見た時の用語を取り上げました。

■ 植生とその分布：群落の構造や遷移・分布等に関する用語を取り上げました。

全国農村教育協会

〒110-0016 東京都台東区台東1-26-6 ホームページ：<http://www.zennokyo.co.jp>  
Tel.03-3833-1821 Fax.03-3833-1665 (お問合せは出版部 03-3839-9160まで)



水田一発処理除草剤

**ダブルスター®**

**1キロ粒剤  
ジャンボ®  
顆粒**

ピラゾスルフロンエチル・フェントラザミド 含有




# 3つの剤型で水田除草革命宣言

あなたは、どのダブルスター？



**顆粒**



**1キロ粒剤**



**ジャンボ**

## 特長

### 1.高い除草効果

ノビエなどの一年生雑草から、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリなどの多年生雑草に高い効果を示します。

### 2.問題の一年生雑草にも有効

最近問題となっている、アメリカアゼナやアゼトウガラシ等の一年生広葉雑草やタウコギ等のキク科雑草に対しても、発生前～発生初期の処理で高い効果を示します。

### 3.ゆとりのある使用時期

移植後5日から、ノビエ2.5葉期（ジャンボは2葉期）まで、長い期間にわたって使用できます。田植後、ゆとりをもって散布ができます。

### 4.長い残効性

各種雑草に対して通常40～50日間の残効が期待できます。特にノビエに対する残効性に優れた剤ですので、ノビエの後発生が問題となる寒冷地においても十分な効果を保ちます。

### 5.水稲に対する優れた選択性

水稲に対して選択性が高いため、通常の水田条件下では安心して使用できます。

## ダブルスター協議会

バイエル クロップサイエンス(株)/日産化学工業(株)

〈事務局〉日産化学工業株式会社 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-7-1 (興和一橋ビル)

# 平成16年度水稻作関係除草剤試験成績概要

財団法人 日本植物調節剤研究協会 技術部

平成16年度水稻作関係除草剤試験成績中央検討会は、平成16年12月9日、10日の2日間、池之端文化センターにおいて開催された。なお、適1試験成績検討会は、これに先立ち平成16年10月7日 台東1丁目区民館にて開催された。ここに、これら検討会における判定結果を報告する。

1) 第一次適用性試験(適1)は、北海道地域(植調北海道試験地)、東北地域(植調古川試験地)、北陸地域(植調新潟試験地)、関東地域(植調研究所)、近畿・中国・四国地域(植調滋賀試験地)、九州地域(植調福岡試

験地)の全国6地域および砂壤土(植調霞ヶ浦試験地)で40薬剤(のべ201点)について実施した。その判定結果は、第2表のとおりである。

2) 第二次適用性試験(適2)の総点数はのべ2,370点であり、その内訳を第1表にまとめた。これら適2試験の判定結果は第3表のとおりであり、「実・継」と判定された薬剤の使用基準を後に掲載した。

第1表 平成16年度適2試験実施点数

|                    |                |               |            |
|--------------------|----------------|---------------|------------|
| A-1 移植栽培(一発処理)     | 148 剤 1,416 点  | A-4 特殊雑草対象 内訳 |            |
| A-2 移植栽培(体系処理:初期)  | 23 剤 259 点     | イボクサ          | 7 剤 11 点   |
| A-3 移植栽培(体系処理:中後期) | 35 剤 226 点     | オモダカ          | 43 剤 84 点  |
| A-4 移植栽培(特殊雑草対象)   | のべ 179 剤 318 点 | クサネム          | 1 剤 6 点    |
| B 直播栽培             | 33 剤 124 点     | クログワイ         | 65 剤 134 点 |
| C 畦畔雑草             | 5 剤 19 点       | コウキヤガラ        | 3 剤 4 点    |
| D 耕起前              | 1 剤 2 点        | シズイ           | 14 剤 18 点  |
| E 休耕田              | 1 剤 4 点        | ミズアオイ         | 12 剤 18 点  |
| その他                | 1 剤 2 点        | SU 抵抗性コナギ     | 12 剤 12 点  |
|                    |                | SU 抵抗性ホタルイ    | 22 剤 35 点  |

第2表 平成16年度 水稻関係除草剤適1試験 判定結果一覧

注) 評価欄の記入については、◎:極めて有望、○:有望、□:可能性有り、△:再検討、×:見込みなし を表す。

| NO | 試験名・剤型<br>[委託会社]                   | 有効成分及び含有率<br>(%)                                             | 実施場所別総合評価 |    |    |    |    |    |        | 判定<br>[今後の検討課題]                                   |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|--------|---------------------------------------------------|
|    |                                    |                                                              | 北海道       | 古川 | 新潟 | 植調 | 滋賀 | 福岡 | 霞ヶ浦(砂) |                                                   |
| 1  | BAH-041-1kg 粒<br>[BASFアグロ]         | シクロスファミロン :0.5<br>ベンゾビシクロン:2<br>ベントキサゾン :3.9                 | □         | □  | ○  | □  | ○  | ○  | □      | □ 一発処理で<br>+0~ノビエ1.5L, ホタルイ1L<br>[低温時の効果変動について]   |
| 2  | BCH-044-1kg 粒<br>[ハイエル]            | イマゾスルフロ :0.9<br>タムロン :4.5<br>フェントラミド :3<br>プロモフチド :9         | ○         | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○      | ○ 一発処理で<br>+0~ノビエ2.5L, ホタルイ2L<br>[年次変動の確認]        |
| 3  | BCH-045H-1kg 粒<br>[ハイエル]           | タムロン :4.5<br>フェントラミド :3<br>プロモフチド :9<br>ベンスルフロメチル:0.75       | □         | ○  |    |    |    |    |        | □ 一発処理で<br>+0~ノビエ2.5L, ホタルイ2L<br>[効果変動要因の検討]      |
| 4  | BCH-045L-1kg 粒<br>[ハイエル]           | タムロン :4.5<br>フェントラミド :3<br>プロモフチド :9<br>ベンスルフロメチル:0.51       |           |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○      | ○ 一発処理で<br>+0~ノビエ2.5L, ホタルイ2L<br>[年次変動の確認]        |
| 5  | DASH-002-1kg 粒<br>[タウケミカル]         | ベノキスラム :0.2<br>未公開(既知):A                                     | □         | ○  | □  | □  | □  | □  | □      | 成分未公開につき判定せず                                      |
| 6  | DKH-411-1kg 粒<br>[デュボン]            | クロマフロップ :3.5<br>タムロン :4.5<br>ベンスルフロメチル:0.51<br>メフェネット :10    |           |    | ○  | □  | □  | □  | □      | □ 一発処理で<br>+3~ノビエ2.5L, ホタルイ2L<br>[年次変動の確認(特に持続性)] |
| 7  | HOK-0401 シャンボ<br>[*北興, デュボン, SDS]  | オキサシクロメホン :1.2<br>ベンスルフロメチル:1.5<br>ベンゾビシクロン:4                | ○         | ○  |    |    |    |    |        | ○ 一発処理で<br>+1~ノビエ2.5L, ホタルイ2L<br>[年次変動の確認]        |
| 8  | HOK-0401 フロアブル<br>[*北興, デュボン, SDS] | オキサシクロメホン :1.2<br>ベンスルフロメチル:1.4<br>ベンゾビシクロン:4                | ○         | ○  |    |    |    |    |        | ○ 一発処理で<br>+0~ノビエ2.5L, ホタルイ2L<br>[年次変動の確認]        |
| 9  | HOK-0401-1kg 粒<br>[*北興, デュボン, SDS] | オキサシクロメホン :0.8<br>ベンスルフロメチル:0.75<br>ベンゾビシクロン:2               | ○         | ○  |    |    |    |    |        | ○ 一発処理で<br>+5~ノビエ2.5L, ホタルイ2L<br>[年次変動の確認]        |
| 10 | HOK-222 シャンボ<br>[*北興, デュボン]        | オキサシクロメホン :1.2<br>クロマフロップ :6<br>プロモフチド :12<br>ベンスルフロメチル:1.5  | ◎         | ○  |    |    |    |    |        | ○ 一発処理で<br>+1~ノビエ2.5L, ホタルイ2L<br>[年次変動の確認]        |
| 11 | HOK-223 シャンボ<br>[*北興, デュボン]        | オキサシクロメホン :1.2<br>クロマフロップ :6<br>プロモフチド :12<br>ベンスルフロメチル:1.02 |           |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○      | ○ 一発処理で<br>+1~ノビエ2.5L, ホタルイ2L<br>[年次変動の確認]        |
| 12 | KPP-2012 フロアブル<br>[科研]             | ピララレート:20<br>ベントキサゾン:4                                       | □         | ○  | ○  | □  | □  | □  | △      | □ 体系処理(初期)で<br>+0~ノビエ1.5L<br>[ホタルイ効果と薬害の変動について]   |
| 13 | KPP-445 フロアブル<br>[*科研, 三井東圧]       | プロモフチド :18<br>ベンスルフロメチル:1.5<br>ベントキサゾン :7.8(W/V)             | ◎         | ○  |    |    |    |    |        | ○ 一発処理で<br>+0~ノビエ1.5L, ホタルイ1L<br>[年次変動の確認]        |

| NO | 試験名 ・ 剤型<br>[委託会社]            | 有効成分及び含有率<br>(%)                                                        | 実施場所別総合評価   |        |        |        |        |        |                    | 判 定<br>[今後の検討課題]                                                  |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
|    |                               |                                                                         | 北<br>海<br>道 | 古<br>川 | 新<br>潟 | 植<br>調 | 滋<br>賀 | 福<br>岡 | 霞<br>ヶ<br>浦<br>(砂) |                                                                   |
| 14 | KPP-445① フロアブル<br>[*科研, 三井東圧] | フ*ロモフ*チト* :18<br>ベ*ンスルフロメチル:1.02<br>ベ*ントキサゾン :7.8(W/V)                  |             |        | ○      | ○      | ○      | ○      | △                  | ○ 一発処理で<br>+0~ノビエ1.5L, ホタルイ1L<br>[薬害発生要因の解明]                      |
| 15 | KUH-032 シ*ンボ*<br>[*タミ化, SDS]  | カフェンストロール:8.4<br>ベ*ンゾ*ビ*シクロン:8                                          | □           | ○      | ○      | □      | ○      | ○      | □                  | ○ 一発処理で<br>+3~ノビエ2L, ホタルイ2L<br>[年次変動の確認]                          |
| 16 | KUH-041-1kg 粒<br>[タミ化]        | KUH-021 :0.5<br>フェントラサ*ミト*:3                                            | ◎           | ◎      | ○      | ○      | ◎      | ◎      | ○                  | ◎ 一発処理で<br>+3~ノビエ3L, ホタルイ2L<br>[年次変動の確認]                          |
| 17 | NC-607 シ*ンボ*<br>[日産]          | オキサジ*クロメホン :2<br>ビ*ラゾ*スルフロンエチル:0.7<br>ベ*ンゾ*ビ*シクロン :6.7                  |             | ○      |        |        |        |        |                    | ○ 一発処理で<br>+3~ノビエ2.5L, ホタルイ2L<br>[年次変動の確認]                        |
| 18 | NC-607-1kg 粒<br>[日産]          | オキサジ*クロメホン :0.8<br>ビ*ラゾ*スルフロンエチル:0.3<br>ベ*ンゾ*ビ*シクロン :2                  |             | ○      |        |        |        |        |                    | ○ 一発処理で<br>+3~ノビエ2.5L, ホタルイ2L<br>[年次変動の確認]                        |
| 19 | NC-608-1kg 粒<br>[日産]          | ビ*ラゾ*スルフロンエチル:0.3<br>ベ*ンゾ*ビ*シクロン :2<br>エスブ*ロカルブ* :15<br>ジ*メタメトリン :0.6   | ○           | ◎      | ◎      | ○      | ○      | ○      | □                  | ○ 一発処理で<br>+5~ノビエ2.5L, ホタルイ2L<br>[年次変動の確認(薬害)]                    |
| 20 | NC-609-1kg 粒<br>[日産]          | ビ*ラゾ*スルフロンエチル:0.3<br>フ*タクロール :7.5<br>ベ*ンゾ*ビ*シクロン :2<br>ビ*ラクロニル :2       | ◎           | ◎      | ◎      | ○      | ◎      | ◎      | □                  | ○ 一発処理で<br>+3~ノビエ2.5L, ホタルイ2L<br>[年次変動の確認(薬害)]                    |
| 21 | NC-611 フロアブル<br>[日産]          | フ*タクロール:15<br>タミロン :18                                                  | ○           | ○      | ○      | □      | □      | □      | □                  | 北海道~北陸 ○ 関東~九州 □<br>体系処理(初期)で<br>~4, +0~ノビエ1.5L<br>[体系処理での確認]     |
| 22 | NC-612-1kg 粒<br>[*日産, SDS]    | シハロップ*フ*チル:1.8<br>ハロスルフロメチル :0.9<br>ベ*ンゾ*ビ*シクロン:2<br>ジ*メタメトリン:1         | ○           | ○      | ○      | ○      | ◎      | □      | □                  | ○ 体系処理(中後期)で<br>+15~ノビエ3L<br>[処理時期と効果薬害について]                      |
| 23 | NHF-401 粒<br>[日農]             | インダ*ノファン :0.46<br>クロメフ*ロップ :1.16<br>ベ*ンスルフロメチル :0.25<br>チアジ*ニル(殺菌剤):6.0 | ○           | ○      |        |        |        |        |                    | ○ 一発処理で<br>+5~ノビエ2.5L, ホタルイ2L<br>[年次変動の確認]                        |
| 24 | SB-564 フロアブル<br>[SDS]         | ビ*ラクロニル :4<br>ベ*ンゾ*ビ*シクロン:4(W/V)                                        | □           | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○                  | ○ 一発処理で<br>+3~ノビエ2.5L<br>[ノビエ2.5Lの効果の確認]                          |
| 25 | SB-564-1kg 粒<br>[SDS]         | ビ*ラクロニル :2<br>ベ*ンゾ*ビ*シクロン:2                                             | ○           | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○                  | ○ 一発処理で<br>+3~ノビエ2.5L<br>[ノビエ2.5Lの効果の確認]                          |
| 26 | SL-0401-1kg 粒<br>[石原]         | SL-0401(新規):0.22                                                        | □           | ○      | □      | ○      | ○      | △      | □                  | 北海道~近畿中国四国 □ ノビエを<br>主たる対象とした中後期処理の除草剤<br>として 九州 △<br>[効果の変動要因解明] |
| 27 | SL-0402-1kg 粒<br>[石原]         | SL-0401(新規):0.22<br>未公開(既知):0.3                                         | □           | ○      | □      | □      | ○      | △      | □                  | △ 体系処理(中後期)で<br>[除草効果の向上, 効果変動要因解明]                               |

| NO | 試験名 ・ 剤型<br>[委託会社]               | 有効成分及び含有率<br>(%)                                                        | 実施場所別総合評価   |        |        |             |        |        |                    | 判 定<br>[今後の検討課題]                                                  |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
|    |                                  |                                                                         | 北<br>海<br>道 | 古<br>川 | 新<br>潟 | 植<br>調<br>研 | 滋<br>賀 | 福<br>岡 | 霞<br>ヶ<br>浦<br>(砂) |                                                                   |
| 28 | SST-403 フロアブル<br>[*住化武田, 住友化学]   | イマゾスルフロン:1.8<br>プロモフチド:18<br>ベントキサゾン:7.8(W/V)                           | ○           | ○      | ○      | ○           | ○      | ○      | △                  | ○ 一発処理で<br>+0～ノビエ1.5L, ホタルイ1L<br>[薬害発生要因の解明]                      |
| 29 | SST-403-1kg 粒<br>[*住化武田, 住友化学]   | イマゾスルフロン:0.9<br>プロモフチド:9<br>ベントキサゾン:3.9                                 | ○           | ○      | ○      | ○           | ○      | ○      | △                  | ○ 一発処理で<br>+0～ノビエ1.5L, ホタルイ1L<br>[薬害発生要因の解明]                      |
| 30 | SW-042⑩ シャンボ<br>[*三共, テュボソ, SDS] | カフェンストロール :7.1<br>タムロン :14.3<br>ベンスルフロンメチル:2.1<br>ベントキサゾン:5.7           | ○           | ○      |        |             |        |        |                    | ○ 一発処理で<br>+3～ノビエ2.5L, ホタルイ2L<br>[年次変動の確認]                        |
| 31 | SW-042⑪ シャンボ<br>[*三共, テュボソ, SDS] | カフェンストロール :7.1<br>タムロン :14.3<br>ベンスルフロンメチル:1.5<br>ベントキサゾン:5.7           |             |        | ○      | ○           | ○      | ○      | ◎                  | ○ 一発処理で<br>+3～ノビエ2.5L, ホタルイ2L<br>[年次変動の確認]                        |
| 32 | SW-043-1kg 粒<br>[三共]             | ビラクロニル :2<br>ビラゾレート: 10<br>ベントキサゾン:2                                    | □           | □      | ○      | ○           | ◎      | ○      | △                  | □ 一発処理で<br>+0～ノビエ2.5L<br>[効果薬害の安定性について]                           |
| 33 | SW-044⑩ フロアブル<br>[三共]            | ベンスルフロンメチル:1.5<br>ベントキサゾン:4<br>ビラクロニル :4                                | ○           | ○      |        |             |        |        |                    | ○ 一発処理で<br>+3～ノビエ2.5L, ホタルイ2L<br>[年次変動の確認]                        |
| 34 | SW-044⑪ フロアブル<br>[三共]            | ベンスルフロンメチル:1<br>ベントキサゾン:4<br>ビラクロニル :4                                  |             |        | ○      | ◎           | ◎      | ○      | ○                  | ○ 一発処理で<br>+3～ノビエ2.5L, ホタルイ2L<br>[年次変動の確認]                        |
| 35 | SYJ-156-1kg 粒<br>[シンジエンタ]        | ビリフタリト :1.5<br>プレチアコロール :4.5<br>ベンスルフロンメチル :0.75<br>メソトリオン(SYJ-104):0.5 | ○           | ○      |        |             |        |        |                    | ○ 一発処理で<br>+5～ノビエ3L, ホタルイ2L<br>[年次変動の確認]                          |
| 36 | TH-001 シャンボ<br>[*住化武田, SDS]      | イマゾスルフロン :2.25<br>カフェンストロール :7.5<br>ベントキサゾン:5                           | ○           | ○      | ○      | ○           | ○      | ○      | □                  | ○ 一発処理で<br>+5～ノビエ2.5L, ホタルイ2L<br>[年次変動の確認]                        |
| 37 | YH-651-1kg 粒<br>[八洲]             | ビラクロニル:1.8<br>クミルロン :12                                                 | ○           | ○      | ○      | ○           | □      | △      | ○                  | 北海道～関東東海○ 近畿中国四国, 九州□ 体系処理(初期)で<br>～-4, +0～ノビエ1.5L<br>[効果変動要因の検討] |
| 38 | NH-403 フロアブル<br>[クサストップ 協議会(日農)] | ベンスルフロンメチル:1.4<br>インタノファン :2.8<br>クロマフロップ :7<br>プロモフチド :12              | ○           | ○      |        |             |        |        |                    | ○ 一発処理で<br>+5～ノビエ2.5L, ホタルイ2L<br>[年次変動の確認]                        |
| 39 | DBH-1294-1kg 粒<br>[東部韓農]         | メタミホッフ :0.9                                                             | □           | ○      | ○      | □           | □      | □      | □                  | □ ノビエ専用中後期剤として<br>～ノビエ3L<br>[年次変動の確認]                             |
| 40 | AKD-7138 フロアブル<br>[アグロカネショウ]     | キノクラミン(ACN):18                                                          | ○           | ○      | ○      | ○           | □      | ○      | □                  | ○ 藻類・表層剥離専用防除剤として<br>発生始期～盛期<br>[薬害発生要因, 殺草葉齢限界の検討]               |

第3表 平成16年度 水稻関係除草剤適2試験判定結果一覧

| 区 分      | 実・継                |                    | 継                |                  |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| A-1 一発処理 | AC-014R ジャンボ,      | AVH-002-1kg 粒,     | BAH-041-1kg 粒,   | DKH-411-1kg 粒,   |
|          | BAG-021 ジャンボ,      | BAG-032 ジャンボ,      | HOK-0401-1kg 粒,  | HOK-201D フロアブル,  |
|          | BCH-031-1kg 粒,     | BCH-032-1kg 粒,     | HOK-201D-1kg 粒,  | HOK-201DS フロアブル, |
|          | BCH-033-1kg 粒,     | BCH-044-1kg 粒,     | HOK-201DS-1kg 粒, | HOK-223 ジャンボ,    |
|          | BCH-045H-1kg 粒,    | BCH-045L-1kg 粒,    | KPP-445 フロアブル,   | KPP-445㊦ フロアブル,  |
|          | DKH-311-1kg 粒,     | HOK-0301-1kg 粒,    | KUH-032 ジャンボ,    | KUH-041-1kg 粒,   |
|          | HOK-0401 ジャンボ,     | HOK-0401 フロアブル,    | NC-607 顆粒水和,     | NC-607 ジャンボ,     |
|          | HOK-221 ジャンボ,      | HOK-222 ジャンボ,      | NC-607-1kg 粒,    | NC-608-1kg 粒,    |
|          | HOK-222 フロアブル,     | HOK-222-1kg 粒,     | NH-403 フロアブル,    | SB-564 フロアブル,    |
|          | HOK-223 フロアブル,     | HOK-223-1kg 粒,     | SB-564-1kg 粒,    | SST-403 フロアブル,   |
|          | HOK-225-1kg 粒,     | HOK-991 ジャンボ,      | SST-403-1kg 粒,   | SW-042㊦ ジャンボ,    |
|          | KPP-444-1kg 粒,     | KPP-444㊦-1kg 粒,    | SW-043-1kg 粒,    | SYJ-156-1kg 粒,   |
|          | KUH-003D ジャンボ,     | KUH-003K ジャンボ,     | TH-547-1kg 粒     |                  |
|          | KUH-004D-1kg 粒,    | KUH-011D-1kg 粒,    |                  |                  |
|          | KUH-011K-1kg 粒,    | KUH-013D ジャンボ,     |                  |                  |
|          | KUH-013D-0.25kg 粒, | KUH-013D-1kg 粒,    |                  |                  |
|          | KUH-013K ジャンボ,     | KUH-013K-0.25kg 粒, |                  |                  |
|          | KUH-013K-1kg 粒,    | KUH-021-1kg 粒,     |                  |                  |
|          | KUH-023D ジャンボ,     | KUH-023D フロアブル,    |                  |                  |
|          | KUH-023D-0.25kg 粒, | KUH-023K ジャンボ,     |                  |                  |
|          | KUH-023K フロアブル,    | KUH-023K-0.25kg 粒, |                  |                  |
|          | KUH-032-0.25kg 粒,  | KUH-985 フロアブル,     |                  |                  |
|          | MK-243D-1kg 粒,     | Mon-923-1kg 粒,     |                  |                  |
|          | Mon-923㊦-1kg 粒,    | MY-100DC フロアブル,    |                  |                  |
|          | MY-100DC-1kg 粒,    | MY-100DC㊦ フロアブル,   |                  |                  |
|          | MY-100DC㊦-1kg 粒,   | MY-100NC-1kg 粒,    |                  |                  |
|          | MY-100TSC フロアブル,   | NBA-071-1kg 粒,     |                  |                  |
|          | NBA-071DEH-1kg 粒,  | NBA-073-1kg 粒,     |                  |                  |
|          | NBA-074-1kg 粒,     | NBA-093(改) ジャンボ,   |                  |                  |
|          | NBA-101SB ジャンボ,    | NBA-131b-1kg 粒,    |                  |                  |
|          | NC-385 顆粒水和,       | NC-385SB 顆粒水和,     |                  |                  |
|          | NC-385SB-1kg 粒,    | NC-397-1kg 粒,      |                  |                  |
|          | NC-604 フロアブル,      | NC-606-1kg 粒,      |                  |                  |
|          | NCH-903DEH ジャンボ,   | NH-003-1kg 粒,      |                  |                  |
|          | NH-101 ジャンボ,       | NH-102 フロアブル,      |                  |                  |
|          | NH-104-1kg 粒,      | NH-301-1kg 粒,      |                  |                  |
|          | NH-302 フロアブル,      | NH-806 ジャンボ,       |                  |                  |
|          | NHF-401 粒,         | NOJ-101-1kg 粒,     |                  |                  |
|          | NOJ-103-1kg 粒,     | NOJ-104-1kg 粒,     |                  |                  |
|          | ONC-381 ジャンボ,      | PSS㊦D-1kg 粒,       |                  |                  |
|          | SB-526 フロアブル,      | SB-526-1kg 粒,      |                  |                  |
|          | SB-533P5(改) ジャンボ,  | SB-554 ジャンボ,       |                  |                  |
|          | SB-554 フロアブル,      | SB-556 フロアブル,      |                  |                  |
|          | SB-559㊦-1kg 粒,     | SB-559㊦-1kg 粒,     |                  |                  |
|          | SB-563㊦-1kg 粒,     | SB-563㊦-1kg 粒,     |                  |                  |

| 区 分          | 実・継                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 継                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|
| A-1 一発処理 つづき | SST-402-1kg 粒, SW-002①フロアブル,<br>SW-005フロアブル, SW-005①フロアブル,<br>SW-012⑩-1kg 粒, SW-012①-1kg 粒,<br>SW-023⑩-1kg 粒, SW-023①-1kg 粒,<br>SW-024⑩ジャンボ, SW-024①ジャンボ,<br>SW-031①-1kg 粒, SW-032フロアブル,<br>SW-032①フロアブル, SW-041⑩-1kg 粒,<br>SW-041①-1kg 粒, SW-042①ジャンボ,<br>SW-991-1kg 粒, SYJ-108ジャンボ,<br>SYJ-150フロアブル, TH-001ジャンボ,<br>TH-001フロアブル, TH-001-1kg 粒,<br>TH-001①フロアブル, TH-005ジャンボ,<br>TH-122-1kg 粒, TH-421ジャンボ,<br>TH-913CSジャンボ, THI-913CSジャンボ,<br>YH-546フロアブル, YH-641-1kg 粒,<br>YH-652フロアブル, YH-652-1kg 粒,<br>YH-655-1kg 粒 |  |                                                          |
| A-2 体系(初期)   | AVH-006フロアブル, CG-113 EW,<br>CG-113(改)ジャンボ, CG-113-1kg 粒,<br>G-315B 乳(少量散布),<br>HSW-012フロアブル(少量散布),<br>KH-152-A 粒, KH-183①-1kg 粒,<br>KPP-2005⑩フロアブル(少量散布),<br>KPP-2008-1kg 粒, KPP-2011フロアブル,<br>SB-528①フロアブル, SB-529-1kg 粒,<br>SB-566フロアブル, SB-566-1kg 粒,<br>YH-650フロアブル, YH-650-1kg 粒,<br>YH-651フロアブル, フタクロール乳,<br>フタクロール-1kg 粒                                                                                                                                                                                        |  | KPP-2012フロアブル, NC-611フロアブル,<br>YH-651-1kg 粒              |
| A-3 体系(中後期)  | DASH-001 SC, DBH-1291 乳,<br>DEH-112-1kg 粒, KPP-444-1kg 粒,<br>KPP-444①-1kg 粒, KUH-003Dジャンボ,<br>KUH-983-1kg 粒, MCP・BAS(Na) 粒,<br>MY-100DCフロアブル, MY-100DC-1kg 粒,<br>MY-100DC①フロアブル, MY-100DC①-1kg 粒,<br>MY-100NC-1kg 粒, MY-100NDC-1kg 粒,<br>MY-100TSCフロアブル, NBA-073-1kg 粒,<br>NC-329-1kg 粒, NC-390フロアブル,<br>NH-003-1kg 粒, NH-803フロアブル,<br>NOJ-101-1kg 粒, NOJ-103-1kg 粒,<br>NOJ-104-1kg 粒, SB-554ジャンボ,<br>SB-554フロアブル, SW-012①-1kg 粒,<br>TH-001フロアブル, TH-001-1kg 粒,<br>TH-913⑩粒, YH-641-1kg 粒,<br>YH-653-1kg 粒             |  | KUH-031 粒, NC-612-1kg 粒,<br>SL-0401-1kg 粒, SL-0402-1kg 粒 |
| A-4 イボクサ     | KUH-911 液, SB-533P5(改)ジャンボ,<br>SB-556フロアブル, SW-991-1kg 粒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | SB-554フロアブル, SW-005フロアブル,<br>SW-005①フロアブル                |

| 区 分          | 実・継                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 継                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A-4 オモダカ     | AC-014A-1kg 粒,<br>KUH-013D-0.25kg 粒,<br>MK-243D-1kg 粒,<br>Mon-923①-1kg 粒,<br>NBA-131a-1kg 粒,<br>NC-385SB 顆粒水和,<br>NH-102 フロアブル,<br>NOJ-103-1kg 粒,<br>SW-002① フロアブル,                                                                                                                               | KUH-003D ジャンボ,<br>KUH-013K-0.25kg 粒,<br>Mon-923-1kg 粒,<br>MY-100NC 顆粒水和,<br>NBA-131b-1kg 粒,<br>NH-101 ジャンボ,<br>NH-104-1kg 粒,<br>NOJ-104-1kg 粒,<br>YH-641-1kg 粒                                                                                                                                  | DASH-001 SC,<br>KPP-444①-1kg 粒,<br>KUH-011K-1kg 粒,<br>KUH-013K-1kg 粒,<br>KUH-031 粒,<br>SW-005 フロアブル,<br>SW-012④-1kg 粒,<br>SW-023④-1kg 粒,<br>SW-024④ ジャンボ,<br>SW-041④-1kg 粒,<br>SYJ-108 ジャンボ,<br>YH-652-1kg 粒                                                                                                 | KPP-444-1kg 粒,<br>KUH-011D-1kg 粒,<br>KUH-013D-1kg 粒,<br>KUH-021-1kg 粒,<br>NBA-093(改) ジャンボ,<br>SW-005① フロアブル,<br>SW-012①-1kg 粒,<br>SW-023①-1kg 粒,<br>SW-024① ジャンボ,<br>SW-041①-1kg 粒,<br>YH-652 フロアブル,                                                                                           |
| A-4 クサネム     | KUH-911 液                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A-4 クログワイ    | AC-014A-1kg 粒,<br>FSS-115 粒,<br>KPP-2005④ フロアブル,<br>KUH-003D ジャンボ,<br>KUH-013K-0.25kg 粒,<br>MK-243D-1kg 粒,<br>Mon-923①-1kg 粒,<br>MY-100DC①-1kg 粒,<br>MY-100NDC-1kg 粒,<br>NBA-131a-1kg 粒,<br>NC-390 フロアブル,<br>NH-102 フロアブル,<br>NOJ-103-1kg 粒,<br>SW-002① フロアブル,<br>TH-001① フロアブル,<br>YH-651 フロアブル, | AVH-002-1kg 粒,<br>KPP-2005 ジャンボ,<br>KPP-2008 乳(EW),<br>KUH-013D-0.25kg 粒,<br>KUH-985① フロアブル,<br>Mon-923-1kg 粒,<br>MY-100DC① フロアブル,<br>MY-100NC-1kg 粒,<br>NBA-071-1kg 粒,<br>NBA-131b-1kg 粒,<br>NH-101 ジャンボ,<br>NH-104-1kg 粒,<br>NOJ-104-1kg 粒,<br>TH-001 フロアブル,<br>YH-641-1kg 粒,<br>YH-652 フロアブル | DASH-001 SC,<br>HOK-223 フロアブル,<br>KPP-2011 フロアブル,<br>KPP-444①-1kg 粒,<br>KUH-011K-1kg 粒,<br>KUH-013K-1kg 粒,<br>MY-100TS フロアブル,<br>NBA-093(改) ジャンボ,<br>NC-604 フロアブル,<br>SB-529-1kg 粒,<br>SW-005 フロアブル,<br>SW-012④-1kg 粒,<br>SW-023④-1kg 粒,<br>SW-024④ ジャンボ,<br>SW-041④-1kg 粒,<br>SYJ-108 ジャンボ,<br>YH-653-1kg 粒 | HOK-0301-1kg 粒,<br>KPP-2008-1kg 粒,<br>KPP-444-1kg 粒,<br>KUH-011D-1kg 粒,<br>KUH-013D-1kg 粒,<br>KUH-021-1kg 粒,<br>MY-100TSC フロアブル,<br>NC-391① ジャンボ,<br>SB-528① フロアブル,<br>SB-554 フロアブル,<br>SW-005① フロアブル,<br>SW-012①-1kg 粒,<br>SW-023①-1kg 粒,<br>SW-024① ジャンボ,<br>SW-041①-1kg 粒,<br>YH-652-1kg 粒, |
| A-4 コウキヤガラ   | TH-001 フロアブル                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KUH-011D-1kg 粒,                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KUH-021-1kg 粒,                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A-4 シズイ      | AVH-002-1kg 粒,<br>NOJ-103-1kg 粒,<br>TH-001-1kg 粒,                                                                                                                                                                                                                                                 | MCP・BAS(Na) 粒,<br>SYJ-108 ジャンボ,<br>TH-005 ジャンボ                                                                                                                                                                                                                                                  | KPP-444-1kg 粒,<br>KUH-013K-1kg 粒,<br>NBA-131a-1kg 粒,<br>SB-554 フロアブル,                                                                                                                                                                                                                                        | KUH-011K-1kg 粒,<br>KUH-021-1kg 粒,<br>NC-604 フロアブル,<br>SW-005 フロアブル                                                                                                                                                                                                                             |
| A-4 ミズアオイ    | AVH-002-1kg 粒,<br>CG-113(改) ジャンボ,<br>NC-397-1kg 粒,<br>YH-546 フロアブル,                                                                                                                                                                                                                               | CG-113 EW,<br>NBA-131a-1kg 粒,<br>TH-005 ジャンボ,<br>YH-641-1kg 粒                                                                                                                                                                                                                                   | KUH-021-1kg 粒,<br>TH-001-1kg 粒,                                                                                                                                                                                                                                                                              | SYJ-156-1kg 粒,<br>YH-650 フロアブル                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A-4 SU-Rコナギ  | AC-014A-1kg 粒,<br>SW-041①-1kg 粒,                                                                                                                                                                                                                                                                  | KPP-2011 フロアブル,<br>YH-641-1kg 粒                                                                                                                                                                                                                                                                 | BAG-032 ジャンボ,<br>KUH-021-1kg 粒,<br>SW-005① フロアブル,<br>SW-024① ジャンボ,                                                                                                                                                                                                                                           | KUH-011D-1kg 粒,<br>SW-002① フロアブル,<br>SW-023①-1kg 粒,<br>SW-032① フロアブル                                                                                                                                                                                                                           |
| A-4 SU-Rホタルイ | AVH-002-1kg 粒,<br>CG-113 EW,<br>NBA-131b-1kg 粒,<br>SW-024④ ジャンボ,                                                                                                                                                                                                                                  | BAG-032 ジャンボ,<br>KUH-011D-1kg 粒,<br>SW-002 フロアブル,<br>SW-024① ジャンボ,                                                                                                                                                                                                                              | KPP-2011 フロアブル,<br>KPP-444①-1kg 粒,<br>SW-005 フロアブル,<br>SW-023④-1kg 粒,                                                                                                                                                                                                                                        | KPP-444-1kg 粒,<br>KUH-011K-1kg 粒,<br>SW-005① フロアブル,<br>SW-023①-1kg 粒,                                                                                                                                                                                                                          |

| 区 分              | 実・継                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  | 継                                                                                                                              |                                                                                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A-4 SU-Rホタルイ つづき | SW-041㊸-1kg 粒,<br>TH-001フロアブル                                                                                                                                                     | SW-041㊹-1kg 粒,                                                                                                                                                   | SW-032フロアブル,<br>SYJ-156-1kg 粒                                                                                                  | SW-032㊹フロアブル,                                                                                                      |
| B 直播栽培           | KUH-011D-1kg 粒,<br>KUH-013D-0.25kg 粒,<br>KUH-962-1kg 粒,<br>KUH-983-1kg 粒,<br>MY-100DC㊹フロアブル,<br>NBA-071-1kg 粒,<br>NH-102フロアブル,<br>SW-002フロアブル,<br>SW-973-1kg 粒,<br>TH-913NCSフロアブル | KUH-011K-1kg 粒,<br>KUH-013K-0.25kg 粒,<br>KUH-972Dフロアブル,<br>KUH-985㊹フロアブル,<br>MY-100TSCフロアブル,<br>NC-385SB 顆粒水和,<br>SB-556フロアブル,<br>SW-002㊹フロアブル,<br>SW-991-1kg 粒, | HOK-221 ジャンボ,<br>KPP-2008 乳(EW),<br>KUH-013D ジャンボ,<br>KUH-013K-1kg 粒,<br>NBA-071DEH-1kg 粒,<br>NOJ-101-1kg 粒,<br>SW-012㊸-1kg 粒, | HOK-225-1kg 粒,<br>KUH-004D-1kg 粒,<br>KUH-013D-1kg 粒,<br>MY-100DCフロアブル,<br>NC-331 水和,<br>NOJ-104-1kg 粒,<br>ZK-122 液 |
| C 畦畔             | AH-01 液,                                                                                                                                                                          | ZK-122 液                                                                                                                                                         | MCP-Na 液,<br>NC-622 液                                                                                                          | MRS-195 液,                                                                                                         |
| D 耕起前            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | AH-01 液                                                                                                                        |                                                                                                                    |
| E 休耕田            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | NC-622 液                                                                                                                       |                                                                                                                    |
| その他              | DEH-112 乳(EW)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                    |

注): 1) 本年度新規に使用基準を作成されたものは、薬剤名にアンダーラインを記した。

2) 本年度は「実」、「継?」及び「中止」と判定された薬剤はなかった。

※ 薬剤名はアルファベット順に記載した。

この草はなんだろう? 手軽に調べたい。

## 三二雑草図鑑

——耕地雑草ハンドブック——

廣田伸七／著

A5判 定価2,200円＋税

耕地には主要なものだけで150種を超える雑草が生えてきます。これら雑草の防除の第一歩は草を知ることです。本書は、農耕地や樹園地などによく見られる雑草500種を収録し、主要種は、幼植物・生育中期・成植物と生育段階を追った写真を掲載。また、似た草の見分け方を記載した、身近な植物を調べるための最適な図鑑です。

## 原色 芽ばえとたね 図鑑

浅野 貞夫／著

A4判 定価9,800円＋税

芽ばえの姿はどうなんだろう。本書は、植物の芽ばえのようすを克明に表した精密図版と、種・成植物の写真を組み合わせた植物の一生図鑑です。成植物のみの図鑑と異なり、芽ばえのようすから紹介しているため、植生などの調査にたいへん役に立つとの声が寄せられています。

全国農村教育協会

〒110-0016 東京都台東区台東1-26-6  
TEL.03-3833-1821 FAX.03-3833-1665

## 平成16年度 水稻関係除草剤使用基準一覧表

## A 移植栽培

## A-1 一発処理

A-1

AC-014R ジャンボ

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期     | 使用量<br>/10a         | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|-----|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|----------|---------------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○2  | ○                  | ○2   | ○始         |            | ○2   |       | ○前※  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +3～ノビエ2L | 20g×10 <sup>2</sup> | ○       | ○             |
| 東北    | ○2  | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○始   | ○前※   | ○前※  | ○発生<br>期 |            | ○前              |          |                     | ○       | ○             |
| 北陸    | ○2  | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○始   |       | ○前※  | ○発生<br>期 |            |                 |          |                     | ○       | ○             |
| 関東・東海 | ○2  | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○始   | ○前※   | ○前※  | ○発生<br>期 |            | ○前              |          |                     | ○       | ○             |
| 近・中・四 | ○2  | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   | ○前※   | ○前※  | ○発生<br>期 |            | ○前              |          |                     | ○       | ○             |
| 九州    | ○2  | ○                  | ○2   | ○前         | ○2         | ○始   | ○前※   | ○前※  | ○発生<br>期 |            | ○前              |          |                     | ○       | ○             |

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。  
 減水深: 2cm/日以下  
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。  
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。  
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。  
 オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

AVH-002-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○1.5 | ○                  | ○始   | ○始         |            | ○始   |       | ○前※  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +3～ノビエ1.5L | 1kg         | ○       | ○             |
| 東北    | ○1.5 | ○                  | ○始   | ○始         | ○始         | ○始   | ○前※   | ○前※  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |             | ●       | ○             |
| 北陸    | ○1.5 | ○                  | ○始   |            | ○始         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |             | ○       | ○             |
| 関東・東海 | ○1.5 | ○                  | ○始   |            | ○始         | ○始   | ●始※   |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |             | ○       | ○             |
| 近・中・四 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 九州    |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。  
 減水深: 2cm/日以下  
 使用上の注意: オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

BAG-021 ジャンボ

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期     | 使用量<br>/10a         | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|-----|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|----------|---------------------|---------|---------------|
| 北海道   |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 | +1～ノビエ2L | 25g×10 <sup>2</sup> |         |               |
| 東北    | ○2  | ○                  | ○始   | ○始         | ○始         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 |            | ○前              |          |                     |         | ○             |
| 北陸    | ○2  | ○                  | ○始   |            | ○始         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 |            |                 |          |                     |         | ○             |
| 関東・東海 | ○2  | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ○前              |          |                     | ○       | ○             |
| 近・中・四 |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |                     |         |               |
| 九州    |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |                     |         |               |

減水深: 2cm/日以下  
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。  
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

A-1  
BAG-032 ジェンボ

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘオモ<br>タカ | ミズガ<br>ツリ | ウリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期        | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|-----|-------------------|------|-----------|-----------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|-------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   | ●2  | ●                 | ●始   | ●始        |           | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | +3～ノビエ2L    | 20g×10コ     |         | ●             |
| 東北    | ●2  | ●                 | ●2   | ●始        | ●始        | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |             |             |         | ●             |
| 北陸    | ●2  | ●                 | ●2   |           | ●始        | ●始   |       |      | ●発生<br>期 |            | ●前              |             |             |         | ●             |
| 関東・東海 | ●2  | ●                 | ●2   |           | ●2        | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | SU抵抗性ホタルイ2L |             | ●       | ●             |
| 近・中・四 | ●2  | ●                 | ●2   |           | ●2        | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |             |             |         | ●             |
| 九州    | ●2  | ●                 | ●2   |           | ●2        | ●2   |       |      | ●発生<br>期 |            |                 |             |             |         | ●             |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な葉害や効果不足が生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1  
BCH-031-1kg 粒

| 地域名       | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘオモ<br>タカ | ミズガ<br>ツリ | ウリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-----------|------|-------------------|------|-----------|-----------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道       | ●2.5 | ●                 | ●2   | ●2        |           | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 | +5～ノビエ2.5L | 1kg         |         | ●             |
| 東北        | ●2.5 | ●                 | ●2   | ●始        | ●始        | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 |            |             |         | ●             |
| 北陸        |      |                   |      |           |           |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 関東・東海     | ●2.5 | ●                 | ●2   |           | ●2        | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 | +5～ノビエ2.5L |             |         | ●             |
| 近・中・四 (昔) | ●2.5 | ●                 | ●2   |           | ●2        | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 |            |             |         | ●             |
| 九州        | ●2.5 | ●                 | ●2   |           | ●2        | ●2   |       |      | ●発生<br>期 |            |                 |            |             |         | ●             |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1  
BCH-032-1kg 粒

| 地域名       | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘオモ<br>タカ | ミズガ<br>ツリ | ウリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-----------|------|-------------------|------|-----------|-----------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道       | ●2.5 | ●                 | ●2   | ●2        |           | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 | +5～ノビエ2.5L | 1kg         |         | ●             |
| 東北        | ●2.5 | ●                 | ●2   | ●2        | ●2        | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 |            |             |         | ●             |
| 北陸        | ●2.5 | ●                 | ●2   |           | ●2        | ●2   |       |      | ●発生<br>期 |            |                 |            |             |         | ●             |
| 関東・東海     | ●2.5 | ●                 | ●2   |           | ●2        | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 |            |             |         | ●             |
| 近・中・四 (昔) | ●2.5 | ●                 | ●2   |           | ●2        | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 |            |             |         | ●             |
| 九州        |      |                   |      |           |           |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-1  
BCH-033-1kg 粒

| 地域名       | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘオモ<br>タカ | ミズガ<br>ツリ | ウリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-----------|------|-------------------|------|-----------|-----------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道       | ●2.5 | ●                 | ●2   | ●2        |           | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 | +5～ノビエ2.5L | 1kg         |         | ●             |
| 東北        | ●2.5 | ●                 | ●2   | ●始        | ●2        |      |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 |            |             |         | ●             |
| 北陸        | ●2.5 | ●                 | ●2   |           | ●始        | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 |            |             |         | ●             |
| 関東・東海     | ●2.5 | ●                 | ●2   |           | ●2        | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 |            |             |         | ●             |
| 近・中・四 (昔) | ●2.5 | ●                 | ●2   |           | ●2        | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 |            |             |         | ●             |
| 九州        | ●2.5 | ●                 | ●2   |           | ●2        | ●2   |       |      | ●発生<br>期 |            |                 |            |             |         | ●             |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1  
BCH-044-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハヤ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   | ●2.5 | ●                  | ●2   | ●2         |            | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | +0～ノビエ2.5L | 1kg         |         | ●             |
| 東北    | ●2.5 | ●                  | ●2   | ●2         | ●2         | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |             |         | ●             |
| 北陸    | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |             |         | ●             |
| 関東・東海 | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |             |         | ●             |
| 近・中・四 | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |             |         | ●             |
| 九州    | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |             |         | ●             |

減水深: 2cm/日以下  
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1  
BCH-045H-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハヤ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   | ●2.5 | ●                  | ●2   | ●2         |            | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | +0～ノビエ2.5L | 1kg         |         | ●             |
| 東北    | ●2.5 | ●                  | ●2   | ●2         | ●2         | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |             |         | ●             |
| 北陸    |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 関東・東海 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 近・中・四 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 九州    |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |

減水深: 2cm/日以下  
 使用上の注意:

A-1  
BCH-045L-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハヤ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 | +0～ノビエ2.5L | 1kg         |         |               |
| 東北    |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 北陸    | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |             |         | ●             |
| 関東・東海 | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 |            |             |         | ●             |
| 近・中・四 | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |             |         | ●             |
| 九州    | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |             |         | ●             |

減水深: 2cm/日以下  
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1  
DKH-311-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハヤ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   | ●2.5 | ●                  | ●2   | ●2         |            | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | +3～ノビエ2.5L | 1kg         |         | ●             |
| 東北    | ●2.5 | ●                  | ●2   | ●始         | ●2         | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |             |         | ●             |
| 北陸    |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 関東・東海 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 近・中・四 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 九州    |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |

減水深: 2cm/日以下  
 使用上の注意:

A-1  
HOK-0301-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌<br>土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 北海道   | ●2.5 | ●                 | ●2   | ●2         |            | ●始   |       |      | ●発生<br>期 |            | ●前              | +5～ノビエ2.5L | 1kg         |             | ●             |
| 東北    | ●2.5 | ●                 | ●2   | ●始         | ●2         | ●始   |       |      | ●発生<br>期 |            |                 |            |             |             | ●             |
| 北陸    | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●始         | ●始   |       |      | ●発生<br>期 |            |                 |            |             |             | ●             |
| 関東・東海 | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 |            |                 |            |             |             | ●             |
| 近・中・四 | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2         | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |             |             | ●             |
| 九州    | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 |            | ●前              |            |             | ●           | ●             |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。A-1  
HOK-0401 ジェンボ

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期     | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌<br>土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|-----|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|----------|-------------|-------------|---------------|
| 北海道   |     |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          | 50g×10回     |             |               |
| 東北    | ●2  | ●                 | ●2   | ●始         | ●始         | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 | +1～ノビエ2L |             |             | ●             |
| 北陸    |     |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |             |             |               |
| 関東・東海 |     |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |             |             |               |
| 近・中・四 |     |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |             |             |               |
| 九州    |     |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |             |             |               |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

A-1  
HOK-0401 フロアブル

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌<br>土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 北海道   |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            | 500ml       |             |               |
| 東北    | ●2.5 | ●                 | ●2   | ●始         | ●2         | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | +0～ノビエ2.5L |             |             | ●             |
| 北陸    |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |             |               |
| 関東・東海 |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |             |               |
| 近・中・四 |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |             |               |
| 九州    |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |             |               |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-1  
HOK-221 ジェンボ

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期     | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌<br>土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|-----|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|----------|-------------|-------------|---------------|
| 北海道   |     |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          | 50g×10回     |             |               |
| 東北    |     |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |             |             |               |
| 北陸    | ○2  | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 | +1～ノビエ2L |             | ●           | ○             |
| 関東・東海 | ○2  | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |          |             | ○           | ○             |
| 近・中・四 | ○2  | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ●前              |          |             | ○           | ○             |
| 九州    | ○2  | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |          |             | ●           | ○             |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。  
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1  
HOK-222 ジャンボ

| 地域名                                                                                   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>タカ | ミズガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期     | 使用量<br>/10a         | 砂<br>壌土 | 埴<br>土 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|----------|---------------------|---------|--------|
| 北海道                                                                                   |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          | 50g×10 <sup>3</sup> |         |        |
| 東北                                                                                    | ●2  | ●                  | ●2   |            | ●始         | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  | +1～ノビエ2L |                     |         | ●      |
| 北陸                                                                                    |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          |                     |         |        |
| 関東・東海                                                                                 |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          |                     |         |        |
| 近・中・四                                                                                 |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          |                     |         |        |
| 九州                                                                                    |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          |                     |         |        |
| 減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。<br>散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。 |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |          |                     |         |        |

A-1  
HOK-222 フロアブル

| 地域名              | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>タカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道              | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○2         |            | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  | +0～ノビエ2.5L | 500ml       | ●       | ○             |
| 東北               | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○2         | ○2         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  | +0～ノビエ2.5L |             | ●       | ○             |
| 北陸               |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |               |
| 関東・東海            |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |               |
| 近・中・四            |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |               |
| 九州               |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |               |
| 田植同時散布可能(北海道、東北) |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |               |
| 減水深: 2cm/日以下     |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |               |
| 使用上の注意:          |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |               |

A-1  
HOK-222-1kg 粒

| 地域名                                                     | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>タカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|---------------------------------------------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道                                                     | ●2.5 | ●                  | ●2   | ●2         |            | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  | +5～ノビエ2.5L | 1kg         |         | ●             |
| 東北                                                      | ●2.5 | ●                  | ●2   | ●始         | ●始         |      |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 |  |            |             |         | ●             |
| 北陸                                                      |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |               |
| 関東・東海                                                   |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |               |
| 近・中・四                                                   |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |               |
| 九州                                                      |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |               |
| 減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: 低温等による活着不良の場合には被害が生じることがある。(東北) |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |               |

A-1  
HOK-223 フロアブル

| 地域名                                   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>タカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>埴土 |   |
|---------------------------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|------------|-------------|---------|----------|---|
| 北海道                                   |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  | +0～ノビエ2.5L | 500ml       |         |          |   |
| 東北                                    |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |          |   |
| 北陸                                    | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |  |            |             |         | ○        | ○ |
| 関東・東海                                 | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |  |            |             |         | ○        | ○ |
| 近・中・四                                 | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  |            |             |         | ●        | ○ |
| 九州                                    | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ●前              |  |            |             |         | ●        | ○ |
| 田植同時散布可能(関東・東海、近畿・中国・四国)              |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |          |   |
| 減水深: 2cm/日以下                          |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |          |   |
| 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |          |   |
| 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。                |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |          |   |

A-1  
HOK-223-1kg 粒

| 地域名                                                                             | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズカヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道                                                                             |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            | 1kg         |         |               |
| 東北                                                                              |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 北陸                                                                              | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | +5～ノビエ2.5L |             |         | ●             |
| 関東・東海                                                                           | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |             |         | ●             |
| 近・中・四                                                                           | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |             |         | ●             |
| 九州                                                                              | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |             | ●       | ●             |
| 減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。<br>田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |

A-1  
HOK-225-1kg 粒

| 地域名                     | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズカヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期     | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------------------------|-----|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|----------|-------------|---------|---------------|
| 北海道                     |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          | 1kg         |         |               |
| 東北                      |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |             |         |               |
| 北陸                      | ●3  | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 |            | ●前              | +5～ノビエ3L |             |         | ●             |
| 関東・東海                   | ●3  | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |          |             |         | ●             |
| 近・中・四                   | ●3  | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |          |             |         | ●             |
| 九州                      |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |             |         |               |
| 減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |             |         |               |

A-1  
HOK-991 シャンボ

| 地域名                                                                                                                                              | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズカヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                    | 使用量<br>/10a         | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|-------|----|-----------------|-------------------------|---------------------|---------|---------------|
| 北海道                                                                                                                                              | ○1.5 | ○                  | ○始   | ○始         |            |      |       |      |       |    |                 | +3～ノビエ1.5L              | 50g×10 <sup>2</sup> |         | ○             |
| 東北                                                                                                                                               | ○1.5 | ○                  | ○始   | ○始         | ○始         |      |       |      |       |    |                 |                         |                     |         | ○             |
| 北陸                                                                                                                                               | ○1.5 | ○                  | ○始   |            | ○始         |      |       |      |       |    |                 |                         |                     |         | ○             |
| 関東・東海                                                                                                                                            | ○1.5 | ○                  | ○始   |            | ○前         | ○始   |       |      |       |    |                 |                         |                     | ○       | ○             |
| 近・中・四                                                                                                                                            | ○1.5 | ○                  | ○始   |            | ○始         | ○始   |       |      |       |    |                 | +1～ノビエ1.5L(砂<br>壌土は+3～) |                     | ○       | ○             |
| 九州                                                                                                                                               | ○1.5 | ○                  | ○始   |            | ○始         | ○始   |       |      |       |    |                 | +3～ノビエ1.5L              |                     | ○       | ○             |
| 減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。<br>散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。<br>散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。<br>田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。 |      |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |                         |                     |         |               |

A-1  
KPP-444-1kg 粒

| 地域名                                         | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズカヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|---------------------------------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道                                         | ●1.5 | ●                  | ●始   | ●始         |            | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | +0～ノビエ1.5L | 1kg         |         | ●             |
| 東北                                          | ●1.5 | ●                  | ●始   | ●始         | ●始         | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |             |         | ●             |
| 北陸                                          |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 関東・東海                                       |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 近・中・四                                       |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 九州                                          |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 田植同時散布可能(北海道,東北)<br>減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |

A-1  
KPP-444Q-1kg 粒

| ノビエ 4440/1kg 粒                                                  |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |               |  |   |
|-----------------------------------------------------------------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|------------|-------------|---------|---------------|--|---|
| 地域名                                                             | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |  |   |
| 北海道                                                             |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  | +0～ノビエ1.5L | 1kg         |         |               |  |   |
| 東北                                                              |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |               |  |   |
| 北陸                                                              | ●1.5 | ●                 | ●始   |            | ●始         | ●始   |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |               |  | ● |
| 関東・東海                                                           | ●1.5 | ●                 | ●始   |            | ●始         | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 |  |            |             |         |               |  | ● |
| 近・中・四                                                           | ●1.5 | ●                 | ●始   |            | ●前         | ●前   |       |      |          | ●再生<br>前～始 | ●前              |  |            |             |         |               |  | ● |
| 九州                                                              | ●1.5 | ●                 | ●始   |            | ●始         | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  |            |             | ●       | ●             |  |   |
| 田植同時散布可能(関東・東海・近畿・中国・四国・九州)                                     |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |               |  |   |
| 減水深: 2cm/日以下                                                    |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |               |  |   |
| 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。<br>田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。 |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |               |  |   |

A-1  
KUH-003D ジャンボ

| 地域名                                                                                                                                                                | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a         | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|---------------------|---------|---------------|---|
| 北海道                                                                                                                                                                |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            | 25g×10 <sup>3</sup> |         |               |   |
| 東北                                                                                                                                                                 |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |                     |         |               |   |
| 北陸                                                                                                                                                                 | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ●発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ●前              | ±1～ノビエ2.5L |                     |         | ○             | ○ |
| 関東・東海                                                                                                                                                              | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   | ●始※   | ●始※  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 | +3～ノビエ2.5L |                     |         | ○             | ○ |
| 近・中・四                                                                                                                                                              | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   | ●始    | ●始   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | ±1～ノビエ2.5L |                     |         | ○             | ○ |
| 九州                                                                                                                                                                 | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○前         | ○2         | ○2   | ●始※   | ●始※  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +3～ノビエ2.5L |                     | ○       | ○             |   |
| ※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。                                                                                                                 |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |                     |         |               |   |
| 減水深: 2cm/日以下                                                                                                                                                       |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |                     |         |               |   |
| 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。<br>散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。<br>散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。<br>田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。<br>オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |                     |         |               |   |

A-1  
KUH-003K ジャンボ

| 地域名                                                                                   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a         | 砂<br>壌土 | 壤土<br>埴土 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|---------------------|---------|----------|--|
| 北海道                                                                                   | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○始         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +3～ノビエ2.5L | 25g×10 <sup>3</sup> | ○       | ○        |  |
| 東北                                                                                    | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○始         | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |                     | ○       | ○        |  |
| 北陸                                                                                    |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |                     |         |          |  |
| 関東・東海                                                                                 |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |                     |         |          |  |
| 近・中・四                                                                                 |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |                     |         |          |  |
| 九州                                                                                    |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |                     |         |          |  |
| 減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。<br>散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。 |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |                     |         |          |  |

A-1  
KUH-004D-1kg 粒

| 地域名                                                                                             | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期     | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|----------|-------------|---------|---------------|---|
| 北海道                                                                                             |     |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          | 1kg         |         |               |   |
| 東北                                                                                              |     |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |             |         |               |   |
| 北陸                                                                                              | ○3  | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   | ○始※   |      |          | ○再生<br>前～始 |                 | +0～ノビエ3L |             |         | ○             | ○ |
| 関東・東海                                                                                           | ○3  | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   | ○始※   | ○始※  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |          |             |         | ○             | ○ |
| 近・中・四                                                                                           | ○3  | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   | ○始※   | ○始   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |          |             |         | ○             | ○ |
| 九州                                                                                              | ○3  | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   | ○始※   | ○始※  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |          |             | ○       | ○             |   |
| ※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。                                              |     |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |             |         |               |   |
| 減水深: 2cm/日以下                                                                                    |     |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |             |         |               |   |
| 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。<br>田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。<br>オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。 |     |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |             |         |               |   |

A-1  
KUH-011D-1kg 粒

| 地域名                                                                                         | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ'ヤ<br>ツツ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期        | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------|------------|--------------|------|--------|------|----------|------------|-----------------|-------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道                                                                                         |      |                   |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |             | 1kg         |         |               |
| 東北                                                                                          |      |                   |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |             |             |         |               |
| 北陸                                                                                          | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2           | ○2   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +0～ノビエ2.5L  |             | ○       | ○             |
| 関東・東海                                                                                       | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2           | ○2   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | SU抵抗性ホタルイ2L |             | ○       | ○             |
| 近・中・四                                                                                       | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2           | ○2   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |             |             | ○       | ○             |
| 九州                                                                                          | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○前         | ○2           | ○2   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |             |             | ○       | ○             |
| 田植同時散布可能<br>減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。<br>田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。 |      |                   |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |             |             |         |               |

A-1  
KUH-011K-1kg 粒

| 地域名                                 | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ'ヤ<br>ツツ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------------------------------------|------|-------------------|------|------------|--------------|------|--------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道                                 | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○2         |              | ○2   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +0～ノビエ2.5L | 1kg         | ○       | ○             |
| 東北                                  | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○始         | ○2           | ○2   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |             | ○       | ○             |
| 北陸                                  |      |                   |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 関東・東海                               |      |                   |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 近・中・四                               |      |                   |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 九州                                  |      |                   |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 田植同時散布可能<br>減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: |      |                   |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |            |             |         |               |

A-1  
KUH-013D ジェンボ

| 地域名                                                                                                                                              | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ'ヤ<br>ツツ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a         | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------|------------|--------------|------|--------|------|----------|------------|-----------------|------------|---------------------|---------|---------------|
| 北海道                                                                                                                                              |      |                   |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |            | 25g×10 <sup>2</sup> |         |               |
| 東北                                                                                                                                               |      |                   |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |            |                     |         |               |
| 北陸                                                                                                                                               | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2           | ○2   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 | +3～ノビエ2.5L |                     | ○       | ○             |
| 関東・東海                                                                                                                                            | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2           | ○2   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |            |                     | ○       | ○             |
| 近・中・四                                                                                                                                            | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2           | ○2   |        |      |          | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |                     | ●       | ○             |
| 九州                                                                                                                                               | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2           | ○2   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |                     | ○       | ○             |
| 減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。<br>散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。<br>散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。<br>田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。 |      |                   |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |            |                     |         |               |

A-1  
KUH-013D-0.25kg 粒

| 地域名                                                                                                                                                                                                                                    | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ'ヤ<br>ツツ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------|------------|--------------|------|--------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道                                                                                                                                                                                                                                    |      |                   |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |            | 250g        |         |               |
| 東北                                                                                                                                                                                                                                     |      |                   |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 北陸                                                                                                                                                                                                                                     | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2           | ○2   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +0～ノビエ2.5L |             | ○       | ○             |
| 関東・東海                                                                                                                                                                                                                                  | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2           | ○2   | ●始※    | ●始※  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |             | ○       | ○             |
| 近・中・四                                                                                                                                                                                                                                  | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2           | ○2   | ●始※    | ●始   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ●前              |            |             | ○       | ○             |
| 九州                                                                                                                                                                                                                                     | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2           | ○2   | ●始※    | ●始※  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |             | ○       | ○             |
| ※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>湛水周縁部散布可能<br>減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: 湛水周縁部散布では藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足を生じることがある。<br>散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。<br>田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。<br>オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。 |      |                   |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |            |             |         |               |

A-1  
KUH-013D-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                  | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|-----|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   |     |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                       | 1kg         |         |               |
| 東北    |     |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                       |             |         |               |
| 北陸    | ○3  | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | ±0～ノビエ3L(砂<br>壌土は+3～) |             | ●       | ○             |
| 関東・東海 | ○3  | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | ±0～ノビエ3L              |             | ●       | ○             |
| 近・中・四 | ○3  | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                       |             | ○       | ○             |
| 九州    | ○3  | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                       |             | ○       | ○             |

減水深: 2cm/日以下  
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
 田植前に生育したミスガヤツリには効果がある。

A-1  
KUH-013K シャンボ

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a         | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|---------------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○始         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +3～ノビエ2.5L | 25g×10 <sup>3</sup> | ●       | ○             |
| 東北    | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○2         | ○2         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |                     | ○       | ○             |
| 北陸    |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |                     |         |               |
| 関東・東海 |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |                     |         |               |
| 近・中・四 |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |                     |         |               |
| 九州    |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |                     |         |               |

減水深: 2cm/日以下  
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。  
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。

A-1  
KUH-013K-0.25kg 粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |           | 処理時期                    | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |  |
|-------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|-----------|-------------------------|-------------|---------|---------------|--|
| 北海道   | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○始         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | ミスアオイ:1L  | +3～ノビエ2.5L              | 250g        | ○       | ○             |  |
| 東北    | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○始         | ○2         | ○2   | ●始※   | ●始※  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | シズイ:草丈3cm | +0～ノビエ2.5L(砂<br>壌土は+3～) |             | ○       | ○             |  |
| 北陸    |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |           |                         |             |         |               |  |
| 関東・東海 |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |           |                         |             |         |               |  |
| 近・中・四 |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |           |                         |             |         |               |  |
| 九州    |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |           |                         |             |         |               |  |

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。  
 湛水周縁部散布可能  
 減水深: 2cm/日以下  
 使用上の注意: 湛水周縁部散布では藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足を生じることがある。  
 オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1  
KUH-013K-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツバイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                  | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |  |
|-------|-----|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------|---------------|--|
| 北海道   | ○3  | ○                  | ○2   | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +3～ノビエ3L              | 1kg         | ●       | ○             |  |
| 東北    | ○3  | ○                  | ○2   | ○2         | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +0～ノビエ3L(砂<br>壌土は+3～) |             | ●       | ○             |  |
| 北陸    |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                       |             |         |               |  |
| 関東・東海 |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                       |             |         |               |  |
| 近・中・四 |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                       |             |         |               |  |
| 九州    |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                       |             |         |               |  |

減水深: 2cm/日以下  
 使用上の注意:

A-1  
KUH-021-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモダ'カ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                  | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|-----|-------------------|------|------------|------------|------|--------|-------|----------|------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○3  | ○                 | ○2   | ○2         |            | ○2   |        |       | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +3～ノビエ3L(砂<br>壌土は+7～) | 1kg         | ●       | ○             |
| 東北    | ○3  | ○                 | ○3   | ●始         | ○2         | ○2   |        |       | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                       |             | ●       | ○             |
| 北陸    | ○3  | ○                 | ○3   |            | ○2         | ○2   |        |       | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |                       |             | ●       | ○             |
| 関東・東海 | ○3  | ○                 | ○3   |            | ○3         | ○2   |        |       | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ●前              |                       |             | ●       | ○             |
| 近・中・四 | ○3  | ○                 | ○3   |            | ○2         | ○2   |        |       | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                       |             | ●       | ○             |
| 九州    | ○3  | ○                 | ○3   |            | ○3         | ○3   |        |       | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ●前              |                       |             | ●       | ○             |

減水深: 2cm/日以下  
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1  
KUH-023D ジャンボ

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモダ'カ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a         | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|------------|------|--------|-------|----------|------------|-----------------|------------|---------------------|---------|---------------|
| 北海道   |      |                   |      |            |            |      |        |       |          |            |                 |            | 25g×10 <sup>7</sup> |         |               |
| 東北    |      |                   |      |            |            |      |        |       |          |            |                 |            |                     |         |               |
| 北陸    | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2         | ●始   |        |       | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | +3～ノビエ2.5L |                     |         | ●             |
| 関東・東海 | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2         | ●2   |        |       | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 |            |                     |         | ●             |
| 近・中・四 | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2         | ●2   |        |       | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |                     | ●       | ●             |
| 九州    | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2         | ●2   |        |       | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |                     | ●       | ●             |

減水深: 2cm/日以下  
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。  
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。  
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1  
KUH-023D フロアブル

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモダ'カ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|------------|------|--------|-------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   |      |                   |      |            |            |      |        |       |          |            |                 |            | 500ml       |         |               |
| 東北    |      |                   |      |            |            |      |        |       |          |            |                 |            |             |         |               |
| 北陸    | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |        |       | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 | +3～ノビエ2.5L |             | ●       | ○             |
| 関東・東海 | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |        |       | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |            |             | ●       | ○             |
| 近・中・四 | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |        |       | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |             | ●       | ○             |
| 九州    | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |        |       | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |             | ○       | ○             |

減水深: 2cm/日以下  
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1  
KUH-023D-0.25kg 粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモダ'カ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|------------|------|--------|-------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   |      |                   |      |            |            |      |        |       |          |            |                 |            | 250g        |         |               |
| 東北    |      |                   |      |            |            |      |        |       |          |            |                 |            |             |         |               |
| 北陸    | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |        |       | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ●前              | +3～ノビエ2.5L |             | ●       | ○             |
| 関東・東海 | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |        |       | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |            |             | ●       | ○             |
| 近・中・四 | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |        |       | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |             | ○       | ○             |
| 九州    | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |        |       | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |             | ○       | ○             |

湛水周縁部散布可能  
 減水深: 2cm/日以下  
 使用上の注意: 湛水周縁部散布では藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足を生じることがある。  
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1  
KUH-023K シヤンボ'

| 地域名                                                                                   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハヤ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a         | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|---------------------|---------|---------------|
| 北海道                                                                                   | ●2.5 | ●                  | ●2   | ●2         |            | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | +5～ノビエ2.5L | 25g×10 <sup>2</sup> |         | ●             |
| 東北                                                                                    | ●2.5 | ●                  | ●2   | ●始         | ●2         | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |                     |         | ●             |
| 北陸                                                                                    |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |                     |         |               |
| 関東・東海                                                                                 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |                     |         |               |
| 近・中・四                                                                                 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |                     |         |               |
| 九州                                                                                    |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |                     |         |               |
| 減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。<br>散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |                     |         |               |

A-1  
KUH-023K フロアブル

| 地域名                     | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハヤ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道                     | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○2         |            | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +5～ノビエ2.5L | 500ml       | ●       | ○             |
| 東北                      | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |             | ●       | ○             |
| 北陸                      |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 関東・東海                   |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 近・中・四                   |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 九州                      |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |

A-1  
KUH-023K-0.25kg 粒

| 地域名                                                                                   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハヤ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道                                                                                   | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +5～ノビエ2.5L | 250g        | ●       | ○             |
| 東北                                                                                    | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |             | ●       | ○             |
| 北陸                                                                                    |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 関東・東海                                                                                 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 近・中・四                                                                                 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 九州                                                                                    |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 湛水周縁部散布可能<br>減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: 湛水周縁部散布では藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |

A-1  
KUH-032-0.25kg 粒

| 地域名                                                                                                                                              | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハヤ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期     | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|----|-----------------|----------|-------------|---------|---------------|
| 北海道                                                                                                                                              | ●2  | ●                  | ●2   | ●2         |            |      |       |      | ●発生<br>期 |    |                 | +3～ノビエ2L | 250g        |         | ●             |
| 東北                                                                                                                                               | ●2  | ●                  | ●2   | ●始         | ●始         |      |       |      | ●発生<br>期 |    |                 |          |             |         | ●             |
| 北陸                                                                                                                                               | ●2  | ●                  | ●2   |            | ●始         |      |       |      | ●発生<br>期 |    |                 |          |             |         | ●             |
| 関東・東海                                                                                                                                            | ●2  | ●                  | ●始   |            | ●2         |      |       |      | ●発生<br>期 |    |                 |          |             |         | ●             |
| 近・中・四                                                                                                                                            | ●2  | ●                  | ●2   |            | ●2         |      |       |      | ●発生<br>期 |    |                 |          |             | ●       | ●             |
| 九州                                                                                                                                               | ●2  | ●                  | ●2   |            | ●2         |      |       |      | ●発生<br>期 |    |                 |          |             | ●       | ●             |
| 湛水周縁部散布可能<br>減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: 湛水周縁部散布では藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。<br>散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。<br>田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。 |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |    |                 |          |             |         |               |

A-1  
KUH-985 フロアブル

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期     | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|-----|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|----------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○3  | ○                 | ○2   | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +5～ノビエ3L | 500ml       | ○       | ○             |
| 東北    | ○3  | ○                 | ○2   | ○前         | ○2         | ○2   | ○前※   | ○始※  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +0～ノビエ3L |             | ○       | ○             |
| 北陸    |     |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |             |         |               |
| 関東・東海 |     |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |             |         |               |
| 近・中・四 |     |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |             |         |               |
| 九州    |     |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |             |         |               |

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。  
田植同時散布可能(東北)  
減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意: オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1  
MK-243D-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +5～ノビエ2.5L | 1kg         |         | ○             |
| 東北    | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○2         | ○2         | ○始   | ●前※   | ●始※  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |             |         | ○             |
| 北陸    |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 関東・東海 |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 近・中・四 |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 九州    |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。  
減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意: オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1  
Mon-923-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                      | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|---------------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○1.5 | ○                 | ○始   | ○始         |            | ○始   |       | ●始   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | シズイ:始<br>SU抵抗性ホタルイ:1L     | 1kg         | ○       | ○             |
| 東北    | ○1.5 | ○                 | ○始   | ○始         | ○始         | ○始   | ●前※   | ●前※  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | シズイ:草丈3cm<br>SU抵抗性ホタルイ:1L |             | ●       | ○             |
| 北陸    |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                           |             |         |               |
| 関東・東海 |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                           |             |         |               |
| 近・中・四 |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                           |             |         |               |
| 九州    |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                           |             |         |               |

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。  
減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意: オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1  
Mon-923①-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            | 1kg         |         |               |
| 東北    |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 北陸    | ○1.5 | ○                 | ○始   |            | ○始         | ○始   |       | ●前   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +0～ノビエ1.5L |             | ●       | ○             |
| 関東・東海 | ○1.5 | ○                 | ○始   |            | ○始         | ○始   | ●始※   | ●始※  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |             | ○       | ○             |
| 近・中・四 | ○1.5 | ○                 | ○始   |            | ○2         | ○始   | ●始    |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |             |         | ○             |
| 九州    | ○1.5 | ○                 | ○始   |            | ○始         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |             |         | ○             |

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。  
減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。  
浅植え、植え付け精度不良等で根が露出すると被害を生じることがある。(北陸)  
オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1  
MY-100DC フロアブル

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |              | 処理時期                    | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |  |
|-------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--------------|-------------------------|-------------|---------|---------------|--|
| 北海道   | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○始         |            | ○始   |       | ○前   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | エゾノササユカグサ:2L | +0～ノビエ2.5L              | 500ml       | ○       | ○             |  |
| 東北    | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○始         | ○2         | ○始   | ○前※   | ○始※  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | シズイ:草丈3cm    | +0～ノビエ2.5L(砂<br>壌土は+5～) |             | ○       | ○             |  |
| 北陸    |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |              |                         |             |         |               |  |
| 関東・東海 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |              |                         |             |         |               |  |
| 近・中・四 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |              |                         |             |         |               |  |
| 九州    |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |              |                         |             |         |               |  |

水口処理可能

田植同時散布可能(北海道、東北)

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1  
MY-100DC-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期                    | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|-------------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○始         |            | ○2   |       | ○前   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  | +0～ノビエ2.5L(砂<br>壌土は+5～) | 1kg         | ○       | ○             |
| 東北    | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○始         | ○2         | ○2   | ○前※   | ○前※  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  | +0～ノビエ2.5L(砂<br>壌土は+5～) |             | ○       | ○             |
| 北陸    |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |                         |             |         |               |
| 関東・東海 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |                         |             |         |               |
| 近・中・四 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |                         |             |         |               |
| 九州    |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |                         |             |         |               |

田植同時散布可能(北海道、東北)

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1  
MY-100DC① フロアブル

| 地域名                                                                                                                                                                                                           | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                    | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土    | 壤土<br>～<br>埴土 |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|-------------------------|-------------|------------|---------------|---|---|
| 北海道                                                                                                                                                                                                           |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                         | 500ml       |            |               |   |   |
| 東北                                                                                                                                                                                                            |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                         |             |            |               |   |   |
| 北陸                                                                                                                                                                                                            | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   | ●始※   |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ●前              | +0～ノビエ2.5L(砂<br>壌土は+5～) |             |            | ○             | ○ |   |
| 関東・東海                                                                                                                                                                                                         | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   | ○始※   | ○始※  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | SU抵抗性ホタルイ:1L            |             | +0～ノビエ2.5L |               | ○ | ○ |
| 近・中・四                                                                                                                                                                                                         | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   | ○始※   | ○始   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                         |             |            |               | ○ | ○ |
| 九州                                                                                                                                                                                                            | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○前         | ○2         | ○2   | ○始※   | ○始※  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | コウキヤガラ:発生始              |             |            | ○             | ○ |   |
| ※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>田植同時散布可能(北陸、関東・東海、近畿・中国・四国)<br>減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。<br>田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。<br>オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                         |             |            |               |   |   |

A-1  
MY-100DC①-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモ'ガ'カ | ヒルムシロ      | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |                         | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 埴土<br>～<br>埴土 |  |
|-------|------|--------------------|------|------------|--------------|------|--------|--------|------------|------------|-----------------|-------------------------|------------|-------------|---------|---------------|--|
| 北海道   |      |                    |      |            |              |      |        |        |            |            |                 |                         |            | 1kg         |         |               |  |
| 東北    |      |                    |      |            |              |      |        |        |            |            |                 |                         |            |             |         |               |  |
| 北陸    | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2           | ○2   | ●始※    |        |            | ○再生<br>前～始 |                 | +0～ノビエ2.5L(砂<br>壌土は+5～) |            |             | ○       | ○             |  |
| 関東・東海 | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2           | ○2   | ○始※    | ○始※    | ○発生<br>期   | ○再生<br>前～始 | ○前              |                         |            |             | ○       | ○             |  |
| 近・中・四 | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2           | ○2   | ○始※    | ○始     | ○発生<br>期   | ○再生<br>前～始 | ○前              |                         |            |             | ○       | ○             |  |
| 九州    | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○前         | ○2           | ○2   | ○始※    | ○始※    | ○再生<br>前～始 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                         | +5～ノビエ2.5L |             | ○       | ○             |  |

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。  
田植同時散布可能(北陸、関東・東海、近畿・中国・四国)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。  
オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1  
MY-100NC-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                     | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>壤土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--------------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○2         |            | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +0～ノビエ2.5L(砂<br>壌土は+5～)  | 1kg         | ○       | ○             |
| 東北    | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○始         | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                          |             | ○       | ○             |
| 北陸    | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ●発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +10～ノビエ2.5L(砂<br>壌土は+5～) |             | ○       | ○             |
| 関東・東海 | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   | ●始※   |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +0～ノビエ2.5L(砂<br>壌土は+5～)  |             | ○       | ○             |
| 近・中・四 | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +1～ノビエ2.5L(砂<br>壌土は+5～)  |             | ○       | ○             |
| 九州    | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○前         | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +5～ノビエ2.5L               |             | ○       | ○             |

田植同時散布可能(東北、関東・東海)  
※:クログワイ防除は、有効剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。  
減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。  
クログワイ防除は有効剤との組み合わせで使用。

A-1  
MY-100TSC フロアブル

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>壤土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +0～ノビエ2.5L | 500ml       | ○       | ○             |
| 東北    | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○前         | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |             | ○       | ○             |
| 北陸    | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |             | ○       | ○             |
| 関東・東海 | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |             | ○       | ○             |
| 近・中・四 | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |             | ○       | ○             |
| 九州    | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |             | ○       | ○             |

田植同時散布可能 水口処理可能(東北、関東・東海、九州)  
減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1  
NBA-071-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                     | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>壤土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--------------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | エノ/サヤスグサ:2L              | 1kg         | ○       | ○             |
| 東北    | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○2         | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +0～ノビエ2.5L(砂<br>壌土は+5～)  |             | ○       | ○             |
| 北陸    | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                          |             | ○       | ○             |
| 関東・東海 | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                          |             | ○       | ○             |
| 近・中・四 | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   | ●始※   |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +10～ノビエ2.5L(砂<br>壌土は+5～) |             | ○       | ○             |
| 九州    | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                          |             | ○       | ○             |

田植同時散布可能(東北、北陸、関東・東海)  
※:クログワイ防除は、有効剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。  
減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。  
クログワイ防除は有効剤との組み合わせで使用。

A-1  
NBA-071DEH-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期     | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>壤土 |
|-------|-----|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|----------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○3  | ○                 | ○2   | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +5～ノビエ3L | 1kg         |         | ○             |
| 東北    | ○3  | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |          |             | ○       | ○             |
| 北陸    | ○3  | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ●発生<br>期 |            |                 |          |             | ●       | ○             |
| 関東・東海 | ○3  | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |          |             | ●       | ○             |
| 近・中・四 | ○3  | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |          |             | ●       | ○             |
| 九州    | ○3  | ○                 | ○2   | ○始         | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |          |             | ○       | ○             |

減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1  
NBA-073-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハヤ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズガヤ<br>ツリ | ワリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                    | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|-------------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +5～ノビエ2.5L              | 1kg         |         | ○             |
| 東北    | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○2         | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +0～ノビエ2.5L              |             | ○       | ○             |
| 北陸    | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                         |             | ○       | ○             |
| 関東・東海 | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                         |             | ○       | ○             |
| 近・中・四 | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +0～ノビエ2.5L(砂<br>壤土は+5～) |             | ○       | ○             |
| 九州    | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +5～ノビエ2.5L              |             | ○       | ○             |

田植同時散布可能(東北～近畿・中国・四国)  
減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1  
NBA-074-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハヤ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズガヤ<br>ツリ | ワリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期     | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|-----|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|----------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○2  | ○                  | ○始   |            |            | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +0～ノビエ2L | 1kg         |         | ○             |
| 東北    | ○2  | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |          |             | ○       | ○             |
| 北陸    | ○2  | ○                  | ○2   |            | ○始         | ○始   |       |      |          |            |                 |          |             | ○       | ○             |
| 関東・東海 | ○2  | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |          |             | ○       | ○             |
| 近・中・四 | ○2  | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |          |             | ○       | ○             |
| 九州    | ○2  | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |          |             | ○       | ○             |

田植同時散布可能(東北～九州)  
減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1  
NBA-093(改) ジャンボ

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハヤ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズガヤ<br>ツリ | ワリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a         | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|---------------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○始         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +5～ノビエ2.5L | 40g×10 <sup>3</sup> | ○       | ○             |
| 東北    | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○始         | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |                     | ●       | ○             |
| 北陸    | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |                     | ○       | ○             |
| 関東・東海 | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |                     | ○       | ○             |
| 近・中・四 | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |                     | ○       | ○             |
| 九州    | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |                     | ○       | ○             |

減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。  
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。  
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1  
NBA-101SB ジャンボ

| 地域名      | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハヤ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズガヤ<br>ツリ | ワリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a         | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|----------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|---------------------|---------|---------------|
| 北海道      | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +1～ノビエ2.5L | 30g×10 <sup>3</sup> | ●       | ○             |
| 東北       | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○始         | ○2         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |                     |         | ○             |
| 北陸       | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ●前              |            |                     | ●       | ○             |
| 関東・東海    | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +1～ノビエ2.5L |                     | ●       | ○             |
| 近・中・四(管) | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | +1～ノビエ2.5L |                     |         | ●             |
| 九州       | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |                     |         | ●             |

減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。  
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。  
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

## A-1

## NBA-131b-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|-----|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|----------------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   |     |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                            | 1kg         |         |               |
| 東北    |     |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                            |             |         |               |
| 北陸    | ○2  | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○始   |       |      |          | ○再生<br>前～始 | ○前              | +0～ノビエ2L                   |             | ○       | ○             |
| 関東・東海 | ○2  | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○始   | ●始※   | ●始※  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | SU抵抗性ナギ:1L<br>SU抵抗性ホタルイ:1L |             | ○       | ○             |
| 近・中・四 | ○2  | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                            |             | ○       | ○             |
| 九州    | ○2  | ○                 | ○2   | ○前         | ○2         | ○2   | ●始※   | ●始※  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                            |             | ○       | ○             |

田植同時散布可能  
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。  
減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。  
オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

## A-1

## NC-385 顆粒水和

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                                   | 使用量<br>/10a                | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +5～ノビエ2.5L                             | 60g(散布<br>液量250<br>～500ml) | ○       | ○             |
| 東北    | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○2         | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +0～ノビエ2.5L(砂<br>壤土は+5～、ホタルイ処理は+6<br>～) |                            | ○       | ○             |
| 北陸    | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○始         | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 | +5～ノビエ2.5L                             |                            | ○       | ○             |
| 関東・東海 | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +0～ノビエ2.5L(砂<br>壤土は+5～、ホタルイ処理は+6<br>～) |                            | ○       | ○             |
| 近・中・四 | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +5～ノビエ2.5L                             |                            | ○       | ○             |
| 九州    | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                                        |                            | ○       | ○             |

顆粒のまま水口処理が可能(東北～近畿・中国・四国) 田植同時散布可能(東北、関東・東海:500ml希釈)  
減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

## A-1

## NC-385SB 顆粒水和

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a            | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|------------------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○2         |            | ○2   |       | ●始   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +0～ノビエ2.5L | 80g(散布<br>液量<br>500ml) | ○       | ○             |
| 東北    | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○始         | ○2         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |                        | ○       | ○             |
| 北陸    | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |            |                        | ○       | ○             |
| 関東・東海 | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |                        | ○       | ○             |
| 近・中・四 | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |                        | ●       | ○             |
| 九州    | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +0～ノビエ2.5L |                        | ○       | ○             |

顆粒のまま水口処理が可能(東北、北陸、関東・東海) 田植同時散布可能(東北、関東・東海)  
減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。  
オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

## A-1

## NC-385SB-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                    | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|-------------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +0～ノビエ2.5L              | 1kg         |         | ○             |
| 東北    | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○2         | ○2         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +0～ノビエ2.5L(砂<br>壤土は+5～) |             | ●       | ○             |
| 北陸    | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○始         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 |            |                 | +0～ノビエ2.5L              |             | ●       | ○             |
| 関東・東海 | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |                         |             | ●       | ○             |
| 近・中・四 | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ●前              |                         |             | ●       | ○             |
| 九州    | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +5～ノビエ2.5L              |             | ●       | ○             |

田植同時散布可能(東北)  
減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-397-1kg 粒

| 地域名                     | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツバイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロク'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------------------------|------|--------------------|------|------------|-------------|------|--------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道                     | ○1.5 | ○                  | ○始   | ○始         |             | ○始   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +3～ノビエ1.5L | 1kg         |         | ○             |
| 東北                      | ○1.5 | ○                  | ○始   |            | ○始          | ○始   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |             |         | ○             |
| 北陸                      | ●1.5 | ●                  | ●始   |            | ●始          | ●前   |        |      |          | ●再生<br>前～始 |                 |            |             |         | ●             |
| 関東・東海                   | ●1.5 | ●                  | ●始   |            | ●始          | ●始   |        |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |             |         | ●             |
| 近・中・四                   |      |                    |      |            |             |      |        |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 九州                      |      |                    |      |            |             |      |        |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: |      |                    |      |            |             |      |        |      |          |            |                 |            |             |         |               |

A-1

NC-604 フロアブル

| 地域名                                                                             | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツバイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロク'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------|------------|-------------|------|--------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道                                                                             | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○2         |             | ○2   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +5～ノビエ2.5L | 500ml       | ●       | ○             |
| 東北                                                                              | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○2         | ○2          | ○始   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |             |         | ○             |
| 北陸                                                                              | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2          | ○2   |        |      | ○発生<br>期 |            |                 |            |             | ●       | ○             |
| 関東・東海                                                                           | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2          | ●2   |        |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |             | ●       | ●             |
| 近・中・四                                                                           | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2          | ●2   |        |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |             | ●       | ●             |
| 九州                                                                              | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2          | ●2   |        |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |             | ●       | ●             |
| 減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。<br>田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。 |      |                    |      |            |             |      |        |      |          |            |                 |            |             |         |               |

A-1

NC-606-1kg 粒

| 地域名                     | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツバイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロク'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------------------------|------|--------------------|------|------------|-------------|------|--------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道                     | ●2.5 | ●                  | ●2   | ●2         |             | ●始   |        |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●始              | +5～ノビエ2.5L | 1kg         |         | ●             |
| 東北                      | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●始          | ●始   |        |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●始              |            |             |         | ●             |
| 北陸                      |      |                    |      |            |             |      |        |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 関東・東海 (昔)               | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2          | ●2   |        |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●始              | +5～ノビエ2.5L |             |         | ●             |
| 近・中・四 (昔)               | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2          | ●始   |        |      |          | ●再生<br>前～始 | ●始              |            |             |         | ●             |
| 九州                      |      |                    |      |            |             |      |        |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: |      |                    |      |            |             |      |        |      |          |            |                 |            |             |         |               |

A-1

NCH-903DEH ジャンボ

| 地域名                                                                                                                                              | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツバイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロク'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期     | 使用量<br>/10a         | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|------|------------|-------------|------|--------|------|----------|------------|-----------------|----------|---------------------|---------|---------------|
| 北海道                                                                                                                                              | ○2  |                    | ○始   | ○始         |             | ○2   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +5～ノビエ2L | 40g×10 <sup>2</sup> |         | ○             |
| 東北                                                                                                                                               | ○3  | ○                  | ○2   | ○2         | ○2          | ○2   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +5～ノビエ3L |                     | ●       | ○             |
| 北陸                                                                                                                                               | ○3  | ○                  | ○2   |            | ○2          | ○2   |        |      |          | ○再生<br>前～始 |                 |          |                     |         | ○             |
| 関東・東海                                                                                                                                            | ○3  | ○                  | ○2   |            | ○2          | ○2   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |          |                     |         | ○             |
| 近・中・四                                                                                                                                            | ○3  | ○                  | ○2   |            | ○2          | ○2   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |          |                     |         | ○             |
| 九州                                                                                                                                               | ○3  | ○                  | ○2   |            | ○2          | ○2   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |          |                     | ○       | ○             |
| 減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。<br>散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。<br>散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。<br>田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。 |     |                    |      |            |             |      |        |      |          |            |                 |          |                     |         |               |

A-1  
NH-003-1kg 粒

| N71005 1kg 粒                                       |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                           |            |             |         |               |   |
|----------------------------------------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|---------------------------|------------|-------------|---------|---------------|---|
| 地域名                                                | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |                           | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>へ<br>埴土 |   |
| 北海道                                                | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○始         |            | ○2   |       | ○前   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | ミスアオイ:1L,<br>エゾノサヤスカグサ:2L | +5～ノビエ2.5L | 1kg         | ○       | ○             |   |
| 東北                                                 | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○始   | ○前※   | ○前※  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | シズイ:草丈3cm                 |            |             |         | ○             | ○ |
| 北陸                                                 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                           |            |             |         |               |   |
| 関東・東海                                              |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                           |            |             |         |               |   |
| 近・中・四                                              |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                           |            |             |         |               |   |
| 九州                                                 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                           |            |             |         |               |   |
| ※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                           |            |             |         |               |   |
| 減水深: 2cm/日以下                                       |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                           |            |             |         |               |   |
| 使用上の注意: オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。         |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                           |            |             |         |               |   |

A-1  
NH-101 ジャンボ

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○2         |            | ○2   |       | ●始   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +5～ノビエ2.5L | 50g×10コ     | ○       | ○             |
| 東北    | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○2         | ○2         | ○2   | ●前※   | ●始※  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |             | ○       | ○             |
| 北陸    |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 関東・東海 |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 近・中・四 |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 九州    |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。  
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。  
オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1  
NH-102 フロアブル

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a             | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------------------|---------|---------------|
| 北海道   |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            | 500ml                   |         |               |
| 東北    |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |                         |         |               |
| 北陸    | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   | ●始    | ●始   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +5～ノビエ2.5L |                         | ○       | ○             |
| 関東・東海 | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   | ●始※   | ●始※  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | イボクサ:再生始   | +0～ノビエ2.5L(砂<br>壌土は+5～) | ○       | ○             |
| 近・中・四 | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   | ●始    | ●始   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |                         | ○       | ○             |
| 九州    | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   | ●始※   | ●始※  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +5～ノビエ2.5L |                         | ○       | ○             |

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。  
減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。  
オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1  
NH-104-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a             | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------------------|---------|---------------|
| 北海道   |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            | 1kg                     |         |               |
| 東北    |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |                         |         |               |
| 北陸    | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   | ●始    |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 | +5～ノビエ2.5L |                         | ○       | ○             |
| 関東・東海 | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   | ●始※   |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | イボクサ:再生始   | +0～ノビエ2.5L(砂<br>壌土は+5～) | ○       | ○             |
| 近・中・四 | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   | ●始    |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            | +0～ノビエ2.5L              | ○       | ○             |
| 九州    | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   | ●始※   |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +5～ノビエ2.5L |                         | ○       | ○             |

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。  
減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。  
クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1  
NH-301-1kg 粒

| 地域名                                                                            | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|-------|----|-----------------|--|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道                                                                            | ●2.5 | ●                  | ●2   | ●2         |            |      |       |      |       |    |                 |  | +0～ノビエ2.5L | 1kg         |         | ●             |
| 東北                                                                             | ●2.5 | ●                  | ●2   |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |            |             |         | ●             |
| 北陸                                                                             | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●前         |      |       |      |       |    |                 |  |            |             |         | ●             |
| 関東・東海                                                                          | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         |      |       |      |       |    |                 |  |            |             |         | ●             |
| 近・中・四（普）                                                                       | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         |      |       |      |       |    |                 |  |            |             |         | ●             |
| 九州                                                                             | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         |      |       |      |       |    |                 |  |            |             |         | ●             |
| 減水深：2cm/日以下<br>使用上の注意： 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。<br>田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。 |      |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |            |             |         |               |

A-1  
NH-302 フロアブル

| 地域名                                                                             | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|-------|----|-----------------|--|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道                                                                             | ●2.5 | ●                  | ●2   | ●2         |            |      |       |      |       |    |                 |  | +0～ノビエ2.5L | 500ml       |         | ●             |
| 東北                                                                              | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●始         |      |       |      |       |    |                 |  |            |             |         | ●             |
| 北陸                                                                              | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●前         |      |       |      |       |    |                 |  |            |             |         | ●             |
| 関東・東海                                                                           | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         |      |       |      |       |    |                 |  |            |             |         | ●             |
| 近・中・四（普）                                                                        | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         |      |       |      |       |    |                 |  |            |             |         | ●             |
| 九州                                                                              | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         |      |       |      |       |    |                 |  |            |             |         | ●             |
| 減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。<br>田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。 |      |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |            |             |         |               |

A-1  
NH-806 シャンボ

| 地域名                                                                                                                                                          | ノビエ   | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ     | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                        | 使用量<br>/10a         | 砂<br>壤土  | 埴土<br>～<br>埴土 |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|-------|--------|-----------------|-----------------------------|---------------------|----------|---------------|---|
| 北海道                                                                                                                                                          |       |                    |      |            |            |      |       |      |       |        |                 | +5～ノビエ2.5L                  | 50g×10 <sup>3</sup> |          |               |   |
| 東北                                                                                                                                                           |       |                    |      |            |            |      |       |      |       |        |                 |                             |                     |          |               |   |
| 北陸                                                                                                                                                           | ○2.5  | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ●発生期  | ○再生前～始 | ○前              |                             |                     |          | ○             | ○ |
| 関東・東海                                                                                                                                                        | ○2.5  | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       | ○始※  | ○発生期  | ○再生前～始 | ○前              |                             |                     | イボクサ:再生始 | ○             | ○ |
| 近・中・四                                                                                                                                                        | ○2.5  | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生期  | ○再生前～始 | ○前              |                             |                     | ○        | ○             |   |
| 九州                                                                                                                                                           | ○2.5* | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生期  | ○再生前～始 | ○前              | +5～ノビエ2.5L(*:<br>早期は～ノビエ2L) |                     | ○        | ○             |   |
| ※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。                                                                                                                 |       |                    |      |            |            |      |       |      |       |        |                 |                             |                     |          |               |   |
| 減水深: 2cm/日以下                                                                                                                                                 |       |                    |      |            |            |      |       |      |       |        |                 |                             |                     |          |               |   |
| 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。<br>散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。<br>散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。<br>田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。<br>オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |       |                    |      |            |            |      |       |      |       |        |                 |                             |                     |          |               |   |

A-1  
NHF-401 粒

| 地域名                    | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|------------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道                    | ●2.5 | ●                  | ●2   | ●2         |            | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | +5～ノビエ2.5L | 3kg         |         | ●             |
| 東北                     | ●2.5 | ●                  | ●2   | ●始         | ●始         | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |             |         | ●             |
| 北陸                     |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 関東・東海                  |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 近・中・四                  |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 九州                     |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 減水深：2cm/日以下<br>使用上の注意： |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |

## A-1

## NOJ-101-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ                  | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|-----|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|------------------------|------------|-----------------|----------------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○3  | ○                  | ○2   | ○2         |            | ○2   |       | ○前   | ○発生<br>期<br>○再生<br>前～始 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +0～ノビエ3L(砂<br>壌土は+5～)      | 1kg         | ○       | ○             |
| 東北    | ○3  | ○                  | ○2   | ○2         | ○2         | ○2   | ○前※   | ○前※  | ○発生<br>期<br>○再生<br>前～始 | ○再生<br>前～始 | ○前              | シズイ:草丈3cm                  |             | ○       | ○             |
| 北陸    | ○3  | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期<br>○再生<br>前～始 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +0～ノビエ3L                   |             |         | ○             |
| 関東・東海 | ○3  | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   | ○前※   | ○始※  | ○発生<br>期<br>○再生<br>前～始 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +0～ノビエ3L(砂<br>壌土は+5～)      |             | ○       | ○             |
| 近・中・四 | ○3  | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   | ○前※   |      | ○発生<br>期<br>○再生<br>前～始 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                            |             | ○       | ○             |
| 九州    | ○3  | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期<br>○再生<br>前～始 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +0～ノビエ3L(早期お<br>よび砂壌土は+5～) |             | ○       | ○             |

田植同時散布可能(北海道、東北、北陸、関東・東海、近畿・中国・四国、九州)

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

## A-1

## NOJ-103-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ                  | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                  | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|-----|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|------------------------|------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○3  | ○                  | ○2   | ○2         |            | ○2   |       | ●始   | ○発生<br>期<br>○再生<br>前～始 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +0～ノビエ3L(砂<br>壌土は+5～) | 1kg         | ○       | ○             |
| 東北    | ○3  | ○                  | ○2   | ○2         | ○2         | ○2   | ●前※   | ●始※  | ○発生<br>期<br>○再生<br>前～始 | ○再生<br>前～始 | ○前              | シズイ:草丈3cm             |             | ○       | ○             |
| 北陸    |     |                    |      |            |            |      |       |      |                        |            |                 |                       |             |         |               |
| 関東・東海 |     |                    |      |            |            |      |       |      |                        |            |                 |                       |             |         |               |
| 近・中・四 |     |                    |      |            |            |      |       |      |                        |            |                 |                       |             |         |               |
| 九州    |     |                    |      |            |            |      |       |      |                        |            |                 |                       |             |         |               |

田植同時散布可能(北海道、東北)

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

## A-1

## NOJ-104-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ                  | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                  | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|-----|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|------------------------|------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   |     |                    |      |            |            |      |       |      |                        |            |                 |                       | 1kg         |         |               |
| 東北    |     |                    |      |            |            |      |       |      |                        |            |                 |                       |             |         |               |
| 北陸    | ○3  | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期<br>○再生<br>前～始 | ○再生<br>前～始 | ●前              | +0～ノビエ3L(砂<br>壌土は+5～) |             | ○       | ○             |
| 関東・東海 | ○3  | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   | ●始※   | ●始※  | ○発生<br>期<br>○再生<br>前～始 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                       |             | ○       | ○             |
| 近・中・四 | ○3  | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   | ●始※   |      | ○発生<br>期<br>○再生<br>前～始 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                       |             | ○       | ○             |
| 九州    | ○3  | ○                  | ○2   | ○2         | ○2         | ○2   |       | ●始※  | ○発生<br>期<br>○再生<br>前～始 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                       |             | ○       | ○             |

田植同時散布可能(北陸、関東・東海、近畿・中国・四国、九州)

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1  
ONC-381 ジャンボ

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a         | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|---------------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○2         |            | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +5～ノビエ2.5L | 30g×10 <sup>3</sup> | ○       | ○             |
| 東北    | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○始         | ○2         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ●前              |            |                     | ○       | ○             |
| 北陸    | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |                     | ○       | ○             |
| 関東・東海 | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |                     | ○       | ○             |
| 近・中・四 | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |                     | ○       | ○             |
| 九州    | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |                     | ○       | ○             |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1  
PSS①D-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期     | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|-----|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|----------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   |     |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 | +0～ノビエ2L | 1kg         |         |               |
| 東北    | ○2  | ○                 | ○2   | ○始         | ○始         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 |            | ○前              |          |             | ○       | ○             |
| 北陸    | ○2  | ○                 | ○2   |            | ○始         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 |            | ○前              |          |             | ○       | ○             |
| 関東・東海 | ○2  | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 |            | ○前              |          |             | ○       | ○             |
| 近・中・四 | ○2  | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |          |             | ○       | ○             |
| 九州    | ○2  | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 |            | ○前              |          |             | ○       | ○             |

田植同時散布可能(東北、北陸、関東・東海、近畿・中国・四国、九州)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 浅植え、植付け精度不良で根が露出すると薬害を生じることがある。

A-1  
SB-526 フロアブル

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期     | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|-----|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|----|-----------------|----------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○2  | ○                 | ○始   | ○2         |            |      |       |      | ○発生<br>期 |    |                 | +3～ノビエ2L | 500ml       | ●       | ○             |
| 東北    | ○2  | ○                 | ○2   | ○始         | ○2         |      |       |      | ○発生<br>期 |    |                 |          |             | ●       | ○             |
| 北陸    | ○2  | ○                 | ○2   |            | ○2         |      |       |      | ○発生<br>期 |    |                 |          |             | ●       | ○             |
| 関東・東海 | ○2  | ○                 | ○2   |            | ○2         |      |       |      | ○発生<br>期 |    |                 |          |             | ●       | ○             |
| 近・中・四 | ○2  | ○                 | ○2   |            | ○始         |      |       |      | ○発生<br>期 |    |                 |          |             | ○       | ○             |
| 九州    | ○2  | ○                 | ○2   |            | ○始         |      |       |      | ○発生<br>期 |    |                 |          |             | ●       | ○             |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1  
SB-526-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期     | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|-----|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|----|-----------------|----------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○2  | ○                 | ○2   | ○2         |            |      |       |      | ○発生<br>期 |    |                 | +3～ノビエ2L | 1kg         | ●       | ○             |
| 東北    | ○2  | ○                 | ○2   | ○始         | ○2         |      |       |      | ○発生<br>期 |    |                 |          |             | ●       | ○             |
| 北陸    | ○2  | ○                 | ○2   |            | ○始         |      |       |      | ○発生<br>期 |    |                 |          |             | ●       | ○             |
| 関東・東海 | ○2  | ○                 | ○2   |            | ○2         |      |       |      | ○発生<br>期 |    |                 |          |             | ●       | ○             |
| 近・中・四 | ○2  | ○                 | ○2   |            | ○2         |      |       |      | ○発生<br>期 |    |                 |          |             | ●       | ○             |
| 九州    | ○2  | ○                 | ○2   |            | ○始         |      |       |      | ○発生<br>期 |    |                 |          |             | ○       | ○             |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

## A-1

## SB-533P5(改) ジャンボ

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 |           | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|----|-----------------|-----------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○1.5 | ○                 | ○始   | ○始         |            |      |       |      | ○発生<br>期 |    |                 | ミス'アオイ:1L | +1～ノビエ1.5L | 50g×5コ      | ○       | ○             |
| 東北    | ○1.5 | ○                 | ○始   |            | ○始         |      |       |      | ○発生<br>期 |    |                 |           | +0～ノビエ1.5L |             | ○       | ○             |
| 北陸    | ○1.5 | ○                 | ○始   |            | ○始         |      |       |      | ○発生<br>期 |    |                 |           |            |             | ○       | ○             |
| 関東・東海 | ○1.5 | ○                 | ○始   |            | ○始         |      |       |      |          |    |                 | イボクサ:再生始  |            |             | ○       | ○             |
| 近・中・四 | ○1.5 | ○                 | ○始   |            | ○始         |      |       |      |          |    |                 |           |            |             | ○       | ○             |
| 九州    | ○1.5 | ○                 | ○始   |            | ○始         |      |       |      | ○発生<br>期 |    |                 |           | +1～ノビエ1.5L |             | ○       | ○             |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

## A-1

## SB-554 ジャンボ

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 |            | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|----|-----------------|------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○1.5 | ○                 | ○始   | ○始         |            |      |       |      | ○発生<br>期 |    |                 |            | +0～ノビエ1.5L | 50g×10コ     | ○       | ○             |
| 東北    | ○1.5 | ○                 | ○始   |            | ○始         |      | ○前※   |      | ○発生<br>期 |    |                 | シズ'イ:草丈3cm |            |             | ○       | ○             |
| 北陸    | ○1.5 | ○                 | ○始   |            | ○始         |      |       |      | ○発生<br>期 |    |                 |            |            |             | ○       | ○             |
| 関東・東海 | ○1.5 | ○                 | ○始   |            | ○始         |      | ○前※   |      | ○発生<br>期 |    |                 |            |            |             | ○       | ○             |
| 近・中・四 | ○1.5 | ○                 | ○始   |            | ○始         | ○前   |       |      | ○発生<br>期 |    |                 |            |            |             | ○       | ○             |
| 九州    | ○1.5 | ○                 | ○始   | ○前         | ○前         | ○前   |       |      | ○発生<br>期 |    |                 |            |            |             | ○       | ○             |

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

クログワイ・シズ'イ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

## A-1

## SB-554 プロアール

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 |                | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|----|-----------------|----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○1.5 | ○                 | ○始   | ○始         |            |      |       |      | ○発生<br>期 |    |                 | SU抵抗性ホタルイ:1.5L | +0～ノビエ1.5L | 500ml       | ●       | ○             |
| 東北    | ○1.5 | ○                 | ○始   |            | ○始         |      |       |      | ○発生<br>期 |    |                 |                |            |             |         | ○             |
| 北陸    | ○1.5 | ○                 | ○始   |            | ○始         |      |       |      | ●発生<br>期 |    |                 |                |            |             | ●       | ○             |
| 関東・東海 | ○1.5 | ○                 | ○始   |            | ○始         |      |       |      | ○発生<br>期 |    |                 | SU抵抗性コナギ:1L    |            |             | ●       | ○             |
| 近・中・四 | ○1.5 | ○                 | ○始   |            | ○始         | ○前   |       |      | ●発生<br>期 |    |                 |                |            |             | ○       | ○             |
| 九州    | ○1.5 | ○                 | ○始   | ○前         | ○始         | ○前   |       |      | ○発生<br>期 |    |                 |                |            |             | ○       | ○             |

田植同時散布可能(北海道・東北・関東・東海)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1  
SB-556 フロアブル

| 地域名                                                                                                                              | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>タカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 |                          | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|----|-----------------|--------------------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道                                                                                                                              | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 |    |                 | エゾノサヤスカグサ:2L<br>ミスアオイ:1L | +0～ノビエ2.5L | 500ml       | ○       | ○             |
| 東北                                                                                                                               | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○始         | ○2         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 |    |                 | シズイ:草丈3cm                |            |             | ○       | ○             |
| 北陸                                                                                                                               | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○始         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 |    |                 |                          |            |             | ○       | ○             |
| 関東・東海                                                                                                                            | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      |          |    |                 | SU抵抗性ホタルイ:2L<br>イネクサ:再生始 |            |             | ○       | ○             |
| 近・中・四                                                                                                                            | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 |    |                 |                          |            |             | ○       | ○             |
| 九州                                                                                                                               | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○前         | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 |    |                 | イネクサ:再生始                 |            |             | ○       | ○             |
| 水口処理可能(北海道～北陸, 九州)<br>減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。<br>田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。<br>シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |    |                 |                          |            |             |         |               |

A-1  
SB-559⑩-1kg 粒

| 地域名                     | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>タカ | ミスカ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |  |
|-------------------------|------|--------------------|------|------------|-----------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|------------|-------------|---------|---------------|--|
| 北海道                     | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○2         |           | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  | +5～ノビエ2.5L | 1kg         | ●       | ○             |  |
| 東北                      | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○始         | ○2        | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |  |            |             | ●       | ○             |  |
| 北陸                      |      |                    |      |            |           |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |               |  |
| 関東・東海                   |      |                    |      |            |           |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |               |  |
| 近・中・四                   |      |                    |      |            |           |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |               |  |
| 九州                      |      |                    |      |            |           |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |               |  |
| 減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: |      |                    |      |            |           |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |               |  |

A-1  
SB-559⑪-1kg 粒

| 地域名                                                                             | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>埴土 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|------------|-------------|---------|----------|---|
| 北海道                                                                             |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  | +3～ノビエ2.5L | 1kg         |         |          |   |
| 東北                                                                              |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |          |   |
| 北陸                                                                              | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |  |            |             |         | ●        | ○ |
| 関東・東海                                                                           | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ●前              |  |            |             |         | ●        | ○ |
| 近・中・四                                                                           | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ●前              |  |            |             |         | ●        | ○ |
| 九州                                                                              | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ●前              |  |            |             |         | ●        | ○ |
|                                                                                 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |          |   |
| 減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。<br>田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |          |   |

A-1  
SB-563⑩-1kg 粒

| 地域名                     | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>タカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |   |
|-------------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|------------|-------------|---------|---------------|---|
| 北海道                     | ●2.5 | ●                  | ●2   | ●2         |            | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  | +3～ノビエ2.5L | 1kg         |         | ●             |   |
| 東北                      | ●2.5 | ●                  | ●2   | ●始         | ●始         | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  |            |             |         |               | ● |
| 北陸                      |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |               |   |
| 関東・東海                   |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |               |   |
| 近・中・四                   |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |               |   |
| 九州                      |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |               |   |
| 減水深： 2cm/日以下<br>使用上の注意： |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |               |   |

A-1  
SB-563①-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                    | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌<br>土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 北海道   |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                         | 1kg         |             |               |
| 東北    |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                         |             |             |               |
| 北陸    | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●始         | ●始   |       |      |          | ●再生<br>前～始 |                 | +3～ノビエ2.5L              |             |             | ●             |
| 関東・東海 | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |                         |             |             | ●             |
| 近・中・四 | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | +3～ノビエ2.5L<br>(砂壌土は+5～) |             | ●           | ●             |
| 九州    | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | +3～ノビエ2.5L              |             |             | ●             |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。A-1  
SST-402-1kg (旧 BCH-035-1kg) 粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌<br>土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 北海道   | ●2.5 | ●                  | ●2   | ●2         |            | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | +0～ノビエ2.5L | 1kg         |             | ●             |
| 東北    | ●2.5 | ●                  | ●2   | ●始         | ●2         | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |             |             | ●             |
| 北陸    | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |             |             | ●             |
| 関東・東海 | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |             |             | ●             |
| 近・中・四 | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |             |             | ●             |
| 九州    | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |             |             | ●             |

田植同時散布可能(北海道、東北、関東・東海、近畿・中国・四国、九州)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。A-1  
SW-002①フロアブル

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期        | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌<br>土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 北海道   |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |             | 500ml       |             |               |
| 東北    |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |             |             |             |               |
| 北陸    | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   | ○始※   | ○前   |          |            |                 | +3～ノビエ2.5L  |             | ○           | ○             |
| 関東・東海 | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   | ●始※   | ●始※  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | SU抵抗性ホタルイ2L |             | ○           | ○             |
| 近・中・四 | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   | ●始※   | ●始   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |             |             | ○           | ○             |
| 九州    | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   | ●始※   | ●始※  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |             |             | ○           | ○             |

※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

水口処理可能(北陸、関東・東海、近畿・中国・四国、九州)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。  
オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。A-1  
SW-005フロアブル

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌<br>土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 北海道   | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +3～ノビエ2.5L | 500ml       | ●           | ○             |
| 東北    | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○始         | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |             | ●           | ○             |
| 北陸    |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |             |               |
| 関東・東海 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |             |               |
| 近・中・四 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |             |               |
| 九州    |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |             |               |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-1  
SW-005①フロアブル

| 地域名                                                                             | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期 | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------|-------------|---------|---------------|
| 北海道                                                                             |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |      | 500ml       |         |               |
| 東北                                                                              |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |      |             |         |               |
| 北陸                                                                              | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ●発生<br>期 |            |                 |      | +3～ノビエ2.5L  | ●       | ○             |
| 関東・東海                                                                           | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ●前              |      |             | ●       | ○             |
| 近・中・四                                                                           | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |      |             | ○       | ○             |
| 九州                                                                              | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |      |             | ○       | ○             |
| 減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。<br>田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |      |             |         |               |

A-1  
SW-012①-1kg 粒

| 地域名                     | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道                     | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○始         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +3～ノビエ2.5L | 1kg         | ○       | ○             |
| 東北                      | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○始         | ○2         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |             | ●       | ○             |
| 北陸                      |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 関東・東海                   |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 近・中・四                   |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 九州                      |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |

A-1  
SW-012①-1kg 粒

| 地域名                                                                             | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道                                                                             |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            | 1kg         |         |               |
| 東北                                                                              |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 北陸                                                                              | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +3～ノビエ2.5L |             | ○       | ○             |
| 関東・東海                                                                           | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |             | ○       | ○             |
| 近・中・四                                                                           | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |             | ○       | ○             |
| 九州                                                                              | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |             | ○       | ○             |
| 減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。<br>田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |

A-1  
SW-023①-1kg 粒

| 地域名                     | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道                     | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +3～ノビエ2.5L | 1kg         | ●       | ○             |
| 東北                      | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○始         | ○2         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |             |         | ○             |
| 北陸                      |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 関東・東海                   |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 近・中・四                   |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 九州                      |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |

A-1  
SW-023①-1kg 粒

| 地域名                                                                             | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道                                                                             |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            | 1kg         |         |               |
| 東北                                                                              |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 北陸                                                                              | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +3～ノビエ2.5L |             | ●       | ○             |
| 関東・東海                                                                           | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |             | ●       | ○             |
| 近・中・四                                                                           | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |             | ●       | ○             |
| 九州                                                                              | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |            |             | ●       | ○             |
| 減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。<br>田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |

A-1  
SW-024①② ジャンボ

| 地域名                                                                                   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期         | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土             | 壤土<br>～<br>埴土 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--------------|-------------|---------------------|---------------|
| 北海道                                                                                   | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | SU抵抗性ホタルイ:2L | +3～ノビエ2.5L  | 40g×10 <sup>2</sup> | ● ○           |
| 東北                                                                                    | ○2.5 | ○                  | ○2   | ○始         | ○2         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | SU抵抗性ホタルイ:2L |             |                     | ○ ○           |
| 北陸                                                                                    |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |              |             |                     |               |
| 関東・東海                                                                                 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |              |             |                     |               |
| 近・中・四                                                                                 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |              |             |                     |               |
| 九州                                                                                    |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |              |             |                     |               |
| 減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。<br>散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |              |             |                     |               |

A-1  
SW-024①② ジャンボ

| 地域名                                                                                                                                              | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期         | 使用量<br>/10a         | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--------------|---------------------|---------|---------------|
| 北海道                                                                                                                                              |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |              | 40g×10 <sup>2</sup> |         |               |
| 東北                                                                                                                                               |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |              |                     |         |               |
| 北陸                                                                                                                                               | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +3～ノビエ2.5L   |                     | ○       | ○             |
| 関東・東海                                                                                                                                            | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | SU抵抗性ホタルイ:1L |                     |         | ○             |
| 近・中・四                                                                                                                                            | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |              |                     | ●       | ○             |
| 九州                                                                                                                                               | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |              |                     | ●       | ○             |
| 減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。<br>散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。<br>散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。<br>田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |              |                     |         |               |

A-1  
SW-031①-1kg 粒

| 地域名                                                                             | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道                                                                             |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            | 1kg         |         |               |
| 東北                                                                              |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 北陸                                                                              |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 関東・東海                                                                           |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 近・中・四 (皆)                                                                       | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●始   |       |      |          | ●再生<br>前～始 | ●前              | +3～ノビエ2.5L |             |         | ●             |
| 九州                                                                              | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 |            |             |         | ●             |
| 減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。<br>田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |

## A-1

## SW-032 フロアブル

| 地域名                     | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------------------------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道                     | ●2.5 | ●                 | ●2   | ●2         |            | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | +3～ノビエ2.5L | 500ml       |         | ●             |
| 東北                      | ●2.5 | ●                 | ●2   | ●始         | ●始         |      |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |             |         | ●             |
| 北陸                      |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 関東・東海                   |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 近・中・四                   |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 九州                      |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |

## A-1

## SW-032① フロアブル

| 地域名                                                                             | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道                                                                             |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            | 500ml       |         |               |
| 東北                                                                              |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |
| 北陸                                                                              | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 |            |                 | +3～ノビエ2.5L |             |         | ●             |
| 関東・東海                                                                           | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |             |         | ●             |
| 近・中・四 (皆)                                                                       | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2         | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 |            |             |         | ●             |
| 九州                                                                              | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |             | ●       | ●             |
| 減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。<br>田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。 |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |             |         |               |

## A-1

## SW-041①-1kg (旧 NBA-141a-1kg) 粒

| 地域名                     | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                    | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------------------------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|-------------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道                     | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +3～ノビエ2.5L              | 1kg         | ●       | ○             |
| 東北                      | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○始         | ○2         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +0～ノビエ2.5L(砂<br>壌土は+3～) |             | ●       | ○             |
| 北陸                      |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                         |             |         |               |
| 関東・東海                   |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                         |             |         |               |
| 近・中・四                   |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                         |             |         |               |
| 九州                      |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                         |             |         |               |
| 減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                         |             |         |               |

## A-1

## SW-041①-1kg (旧 NBA-141b-1kg) 粒

| 地域名                                                                             | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離            | 処理時期                    | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道                                                                             |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                            |                         | 1kg         |         |               |
| 東北                                                                              |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                            |                         |             |         |               |
| 北陸                                                                              | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                            | +0～ノビエ2.5L(砂<br>壌土は+3～) |             | ●       | ○             |
| 関東・東海                                                                           | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | SU抵抗性コナキ1L<br>SU抵抗性オキイ1.5L | +3～ノビエ2.5L              |             | ●       | ○             |
| 近・中・四 茅草                                                                        | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                            |                         |             | ●       | ○             |
| 九州                                                                              | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前                         |                         |             | ○       | ○             |
| 減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。<br>田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。 |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                            |                         |             |         |               |

A-1

SW-042① ジャンボ

| 地域名                                                                                                                                             | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|------------|-------------|---------|---------------|---|
| 北海道                                                                                                                                             |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  | +3～ノビエ2.5L | 35g×10<br>コ |         |               |   |
| 東北                                                                                                                                              |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |               |   |
| 北陸                                                                                                                                              | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  |            |             |         |               | ● |
| 関東・東海                                                                                                                                           | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 |  |            |             |         |               | ● |
| 近・中・四（普）                                                                                                                                        | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  |            |             |         |               | ● |
| 九州                                                                                                                                              | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  |            |             |         | ●             |   |
| 減水深：2cm/日以下<br>使用上の注意： 5cm程度の水深で散布する。<br>散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。<br>散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。<br>田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。 |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |            |             |         |               |   |

A-1

SW-991-1kg 粒

| 地域名                                                                             | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 |              | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|----|-----------------|--------------|------------|-------------|---------|---------------|---|
| 北海道                                                                             | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○始         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 |    | ○前              | エゾノササユカグサ:2L | +5～ノビエ2.5L | 1kg         | ○       | ○             |   |
| 東北                                                                              | ○2   | ○                 | ○2   | ○始         | ○始         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 |    |                 |              | +5～ノビエ2L   |             |         | ○             |   |
| 北陸                                                                              | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      |          |    | ○前              |              | +5～ノビエ2.5L |             |         | ●             | ○ |
| 関東・東海                                                                           | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 |    | ○前              |              |            |             |         | ○             | ○ |
| 近・中・四                                                                           | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      |          |    |                 |              |            |             |         | ○             | ○ |
| 九州                                                                              | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○前         | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 |    |                 |              |            |             |         | ○             | ○ |
| 減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。<br>田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。 |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |    |                 |              |            |             |         |               |   |

A-1

SYJ-108 ジャンボ

| 地域名                                                                                                                                                                         | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |          | 処理時期     | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|----------|----------|-------------|---------|---------------|
| 北海道                                                                                                                                                                         | ○3  | ○                 | ○2   | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○始              |          | +5～ノビエ3L | 30g×10コ     | ●       | ○             |
| 東北                                                                                                                                                                          | ○3  | ○                 | ○2   | ○2         | ○2         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○始              | シズメ草丈3cm |          |             |         | ○             |
| 北陸                                                                                                                                                                          | ○3  | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |          |          |             | ●       | ○             |
| 関東・東海                                                                                                                                                                       | ○3  | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ●始              |          |          |             | ●       | ○             |
| 近・中・四                                                                                                                                                                       | ○3  | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○始              |          |          |             | ●       | ○             |
| 九州                                                                                                                                                                          | ○3  | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○始              |          |          |             | ●       | ○             |
| 減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。<br>散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。<br>散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。<br>田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。<br>シズメ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |     |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |          |             |         |               |

A-1

SYJ-150 フロアブル

| 地域名                     | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期     | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |   |  |
|-------------------------|-----|-------------------|------|------------|-------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|----------|-------------|---------|---------------|---|--|
| 北海道                     | ●3  | ●                 | ●2   | ●2         |             | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  | +5～ノビエ3L | 500ml       |         | ●             |   |  |
| 東北                      | ●3  | ●                 | ●2   | ●2         | ●2          | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  |          |             |         |               | ● |  |
| 北陸                      |     |                   |      |            |             |      |       |      |          |            |                 |  |          |             |         |               |   |  |
| 関東・東海                   |     |                   |      |            |             |      |       |      |          |            |                 |  |          |             |         |               |   |  |
| 近・中・四                   |     |                   |      |            |             |      |       |      |          |            |                 |  |          |             |         |               |   |  |
| 九州                      |     |                   |      |            |             |      |       |      |          |            |                 |  |          |             |         |               |   |  |
| 減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: |     |                   |      |            |             |      |       |      |          |            |                 |  |          |             |         |               |   |  |

A-1  
TH-001 シェンボ

| 地域名                                                                                                                                             | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a         | 砂<br>壤<br>土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|---------------------|-------------|---------------|
| 北海道                                                                                                                                             | ●2.5 | ●                  | ●2   | ●2         |            | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | +5～ノビエ2.5L | 40g×10 <sup>3</sup> |             | ●             |
| 東北                                                                                                                                              | ●2.5 | ●                  | ●2   | ●2         | ●2         | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 |            |                     |             | ●             |
| 北陸                                                                                                                                              | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 |            |                     |             | ●             |
| 関東・東海                                                                                                                                           | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 |            |                     |             | ●             |
| 近・中・四（管）                                                                                                                                        | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |                     |             | ●             |
| 九州                                                                                                                                              | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |                     |             | ●             |
| 減水深：2cm/日以下<br>使用上の注意： 5cm程度の水深で散布する。<br>散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。<br>散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。<br>田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |            |                     |             |               |

A-1  
TH-001 フロアブル

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ      | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |                                       | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤<br>土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|-----------|------|-------|------|------------|------------|-----------------|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 北海道   | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○2         |           | ○2   |       | ○前   | ○発生<br>期   | ○再生<br>前～始 | ○前              | コノハヤスガクサ:2L<br>ミスアオイ:1L               | +5～ノビエ2.5L | 500ml       | ○           | ○             |
| 東北    | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○始         | ○2        | ○2   | ●前※   | ○始※  | ○発生<br>期   | ○再生<br>前～始 | ○前              | コウキヤガラ:始<br>シズイ:草丈3cm<br>SU抵抗性セカルイ:2L |            |             | ○           | ○             |
| 北陸    | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2        | ○2   |       |      | ○再生<br>前～始 |            |                 |                                       |            |             | ○           | ○             |
| 関東・東海 | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2        | ○2   | ●始※   |      | ○発生<br>期   | ○再生<br>前～始 | ○前              | SU抵抗性セカルイ:2L                          |            |             | ○           | ○             |
| 近・中・四 | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2        | ○2   |       |      | ○発生<br>期   | ○再生<br>前～始 | ○前              |                                       |            |             | ○           | ○             |
| 九州    | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○始         | ○2        | ○2   |       |      | ○発生<br>期   | ○再生<br>前～始 | ○前              |                                       |            |             | ○           | ○             |

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。  
水口処理可能(東北・関東・東海・九州)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。  
オモダカ・シズイ・クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1  
TH-001-1kg 粒

| 地域名                                                                                                       | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |          | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤<br>土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|----------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 北海道                                                                                                       | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |          | +5～ノビエ2.5L | 1kg         | ●           | ○             |
| 東北                                                                                                        | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○始         | ○2         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | シズイ草丈3cm |            |             | ●           | ○             |
| 北陸                                                                                                        | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○始         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |          |            |             |             | ○             |
| 関東・東海                                                                                                     | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 |          |            |             |             | ●             |
| 近・中・四（管）                                                                                                  | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |          |            |             |             | ●             |
| 九州                                                                                                        | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |          |            |             |             | ●             |
| 減水深：2cm/日以下<br>使用上の注意： 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。<br>田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。<br>シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |          |            |             |             |               |

A-1  
TH-001①フロアブル

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>タカ | ミスガヤ<br>ツリ | ワリカワ | クログワイ | オモタカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期 | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|-----|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |      | 500ml       |         |               |
| 東北    |     |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |      |             |         |               |
| 北陸    | ○2  | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |      | +3～ノビエ2L    | ●       | ○             |
| 関東・東海 | ○2  | ○                  | ○2   |            | ○始         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |      |             | ●       | ○             |
| 近・中・四 | ○2  | ○                  | ○2   |            | ○始         | ○始   | ●始※   |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |      |             | ●       | ○             |
| 九州    | ○2  | ○                  | ○2   |            | ○始         | ○2   | ●始※   |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |      |             | ○       | ○             |

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。  
減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。  
クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1  
TH-005 ジェンボ

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>タカ | ミスガヤ<br>ツリ | ワリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |           | 処理時期     | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|-----|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|-----------|----------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○2  | ○                  | ○2   | ○始         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | シズイオ:始    | +3～ノビエ2L | 50g×10コ     | ●       | ○             |
| 東北    | ○2  | ○                  | ○2   | ○始         | ○2         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | シズイ:草丈3cm |          |             | ●       | ○             |
| 北陸    | ○2  | ○                  | ○2   |            | ○始         | ○始   |       |      | ●発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ●前              |           |          |             | ●       | ○             |
| 関東・東海 | ○2  | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |           |          |             | ●       | ○             |
| 近・中・四 | ○2  | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○始   |       |      |          | ○再生<br>前～始 | ●前              |           |          |             | ●       | ○             |
| 九州    | ○2  | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |           |          | ●           | ○       |               |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な葉害や効果不足が生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下する場合がある。

田植え前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1  
TH-122-1kg 粒

| 地域名       | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>タカ | ミスガヤ<br>ツリ | ワリカワ | クログワイ | オモタカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期 | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-----------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------|-------------|---------|---------------|
| 北海道       | ●2.5 | ●                  | ●2   | ●2         |            | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |      | +5～ノビエ2.5L  | 1kg     | ●             |
| 東北        | ●2.5 | ●                  | ●2   | ●2         | ●2         | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |      |             |         | ●             |
| 北陸        | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●始         | ●始   |       |      | ●発生<br>期 |            |                 |      |             |         | ●             |
| 関東・東海     | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |      |             |         | ●             |
| 近・中・四 (普) | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |      |             | ●       | ●             |
| 九州        | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |      |             | ●       | ●             |

減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

## A-1

## TH-421 シャンボ

| 地域名      | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|----------|------|-------------------|------|------------|-------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道      | ●2.5 | ●                 | ●2   | ●2         |             | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | +5～ノビエ2.5L | 40g×10コ     |         | ●             |
| 東北       | ●2.5 | ●                 | ●2   | ●2         | ●2          | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |             |         | ●             |
| 北陸       | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2          | ●2   |       |      | ●発生<br>期 |            |                 |            |             |         | ●             |
| 関東・東海    | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2          | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |             |         | ●             |
| 近・中・四（管） | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2          | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            |             | ●       | ●             |
| 九州       | ●2   | ●                 | ●2   |            | ●2          | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 | +5～ノビエ2L   |             | ●       | ●             |

減水深：2cm/日以下

使用上の注意： 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下する場合がある。

田植え前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

## A-1

## TH-913CS シャンボ

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期     | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|-----|-------------------|------|------------|-------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|----------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○2  | ○                 | ○始   | ○始         |             | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +3～ノビエ2L | 50g×10コ     | ○       | ○             |
| 東北    | ○2  | ○                 | ○2   |            | ○2          | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |          |             |         | ○             |
| 北陸    | ○2  | ○                 | ○2   | ○始         | ○始          | ○2   |       |      |          | ○再生<br>前～始 | ○前              |          |             | ○       | ○             |
| 関東・東海 | ○2  | ○                 | ○2   |            | ○2          | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |          |             | ●       | ○             |
| 近・中・四 | ○2  | ○                 | ○2   |            | ○2          | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |          |             | ○       | ○             |
| 九州    | ○2  | ○                 | ○2   |            | ○2          | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |          |             | ○       | ○             |

減水深：2cm/日以下

使用上の注意： 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

散布前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

## A-1

## THI-913CS シャンボ

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期     | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|-----|-------------------|------|------------|-------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|----------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   |     |                   |      |            |             |      |       |      |          |            |                 |          | 50g×10コ     |         |               |
| 東北    |     |                   |      |            |             |      |       |      |          |            |                 |          |             |         |               |
| 北陸    |     |                   |      |            |             |      |       |      |          |            |                 |          |             |         |               |
| 関東・東海 |     |                   |      |            |             |      |       |      |          |            |                 |          |             |         |               |
| 近・中・四 |     |                   |      |            |             |      |       |      |          |            |                 |          |             |         |               |
| 九州    | ○2  | ○                 | ○2   |            | ○2          | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +3～ノビエ2L |             | ○       | ○             |

減水深：2cm/日以下

使用上の注意： 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植え前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1  
YH-546 フロアブル

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤<br>土 | 壤土<br>へ<br>填土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|-------|----|-----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 北海道   | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○始         |            | ○2   |       |      |       |    | ミスアオイ:1L        | +3～ノビエ2.5L | 500ml       | ●           | ○             |
| 東北    | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○始         | ○2         | ○始   |       |      |       |    |                 |            |             |             | ○             |
| 北陸    | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○始   |       |      |       |    |                 |            |             | ○           | ○             |
| 関東・東海 | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○始   |       |      |       |    | SU抵抗性コナギ:2L     |            |             | ○           | ○             |
| 近・中・四 | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○始   |       |      |       |    |                 |            |             | ○           | ○             |
| 九州    | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○前         | ○2         |      |       |      |       |    |                 |            |             | ○           | ○             |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。A-1  
YH-641-1kg 粒

| F1-041-18g 種 |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |             |            |             |             |               |
|--------------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 地域名          | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |             | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤<br>土 | 壤土<br>へ<br>填土 |
| 北海道          | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○2         |            | ○2   |       | ●始   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | ミズアオイ:1L    | +5～ノビエ2.5L | 1kg         | ○           | ○             |
| 東北           | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○始   | ●前※   | ●始※  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |             |            |             | ●           | ○             |
| 北陸           | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○始   | ●始    | ●始   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 |             |            |             | ●           | ○             |
| 関東・東海        | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   | ●始※   | ●始※  | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | SU抵抗性コナギ:1L |            |             | ○           | ○             |
| 近・中・四（普）     | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |             |            |             | ●           | ○             |
| 九州           |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |             |            |             |             |               |

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1  
YH-652 フロアブル

| 地域名       | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤<br>土 | 壤土<br>へ<br>填土 |
|-----------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|----|-----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 北海道       | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○2         |            | ○2   |       |      | ○発生<br>期 |    | SU抵抗性ホタルイ:2L    | +5～ノビエ2.5L | 500ml       | ●           | ○             |
| 東北        | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○始         | ○2         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 |    | SU抵抗性ホタルイ:2L    |            |             |             | ○             |
| 北陸        | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   | ○始※   |      | ○発生<br>期 |    |                 |            |             | ●           | ○             |
| 関東・東海     | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   | ○始※   |      | ○発生<br>期 |    |                 |            |             | ●           | ○             |
| 近・中・四 (普) | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   | ○前    |      | ○発生<br>期 |    |                 |            |             | ●           | ○             |
| 九州        | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 |    | ○前              |            |             | ●           | ○             |

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。  
クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。A-1  
YH-652-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤<br>土 | 壤土<br>へ<br>填土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|----|-----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 北海道   | ●2.5 | ●                 | ●2   | ●2         |            | ●2   |       |      | ●発生<br>期 |    |                 | +5～ノビエ2.5L | 1kg         |             | ●             |
| 東北    | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○始         | ○始         | ○始   |       |      | ○発生<br>期 |    |                 |            |             |             | ○             |
| 北陸    | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 |    |                 |            |             |             | ●             |
| 関東・東海 | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 |    |                 |            |             | ●           | ○             |
| 近・中・四 | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 |    |                 |            |             | ●           | ●             |
| 九州    | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 |    |                 |            |             | ○           | ○             |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1  
YH-655-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期     | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|-----|--------------------|------|------------|--------------|------|--------|------|----------|------------|-----------------|----------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   |     |                    |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |          | 1kg         |         |               |
| 東北    | ○2  | ○                  | ○2   |            | ○2           | ○始   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +0～ノビエ2L |             | ●       | ○             |
| 北陸    | ○2  | ○                  | ○2   |            | ○2           | ○始   |        |      | ●発生<br>期 |            |                 |          |             | ●       | ○             |
| 関東・東海 | ○2  | ○                  | ○2   |            | ○2           | ○始   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ●前              |          |             | ●       | ○             |
| 近・中・四 | ○2  | ○                  | ○2   |            | ○2           | ○始   |        |      | ○発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |          |             | ●       | ○             |
| 九州    | ○2  | ○                  | ○2   |            | ○2           | ○2   |        |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | +0～ノビエ2L |             | ○       | ○             |

田植同時散布可能(東北・関東・東海・近畿・中国・四国・九州)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
田植前に生育したミス'カ'ヤツリには効果がある。

## A-2 体系処理(初期)

A-2  
AVH-006 フロアブル

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                   | 使用量<br>/10a   | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|-----|--------------------|------|------------|--------------|------|--------|------|-------|----|-----------------|------------------------|---------------|---------|---------------|
| 北海道   |     |                    |      |            |              |      |        |      |       |    |                 |                        |               |         |               |
| 東北    | ○1  | ○                  | ○始   |            |              |      |        |      |       |    | ○前              | 植代後～4、+0～<br>+5(ノビエ1L) | 300～<br>500ml | ○       | ○             |
| 北陸    | ○1  | ○                  | ○始   |            |              |      |        |      |       |    |                 |                        |               | ○       | ○             |
| 関東・東海 | ○1  | ○                  | ○始   |            |              |      |        |      |       |    | ○前              |                        |               |         | ○             |
| 近・中・四 | ○1  | ○                  | ○始   |            |              |      |        |      |       |    | ○前              |                        |               |         | ○             |
| 九州    | ○1  | ○                  | ○始   |            |              |      |        |      |       |    | ○前              |                        | 500ml         | ○       | ○             |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 深水条件では害害を生じることがある。

A-2  
CG-113 EW

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離        | 処理時期                   | 使用量<br>/10a                                         | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|-----|--------------------|------|------------|--------------|------|--------|------|-------|----|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○1  | ○                  | ○始   | ○始         |              |      |        |      |       |    | ミス'ア'オイ前<br>SU抵抗性ホタルイ前 | +0～+5(ノビエ1L)           | 100ml<br>(原液<br>または<br>500ml以<br>下の<br>散布微量<br>に希釈) | ○       | ○             |
| 東北    | ○1  | ○                  | ○始   |            | ○始           |      |        |      |       |    |                        | 植代後～4、+0～<br>+5(ノビエ1L) |                                                     | ○       | ○             |
| 北陸    | ○1  | ○                  | ○始   |            | ○始           |      |        |      |       |    |                        |                        |                                                     | ○       | ○             |
| 関東・東海 | ○1  | ○                  | ○始   |            | ○始           |      |        |      |       |    |                        |                        |                                                     | ○       | ○             |
| 近・中・四 | ○1  | ○                  | ○始   |            | ○始           |      |        |      |       |    |                        |                        |                                                     | ○       | ○             |
| 九州    | ○1  | ○                  | ○始   |            | ○始           |      |        |      |       |    |                        |                        |                                                     | ○       | ○             |

田植同時散布可能(散布液量500ml/10aに希釈)

水口処理可能(北海道・東北・関東・東海)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: ミス'ア'オイ、SU抵抗性ホタルイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-2  
CG-113(改) ジェンボ

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離        | 処理時期                                | 使用量<br>/10a         | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|-----|--------------------|------|------------|--------------|------|--------|------|-------|----|------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○1  | ○                  | ○始   | ○始         |              |      |        |      |       |    | SU抵抗性ホタルイ前<br>ミス'ア'オイ始 | +0～+5(ノビエ<br>1L)(砂壌土は+1～)           | 30g×10 <sup>3</sup> | ○       | ○             |
| 東北    | ○1  | ○                  | ○始   | ○始         | ○始           |      |        |      |       |    |                        | 植代後～4、+0～<br>+5(ノビエ1L)              |                     | ○       | ○             |
| 北陸    | ○1  | ○                  | ○始   |            | ○始           |      |        |      |       |    |                        | 植代後～4、+0～<br>+5(ノビエ1L)              |                     | ○       | ○             |
| 関東・東海 | ○1  | ○                  | ○始   |            | ○始           |      |        |      |       |    |                        |                                     |                     | ○       | ○             |
| 近・中・四 | ○1  | ○                  | ○始   |            | ○始           |      |        |      |       |    |                        | 植代後～4、+0～+5(ノ<br>ビエ1L)(砂壌土は+1<br>～) |                     | ○       | ○             |
| 九州    | ○1  | ○                  | ○始   |            | ○始           |      |        |      |       |    |                        | 植代後～4、+0～+5(ノ<br>ビエ1L)(砂壌土は+1<br>～) |                     | ○       | ○             |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

A-2

CG-113-1kg粒

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツバイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                    | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土<br>土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|-----|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 北海道   | ○1  | ○                  | ○始   | ○始         |            |      |       |      |       |    |                 | 植代後～-4,+0～<br>+5(ノビエ1L) | 1kg         | ○            | ○             |
| 東北    | ○1  | ○                  | ○始   | ○始         | ○始         |      |       |      |       |    |                 |                         |             |              | ○             |
| 北陸    | ○1  | ○                  | ○始   | ○始         | ○始         |      |       |      |       |    |                 |                         |             |              | ○             |
| 関東・東海 | ○1  | ○                  | ○始   |            |            |      |       |      |       |    |                 |                         |             |              | ○             |
| 近・中・四 | ○1  | ○                  | ○始   |            |            |      |       |      |       |    |                 |                         |             |              | ○             |
| 九州    | ○1  | ○                  | ○始   |            |            |      |       |      |       |    |                 | 植代後～-4,+0～<br>+3(ノビエ1L) |             | ○*           | ○             |

田植同時散布可能(北海道,東北,北陸,関東・東海,近畿・中国・四国,九州)

\*:九州の砂壤土は普通期を除く

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-2

G-315B 乳(少量散布)

| 地域名    | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツバイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期      | 使用量<br>/10a   | 砂<br>壤土<br>土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|--------|-----|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|-------|----|-----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 北海道    |     |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 | 植代時(-4まで) | 250～<br>350ml |              |               |
| 東北     | ○前  | ○                  | ○前   | ○前         | ○前         |      |       |      |       |    |                 |           |               | ○            | ○             |
| 北陸     | ○前  | ○                  | ○前   | ○前         | ○前         |      |       |      |       |    |                 |           |               | ○            | ○             |
| 関東・東海  | ○前  | ○                  | ○前   |            | ○前         |      |       |      |       |    |                 |           |               | ○            | ○             |
| 近・中・四  | ●前  | ●                  | ●前   |            | ●前         |      |       |      |       |    |                 |           |               |              | ●             |
| 九州 (普) | ●前  | ●                  | ●前   |            | ●前         |      |       |      |       |    |                 |           |               |              | ●             |

土壌混和処理

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-2

HSW-012 フロアブル(少量散布)

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツバイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期        | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土<br>土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|-----|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|-------|----|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 北海道   | ●始  | ●                  | ●前   | ●前         |            | ●前   |       |      | ●前    |    |                 | +0～+5(ノビエ始) | 250ml       |              | ●             |
| 東北    |     |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |             |             |              |               |
| 北陸    |     |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |             |             |              |               |
| 関東・東海 |     |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |             |             |              |               |
| 近・中・四 |     |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |             |             |              |               |
| 九州    |     |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |             |             |              |               |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-2

KH-183㊟-1kg粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツバイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                                | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土<br>土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|-------|----|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 北海道   | ○1.5 | ○                  | ○始   | ○始         |            |      |       |      |       |    | ○始              | +3～ノビエ1.5L<br>植代後～-4,+3～<br>ノビエ1.5L | 1kg         | ●            | ○             |
| 東北    | ○1.5 | ○                  | ○始   | ○始         | ●前         |      |       |      |       |    | ○始              |                                     |             | ●            | ○             |
| 北陸    | ○1.5 | ○                  | ○始   |            | ○始         |      |       |      |       |    | ○始              |                                     |             | ●            | ○             |
| 関東・東海 | ○1.5 | ○                  | ○始   |            | ○始         |      |       |      |       |    | ○始              |                                     |             |              | ○             |
| 近・中・四 | ○1.5 | ○                  | ○始   |            | ○始         |      |       |      |       |    | ○始              |                                     |             | ●            | ○             |
| 九州    | ○1.5 | ○                  | ○始   |            | ○始         |      |       |      |       |    | ○始              |                                     |             | ●            | ○             |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

## A-2

## KPP-2005⑩ フロアブル(少量散布)

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハヤ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ<br>ツツ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                    | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>植土 |
|-------|-----|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○1  | ○                  | ○始   |            |            |      |       |      |       |    |                 | +0～+5(ノビエ1L)            | 300ml       | ○       | ○             |
| 東北    | ○1  | ○                  | ○始   |            | ○前         |      | ○前※   |      |       |    |                 | 植代後～+4,+0～<br>+5(ノビエ1L) |             | ○       | ○             |
| 北陸    | ○1  | ○                  | ○始   |            | ○始         |      |       |      |       |    |                 |                         |             | ○       | ○             |
| 関東・東海 | ○1  | ○                  | ○始   |            | ○始         |      | ○前※   |      |       |    |                 |                         |             | ○       | ○             |
| 近・中・四 | ○1  | ○                  | ○始   |            | ○始         |      | ○前※   |      |       |    |                 |                         |             | ○       | ○             |
| 九州    | ○1  | ○                  | ○始   |            | ○始         |      | ○前※   |      |       |    | コウキヤガラ:発生始      |                         |             | ○       | ○             |

※クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。  
一発処理型除草剤の前処理として少量散布(300ml/10a)が可能。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

## A-2

## KPP-2008-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハヤ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ<br>ツツ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                        | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>植土 |
|-------|-----|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|-------|----|-----------------|-----------------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○1  | ○                  | ○始   | ○始         |            |      |       |      |       |    |                 | +0～+5(ノビエ1L)                | 1kg         | ●       | ○             |
| 東北    | ○1  | ○                  | ○始   | ○前         | ○始         |      |       |      |       |    |                 | 植代後～+4,+0～<br>+5(ノビエ1L)     |             |         | ○             |
| 北陸    | ○1  | ○                  | ○始   |            | ○始         |      |       |      |       |    |                 |                             |             | ●       | ○             |
| 関東・東海 | ○1  | ○                  | ○始   |            | ○始         |      |       |      |       |    |                 |                             |             | ●       | ○             |
| 近・中・四 | ○1  | ○                  | ○始   |            | ○始         |      |       |      |       |    |                 | 植代後～+4,+0～+5(ノビエ1L)(砂壌土は+0) |             | ●       | ○             |
| 九州    | ○1  | ○                  | ○始   |            | ○始         |      |       |      |       |    |                 | 植代後～+4,+0～<br>+5(ノビエ1L)     |             | ●       | ○             |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 深水条件では薬害を生じることがある。

## A-2

## KPP-2011 フロアブル

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハヤ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ<br>ツツ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                    | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>植土 |
|-------|-----|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○1  | ○                  | ○始   | ○始         |            |      |       |      |       |    |                 | +0～+5(ノビエ1L)            | 500ml       | ○       | ○             |
| 東北    | ○1  | ○                  | ○始   |            | ○前         |      |       |      |       |    |                 | 植代後～+4,+0～<br>+5(ノビエ1L) |             | ●       | ○             |
| 北陸    | ○1  | ○                  | ○始   |            | ○前         |      |       |      |       |    |                 |                         |             | ○       | ○             |
| 関東・東海 | ○1  | ○                  | ○前   |            | ○前         |      |       |      |       |    | SU抵抗性コナギ:始      |                         |             | ○       | ○             |
| 近・中・四 | ○1  | ○                  | ○始   |            | ○前         |      |       |      |       |    |                 |                         |             | ○       | ○             |
| 九州    | ○1  | ○                  | ○始   |            | ○始         |      |       |      |       |    |                 |                         |             | ○       | ○             |

一発処理型除草剤の前処理として使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 深水条件では薬害を生じることがある。

SU抵抗性コナギ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

## A-2

## SB-528④ フロアブル

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハヤ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ<br>ツツ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                    | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>植土 |
|-------|-----|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○1  | ○                  | ○始   | ○始         |            |      |       |      |       |    |                 | +0～+5(ノビエ1L)            | 500ml       | ○       | ○             |
| 東北    | ○1  | ○                  | ○始   | ○前         |            |      |       |      |       |    |                 | 植代時～+4,+0～<br>+5(ノビエ1L) |             | ○       | ○             |
| 北陸    | ○1  | ○                  | ○始   |            | ○前         |      |       |      |       |    |                 |                         |             | ○       | ○             |
| 関東・東海 | ○1  | ○                  | ○始   |            | ○始         |      |       |      |       |    |                 |                         |             | ○       | ○             |
| 近・中・四 | ○1  | ○                  | ○始   |            | ○始         |      |       |      |       |    |                 |                         |             | ○       | ○             |
| 九州    | ○1  | ○                  | ○始   | ○前         | ○始         |      |       |      |       |    |                 | 植代後～+4,+0～<br>+5(ノビエ1L) |             | ○       | ○             |

植代時は土壌混和処理

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-2  
SB-529-1kg 粒

| 地域名                                        | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>タカ | ミズカヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                    | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|--------------------------------------------|-----|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道                                        | ○1  | ○                 | ○始   | ○始         |            |      |       |      |       |    |                 | +0～+5(ノビエ1L)            | 1kg         | ○       | ○             |
| 東北                                         | ○1  | ○                 | ○始   | ○始         | ○前         |      |       |      |       |    |                 | 植代後～+4,+0～<br>+5(ノビエ1L) |             | ○       | ○             |
| 北陸                                         | ○1  | ○                 | ○始   | ○始         |            |      |       |      |       |    |                 |                         |             | ●       | ○             |
| 関東・東海                                      | ○1  | ○                 | ○始   |            | ●前         |      |       |      |       |    |                 | +0～+5(ノビエ1L)            |             |         | ○             |
| 近・中・四                                      | ○1  | ○                 | ○始   |            | ●前         |      |       |      |       |    |                 | 植代後～+4,+0～<br>+5(ノビエ1L) |             | ●       | ○             |
| 九州                                         | ○1  | ○                 | ○始   |            |            |      |       |      |       |    |                 | +0～+5(ノビエ1L)            |             | ○       | ○             |
| 減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: 深水条件では薬害を生じることがある。 |     |                   |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |                         |             |         |               |

A-2  
SB-566 フロアブル

| 地域名                     | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>タカ | ミズカヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------------------------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|----|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道                     | ●1.5 | ●                 | ●始   | ●始         |            |      |       |      | ●発生<br>期 |    |                 | +0～ノビエ1.5L | 500ml       |         | ●             |
| 東北                      | ●1.5 | ●                 | ●始   | ●前         | ●始         |      |       |      | ●発生<br>期 |    |                 |            |             |         | ●             |
| 北陸                      | ●1.5 | ●                 | ●始   |            | ●始         |      |       |      | ●発生<br>期 |    |                 |            |             |         | ●             |
| 関東・東海                   | ●1.5 | ●                 | ●始   |            | ●始         |      |       |      | ●発生<br>期 |    |                 |            |             |         | ●             |
| 近・中・四 (普)               | ●1.5 | ●                 | ●始   |            | ●始         |      |       |      |          |    |                 |            |             |         | ●             |
| 九州                      | ●1.5 | ●                 | ●始   |            | ●始         |      |       |      |          |    |                 |            |             |         | ●             |
| 減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |    |                 |            |             |         |               |

A-2  
SB-566-1kg 粒

| 地域名                     | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>タカ | ミズカヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------------------------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|----|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道                     | ●1.5 | ●                 | ●始   | ●始         |            |      |       |      | ●発生<br>期 |    |                 | +0～ノビエ1.5L | 1kg         |         | ●             |
| 東北                      | ●1.5 | ●                 | ●始   |            | ●始         |      |       |      | ●発生<br>期 |    |                 |            |             |         | ●             |
| 北陸                      | ●1.5 | ●                 | ●始   |            | ●始         |      |       |      | ●発生<br>期 |    |                 |            |             |         | ●             |
| 関東・東海                   | ●1.5 | ●                 | ●始   |            | ●始         |      |       |      | ●発生<br>期 |    |                 |            |             |         | ●             |
| 近・中・四 (普)               | ●1.5 | ●                 | ●始   |            | ●始         |      |       |      |          |    |                 |            |             |         | ●             |
| 九州                      | ●1.5 | ●                 | ●始   |            | ●始         |      |       |      |          |    |                 |            |             |         | ●             |
| 減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |    |                 |            |             |         |               |

A-2  
YH-650 フロアブル

| 地域名                     | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>タカ | ミズカヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                  | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------------------------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|-------|----|-----------------|-----------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道                     | ●1.5 | ●                 | ●始   | ●始         |            |      |       |      |       |    |                 | +0～ノビエ1.5L            | 500ml       |         | ●             |
| 東北                      | ●1.5 | ●                 | ●始   | ●始         |            |      |       |      |       |    |                 | 植代後～+4,+0～<br>ノビエ1.5L |             |         | ●             |
| 北陸                      | ●1.5 | ●                 | ●始   |            |            |      |       |      |       |    |                 |                       |             |         | ●             |
| 関東・東海                   | ●1.5 | ●                 | ●始   |            |            |      |       |      |       |    |                 |                       |             |         | ●             |
| 近・中・四 (普)               | ●1.5 | ●                 | ●始   |            |            |      |       |      |       |    |                 |                       |             | ●       | ●             |
| 九州                      | ●1.5 | ●                 | ●始   |            |            |      |       |      |       |    |                 |                       |             |         | ●             |
| 減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: |      |                   |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |                       |             |         |               |

A-2  
YH-650-1kg 粒

| 地域名       | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                  | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌<br>土 | 壤土<br>～<br>植土 |
|-----------|------|-------------------|------|------------|--------------|------|--------|------|-------|----|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|
| 北海道       | ●1.5 | ●                 | ●始   | ●始         |              |      |        |      |       |    |                 | +0～ノビエ1.5L            | 1kg         |             | ●             |
| 東北        | ●1.5 | ●                 | ●始   | ●始         |              |      |        |      |       |    |                 | 植代後～4, +0～<br>ノビエ1.5L |             |             | ●             |
| 北陸        | ●1.5 | ●                 | ●始   |            |              |      |        |      |       |    |                 |                       |             |             | ●             |
| 関東・東海     | ●1.5 | ●                 | ●始   |            |              |      |        |      |       |    |                 |                       |             |             | ●             |
| 近・中・四 (普) | ●1.5 | ●                 | ●始   |            |              |      |        |      |       |    |                 |                       |             | ●           | ●             |
| 九州        | ●1.5 | ●                 | ●始   |            |              |      |        |      |       |    |                 |                       |             | ●           | ●             |

減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意:

A-2  
YH-651 フロアブル

| 地域名       | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                  | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌<br>土 | 壤土<br>～<br>植土 |
|-----------|------|-------------------|------|------------|--------------|------|--------|------|-------|----|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|
| 北海道       |      |                   |      |            |              |      |        |      |       |    |                 |                       | 500ml       |             |               |
| 東北        | ●1.5 | ●                 | ●始   | ●始         | ●始           |      |        |      |       |    |                 | 植代後～4, +0～<br>ノビエ1.5L |             |             | ●             |
| 北陸        | ●1.5 | ●                 | ●始   |            | ●始           |      |        |      |       |    |                 |                       |             |             | ●             |
| 関東・東海     | ○1.5 | ○                 | ○始   |            | ○始           |      | ○前※    |      |       |    | ○始              |                       |             | ●           | ○             |
| 近・中・四 (普) | ●1.5 | ●                 | ●始   |            | ●始           |      |        |      |       |    |                 |                       |             | ●           | ●             |
| 九州        | ●1.5 | ●                 | ●始   |            | ●始           |      |        |      |       |    |                 |                       |             | ●           | ●             |

※: クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。  
減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-2  
ブタクロール 乳

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期      | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌<br>土 | 壤土<br>～<br>植土 |
|-------|-----|-------------------|------|------------|--------------|------|--------|------|-------|----|-----------------|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 北海道   |     |                   |      |            |              |      |        |      |       |    |                 |           | 300ml       |             |               |
| 東北    | ○前  | ○                 | ○前   |            |              |      |        |      |       |    |                 | 植代時(-4まで) |             |             | ○             |
| 北陸    |     |                   |      |            |              |      |        |      |       |    |                 |           |             |             |               |
| 関東・東海 | ○前  | ○                 | ○前   |            | ○前           |      |        |      |       |    |                 | 植代時(-4まで) |             |             | ○             |
| 近・中・四 |     |                   |      |            |              |      |        |      |       |    |                 |           |             |             |               |
| 九州    |     |                   |      |            |              |      |        |      |       |    |                 |           |             |             |               |

土壌混和処理  
混和時の水深3～5cm  
減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意:

A-2  
ブタクロール-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                                  | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌<br>土 | 壤土<br>～<br>植土 |
|-------|-----|-------------------|------|------------|--------------|------|--------|------|-------|----|-----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 北海道   | ○1  | ○                 | ○始   | ○前         |              |      |        |      |       |    | ミス'ア'イ: 始       | +0～+5(ノビエ1L)                          | 1kg         | ○           | ○             |
| 東北    | ○1  | ○                 | ○始   |            | ○始           |      |        |      |       |    |                 | 植代後～4, +0～+5(ノ<br>ビエ1L) (砂壌土は+1<br>～) |             | ○           | ○             |
| 北陸    | ○1  | ○                 | ○始   |            | ○始           |      |        |      |       |    |                 | 植代後～4, +0～<br>+5(ノビエ1L)               |             | ○           | ○             |
| 関東・東海 | ○1  | ○                 | ○始   |            | ○始           |      |        |      |       |    |                 | 植代後～4, +1～<br>+5(ノビエ1L)               |             | ○           | ○             |
| 近・中・四 | ○1  | ○                 | ○始   |            | ○始           |      |        |      |       |    |                 |                                       |             | ○           | ○             |
| 九州    | ○1  | ○                 | ○始   |            | ○始           |      |        |      |       |    |                 |                                       |             | ○           | ○             |

減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意: 浅植え、植え付け精度不良等で根が露出すると薬害を生じることがある。

## A-3 体系処理(中後期)

A-3

DASH-001 SC

| 地域名       | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツバイ | ホタルイ       | ヘラオモ<br>ダカ | ミズガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ       | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                        | 使用量<br>/10a             | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-----------|-----|--------------------|------------|------------|------------|------|-------|------|----------|----------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---------|---------------|
| 北海道       | ●5  | ●                  | ●花茎<br>抽出始 | ●5         |            | ●4   |       |      | ●生育<br>期 | ●生育<br>期 |                 | +25～+40(イネ6L以<br>降,ノビエ5Lまで) | 100ml(散<br>布液量<br>100L) |         | ●             |
| 東北        | ○5  | ○                  | ○花茎<br>抽出始 | ○4         | ○4         | ○4   |       |      | ●生育<br>期 | ●生育<br>期 |                 |                             |                         |         | ○             |
| 北陸        | ○5  | ○                  | ○花茎<br>抽出始 |            | ○4         | ○5   |       |      | ●生育<br>期 | ●生育<br>期 |                 |                             |                         | ●       | ○             |
| 関東・東海     | ○5  | ○                  | ○花茎<br>抽出始 |            | ○5         | ○5   |       |      | ○生育<br>期 | ○生育<br>期 |                 |                             |                         | ●       | ○             |
| 近・中・四 (管) | ○5  | ○                  | ○花茎<br>抽出始 |            | ○5         | ○5   |       |      | ●生育<br>期 |          |                 |                             |                         | ●       | ○             |
| 九州        | ○5  | ○                  | ○花茎<br>抽出始 |            | ○6         | ○6   |       |      | ○生育<br>期 | ○生育<br>期 |                 |                             |                         | ●       | ○             |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組合せで使用する。

落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。

A-3

DBH-1291 乳

| 地域名      | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツバイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期      | 使用量<br>/10a             | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|----------|-----|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|-------|----|-----------------|--|-----------|-------------------------|---------|---------------|
| 北海道      | ●5  |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  | +20～ノビエ5L | 300ml(散<br>布液量<br>100L) |         | ●             |
| 東北       | ●5  |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |           |                         |         | ●             |
| 北陸       | ●6  |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  | +20～ノビエ6L |                         |         | ●             |
| 関東・東海    | ●6  |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |           |                         |         | ●             |
| 近・中・四（管） | ●6  |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |           |                         |         | ●             |
| 九州       | ●6  |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                 |  |           |                         |         | ●             |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組合せで使用する。

落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。

A-3

DEH-112-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツバイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離       | 処理時期      | 使用量<br>/10a                   | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|-----|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|-------|----|-----------------------|-----------|-------------------------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○4  |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                       | +15～ノビエ4L | 1～1.5kg (ノ<br>ビエ3Lを超え<br>る場合は | ○       | ○             |
| 東北    | ○5  |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                       | +15～ノビエ5L | 1～1.5kg (ノ<br>ビエ4Lを超え<br>る場合は | ○       | ○             |
| 北陸    | ○3  |                    |      |            |            |      |       |      |       |    |                       | +15～ノビエ3L | 1～1.5kg                       | ○       | ○             |
| 関東・東海 | ○4  |                    |      |            |            |      |       |      |       |    | キシウスズメノヒエ;再生茎<br>2～4葉 | +15～ノビエ4L | 1～1.5kg (ノ<br>ビエ3Lを超え<br>る場合は | ○       | ○             |
| 近・中・四 | ○4  |                    |      |            |            |      |       |      |       |    | キシウスズメノヒエ;再生茎<br>2～4葉 |           |                               | ○       | ○             |
| 九州    | ○4  |                    |      |            |            |      |       |      |       |    | キシウスズメノヒエ;再生茎<br>2～4葉 |           |                               | ○       | ○             |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

キシウスズメノヒエ防除は展開葉が水面に接する条件で使用する。(関東・東海～九州)

A-3

KPP-444-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツバイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期                   | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|------------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |                        | 1kg         |         |               |
| 東北    | ●1.5 | ●                  | ●始   | ●始         | ●始         | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  | +10～+20(ノビエ<br>1.5Lまで) |             |         | ●             |
| 北陸    |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |                        |             |         |               |
| 関東・東海 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |                        |             |         |               |
| 近・中・四 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |                        |             |         |               |
| 九州    |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |                        |             |         |               |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

## A-3

## KPP-444①-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツバイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロク'ワイ | オモダ'カ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                   | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|--------------------|------|------------|-------------|------|--------|-------|----------|------------|-----------------|------------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   |      |                    |      |            |             |      |        |       |          |            |                 |                        | 1kg         |         |               |
| 東北    |      |                    |      |            |             |      |        |       |          |            |                 |                        |             |         |               |
| 北陸    | ●1.5 | ●                  | ●始   |            | ●始          | ●始   |        |       |          |            |                 | +10～+20(ノビエ<br>1.5Lまで) |             |         | ●             |
| 関東・東海 | ●1.5 | ●                  | ●始   |            | ●始          | ●始   |        |       | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 |                        |             |         | ●             |
| 近・中・四 |      |                    |      |            |             |      |        |       |          |            |                 |                        |             |         |               |
| 九州    |      |                    |      |            |             |      |        |       |          |            |                 |                        |             |         |               |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

## A-3

## KUH-003D ジェンボ'

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツバイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロク'ワイ | オモダ'カ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                   | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|--------------------|------|------------|-------------|------|--------|-------|----------|------------|-----------------|------------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   |      |                    |      |            |             |      |        |       |          |            |                 |                        | 25g×10コ     |         |               |
| 東北    |      |                    |      |            |             |      |        |       |          |            |                 |                        |             |         |               |
| 北陸    |      |                    |      |            |             |      |        |       |          |            |                 |                        |             |         |               |
| 関東・東海 |      |                    |      |            |             |      |        |       |          |            |                 |                        |             |         |               |
| 近・中・四 | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2          | ●2   |        |       | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | +15～+25(ノビエ<br>2.5Lまで) |             | ●       | ●             |
| 九州    |      |                    |      |            |             |      |        |       |          |            |                 |                        |             |         |               |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

## A-3

## KUH-983-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツバイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クロク'ワイ | オモダ'カ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期               | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|-----|--------------------|------|------------|-------------|------|--------|-------|-------|----|-----------------|--------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   | ○4  |                    |      |            |             |      |        |       |       |    |                 | +15～+35(ノビエ<br>4L) | 1kg         | ○       | ○             |
| 東北    | ○4  |                    |      |            |             |      |        |       |       |    |                 |                    |             | ○       | ○             |
| 北陸    | ○4  |                    |      |            |             |      |        |       |       |    |                 |                    |             | ○       | ○             |
| 関東・東海 | ○4  |                    |      |            |             |      |        |       |       |    |                 |                    |             | ○       | ○             |
| 近・中・四 | ○4  |                    |      |            |             |      |        |       |       |    |                 |                    |             | ○       | ○             |
| 九州    | ○4  |                    |      |            |             |      |        |       |       |    |                 |                    |             | ○       | ○             |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

## A-3

## MCP-BAS(Na) 粒

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツバイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガヤ<br>ツリ | ウリカワ       | クロク'ワイ | オモダ'カ | ヒルムシロ    | セリ       | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                | 使用量<br>/10a                                               | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|-----|--------------------|------|------------|-------------|------------|--------|-------|----------|----------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 北海道   |     | ○生育<br>期           | ○4   | ○5         |             | ●塊茎<br>形成前 |        |       | ●生育<br>期 | ●増殖<br>期 |                 | 幼穂形成始期              | 3～4kg<br>(北海道、<br>東北、北<br>陸、近畿・<br>中国、四<br>州の砂壤土<br>は3kg) | ●       | ○             |
| 東北    |     | ○生育<br>期           | ○4   | ○6         | ○6          | ○塊茎<br>形成前 |        |       | ●生育<br>期 | ○増殖<br>期 | シズイ草丈15～20cm    | 有効分けつ終止期<br>～幼穂形成期前 |                                                           | ●       | ○             |
| 北陸    |     | ○生育<br>期           | ○4   | ○5         | ○6          | ○塊茎<br>形成前 |        |       | ○生育<br>期 |          |                 |                     |                                                           | ○       | ○             |
| 関東・東海 |     | ○生育<br>期           | ○4   |            | ○6          | ○塊茎<br>形成前 |        |       |          |          |                 |                     |                                                           | ○       | ○             |
| 近・中・四 |     | ○生育<br>期           | ○4   |            | ○6          | ○塊茎<br>形成前 |        |       |          | ●増殖<br>期 |                 |                     |                                                           | ●       | ○             |
| 九州    |     | ○生育<br>期           | ○5   |            | ○6          | ○塊茎<br>形成前 |        |       |          |          |                 |                     |                                                           | ○       | ○             |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。

降雨などにより散布後2日間以上落水もしくは浅水状態が維持されないと効果が低下することがある。

シズイ防除は有効剤との組み合わせで使用する。

A-3  
MY-100DC フロアブル

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハヤ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期      | 使用量<br>/10a            | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|-----------|------------------------|---------|---------------|
| 北海道   |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |           | 500ml                  |         |               |
| 東北    | ●2.5 | ●                  | ●2   | ●始         | ●2         | ●始   | ●前※   | ●始※  | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | シズイ:草丈3cm | +15～+25(ノビエ<br>2.5Lまで) | ●       | ●             |
| 北陸    |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |           |                        |         |               |
| 関東・東海 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |           |                        |         |               |
| 近・中・四 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |           |                        |         |               |
| 九州    |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |           |                        |         |               |

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。  
 減水深: 2cm/日以下  
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。  
 オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3  
MY-100DC-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハヤ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                   | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                        | 1kg         |         |               |
| 東北    | ●2.5 | ●                  | ●2   | ●始         | ●2         | ●2   | ●前※   | ●前※  | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | +15～+25(ノビエ<br>2.5Lまで) |             | ●       | ●             |
| 北陸    |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                        |             |         |               |
| 関東・東海 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                        |             |         |               |
| 近・中・四 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                        |             |         |               |
| 九州    |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                        |             |         |               |

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。  
 減水深: 2cm/日以下  
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。  
 オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3  
MY-100DC① フロアブル

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハヤ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                   | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                        | 500ml       |         |               |
| 東北    |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                        |             |         |               |
| 北陸    | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | +15～+25(ノビエ<br>2.5Lまで) |             | ●       | ●             |
| 関東・東海 | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   | ●始※   | ●始※  | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | SU抵抗性ホタルイ:1L           |             | ●       | ●             |
| 近・中・四 | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   | ●始※   | ●始   | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |                        |             | ●       | ●             |
| 九州    |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                        |             |         |               |

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。  
 減水深: 2cm/日以下  
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。  
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
 オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3  
MY-100DC①-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハヤ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                   | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                        | 1kg         |         |               |
| 東北    |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                        |             |         |               |
| 北陸    | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      |          | ●再生<br>前～始 |                 | +15～+25(ノビエ<br>2.5Lまで) |             | ●       | ●             |
| 関東・東海 | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   | ●始※   | ●始※  | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |                        |             | ●       | ●             |
| 近・中・四 | ○2.5 | ○                  | ○2   |            | ○2         | ○2   | ○始※   | ○始   | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                        |             | ○       | ○             |
| 九州    |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                        |             |         |               |

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。  
 減水深: 2cm/日以下  
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。  
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
 オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

## A-3

## MY-100NC-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ'ヤ<br>ツツ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                   | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌<br>土 | 壤土<br>へ<br>殖土 |
|-------|------|--------------------|------|------------|--------------|------|--------|------|----------|------------|-----------------|------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 北海道   |      |                    |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |                        | 1kg         |             |               |
| 東北    | ●2.5 | ●                  | ●2   | ●始         | ●2           | ●2   |        |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | +15～+25(ノビエ<br>2.5Lまで) |             | ●           | ●             |
| 北陸    |      |                    |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |                        |             |             |               |
| 関東・東海 |      |                    |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |                        |             |             |               |
| 近・中・四 |      |                    |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |                        |             |             |               |
| 九州    |      |                    |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |                        |             |             |               |

減水深: 2cm/日以下  
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。  
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

## A-3

## MY-100NDC-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ'ヤ<br>ツツ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                 | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌<br>土 | 壤土<br>へ<br>殖土 |
|-------|-----|--------------------|------|------------|--------------|------|--------|------|-------|------------|-----------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|
| 北海道   |     |                    |      |            |              |      |        |      |       |            |                 |                      | 1kg         |             |               |
| 東北    |     |                    |      |            |              |      |        |      |       |            |                 |                      |             |             |               |
| 北陸    | ●3  | ●                  | ●2   |            | ●2           | ●2   |        |      |       | ●再生<br>前～始 | ●前              | +20～+30(ノビエ<br>3Lまで) |             | ●           | ●             |
| 関東・東海 |     |                    |      |            |              |      |        |      |       |            |                 |                      |             |             |               |
| 近・中・四 |     |                    |      |            |              |      |        |      |       |            |                 |                      |             |             |               |
| 九州    |     |                    |      |            |              |      |        |      |       |            |                 |                      |             |             |               |

減水深: 2cm/日以下  
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。  
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

## A-3

## MY-100TSC フロアブル

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ'ヤ<br>ツツ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                   | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌<br>土 | 壤土<br>へ<br>殖土 |
|-------|------|--------------------|------|------------|--------------|------|--------|------|----------|------------|-----------------|------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 北海道   |      |                    |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |                        | 500ml       |             |               |
| 東北    | ●2.5 | ●                  | ●2   | ●前         | ●2           | ●2   |        |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | +15～+25(ノビエ<br>2.5Lまで) |             | ●           | ●             |
| 北陸    | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2           | ●2   |        |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |                        |             | ●           | ●             |
| 関東・東海 | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2           | ●2   |        |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |                        |             | ●           | ●             |
| 近・中・四 | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2           | ●2   |        |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |                        |             | ●           | ●             |
| 九州    | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2           | ●2   |        |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |                        |             | ●           | ●             |

減水深: 2cm/日以下  
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。  
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

## A-3

## NBA-073-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ'ヤ<br>ツツ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                   | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌<br>土 | 壤土<br>へ<br>殖土 |
|-------|------|--------------------|------|------------|--------------|------|--------|------|----------|------------|-----------------|------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 北海道   |      |                    |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |                        | 1kg         |             |               |
| 東北    |      |                    |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |                        |             |             |               |
| 北陸    |      |                    |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |                        |             |             |               |
| 関東・東海 |      |                    |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |                        |             |             |               |
| 近・中・四 | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2           | ●2   |        |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | +15～+25(ノビエ<br>2.5Lまで) |             | ●           | ●             |
| 九州    |      |                    |      |            |              |      |        |      |          |            |                 |                        |             |             |               |

減水深: 2cm/日以下  
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。  
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3  
NC-329-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                                  | 使用量<br>/10a            | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|--------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------|---------|---------------|
| 北海道   |      |                   |      |            |              |      |       |      |          |            |                 |                                       | 1kg                    |         |               |
| 東北    | ○2.5 | ○                 | ○2   | ○2         | ○2           | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | シズ'イ:草丈3cm<br>コウキヤガラ:発生始<br>タウキ:本葉1葉期 | +15～+25(ノビエ<br>2.5Lまで) | ○       | ○             |
| 北陸    | ●2.5 | ●                 | ●2   | ●2         | ●2           | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |                                       |                        | ●       | ●             |
| 関東・東海 | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2           | ●2   |       |      |          | ●再生<br>前～始 | ●前              |                                       |                        | ●       | ●             |
| 近・中・四 |      |                   |      |            |              |      |       |      |          |            |                 |                                       |                        |         |               |
| 九州    |      |                   |      |            |              |      |       |      |          |            |                 |                                       |                        |         |               |

減水深: 2cm/日以下  
 使用上の注意: 前処理剤との組合せで使用する。  
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
 コウキヤガラ・シズ'イ防除は、有効剤との組み合わせで使用する。

A-3  
NC-390 フロアブル

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a          | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|-----|-------------------|------|------------|--------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|----------------------|---------|---------------|
| 北海道   |     |                   |      |            |              |      |       |      |          |            |                 |            | 500ml                |         |               |
| 東北    | ●3  | ●                 | ●2   | ●始         | ●2           | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | シズ'イ:草丈3cm | +20～+30(ノビエ<br>3Lまで) | ●       | ●             |
| 北陸    |     |                   |      |            |              |      |       |      |          |            |                 |            |                      |         |               |
| 関東・東海 | ●3  | ●                 | ●2   |            | ●2           | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |            | +20～+30(ノビエ<br>3Lまで) | ●       | ●             |
| 近・中・四 |     |                   |      |            |              |      |       |      |          |            |                 |            |                      |         |               |
| 九州    |     |                   |      |            |              |      |       |      |          |            |                 |            |                      |         |               |

減水深: 2cm/日以下  
 使用上の注意: 前処理剤との組合せで使用する。  
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。  
 シズ'イ防除は、有効剤との組み合わせで使用する。

A-3  
NH-003-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a            | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|--------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------|------------------------|---------|---------------|
| 北海道   |      |                   |      |            |              |      |       |      |          |            |                 |            | 1kg                    |         |               |
| 東北    | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2           | ●始   | ●前※   | ●前※  | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | シズ'イ:草丈3cm | +15～+25(ノビエ<br>2.5Lまで) | ●       | ●             |
| 北陸    |      |                   |      |            |              |      |       |      |          |            |                 |            |                        |         |               |
| 関東・東海 |      |                   |      |            |              |      |       |      |          |            |                 |            |                        |         |               |
| 近・中・四 |      |                   |      |            |              |      |       |      |          |            |                 |            |                        |         |               |
| 九州    |      |                   |      |            |              |      |       |      |          |            |                 |            |                        |         |               |

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。  
 減水深: 2cm/日以下  
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。  
 オモダカ・クログワイ・シズ'イ防除は有効剤との組み合わせで使用する。

A-3  
NH-803 フロアブル

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                   | 使用量<br>/10a            | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|--------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------------------|------------------------|---------|---------------|
| 北海道   |      |                   |      |            |              |      |       |      |          |            |                 |                        | 500ml                  |         |               |
| 東北    | ●2.5 | ●                 | ●2   | ●2         | ●2           | ●始   | ●前※   | ●始※  | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | クサネム:発生始<br>シズ'イ:草丈3cm | +15～+25(ノビエ<br>2.5Lまで) | ●       | ●             |
| 北陸    |      |                   |      |            |              |      |       |      |          |            |                 |                        |                        |         |               |
| 関東・東海 |      |                   |      |            |              |      |       |      |          |            |                 |                        |                        |         |               |
| 近・中・四 |      |                   |      |            |              |      |       |      |          |            |                 |                        |                        |         |               |
| 九州    |      |                   |      |            |              |      |       |      |          |            |                 |                        |                        |         |               |

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。  
 水口処理可能  
 減水深: 2cm/日以下  
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。  
 オモダカ・クログワイ・シズ'イ防除は有効剤との組み合わせで使用する。

## A-3

## NOJ-101-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                 | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|-----|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|----------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   | ●3  | ●                 | ●2   | ●2         |            | ●2   |       | ●前   | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | +25～+35(ノビエ<br>3Lまで) | 1kg         | ●       | ●             |
| 東北    | ●3  | ●                 | ●2   | ●2         | ●2         | ●2   | ●前※   | ●前※  | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | +20～+30(ノビエ<br>3Lまで) |             | ●       | ●             |
| 北陸    | ●3  | ●                 | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |                      |             |         | ●             |
| 関東・東海 | ●3  | ●                 | ●2   |            | ●2         | ●2   | ●前※   | ●始※  | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |                      |             | ●       | ●             |
| 近・中・四 | ●3  | ●                 | ●2   |            | ●2         | ●2   | ●前※   |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |                      |             | ●       | ●             |
| 九州    | ●3  | ●                 | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |                      |             | ●       | ●             |

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

## A-3

## NOJ-103-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                 | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|-----|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|----------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   | ●3  | ●                 | ●2   | ●2         |            | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | +25～+35(ノビエ<br>3Lまで) | 1kg         | ●       | ●             |
| 東北    | ●3  | ●                 | ●2   | ●2         | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | +20～+30(ノビエ<br>3Lまで) |             | ●       | ●             |
| 北陸    |     |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                      |             |         |               |
| 関東・東海 |     |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                      |             |         |               |
| 近・中・四 |     |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                      |             |         |               |
| 九州    |     |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                      |             |         |               |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組合せで使用する。

## A-3

## NOJ-104-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                 | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|-----|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|----------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   |     |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                      | 1kg         |         |               |
| 東北    |     |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                      |             |         |               |
| 北陸    | ●3  | ●                 | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | +20～+30(ノビエ<br>3Lまで) |             | ●       | ●             |
| 関東・東海 | ●3  | ●                 | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |                      |             | ●       | ●             |
| 近・中・四 | ●3  | ●                 | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |                      |             | ●       | ●             |
| 九州    | ●3  | ●                 | ●2   | ●2         | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |                      |             | ●       | ●             |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

## A-3

## SB-554 シャンボ

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                   | 使用量<br>/10a         | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|----|-----------------|------------------------|---------------------|---------|---------------|
| 北海道   |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |    |                 |                        | 50g×10 <sup>3</sup> |         |               |
| 東北    |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |    |                 |                        |                     |         |               |
| 北陸    |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |    |                 |                        |                     |         |               |
| 関東・東海 | ●1.5 | ●                 | ●始   |            | ●始         |      | ●前    |      | ●発生<br>期 |    |                 | +10～+20(ノビエ<br>1.5Lまで) |                     | ●       | ●             |
| 近・中・四 |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |    |                 |                        |                     |         |               |
| 九州    |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |    |                 |                        |                     |         |               |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3  
SB-554 フロアブル

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                   | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|--------------|------|-------|------|----------|----|-----------------|------------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   |      |                   |      |            |              |      |       |      |          |    |                 |                        | 500ml       |         |               |
| 東北    | ●1.5 | ●                 | ●始   |            | ●始           |      |       |      | ●発生<br>期 |    |                 | +10～+20(ノビエ<br>1.5Lまで) |             |         | ●             |
| 北陸    | ●1.5 | ●                 | ●始   |            | ●始           |      |       |      | ●発生<br>期 |    |                 |                        |             | ●       | ●             |
| 関東・東海 | ●1.5 | ●                 | ●始   |            | ●始           |      |       |      | ●発生<br>期 |    | SU抵抗性コナギ:1L     |                        |             | ●       | ●             |
| 近・中・四 |      |                   |      |            |              |      |       |      |          |    |                 |                        |             |         |               |
| 九州    |      |                   |      |            |              |      |       |      |          |    |                 |                        |             |         |               |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組合せで使用する。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3  
SW-012①-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                   | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|--------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   |      |                   |      |            |              |      |       |      |          |            |                 |                        | 1kg         |         |               |
| 東北    |      |                   |      |            |              |      |       |      |          |            |                 |                        |             |         |               |
| 北陸    | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2           | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | +15～+25(ノビエ<br>2.5Lまで) |             | ●       | ●             |
| 関東・東海 | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2           | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |                        |             | ●       | ●             |
| 近・中・四 | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2           | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |                        |             | ●       | ●             |
| 九州    |      |                   |      |            |              |      |       |      |          |            |                 |                        |             |         |               |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組合せで使用する。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3  
TH-001 フロアブル

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                   | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|--------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   |      |                   |      |            |              |      |       |      |          |            |                 |                        | 500ml       |         |               |
| 東北    | ●2.5 | ●                 | ●2   | ●始         | ●2           | ●2   |       | ●始※  | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | +15～+25(ノビエ<br>2.5Lまで) |             | ●       | ●             |
| 北陸    | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2           | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 |                        |             | ●       | ●             |
| 関東・東海 | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2           | ○2   |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              |                        |             | ○       | ○             |
| 近・中・四 | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2           | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |                        |             | ●       | ●             |
| 九州    | ●2.5 | ●                 | ●2   | ●始         | ●2           | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |                        |             | ●       | ●             |

※:オモダカ防除は、有効剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

オモダカ・シズイ防除は有効剤との組み合わせで使用する。

A-3  
TH-001-1kg 粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                   | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|--------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   |      |                   |      |            |              |      |       |      |          |            |                 |                        | 1kg         |         |               |
| 東北    | ●2.5 | ●                 | ●2   | ●始         | ●2           | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | +15～+25(ノビエ<br>2.5Lまで) |             | ●       | ●             |
| 北陸    | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●始           | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 |                        |             |         | ●             |
| 関東・東海 |      |                   |      |            |              |      |       |      |          |            |                 |                        |             |         |               |
| 近・中・四 |      |                   |      |            |              |      |       |      |          |            |                 |                        |             |         |               |
| 九州    |      |                   |      |            |              |      |       |      |          |            |                 |                        |             |         |               |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組合せで使用する。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3  
TH-913⑩粒

| 地域名       | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |              | 処理時期    | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-----------|-----|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--------------|---------|-------------|---------|---------------|
| 北海道       |     | ○                 | ○    | ○2         |            | ○    |       |      | ○発生<br>期 | ○再生<br>前～始 |                 | エノノサヤスカグサ:2L | +10～+15 | 3kg         | ○       | ○             |
| 東北        |     | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   | ○始※   |      |          |            |                 | シズイ:草丈3cm    |         |             |         | ○             |
| 北陸        |     | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   |       |      |          |            |                 |              |         |             |         | ○             |
| 関東・東海 (普) |     | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   | ○始※   |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 |              | +10～+25 |             | ○       | ○             |
| 近・中・四 (普) |     | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   | ○始※   |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |              |         |             | ○       | ○             |
| 九州 (普)    |     | ○                 | ○2   |            | ○2         | ○2   | ○始※   |      |          |            |                 |              | +10～+15 |             | ○       | ○             |

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

クログワイ、シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3  
YH-641-1kg粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期                  | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|--|-----------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道   |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  | +15～25(ノビエ<br>2.5Lまで) | 1kg         |         |               |
| 東北    | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2         | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              |  |                       |             | ●       | ●             |
| 北陸    |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |                       |             |         |               |
| 関東・東海 |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |                       |             |         |               |
| 近・中・四 |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |                       |             |         |               |
| 九州    |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |  |                       |             |         |               |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組合せで使用する。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3  
YH-653-1kg粒

| 地域名       | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 |  | 処理時期                          | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-----------|------|-------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|----|-----------------|--|-------------------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道       | ○3.5 | ○                 | ○3   | ○3         |            | ○3   |       |      |          |    | ○始              |  | +20～+30(イネ5L以<br>降、ノビエ3.5Lまで) | 1kg         | ●       | ○             |
| 東北        | ●3.5 | ●                 | ●3   | ●3         | ●3         | ●2   |       |      |          |    | ●始              |  |                               |             |         | ●             |
| 北陸        | ○3.5 | ○                 | ○3   |            | ○2         | ○2   |       |      | ○発生<br>期 |    |                 |  |                               |             | ●       | ○             |
| 関東・東海     | ●3.5 | ●                 | ●3   |            | ●3         | ●3   |       |      |          |    |                 |  |                               |             | ●       | ●             |
| 近・中・四 (普) | ●3.5 | ●                 | ●3   |            | ●3         | ●3   |       |      |          |    | ●前              |  |                               |             |         | ●             |
| 九州        |      |                   |      |            |            |      |       |      |          |    |                 |  |                               |             |         |               |

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

著しい高温条件では薬害を生じることがある。

散布後の低温および急激な気温の上昇により薬害を生じることがある。

## A-4 特殊雑草対象(イボクサ)

A-4 イボクサ  
KUH-911 液

| 地域名          | 対象雑草: イボクサ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量 /10a                     |
|--------------|------------|-----------------|------------------------------|
| 関東・東海～九<br>州 | ○          | +30～基長30cm      | 50～100ml(散布液量100L)<br>展着剤無加用 |

使用上の注意: 落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。

A-4 イボクサ  
SB-533P5(改) ジェンボ

SD-55379(9)アザミ

| 地域名     | 対象雑草: イボクサ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量 /10a |
|---------|------------|-----------------|----------|
| 北海道     |            |                 | 50g×5コ   |
| 東北      |            |                 |          |
| 北陸      |            |                 |          |
| 関東・東海   | ●          | 再生始             |          |
| 近・中・四   |            |                 |          |
| 九州      |            |                 |          |
| 使用上の注意: |            |                 |          |

A-4 イボクサ  
SB-556 フロアフル

SD-556 / 0777 R

| 地域名     | 対象雑草: イボクサ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量 /10a |
|---------|------------|-----------------|----------|
| 北海道     |            |                 | 500ml    |
| 東北      |            |                 |          |
| 北陸      |            |                 |          |
| 関東・東海   | ●          | 再生始             |          |
| 近・中・四   |            |                 |          |
| 九州      | ●          | 再生始             |          |
| 使用上の注意: |            |                 |          |

A-4 イボクサ  
SW-991-1kg 粒

SW-991-1kg 粒

| 地域名     | 対象雑草: イボクサ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量 /10a |
|---------|------------|-----------------|----------|
| 北海道     |            |                 | 1kg      |
| 東北      |            |                 |          |
| 北陸      |            |                 |          |
| 関東・東海   | ●          | 再生始             |          |
| 近・中・四   |            |                 |          |
| 九州      |            |                 |          |
| 使用上の注意: |            |                 |          |

## A-4 特殊雑草対象(オモダカ)

A-4 オモダカ  
AC-014A-1kg 粒

AC-U14A-1kg 丸

| 地域名                                                                              | 対象雑草: オモダカ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                              | ○          | 前               | ※               | 1kg      |
| 東北                                                                               | ○          | 前               | ※               |          |
| 北陸                                                                               | ○          | 前               | ※               |          |
| 関東・東海                                                                            | ○          | 前               | ※               |          |
| 近・中・四                                                                            | ○          | 前               | ※               |          |
| 九州                                                                               | ●          | 前               | ※               |          |
| ※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |            |                 |                 |          |

A-4 オモダカ  
KUH-003D ジェンボ

KUH-003D シヤンホ

| 地域名                                                                              | 対象雑草: オモダカ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                              |            |                 |                 | 25g×10㎡  |
| 東北                                                                               |            |                 |                 |          |
| 北陸                                                                               |            |                 |                 |          |
| 関東・東海                                                                            | ●          | 始               | ※               |          |
| 近・中・四                                                                            | ●          | 始               |                 |          |
| 九州                                                                               | ●          | 始               | ※               |          |
| ※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |            |                 |                 |          |

A-4 オモダカ  
KUH-013D-0.25kg 粒

KUH-013D-0.25kg 粒

| 地域名                                                                              | 対象雑草: オモダカ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                              |            |                 |                 | 250g     |
| 東北                                                                               |            |                 |                 |          |
| 北陸                                                                               |            |                 |                 |          |
| 関東・東海                                                                            | ●          | 始               | ※               |          |
| 近・中・四                                                                            | ●          | 始               |                 |          |
| 九州                                                                               | ●          | 始               | ※               |          |
| ※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |            |                 |                 |          |

A-4 オモダカ  
KUHI-013K-0.25kg 粒

| 地域名                                                                              | 対象雑草: オモダカ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                              |            |                 |                 | 250g     |
| 東北                                                                               | ●          | 始               | ※               |          |
| 北陸                                                                               |            |                 |                 |          |
| 関東・東海                                                                            |            |                 |                 |          |
| 近・中・四                                                                            |            |                 |                 |          |
| 九州                                                                               |            |                 |                 |          |
| ※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |            |                 |                 |          |

A-4 オモダカ  
MK-243D-1kg 粒

| 地域名                                                                              | 対象雑草: オモダカ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                              |            |                 |                 | 1kg      |
| 東北                                                                               | ●          | 始               | ※               |          |
| 北陸                                                                               |            |                 |                 |          |
| 関東・東海                                                                            |            |                 |                 |          |
| 近・中・四                                                                            |            |                 |                 |          |
| 九州                                                                               |            |                 |                 |          |
| ※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |            |                 |                 |          |

A-4 オモダカ  
Mon-923-1kg 粒

| 地域名                                                                              | 対象雑草: オモダカ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                              | ●          | 始               |                 | 1kg      |
| 東北                                                                               | ●          |                 | ※               |          |
| 北陸                                                                               |            | 前               |                 |          |
| 関東・東海                                                                            |            |                 |                 |          |
| 近・中・四                                                                            |            |                 |                 |          |
| 九州                                                                               |            |                 |                 |          |
| ※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |            |                 |                 |          |

A-4 オモダカ  
Mon-923①-1kg 粒

| 地域名                                                                              | 対象雑草: オモダカ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                              |            |                 |                 | 1kg      |
| 東北                                                                               |            |                 |                 |          |
| 北陸                                                                               | ●          | 前               |                 |          |
| 関東・東海                                                                            | ●          | 始               | ※               |          |
| 近・中・四                                                                            |            |                 |                 |          |
| 九州                                                                               |            |                 |                 |          |
| ※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |            |                 |                 |          |

A-4 オモダカ  
MY-100NC 顆粒水和

| 地域名                              | 対象雑草: オモダカ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a       |
|----------------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 北海道                              | ●          | 始               |                 | 80g(散布液量500ml) |
| 東北                               |            |                 |                 |                |
| 北陸                               |            |                 |                 |                |
| 関東・東海                            |            |                 |                 |                |
| 近・中・四                            |            |                 |                 |                |
| 九州                               |            |                 |                 |                |
| 使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |            |                 |                 |                |

A-4 オモダカ  
NBA-131a-1kg 粒

| 地域名                                                                              | 対象雑草: オモダカ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                              | ●          | 始               |                 | 1kg      |
| 東北                                                                               | ●          | 始               | ※               |          |
| 北陸                                                                               |            |                 |                 |          |
| 関東・東海                                                                            |            |                 |                 |          |
| 近・中・四                                                                            |            |                 |                 |          |
| 九州                                                                               |            |                 |                 |          |
| ※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |            |                 |                 |          |

A-4 オモダカ  
NBA-131b-1kg 粒

| 地域名   | 対象雑草: オモダカ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|-------|------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道   |            |                 |                 | 1kg      |
| 東北    |            |                 |                 |          |
| 北陸    |            |                 |                 |          |
| 関東・東海 | ●          | 始               | ※               |          |
| 近・中・四 |            |                 |                 |          |
| 九州    | ●          | 始               | ※               |          |

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。  
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ  
NC-385SB 顆粒水和

| 地域名   | 対象雑草: オモダカ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a       |
|-------|------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 北海道   | ●          | 始               |                 | 80g(散布液量500ml) |
| 東北    |            |                 |                 |                |
| 北陸    |            |                 |                 |                |
| 関東・東海 |            |                 |                 |                |
| 近・中・四 |            |                 |                 |                |
| 九州    |            |                 |                 |                |

使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ  
NH-101 ジェル

| 地域名   | 対象雑草: オモダカ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a            |
|-------|------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 北海道   | ●          | 始               |                 | 50g×10 <sup>7</sup> |
| 東北    | ●          | 始               | ※               |                     |
| 北陸    |            |                 |                 |                     |
| 関東・東海 |            |                 |                 |                     |
| 近・中・四 |            |                 |                 |                     |
| 九州    |            |                 |                 |                     |

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。  
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ  
NH-102 フロアブル

| 地域名   | 対象雑草: オモダカ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|-------|------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道   |            |                 |                 | 500ml    |
| 東北    |            |                 |                 |          |
| 北陸    | ●          | 始               |                 |          |
| 関東・東海 | ●          | 始               | ※               |          |
| 近・中・四 | ●          | 始               |                 |          |
| 九州    | ●          | 始               | ※               |          |

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。  
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ  
NH-104-1kg 粒

| 地域名   | 対象雑草: オモダカ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|-------|------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道   |            |                 |                 | 1kg      |
| 東北    |            |                 |                 |          |
| 北陸    | ●          | 始               |                 |          |
| 関東・東海 | ●          | 始               | ※               |          |
| 近・中・四 | ●          | 始               |                 |          |
| 九州    | ●          | 始               | ※               |          |

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。  
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ  
NOJ-103-1kg 粒

| 地域名   | 対象雑草: オモダカ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|-------|------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道   | ●          | 始               |                 | 1kg      |
| 東北    | ●          | 始               | ※               |          |
| 北陸    |            |                 |                 |          |
| 関東・東海 |            |                 |                 |          |
| 近・中・四 |            |                 |                 |          |
| 九州    |            |                 |                 |          |

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。  
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ  
NOJ-104-1kg 粒

| 地域名   | 対象雑草: オモダカ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|-------|------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道   |            |                 |                 | 1kg      |
| 東北    |            |                 |                 |          |
| 北陸    |            |                 |                 |          |
| 関東・東海 | ●          | 始               | ※               |          |
| 近・中・四 |            |                 |                 |          |
| 九州    | ●          | 始               | ※               |          |

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。  
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ  
SW-002① フロアブル

| 地域名   | 対象雑草: オモダカ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|-------|------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道   |            |                 |                 | 500ml    |
| 東北    |            |                 |                 |          |
| 北陸    | ○          | 前               |                 |          |
| 関東・東海 | ●          | 始               | ※               |          |
| 近・中・四 | ●          | 始               |                 |          |
| 九州    | ●          | 始               | ※               |          |

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。  
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ  
YH-641-1kg 粒

| 地域名   | 対象雑草: オモダカ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|-------|------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道   | ●          | 始               |                 | 1kg      |
| 東北    | ●          | 始               | ※               |          |
| 北陸    | ●          | 始               |                 |          |
| 関東・東海 | ●          | 始               | ※               |          |
| 近・中・四 |            |                 |                 |          |
| 九州    |            |                 |                 |          |

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。  
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

## A-4 特殊雑草対象(クサネム)

A-4 クサネム  
KUH-911 液

| 地域名 | 対象雑草: クサネム | 処理時期(対象雑草の生育時期)            | 使用量 /10a                                                   |
|-----|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 全域  | ○          | +30～草丈40cm<br>(九州は～草丈30cm) | 25～50ml(散布液量100L)<br>展着剤加用<br>50～100ml(散布液量100L)<br>展着剤無加用 |

使用上の注意: 落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。

## A-4 特殊雑草対象(クログワイ)

A-4 クログワイ  
AC-014A-1kg 粒

| 地域名   | 対象雑草: クログワイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|-------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道   |             |                 |                 | 1kg      |
| 東北    | ○           | 前               | ※               |          |
| 北陸    |             |                 |                 |          |
| 関東・東海 | ○           | 前               | ※               |          |
| 近・中・四 | ○           | 前               | ※               |          |
| 九州    | ●           | 前               | ※               |          |

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。  
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ  
AVH-002-1kg 粒

| 地域名   | 対象雑草: クログワイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|-------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道   |             |                 |                 | 1kg      |
| 東北    | ○           | 前               | ※               |          |
| 北陸    |             |                 |                 |          |
| 関東・東海 | ●           | 始               | ※               |          |
| 近・中・四 |             |                 |                 |          |
| 九州    |             |                 |                 |          |

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。  
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ  
FSS-115 粒

| 地域名                                                                                | 対象雑草: クログワイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                                |             |                 |                 | 3kg      |
| 東北                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 北陸                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 関東・東海                                                                              | ●           | 始               | ※               |          |
| 近・中・四                                                                              |             |                 |                 |          |
| 九州                                                                                 |             |                 |                 |          |
| ※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |             |                 |                 |          |

A-4 クログワイ  
KPP-2005 シャンボ

| 地域名                                                                                      | 対象雑草: クログワイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                                      |             |                 |                 | 50g×10㎡  |
| 東北                                                                                       | ○           | 前               | ※               |          |
| 北陸                                                                                       |             |                 |                 |          |
| 関東・東海                                                                                    | ○           | 前               | ※               |          |
| 近・中・四                                                                                    | ○           | 前               | ※               |          |
| 九州                                                                                       | ○           | 前               | ※               |          |
| ※:クログワイ防除は、クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |             |                 |                 |          |

A-4 クログワイ  
KPP-2005DDフロアブル(少量散布)

| 地域名                                                                                      | 対象雑草: クログワイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                                      |             |                 |                 | 300ml    |
| 東北                                                                                       | ○           | 前               | ※               |          |
| 北陸                                                                                       |             |                 |                 |          |
| 関東・東海                                                                                    | ○           | 前               | ※               |          |
| 近・中・四                                                                                    | ○           | 前               | ※               |          |
| 九州                                                                                       | ○           | 前               | ※               |          |
| ※:クログワイ防除は、クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |             |                 |                 |          |

A-4 クログワイ  
KPP-2008 FL(EW)

| 地域名                                                                                | 対象雑草: クログワイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                                |             |                 |                 | 500ml    |
| 東北                                                                                 | ●           | 前               | ※               |          |
| 北陸                                                                                 | ●           | 前               | ※               |          |
| 関東・東海                                                                              | ●           | 前               | ※               |          |
| 近・中・四                                                                              | ●           | 前               | ※               |          |
| 九州                                                                                 | ●           | 前               | ※               |          |
| ※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |             |                 |                 |          |

A-4 クログワイ  
KUH-003D シャンボ

| 地域名                                                                                | 対象雑草: クログワイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                                |             |                 |                 | 25g×10㎡  |
| 東北                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 北陸                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 関東・東海                                                                              | ●           | 始               | ※               |          |
| 近・中・四                                                                              | ●           | 始               | ※               |          |
| 九州                                                                                 | ●           | 始               | ※               |          |
| ※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |             |                 |                 |          |

A-4 クログワイ  
KUH-013D-0.25kg 粒

| 地域名                                                                                | 対象雑草: クログワイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                                |             |                 |                 | 250g     |
| 東北                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 北陸                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 関東・東海                                                                              | ●           | 始               | ※               |          |
| 近・中・四                                                                              | ●           | 始               | ※               |          |
| 九州                                                                                 | ●           | 始               | ※               |          |
| ※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |             |                 |                 |          |

A-4 クログワイ  
KUH-013K-0.25kg 粒

| 地域名                                                                                | 対象雑草: クログワイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                                |             |                 |                 | 250g     |
| 東北                                                                                 | ●           | 前               | ※               |          |
| 北陸                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 関東・東海                                                                              |             |                 |                 |          |
| 近・中・四                                                                              |             |                 |                 |          |
| 九州                                                                                 |             |                 |                 |          |
| ※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |             |                 |                 |          |

A-4 クログワイ  
KUH-985㊦ フロアブル

| 地域名                                                                                | 対象雑草: クログワイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                                |             |                 |                 | 500ml    |
| 東北                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 北陸                                                                                 | ●           | 始               | ※               |          |
| 関東・東海                                                                              | ○           | 始               | ※               |          |
| 近・中・四                                                                              | ○           | 始               | ※               |          |
| 九州                                                                                 | ○           | 始               | ※               |          |
| ※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |             |                 |                 |          |

A-4 クログワイ  
MK-243D-1kg 粒

| 地域名                                                                                | 対象雑草: クログワイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                                |             |                 |                 | 1kg      |
| 東北                                                                                 | ●           | 前               | ※               |          |
| 北陸                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 関東・東海                                                                              |             |                 |                 |          |
| 近・中・四                                                                              |             |                 |                 |          |
| 九州                                                                                 |             |                 |                 |          |
| ※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |             |                 |                 |          |

A-4 クログワイ  
Mon-923-1kg 粒

| 地域名                                                                                | 対象雑草: クログワイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                                |             |                 |                 | 1kg      |
| 東北                                                                                 | ●           | 前               | ※               |          |
| 北陸                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 関東・東海                                                                              |             |                 |                 |          |
| 近・中・四                                                                              |             |                 |                 |          |
| 九州                                                                                 |             |                 |                 |          |
| ※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |             |                 |                 |          |

A-4 クログワイ  
Mon-923㊦-1kg 粒

| 地域名                                                                                | 対象雑草: クログワイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                                |             |                 |                 | 1kg      |
| 東北                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 北陸                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 関東・東海                                                                              | ●           | 始               | ※               |          |
| 近・中・四                                                                              | ●           | 始               |                 |          |
| 九州                                                                                 |             |                 |                 |          |
| ※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |             |                 |                 |          |

A-4 クログワイ  
MY-100DC㊦ フロアブル

| 地域名                                                                                | 対象雑草: クログワイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                                |             |                 |                 | 500ml    |
| 東北                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 北陸                                                                                 | ●           | 始               | ※               |          |
| 関東・東海                                                                              | ○           | 始               | ※               |          |
| 近・中・四                                                                              | ○           | 始               | ※               |          |
| 九州                                                                                 | ○           | 始               | ※               |          |
| ※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |             |                 |                 |          |

A-4 クログワイ

MY-100DC①-1kg 粒

| 地域名                                                                                | 対象雑草: クログワイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                                |             |                 |                 | 1kg      |
| 東北                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 北陸                                                                                 | ●           | 始               | ※               |          |
| 関東・東海                                                                              | ○           | 始               | ※               |          |
| 近・中・四                                                                              | ○           | 始               | ※               |          |
| 九州                                                                                 | ○           | 始               | ※               |          |
| ※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |             |                 |                 |          |

A-4 クログワイ

MY-100NC-1kg 粒

| 地域名                                                                                | 対象雑草: クログワイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                                |             |                 |                 | 1kg      |
| 東北                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 北陸                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 関東・東海                                                                              | ●           | 始               | ※               |          |
| 近・中・四                                                                              |             |                 |                 |          |
| 九州                                                                                 |             |                 |                 |          |
| ※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |             |                 |                 |          |

A-4 クログワイ

MY-100NDC-1kg 粒

| 地域名                                                                                | 対象雑草: クログワイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                                |             |                 |                 | 1kg      |
| 東北                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 北陸                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 関東・東海                                                                              | ●           | 始               | ※               |          |
| 近・中・四                                                                              | ●           | 始               | ※               |          |
| 九州                                                                                 |             |                 |                 |          |
| ※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |             |                 |                 |          |

A-4 クログワイ

NBA-071-1kg 粒

| 地域名                                                                                | 対象雑草: クログワイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                                |             |                 |                 | 1kg      |
| 東北                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 北陸                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 関東・東海                                                                              |             |                 |                 |          |
| 近・中・四                                                                              | ●           | 始               | ※               |          |
| 九州                                                                                 |             |                 |                 |          |
| ※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |             |                 |                 |          |

A-4 クログワイ

NBA-131a-1kg 粒

| 地域名                                                                                | 対象雑草: クログワイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                                |             |                 |                 | 1kg      |
| 東北                                                                                 | ●           | 前               | ※               |          |
| 北陸                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 関東・東海                                                                              |             |                 |                 |          |
| 近・中・四                                                                              |             |                 |                 |          |
| 九州                                                                                 |             |                 |                 |          |
| ※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |             |                 |                 |          |

A-4 クログワイ

NBA-131b-1kg 粒

| 地域名                                                                                | 対象雑草: クログワイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                                |             |                 |                 | 1kg      |
| 東北                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 北陸                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 関東・東海                                                                              | ●           | 始               | ※               |          |
| 近・中・四                                                                              |             |                 |                 |          |
| 九州                                                                                 | ●           | 始               | ※               |          |
| ※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |             |                 |                 |          |

A-4 クログワイ  
NC-390 プロアフル

| 地域名                                                                                | 対象雑草: クログワイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                                |             |                 |                 | 500ml    |
| 東北                                                                                 | ●           | 前               | ※               |          |
| 北陸                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 関東・東海                                                                              | ●           | 始               | ※               |          |
| 近・中・四                                                                              |             |                 |                 |          |
| 九州                                                                                 |             |                 |                 |          |
| ※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |             |                 |                 |          |

A-4 クログワイ  
NH-101 シェンボ

| 地域名                                                                                | 対象雑草: クログワイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                                |             |                 |                 | 50g×10コ  |
| 東北                                                                                 | ●           | 前               | ※               |          |
| 北陸                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 関東・東海                                                                              |             |                 |                 |          |
| 近・中・四                                                                              |             |                 |                 |          |
| 九州                                                                                 |             |                 |                 |          |
| ※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |             |                 |                 |          |

A-4 クログワイ  
NH-102 プロアフル

| 地域名                                                                                | 対象雑草: クログワイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                                |             |                 |                 | 500ml    |
| 東北                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 北陸                                                                                 | ●           | 始               |                 |          |
| 関東・東海                                                                              | ●           | 始               | ※               |          |
| 近・中・四                                                                              | ●           | 始               |                 |          |
| 九州                                                                                 | ●           | 始               | ※               |          |
| ※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |             |                 |                 |          |

A-4 クログワイ  
NH-104-1kg 粒

| 地域名                                                                                | 対象雑草: クログワイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                                |             |                 |                 | 1kg      |
| 東北                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 北陸                                                                                 | ●           | 始               |                 |          |
| 関東・東海                                                                              | ●           | 始               | ※               |          |
| 近・中・四                                                                              | ●           | 始               |                 |          |
| 九州                                                                                 | ●           | 始               | ※               |          |
| ※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |             |                 |                 |          |

A-4 クログワイ  
NOJ-103-1kg 粒

| 地域名                                                                                | 対象雑草: クログワイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                                |             |                 |                 | 1kg      |
| 東北                                                                                 | ●           | 前               | ※               |          |
| 北陸                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 関東・東海                                                                              |             |                 |                 |          |
| 近・中・四                                                                              |             |                 |                 |          |
| 九州                                                                                 |             |                 |                 |          |
| ※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |             |                 |                 |          |

A-4 クログワイ  
NOJ-104-1kg 粒

| NOJ-104-1kg粒                                                                       |             |                 |                 |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 地域名                                                                                | 対象雑草: クログワイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
| 北海道                                                                                |             |                 |                 | 1kg      |
| 東北                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 北陸                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 関東・東海                                                                              | ●           | 始               | ※               |          |
| 近・中・四                                                                              | ●           | 始               | ※               |          |
| 九州                                                                                 |             |                 |                 |          |
| ※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |             |                 |                 |          |

A-4 クログワイ  
SW-002①フロアブル

| 地域名                                                                                | 対象雑草: クログワイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                                |             |                 |                 | 500ml    |
| 東北                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 北陸                                                                                 | ○           | 始               | ※               |          |
| 関東・東海                                                                              | ●           | 始               | ※               |          |
| 近・中・四                                                                              | ●           | 始               | ※               |          |
| 九州                                                                                 | ●           | 始               | ※               |          |
| ※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |             |                 |                 |          |

A-4 クログワイ  
TH-001フロアブル

| 地域名                                                                                | 対象雑草: クログワイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                                |             |                 |                 | 500ml    |
| 東北                                                                                 | ●           | 前               | ※               |          |
| 北陸                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 関東・東海                                                                              | ●           | 始               | ※               |          |
| 近・中・四                                                                              |             |                 |                 |          |
| 九州                                                                                 |             |                 |                 |          |
| ※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |             |                 |                 |          |

A-4 クログワイ  
TH-001①フロアブル

| 地域名                                                                                | 対象雑草: クログワイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                                |             |                 |                 | 500ml    |
| 東北                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 北陸                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 関東・東海                                                                              |             |                 |                 |          |
| 近・中・四                                                                              | ●           | 始               | ※               |          |
| 九州                                                                                 | ●           | 始               | ※               |          |
| ※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |             |                 |                 |          |

A-4 クログワイ  
YH-641-1kg 粒

| 地域名                                                                                | 対象雑草: クログワイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                                |             |                 |                 | 1kg      |
| 東北                                                                                 | ●           | 前               | ※               |          |
| 北陸                                                                                 | ●           | 始               |                 |          |
| 関東・東海                                                                              | ●           | 始               | ※               |          |
| 近・中・四                                                                              |             |                 |                 |          |
| 九州                                                                                 |             |                 |                 |          |
| ※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |             |                 |                 |          |

A-4 クログワイ  
YH-651フロアブル

| 地域名                                                                                | 対象雑草: クログワイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                                |             |                 |                 | 500ml    |
| 東北                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 北陸                                                                                 | ○           | 前               | ※               |          |
| 関東・東海                                                                              | ○           | 前               | ※               |          |
| 近・中・四                                                                              | ○           | 前               |                 |          |
| 九州                                                                                 |             |                 |                 |          |
| ※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |             |                 |                 |          |

A-4 クログワイ  
YH-652フロアブル

| 地域名                                                                                | 対象雑草: クログワイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 連年施用による<br>効果向上 | 使用量 /10a |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道                                                                                |             |                 |                 | 500ml    |
| 東北                                                                                 |             |                 |                 |          |
| 北陸                                                                                 | ○           | 始               | ※               |          |
| 関東・東海                                                                              | ○           | 始               | ※               |          |
| 近・中・四                                                                              | ○           | 前               |                 |          |
| 九州                                                                                 |             |                 |                 |          |
| ※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。<br>使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 |             |                 |                 |          |

A-4 コウキヤガラ  
TH-001 プロアプル

| 地域名   | 対象雑草: コウキヤガラ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量 /10a |
|-------|--------------|-----------------|----------|
| 北海道   | ●            | 始               | 500ml    |
| 東北    |              |                 |          |
| 北陸    |              |                 |          |
| 関東・東海 |              |                 |          |
| 近・中・四 |              |                 |          |
| 九州    |              |                 |          |

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

## A-4 特殊雑草対象(シズイ)

A-4 シズイ  
AVH-002-1kg 粒

| 地域名   | 対象雑草: シズイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量 /10a |
|-------|-----------|-----------------|----------|
| 北海道   | ●         | 草丈3cm           | 1kg      |
| 東北    |           |                 |          |
| 北陸    |           |                 |          |
| 関東・東海 |           |                 |          |
| 近・中・四 |           |                 |          |
| 九州    |           |                 |          |

使用上の注意: シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 シズイ  
MCP-BAS(Na) 粒

| 地域名   | 対象雑草: シズイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量 /10a |
|-------|-----------|-----------------|----------|
| 北海道   | ●         | 草丈15~20cm       | 3kg      |
| 東北    |           |                 |          |
| 北陸    |           |                 |          |
| 関東・東海 |           |                 |          |
| 近・中・四 |           |                 |          |
| 九州    |           |                 |          |

使用上の注意: シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 シズイ  
NOJ-103-1kg 粒

| 地域名   | 対象雑草: シズイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量 /10a |
|-------|-----------|-----------------|----------|
| 北海道   | ●         | 草丈3cm           | 1kg      |
| 東北    |           |                 |          |
| 北陸    |           |                 |          |
| 関東・東海 |           |                 |          |
| 近・中・四 |           |                 |          |
| 九州    |           |                 |          |

使用上の注意: シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 シズイ  
SYJ-108 ジャンボ

| 地域名   | 対象雑草: シズイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量 /10a |
|-------|-----------|-----------------|----------|
| 北海道   | ●         | 草丈3cm           | 30g×10㍓  |
| 東北    |           |                 |          |
| 北陸    |           |                 |          |
| 関東・東海 |           |                 |          |
| 近・中・四 |           |                 |          |
| 九州    |           |                 |          |

使用上の注意: シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 シズイ  
TH-001-1kg 粒

| 地域名   | 対象雑草: シズイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量 /10a |
|-------|-----------|-----------------|----------|
| 北海道   | ●         | 草丈3cm           | 1kg      |
| 東北    |           |                 |          |
| 北陸    |           |                 |          |
| 関東・東海 |           |                 |          |
| 近・中・四 |           |                 |          |
| 九州    |           |                 |          |

使用上の注意: シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 シズイ  
TH-005 シャンボ

| 地域名   | 対象雑草: シズイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量 /10a            |
|-------|-----------|-----------------|---------------------|
| 北海道   | ●         | 草丈3cm           | 50g×10 <sup>3</sup> |
| 東北    |           |                 |                     |
| 北陸    |           |                 |                     |
| 関東・東海 |           |                 |                     |
| 近・中・四 |           |                 |                     |
| 九州    |           |                 |                     |

使用上の注意: シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

## A-4 特殊雑草対象(ミズアオイ)

A-4 ミズアオイ  
AVH-002-1kg 粒

| 地域名   | 対象雑草: ミズアオイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量 /10a |
|-------|-------------|-----------------|----------|
| 北海道   | ●           | 始               | 1kg      |
| 東北    |             |                 |          |
| 北陸    |             |                 |          |
| 関東・東海 |             |                 |          |
| 近・中・四 |             |                 |          |
| 九州    |             |                 |          |

使用上の注意:

A-4 ミズアオイ  
CG-113 EW

| 地域名   | 対象雑草: ミズアオイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量 /10a  |
|-------|-------------|-----------------|-----------|
| 北海道   | ●           | 前               | 100ml(原液) |
| 東北    |             |                 |           |
| 北陸    |             |                 |           |
| 関東・東海 |             |                 |           |
| 近・中・四 |             |                 |           |
| 九州    |             |                 |           |

使用上の注意: 有効な剤との組み合わせで使用する

A-4 ミズアオイ  
CG-113(改) シャンボ

| 地域名   | 対象雑草: ミズアオイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量 /10a            |
|-------|-------------|-----------------|---------------------|
| 北海道   | ●           | 前               | 30g×10 <sup>3</sup> |
| 東北    |             |                 |                     |
| 北陸    |             |                 |                     |
| 関東・東海 |             |                 |                     |
| 近・中・四 |             |                 |                     |
| 九州    |             |                 |                     |

使用上の注意: 有効な剤との組み合わせで使用する

A-4 ミズアオイ  
NBA-131a-1kg 粒

| 地域名   | 対象雑草: ミズアオイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量 /10a |
|-------|-------------|-----------------|----------|
| 北海道   | ●           | 始               | 1kg      |
| 東北    |             |                 |          |
| 北陸    |             |                 |          |
| 関東・東海 |             |                 |          |
| 近・中・四 |             |                 |          |
| 九州    |             |                 |          |

使用上の注意:

A-4 ミズアオイ  
TH-005 シャンボ

| 地域名   | 対象雑草: ミズアオイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量 /10a            |
|-------|-------------|-----------------|---------------------|
| 北海道   | ●           | 始               | 50g×10 <sup>3</sup> |
| 東北    |             |                 |                     |
| 北陸    |             |                 |                     |
| 関東・東海 |             |                 |                     |
| 近・中・四 |             |                 |                     |
| 九州    |             |                 |                     |

使用上の注意:

A-4 ミズアオイ  
YH-546 フロアブル

| 地域名     | 対象雑草： ミズアオイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量 /10a |
|---------|-------------|-----------------|----------|
| 北海道     | ●           | 1L              | 500ml    |
| 東北      |             |                 |          |
| 北陸      |             |                 |          |
| 関東・東海   |             |                 |          |
| 近・中・四   |             |                 |          |
| 九州      |             |                 |          |
| 使用上の注意: |             |                 |          |

A-4 ミズアオイ  
YH-641-1kg 粒

| 地域名     | 対象雑草: ミズアオイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量 /10a |
|---------|-------------|-----------------|----------|
| 北海道     | ●           | 1L              | 1kg      |
| 東北      |             |                 |          |
| 北陸      |             |                 |          |
| 関東・東海   |             |                 |          |
| 近・中・四   |             |                 |          |
| 九州      |             |                 |          |
| 使用上の注意: |             |                 |          |

## A-4 特殊雑草対象(SU抵抗性コナギ)

A-4 SU抵抗性コナギ  
AC-014A-1kg 粒

| 地域名     | 対象雑草: SU抵抗性コナギ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量 /10a |
|---------|----------------|-----------------|----------|
| 北海道     |                |                 | 1kg      |
| 東北      |                |                 |          |
| 北陸      |                |                 |          |
| 関東・東海   | ●              | 始               |          |
| 近・中・四   |                |                 |          |
| 九州      |                |                 |          |
| 使用上の注意: |                |                 |          |

A-4 SU抵抗性コナギ  
KPP-2011 フロアブル

| 地域名                       | 対象雑草: SU抵抗性コナギ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量 /10a |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------|
| 北海道                       |                |                 | 500ml    |
| 東北                        |                |                 |          |
| 北陸                        |                |                 |          |
| 関東・東海                     | ●              | 始               |          |
| 近・中・四                     |                |                 |          |
| 九州                        |                |                 |          |
| 使用上の注意: 有効な剤との組み合わせで使用する。 |                |                 |          |

A-4 SU抵抗性コナギ  
SW-041①-1kg (旧 NBA-141b-1kg) 粒

| 地域名     | 対象雑草: SU抵抗性コナギ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量 /10a |
|---------|----------------|-----------------|----------|
| 北海道     |                |                 | 1kg      |
| 東北      |                |                 |          |
| 北陸      |                |                 |          |
| 関東・東海   | ●              | 1L              |          |
| 近・中・四   |                |                 |          |
| 九州      |                |                 |          |
| 使用上の注意: |                |                 |          |

A-4 SU抵抗性コナギ  
YH-641-1kg 粒

| 地域名     | 対象雑草: SU抵抗性コナギ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量 /10a |
|---------|----------------|-----------------|----------|
| 北海道     |                |                 | 1kg      |
| 東北      |                |                 |          |
| 北陸      |                |                 |          |
| 関東・東海   | ●              | 1L              |          |
| 近・中・四   |                |                 |          |
| 九州      |                |                 |          |
| 使用上の注意: |                |                 |          |

## A-4 特殊雑草対象(SU抵抗性ホタルイ)

A-4 SU抵抗性ホタルイ

AVH-002-1kg 粒

| 地域名     | 対象雑草: SU抵抗性ホタルイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量 /10a |
|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道     | ●               | 1L              | 1kg      |
| 東北      | ○               | 1L              |          |
| 北陸      |                 |                 |          |
| 関東・東海   | ●               | 1L              |          |
| 近・中・四   |                 |                 |          |
| 九州      |                 |                 |          |
| 使用上の注意: |                 |                 |          |

A-4 SU抵抗性ホタルイ

BAG-032 ジャンボ

| 地域名     | 対象雑草: SU抵抗性ホタルイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量 /10a |
|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道     |                 |                 | 20g×10㎡  |
| 東北      |                 |                 |          |
| 北陸      |                 |                 |          |
| 関東・東海   | ●               | 2L              |          |
| 近・中・四   |                 |                 |          |
| 九州      |                 |                 |          |
| 使用上の注意: |                 |                 |          |

A-4 SU抵抗性ホタルイ

CG-113 EW

| 地域名                      | 対象雑草: SU抵抗性ホタルイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量 /10a  |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 北海道                      | ●               | 前               | 100ml(原液) |
| 東北                       |                 |                 |           |
| 北陸                       |                 |                 |           |
| 関東・東海                    |                 |                 |           |
| 近・中・四                    |                 |                 |           |
| 九州                       |                 |                 |           |
| 使用上の注意: 有効な剤との組み合わせで使用する |                 |                 |           |

A-4 SU抵抗性ホタルイ

KUH-011D-1kg 粒

| 地域名     | 対象雑草: SU抵抗性ホタルイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量 /10a |
|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道     |                 |                 | 1kg      |
| 東北      |                 |                 |          |
| 北陸      |                 |                 |          |
| 関東・東海   | ●               | 2L              |          |
| 近・中・四   |                 |                 |          |
| 九州      |                 |                 |          |
| 使用上の注意: |                 |                 |          |

A-4 SU抵抗性ホタルイ

NBA-131b-1kg 粒

| 地域名     | 対象雑草: SU抵抗性ホタルイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量 /10a |
|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道     |                 |                 | 1kg      |
| 東北      |                 |                 |          |
| 北陸      |                 |                 |          |
| 関東・東海   | ●               | 1L              |          |
| 近・中・四   |                 |                 |          |
| 九州      |                 |                 |          |
| 使用上の注意: |                 |                 |          |

A-4 SU抵抗性ホタルイ

SW-002 フロアブル

| 地域名     | 対象雑草: SU抵抗性ホタルイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量 /10a |
|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道     |                 |                 | 500ml    |
| 東北      | ●               | 2L              |          |
| 北陸      |                 |                 |          |
| 関東・東海   |                 |                 |          |
| 近・中・四   |                 |                 |          |
| 九州      |                 |                 |          |
| 使用上の注意: |                 |                 |          |

A-4 SU抵抗性ホタルイ  
SW-024④ シャンボ

| 地域名     | 対象雑草： SU抵抗性ホタルイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量 /10a |
|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道     | ●               | 2L              | 40g×10㎡  |
| 東北      | ●               | 2L              |          |
| 北陸      |                 |                 |          |
| 関東・東海   |                 |                 |          |
| 近・中・四   |                 |                 |          |
| 九州      |                 |                 |          |
| 使用上の注意： |                 |                 |          |

A-4 SU抵抗性ホタルイ  
SW-024④ シャンボ

| 地域名     | 対象雑草: SU抵抗性ホタルイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量 /10a |
|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道     |                 |                 | 40g×10㎡  |
| 東北      |                 |                 |          |
| 北陸      |                 |                 |          |
| 関東・東海   | ●               | 1L              |          |
| 近・中・四   |                 |                 |          |
| 九州      |                 |                 |          |
| 使用上の注意: |                 |                 |          |

A-4 SU抵抗性ホタルイ  
SW-041④-1kg (旧 NBA-141a-1kg) 粒

| 地域名     | 対象雑草： SU抵抗性ホタルイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量 /10a |
|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道     | ●               | 1.5L            | 1kg      |
| 東北      | ●               | 1.5L            |          |
| 北陸      |                 |                 |          |
| 関東・東海   |                 |                 |          |
| 近・中・四   |                 |                 |          |
| 九州      |                 |                 |          |
| 使用上の注意： |                 |                 |          |

A-4 SU抵抗性ホタルイ  
SW-041④-1kg (旧 NBA-141b-1kg) 粒

| 地域名     | 対象雑草: SU抵抗性ホタルイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量 /10a |
|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道     |                 |                 | 1kg      |
| 東北      |                 |                 |          |
| 北陸      |                 |                 |          |
| 関東・東海   | ●               | 1.5L            |          |
| 近・中・四   |                 |                 |          |
| 九州      |                 |                 |          |
| 使用上の注意: |                 |                 |          |

A-4 SU抵抗性ホタルイ  
TH-001 フロアブル

| 地域名     | 対象雑草: SU抵抗性ホタルイ | 処理時期(対象雑草の生育時期) | 使用量 /10a |
|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 北海道     |                 |                 | 500ml    |
| 東北      | ○               | 2L              |          |
| 北陸      |                 |                 |          |
| 関東・東海   | ●               | 2L              |          |
| 近・中・四   |                 |                 |          |
| 九州      |                 |                 |          |
| 使用上の注意: |                 |                 |          |

## B 直播栽培

B  
KUH-011D-1kg 粒

| 地域名                                                        | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハイ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミズカヤ<br>ツツ | ウリカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期             | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|------------------------------------------------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------------|-------------|---------|---------------|
| 北陸～九州                                                      | ●2.5 | ●                  | ●2   |            | ●2         | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | イネ1L～ノビエ<br>2.5L | 1kg         | ●       | ●             |
| 灌水条件で使用する。<br>減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: イネの根が露出する条件では被害を生じる。 |      |                    |      |            |            |      |       |      |          |            |                 |                  |             |         |               |

B

KUH-011K-1kg 粒

| 地域名    | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモダ'カ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期             | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|--------|------|-------------------|------|------------|--------------|------|--------|-------|----------|------------|-----------------|------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道、東北 | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●始           | ●始   |        |       | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 | イネ1L～ノビエ<br>2.5L | 1kg         |         | ●             |

湛水直播  
湛水条件で使用する。  
減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

KUH-013D-0.25kg 粒

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモダ'カ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期             | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|--------------|------|--------|-------|----------|------------|-----------------|------------------|-------------|---------|---------------|
| 北陸～九州 | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2           | ●2   |        |       | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 | ●前              | イネ1L～ノビエ<br>2.5L | 250g        | ●       | ●             |

湛水条件で使用する。  
減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

KUH-013K-0.25kg 粒

| 地域名    | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモダ'カ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期             | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|--------|------|-------------------|------|------------|--------------|------|--------|-------|----------|------------|-----------------|------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道、東北 | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●始           | ●始   |        |       | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 | イネ1L～ノビエ<br>2.5L | 250g        |         | ●             |

湛水直播  
湛水条件で使用する。  
減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

KUH-962-1kg 粒

| 地域名              | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモダ'カ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期             | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|------------------|------|-------------------|------|------------|--------------|------|--------|-------|-------|----|-----------------|------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道～近畿・<br>中国・四国 | ●3.5 | ●                 | ●3   |            | ●3           | ●3   |        |       |       |    |                 | イネ5L～ノビエ<br>3.5L | 1kg         | ●       | ●             |

湛水直播  
湛水条件で使用する。  
減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意: 著しい高温条件では薬害を生じることがある。  
散布後の低温および急激な気温の上昇により薬害を生じることがある。  
前処理剤との組み合わせで使用する。

B

KUH-972D フロアブル

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモダ'カ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|-----|-------------------|------|------------|--------------|------|--------|-------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 北陸～九州 | ○3  | ○                 | ○2   |            | ○2           | ○2   |        |       | ●発生<br>期 | ○再生<br>前～始 | ○前              | イネ1L～ノビエ3L | 500ml       | ○       | ○             |

湛水直播  
湛水条件で使用する。  
減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

KUH-983-1kg 粒

| 地域名 | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログ'ワイ | オモダ'カ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期       | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-----|-----|-------------------|------|------------|--------------|------|--------|-------|-------|----|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 全域  | ●4  |                   |      |            |              |      |        |       |       |    |                 | イネ3L～ノビエ4L | 1kg         |         | ●             |

湛水条件で使用する。  
減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。  
イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B  
KUH-985①フロアブル

| 地域名                                                                | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                                   | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|------|------------|--------------|------|-------|------|-------|------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|---------|---------------|
| 北陸～九州                                                              | ○3  | ○                 | ○2   |            | ○2           | ○2   |       |      |       | ○再生<br>前～始 | ○前              | イネ1L*～ノビエ<br>3L<br>(*:砂壌土はイ<br>ネ1.5L～) | 500ml       | ○*      | ○             |
| 湛水直播<br>湛水条件で使用する。<br>減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: イネの根が露出する条件では葉害を生じる。 |     |                   |      |            |              |      |       |      |       |            |                 |                                        |             |         |               |

B  
MY-100DC①フロアブル

| 地域名                                                        | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期             | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|------------------------------------------------------------|------|-------------------|------|------------|--------------|------|-------|------|-------|------------|-----------------|------------------|-------------|---------|---------------|
| 北陸～九州                                                      | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2           | ●2   |       |      |       | ●再生<br>前～始 |                 | イネ1L～ノビエ<br>2.5L | 500ml       |         | ●             |
| 湛水条件で使用する。<br>減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: イネの根が露出する条件では葉害を生じる。 |      |                   |      |            |              |      |       |      |       |            |                 |                  |             |         |               |

B  
MY-100TSCフロアブル

| 地域名                                                        | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期             | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|------------------------------------------------------------|------|-------------------|------|------------|--------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------------|-------------|---------|---------------|
| 全域                                                         | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2           | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 | イネ1L～ノビエ<br>2.5L | 500ml       |         | ●             |
| 湛水条件で使用する。<br>減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: イネの根が露出する条件では葉害を生じる。 |      |                   |      |            |              |      |       |      |          |            |                 |                  |             |         |               |

B  
NBA-071-1kg 粒

| 地域名                                                                | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期             | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------|------------|--------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------------|-------------|---------|---------------|
| 東北～九州                                                              | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2           | ●2   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 | イネ1L～ノビエ<br>2.5L | 1kg         |         | ●             |
| 湛水直播<br>湛水条件で使用する。<br>減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: イネの根が露出する条件では葉害を生じる。 |      |                   |      |            |              |      |       |      |          |            |                 |                  |             |         |               |

B  
NC-385SB 顆粒水和

| 地域名                                                                | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期             | 使用量<br>/10a            | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------|------------|--------------|------|-------|------|-------|----|-----------------|------------------|------------------------|---------|---------------|
| 東北～九州                                                              | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2           |      |       |      |       |    |                 | イネ1L～ノビエ<br>2.5L | 80g(散<br>布液量<br>500ml) |         | ●             |
| 湛水直播<br>湛水条件で使用する。<br>減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: イネの根が露出する条件では葉害を生じる。 |      |                   |      |            |              |      |       |      |       |    |                 |                  |                        |         |               |

B  
NH-102フロアブル

| 地域名                                                                | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'ガ'ヤ<br>ツリ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期             | 使用量<br>/10a | 砂<br>壌土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------|------------|--------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------------|-------------|---------|---------------|
| 北陸～九州                                                              | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2           | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 | イネ1L～ノビエ<br>2.5L | 500ml       |         | ●             |
| 湛水直播<br>湛水条件で使用する。<br>減水深: 2cm/日以下<br>使用上の注意: イネの根が露出する条件では葉害を生じる。 |      |                   |      |            |              |      |       |      |          |            |                 |                  |             |         |               |

B

## SB-556 フロアブル

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ'ヤ<br>ツツ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期             | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|--------------|------|-------|------|----------|----|-----------------|------------------|-------------|---------|---------------|
| 東北～九州 | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2           | ●2   |       |      | ●発生<br>期 |    |                 | イネ1L～ノビエ<br>2.5L | 500ml       | ●       | ●             |

湛水直播  
湛水条件で使用する。  
減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

## SW-002 フロアブル

| 地域名     | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ'ヤ<br>ツツ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期             | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|---------|------|-------------------|------|------------|--------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道, 東北 | ○2.5 | ○                 | ○2   |            |              | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 | イネ1L～ノビエ<br>2.5L | 500ml       |         | ○             |

湛水条件で使用する。  
減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

## SW-002① フロアブル

| 地域名   | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ'ヤ<br>ツツ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期             | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-------|------|-------------------|------|------------|--------------|------|-------|------|----------|------------|-----------------|------------------|-------------|---------|---------------|
| 北陸～九州 | ○2.5 | ○                 | ○2   |            | ○2           | ●始   |       |      | ●発生<br>期 | ●再生<br>前～始 |                 | イネ1L～ノビエ<br>2.5L | 500ml       |         | ○             |

湛水直播  
湛水条件で使用する。  
減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

## SW-973-1kg 粒

| 地域名                    | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ'ヤ<br>ツツ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期             | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|------------------------|------|-------------------|------|------------|--------------|------|-------|------|----------|----|-----------------|------------------|-------------|---------|---------------|
| 北海道<br>東北～近畿・中<br>国・四国 | ○3.5 | ○                 | ○2   |            | ○2           | ○2   |       |      | ○発生<br>期 |    |                 | イネ5L～ノビエ<br>3.5L | 1kg         | ●       | ○             |

湛水直播(関東・東海, 近畿・中国・四国)  
湛水条件で使用する。  
減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意: 著しい高温条件では薬害を生じることがある。  
散布後の低温および急激な気温の上昇により薬害を生じることがある。  
前処理剤との組み合わせで使用する。

B

## SW-991-1kg 粒

| 地域名 | ノビエ  | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ'ヤ<br>ツツ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ    | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期             | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-----|------|-------------------|------|------------|--------------|------|-------|------|----------|----|-----------------|------------------|-------------|---------|---------------|
| 全域  | ●2.5 | ●                 | ●2   |            | ●2           | ●2   |       |      | ●発生<br>期 |    |                 | イネ1L～ノビエ<br>2.5L | 1kg         |         | ●             |

湛水条件で使用する。  
減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

## TH-913NCS フロアブル

| 地域名 | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツハ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミス'カ'ヤ<br>ツツ | ウリカワ | クログワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ         | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期                               | 使用量<br>/10a | 砂<br>壤土 | 壤土<br>～<br>埴土 |
|-----|-----|-------------------|------|------------|--------------|------|-------|------|-------|------------|-----------------|------------------------------------|-------------|---------|---------------|
| 全域  | ○3  | ○                 | ○2   |            | ○2           | ○2   |       |      |       | ○再生<br>前～始 |                 | イネ1L～ノビエ3L<br>(北海道～北陸は<br>イネ1.5L～) | 500ml       |         | ○             |

湛水直播  
湛水条件で使用する。  
減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

## C 畦畔雑草

C

AH-01 液

| 地域名 |   | 対象雑草 | 処理時期            | 使用量(散布液量) /10a           | 適用土壌 |
|-----|---|------|-----------------|--------------------------|------|
| 全域  | ● | 全草種  | 雑草生育期(草丈30cm以下) | 500～1000ml(散布液量100～150L) | 全土壌  |

使用上の注意: のり面には使用しない。  
水田内に流入または飛散すると薬害を生じる。

C

ZK-122 液

| 地域名 |   | 対象雑草        | 処理時期            | 使用量(散布液量) /10a                                                         | 適用土壌 |
|-----|---|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| 全域  | ○ | 全草種(スギナを除く) | 雑草生育期(草丈30cm以下) | 一年生雑草:250～500ml/10a<br>多年生雑草:500～1000ml/10a<br>(散布液量50L/10a, 専用ノズルを使用) | 全土壌  |

使用上の注意: のり面には使用しない。  
水田内に流入または飛散すると薬害を生じる。

## その他

その他

DEH-112 乳(EW)

| 地域名   | ノビエ | 一年生<br>広葉・<br>マツバ | ホタルイ | ヘラオモ<br>ダカ | ミスガヤ<br>ツリ | ワカワ | クロクワイ | オモダカ | ヒルムシロ | セリ | 藻類・<br>表層<br>剥離 | 処理時期             | 使用量<br>/10a             | 砂<br>壌<br>土 | 壤<br>土<br>～<br>埴<br>土 |
|-------|-----|-------------------|------|------------|------------|-----|-------|------|-------|----|-----------------|------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| 北海道   | ○5  |                   |      |            |            |     |       |      |       |    |                 | 播種後10日～ノ<br>ビエ5L | 100ml(散<br>布液量<br>100L) |             |                       |
| 東北    |     |                   |      |            |            |     |       |      |       |    |                 |                  |                         |             |                       |
| 北陸    |     |                   |      |            |            |     |       |      |       |    |                 |                  |                         |             |                       |
| 関東・東海 |     |                   |      |            |            |     |       |      |       |    |                 |                  |                         |             |                       |
| 近・中・四 |     |                   |      |            |            |     |       |      |       |    |                 |                  |                         |             |                       |
| 九州    |     |                   |      |            |            |     |       |      |       |    |                 |                  |                         |             |                       |

機械移植育苗に使用する  
減水深: 2cm/日以下  
使用上の注意:

## 水稲関係除草剤使用基準の表示について

- 過年度、既に実用化の認められている適用草種・土壌条件に○を印した。  
(本年度の試験の結果、特に拡大のない場合も含む)  
草種欄の数字、字句で草種ごとの葉齢を示した。[例:○始(発生始)、○2(2葉期まで)]  
作期に限定がある場合は、地域名の後に適用作期を普通期:(普), 早期:(早)と記した。  
使用上の注意は別途一覧表に沿って文章で備考欄に記載した。
- 本年度、新たに使用基準が作成された場合は、実用化可能となった適用草種・土壌に●を印し、  
処理時期及び使用量を記載した。  
C(畦畔), D(耕起前), E(休耕田)の試験区分において、判定欄の○は前年度までに実用化の  
認められている地域を示す。
- 過年度の基準に適用条件拡大が可能となった場合、  
作 期 の 拡 大 : 作期の限定がなくなった場合、作期の記載を取消線で消した。(例:(普))  
草 種 の 拡 大 : 拡大可能となった草種に●を印した。  
葉 齢 の 拡 大 : 拡大可能となった葉齢に、アンダーラインを付した。(例: ○2.5)  
処理時期, 使用量の拡大 : 拡大部分にアンダーラインを付した。(例: ±3～ノビエ2L, 50～75ml/a)  
土 壌 条 件 の 拡 大 : 拡大可能となった土壌に●を印した。

省力タイプの  
高性能一発処理除草剤  
シリーズ

# 問題雑草を一掃!!

投げ込み用 水稲用一発処理除草剤  
**マサカリ**  
ジャンボ

投げ込むだけ!!

水稲用初・中期一発除草剤  
**ダイナマン**

フロアブル 1キロ粒剤75

ダイナマンにお任せ!!

少量拡散型 水稲用一発処理除草剤  
**ダンシングパワー**  
500グラム粒剤

容れ物を振り回すに歩くだけ!!

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小売の手の届くところには置かないでください。
- 空容器は密閉に保管せず、破棄に影響のないように適切に処理してください。

**日本農薬株式会社**  
東京都中央区日本橋1丁目2番5号  
ホームページアドレス <http://www.nichino.co.jp/>

## ミスターホームランは 決め手が3つ!

| 水稲用一発処理除草剤      | 水稲用一発処理除草剤         | 水稲用一発処理除草剤      |
|-----------------|--------------------|-----------------|
| <b>一発でキメる。</b>  | <b>一振りですべてキメる。</b> | <b>バックでキメる。</b> |
|                 |                    |                 |
| 1キロ粒剤75/1キロ粒剤51 | フロアブル/フロアブル        | ジャンボ/ジャンボ       |

水稲用一発処理除草剤

**ホーラン** A1キロ粒剤36  
◎ 1キロ粒剤51

**一発でキメる。**

**水田除草は  
ホームラン剤で  
キメる!**

**M4-100**

「低コスト」「省力」「安全」ニーズに応えるホームラン剤

●ノビエ2.5葉期まで効果がある(ジャンボ剤は2葉期まで) ●ノビエに対する効果がなが〜続く ●稲への安全性が高い

JAグループ  
**農協** | **全農** | 経済連

**北興化学工業株式会社**  
〒103-8341 東京都中央区日本橋本町4-4-20  
ホームページアドレス <http://www.hokkochem.co.jp>

◎は登録商標

## 植調協会だより

### ◎ 人事異動

平成17年1月31日付

退職 事務局

川本 弘行

### 編集後記


今年は北陸から東北地方の日本海側は19年振りの大雪に見舞われ、雪国の人々は難儀を強いられている。この影響か関東地方も今年も暖冬には変わりはないが、昨年よりは春の兆しが数日遅れているようだ。昨年の今日は（2月16日）はわが家の庭の梅が八分咲きだったが、今年は3分咲きとやや遅れている。

大雪の年は豊作といわれているが、2005年は平和で、豊かな暮しが訪れることを切に願うものである。

節分も過ぎると陽射しも1日1日暖かさを増し、関東の日溜りにはオオイヌノフグリが小さなコバルトブルーの可憐な花を咲かせ春の訪れを告げている。かわいいので摘みとって花束を作りミニ生花

にとコップに差して観賞しようとしてもこれは失敗に終る。何故なら美しい花も1時間も持たずに花冠が落ちてしまうからである。

オオイヌノフグリの花は昆虫が止まると虫の重みで花が傾くので虫は必然的に雄しべにしがみつき、その結果として雄しべの葯と雌しべの柱頭が触れ合って花粉が柱頭につき、



▲オオイヌノフグリ開花期

### ◎ 訃報

当協会元古川試験地主任紺野亨氏（83歳）は、平成17年1月31日逝去されました。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

やがて日がかげり出すと雄しべがゆるやかに動きだして雄しべと雌しべが近づいて互いに触れ合って自動的に受粉するという巧妙な仕組みをもっている。受粉が終ると花冠はガクの強い挟む力によってポロリと落ちる。

こうした性質からオオイヌノフグリの花は触れると落ちるといわれており、人間の手で触れても同じ理由でポロリと落ちるといわれるが、実際には触れてすぐにポロリと落ちるのはまれで、多くは触れてから時間が経過してから落ちるのが普通である。

オオイヌノフグリの和名は、実の形がイヌのふぐり（鰐丸）に似ているということからついた名であるが、春一番に

咲き出す可憐な花なのでもっと上品な名をと、ルリカラクサ、ハタケクワガタなどと呼ばれたが、これはあまり普及せず、在来のにヌノフグリとの関係からか、オオイヌノフグリと奇妙な名で通用するようになったと言われている。私ならハルイチバンと名づけたところだ。

㊦

財団法人 日本植物調節剤研究協会

東京都台東区台東1丁目26番6号

電話 (03)3832-4188 (代)

FAX (03)3833-1807

編集人 日本植物調節剤研究協会 会長 小林 仁

発行人 植調編集印刷事務所 広田 伸七

東京都台東区台東1-26-6 全国農村教育協会

発行所 植調編集印刷事務所

電話 (03)3833-1821 (代)

FAX (03)3833-1665

E-mail: hon@zennokyo.co.jp

平成17年2月発行 定価525円(本体500円+消費税25円)

植調第38巻第11号

(送料 270円)

印刷所 新成印刷(有)

難防除雑草  
対策の新製品

サラブレッド®  
RX フロアブル

イッテツ®  
フロアブル

期待の新製品

使いやすさの大本命

サラブレッド® フロアブル

ノビエ3葉期  
まで使える

アピロイグル®

フロアブル

ポ〜んと手軽に

クラッシュ® EX ジャンボ

安定した効果の  
初中期一発剤

ドニチ1® 粒剤

大好評の既存剤

ザ・ワン® フロアブル  
1kg粒剤

キックバイ1® キロ粒剤

アワード® フロアブル

ロンゲット® フロアブル

シェリフ1® 粒剤

リーディング®  
ジャンボ

クラッシュ1® 粒剤


バトル® 粒剤

住化武田農業株式会社  
〒104-0033 東京都中央区新川一丁目16番3号

DUPONT

The miracles of science™

デュポン社が開発した  
ベンスルフロンメチル「ロンダックス®」は、  
日本の美味しい米作りと食の安全を支えています。



「ロンダックス®」は低薬量かつ1回の処理で除草ができる自然に  
やさしい環境負荷低減型除草剤。

様々な有効成分と混合し、使いやすい薬剤として、日本における  
水稲面積の約60%※の除草作業をお手伝いしています。

※平成15年度出荷実績



上記のマークがついている除草剤には  
ロンダックス® (DPX-84) が含まれています。

デュポン株式会社 農業製品事業部 〒100-6111 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー 電話 03-5521-8410 Fax.03-5521-2470 ⑧は米国デュポン社の登録商標です。

水稻用初・中期一発除草剤

# パワーウルフ

新発売

てごわい雑草  
パワーで勝負!!

1キロ粒剤



特長

- ご好評のウルフエースがパワーアップしました。
- スルホニルウレア抵抗性のホタルイ類に対して高い効果があります。
- 難防除雑草を含む広範囲の雑草に効果が優れています。
- 水稻や環境に対する安全性が高い薬剤です。


JAグループ  
農協 | 全農® | 経済連  
®は登録商標です。

自然に学び 自然を守る  
クミアイ化学工業株式会社  
本社:東京都台東区池之端1-4-26 〒110-8782 TEL:03-3822-5036  
ホームページ/<http://www.kumiai-chem.co.jp>

いのちの輝きを見つめる

## Meiji

私たちは、夢と楽しさ、いのちの輝きを大切にし、  
世界の人々の心豊かなくらしに、貢献します。



天然物で確実除草

## ハービー®液剤

Meiji 明治製菓株式会社  
104-8002 東京都中央区京橋2-4-16  
<http://www.meiji.co.jp/nouyaku>