

平成16年度水稲作関係除草剤試験成績概要

財団法人 日本植物調節剤研究協会 技術部

平成16年度水稲作関係除草剤試験成績中央検討会は、平成16年12月9日、10日の2日間、池之端文化センターにおいて開催された。なお、適1試験成績検討会は、これに先立ち平成16年10月7日 台東1丁目区民館にて開催された。ここに、これら検討会における判定結果を報告する。

1) 第一次適用性試験(適1)は、北海道地域(植調北海道試験地)、東北地域(植調古川試験地)、北陸地域(植調新潟試験地)、関東地域(植調研究所)、近畿・中国・四国地域(植調滋賀試験地)、九州地域(植調福岡試

験地)の全国6地域および砂壤土(植調霞ヶ浦試験地)で40薬剤(のべ201点)について実施した。その判定結果は、第2表のとおりである。

2) 第二次適用性試験(適2)の総点数はのべ2,370点であり、その内訳を第1表にまとめた。これら適2試験の判定結果は第3表のとおりであり、「実・継」と判定された薬剤の使用基準を後に掲載した。

第1表 平成16年度適2試験実施点数

A-1 移植栽培(一発処理)	148 剤 1,416 点	A-4 特殊雑草対象 内訳	
A-2 移植栽培(体系処理:初期)	23 剤 259 点	イボクサ	7 剤 11 点
A-3 移植栽培(体系処理:中後期)	35 剤 226 点	オモダカ	43 剤 84 点
A-4 移植栽培(特殊雑草対象)	のべ 179 剤 318 点	クサネム	1 剤 6 点
B 直播栽培	33 剤 124 点	クログワイ	65 剤 134 点
C 畦畔雑草	5 剤 19 点	コウキヤガラ	3 剤 4 点
D 耕起前	1 剤 2 点	シズイ	14 剤 18 点
E 休耕田	1 剤 4 点	ミズアオイ	12 剤 18 点
その他	1 剤 2 点	SU 抵抗性コナギ	12 剤 12 点
		SU 抵抗性ホタルイ	22 剤 35 点

第2表 平成16年度 水稻関係除草剤適1試験 判定結果一覧

注) 評価欄の記入については、◎:極めて有望、○:有望、□:可能性有り、△:再検討、×:見込みなし を表す。

NO	試験名・剤型 [委託会社]	有効成分及び含有率 (%)	実施場所別総合評価							判定 [今後の検討課題]
			北海道	古川	新潟	植調	滋賀	福岡	霞ヶ浦(砂)	
1	BAH-041-1kg 粒 [BASFアグロ]	シクロスファミロン :0.5 ベンゾビシクロン:2 ベントキサゾン :3.9	□	□	○	□	○	○	□	□ 一発処理で +0~ノビエ1.5L, ホタルイ1L [低温時の効果変動について]
2	BCH-044-1kg 粒 [ハイエル]	イマゾスルフロ :0.9 タムロン :4.5 フェントラミド :3 プロモフチド :9	○	○	○	○	○	○	○	○ 一発処理で +0~ノビエ2.5L, ホタルイ2L [年次変動の確認]
3	BCH-045H-1kg 粒 [ハイエル]	タムロン :4.5 フェントラミド :3 プロモフチド :9 ベンスルフロメチル:0.75	□	○						□ 一発処理で +0~ノビエ2.5L, ホタルイ2L [効果変動要因の検討]
4	BCH-045L-1kg 粒 [ハイエル]	タムロン :4.5 フェントラミド :3 プロモフチド :9 ベンスルフロメチル:0.51			○	○	○	○	○	○ 一発処理で +0~ノビエ2.5L, ホタルイ2L [年次変動の確認]
5	DASH-002-1kg 粒 [タウケミカル]	ベノキスラム :0.2 未公開(既知):A	□	○	□	□	□	□	□	成分未公開につき判定せず
6	DKH-411-1kg 粒 [デュボン]	クロメフロップ :3.5 タムロン :4.5 ベンスルフロメチル:0.51 メフェネット :10			○	□	□	□	□	□ 一発処理で +3~ノビエ2.5L, ホタルイ2L [年次変動の確認(特に持続性)]
7	HOK-0401 シャンボ [*北興, デュボン, SDS]	オキサシクロメホン :1.2 ベンスルフロメチル:1.5 ベンゾビシクロン:4	○	○						○ 一発処理で +1~ノビエ2.5L, ホタルイ2L [年次変動の確認]
8	HOK-0401 フロアブル [*北興, デュボン, SDS]	オキサシクロメホン :1.2 ベンスルフロメチル:1.4 ベンゾビシクロン:4	○	○						○ 一発処理で +0~ノビエ2.5L, ホタルイ2L [年次変動の確認]
9	HOK-0401-1kg 粒 [*北興, デュボン, SDS]	オキサシクロメホン :0.8 ベンスルフロメチル:0.75 ベンゾビシクロン:2	○	○						○ 一発処理で +5~ノビエ2.5L, ホタルイ2L [年次変動の確認]
10	HOK-222 シャンボ [*北興, デュボン]	オキサシクロメホン :1.2 クロメフロップ :6 プロモフチド :12 ベンスルフロメチル:1.5	◎	○						○ 一発処理で +1~ノビエ2.5L, ホタルイ2L [年次変動の確認]
11	HOK-223 シャンボ [*北興, デュボン]	オキサシクロメホン :1.2 クロメフロップ :6 プロモフチド :12 ベンスルフロメチル:1.02			○	○	○	○	○	○ 一発処理で +1~ノビエ2.5L, ホタルイ2L [年次変動の確認]
12	KPP-2012 フロアブル [科研]	ピララレート:20 ベントキサゾン:4	□	○	○	□	□	□	△	□ 体系処理(初期)で +0~ノビエ1.5L [ホタルイ効果と薬害の変動について]
13	KPP-445 フロアブル [*科研, 三井東圧]	プロモフチド :18 ベンスルフロメチル:1.5 ベントキサゾン :7.8(W/V)	◎	○						○ 一発処理で +0~ノビエ1.5L, ホタルイ1L [年次変動の確認]

NO	試験名 ・ 剤型 [委託会社]	有効成分及び含有率 (%)	実施場所別総合評価							判定 [今後の検討課題]
			北 海 道	古 川	新 潟	植 調	滋 賀	福 岡	霞 ヶ 浦 (砂)	
14	KPP-445① フロアブル [*科研, 三井東圧]	フ*ロモフ*チト* :18 ベ*ンスルフロメチル:1.02 ベ*ントキサゾン :7.8(W/V)			○	○	○	○	△	○ 一発処理で +0~ノビエ1.5L, ホタルイ1L [薬害発生要因の解明]
15	KUH-032 シ*ンボ* [*タミ化, SDS]	カフェンストロール:8.4 ベ*ンゾ*ビ*シクロン:8	□	○	○	□	○	○	□	○ 一発処理で +3~ノビエ2L, ホタルイ2L [年次変動の確認]
16	KUH-041-1kg 粒 [タミ化]	KUH-021 :0.5 フェントラサ*ミト*:3	◎	◎	○	○	◎	◎	○	◎ 一発処理で +3~ノビエ3L, ホタルイ2L [年次変動の確認]
17	NC-607 シ*ンボ* [日産]	オキサジ*クロメホン :2 ビ*ラゾ*スルフロニエチル:0.7 ベ*ンゾ*ビ*シクロン :6.7		○						○ 一発処理で +3~ノビエ2.5L, ホタルイ2L [年次変動の確認]
18	NC-607-1kg 粒 [日産]	オキサジ*クロメホン :0.8 ビ*ラゾ*スルフロニエチル:0.3 ベ*ンゾ*ビ*シクロン :2		○						○ 一発処理で +3~ノビエ2.5L, ホタルイ2L [年次変動の確認]
19	NC-608-1kg 粒 [日産]	ビ*ラゾ*スルフロニエチル:0.3 ベ*ンゾ*ビ*シクロン :2 エスブ*ロカルブ* :15 ジ*メタメトリン :0.6	○	◎	◎	○	○	○	□	○ 一発処理で +5~ノビエ2.5L, ホタルイ2L [年次変動の確認(薬害)]
20	NC-609-1kg 粒 [日産]	ビ*ラゾ*スルフロニエチル:0.3 フ*タクロール :7.5 ベ*ンゾ*ビ*シクロン :2 ビ*ラクロニル :2	◎	◎	◎	○	◎	◎	□	○ 一発処理で +3~ノビエ2.5L, ホタルイ2L [年次変動の確認(薬害)]
21	NC-611 フロアブル [日産]	フ*タクロール:15 タミロン :18	○	○	○	□	□	□	□	北海道~北陸 ○ 関東~九州 □ 体系処理(初期)で ~4, +0~ノビエ1.5L [体系処理での確認]
22	NC-612-1kg 粒 [*日産, SDS]	シハロップ*フ*チル:1.8 ハロスルフロメチル :0.9 ベ*ンゾ*ビ*シクロン:2 ジ*メタメトリン:1	○	○	○	○	◎	□	□	○ 体系処理(中後期)で +15~ノビエ3L [処理時期と効果薬害について]
23	NHF-401 粒 [日農]	インダ*ノファン :0.46 クロマフ*ロップ :1.16 ベ*ンスルフロメチル :0.25 チアジ*ニル(殺菌剤):6.0	○	○						○ 一発処理で +5~ノビエ2.5L, ホタルイ2L [年次変動の確認]
24	SB-564 フロアブル [SDS]	ビ*ラクロニル :4 ベ*ンゾ*ビ*シクロン:4(W/V)	□	○	○	○	○	○	○	○ 一発処理で +3~ノビエ2.5L [ノビエ2.5Lの効果の確認]
25	SB-564-1kg 粒 [SDS]	ビ*ラクロニル :2 ベ*ンゾ*ビ*シクロン:2	○	○	○	○	○	○	○	○ 一発処理で +3~ノビエ2.5L [ノビエ2.5Lの効果の確認]
26	SL-0401-1kg 粒 [石原]	SL-0401(新規):0.22	□	○	□	○	○	△	□	北海道~近畿中国四国 □ ノビエを 主たる対象とした中後期処理の除草剤 として 九州 △ [効果の変動要因解明]
27	SL-0402-1kg 粒 [石原]	SL-0401(新規):0.22 未公開(既知):0.3	□	○	□	□	○	△	□	△ 体系処理(中後期)で [除草効果の向上, 効果変動要因解明]

NO	試験名 ・ 剤型 [委託会社]	有効成分及び含有率 (%)	実施場所別総合評価							判 定 [今後の検討課題]
			北 海 道	古 川	新 潟	植 調 研	滋 賀	福 岡	霞 ヶ 浦 (砂)	
28	SST-403 フロアブル [*住化武田, 住友化学]	イマゾスルフロン:1.8 プロモプチド:18 ベントキサゾン:7.8(W/V)	○	○	○	○	○	○	△	○ 一発処理で +0～ノビエ1.5L, ホタルイ1L [薬害発生要因の解明]
29	SST-403-1kg 粒 [*住化武田, 住友化学]	イマゾスルフロン:0.9 プロモプチド:9 ベントキサゾン:3.9	○	○	○	○	○	○	△	○ 一発処理で +0～ノビエ1.5L, ホタルイ1L [薬害発生要因の解明]
30	SW-042⑩ シャンボ [*三共, テュボソ, SDS]	カフェンストロール :7.1 タムロン :14.3 ベンスルフロンメチル:2.1 ベントキサゾン:5.7	○	○						○ 一発処理で +3～ノビエ2.5L, ホタルイ2L [年次変動の確認]
31	SW-042① シャンボ [*三共, テュボソ, SDS]	カフェンストロール :7.1 タムロン :14.3 ベンスルフロンメチル:1.5 ベントキサゾン:5.7			○	○	○	○	◎	○ 一発処理で +3～ノビエ2.5L, ホタルイ2L [年次変動の確認]
32	SW-043-1kg 粒 [三共]	ビラクロニル :2 ビラゾレート: 10 ベントキサゾン:2	□	□	○	○	◎	○	△	□ 一発処理で +0～ノビエ2.5L [効果薬害の安定性について]
33	SW-044⑩ フロアブル [三共]	ベンスルフロンメチル:1.5 ベントキサゾン:4 ビラクロニル :4	○	○						○ 一発処理で +3～ノビエ2.5L, ホタルイ2L [年次変動の確認]
34	SW-044① フロアブル [三共]	ベンスルフロンメチル:1 ベントキサゾン:4 ビラクロニル :4			○	◎	◎	○	○	○ 一発処理で +3～ノビエ2.5L, ホタルイ2L [年次変動の確認]
35	SYJ-156-1kg 粒 [シンジエンタ]	ビリフタリト :1.5 プレチクロール :4.5 ベンスルフロンメチル :0.75 メソトリオン(SYJ-104):0.5	○	○						○ 一発処理で +5～ノビエ3L, ホタルイ2L [年次変動の確認]
36	TH-001 シャンボ [*住化武田, SDS]	イマゾスルフロン :2.25 カフェンストロール :7.5 ベントキサゾン:5	○	○	○	○	○	○	□	○ 一発処理で +5～ノビエ2.5L, ホタルイ2L [年次変動の確認]
37	YH-651-1kg 粒 [八洲]	ビラクロニル:1.8 クミルロン :12	○	○	○	○	□	△	○	北海道～関東東海○ 近畿中国四国, 九州□ 体系処理(初期)で ～-4, +0～ノビエ1.5L [効果変動要因の検討]
38	NH-403 フロアブル [クサストップ 協議会(日農)]	ベンスルフロンメチル:1.4 インタノファン :2.8 クロマプロップ :7 プロモプチド :12	○	○						○ 一発処理で +5～ノビエ2.5L, ホタルイ2L [年次変動の確認]
39	DBH-1294-1kg 粒 [東部韓農]	メタミホップ :0.9	□	○	○	□	□	□	□	□ ノビエ専用中後期剤として ～ノビエ3L [年次変動の確認]
40	AKD-7138 フロアブル [アガカネショウ]	キノクラミン(ACN):18	○	○	○	○	□	○	□	○ 藻類・表層剥離専用防除剤として 発生始期～盛期 [薬害発生要因, 殺草葉齢限界の検討]

第3表 平成16年度 水稻関係除草剤適2試験判定結果一覧

区 分	実・継		継	
A-1 一発処理	AC-014R ジャンボ,	AVH-002-1kg 粒,	BAH-041-1kg 粒,	DKH-411-1kg 粒,
	BAG-021 ジャンボ,	BAG-032 ジャンボ,	HOK-0401-1kg 粒,	HOK-201D フロアブル,
	BCH-031-1kg 粒,	BCH-032-1kg 粒,	HOK-201D-1kg 粒,	HOK-201DS フロアブル,
	BCH-033-1kg 粒,	BCH-044-1kg 粒,	HOK-201DS-1kg 粒,	HOK-223 ジャンボ,
	BCH-045H-1kg 粒,	BCH-045L-1kg 粒,	KPP-445 フロアブル,	KPP-445㊦ フロアブル,
	DKH-311-1kg 粒,	HOK-0301-1kg 粒,	KUH-032 ジャンボ,	KUH-041-1kg 粒,
	HOK-0401 ジャンボ,	HOK-0401 フロアブル,	NC-607 顆粒水和,	NC-607 ジャンボ,
	HOK-221 ジャンボ,	HOK-222 ジャンボ,	NC-607-1kg 粒,	NC-608-1kg 粒,
	HOK-222 フロアブル,	HOK-222-1kg 粒,	NH-403 フロアブル,	SB-564 フロアブル,
	HOK-223 フロアブル,	HOK-223-1kg 粒,	SB-564-1kg 粒,	SST-403 フロアブル,
	HOK-225-1kg 粒,	HOK-991 ジャンボ,	SST-403-1kg 粒,	SW-042㊦ ジャンボ,
	KPP-444-1kg 粒,	KPP-444㊦-1kg 粒,	SW-043-1kg 粒,	SYJ-156-1kg 粒,
	KUH-003D ジャンボ,	KUH-003K ジャンボ,	TH-547-1kg 粒	
	KUH-004D-1kg 粒,	KUH-011D-1kg 粒,		
	KUH-011K-1kg 粒,	KUH-013D ジャンボ,		
	KUH-013D-0.25kg 粒,	KUH-013D-1kg 粒,		
	KUH-013K ジャンボ,	KUH-013K-0.25kg 粒,		
	KUH-013K-1kg 粒,	KUH-021-1kg 粒,		
	KUH-023D ジャンボ,	KUH-023D フロアブル,		
	KUH-023D-0.25kg 粒,	KUH-023K ジャンボ,		
	KUH-023K フロアブル,	KUH-023K-0.25kg 粒,		
	KUH-032-0.25kg 粒,	KUH-985 フロアブル,		
	MK-243D-1kg 粒,	Mon-923-1kg 粒,		
	Mon-923㊦-1kg 粒,	MY-100DC フロアブル,		
	MY-100DC-1kg 粒,	MY-100DC㊦ フロアブル,		
	MY-100DC㊦-1kg 粒,	MY-100NC-1kg 粒,		
	MY-100TSC フロアブル,	NBA-071-1kg 粒,		
	NBA-071DEH-1kg 粒,	NBA-073-1kg 粒,		
	NBA-074-1kg 粒,	NBA-093(改) ジャンボ,		
	NBA-101SB ジャンボ,	NBA-131b-1kg 粒,		
	NC-385 顆粒水和,	NC-385SB 顆粒水和,		
	NC-385SB-1kg 粒,	NC-397-1kg 粒,		
	NC-604 フロアブル,	NC-606-1kg 粒,		
	NCH-903DEH ジャンボ,	NH-003-1kg 粒,		
	NH-101 ジャンボ,	NH-102 フロアブル,		
	NH-104-1kg 粒,	NH-301-1kg 粒,		
	NH-302 フロアブル,	NH-806 ジャンボ,		
	NHF-401 粒,	NOJ-101-1kg 粒,		
	NOJ-103-1kg 粒,	NOJ-104-1kg 粒,		
	ONC-381 ジャンボ,	PSS㊦D-1kg 粒,		
	SB-526 フロアブル,	SB-526-1kg 粒,		
	SB-533P5(改) ジャンボ,	SB-554 ジャンボ,		
	SB-554 フロアブル,	SB-556 フロアブル,		
	SB-559㊦-1kg 粒,	SB-559㊦-1kg 粒,		
	SB-563㊦-1kg 粒,	SB-563㊦-1kg 粒,		

区 分	実・継		継
A-1 一発処理 つづき	SST-402-1kg 粒, SW-002①フロアブル, SW-005フロアブル, SW-005①フロアブル, SW-012⑧-1kg 粒, SW-012①-1kg 粒, SW-023⑧-1kg 粒, SW-023①-1kg 粒, SW-024⑧ジャンボ, SW-024①ジャンボ, SW-031①-1kg 粒, SW-032フロアブル, SW-032①フロアブル, SW-041⑧-1kg 粒, SW-041①-1kg 粒, SW-042①ジャンボ, SW-991-1kg 粒, SYJ-108ジャンボ, SYJ-150フロアブル, TH-001ジャンボ, TH-001フロアブル, TH-001-1kg 粒, TH-001①フロアブル, TH-005ジャンボ, TH-122-1kg 粒, TH-421ジャンボ, TH-913CSジャンボ, THI-913CSジャンボ, YH-546フロアブル, YH-641-1kg 粒, YH-652フロアブル, YH-652-1kg 粒, YH-655-1kg 粒		
A-2 体系(初期)	AVH-006フロアブル, CG-113 EW, CG-113(改)ジャンボ, CG-113-1kg 粒, G-315B 乳(少量散布), HSW-012フロアブル(少量散布), KH-152-A 粒, KH-183①-1kg 粒, KPP-2005⑧フロアブル(少量散布), KPP-2008-1kg 粒, KPP-2011フロアブル, SB-528①フロアブル, SB-529-1kg 粒, SB-566フロアブル, SB-566-1kg 粒, YH-650フロアブル, YH-650-1kg 粒, YH-651フロアブル, フタクロール乳, フタクロール-1kg 粒		KPP-2012フロアブル, NC-611フロアブル, YH-651-1kg 粒
A-3 体系(中後期)	DASH-001 SC, DBH-1291 乳, DEH-112-1kg 粒, KPP-444-1kg 粒, KPP-444①-1kg 粒, KUH-003Dジャンボ, KUH-983-1kg 粒, MCP・BAS(Na) 粒, MY-100DCフロアブル, MY-100DC-1kg 粒, MY-100DC①フロアブル, MY-100DC①-1kg 粒, MY-100NC-1kg 粒, MY-100NDC-1kg 粒, MY-100TSCフロアブル, NBA-073-1kg 粒, NC-329-1kg 粒, NC-390フロアブル, NH-003-1kg 粒, NH-803フロアブル, NOJ-101-1kg 粒, NOJ-103-1kg 粒, NOJ-104-1kg 粒, SB-554ジャンボ, SB-554フロアブル, SW-012①-1kg 粒, TH-001フロアブル, TH-001-1kg 粒, TH-913⑧粒, YH-641-1kg 粒, YH-653-1kg 粒		KUH-031 粒, NC-612-1kg 粒, SL-0401-1kg 粒, SL-0402-1kg 粒
A-4 イボクサ	KUH-911 液, SB-533P5(改)ジャンボ, SB-556フロアブル, SW-991-1kg 粒		SB-554フロアブル, SW-005フロアブル, SW-005①フロアブル

区 分	実・継		継	
A-4 オモダカ	AC-014A-1kg 粒, KUH-013D-0.25kg 粒, MK-243D-1kg 粒, Mon-923①-1kg 粒, NBA-131a-1kg 粒, NC-385SB 顆粒水和, NH-102 フロアブル, NOJ-103-1kg 粒, SW-002① フロアブル,	KUH-003D ジャンボ, KUH-013K-0.25kg 粒, Mon-923-1kg 粒, MY-100NC 顆粒水和, NBA-131b-1kg 粒, NH-101 ジャンボ, NH-104-1kg 粒, NOJ-104-1kg 粒, YH-641-1kg 粒	DASH-001 SC, KPP-444①-1kg 粒, KUH-011K-1kg 粒, KUH-013K-1kg 粒, KUH-031 粒, SW-005 フロアブル, SW-012④-1kg 粒, SW-023④-1kg 粒, SW-024④ ジャンボ, SW-041④-1kg 粒, SYJ-108 ジャンボ, YH-652-1kg 粒	KPP-444-1kg 粒, KUH-011D-1kg 粒, KUH-013D-1kg 粒, KUH-021-1kg 粒, NBA-093(改) ジャンボ, SW-005① フロアブル, SW-012①-1kg 粒, SW-023①-1kg 粒, SW-024① ジャンボ, SW-041①-1kg 粒, YH-652 フロアブル,
A-4 クサナム	KUH-911 液			
A-4 クログワイ	AC-014A-1kg 粒, FSS-115 粒, KPP-2005④ フロアブル, KUH-003D ジャンボ, KUH-013K-0.25kg 粒, MK-243D-1kg 粒, Mon-923①-1kg 粒, MY-100DC①-1kg 粒, MY-100NDC-1kg 粒, NBA-131a-1kg 粒, NC-390 フロアブル, NH-102 フロアブル, NOJ-103-1kg 粒, SW-002① フロアブル, TH-001① フロアブル, YH-651 フロアブル,	AVH-002-1kg 粒, KPP-2005 ジャンボ, KPP-2008 乳(EW), KUH-013D-0.25kg 粒, KUH-985① フロアブル, Mon-923-1kg 粒, MY-100DC① フロアブル, MY-100NC-1kg 粒, NBA-071-1kg 粒, NBA-131b-1kg 粒, NH-101 ジャンボ, NH-104-1kg 粒, NOJ-104-1kg 粒, TH-001 フロアブル, YH-641-1kg 粒, YH-652 フロアブル	DASH-001 SC, HOK-223 フロアブル, KPP-2011 フロアブル, KPP-444①-1kg 粒, KUH-011K-1kg 粒, KUH-013K-1kg 粒, MY-100TS フロアブル, NBA-093(改) ジャンボ, NC-604 フロアブル, SB-529-1kg 粒, SW-005 フロアブル, SW-012④-1kg 粒, SW-023④-1kg 粒, SW-024④ ジャンボ, SW-041④-1kg 粒, SYJ-108 ジャンボ, YH-653-1kg 粒	HOK-0301-1kg 粒, KPP-2008-1kg 粒, KPP-444-1kg 粒, KUH-011D-1kg 粒, KUH-013D-1kg 粒, KUH-021-1kg 粒, MY-100TSC フロアブル, NC-391① ジャンボ, SB-528① フロアブル, SB-554 フロアブル, SW-005① フロアブル, SW-012①-1kg 粒, SW-023①-1kg 粒, SW-024① ジャンボ, SW-041①-1kg 粒, YH-652-1kg 粒,
A-4 コウキヤガラ	TH-001 フロアブル		KUH-011D-1kg 粒,	KUH-021-1kg 粒,
A-4 シズイ	AVH-002-1kg 粒, NOJ-103-1kg 粒, TH-001-1kg 粒,	MCP・BAS(Na) 粒, SYJ-108 ジャンボ, TH-005 ジャンボ	KPP-444-1kg 粒, KUH-013K-1kg 粒, NBA-131a-1kg 粒, SB-554 フロアブル,	KUH-011K-1kg 粒, KUH-021-1kg 粒, NC-604 フロアブル, SW-005 フロアブル
A-4 ミズアオイ	AVH-002-1kg 粒, CG-113(改) ジャンボ, NC-397-1kg 粒, YH-546 フロアブル,	CG-113 EW, NBA-131a-1kg 粒, TH-005 ジャンボ, YH-641-1kg 粒	KUH-021-1kg 粒, TH-001-1kg 粒,	SYJ-156-1kg 粒, YH-650 フロアブル
A-4 SU-Rコナギ	AC-014A-1kg 粒, SW-041①-1kg 粒,	KPP-2011 フロアブル, YH-641-1kg 粒	BAG-032 ジャンボ, KUH-021-1kg 粒, SW-005① フロアブル, SW-024① ジャンボ,	KUH-011D-1kg 粒, SW-002① フロアブル, SW-023①-1kg 粒, SW-032① フロアブル
A-4 SU-Rホタルイ	AVH-002-1kg 粒, CG-113 EW, NBA-131b-1kg 粒, SW-024④ ジャンボ,	BAG-032 ジャンボ, KUH-011D-1kg 粒, SW-002 フロアブル, SW-024① ジャンボ,	KPP-2011 フロアブル, KPP-444①-1kg 粒, SW-005 フロアブル, SW-023④-1kg 粒,	KPP-444-1kg 粒, KUH-011K-1kg 粒, SW-005① フロアブル, SW-023①-1kg 粒,

区 分	実・継		継	
A-4 SU-Rホタルイ つづき	SW-041㊸-1kg 粒, TH-001フロアブル	SW-041㊹-1kg 粒,	SW-032フロアブル, SYJ-156-1kg 粒	SW-032㊹フロアブル,
B 直播栽培	KUH-011D-1kg 粒, KUH-013D-0.25kg 粒, KUH-962-1kg 粒, KUH-983-1kg 粒, MY-100DC㊹フロアブル, NBA-071-1kg 粒, NH-102フロアブル, SW-002フロアブル, SW-973-1kg 粒, TH-913NCSフロアブル	KUH-011K-1kg 粒, KUH-013K-0.25kg 粒, KUH-972Dフロアブル, KUH-985㊹フロアブル, MY-100TSCフロアブル, NC-385SB 顆粒水和, SB-556フロアブル, SW-002㊹フロアブル, SW-991-1kg 粒,	HOK-221 ジャンボ, KPP-2008 乳(EW), KUH-013D ジャンボ, KUH-013K-1kg 粒, NBA-071DEH-1kg 粒, NOJ-101-1kg 粒, SW-012㊸-1kg 粒,	HOK-225-1kg 粒, KUH-004D-1kg 粒, KUH-013D-1kg 粒, MY-100DCフロアブル, NC-331 水和, NOJ-104-1kg 粒, ZK-122 液
C 畦畔	AH-01 液,	ZK-122 液	MCP-Na 液, NC-622 液	MRS-195 液,
D 耕起前			AH-01 液	
E 休耕田			NC-622 液	
その他	DEH-112 乳(EW)			

注): 1) 本年度新規に使用基準を作成されたものは、薬剤名にアンダーラインを記した。

2) 本年度は「実」、「継?」及び「中止」と判定された薬剤はなかった。

※ 薬剤名はアルファベット順に記載した。

この草はなんだろう? 手軽に調べたい。

三二雑草図鑑

——耕地雑草ハンドブック——

廣田伸七／著

A5判 定価2,200円＋税

耕地には主要なものだけで150種を超える雑草が生えてきます。これら雑草の防除の第一歩は草を知ることです。本書は、農耕地や樹園地などによく見られる雑草500種を収録し、主要種は、幼植物・生育中期・成植物と生育段階を追った写真を掲載。また、似た草の見分け方を記載した、身近な植物を調べるための最適な図鑑です。

原色 芽ばえとたね 図鑑

浅野 貞夫／著

A4判 定価9,800円＋税

芽ばえの姿はどうなんだろう。本書は、植物の芽ばえのようすを克明に表した精密図版と、種・成植物の写真を組み合わせた植物の一生図鑑です。成植物のみの図鑑と異なり、芽ばえのようすから紹介しているため、植生などの調査にたいへん役に立つとの声が寄せられています。

全国農村教育協会

〒110-0016 東京都台東区台東1-26-6
TEL.03-3833-1821 FAX.03-3833-1665

平成16年度 水稻関係除草剤使用基準一覧表

A 移植栽培

A-1 一発処理

A-1

AC-014R ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2	○	○2	○始		○2		○前※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2L	20g×10 [□]	○	○
東北	○2	○	○2		○2	○始	○前※	○前※	○発生 期		○前			○	○
北陸	○2	○	○2		○2	○始		○前※	○発生 期					○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○始	○前※	○前※	○発生 期		○前			○	○
近・中・四	○2	○	○2		○2	○2	○前※	○前※	○発生 期		○前			○	○
九州	○2	○	○2	○前	○2	○始	○前※	○前※	○発生 期		○前			○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

AVH-002-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始		○前※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ1.5L	1kg	○	○
東北	○1.5	○	○始	○始	○始	○始	○前※	○前※	○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
北陸	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	○始	●始※		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四															
九州															

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

BAG-021 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道												+1～ノビエ2L	25g×10 [□]		
東北	○2	○	○始	○始	○始	○始			○発生 期		○前				○
北陸	○2	○	○始		○始	○始			○発生 期						○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○2			●発生 期	●再生 前～始	○前			○	○
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

A-1
BAG-032 ジェンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2	●	●始	●始		●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+3～ノビエ2L	20g×10コ		●
東北	●2	●	●2	●始	●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
北陸	●2	●	●2		●始	●始			●発生 期		●前				●
関東・東海	●2	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	SU抵抗性材料:2L		●	●
近・中・四	●2	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
九州	●2	●	●2		●2	●2			●発生 期						●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な葉害や効果不足が生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1
BCH-031-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	1kg		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●始	●始			●発生 期	●再生 前～始					●
北陸															
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ2.5L			●
近・中・四 (昔)	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期						●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1
BCH-032-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	1kg		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始					●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期						●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四 (昔)	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-1
BCH-033-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	1kg		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●2				●発生 期	●再生 前～始					●
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始					●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四 (昔)	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期						●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1
BCH-044-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+0～ノビエ2.5L	1kg		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1
BCH-045H-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+0～ノビエ2.5L	1kg		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意:

A-1
BCH-045L-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道												+0～ノビエ2.5L	1kg		
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1
DKH-311-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+3～ノビエ2.5L	1kg		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意:

A-1
HOK-0301-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期		●前	+5～ノビエ2.5L	1kg		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期						●
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期						●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期						●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期		●前			●	●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。A-1
HOK-0401 ジェンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土
北海道													50g×100		
東北	●2	●	●2	●始	●始	●始			●発生 期	●再生 前～始		+1～ノビエ2L			●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

A-1
HOK-0401 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土
北海道													500ml		
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+0～ノビエ2.5L			●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-1
HOK-221 ジェンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土
北海道													50g×100		
東北															
北陸	○2	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始		+1～ノビエ2L		●	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始				○	○
近・中・四	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	●前			○	○
九州	○2	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1
HOK-222 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	埴 土
北海道														50g×10 ³		
東北	●2	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前		+1～ノビエ2L			●
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。																

A-1
HOK-222 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前		+0～ノビエ2.5L	500ml	●	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前		+0～ノビエ2.5L		●	○
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																
田植同時散布可能(北海道,東北)																
減水深: 2cm/日以下																
使用上の注意:																

A-1
HOK-222-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期	●再生 前～始	●前		+5～ノビエ2.5L	1kg		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●始				●発生 期	●再生 前～始						●
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 低温等による活着不良の場合には被害が生じることがある。(東北)																

A-1
HOK-223 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 埴土	
北海道													+0～ノビエ2.5L	500ml			
東北																	
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始						○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始						○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前					●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	●前					●	○
田植同時散布可能(関東・東海,近畿・中国・四国)																	
減水深: 2cm/日以下																	
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。																	
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。																	

A-1
HOK-223-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズカヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+5～ノビエ2.5L			●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。															

A-1
HOK-225-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズカヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北															
北陸	●3	●	●2		●2	●2			●発生 期		●前	+5～ノビエ3L			●
関東・東海	●3	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
近・中・四	●3	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
九州															
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:															

A-1
HOK-991 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズカヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1.5	○	○始	○始								+3～ノビエ1.5L	50g×10 ²		○
東北	○1.5	○	○始	○始	○始										○
北陸	○1.5	○	○始		○始										○
関東・東海	○1.5	○	○始		○前	○始								○	○
近・中・四	○1.5	○	○始		○始	○始						+1～ノビエ1.5L(砂 壌土は+3～)		○	○
九州	○1.5	○	○始		○始	○始						+3～ノビエ1.5L		○	○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。															

A-1
KPP-444-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズカヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●1.5	●	●始	●始		●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+0～ノビエ1.5L	1kg		●
東北	●1.5	●	●始	●始	●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															
田植同時散布可能(北海道,東北) 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:															

A-1
KPP-444Q-1kg 粒

ノビエ 4440 / 1kg 粒																		
地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土		
北海道													+0～ノビエ1.5L	1kg				
東北																		
北陸	●1.5	●	●始		●始	●始												●
関東・東海	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始								●
近・中・四	●1.5	●	●始		●前	●前				●再生 前～始	●前							●
九州	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●	●		
田植同時散布可能(関東・東海・近畿・中国・四国・九州)																		
減水深: 2cm/日以下																		
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。																		

A-1
KUH-003D ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													25g×10 ³		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			●発生 期	○再生 前～始	●前	+1～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始		+3～ノビエ2.5L		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始	●始	○発生 期	○再生 前～始	○前	+1～ノビエ2.5L		○	○
九州	○2.5	○	○2	○前	○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L		○	○
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。															
減水深: 2cm/日以下															
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。 オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。															

A-1
KUH-003K ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○始		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L	25g×10 ³	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。															

A-1
KUH-004D-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 埴土	
北海道													1kg			
東北																
北陸	○3	○	○2		○2	○2	○始※			○再生 前～始		+0～ノビエ3L			○	○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ3L			○	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2	○始※	○始	○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
九州	○3	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。																
減水深: 2cm/日以下																
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。 オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。																

A-1

KUH-011D-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツツ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性ホタルイ2L		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2	○前	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

田植同時散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

KUH-011K-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツツ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

田植同時散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

A-1

KUH-013D ジェンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツツ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													25g×10 ²		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始		+3～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2				○再生 前～始	○前			●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

KUH-013D-0.25kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツツ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													250g		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始	○発生 期	○再生 前～始	●前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
湛水周縁部散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 湛水周縁部散布では藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足を生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1
KUH-013D-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北															
北陸	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ3L(砂 壌土は+3～)		●	○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ3L		●	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果がある。

A-1
KUH-013K シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○始		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L	25g×10 ³	●	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。

A-1
KUH-013K-0.25kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土	
北海道	○2.5	○	○2	○始		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	ミスアイ:1L	+3～ノビエ2.5L	250g	○	○	
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ:草丈3cm	±0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+3～)		○	○	
北陸																	
関東・東海																	
近・中・四																	
九州																	

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
湛水周縁部散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 湛水周縁部散布では藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足を生じることがある。
オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1
KUH-013K-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土	
北海道	○3	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前		+3～ノビエ3L	1kg	●	○	
東北	○3	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前		±0～ノビエ3L(砂 壤土は+3～)		●	○	
北陸																	
関東・東海																	
近・中・四																	
九州																	
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:																	

A-1
KUH-021-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○3	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ3L(砂 壌土は+7～)	1kg	●	○
東北	○3	○	○3	●始	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
北陸	○3	○	○3		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○
関東・東海	○3	○	○3		○3	○2			○発生 期	○再生 前～始	●前			●	○
近・中・四	○3	○	○3		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
九州	○3	○	○3		○3	○3			○発生 期	○再生 前～始	●前			●	○

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1
KUH-023D ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													25g×10 ⁷		
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+3～ノビエ2.5L			●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1
KUH-023D フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													500ml		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始		+3～ノビエ2.5L		●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1
KUH-023D-0.25kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													250g		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	●前	+3～ノビエ2.5L		●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

湛水周縁部散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 湛水周縁部散布では藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足を生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1
KUH-023K シヤンボ'

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+5～ノビエ2.5L	25g×10 ²		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。															

A-1
KUH-023K フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	500ml	●	○
東北	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:															

A-1
KUH-023K-0.25kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	250g	●	○
東北	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															
湛水周縁部散布可能 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 湛水周縁部散布では藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。															

A-1
KUH-032-0.25kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2	●	●2	●2					●発生 期			+3～ノビエ2L	250g		●
東北	●2	●	●2	●始	●始				●発生 期						●
北陸	●2	●	●2		●始				●発生 期						●
関東・東海	●2	●	●始		●2				●発生 期						●
近・中・四	●2	●	●2		●2				●発生 期					●	●
九州	●2	●	●2		●2				●発生 期					●	●
湛水周縁部散布可能 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 湛水周縁部散布では藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。															

A-1
KUH-985 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○3	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ3L	500ml	○	○
東北	○3	○	○2	○前	○2	○2	○前※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ3L		○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
田植同時散布可能(東北)
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1
MK-243D-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	1kg		○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	●前※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前				○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1
Mon-923-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始		●始	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ:始 SU抵抗性ホタルイ:1L	1kg	○	○
東北	○1.5	○	○始	○始	○始	○始	●前※	●前※	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ:草丈3cm SU抵抗性ホタルイ:1L		●	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1
Mon-923①-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北															
北陸	○1.5	○	○始		○始	○始		●前	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ1.5L		●	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○1.5	○	○始		○2	○始	●始		○発生 期	○再生 前～始	○前				○
九州	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前				○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
浅植え、植え付け精度不良等で根が露出すると被害を生じることがある。(北陸)
オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1
MY-100DC フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土	
北海道	○2.5	○	○2	○始		○始		○前	○発生 期	○再生 前～始	○前	エゾノササユカグサ:2L	+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○	
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始	○前※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ:草丈3cm	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)		○	○	
北陸																	
関東・東海																	
近・中・四																	
九州																	

水口処理可能

田植同時散布可能(北海道、東北)

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1
MY-100DC-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○始		○2		○前	○発生 期	○再生 前～始	○前		+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○2	○前※	○前※	○発生 期	○再生 前～始	○前		+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)		○	○
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

田植同時散布可能(北海道、東北)

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1
MY-100DC① フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													500ml		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※		○発生 期	○再生 前～始	●前		+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性ホタルイ:1L	+0～ノビエ2.5L	○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2	○前	○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コウキヤガラ:発生始		○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
田植同時散布可能(北陸、関東・東海、近畿・中国・四国)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1
MY-100DC①-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモ'ガカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土	
北海道														1kg			
東北																	
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※			○再生 前～始			+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前					○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始	○発生 期	○再生 前～始	○前					○	○
九州	○2.5	○	○2	○前	○2	○2	○始※	○始※	○再生 前～始	○再生 前～始	○前		+5～ノビエ2.5L		○	○	

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
田植同時散布可能(北陸、関東・東海、近畿・中国・四国)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1
MY-100NC-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			●発生 期	○再生 前～始	○前	+10～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※		○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+1～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)		○	○
九州	○2.5	○	○2	○前	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		○	○

田植同時散布可能(東北・関東・東海)

※:クログワイ防除は、有効剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

クログワイ防除は有効剤との組み合わせで使用する。

A-1
MY-100TSC フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○前	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

田植同時散布可能

水口処理可能(東北・関東・東海・九州)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1
NBA-071-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	エノ/サヤスグサ:2L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※		○発生 期	○再生 前～始	○前	+10～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)		○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

田植同時散布可能(東北・北陸・関東・東海)

※:クログワイ防除は、有効剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

クログワイ防除は有効剤との組み合わせで使用する。

A-1
NBA-071DEH-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道	○3	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ3L	1kg		○
東北	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○3	○	○2		○2	○2			●発生 期					●	○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
九州	○3	○	○2	○始	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1
NBA-073-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ワリカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	1kg		○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壤土は+5～)		○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		○	○

田植同時散布可能(東北～近畿・中国・四国)
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1
NBA-074-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ワリカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2	○	○始			○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2L	1kg		○
東北	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○2	○	○2		○始	○始								○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
近・中・四	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

田植同時散布可能(東北～九州)
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1
NBA-093(改) ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ワリカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○始		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	40g×10 ³	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1
NBA-101SB ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ワリカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+1～ノビエ2.5L	30g×10 ³	●	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前				○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	●前			●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+1～ノビエ2.5L		●	○
近・中・四(管)	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+1～ノビエ2.5L			●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

NBA-131b-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北															
北陸	○2	○	○2		○2	○始				○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2L		○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性ナギ:1L SU抵抗性ホタルイ:1L		○	○
近・中・四	○2	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2	○	○2	○前	○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

田植同時散布可能
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

NC-385 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	60g(散布 液量250 ～500ml)	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壤土は+5～、ホタルイ処理は+6 ～)		○	○
北陸	○2.5	○	○2	○始	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壤土は+5～、ホタルイ処理は+6 ～)		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

顆粒のまま水口処理が可能(東北～近畿・中国・四国) 田植同時散布可能(東北、関東・東海:500ml希釈)
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-385SB 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		●始	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	80g(散布 液量 500ml)	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L		○	○

顆粒のまま水口処理が可能(東北、北陸、関東・東海) 田植同時散布可能(東北、関東・東海)
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

NC-385SB-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	1kg		○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壤土は+5～)		●	○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生 期			+0～ノビエ2.5L		●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	●前			●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		●	○

田植同時散布可能(東北)
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-397-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ1.5L	1kg		○
東北	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前				○
北陸	●1.5	●	●始		●始	●前				●再生 前～始					●
関東・東海	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
近・中・四															
九州															
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:															

A-1

NC-604 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	500ml	●	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前				○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期					●	○
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。															

A-1

NC-606-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期	●再生 前～始	●始	+5～ノビエ2.5L	1kg		●
東北	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●始				●
北陸															
関東・東海 (昔)	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●始	+5～ノビエ2.5L			●
近・中・四 (昔)	●2.5	●	●2		●2	●始				●再生 前～始	●始				●
九州															
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:															

A-1

NCH-903DEH ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2		○始	○始		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2L	40g×10 ²		○
東北	○3	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ3L		●	○
北陸	○3	○	○2		○2	○2				○再生 前～始					○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○
九州	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。															

A-1
NH-003-1kg 粒

F17-003 1kg 粒																		
地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土		
北海道	○2.5	○	○2	○始		○2		○前	○発生 期	○再生 前～始	○前	ミスアオイ:1L, エゾノサヤスカグサ:2L	+5～ノビエ2.5L	1kg	○	○		
東北	○2.5	○	○2		○2	○始	○前※	○前※	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ:草丈3cm			○	○		
北陸																		
関東・東海																		
近・中・四																		
九州																		
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。																		
減水深: 2cm/日以下																		
使用上の注意: オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。																		

A-1
NH-101 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土	
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		●始	○発生 期	○再生 前～始	○前		+5～ノビエ2.5L	50g×10コ	○	○	
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○2	●前※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前					○	○
北陸																	
関東・東海																	
近・中・四																	
九州																	

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。
オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1
NH-102 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													500ml		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	●始	●始	○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	イボクサ:再生始	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)	○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始	●始	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1
NH-104-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	●始		○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※		○発生 期	○再生 前～始	○前	イボクサ:再生始	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)	○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始		○発生 期	○再生 前～始	○前		+0～ノビエ2.5L	○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※		○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		○	○

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1
NH-301-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2									+0～ノビエ2.5L	1kg		●
東北	●2.5	●	●2													●
北陸	●2.5	●	●2		●前											●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2											●
近・中・四（管）	●2.5	●	●2		●2											●
九州	●2.5	●	●2		●2											●
減水深：2cm/日以下 使用上の注意： 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。																

A-1
NH-302 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2									+0～ノビエ2.5L	500ml		●
東北	●2.5	●	●2		●始											●
北陸	●2.5	●	●2		●前											●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2											●
近・中・四（管）	●2.5	●	●2		●2											●
九州	●2.5	●	●2		●2											●
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。																

A-1
NH-806 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	埴土 ～ 埴土	
北海道												+5～ノビエ2.5L	50g×10 ³			
東北																
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			●発生期	○再生前～始	○前				○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2		○始※	○発生期	○再生前～始	○前			イボクサ:再生始	○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前～始	○前			○	○	
九州	○2.5*	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前～始	○前	+5～ノビエ2.5L(*: 早期は～ノビエ2L)		○	○	
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。																
減水深: 2cm/日以下																
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。 オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。																

A-1
NHF-401 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+5～ノビエ2.5L	3kg		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															
減水深：2cm/日以下 使用上の注意：															

A-1

NOJ-101-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○3	○	○2	○2		○2		○前	○発生 期 ○再生 前～始	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ3L(砂 壌土は+5～)	1kg	○	○
東北	○3	○	○2	○2	○2	○2	○前※	○前※	○発生 期 ○再生 前～始	○再生 前～始	○前	シズイ:草丈3cm		○	○
北陸	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期 ○再生 前～始	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ3L			○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2	○前※	○始※	○発生 期 ○再生 前～始	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ3L(砂 壌土は+5～)		○	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2	○前※		○発生 期 ○再生 前～始	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期 ○再生 前～始	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ3L(早期お よび砂壌土は+5～)		○	○

田植同時散布可能(北海道・東北・北陸・関東・東海・近畿・中国・四国・九州)

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

NOJ-103-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○3	○	○2	○2		○2		●始	○発生 期 ○再生 前～始	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ3L(砂 壌土は+5～)	1kg	○	○
東北	○3	○	○2	○2	○2	○2	●前※	●始※	○発生 期 ○再生 前～始	○再生 前～始	○前	シズイ:草丈3cm		○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

田植同時散布可能(北海道・東北)

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

NOJ-104-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北															
北陸	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期 ○再生 前～始	○再生 前～始	●前	+0～ノビエ3L(砂 壌土は+5～)		○	○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期 ○再生 前～始	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2	●始※		○発生 期 ○再生 前～始	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○3	○	○2	○2	○2	○2		●始※	○発生 期 ○再生 前～始	○再生 前～始	○前			○	○

田植同時散布可能(北陸・関東・東海・近畿・中国・四国・九州)

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1
ONC-381 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	30g×10 ³	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	●前				
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1
PSS①D-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道												+0～ノビエ2L	1kg	○	○
東北	○2	○	○2	○始	○始	○始			○発生 期		○前				
北陸	○2	○	○2		○始	○始			○発生 期		○前				
関東・東海	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期		○前				
近・中・四	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期		○前				

田植同時散布可能(東北、北陸、関東・東海、近畿・中国・四国、九州)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 浅植え、植付け精度不良で根が露出すると薬害を生じることがある。

A-1
SB-526 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2	○	○始	○2					○発生 期			+3～ノビエ2L	500ml	●	○
東北	○2	○	○2	○始	○2				○発生 期						
北陸	○2	○	○2		○2				○発生 期						
関東・東海	○2	○	○2		○2				○発生 期						
近・中・四	○2	○	○2		○始				○発生 期						
九州	○2	○	○2		○始				○発生 期						

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1
SB-526-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2	○	○2	○2					○発生 期			+3～ノビエ2L	1kg	●	○
東北	○2	○	○2	○始	○2				○発生 期						
北陸	○2	○	○2		○始				○発生 期						
関東・東海	○2	○	○2		○2				○発生 期						
近・中・四	○2	○	○2		○2				○発生 期						
九州	○2	○	○2		○始				○発生 期						

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

SB-533P5(改) ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1.5	○	○始	○始					○発生 期			ミス'アオイ:1L	+1～ノビエ1.5L	50g×5コ	○	○
東北	○1.5	○	○始		○始				○発生 期				+0～ノビエ1.5L		○	○
北陸	○1.5	○	○始		○始				○発生 期						○	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始							イボクサ:再生始			○	○
近・中・四	○1.5	○	○始		○始										○	○
九州	○1.5	○	○始		○始				○発生 期				+1～ノビエ1.5L		○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

SB-554 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1.5	○	○始	○始					○発生 期				+0～ノビエ1.5L	50g×10コ	○	○
東北	○1.5	○	○始		○始		○前※		○発生 期			シズ'イ:草丈3cm			○	○
北陸	○1.5	○	○始		○始				○発生 期						○	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始		○前※		○発生 期						○	○
近・中・四	○1.5	○	○始		○始	○前			○発生 期						○	○
九州	○1.5	○	○始	○前	○前	○前			○発生 期						○	○

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

クログワイ・シズ'イ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

SB-554 プロアール

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1.5	○	○始	○始					○発生 期			SU抵抗性ホタルイ:1.5L	+0～ノビエ1.5L	500ml	●	○
東北	○1.5	○	○始		○始				○発生 期							○
北陸	○1.5	○	○始		○始				●発生 期						●	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始				○発生 期			SU抵抗性コナギ:1L			●	○
近・中・四	○1.5	○	○始		○始	○前			●発生 期						○	○
九州	○1.5	○	○始	○前	○始	○前			○発生 期						○	○

田植同時散布可能(北海道・東北・関東・東海)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1
SB-556 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期			エゾノサヤスカグサ:2L ミスアオイ:1L	+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期			シズイ:草丈3cm			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生 期						○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2						SU抵抗性ホタルイ:2L イネクサ:再生始			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期						○	○
九州	○2.5	○	○2	○前	○2	○2			○発生 期			イネクサ:再生始			○	○
水口処理可能(北海道～北陸, 九州) 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。 シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。																

A-1
SB-559①-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズカヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土	
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前		+5～ノビエ2.5L	1kg	●	○	
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前				●	○	
北陸																	
関東・東海																	
近・中・四																	
九州																	
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:																	

A-1
SB-559②-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土	
北海道													+3～ノビエ2.5L	1kg			
東北																	
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始						●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	●前					●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	●前					●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	●前				●	○	
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。																	

A-1
SB-563①-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+3～ノビエ2.5L	1kg		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:															

A-1
SB-563①-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始				●再生 前～始		+3～ノビエ2.5L			●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+3～ノビエ2.5L (砂壌土は+5～)		●	●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+3～ノビエ2.5L			●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。A-1
SST-402-1kg (旧 BCH-035-1kg) 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+0～ノビエ2.5L	1kg		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●

田植同時散布可能(北海道、東北、関東・東海、近畿・中国・四国、九州)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。A-1
SW-002①フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土
北海道													500ml		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○前				+3～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性ホタルイ2L		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

水口処理可能(北陸、関東・東海、近畿・中国・四国、九州)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。A-1
SW-005 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L	500ml	●	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-1
SW-005①フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													500ml		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			●発生 期				+3～ノビエ2.5L	●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	●前			●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。															

A-1
SW-012①-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○始		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:															

A-1
SW-012①-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。															

A-1
SW-023①-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L	1kg	●	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前				○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:															

A-1
SW-023①-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L		●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1
SW-024①② ジャンボ

SW-024⑩ シンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	埴 土	
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性ホタルイ:2L	+3～ノビエ2.5L	40g×10 ²	●	○	
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性ホタルイ:2L				○	○
北陸																	
関東・東海																	
近・中・四																	
九州																	

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

A-1
SW-024① ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													40g×10 ²		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性ホタルイ:1L			○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1
SW-031①-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北															
北陸															
関東・東海															
近・中・四 (皆)	●2.5	●	●2		●2	●始				●再生 前～始	●前	+3～ノビエ2.5L			●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

SW-032 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+3～ノビエ2.5L	500ml		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●始				●発生 期	●再生 前～始	●前				●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:															

A-1

SW-032① フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													500ml		
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期			+3～ノビエ2.5L			●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
近・中・四 (皆)	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。															

A-1

SW-041①-1kg (旧 NBA-141a-1kg) 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L	1kg	●	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+3～)		●	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:															

A-1

SW-041①-1kg (旧 NBA-141b-1kg) 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始		+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+3～)		●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	SU抵抗性コナキ1L SU抵抗性オキイ1.5L	+3～ノビエ2.5L		●	○
近・中・四 水害	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。															

A-1
SW-042① ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土	
北海道													+3～ノビエ2.5L	35g×10 コ			
東北																	
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前						●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始							●
近・中・四（普）	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前						●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前					●	
減水深：2cm/日以下																	
使用上の注意： 5cm程度の水深で散布する。																	
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。																	
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。																	
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。																	

A-1
SW-991-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土	
北海道	○2.5	○	○2	○始		○2			○発生 期		○前	エゾノササユカグサ:2L	+5～ノビエ2.5L	1kg	○	○	
東北	○2	○	○2	○始	○始	○始			○発生 期				+5～ノビエ2L			○	
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2					○前		+5～ノビエ2.5L			●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期		○前					○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2										○	○
九州	○2.5	○	○2	○前	○2	○2			○発生 期							○	○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。																	

A-1
SYJ-108 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 埴土
北海道	○3	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○始		+5～ノビエ3L	30g×10コ	●	○
東北	○3	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○始	シズメ草丈3cm				○
北陸	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始					●	○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	●始				●	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○始				●	○
九州	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○始				●	○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。 シズメ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。																

A-1
SYJ-150 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土		
北海道	●3	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前		+5～ノビエ3L	500ml		●		
東北	●3	●	●2	●2	●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前						●	
北陸																		
関東・東海																		
近・中・四																		
九州																		
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:																		

A-1
TH-001 シェンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤 土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前		+5～ノビエ2.5L	40g×10 ³		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始						●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始						●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始						●
近・中・四（管）	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前					●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前					●
減水深：2cm/日以下 使用上の注意： 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。																

A-1
TH-001 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤 土	壤土 ～ 埴土	
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		○前	○発生 期	○再生 前～始	○前	エゾノササユスガ草:2L ミズオオイ:1L	+5～ノビエ2.5L	500ml	○	○	
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○2	●前※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	ゴボウカワ:始 シズイ:草丈3cm SU抵抗性ホタルイ:2L				○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○再生 前～始							○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※		○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性ホタルイ:2L				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前					○	○
九州	○2.5	○	○2	○始	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前					○	○
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 水口処理可能(東北,関東・東海,九州)																	
減水深: 2cm/日以下																	
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。 オモダカ・シズイ・クログワイ・ユウキヤガラ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。																	

A-1
TH-001-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉 マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤 土	壤土 ～ 埴土	
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	1kg	●	○	
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			シズイ:草丈3cm	●	○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始						○
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始						●
近・中・四（普）	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前					●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前					●
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。 シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。																

A-1
TH-001①フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ワリカワ	クログワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													500ml		
東北															
北陸	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前		+3～ノビエ2L	●	○
関東・東海	○2	○	○2		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始				●	○
近・中・四	○2	○	○2		○始	○始	●始※		○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
九州	○2	○	○2		○始	○2	●始※		○発生 期	○再生 前～始				○	○

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1
TH-005 ジェンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ワリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2	○	○2	○始		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	ミズアオイ始	+3～ノビエ2L	50g×10コ	●	○
東北	○2	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ草丈3cm			●	○
北陸	○2	○	○2		○始	○始			●発生 期	○再生 前～始	●前				●	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前				●	○
近・中・四	○2	○	○2		○2	○始				○再生 前～始	●前				●	○
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○	

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な葉害や効果不足が生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下する場合がある。

田植え前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1
TH-122-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ワリカワ	クログワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期	●再生 前～始	●前		+5～ノビエ2.5L	1kg	●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期						●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
近・中・四 (普)	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1
TH-421 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+5～ノビエ2.5L	40g×10コ		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期						●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
近・中・四（管）	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
九州	●2	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ2L		●	●

減水深：2cm/日以下
 使用上の注意： 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下する場合がある。
 田植え前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1
TH-913CS シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2	○	○始	○始		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2L	50g×10コ	○	○
東北	○2	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前				○
北陸	○2	○	○2	○始	○始	○2				○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
近・中・四	○2	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

減水深：2cm/日以下
 使用上の注意： 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
 田植え前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-1
THI-913CS シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													50g×10コ		
東北															
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2L		○	○

減水深：2cm/日以下
 使用上の注意： 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植え前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1
YH-546 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤 土	壤 土 へ 埋 土
北海道	○2.5	○	○2	○始		○2					ミスアオイ:1L	+3～ノビエ2.5L	500ml	●	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始									○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始									○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○始					SU抵抗性コナギ:2L				○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○始									○
九州	○2.5	○	○2	○前	○2										○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。A-1
YH-641-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤 土	壤 土 へ 埋 土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		●始	○発生 期	○再生 前～始	○前	ミスアオイ:1L	+5～ノビエ2.5L	1kg	○
東北	○2.5	○	○2		○2	○始	●前※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前				●
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始	●始	●始	○発生 期	○再生 前～始					●
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性コナギ:1L			○
近・中・四 (普)	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前				●
九州															

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1
YH-652 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤 土	壤 土 へ 埋 土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期		SU抵抗性ホタルイ:2L	+5～ノビエ2.5L	500ml	●	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期		SU抵抗性ホタルイ:2L				○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期						●
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期						●
近・中・四 (普)	○2.5	○	○2		○2	○2	○前		○発生 期						●
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期		○前				●

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。A-1
YH-652-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤 土	壤 土 へ 埋 土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期			+5～ノビエ2.5L	1kg		●
東北	○2.5	○	○2	○始	○始	○始			○発生 期						○
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期						●
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期						○
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期						●
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期						○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1
YH-655-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北	○2	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2L		●	○
北陸	○2	○	○2		○2	○始			●発生 期					●	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	●前			●	○
近・中・四	○2	○	○2		○2	○始			○発生 期	●再生 前～始	●前			●	○
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2L		○	○

田植同時散布可能(東北・関東・東海・近畿・中国・四国・九州)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミス'カ'ヤツリには効果がある。

A-2 体系処理(初期)

A-2
AVH-006 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北	○1	○	○始								○前	植代後～4, +0～ +5(ノビエ1L)	300～ 500ml	○	○
北陸	○1	○	○始											○	○
関東・東海	○1	○	○始								○前				○
近・中・四	○1	○	○始								○前				○
九州	○1	○	○始								○前		500ml	○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 深水条件では害害を生じることがある。

A-2
CG-113 EW

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1	○	○始	○始							ミス'ア'オイ前 SU抵抗性ホタルイ前	+0～+5(ノビエ1L)	100ml (原液 または 500ml以 下の 散布微量 に希釈)	○	○
東北	○1	○	○始		○始							植代後～4, +0～ +5(ノビエ1L)		○	○
北陸	○1	○	○始		○始									○	○
関東・東海	○1	○	○始		○始									○	○
近・中・四	○1	○	○始		○始									○	○
九州	○1	○	○始		○始									○	○

田植同時散布可能(散布液量500ml/10aに希釈)

水口処理可能(北海道・東北・関東・東海)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: ミス'ア'オイ, SU抵抗性ホタルイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-2
CG-113(改) ジェンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1	○	○始	○始							SU抵抗性ホタルイ前 ミス'ア'オイ始	+0～+5(ノビエ 1L)(砂壤土は+1～)	30g×10 ³	○	○
東北	○1	○	○始	○始	○始							植代後～4, +0～ +5(ノビエ1L)		○	○
北陸	○1	○	○始		○始							植代後～4, +0～ +5(ノビエ1L)		○	○
関東・東海	○1	○	○始		○始									○	○
近・中・四	○1	○	○始		○始							植代後～4, +0～+5(ノ ビエ1L)(砂壤土は+1 ～)		○	○
九州	○1	○	○始		○始							植代後～4, +0～+5(ノ ビエ1L)(砂壤土は+1 ～)		○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

A-2

CG-113-1kg粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1	○	○始	○始								植代後～-4,+0～ +5(ノビエ1L)	1kg	○	○
東北	○1	○	○始	○始	○始										○
北陸	○1	○	○始	○始	○始										○
関東・東海	○1	○	○始												○
近・中・四	○1	○	○始												○
九州	○1	○	○始									植代後～-4,+0～ +3(ノビエ1L)		○*	○

田植同時散布可能(北海道,東北,北陸,関東・東海,近畿・中国・四国,九州)

*:九州の砂壤土は普通期を除く

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-2

G-315B 乳(少量散布)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道												植代時(-4まで)	250～ 350ml		
東北	○前	○	○前	○前	○前									○	○
北陸	○前	○	○前	○前	○前									○	○
関東・東海	○前	○	○前		○前									○	○
近・中・四	●前	●	●前		●前										●
九州 (普)	●前	●	●前		●前										●

土壌混和処理

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-2

HSW-012 フロアブル(少量散布)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●始	●	●前	●前		●前			●前			+0～+5(ノビエ始)	250ml		●
東北															
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-2

KH-183㊟-1kg粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1.5	○	○始	○始							○始	+3～ノビエ1.5L 植代後～-4,+3～ ノビエ1.5L	1kg	●	○
東北	○1.5	○	○始	○始	●前						○始			●	○
北陸	○1.5	○	○始		○始						○始			●	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始						○始				○
近・中・四	○1.5	○	○始		○始						○始			●	○
九州	○1.5	○	○始		○始						○始			●	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-2
KPP-2005⑩ フロアブル(少量散布)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ ツツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 植土
北海道	○1	○	○始									+0～+5(ノビエ1L)	300ml	○	○
東北	○1	○	○始		○前		○前※					植代後～+4,+0～ +5(ノビエ1L)		○	○
北陸	○1	○	○始		○始									○	○
関東・東海	○1	○	○始		○始		○前※							○	○
近・中・四	○1	○	○始		○始		○前※							○	○
九州	○1	○	○始		○始		○前※				コウキヤガラ:発生始			○	○

※クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
一発処理型除草剤の前処理として少量散布(300ml/10a)が可能。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-2
KPP-2008-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ ツツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 植土
北海道	○1	○	○始	○始								+0～+5(ノビエ1L)	1kg	●	○
東北	○1	○	○始	○前	○始							植代後～+4,+0～ +5(ノビエ1L)			○
北陸	○1	○	○始		○始									●	○
関東・東海	○1	○	○始		○始									●	○
近・中・四	○1	○	○始		○始							植代後～+4,+0～+5(ノビエ1L)(砂壌土は+0)		●	○
九州	○1	○	○始		○始							植代後～+4,+0～ +5(ノビエ1L)		●	○

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 深水条件では薬害を生じることがある。

A-2
KPP-2011 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ ツツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 植土
北海道	○1	○	○始	○始								+0～+5(ノビエ1L)	500ml	○	○
東北	○1	○	○始		○前							植代後～+4,+0～ +5(ノビエ1L)		●	○
北陸	○1	○	○始		○前									○	○
関東・東海	○1	○	○前		○前						SU抵抗性コナギ:始			○	○
近・中・四	○1	○	○始		○前									○	○
九州	○1	○	○始		○始									○	○

一発処理型除草剤の前処理として使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 深水条件では薬害を生じることがある。
SU抵抗性コナギ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-2
SB-528① フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ ツツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 植土
北海道	○1	○	○始	○始								+0～+5(ノビエ1L)	500ml	○	○
東北	○1	○	○始	○前								植代時～+4,+0～ +5(ノビエ1L)		○	○
北陸	○1	○	○始		○前									○	○
関東・東海	○1	○	○始		○始									○	○
近・中・四	○1	○	○始		○始									○	○
九州	○1	○	○始	○前	○始							植代後～+4,+0～ +5(ノビエ1L)		○	○

植代時は土壌混和処理
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

A-2
SB-529-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズカヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1	○	○始	○始								+0～+5(ノビエ1L)	1kg	○	○
東北	○1	○	○始	○始	○前							植代後～+4,+0～ +5(ノビエ1L)		○	○
北陸	○1	○	○始	○始										●	○
関東・東海	○1	○	○始		●前							+0～+5(ノビエ1L)			○
近・中・四	○1	○	○始		●前							植代後～+4,+0～ +5(ノビエ1L)		●	○
九州	○1	○	○始									+0～+5(ノビエ1L)		○	○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 深水条件では薬害を生じることがある。															

A-2
SB-566 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズカヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●1.5	●	●始	●始					●発生 期			+0～ノビエ1.5L	500ml		●
東北	●1.5	●	●始	●前	●始				●発生 期						●
北陸	●1.5	●	●始		●始				●発生 期						●
関東・東海	●1.5	●	●始		●始				●発生 期						●
近・中・四 (普)	●1.5	●	●始		●始										●
九州	●1.5	●	●始		●始										●
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:															

A-2
SB-566-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズカヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●1.5	●	●始	●始					●発生 期			+0～ノビエ1.5L	1kg		●
東北	●1.5	●	●始		●始				●発生 期						●
北陸	●1.5	●	●始		●始				●発生 期						●
関東・東海	●1.5	●	●始		●始				●発生 期						●
近・中・四 (普)	●1.5	●	●始		●始										●
九州	●1.5	●	●始		●始										●
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:															

A-2
YH-650 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズカヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●1.5	●	●始	●始								+0～ノビエ1.5L	500ml		●
東北	●1.5	●	●始	●始								植代後～+4,+0～ ノビエ1.5L			●
北陸	●1.5	●	●始												●
関東・東海	●1.5	●	●始												●
近・中・四 (普)	●1.5	●	●始											●	●
九州	●1.5	●	●始												●
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:															

A-2
YH-650-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 植土
北海道	●1.5	●	●始	●始								+0～ノビエ1.5L	1kg		●
東北	●1.5	●	●始	●始								植代後～4, +0～ ノビエ1.5L			●
北陸	●1.5	●	●始												●
関東・東海	●1.5	●	●始												●
近・中・四 (普)	●1.5	●	●始											●	●
九州	●1.5	●	●始											●	●

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

A-2
YH-651 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 植土
北海道													500ml		
東北	●1.5	●	●始	●始	●始							植代後～4, +0～ ノビエ1.5L			●
北陸	●1.5	●	●始		●始										●
関東・東海	○1.5	○	○始		○始		○前※				○始			●	○
近・中・四 (普)	●1.5	●	●始		●始									●	●
九州	●1.5	●	●始		●始									●	●

※: クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-2
ブタクロール 乳

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 植土
北海道													300ml		
東北	○前	○	○前									植代時(-4まで)			○
北陸															
関東・東海	○前	○	○前		○前							植代時(-4まで)			○
近・中・四															
九州															

土壌混和処理
混和時の水深3～5cm
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

A-2
ブタクロール-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 植土
北海道	○1	○	○始	○前							ミス'ア'イ: 始	+0～+5(ノビエ1L)	1kg	○	○
東北	○1	○	○始		○始							植代後～4, +0～+5(ノ ビエ1L) (砂壌土は+1 ～)		○	○
北陸	○1	○	○始		○始							植代後～4, +0～ +5(ノビエ1L)		○	○
関東・東海	○1	○	○始		○始							植代後～4, +1～ +5(ノビエ1L)		○	○
近・中・四	○1	○	○始		○始									○	○
九州	○1	○	○始		○始									○	○

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 浅植え、植え付け精度不良等で根が露出すると薬害を生じることがある。

A-3 体系処理(中後期)

A-3
DASH-001 SC

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●5	●	●花茎 抽出始	●5		●4			●生育 期	●生育 期		+25～+40(イネ6L以 降、ノビエ5Lまで)	100ml(散 布液量 100L)		●
東北	○5	○	○花茎 抽出始	○4	○4	○4			●生育 期	●生育 期					○
北陸	○5	○	○花茎 抽出始		○4	○5			●生育 期	●生育 期				●	○
関東・東海	○5	○	○花茎 抽出始		○5	○5			○生育 期	○生育 期				●	○
近・中・四 (管)	○5	○	○花茎 抽出始		○5	○5				●生育 期				●	○
九州	○5	○	○花茎 抽出始		○6	○6			○生育 期	○生育 期				●	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組合せで使用する。

落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。

A-3
DBH-1291 乳

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●5											+20～ノビエ5L	300ml(散 布液量 100L)		●
東北	●5														●
北陸	●6											+20～ノビエ6L			●
関東・東海	●6														●
近・中・四 (管)	●6														●
九州	●6													●	●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組合せで使用する。

落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。

A-3
DEH-112-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○4											+15～ノビエ4L	1～1.5kg (ノ ビエ3Lを超え る場合は	○	○
東北	○5											+15～ノビエ5L	1～1.5kg (ノ ビエ4Lを超え る場合は	○	○
北陸	○3											+15～ノビエ3L	1～1.5kg	○	○
関東・東海	○4										キシウスズメノヒエ;再生茎 2～4葉	+15～ノビエ4L	1～1.5kg (ノ ビエ3Lを超え る場合は	○	○
近・中・四	○4										キシウスズメノヒエ;再生茎 2～4葉			○	○
九州	○4										キシウスズメノヒエ;再生茎 2～4葉			○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。
キシウスズメノヒエ防除は展開葉が水面に接する条件で使用する。(関東・東海～九州)A-3
KPP-444-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北	●1.5	●	●始	●始	●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+10～+20(ノビエ 1.5Lまで)			●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

KPP-444①-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北															
北陸	●1.5	●	●始		●始	●始						+10～+20(ノビエ 1.5Lまで)			●
関東・東海	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3

KUH-003D ジェンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													25g×10コ		
東北															
北陸															
関東・東海															
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		●	●
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3

KUH-983-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○4											+15～+35(ノビエ 4L)	1kg	○	○
東北	○4													○	○
北陸	○4													○	○
関東・東海	○4													○	○
近・中・四	○4													○	○
九州	○4													○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

MCP-BAS(Na) 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道		○生育 期	○4	○5		●塊茎 形成前			●生育 期	●増殖 期		幼穂形成始期	3～4kg (北海道、 東北、北 陸、近畿・ 中国、四 州の砂壤土 は3kg)	●	○
東北		○生育 期	○4	○6	○6	○塊茎 形成前			●生育 期	○増殖 期	シズイ草丈15～20cm	有効分けつ終止期 ～幼穂形成期前		●	○
北陸		○生育 期	○4	○5	○6	○塊茎 形成前			○生育 期					○	○
関東・東海		○生育 期	○4		○6	○塊茎 形成前								○	○
近・中・四		○生育 期	○4		○6	○塊茎 形成前				●増殖 期				●	○
九州		○生育 期	○5		○6	○塊茎 形成前								○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。

降雨などにより散布後2日間以上落水もしくは浅水状態が維持されないと効果が低下することがある。

シズイ防除は有効剤との組み合わせで使用する。

A-3
MY-100DC フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													500ml		
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始	●前※	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前	シズイ:草丈3cm	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)	●	●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3
MY-100DC-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●2	●前※	●前※	●発生 期	●再生 前～始	●前	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		●	●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3
MY-100DC① フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													500ml		
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2	●始※	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前	SU抵抗性ホタルイ:1L		●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2	●始※	●始	●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
九州															

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3
MY-100DC①-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2				●再生 前～始		+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2	●始※	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州															

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3

MY-100NC-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツツ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤 土 へ 殖 土
北海道													1kg		
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		●	●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3

MY-100NDC-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツツ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤 土 へ 殖 土
北海道													1kg		
東北															
北陸	●3	●	●2		●2	●2				●再生 前～始	●前	+20～+30(ノビエ 3Lまで)		●	●
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3

MY-100TSCフロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツツ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤 土 へ 殖 土
北海道													500ml		
東北	●2.5	●	●2	●前	●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		●	●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3

NBA-073-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツツ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤 土 へ 殖 土
北海道													1kg		
東北															
北陸															
関東・東海															
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		●	●
九州															

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3
NC-329-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	シズ'イ:草丈3cm コウキヤガラ:発生始 タウキ:本葉1葉期	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)	○	○
北陸	●2.5	●	●2	●2	●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2				●再生 前～始	●前			●	●
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組合せで使用する。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 コウキヤガラ・シズ'イ防除は、有効剤との組み合わせで使用する。

A-3
NC-390 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													500ml		
東北	●3	●	●2	●始	●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	シズ'イ:草丈3cm	+20～+30(ノビエ 3Lまで)	●	●
北陸															
関東・東海	●3	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前		+20～+30(ノビエ 3Lまで)	●	●
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組合せで使用する。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 シズ'イ防除は、有効剤との組み合わせで使用する。

A-3
NH-003-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北	●2.5	●	●2		●2	●始	●前※	●前※	●発生 期	●再生 前～始	●前	シズ'イ:草丈3cm	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)	●	●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 オモダカ・クログワイ・シズ'イ防除は有効剤との組み合わせで使用する。

A-3
NH-803 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													500ml		
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始	●前※	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前	クサネム:発生始 シズ'イ:草丈3cm	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)	●	●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 水口処理可能
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 オモダカ・クログワイ・シズ'イ防除は有効剤との組み合わせで使用する。

A-3

NOJ-101-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●3	●	●2	●2		●2		●前	●発生 期	●再生 前～始	●前	+25～+35(ノビエ 3Lまで)	1kg	●	●
東北	●3	●	●2	●2	●2	●2	●前※	●前※	●発生 期	●再生 前～始	●前	+20～+30(ノビエ 3Lまで)		●	●
北陸	●3	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
関東・東海	●3	●	●2		●2	●2	●前※	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
近・中・四	●3	●	●2		●2	●2	●前※		●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
九州	●3	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3

NOJ-103-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●3	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+25～+35(ノビエ 3Lまで)	1kg	●	●
東北	●3	●	●2	●2	●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+20～+30(ノビエ 3Lまで)		●	●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組合せで使用する。

A-3

NOJ-104-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北															
北陸	●3	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+20～+30(ノビエ 3Lまで)		●	●
関東・東海	●3	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
近・中・四	●3	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
九州	●3	●	●2	●2	●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3

SB-554 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													50g×10 ³		
東北															
北陸															
関東・東海	●1.5	●	●始		●始		●前		●発生 期			+10～+20(ノビエ 1.5Lまで)		●	●
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3
SB-554 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													500ml		
東北	●1.5	●	●始		●始				●発生 期			+10～+20(ノビエ 1.5Lまで)			●
北陸	●1.5	●	●始		●始				●発生 期					●	●
関東・東海	●1.5	●	●始		●始				●発生 期		SU抵抗性コナギ:1L			●	●
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組合せで使用する。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3
SW-012①-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組合せで使用する。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3
TH-001 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													500ml		
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●2		●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前	シズイ:草丈3cm SU抵抗性ホタルイ:2L	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)	●	●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2				●再生 前～始				●	●
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
九州	●2.5	●	●2	●始	●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

オモダカ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3
TH-001-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		●	●
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始					●
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組合せで使用する。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3

TH-913①粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道		○	○	○2		○			○発生 期	○再生 前～始		エノノサヤスカグサ:2L	+10～+15	3kg	○	○
東北		○	○2		○2	○2	○始※					シズイ:草丈3cm				○
北陸		○	○2		○2	○2										○
関東・東海 (普)		○	○2		○2	○2	○始※		●発生 期	●再生 前～始			+10～+25		○	○
近・中・四 (普)		○	○2		○2	○2	○始※		●発生 期	●再生 前～始	●前				○	○
九州 (普)		○	○2		○2	○2	○始※						+10～+15		○	○

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

クログワイ、シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3

YH-641-1kg粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													+15～25(ノビエ 2.5Lまで)	1kg		
東北	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●	●
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組合せで使用する。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3

YH-653-1kg粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○3.5	○	○3	○3		○3					○始		+20～+30(イネ5L以 降、ノビエ3.5Lまで)	1kg	●	○
東北	●3.5	●	●3	●3	●3	●2					●始					●
北陸	○3.5	○	○3		○2	○2			○発生 期						●	○
関東・東海	●3.5	●	●3		●3	●3									●	●
近・中・四 (普)	●3.5	●	●3		●3	●3					●前					●
九州																

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

著しい高温条件では薬害を生じることがある。

散布後の低温および急激な気温の上昇により薬害を生じることがある。

A-4 特殊雑草対象(イボクサ)

A-4 イボクサ

KUH-911 液

地域名	対象雑草: イボクサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
関東・東海～九州	○	+30～基長30cm	50～100ml(散布液量100L) 展着剤無加用

使用上の注意: 落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。

A-4 オモダカ
KUHI-013K-0.25kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				250g
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ
MK-243D-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ
Mon-923-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始		1kg
東北	●	前	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ
Mon-923①-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	前		
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ
MY-100NC 顆粒水和

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始		80g(散布液量500ml)
東北				
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ
NBA-131a-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始		1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ
NBA-131b-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
NC-385SB 顆粒水和

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始		80g(散布液量500ml)
東北				
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
NH-101 ジャンボ

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始		50g×10 ⁷
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
NH-102 フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸	●	始		
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始		
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
NH-104-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	始		
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始		
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
NOJ-103-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始		1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
NOJ-104-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
SW-002① フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸	○	前		
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始		
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
YH-641-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始		1kg
東北	●	始	※	
北陸	●	始		
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 特殊雑草対象(クサネム)

A-4 クサネム
KUH-911 液

地域名	対象雑草: クサネム	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
全域	○	+30～草丈40cm (九州は～草丈30cm)	25～50ml(散布液量100L) 展着剤加用 50～100ml(散布液量100L) 展着剤無加用

使用上の注意: 落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。

A-4 特殊雑草対象(クログワイ)

A-4 クログワイ
AC-014A-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	前	※	
北陸				
関東・東海	○	前	※	
近・中・四	○	前	※	
九州	●	前	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
AVH-002-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	前	※	
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
FSS-115 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				3kg
東北				
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
KPP-2005 シャンボ

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				50g×10㎡
東北	○	前	※	
北陸				
関東・東海	○	前	※	
近・中・四	○	前	※	
九州	○	前	※	
※:クログワイ防除は、クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
KPP-2005DDフロアブル(少量散布)

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				300ml
東北	○	前	※	
北陸				
関東・東海	○	前	※	
近・中・四	○	前	※	
九州	○	前	※	
※:クログワイ防除は、クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
KPP-2008 丸(EW)

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	●	前	※	
北陸	●	前	※	
関東・東海	●	前	※	
近・中・四	●	前	※	
九州	●	前	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
KUH-003D シャンボ

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				25g×10㎡
東北				
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
KUH-013D-0.25kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				250g
東北				
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
KUH-013K-0.25kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				250g
東北	●	前	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
KUH-985㊦ フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸	●	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	○	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
MK-243D-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	前	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
Mon-923-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	前	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
Mon-923㊦-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始		
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
MY-100DC㊦ フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸	●	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	○	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

MY-100DC①-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	○	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

MY-100NC-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

MY-100NDC-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

NBA-071-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸				
関東・東海				
近・中・四	●	始	※	
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

NBA-131a-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	前	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

NBA-131b-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州	●	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
NC-390 プロアフル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	●	前	※	
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
NH-101 シェンボ

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				50g×10コ
東北	●	前	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
NH-102 プロアフル

地域名	対象雑草： クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸	●	始		
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始		
九州	●	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
NH-104-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	始		
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始		
九州	●	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
NOJ-103-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	前	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
NOJ-104-1kg 粒

NOJ-104-1kg粒				
地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
SW-002①フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸	○	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
TH-001フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	●	前	※	
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
TH-001①フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸				
関東・東海				
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
YH-641-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	前	※	
北陸	●	始		
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
YH-651フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸	○	前	※	
関東・東海	○	前	※	
近・中・四	○	前		
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
YH-652フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸	○	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	前		
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 コウキヤガラ
TH-001 プロアプル

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	始	500ml
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。			

A-4 特殊雑草対象(シズイ)

A-4 シズイ
AVH-002-1kg 粒

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	草丈3cm	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意: シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。			

A-4 シズイ
MCP-BAS(Na) 粒

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	草丈15～20cm	3kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意: シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。			

A-4 シズイ
NOJ-103-1kg 粒

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	草丈3cm	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意: シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。			

A-4 シズイ
SYJ-108 ジャンボ

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	草丈3cm	30g×10㎡
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意: シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。			

A-4 シズイ
TH-001-1kg 粒

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	草丈3cm	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意: シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。			

A-4 シズイ
TH-005 シャンボ

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	草丈3cm	50g×10 [□]
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意: シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 特殊雑草対象(ミズアオイ)

A-4 ミズアオイ
AVH-002-1kg 粒

地域名	対象雑草: ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	始	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 ミズアオイ
CG-113 EW

地域名	対象雑草: ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	前	100ml(原液)
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意: 有効な剤との組み合わせで使用する

A-4 ミズアオイ
CG-113(改) シャンボ

地域名	対象雑草: ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	前	30g×10 [□]
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意: 有効な剤との組み合わせで使用する

A-4 ミズアオイ
NBA-131a-1kg 粒

地域名	対象雑草: ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	始	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 ミズアオイ
TH-005 シャンボ

地域名	対象雑草: ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	始	50g×10 [□]
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 ミズアオイ
YH-546 フロアブル

地域名	対象雑草： ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	1L	500ml
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 ミズアオイ
YH-641-1kg 粒

地域名	対象雑草: ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	1L	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 特殊雑草対象(SU抵抗性コナギ)

A-4 SU抵抗性コナギ
AC-014A-1kg 粒

地域名	対象雑草: SU抵抗性コナギ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 SU抵抗性コナギ
KPP-2011 フロアブル

地域名	対象雑草: SU抵抗性コナギ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州			
使用上の注意: 有効な剤との組み合わせで使用する。			

A-4 SU抵抗性コナギ
SW-041①-1kg (旧 NBA-141b-1kg) 粒

地域名	対象雑草: SU抵抗性コナギ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	1L	
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 SU抵抗性コナギ
YH-641-1kg 粒

地域名	対象雑草: SU抵抗性コナギ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	1L	
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 特殊雑草対象(SU抵抗性ホタルイ)

A-4 SU抵抗性ホタルイ

AVH-002-1kg 粒

地域名	対象雑草: SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	1L	1kg
東北	○	1L	
北陸			
関東・東海	●	1L	
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 SU抵抗性ホタルイ

BAG-032 ジャンボ

地域名	対象雑草: SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			20g×10 ³
東北			
北陸			
関東・東海	●	2L	
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 SU抵抗性ホタルイ

CG-113 EW

地域名	対象雑草: SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	前	100ml(原液)
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意: 有効な剤との組み合わせで使用する			

A-4 SU抵抗性ホタルイ

KUH-011D-1kg 粒

地域名	対象雑草: SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	2L	
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 SU抵抗性ホタルイ

NBA-131b-1kg 粒

地域名	対象雑草: SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	1L	
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 SU抵抗性ホタルイ

SW-002 フロアブル

地域名	対象雑草: SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北	●	2L	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 SU抵抗性ホタルイ
SW-024④ シャンボ

地域名	対象雑草： SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	40g×10㎡
東北	●	2L	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 SU抵抗性ホタルイ
SW-024④ シャンボ

地域名	対象雑草： SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			40g×10㎡
東北			
北陸			
関東・東海	●	1L	
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 SU抵抗性ホタルイ
SW-041④-1kg (旧 NBA-141a-1kg) 粒

地域名	対象雑草： SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	1.5L	1kg
東北	●	1.5L	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意：			

A-4 SU抵抗性ホタルイ
SW-041④-1kg (旧 NBA-141b-1kg) 粒

地域名	対象雑草: SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	1.5L	
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 SU抵抗性ホタルイ
TH-001 フロアブル

地域名	対象雑草: SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北	○	2L	
北陸			
関東・東海	●	2L	
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

B 直播栽培

B
KUH-011D-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズカヤ ツツ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北陸～九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	イネ1L～ノビエ 2.5L	1kg	●	●
灌水条件で使用する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: イネの根が露出する条件では被害を生じる。															

B

KUH-011K-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道、東北	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始		イネ1L～ノビエ 2.5L	1kg		●

湛水直播
湛水条件で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

KUH-013D-0.25kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北陸～九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	イネ1L～ノビエ 2.5L	250g	●	●

湛水条件で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

KUH-013K-0.25kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道、東北	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始		イネ1L～ノビエ 2.5L	250g		●

湛水直播
湛水条件で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

KUH-962-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道～近畿・ 中国・四国	●3.5	●	●3		●3	●3						イネ5L～ノビエ 3.5L	1kg	●	●

湛水直播
湛水条件で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 著しい高温条件では薬害を生じることがある。
散布後の低温および急激な気温の上昇により薬害を生じることがある。
前処理剤との組み合わせで使用する。

B

KUH-972D フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北陸～九州	○3	○	○2		○2	○2			●発生 期	○再生 前～始	○前	イネ1L～ノビエ3L	500ml	○	○

湛水直播
湛水条件で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

KUH-983-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
全域	●4											イネ3L～ノビエ4L	1kg		●

湛水条件で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B
KUH-985① フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北陸～九州	○3	○	○2		○2	○2				○再生 前～始	○前	イネ1L*～ノビエ 3L (*:砂壌土はイ ネ1.5L～)	500ml	○*	○
湛水直播 湛水条件で使用する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: イネの根が露出する条件では葉害を生じる。															

B
MY-100DC① フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北陸～九州	●2.5	●	●2		●2	●2				●再生 前～始		イネ1L～ノビエ 2.5L	500ml		●
湛水条件で使用する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: イネの根が露出する条件では葉害を生じる。															

B
MY-100TSC フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
全域	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始		イネ1L～ノビエ 2.5L	500ml		●
湛水条件で使用する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: イネの根が露出する条件では葉害を生じる。															

B
NBA-071-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
東北～九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始		イネ1L～ノビエ 2.5L	1kg		●
湛水直播 湛水条件で使用する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: イネの根が露出する条件では葉害を生じる。															

B
NC-385SB 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
東北～九州	●2.5	●	●2		●2							イネ1L～ノビエ 2.5L	80g(散 布液量 500ml)		●
湛水直播 湛水条件で使用する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: イネの根が露出する条件では葉害を生じる。															

B
NH-102 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北陸～九州	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始		イネ1L～ノビエ 2.5L	500ml		●
湛水直播 湛水条件で使用する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: イネの根が露出する条件では葉害を生じる。															

B

SB-556 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツツ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
東北～九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期			イネ1L～ノビエ 2.5L	500ml	●	●

湛水直播
湛水条件で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

SW-002 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツツ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道, 東北	○2.5	○	○2			●始			●発生 期	●再生 前～始		イネ1L～ノビエ 2.5L	500ml		○

湛水条件で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

SW-002① フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツツ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北陸～九州	○2.5	○	○2		○2	●始			●発生 期	●再生 前～始		イネ1L～ノビエ 2.5L	500ml		○

湛水直播
湛水条件で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

SW-973-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツツ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道 東北～近畿・中 国・四国	○3.5	○	○2		○2	○2			○発生 期			イネ5L～ノビエ 3.5L	1kg	●	○

湛水直播(関東・東海, 近畿・中国・四国)
湛水条件で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 著しい高温条件では薬害を生じることがある。
散布後の低温および急激な気温の上昇により薬害を生じることがある。
前処理剤との組み合わせで使用する。

B

SW-991-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツツ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
全域	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期			イネ1L～ノビエ 2.5L	1kg		●

湛水条件で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

TH-913NCS フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツツ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
全域	○3	○	○2		○2	○2				○再生 前～始		イネ1L～ノビエ3L (北海道～北陸は イネ1.5L～)	500ml		○

湛水直播
湛水条件で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

C 畦畔雑草

C

AH-01 液

地域名		対象雑草	処理時期	使用量(散布液量) /10a	適用土壌
全域	●	全草種	雑草生育期(草丈30cm以下)	500～1000ml(散布液量100～150L)	全土壌

使用上の注意: のり面には使用しない。
水田内に流入または飛散すると薬害を生じる。

C

ZK-122 液

地域名		対象雑草	処理時期	使用量(散布液量) /10a	適用土壌
全域	○	全草種(スギナを除く)	雑草生育期(草丈30cm以下)	一年生雑草:250～500ml/10a 多年生雑草:500～1000ml/10a (散布液量50L/10a, 専用ノズルを使用)	全土壌

使用上の注意: のり面には使用しない。
水田内に流入または飛散すると薬害を生じる。

その他

その他

DEH-112 乳(EW)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ワカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土 ～ 壤土
北海道	○5											播種後10日～ノ ビエ5L	100ml(散 布液量 100L)	
東北														
北陸														
関東・東海														
近・中・四														
九州														

機械移植育苗に使用する
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

水稲関係除草剤使用基準の表示について

- 過年度、既に実用化の認められている適用草種・土壌条件に○を印した。
(本年度の試験の結果、特に拡大のない場合も含む)
草種欄の数字、字句で草種ごとの葉齢を示した。[例:○始(発生始)、○2(2葉期まで)]
作期に限定がある場合は、地域名の後に適用作期を普通期:(普), 早期:(早)と記した。
使用上の注意は別途一覧表に沿って文章で備考欄に記載した。
- 本年度、新たに使用基準が作成された場合は、実用化可能となった適用草種・土壌に●を印し、
処理時期及び使用量を記載した。
C(畦畔), D(耕起前), E(休耕田)の試験区分において、判定欄の○は前年度までに実用化の
認められている地域を示す。
- 過年度の基準に適用条件拡大が可能となった場合、
作 期 の 拡 大 : 作期の限定がなくなった場合、作期の記載を取消線で消した。(例:(普))
草 種 の 拡 大 : 拡大可能となった草種に●を印した。
葉 齢 の 拡 大 : 拡大可能となった葉齢に、アンダーラインを付した。(例: ○2.5)
処理時期、使用量の拡大 : 拡大部分にアンダーラインを付した。(例: ±3～ノビエ2L, 50～75ml/a)
土 壌 条 件 の 拡 大 : 拡大可能となった土壌に●を印した。