

農林水産省消費・安全局農産安全管理課
平成16年12月1日～平成17年3月31日

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	登録会社
ベンシスル タップ・イマゾ スルフロン・カフ エストロール・ タムロン粒 剤	ショウリョクシ ンホ	S, S'-2-ジ'メチルア トリメチレン= (ベン ゼンチオスホート) ・・・32.0% 1-(2-クロロイミダゾ [1, 2-a]ピリジン- 3-イルスルホニル)-3- (4, 6-ジ'メトキシピ リジン-2-イル)尿素 ・・・1.8% N, N-ジ'エチル-3-メシ チルスルホニル-1H-1, 2, 4-トリアゾ-6-1- カルボキシミド ・・・4.2% 1-(α, α-ジ'メチル ベンジル)-3-(パ トリル)尿素 ・・・20.0%	粒 剤	移植水稻	スミシノコ ガイ(食害 防止)及 び水田一 年生雑 草、マツバ イ、ホタルイ、 ミス'カ'ヤツ リ、ウリカワ、ヒ ルシロ、ゼリ、 アオミド・ロ 藻類によ る表層は く離	九州の 普通期 栽培地 帯	砂壤土 ～壇土	移植後 3 日～ 1 2 日 (/ピ'エ2葉 期まで)	小包装10個 (500g)	水田に小包装 のまま投げ入 れる 本剤の使用回 数1回 ベンシスルタ ップを含む農 薬の総使用回 数4回以内 イマゾスルフロ ンを含む農薬 の総使用回数 2回以内 カフエストロー ルを含む農薬 の総使用回数 1回 タムロンを含 む農薬の総使 用回数3回以 内(本時期は2 回以内)	住化武田 農薬㈱
タムロン・ ピラゾスル フロエチル・フ ェントラサミ ド粒剤	エールスター1キ ロ粒剤	1-(α, α-ジ'メチル ベンジル)-3-(パ トリル)尿素 ・・・4.5% エチル=5-(4, 6-ジ'メ トキシピリジン-2-イ ルカルバモイルスル フアモイル)-1-メチル ピラゾ-6-1-カルボキ シミド ・・・0.30% 4-(2-クロロフェニル)- N-シクロヘキシル-N-エ チル-4, 5-ジ'ヒドロ-5 -オキソ-1H-ピラゾ-6- 1-カルボキシミド ・・・2.0%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツバ イ、ホタル イ、ウリカ ワ、ミス'カ 'ヤツリ、 ヒルシロ(北 陸を除く)、 ゼリ(北陸、 近畿・中 国・四国 を除く) アオミド・ ロ藻類によ る表層は く離(東北 、九州)	東北 北陸、 関東以 西(九州 を除く) の普通 期栽培 地帯及 び関東 ・東山 ・東海 の早期 栽培地 帯	壇土 ～壇土	移植直後 ～移植後 1 5 日 (/ピ'エ2葉 期まで) 移植直後 ～移植後 1 2 日 (/ピ'エ2葉 期まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用回 数1回 タムロンを含 む農薬の総使 用回数3回以 内(本時期は2 回以内) ピラゾスルフロ エチルを含む 農薬の総使用 回数1回 フェントラサミ ドを含む農薬 の総使用回数 1回	日産化学 工業㈱、 協友アグ リ㈱、 ハニエル クロップ サイエ ンス㈱
						九州の 普通期 及び早 期栽培 地帯	砂壤土 ～壇土	移植後 1 日～ 1 2 日 (/ピ'エ2葉 期まで)			

– 24 –

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10 a 当り使用量	使用方法	登録会社
イマゾスルフロン・ブレチラロール粒剤	コ・ヨリダ・シ・ヤンホ	1-(2-クロロイミダゾール[1,2-a]ピリジン-3-イルスルホニル)-3-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イル)尿素 ・・・1.8% 2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(2-プロポキシエチル)アゼトアゼリト ・・・12.0%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバ、オタネ、ウリカ、ミズカヤツリ(北海道を除く)、ヘラモダカ(北海道、東北)ヒルムシロ(北陸、近畿、中国・四国を除く)セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離(北陸、近畿、中国・四国を除く)	北海道	壤土～埴土	移植後3日～15日(1/2エタ薬期まで)	小包装10個(500g)	水田に小包装のまま投げ入れる 本剤の使用回数1回 イマゾスルフロンを含む農薬の総使用回数2回以内 ブレチラロールを含む農薬の総使用回数2回以内	住化武田農業㈱
						全域(北海道を除く)の普通期栽培地帯及び関東・東山・東海の早期栽培地帯		移植後3日～12日(1/2エタ薬期まで)			
イマゾスルフロン・フェントラサミト粒剤	リーテ・インク・Sシ・ヤンホ	1-(2-クロロイミダゾール[1,2-a]ピリジン-3-イルスルホニル)-3-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イル)尿素 ・・・3.0% 4-(2-クロロフェニル)-N-シクロヘキシル-N-エチル-4,5-ジヒドロ-5-オキソ-1H-テトラゾール-1-カルボキサミト ・・・7.5%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバ、オタネ、ウリカ、ミズカヤツリ(北海道を除く)、ヘラモダカ(北海道、東北)ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	北海道	砂壤土～埴土	移植後5日～20日(1/2エタ薬期まで)	小包装10個(400g)	水田に小包装のまま投げ入れる 本剤の使用回数1回 イマゾスルフロンを含む農薬の総使用回数2回以内 フェントラサミトを含む農薬の総使用回数1回	住化武田農業㈱
						東北	壤土～埴土	移植後5日～15日(1/2エタ薬期まで)			
						北陸、関東以西の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～埴土				

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10 a 当り使用量	使用方法	登録会社
イマゾスルフロン・タ・イムロン・フェントラザミド粒剤	カルガ・ル1キロ粒剤	1-(2-クロロイミダゾール[1,2-a]ピリジン-3-イルスルホニル)-3-(4,6-ジメトキシピリジン-2-イル)尿素 ・・・0.90% 1-(α , α -ジメチルペンジル)-3-(パラトリル)尿素 ・・・10.0% 4-(2-クロロフェニル)-N-シクロヘキシル-N-エチル-4,5-ジヒドロ-5-オキソ-1H-テトラゾール-1-カルボキサミド ・・・2.0%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びDMAツバノイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズカヤツリ、ヘラオモタカ(東北)、ヒルムシロ、ゼリ、アオミドロ・藻類による表層はく離(東北、九州)	東北	壤土～埴土	移植直後～移植後15日(ノビエ2葉期まで)	1kg	湛水散布 本剤の使用回数1回 イマゾスルフロンを含む農薬の総使用回数2回以内 タ・イムロンを含む農薬の総使用回数3回以内(本田期は2回以内) フェントラザミドを含む農薬の総使用回数1回	バ・イェルクロップ・サイエンス(株)
						北陸、関東・東山・東海、近畿・中国、四国の普通期栽培地帯及び関東・東山・東海の早期栽培地帯		移植直後～移植後12日(ノビエ2葉期まで)			
						九州の普通期栽培地帯	砂壤土～埴土				
カフェンストロール・タ・イムロン・ハロスルフロンメチル・ベンゾゾ・ビシクロン水和剤	オークスフロアブル	N,N-ジエチル-3-メチルスルホニル-1H-1,2,4-トリアジン-6-イル-カルボキサミド ・・・5.0% 1-(α , α -ジメチルペンジル)-3-(パラトリル)尿素 ・・・10.0% メチル-3-クロロ-5-(4,6-ジメトキシピリジン-2-イルカルボモイルスルファミド)-1-メチルピラゾール-4-カルボキシアート ・・・1.2% 3-(2-クロロ-4-メチルペンジル)-2-フェニルチオビシクロ[3.2.1]オクタ-2-エン-4-オン ・・・4.0%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草及びDMAツバノイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズカヤツリ(北海道を除く)、ヘラオモタカ(北陸を除く)、ヒルムシロ、ゼリ(北陸を除く)、アオミドロ・藻類による表層はく離(北陸を除く)	北海道	壤土～埴土	移植後5日～20日(ノビエ2.5葉期まで)	500mL	原液湛水散布 本剤の使用回数1回 カフェンストロールを含む農薬の総使用回数1回 タ・イムロンを含む農薬の総使用回数3回以内(本田期は2回以内) ハロスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数1回 ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数2回以内	日産化学工業(株) 関エス・ティ ー・エス・バイ テック
						東北、北陸		移植後5日～15日(ノビエ2.5葉期まで)			

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
ブタクロール 粒剤	マゼット粒 剤5	2-クロロ-2',6'-ジ エチル-N-(7'-トキシメ ル)アセトアニト ...5.0%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツバ、イ ネ、ミズ カヤツリ(北 海道を除 く)、 ヘオモタカ (北海道、 東北)	全域 (九州を 除く)の 普通期 栽培地 帯及び 九州の 早期栽 培地帯	壤土 ～埴土	植代後 ～移植 4 日前まで	2～3kg	湛水散布 本剤の使用回 数 1 回 ブタクロールを 含む農薬の総 使用回数 2 回以 内	日産化学 工業㈱
						全域の 普通期 及び早 期栽培 地帯		移植後 3 日～ 10 日 (/ビエ1.5 葉期ま で)	3kg		
カフェストロー ル・ダームロ ン・ビラゾ キシフェン・ ベンゾビシ ロン粒剤	トビキシヤ ンホ	N,N-ジエチル-3-メ チルホルム-1H-1, 2,4-トリアゾール-1- カルボキサミド ...4.2% 1-(α,α-ジメチル ベンジル)-3-(パラ トリル)尿素 ...8.4% 2-[4-(2,4-ジクロ ロベンジル)-1,3- ジメチルピラゾール-5 -イルオキシ]アセトフェノ ン ...20.0% 3-(2-クロロ-4-メチル ベンジル)-2-フェニ ルチオビシクロ[3.2. 1]オクタ-2-エン-4-オ ン ...4.0%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草及 びマツバ、イ ネ、ミズ カヤツリ、 ミズカヤツ (北海道を 除く)、 ヘオモタカ (北海道、 東北)、 ヒルムシロ、 セリ(東北) エゾノササ グサ(北海 道)、 シスイ(東 北)、 コウキカ (九州)、 アオミロ 藻類によ る表層は く離(東 北、九州)	北海道 東北	砂壤土 ～埴土	移植後 3 日～ 15 日 (/ビエ2葉 期まで)	小包装10個 (500g)	水田に小包装 のまま投入 れる 本剤の使用回 数 1 回 カフェストロー ルを含む農薬 の総使用回数 1 回 タムロンを含む 農薬の総使用 回数 3 回以内 (本田期は2回 以内) ビラゾキシフェ ンを含む農薬 の総使用回数 2 回以内 ベンゾビシロン を含む農薬の 総使用回数 2 回以内	石原産業 ㈱ ㈱エス・デー ー・エス・バ イ オテック
						北陸、 関東以 西の普 通期及 び早期 栽培地 帯		移植後 3 日～ 12 日 (/ビエ2葉 期まで)			

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稲刈後・畑作・野菜作・永年生物・非農耕地対象

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
ターバシル・テトラビオン・テフチロン粒剤	ラーチS粒剤	3-カーシャリ-7-チル5-クロロ-6-メチルピリジン ...2.5% 2,2,3,3-テトラフルオロ-7-ピリジン-5-カルボキシ酸ナトリウム ...4.0% 1-(5-tert-ブチル-1,3,4-チアジ-2-イル)-1,3,4-オキサジナ-2,4,6-トリオン ...2.5%	粒剤	樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、鉄道等)	一年生雑草			雑草発生前～雑草生育期(草丈30cm以下)	7.5～15kg	植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布 本剤の使用回数1回 ターバシルを含む農薬の総使用回数1回 テトラビオンを含む農薬の総使用回数2回以内 テフチロンを含む農薬の総使用回数3回以内	㈱日本ケリンアント・ガートン
					多年生雑草				15kg		
グリホサートイソプロピルアミン塩液剤	クサゼンロイッキネツキ液剤	イソプロピルアミン塩 N-(ホスホリル)グリホサート ...41.0%	液剤	キャベツはくさいだいこん	畑地一年生雑草			雑草生育期(草丈30cm以下)但し耕起7日前まで	250～500mL 希釈水量100L	雑草茎葉散布 本剤の使用回数1回 グリホサートを含む農薬の総使用回数1回	(株)エース・アグリカヤマ産業(株)
				なしりんごかんきつ	一年生雑草			雑草生育期(草丈30cm以下)但し収穫7日前まで	250～500mL 希釈水量50～100L		
					多年生雑草				500～1000mL 希釈水量50～100L		

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10 a 当り使用量	使用方法	登録会社		
グリホサートイソプロピルアミン塩液剤 つづき	グサセロイックネコジク液剤 つづき	イソプロピルアミンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリホサート ・・・41.0% つづき	液剤 つづき	水田作物 (水田畦畔)	一年生雑草			雑草生育期(草丈30cm以下) 但し収穫14日前まで	250～500mL 希釈水量50～100L	雑草茎葉散布 本剤の使用回数2回以内 グリホサートを含む農薬の総使用回数2回以内			
					多年生雑草				500 ～1000mL 希釈水量50～100L				
				水田作物 (水田耕起前)	一年生雑草			雑草生育期 但し耕起20～10日前まで	250～500mL 希釈水量50～100L	雑草茎葉散布 本剤の使用回数1回 グリホサートを含む農薬の総使用回数1回			
					樹木等 (公園、提とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面等)				一年生雑草	雑草生育期 但し草丈30cm以下		500mL 希釈水量100L	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布 グリホサートを含む農薬の総使用回数3回以内
									多年生雑草			1000mL 希釈水量100L	
									スギナ			雑草生育期	
グリホサート・メトリアジン・DCMU粉粒剤	ネコジクマイクロ粒剤 クサノンQ微粒剤	アンモニウムDL-ホモアラニン-4-イル(メチル)ホスフィナート ・・・0.80% 4-アミノ-6-ターシャリアブチル-3-(メチルチオ)-1,2,4-トリアジン-5(4H)-オン ・・・0.40% 3-(3,4-ジクロロフェニル)-1,1-ジメチル尿素 ・・・2.0%	微粒剤	樹木等 (公園、庭園、提とう、駐車場、道路、運動場、宅地、鉄道等)	一年生雑草			雑草生育期(草丈30cm以下)	10～20kg	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布 本剤の使用回数2回以内 グリホサートを含む農薬の総使用回数3回以内 メトリアジンを含む農薬の総使用回数2回以内 DCMUを含む農薬の総使用回数3回以内	ハ・イェルクロップ・サイエンス(株) (株)日本グリフ・リシアント・カンパニー		

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用地帯	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
ジメナミド・リニロン粒剤	エコトップ粒剤	(RS)-2-クロロ-N-(2,4-ジメチル-3-チエニル)-N-(2-メトキシ-1-メチルエチル)アセトアミド ...1.6% 3-(3,4-ジクロロフェニル)-1-メトキシ-1-メチル尿素 ...1.4%	粒剤	だいず	畑地一年生雑草	全域(北海道を除く)	砂土を除く全土壌	は種後出芽前(雑草発生前)	4~6kg	全面土壌散布 ジメナミドを含む農薬の総使用回数1回 リニロンを含む農薬の総使用回数1回	日産化学工業㈱ BASF㈱ デュポン㈱ 丸和㈱ イノケム㈱
グリホサートイソプロピルアミン塩液剤	マラカリータAL クサゼロイッキAL ネコギ液剤AL カレリーナAL	イソプロピルアミン塩 =N-(ホスホメチル)グリホサート ...0.40%	液剤	樹木等(公園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面等)	一年生雑草及び多年生雑草 スギナ			雑草生育期(草丈30cm以下) 雑草生育期	500~100mL/m ² (原液散布) 200mL/m ² (原液散布)	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布 グリホサートを含む農薬の総使用回数3回以内	住商アグロインターナショナル㈱ (南)ビーエス・アグリカレイン㈱ 薬品㈱ ヤマダ産業㈱

SHIBUYA INDEX 2005年版 できました。

—10th Edition—

渋谷成美ほか／編集 A4判 956頁 定価45,150円(本体43,000円+税5%)

「SHIBUYA INDEX—10th Edition—」2005年版の特長

前回の2002年版に新たに開発された単剤と混合剤を加え、より充実しました。また、これまでに開発せず不要な剤は削除し、より見やすい形としました。

- ①世界の農薬(殺虫剤、殺菌剤、除草剤、フェロモン、殺そ剤等)の全てを網羅し、世界で最も簡単に利用できる画期的な資料です。
- ②各農薬が構造別に整理されているので、関連化合物を容易に探すことができます。
- ③一般名、商品名、コードナンバー、メーカー名、構造式、主要剤型と濃度、安全性、使用分野に区分し、剤の特性が一目で判ります。
- ④一般名、商品名のある古い剤は全てを含むほか、構造の判明している新しい剤と各種混合剤も記載されています。
- ⑤日本での委託・登録状況が判ります(米国、英国、フランス、韓国等についても一部記載)。
- ⑥米国の再登録現況も収録してあります。

全国農村教育協会

〒110-0016 東京都台東区台東1-26-6
電話 03-3839-9160 FAX 03-3839-9172