

平成17年度水稻作関係除草剤試験成績概要

財団法人 日本植物調節剤研究協会 技術部

平成17年度水稻作関係除草剤試験成績中央検討会は、平成17年12月8日、9日の2日間、池之端文化センターにおいて開催された。なお、適1試験成績検討会は、これに先立ち平成17年10月14日 台東1丁目区民館にて開催された。ここに、これら検討会における判定結果を報告する。

1) 第一次適用性試験(適1)は、北海道地域(植調北海道試験地)、東北地域(植調古川試験地)、北陸地域(植調新潟試験地)、関東地域(植調研究所)、近畿・中国・四国

地域(植調滋賀試験地)、九州地域(植調福岡試験地)の全国6地域および砂壌土(植調霞ヶ浦試験地)で34薬剤(のべ187点)について実施した。その判定結果は、第2表のとおりである。

2) 第二次適用性試験(適2)は、のべ430剤(総点数2,236点)であり、その内訳を第1表にまとめた。これら適2試験の判定結果は第3表のとおりであり、「実・継」と判定された薬剤の使用基準を後に掲載した。

第1表 平成17年度適2試験実施点数

A-1 移植栽培(一発処理)	126 剤 1,141 点	A-4 特殊雑草対象 内訳	
A-2 移植栽培(体系処理:初期)	20 剤 171 点	アシカキ	1 剤 1 点
A-3 移植栽培(体系処理:中後期)	56 剤 395 点	アゼガヤ	1 剤 3 点
A-4 移植栽培(特殊雑草対象)	のべ 185 剤 355 点	イボクサ	4 剤 4 点
B 直播栽培	32 剤 102 点	エンノサヤヌカグサ	3 剤 3 点
C 畦畔雑草	5 剤 38 点	オモダカ	41 剤 106 点
D 耕起前	3 剤 12 点	クサネム	2 剤 4 点
E 休耕田	2 剤 18 点	クログワイ	66 剤 156 点
その他	1 剤 4 点	コウキヤガラ	8 剤 10 点
		シズイ	15 剤 15 点
		ミズアオイ	11 剤 11 点
		SU 抵抗性コナギ	10 剤 10 点
		SU 抵抗性ホタルイ	23 剤 32 点

第2表 平成17年度 水稻関係除草剤適1試験 判定結果一覧

注) 評価欄の記入については、◎:極めて有望、○:有望、□:可能性有り、△:再検討、×:見込みなし を表す。

NO	試験名・剤型 [委託会社]	有効成分及び含有率 (%)	実施場所別総合評価							中央判定 [今後の検討課題]
			北海道	古川	新潟	植調	滋賀	福岡	霞ヶ浦(砂)	
1	BCH-051 ジャンボ [ハ'イ]	AVH-301:10% オキサジクロメホン:2%	□	□	□	○	◎	○	○	□:北海道～北陸 ○:関東～九州 一発処理 [2.5葉期のノビエおよび寒地における ウリカワに対する効果の確認]
2	BCH-052 フロアブル [ハ'イ]	AVH-301:6% フェントラサミド:6% (W/V)	□	□	◎	◎	◎	○	◎	□:北海道～東北 ◎:北陸～九州 一発処理 [2.5葉期のノビエおよび寒地における ウリカワに対する効果の確認]
3	BCH-053 フロアブル [ハ'イ]	AVH-301:6% メフエナセット:20% (W/V)	□	□	◎	◎	○	○	◎	□:北海道～東北 ◎:北陸～九州 一発処理 [2.5葉期のノビエおよび寒地における ウリカワに対する効果の確認]
4	DASH-003-1kg 粒 [タ'ウミカル, 住友化学]	イマゾスルフロニ:0.9% ジチオピル:0.9% シハロホップ'チル:1.8% プロモ'チド:9%	○	□	○	○	○	△	○	□ 一発処理 [高葉期のノビエに対する効果と葉害の 確認]
5	DBH-1294-1kg 粒 [東部韓農]	メタミホップ:0.9%	△	△	△	△	○	△	△	△ ノビエ専用剤 [効果の再検討]
6	HOK-0301 フロアブル [北興]	フェントラサミド:6% ベンゾ'フェナップ:1.6% ベンフレセート:10%	□	□	◎	◎	○	□	◎	○ 一発処理 [2.5葉期のノビエおよび寒地における ウリカワに対する効果の確認]
7	HOK-0401① フロアブル [北興, SDS, デュボン]	オキサジクロメホン:1.2% ベンスルフロニメチル:1.0% ベンゾ'ビシクロン:4%			○	□	○	□	○	○:北陸～九州 一発処理 [2.5葉期のノビエに対する効果の確認]
8	HOK-0401①-1kg 粒 [北興, SDS, デュボン]	ベンスルフロニメチル:0.51% オキサジクロメホン:0.8% ベンゾ'ビシクロン:2%			□	□	◎	○	○	○:北陸～九州 一発処理 [2.5葉期のノビエに対する効果の確認]
9	HOK-0501 ジャンボ [北興, デュボン]	オキサジクロメホン:1.6% ベンスルフロニメチル:1.5% クロメプロップ:10%		□						□:東北 一発処理 [2.5葉期のノビエに対する効果と葉害 の確認]
10	HOK-0501 フロアブル [北興, デュボン]	オキサジクロメホン:1.2% ベンスルフロニメチル:1.4% クロメプロップ:10%		□						□:東北 一発処理 [2.5葉期のノビエに対する効果と葉害 の確認]
11	HOK-0501-1kg 粒 [北興, デュボン]	オキサジクロメホン:0.8% ベンスルフロニメチル:0.75% クロメプロップ:5%		□						□:東北 一発処理 [2.5葉期のノビエに対する効果の確認]
12	HSW-051-1kg 粒 [北海三共]	ピラゾレート:18% フェントラサミド:3% ベンフレセート:4%	□							□:北海道 一発処理 [ホタルイに対する効果の確認]
13	HSW-052 フロアブル [北海三共]	ピラゾレート:300g/L フェントラサミド:60g/L ベンフレセート:80g/L	○							○:北海道 一発処理 [年次変動の確認]

注) 評価欄の記入については、◎:極めて有望、○:有望、□:可能性有り、△:再検討、×:見込みなし を表す。

NO	試験名 ・ 剤型 [委託会社]	有効成分及び含有率 (%)	実施場所別総合評価							中央判定 [今後の検討課題]
			北海道	北川	新潟	植調	滋賀	福岡	霞ヶ浦(砂)	
14	KYH-680-1kg 粒 [協友アグリ]	ピラクロニル:1% プレチラクロール:4%	◎	□	○	○	○	□	○	○ 体系処理(初期) [ホタルイ、ミズガヤツリに対する効果の確認]
15	NC-604 ジャンボ [日産, SDS]	カフェンストロール:10% タイムロン:16.7% ハロスルフロメチル:2% ベンゾピシクロン:6.7%	□	□	○	□	○	○	□	□ 一発処理 [高葉齢のノビエに対する効果の確認]
16	NC-604-1kg 粒 [日産, SDS]	カフェンストロール:3% タイムロン:5% ハロスルフロメチル:0.6% ベンゾピシクロン:2%	□	□	○	□	○	○	□	□ 一発処理 [ノビエに対する効果の確認]
17	NC-606 ジャンボ [日産]	オキサジクロメホン:2.7% ピラゾスルフロエチル:1% ベンゾピシクロン:6.7% ジメタメリン:2%	○	○	◎	○	◎	□	○	○ 一発処理 [年次変動の確認]
18	NC-607 ジャンボ [日産]	オキサジクロメホン:2% ピラゾスルフロエチル:0.7% ベンゾピシクロン:6.7%	○	○	○	□	○	□	○	□～○ 一発処理 [ノビエに対する効果の確認]
19	NC-607-1kg 粒 [日産]	オキサジクロメホン:0.8% ピラゾスルフロエチル:0.3% ベンゾピシクロン:2%	○	○	○	□	○	□	○	□～○ 一発処理 [ノビエに対する効果の確認]
20	NC-617-1kg 粒 [日産]	エスプロカルブ:15% ペノキスラム:0.3% ピラゾスルフロエチル*:0.21% (*6月3日成分名・含有率公開)	○	◎	◎	◎	○	○	○	◎ 一発処理 [年次変動の確認]
21	NH-051㊥ フロアブル [日農, デュボン]	ピラクロニル*:4% プロモブチド*:18% ペンシルフロメチル*:1.4% (*4月4日成分名公開)	◎	○						○:北海道, 東北 一発処理 [年次変動の確認]
22	NH-051㊥-1kg 粒 [日農, デュボン]	ピラクロニル*:2% プロモブチド*:9% ペンシルフロメチル*:0.75% (*4月4日成分名公開)	○	○						○:北海道, 東北 一発処理 [年次変動の確認]
23	NP-0502 フロアブル [日本曹達, 科研]	ピリプチカルブ*:10%* ペントキサゾン*:4%*(W/V) (*8月31日含有率公開)	○	□	□	□	□	□	△	□ 体系処理(初期) ～ノビエ1L [ホタルイ、ミズガヤツリに対する効果の確認]
24	NP-0503-1kg 粒 [日本曹達]	未公開(既知A):A% 未公開(既知B):B%	△	△	△	△	△	△	△	△ 体系処理(初期) [効果の再検討]
25	SBX-568 ジャンボ [SDS]	ピラクロニル*:6.6%* ベンゾピシクロン:6.7% (*6月9日成分名・含有率公開)	□	◎	○	◎	◎	◎	○	○ 一発処理 [寒地におけるホタルイに対する効果の確認]
26	SST-404 フロアブル [住化武田, 協友アグリ, 住友化学]	イマゾスルフロ:1.8% ピラクロニル:4% プロモブチド*:18%(W/V)	◎	○	○	○	○	□	◎	○ 一発処理 [年次変動の確認]
27	SST-404-1kg 粒 [住化武田, 協友アグリ, 住友化学]	イマゾスルフロ:0.9% ピラクロニル:2% プロモブチド:9%	◎	○	○	○	◎	□	◎	○ 一発処理 [年次変動の確認]

注) 評価欄の記入については、◎：極めて有望、○：有望、□：可能性有り、△：再検討、×：見込みなし を表す。

NO	試験名 ・ 剤型 [委託会社]	有効成分及び含有率 (%)	実施場所別総合評価							中 央 判 定 [今後の検討課題]
			北 海 道	古 川	新 潟	植 調 研	滋 賀	福 岡	霞 ヶ 浦 (砂)	
28	SW-051-1kg 粒 [三共アグリ、デュポン]	アジメスルフロン:0.18% シハロホップブチル:1.8%	○	□	△	◎	○	△	◎	□ 体系処理（中後期）～ノビエ3.5L [ノビエに対する効果の確認と使用場面 について]
29	SW-052 ジャンボ [三共アグリ]	ビラクロニル:4% ピラゾレート:20% ベンゾビシクロン:4%	□	◎	○	○	◎	□	○	○ 一発処理 [年次変動の確認]
30	SYJ-157-1kg 粒 [シンジエンタ]	トリフタリド:1.2% プレチラクロール:4.5% ベンスルフロメチル:0.51% メトリオン:0.9%			○	○	○	□	○	○ 一発処理 ～ノビエ2.5L [薬害の年次変動の確認]
31	SYJ-166 フロアブル [シンジエンタ]	トリフタリド:3% プレチラクロール:9% ベンスルフロメチル:1.5% ベンゾビシクロン:4%	○	○						○：北海道、東北 一発処理 [年次変動の確認]
32	SYJ-167-1kg 粒 [シンジエンタ]	プレチラクロール:4% メトリオン:0.6%	△	△	○	○	○	□	○	△ [使用時期と薬害について]
33	TH-224 フロアブル [協友アグリ]	イマゾスルフロン:1.8% オキサジクロメホン:1.2% ベンゾビシクロン:4%(W/V)	○	○	◎	○	○	□	○	○ 一発処理 [年次変動の確認]
34	YH-652 ジャンボ [協友アグリ]	ビラクロニル:3.6% ベンゾビシクロン:4% ベンゾフェナップ:14.5%	△	◎	○	□	◎	□	○	□ 一発処理 [ノビエと寒地のホタルイに対する効果 の確認]

第3表 平成17年度 水稻関係除草剤適2試験判定結果一覧

区 分	実・継		継	
A-1 一発処理	AVH-002-1kg 粒	BAG-032 シャンボ'	BCH-051 シャンボ'	BCH-051 フロアブル
	BCH-031-1kg 粒	BCH-032-1kg 粒	BCH-052 フロアブル	BCH-053 フロアブル
	BCH-033-1kg 粒	BCH-044-1kg 粒	HOK-0301 フロアブル	HOK-0401① フロアブル
	BCH-045H-1kg 粒	BCH-045L-1kg 粒	HOK-0401①-1kg 粒	HOK-0501 シャンボ'
	DHN-971① フロアブル	DKH-311-1kg 粒	HOK-0501 フロアブル	HOK-0501-1kg 粒
	DKH-411-1kg 粒	FSS-115 粒	NC-604 シャンボ'	NC-604-1kg 粒
	HOK-0301-1kg 粒	HOK-0401 シャンボ'	NC-609-1kg 粒	NH-051⑨ フロアブル
	HOK-0401 フロアブル	<u>HOK-0401-1kg 粒</u>	NH-051⑨-1kg 粒	SBX-568 シャンボ'
	HOK-221 シャンボ'	HOK-222 シャンボ'	SST-404 フロアブル	SST-404-1kg 粒
	HOK-222 フロアブル	HOK-222-1kg 粒	SW-052 シャンボ'	SYJ-157-1kg 粒
	<u>HOK-223 シャンボ'</u>	HOK-223 フロアブル	SYJ-166 フロアブル	TH-547(Z)-1kg 粒
	HOK-223-1kg 粒	HOK-225-1kg 粒	YH-652 シャンボ'	
	HOK-983 フロアブル	HOK-991 シャンボ'		
	KPP-444-1kg 粒	KPP-444①-1kg 粒		
	<u>KPP-445 フロアブル</u>	<u>KPP-445① フロアブル</u>		
	KUH-013D-1kg 粒	KUH-013K シャンボ'		
	KUH-013K-0.25kg 粒	KUH-013K-1kg 粒		
	KUH-021-1kg 粒	KUH-023D シャンボ'		
	KUH-023D フロアブル	KUH-023K シャンボ'		
	KUH-023K フロアブル	KUH-023K-0.25kg 粒		
	<u>KUH-032 シャンボ'</u>	KUH-032-0.25kg 粒		
	<u>KUH-041-1kg 粒</u>	MY-100MS シャンボ'		
	MY-100NC 顆粒水和	MY-100TSC フロアブル		
	NBA-071-1kg 粒	NBA-101SB シャンボ'		
	NBA-941S-1kg 粒	NC-385SB 顆粒水和		
	NC-385SB-1kg 粒	NC-397-1kg 粒		
	NC-604 フロアブル	<u>NC-606 シャンボ'</u>		
	NC-606-1kg 粒	<u>NC-607 シャンボ'</u>		
	<u>NC-607 顆粒水和</u>	<u>NC-607-1kg 粒</u>		
	NH-102 フロアブル	NH-104-1kg 粒		
	NH-301-1kg 粒	NH-302 フロアブル		
	<u>NH-403 フロアブル</u>	NH-806 シャンボ'		
	NHF-401 粒	PSS①D 粒		
	SB-526 フロアブル	SB-526-1kg 粒		
	SB-554 フロアブル	SB-556 フロアブル		
	SB-559⑨-1kg 粒	SB-559①-1kg 粒		
	SB-563⑨-1kg 粒	SB-563①-1kg 粒		
	<u>SB-564 フロアブル</u>	<u>SB-564-1kg 粒</u>		
	SST-402-1kg 粒	<u>SST-403 フロアブル</u>		
	<u>SST-403-1kg 粒</u>	SW-002① フロアブル		
	SW-005① フロアブル	SW-024⑨ シャンボ'		

区 分	実・継		継	
A-1 一発処理 つづき	SW-024① シャンボ SW-032① フロアブル SW-042② シャンボ SW-043-1kg 粒 SYJ-108 シャンボ SYJ-156-1kg 粒 TH-001-1kg 粒 TH-224 フロアブル THI-913CS シャンボ YH-652 フロアブル YH-655-1kg 粒	SW-032 フロアブル SW-041②-1kg 粒 SW-042① シャンボ SW-907 粒 SYJ-150 フロアブル TH-001 シャンボ TH-122-1kg 粒 TH-421 シャンボ YH-641-1kg 粒 YH-652-1kg 粒		
A-2 体系(初期)	CG-113(改) シャンボ KPP-2005② フロアブル(少量散布) KPP-2008-1kg 粒 KPP-2012 フロアブル SB-529-1kg 粒 SB-566-1kg 粒 YH-650-1kg 粒 YH-651-1kg 粒	KH-183①-1kg 粒 KPP-2011 フロアブル KUH-958 フロアブル SB-566 フロアブル YH-650 フロアブル YH-651 フロアブル ブタクロール 乳	AKD-7138 フロアブル NC-611 フロアブル SYJ-167-1kg 粒	KYH-680-1kg 粒 NP-0503-1kg 粒
A-3 体系(中後期)	AVH-002-1kg 粒 DEH-112 乳(EW) HOK-222 フロアブル HOK-223 フロアブル HOK-983 フロアブル KPP-444-1kg 粒 KPP-445 フロアブル KUH-003D-0.25kg 粒 KUH-021-1kg 粒 KUH-023K フロアブル KUH-983-1kg 粒 MY-100DC① シャンボ MY-100DC①-1kg 粒 NBA-941-1kg 粒 NC-329-1kg 粒 NC-604 フロアブル NC-612-1kg 粒 NH-806 シャンボ SB-554 シャンボ SB-556 フロアブル SB-559①-1kg 粒 SL-0402-1kg 粒 SW-041②-1kg 粒	DASH-001 SC DEH-112-1kg 粒 HOK-222-1kg 粒 HOK-223-1kg 粒 HSW-951 フロアブル KPP-444①-1kg 粒 KPP-445① フロアブル KUH-013D-0.25kg 粒 KUH-023D フロアブル KUH-031 粒 MK-243D-1kg 粒 MY-100DC① フロアブル MY-100NC-1kg 粒 NC-329 粒 NC-385SB-1kg 粒 NC-606-1kg 粒 NH-104-1kg 粒 PSS①D-1kg 粒 SB-554 フロアブル SB-559②-1kg 粒 SL-0401-1kg 粒 SST-402-1kg 粒 SW-907② 粒	AVH-301-1kg 粒 DBH-1295 液(ME)	DBH-1294-1kg 粒 SW-051-1kg 粒

区 分	実 ・ 継		継	
A-3 体系(中後期) つづき	TH-001 シャンボ	TH-001-1kg 粒		
	TH-005 シャンボ	YH-641-1kg 粒		
	YH-652-1kg 粒	YH-653-1kg 粒		
A-4 アシカキ			YH-652 フロアブル	
A-4 アゼガヤ	DEH-112-1kg 粒			
A-4 イボクサ	KUH-911 液	SB-554 フロアブル	NC-612-1kg 粒	
	SW-005㊦ フロアブル			
A-5 エゾノサヤヌカグサ			BCH-044-1kg 粒	HOK-0301-1kg 粒
			YH-652 フロアブル	
A-4 オモダカ	DASH-001 SC	KPP-444-1kg 粒	BAG-032 シャンボ	BCH-031-1kg 粒
	KPP-444㊦-1kg 粒	KUH-011D-1kg 粒	BCH-032-1kg 粒	BCH-033-1kg 粒
	KUH-011K-1kg 粒	KUH-013D-0.25kg 粒	BCH-044-1kg 粒	BCH-045L-1kg 粒
	KUH-013D-1kg 粒	KUH-013K-1kg 粒	KPP-445 フロアブル	KPP-445㊦ フロアブル
	KUH-021-1kg 粒	KUH-031 粒	KUH-023D フロアブル	KUH-023K フロアブル
	NBA-093(改) シャンボ	SW-005㊦ フロアブル	NC-612-1kg 粒	NHF-401 粒
	SW-012㊨-1kg 粒	SW-012㊦-1kg 粒	SB-559㊨-1kg 粒	SB-559㊦-1kg 粒
	SW-024㊨ シャンボ	SW-041㊨-1kg 粒	SB-564 フロアブル	SB-564-1kg 粒
	SYJ-108 シャンボ	YH-641-1kg 粒	TH-001 シャンボ	TH-001-1kg 粒
	YH-652 フロアブル	YH-652-1kg 粒	TH-122-1kg 粒	TH-421 シャンボ
			YH-650 フロアブル	
	A-4 クサネム	KUH-911 液		YH-652 フロアブル
A-4 クログワイ	DASH-001 SC	FSS-115 粒	BAG-032 シャンボ	BCH-031-1kg 粒
	HOK-0301-1kg 粒	HOK-223 フロアブル	BCH-032-1kg 粒	BCH-033-1kg 粒
	KPP-2005 シャンボ		BCH-044-1kg 粒	BCH-045L-1kg 粒
	KPP-2005㊨ フロアブル(少量散布)		G-315B 乳	HOK-991 シャンボ
	KPP-2008-1kg 粒	KPP-2011 フロアブル	KPP-445 フロアブル	KPP-445㊦ フロアブル
	KPP-444-1kg 粒	KPP-444㊦-1kg 粒	KUH-023D フロアブル	KUH-023K フロアブル
	KUH-011D-1kg 粒	KUH-011K-1kg 粒	MY-100TSC フロアブル	NC-606-1kg 粒
	KUH-013D-0.25kg 粒	KUH-013D-1kg 粒	NC-612-1kg 粒	NHF-401 粒
	KUH-013K-1kg 粒	KUH-021-1kg 粒	SB-554 シャンボ	SB-559㊨-1kg 粒
	MY-100NC-1kg 粒	MY-100NDC-1kg 粒	SB-559㊦-1kg 粒	SB-564 フロアブル
	NBA-093(改) シャンボ	NC-391㊦ シャンボ	SB-564-1kg 粒	SST-402-1kg 粒
	NC-604 フロアブル	NH-806 シャンボ	TH-001 シャンボ	TH-001-1kg 粒
	SB-528 フロアブル	SB-528㊦ フロアブル	TH-005 シャンボ	TH-122-1kg 粒
	SB-529-1kg 粒	SB-554 フロアブル	TH-421 シャンボ	YH-651-1kg 粒
	SW-005㊦ フロアブル	SW-012㊨-1kg 粒		
	SW-012㊦-1kg 粒	SW-024㊨ シャンボ		
	SW-041㊨-1kg 粒	SYJ-108 シャンボ		
	TH-001 フロアブル	YH-641-1kg 粒		
	YH-651 フロアブル	YH-652 フロアブル		
	YH-652-1kg 粒	YH-653-1kg 粒		

区 分	実・継		継	
A-4 コウキヤガラ	<u>KUH-011D-1kg 粒</u>	<u>KUH-021-1kg 粒</u>	NC-612-1kg 粒 SB-564フロアブル TH-001フロアブル	SB-528フロアブル SB-564-1kg 粒 TH-001-1kg 粒
A-4 シズイ	<u>KPP-444-1kg 粒</u> <u>KUH-013K-1kg 粒</u> <u>NBA-131a-1kg 粒</u> <u>SB-554フロアブル</u>	<u>KUH-011K-1kg 粒</u> <u>KUH-021-1kg 粒</u> <u>NC-604フロアブル</u>	KPP-445フロアブル NC-612-1kg 粒 SB-564フロアブル SST-402-1kg 粒	KUH-023Kフロアブル SB-559㊸-1kg 粒 SB-564-1kg 粒 TH-001ジャンボ
A-4 ミズアオイ	<u>KUH-021-1kg 粒</u>	<u>TH-001-1kg 粒</u>	BCH-044-1kg 粒 KUH-023Kフロアブル SB-559㊸-1kg 粒 SB-564-1kg 粒 YH-652-1kg 粒	KPP-444-1kg 粒 SB-554フロアブル SB-564フロアブル TH-001ジャンボ
A-4 SU-Rコナギ	<u>BAG-032ジャンボ</u> <u>KPP-2008-1kg 粒</u> <u>KUH-021-1kg 粒</u>	<u>KPP-2008 乳(EW)</u> <u>KUH-011D-1kg 粒</u> <u>YH-652-1kg 粒</u>	KPP-444㊸-1kg 粒 NC-612-1kg 粒	KPP-445㊸フロアブル SYJ-157-1kg 粒
A-4 SU-Rホタルイ	<u>BAG-032ジャンボ</u> <u>KPP-2011フロアブル</u> <u>KPP-444㊸-1kg 粒</u> <u>KUH-023Dフロアブル</u> <u>SST-402-1kg 粒</u> <u>YH-650フロアブル</u> <u>YH-652-1kg 粒</u>	<u>KPP-2008-1kg 粒</u> <u>KPP-444-1kg 粒</u> <u>KUH-011K-1kg 粒</u> <u>SB-559㊸-1kg 粒</u> <u>SYJ-156-1kg 粒</u> <u>YH-652フロアブル</u>	KPP-445フロアブル KUH-021-1kg 粒 NC-385SB 顆粒水和 NC-604フロアブル SB-559㊸-1kg 粒	KPP-445㊸フロアブル KUH-023Kフロアブル NC-385SB-1kg 粒 NC-612-1kg 粒 SYJ-157-1kg 粒
B 直播栽培	<u>HOK-221ジャンボ</u> <u>KPP-2008 乳(EW)</u> <u>KUH-013Dジャンボ</u> KUH-013K-0.25kg 粒 KUH-983-1kg 粒 NBA-071-1kg 粒 NC-331 水和 NOJ-101-1kg 粒 PSS㊸D-1kg 粒 SW-002㊸フロアブル SW-973-1kg 粒	<u>HOK-225-1kg 粒</u> KUH-011K-1kg 粒 <u>KUH-013D-1kg 粒</u> KUH-013K-1kg 粒 <u>MY-100DCフロアブル</u> <u>NBA-071DEH-1kg 粒</u> NC-385SB 顆粒水和 <u>NOJ-104-1kg 粒</u> SB-556フロアブル <u>SW-012㊸-1kg 粒</u> <u>ZK-122 液</u>	DASH-001 SC NH-104-1kg 粒 SB-551-1kg 粒 SYJ-171 液 TH-001フロアブル	NC-622 液 SB-528フロアブル SST-402-1kg 粒 TH-001ジャンボ TH-001-1kg 粒
C 畦畔	MCP-Na 液 NC-622 液	MRS-195 液 ZK-122 液	SYJ-171 液	
D 耕起前	AH-01 液		NC-622 液	SYJ-171 液
E 休耕田	NC-622 液		SYJ-171 液	
その他	DEH-112 乳(EW)			

注): 1) 本年度新規に使用基準を作成されたものは、薬剤名にアンダーラインを記した。

2) 本年度は「実」、「継?」及び「中止」と判定された薬剤はなかった。

※ 薬剤名はアルファベット順に記載した。

平成17年度 水稻関係除草剤使用基準

A 移植栽培

A-1 一発処理

A-1

AVH-002-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土	
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始		○前※	○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性オタノイ:1L エゾノ オキスガ:2L ミズアオイ:始	+3～ノビエ1.5L	1kg	○	○
東北	○1.5	○	○始	○始	○始	○始	○前※	○前※	○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性オタノイ:1L シズイ:草丈3cm			○	○
北陸	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	○始	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性コナギ:子葉期 SU抵抗性オタノイ:1L			○	○
近・中・四																
九州																

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

BAG-032 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオミ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2	○	○始	○始		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2L	20g×10コ	●	○
東北	○2	○	○2	○始	○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			SU抵抗性オタノイ:2L	●
北陸	○2	○	○2		○始	○始			○発生 期		○前			●	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性オタノイ:2L SU抵抗性コナギ:2L		○	○
近・中・四	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	●再生 前～始	●前			●	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

散布時の藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

BCH-031-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		2 ○始			○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	1kg		○
東北	○2.5	○	○2	○始	○始	○始			○発生 期	○再生 前～始					○
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始					●
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始					○
近・中・四 (雑)	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始					○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期						○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1
BCH-032-1kg 粒

BCF-032-18kg 粒															
地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		2 ○始			○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	1kg		○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始					○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	●再生 前～始					○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始					○
近・中・四 <u>(註)</u>	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始					○
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期						●
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。															

A-1
BCH-033-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤 土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	1kg		○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2				○発生 期	○再生 前～始					○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始					○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始					○
近・中・四 (註)	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始					○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期					●	○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。															

A-1
BCH-044-1kg 粒

SCF-044 1kg 粒												処理時期	使用量 /10a	砂 壤 土	壊土 埴土
地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオミ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離				
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	1kg		○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
田植同時散布可能(北海道、東北、北陸、関東・東海、近畿・中国・四国、九州)															
減水深: 2cm/日以下															
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。															

A-1
BCH-045H-1kg 粒

DCP-043F-1kg 粒																
地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤 土	埴 土	
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	1kg		○	
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○	
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																
田植同時散布可能(北海道、東北)																
減水深: 2cm/日以下																
使用上の注意:																

A-1

BCH-045L-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期前～始	○再生 期前～始	○前	+0～ノビエ2.5L		●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期前～始	○再生 期前～始	●前			●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期前～始	○再生 期前～始	○前			●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期前～始	○再生 期前～始	○前			●	○

田植同時散布可能(北陸、関東・東海、近畿・中国・四国、九州)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミス'ガヤツリには効果が劣る。

A-1

DHN-971①フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													500ml		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2				○再生 期前～始	○前	+0～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期前～始	○再生 期前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期前～始	○再生 期前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期前～始	○再生 期前～始	○前			○	○

田植同時散布可能(北陸、関東・東海、近畿・中国・四国、九州)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミス'ガヤツリには効果が劣る。

A-1

DKH-311-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		2 ○始			○発生 期前～始	○再生 期前～始	○前	+0、+3～ノビエ2.5L (砂壌土は+3～)	1kg	●	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期前～始	○再生 期前～始	○前	+0 +3～ノビエ2.5L		●	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

田植同時散布可能(北海道、東北)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-1

DKH-411-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期前～始	●再生 期前～始	●前	+3～ノビエ2.5L			●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期前～始	●再生 期前～始	●前				●
近・中・四 (普)	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期前～始	●再生 期前～始	●前			●	●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期前～始	●再生 期前～始	●前				●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミス'ガヤツリには効果が劣る。

A-1
FSS-115 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヒ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2	○	○2	○2		○2			○発生 始			+5～ノビエ2L	3kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○2			○発生 始			+5～ノビエ2.5L			○
北陸	○2.5	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期						○
関東・東海 (峠)	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期	○前				●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期					○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○前				○	○

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することにより効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 泥炭質土壌では効果が低下することがある。

浅植え、植え付け精度不良等で根が露出すると薬害を生じることがある。

田植え前に生育したミスガヤツリには効果が劣ることがある。

クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1
HOK-0301-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヒ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		2 ○始			○発生 期	○前		+5～ノビエ2.5L	1kg	●	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始	●始※		○発生 期					●	○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始	●始※		○発生 期	●前				●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※		○発生 期	●前				●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○始	●始※		○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※		○発生 期	○前				○	○

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することにより効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植え前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1
HOK-0401 シャンホ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヒ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土
北海道													50g×10コ		
東北	○2	○	○2	○始	○始	○始			○発生 期	○再生 前～始		+1～ノビエ2L		●	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

A-1
HOK-0401 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヒ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土
北海道													500ml		
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L		●	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

田植同時散布可能(東北)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-1

HOK-0401-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+5～ノビエ2.5L			●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 低温等による活着不良の場合には薬害が生じる事がある。

A-1

HOK-221 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土
北海道													50g×10 ²		
東北															
北陸	○2	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始		+1～ノビエ2L		○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始				○	○
近・中・四	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じる事がある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下する事がある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

HOK-222 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2	●	●2	●始		●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+1～ノビエ2L	50g×10 ²		●
東北	○2	○	○2		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じる事がある。

A-1

HOK-222 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

田植同時散布可能 水口処理可能(北海道, 東北)
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

A-1
HOK-222-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダ'カ	ヒルム'シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 〜 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		2 ○始			○発生 期	○再生 前〜始	○前	+5〜ノビエ2.5L	1kg	●	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○始	●始			○発生 期	○再生 前〜始					○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 低温等による活着不良の場合には葉害が生じることがある。(東北)

A-1
HOK-223 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダ'カ	ヒルム'シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 〜 埴土
北海道													50g×10a		
東北															
北陸	●2	●	●始	●始	●始	●始			●発生 期	●再生 前〜始	●前	+1〜ノビエ2L		●	●
関東・東海	●2	●	●2	●2	●2	●2			●発生 期	●再生 前〜始					●
近・中・四 (管)	●2	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前〜始	●前	+1〜ノビエ2L (砂 壤土は+3〜)		●	●
九州	●2	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前〜始	●前	+1〜ノビエ2L			●

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な葉害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1
HOK-223 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダ'カ	ヒルム'シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 〜 埴土
北海道													500ml		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前〜始		+0〜ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※		○発生 期	○再生 前〜始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前〜始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前〜始	○前			○	○

※クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することにより効果が向上する。
田植同時散布可能(関東・東海, 近畿・中国・四国)
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1
HOK-223-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダ'カ	ヒルム'シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 〜 埴土
北海道													1kg		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前〜始	○前	+5〜ノビエ2.5L		●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前〜始	○前			●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前〜始	○前			●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前〜始	○前			○	○

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1
HOK-225-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壤土
北海道													1kg		
東北															
北陸	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期		○前	+5～ノビエ3L		●	○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
九州	●3	●	●2		●2	●2			●発生 期		●前			●	●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。A-1
HOK-983 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガ ^キ ツリ	ウリカワ	クログ ^ワ イ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壤土	
北海道	○2	○	○始	○始		○始					○前 ミスアオイ:1L	+0～ノビエ2L	500ml	○	○	
東北																
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

田植同時散布可能

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-1
HOK-991 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壤土
北海道	○1.5	○	○始	○始								+3～ノビエ1.5L	50g×10コ		○
東北	○1.5	○	○始	○始	○始										○
北陸	○1.5	○	○始		○始										○
関東・東海	○1.5	○	○始		○前	○始								○	○
近・中・四	○1.5	○	○始		○始	○始						+1～ノビエ1.5L(砂 壌土は+3～)		○	○
九州	○1.5	○	○始		○始	○始						+3～ノビエ1.5L		○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。A-1
KPP-444-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壤土	
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	SL抵抗性ホタルイ:2L	+0～ノビエ1.5L	1kg	●	○	
東北	○1.5	○	○始	○始	○始	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズメ草丈3cm SL抵抗性ホタルイ:2L			●	○	
北陸																	
関東・東海																	
近・中・四																	
九州																	

※オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することにより効果が向上する。

田植同時散布可能

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: オモダカ・クログワイ・シズメ草防除は、有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

KPP-444①-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道														1kg		
東北																
北陸	○1.5	○	○始		○始	○始	●始						+0～ノビエ1.5L		●	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始		SL抵抗性マダライ1L			●	○
近・中・四	○1.5	○	○始		○始	○始	●始			○再生 前～始	○前				●	○
九州	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○

※オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することにより効果が向上する。
 田植同時散布可能(北陸、関東・東海、近畿・中国・四国、九州)
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

KPP-445フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	●1.5	●	●始	●始		●始			●発生 期	●再生 前～始	●前		+0～ノビエ1.5L	500ml		●
東北	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前					●
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

田植同時散布可能(北海道、東北)
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意:

A-1

KPP-445①フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道														500ml		
東北																
北陸	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前		+0～ノビエ1.5L		●	●
関東・東海	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始					●	
近・中・四	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始					●	
九州	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●	

田植同時散布可能(北陸、関東・東海、近畿・中国・四国、九州)
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

KUH-013D-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道														1kg		
東北																
北陸	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前		+0～ノビエ3L (砂壌土は+3～)		○	○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前		+0～ノビエ3L		○	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
九州	○3	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○

※オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することにより効果が向上する。
 田植同時散布可能(関東・東海、九州)
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1
KUH-013K ジェンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○始		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L	25g×100	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

A-1
KUH-013K-0.25kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○始		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	ミズアオイ:1L	+3～ノビエ2.5L	250g	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ:草丈3cm	+0～ノビエ2.5L (砂壌土は+3cm)		○	○
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
湛水周縁部散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 湛水周縁部散布では藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足を生じることがある。
オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1
KUH-013K-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土
北海道	○3	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0 +3～ノビエ3L (砂壌土は+3～)	1kg	○	○
東北	○3	○	○2	○2	○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ:草丈3cm +0～ノビエ3L (砂壌土は+3～)		○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

※オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することにより効果が向上する。
田植同時散布可能(東北)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: オモダカ・クログワイ・シズイ防除は、有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1
KUH-021-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土	
北海道	○3	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	ミズアオイ:2L	+3～ノビエ3L(砂 壌土は+7～)	1kg	○	○
東北	○3	○	○3	○始	○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コウキカラ:始 シズイ:草丈3cm			○	○
北陸	○3	○	○3		3 ○2	○2	●始	●始	○発生 期	○再生 前～始					○	○
関東・東海	○3	○	○3		○3	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性コナキ:2L			○	○
近・中・四	○3	○	○3		3 ○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
九州	○3	○	○3		○3	○3	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コウキカラ:始			○	○

※オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することにより効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ・コウキカラ・シズイ防除は、有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

KUH-023D ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													25g×10 ³		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期～始	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L		●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	●前			●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果がある。															

A-1

KUH-023D フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													500ml		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始		+3～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	SL抵抗性ホタルイ2L			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果がある。															

A-1

KUH-023K ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		2 ○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	25g×10 ³	●	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。															

A-1

KUH-023K フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:															

A-1
MY-100MS ジャンボ

水質・土壌・気象・環境・生物・化学・物理・地質・天候・気象・環境・生物・化学															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A-1
MY-100NC 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 増土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		○始	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	80g(散布 液量 500ml)	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L (砂壌土は+5～)		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2				○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L (砂壌土は+5～)		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		○	○
九州	○2.5	○	○2	○前	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
田植同時散布可能(北海道、東北) 顆粒のまま水口処理が可能(東北、北陸、関東・東海)															
減水深: 2cm/日以下															
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。 オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。															

A-1
MY-100TSC フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオミ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 増土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○前	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
田植同時散布可能 水口処理可能(東北、関東・東海、九州)															
減水深：2cm/日以下															
使用上の注意： 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。															

A-1
NBA-071-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘオモ ダカ	ミスガ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 増土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	エゾノサヤカグサ:2L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L (砂壌土は+5～)		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
田植同時散布可能(東北、北陸、関東・東海、近畿・中国・四国、九州)															
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。															
減水深: 2cm/日以下															
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。 クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。															

A-1
NBA-101SB ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+1～ノビエ2.5L	30g×10 ³	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四 (注)	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1
NBA-941S-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○3	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ3L	1kg	○	○
東北	○3	○	○2	○始	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○3	○	○2		○2	○2								●	○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
九州	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1
NC-385SB 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○始		○2		○始	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	80g(散布 液量 500ml)	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

顆粒のまま水口処理が可能(東北,北陸,関東・東海) 田植同時散布可能(東北,関東・東海)
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1
NC-385SB-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	1kg	●	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L (砂壌土は+5～)		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始		+0～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		○	○

田植同時散布可能(北海道,東北,北陸,関東・東海,近畿・中国・四国)
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-397-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ1.5L	1kg		○
東北	○1.5	○	○始	●始	○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0 +3～ノビエ1.5L		●	○
北陸	○1.5	○	○始		○始	○前				○再生 前～始		+3～ノビエ1.5L			○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0 +3～ノビエ1.5L			○
近・中・四															
九州															
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:															

A-1

NC-604 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	●始※		○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ: 草丈3cm		●	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
※クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することにより効果が向上する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。 クログワイ・シズイ防除は、有効な剤との組み合わせで使用。															

A-1

NC-606 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													30g×100		
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●始	+5～ノビエ2.5L			●
北陸															
関東・東海 (昔)	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●始	+5～ノビエ2.5L			●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●始				●
九州															
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。															

A-1

NC-606-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		2 ○始			○発生 期	○再生 前～始	○始	+5～ノビエ2.5L	1kg	●	○
東北	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○始				○
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●始				●
関東・東海 (昔)	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○始			●	○
近・中・四 (昔)	○2.5	○	○2		○2	2 ○始				○再生 前～始	○始			●	○
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●始				●
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。															

A-1

NC-607 シェンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													30g×10a		
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+3～ノビエ2.5L			●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。

A-1

NC-607 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+3～ノビエ2.5L	60g(散布 液量 500ml)		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+0～ノビエ2.5L			●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意:

A-1

NC-607-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+0～ノビエ2.5L			●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意:

A-1

NH-102 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													500ml		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	○始	○始	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0 +5～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L (砂壤土は+5～)		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始	○始	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		○	○

※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 田植同時散布可能(北陸・関東・東海・近畿・中国・四国)
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

NH-104-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 殖土
北海道													1kg		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	○始		○発生 期	○再生 前～始		+0 +5～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前	イボクサ:再生始 (+0～ノビエ2.5L (砂壌土は+5～))		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始		○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L		○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前	+0 +5～ノビエ2.5L (砂壌土は+5～)		○	○

※:クログワイ防除は、有効剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 田植同時散布可能(北陸、関東・東海、近畿・中国・四国、九州)
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 クログワイ防除は有効剤との組み合わせで使用する。

A-1

NH-301-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 殖土
北海道	○2.5	○	○2	○2								+0～ノビエ2.5L	1kg	●	○
東北	○2.5	○	○2		●前									●	○
北陸	○2.5	○	○2		○前										○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2										○
近・中・四 (昔)	○2.5	○	○2		○2										○
九州	○2.5	○	○2		○2										○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

NH-302 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 殖土
北海道	○2.5	○	○2	○2								+0～ノビエ2.5L	500ml	●	○
東北	○2.5	○	○2		○始									●	○
北陸	○2.5	○	○2		○前										○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2										○
近・中・四 (昔)	○2.5	○	○2		○2										○
九州	○2.5	○	○2		○2										○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

NH-403 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 殖土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+5～ノビエ2.5L	500ml		●
東北	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意:

A-1

NH-806 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													50g×10 ³		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	イボクサ:再生始		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5*	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L(*:早 期は～ノビエ2L)		○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な葉害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

NHF-401 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	3kg		○
東北	○2.5	○	○2	○始	○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-1

PSS①D 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													3kg		
東北	○2	○	○2	○始	○2	○2			○発生 期		○始	+0～ノビエ2L		○	○
北陸	○2	○	○2		○始	○2					○始			○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期		○始	+0～ノビエ2L (普通期 および砂壤土は+3～)		○	○
近・中・四	○2	○	○2	○2	○始	○2			○発生 期		○始	+0～ノビエ2L (砂 壤土は+3～)		○	○
九州	○2	○	○2		○始	○2			○発生 期			+0～ノビエ2L		○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

SB-526 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2	○	○始	○2					○発生 期			+3～ノビエ2L	500ml	○	○
東北	○2	○	○2	○始	○2				○発生 期					○	○
北陸	○2	○	○2		○2				○発生 期					○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2				○発生 期					○	○
近・中・四	○2	○	○2		○始				○発生 期					○	○
九州	○2	○	○2		○始				○発生 期					○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

SB-526-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2	○	○2	○2					○発生 期				+3～ノビエ2L	1kg	○	○
東北	○2	○	○2	○始	○2				○発生 期						○	○
北陸	○2	○	○2		○始				○発生 期						○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2				○発生 期						○	○
近・中・四	○2	○	○2		○2				○発生 期						○	○
九州	○2	○	○2		○始				○発生 期						○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

SB-554 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1.5	○	○始	○始					○発生 期		SU抵抗性ホタル イ:1.5L		+0～ノビエ1.5L	500ml	○	○
東北	○1.5	○	○始		○始		●前※		○発生 期		シズイ:草丈3cm				●	○
北陸	○1.5	○	○始		○始		●前		○発生 期						○	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始		●前※		○発生 期		イボクサ:再生始 SU抵抗性コナギ:1L				○	○
近・中・四	○1.5	○	○始		○始	○前			○発生 期						○	○
九州	○1.5	○	○始	○前	○始	○前			○発生 期						○	○

※クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することにより効果が向上する。
田植同時散布可能(北海道、東北、北陸、関東・東海、近畿・中国・四国、九州)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
クログワイ・シズイ防除は、有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

SB-556 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期		エゾノササガサ:2L ミズアオイ:1L		+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期		シズイ:草丈3cm				○	○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生 期						○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2					SU抵抗性ホタルイ:2L イボクサ:再生始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期						○	○
九州	○2.5	○	○2	○前	○2	○2			○発生 期		イボクサ:再生始				○	○

水口処理可能(北海道～北陸、九州)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

SB-559 粒 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前		+5～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-1

SB-559①-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始		+3～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	SL抵抗性ホタルイ2L		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

SB-563②-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		2 ○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L	1kg	●	○
東北	○2.5	○	○2	○始	2 ○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-1

SB-563①-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始			●発生 期	○再生 前～始	●前	+3～ノビエ2.5L		●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L (砂壤土は+5～)		○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L		●	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

SB-564フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2	●	●始	●2		●始			●発生 期			+3～ノビエ2L	500ml		●
東北	●2	●	●2	●前	●始	●始			●発生 期						●
北陸	●2	●	●始		●始	●始			●発生 期						●
関東・東海	●2	●	●2		●2	●始			●発生 期						●
近・中・四	●2	●	●2		●始	●始			●発生 期					●	●
九州	●2	●	●2		●2	●2			●発生 期						●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

SB-564-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2	●	●始	●2		●始			●発生 期			+3～ノビエ2L	1kg		●
東北	●2	●	●始	●前	●始	●始			●発生 期						●
北陸	●2	●	●始		●始	●始			●発生 期						●
関東・東海	●2	●	●2		●2	●2			●発生 期						●
近・中・四 (普)	●2	●	●2		●始	●始			●発生 期					●	●
九州	●2	●	●2		●2	●2			●発生 期						●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

SST-402-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	1kg	●	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L (砂壌土は+5～)		●	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性ホタルイ2L	+0～ノビエ2.5L	●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○

田植同時散布可能(北海道、東北、北陸、関東・東海、近畿・中国・四国、九州)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

SST-403フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●1.5	●	●始	●始		●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+0～ノビエ1.5L	500ml		●
東北	●1.5	●	●始	●前	●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
北陸	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
関東・東海	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
近・中・四	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
九州	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●

田植同時散布可能(北海道、東北、北陸、関東・東海、近畿・中国・四国、九州)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

SST-403-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●1.5	●	●始	●始		●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+0～ノビエ1.5L	1kg		●
東北	●1.5	●	●始	●始	●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
北陸	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
関東・東海	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
近・中・四	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
九州	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●

田植同時散布可能(北海道、東北、北陸、関東・東海、近畿・中国・四国、九州)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

SW-002①フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道													500ml		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○前				+3～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性ホタルイ:2L		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

水口処理可能

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミス'ガ'ヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

SW-005①フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道													500ml		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	●始	●始	○発生 期			+3～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	イボサ:再生始		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

水口処理可能(北陸、関東・東海、近畿・中国・四国、九州)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミス'ガ'ヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

SW-024④ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ' ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土	
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性ホタルイ:2L	+3～ノビエ2.5L	40g×10コ	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性ホタルイ:2L			○	○
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

A-1

SW-024④ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道													40g×10コ		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性ホタルイ:1L		●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミス'ガ'ヤツリには効果が劣る。

A-1

SW-032 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0 +3～ノビエ2.5L (砂壌土は+3～)	500ml	●	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○始	●始			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															
田植同時散布可能(北海道・東北)															
減水深: 2cm/日以下															
使用上の注意:															

A-1

SW-032①フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道													500ml		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期			+0 +3～ノビエ2.5L (砂壌土は+3～)		●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L		●	○
近・中・四 (兼)	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	●前				○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
田植同時散布可能(北陸)															
減水深: 2cm/日以下															
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。															

A-1

SW-041①-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		●始	○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性ホタル イ:1.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性ホタル イ:1.5L		○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															
※オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することにより効果が向上する。															
田植同時散布可能(北海道・東北)															
減水深: 2cm/日以下															
使用上の注意: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで使用する。															

A-1

SW-042①ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+3～ノビエ2.5L	35g×10 コ		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															
減水深: 2cm/日以下															
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。															

A-1
SW-042① ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土 ～ 壤土	壤土 ～ 壤土
北海道													35g×10 コ		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L		●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○
近・中・四 (皆)	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1
SW-043-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土 ～ 壤土	壤土 ～ 壤土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期		●前	+0～ノビエ2.5L	1kg		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期		●前				●
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期						●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期		●前				●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期		●前			●	●
九州 (皆)	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期		●前				●

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1
SW-907 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土 ～ 壤土	壤土 ～ 壤土
北海道													3kg		
東北	○2	○	○2	○2	○2	○2					○前	シズイ:始	+3～ノビエ2L		○
北陸	○2	○	○2		○2	○2									○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○2					○前				○
近・中・四	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期		○前			○	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 浅植え、植え付け精度不良等で根が露出すると薬害を生じる事がある。
 シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1
SYJ-108 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土 ～ 壤土	壤土 ～ 壤土
北海道	○3	○	○2	○2		○2		●始	○発生 期	○再生 前～始	○始	+5～ノビエ3L	30g×10コ	○	○
東北	○3	○	○2	○2	○2	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○始	シズイ:草丈3cm		●	○
北陸	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	●始			○	○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○始			○	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2	●始		○発生 期	○再生 前～始	○始			○	○
九州	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○始			○	○

※オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することにより効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1
SYJ-150 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壤土
北海道	○3	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0 +5～ノビエ3L (砂壌土は+5～)	500ml	●	○
東北	○3	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0 +5～ノビエ3L			○
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期		●前	+0～ノビエ2.5L (砂壌土は+3～)	350ml	●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始				●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+0～ノビエ2.5L			●

田植同時散布可能(北海道、東北、北陸、関東・東海、近畿・中国・四国、九州)
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1
SYJ-156-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壤土
北海道	●3	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+5～ノビエ3L	1kg		●
東北	●3	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	SU抵抗性ホタルイ2L			●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意:

A-1
TH-001 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壤土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	40g×10コ		○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始				●	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	●前			●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○
近・中・四 (雑)	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な葉害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1
TH-001-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壤土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	ミズオイ1L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ: 草丈3cm		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始					○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○
近・中・四 (雑)	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

TH-122-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 植土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	1kg	●	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生 期		●前				○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
近・中・四 (雑)	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

減水深：2cm/日以下

使用上の注意： 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

TH-224 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 植土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+5～ノビエ2.5L	500ml		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●

減水深：2cm/日以下

使用上の注意： 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

TH-421 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 植土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	40g×10コ	●	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期		●前				○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
近・中・四 (雑)	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	2.5 ○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	2.5	○	○

減水深：2cm/日以下

使用上の注意： 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下する場合がある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

THI-913CS シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 植土
北海道													50g×10コ		
東北															
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0.43～ノビエ2L (砂壌土は+3～)		○	○

減水深：2cm/日以下

使用上の注意： 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

YH-641-1kg 粒

FH-641-1kg 粒																	
地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 埴土	
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		○始	○発生 期	○再生 前～始	○前	ミスアオイ:1L	+5～ノビエ2.5L	1kg	○	○	
東北	○2.5	○	○2		○2	○始	○前※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前					○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始	○始	○始	○発生 期	○再生 前～始						○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性コナギ:1L				○	○
近・中・四 (準)	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前					○	○
九州																	

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

YH-652フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期		SU抵抗性ホタルイ:2L	+5～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始	●始※		○発生 期		SU抵抗性ホタルイ:2L			●	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	●始	○発生 期					○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	●始※	○発生 期		SU抵抗性ホタルイ:2L			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○前※	●始	○発生 期					○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期		○前			○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

YH-652-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期			+5～ノビエ2.5L	1kg	●	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○始	○始			○発生 期		SU抵抗性ホタルイ:2L			●	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	●始	●始	○発生 期					●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期		SU抵抗性コナギ:2L SU抵抗性ホタルイ:2L			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始	●始	○発生 期					○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期					○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することにより効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

YH-655-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 埴土
北海道													1kg		
東北	○2	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前		+0～ノビエ2L	○	○
北陸	○2	○	○2		○2	○始			○発生 期	●再生 前～始	●前			○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

田植同時散布可能(東北・関東・東海、近畿・中国・四国、九州)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-2 体系処理(初期)

A-2

CG-113(改)ジャンボ

CG-1156/アノマヤ													処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 植土
地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離					
北海道	○1	○	○始	○始							SU抵抗性ホタルイ前 ミスアオイ始	-0～+5(ノビエ1L)	30g×10コ	○	○	
東北	○1	○	○始	○始	○始							植代後～+4,+0～ +5(ノビエ1L)		○	○	
北陸	○1	○	○始		○始									○	○	
関東・東海	○1	○	○始		○始									○	○	
近・中・四	○1	○	○始		○始									○	○	
九州	○1	○	○始		○始							植代後～+4,+0～+5(ノ ビエ1L)(※砂壌土は+4 ～+5)		○	○	

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

A-2

KH-183㊦-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 植土
北海道	○1.5	○	○始	○始						○始		+3～ノビエ1.5L	1kg	○	○
東北	○1.5	○	○始	○始	○前					○始		植代後～+4,+3～ ノビエ1.5L		○	○
北陸	○1.5	○	○始		○始					○始				○	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始					○始				●	○
近・中・四	○1.5	○	○始		○始					○始				○	○
九州	○1.5	○	○始		○始					○始				○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-2

KPP-2005㊦ フロアブル(少量散布)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 植土
北海道	○1	○	○始									-0～+5(ノビエ1L)	300ml	○	○
東北	○1	○	○始		○前		○前※					植代後～+4,+0～ +5(ノビエ1L)		○	○
北陸	○1	○	○始		○始									○	○
関東・東海	○1	○	○始		○始		○前※							○	○
近・中・四	○1	○	○始		○始		○前※							○	○
九州	○1	○	○始		○始		○前※				コウキヤカラ始			○	○

※: クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

一発処理型除草剤の前処理として少量散布(300ml/10a)が可能。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-2

KPP-2008-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 植土
北海道	○1	○	○始	○始								+0～+5(ノビエ1L)	1kg	○	○
東北	○1	○	○始	○前	○始		●前※					植代後～+4,+0～ +5(ノビエ1L)		●	○
北陸	○1	○	○始		○始		●前							○	○
関東・東海	○1	○	○始		○始		●前※				SU抵抗性コナギ始 SU抵抗性ホタルイ始			○	○
近・中・四	○1	○	○始		○始		●前					植代後～+4,+0～+5(ノ ビエ1L)(砂壌土は+0 ～+5)		○	○
九州	○1	○	○始		○始							植代後～+4,+0～ +5(ノビエ1L)		○	○

※: クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することにより効果が向上する。

由植同時散布可能(北海道、東北、北陸、関東・東海、近畿・中国・四国、九州)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 深水条件では薬害を生じることがある。

クログワイ・SU抵抗性コナギ・SU抵抗性ホタルイ防除は、有効な剤との組み合わせで使用する。

A-2

KPP-2011 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壌土 ～ 埋土
北海道	○1	○	○始	○始								SU抵抗性ホタルイ:始	+0～+5(ノビエ1L)	500ml	○	○
東北	○1	○	○始		○前		●前※						植代後～-4,+0～ +5(ノビエ1L)		○	○
北陸	○1	○	○始		○前		●前								○	○
関東・東海	○1	○	始 ○前		○前		●前※					SU抵抗性コナギ:始			○	○
近・中・四	○1	○	○始		○前										○	○
九州	○1	○	○始		○始										○	○

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することにより効果が向上する。

一発処理型除草剤の前処理として使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 深水条件では薬害を生じることがある。

クログワイ・SU抵抗性ホタルイ・SU抵抗性コナギ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-2

KPP-2012 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壌土 ～ 埋土
北海道	●1	●	●始	●始		●始							+0～+5(ノビエ1L)	500ml		●
東北	●1	●	●始	●前	●始	●始							植代後～-4,+0～ +5(ノビエ1L)			●
北陸	●1	●	●始		●始	●前										●
関東・東海	●1	●	●始		●始	●始										●
近・中・四	●1	●	●始		●始	●始									●	●
九州	●1	●	●始		●始	●始										●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 深水条件では薬害を生じることがある。

A-2

KUH-958 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壌土 ～ 埋土
北海道	○1	○	○始										植代後～-4,+0～ +5(ノビエ1L)	500ml	○	○
東北	○1	○	○始	○始	○前		○前※						植代後～-4,+0～ +7(ノビエ1L)		○	○
北陸	○1	○	○始		○始		○前※						植代後～-4,+0～+8(ノ ビエ1L)(※:砂壌土は移 植前処理を除く)		○*	○
関東・東海	○1	○	○始		○始		○前※						+0～+5(ノビエ1L)		○	○
近・中・四	○1	○	○始		○始		○前※						植代後～-4,+0～+3(ノ ビエ1L)(※:早期は移植前 処理を除く)		○	○
九州	○1	○	○始		○始		○前※								○	○

水口処理可能 田植同時散布可能(関東・東海)

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 深水条件では薬害を生じることがある。

クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-2

SB-529-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壌土 ～ 埋土
北海道	○1	○	○始	○始									+0～+5(ノビエ1L)	1kg	○	○
東北	○1	○	○始	○始	○前								植代後～-4,+0～ +5(ノビエ1L)		○	○
北陸	○1	○	○始	○始											○	○
関東・東海	○1	○	○始		○前		●前※						+0～+5(ノビエ1L)		●	○
近・中・四	○1	○	○始		○前								植代後～-4,+0～ +5(ノビエ1L)		○	○
九州	○1	○	○始										+0～+5(ノビエ1L)		○	○

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することにより効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 深水条件では薬害を生じることがある。

クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで使用する。

A-2
SB-566 フロアブル

SB-b6b ノビエ												処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 植土
地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離				
北海道	○1.5	○	○始	○始					○発生 期			+0～ノビエ1.5L	500ml	●	○
東北	○1.5	○	○始	○前	○始				○発生 期					●	○
北陸	○1.5	○	○始		○始				○発生 期					●	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始				○発生 期					●	○
近・中・四（普）	○1.5	○	○始		○始										○
九州	○1.5	○	○始		○始				●発生 期					●	○
減水深：2cm/日以下 使用上の注意：															

A-2
SB-566-1kg 粒

SB-566-1kg粒															
地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 植土
北海道	○1.5	○	○始	○始					○発生 期			+0～ノビエ1.5L	1kg	●	○
東北	○1.5	○	○始		○始				○発生 期					●	○
北陸	○1.5	○	○始		○始	●前			○発生 期					●	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始				○発生 期					●	○
近・中・四（普）	○1.5	○	○始		○始									●	○
九州	○1.5	○	○始		○始				●発生 期					●	○
減水深：2cm/日以下 使用上の注意：															

A-2
YH-650 フロアブル

IH-650 フォアフル																
地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 植土
北海道	○1.5	○	○始	○始					●発生 期				+0～ノビエ1.5L	500ml	●	○
東北	○1.5	○	○始	○始									植代後～4,+0～ ノビエ1.5L		●	○
北陸	○1.5	○	○始			●始			●発生 期						●	○
関東・東海	○1.5	○	○始			●始			●発生 期		SU抵抗性ホタルイ始				●	○
近・中・四 (普)	○1.5	○	○始			●始			●発生 期						○	○
九州	○1.5	○	○始												●	○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: SU抵抗性ホタルイ防除は、有効薬剤との組み合わせで使用する。																

A-2
YH-650-1kg 粒

YH-650-1kg 粒																
地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 植
北海道	○1.5	○	○始	○始					●発生 期				+0～ノビエ1.5L	1kg	●	○
東北	○1.5	○	○始	○始									植代後～4,+0～ ノビエ1.5L		●	○
北陸	○1.5	○	○始			●始			●発生 期						●	○
関東・東海	○1.5	○	○始			●始			●発生 期						●	○
近・中・四 (普)	○1.5	○	○始			●始			●発生 期						○	○
九州	○1.5	○	○始												●	○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:																

A-2

YH-651 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズカヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 殖土
北海道	●1.5	●	●始	●始					●発生 期			+0～ノビエ1.5L	500ml		●
東北	○1.5	○	○始	○始	○始							植代後～4, +0～ ノビエ1.5L		●	○
北陸	○1.5	○	○始		○始	●始	○前※		●発生 期					●	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	●始	○前※		●発生 期		○始			○	○
近・中・四 (普)	○1.5	○	○始		○始	●前	○前		●発生 期					○	○
九州	○1.5	○	○始		○始									●	○

※:クログワイ防除は、有効剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: クログワイ防除は有効剤との組み合わせで使用。

A-2

YH-651-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズカヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 殖土
北海道	●1.5	●	●始	●始								+0～ノビエ1.5L	1kg		●
東北	●1.5	●	●始		●始							植代後～4, +0～ ノビエ1.5L			●
北陸	●1.5	●	●始		●前										●
関東・東海	●1.5	●	●始		●始										●
近・中・四	●1.5	●	●始		●始									●	●
九州	●1.5	●	●始		●始										●

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意:

A-2

ブタクロール 乳

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズカヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 殖土
北海道	○前	○	○前	○前								植代時(-4まで)	400～ 500ml		○
東北	○前 1	○	○始	●始	●前							植代時(-4まで), ±1 ～+5(ノビエ1L)	300～ 500ml		○
北陸	○前	○	○前		○前							植代時(-4まで)	350～ 500ml		○
関東・東海	○前	○	○前		○前								300～ 500ml		○
近・中・四 (普)	○前	○											350～ 500ml		○
九州 (普)	○前	○													○

植代時は土壌混和処理
 混和時の水深3～5cm
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意:

A-3 体系処理 (中後期)

A-3

AVH-002-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 殖土
北海道	●1.5	●	●始	●始		●始		●前※	●発生 期	●再生 前～始	●前	SU抵抗性ホタルイ:1L エゾノ ヤスダカサ:2L ミズアオイ:始	+12～+20(ノビエ 1.5Lまで)	1kg	●	●
東北	●1.5	●	●始	●始	●始	●始	●前※	●前※	●発生 期	●再生 前～始	●前	SU抵抗性ホタルイ:1L シズイ:草丈3cm			●	●
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

※オモダカ・クログワイ防除は、有効剤との組み合わせで連年施用することにより効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組合せで使用する。
オモダカ・クログワイ・シズイは有効剤との組み合わせで使用する。

A-3
DASH-001 SC

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 へ 埋土
北海道	○5	○	○花茎 抽出始	○5		○4			○生育 期	○生育 期		+25～+40(イネ6L以 降,ノビエ5Lまで)	100ml(散 布液量 100L)	●	○
東北	○5	○	○花茎 抽出始	○4	○4	○4	●草丈 20cm※	●草丈 30cm※	○生育 期	○生育 期				●	○
北陸	○5	○	○花茎 抽出始		○4	○5	●草丈 30cm	●草丈 30cm	○生育 期	○生育 期				○	○
関東・東海	○5	○	○花茎 抽出始		○5	○5	●草丈 30cm※	●草丈 30cm※	○生育 期	○生育 期				○	○
近・中・四	○5	○	○花茎 抽出始		○5	○5	●草丈 30cm※	●草丈 30cm	○生育 期	○生育 期				○	○
九州	○5	○	○花茎 抽出始		○6	○6			○生育 期	○生育 期				○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することにより効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組合せで使用する。

落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。

オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで使用。

A-3
DEH-112 乳(EW)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 へ 埋土
北海道	○5											+25～ノビエ5L	100ml (注)	○	○
東北	○5													○	○
北陸	○5													○	○
関東・東海	○5										キシウスズメノヒエ*			○	○
近・中・四	○5										キシウスズメノヒエ*			○	○
九州	○5										キシウスズメノヒエ*			○	○

注) 散布液量25～100L/10a。ただし、25～50L散布は少量散布用ノズルを使用。展着剤加用。

*: 再生茎3～6葉期(関東・東海～九州)、畦畔からの匍匐茎1m以内(関東・東海～九州)

畦畔からの侵入個体には全体にかける(関東・東海～九州)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3
DEH-112-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 へ 埋土
北海道	5 ○青											+15～ノビエ4L	1～1.5kg (北海道)	○	○
東北	○5											+15～ノビエ5L	東北・北 陸・関東・ 東海・近 畿・中国・ 四国・六 州・ノビエ 8L4Lを超 える場合 は1.5kg)	○	○
北陸	5 ○青											+15～ノビエ4L	5	○	○
関東・東海	5 ○青										キシウスズメノヒエ;再生茎 2～4葉	+15～ノビエ4L	5	○	○
近・中・四	5 ○青										キシウスズメノヒエ;再生茎 2～4葉		5	○	○
九州	5 ○青										キシウスズメノヒエ;再生茎 2～4葉 7モカヤ5葉		5	○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な葉害や効果不足が生じることがある。

キシウスズメノヒエ防除は展開葉が水面に接する条件で使用する。(関東・東海～九州)

A-3
HOK-222 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 へ 埋土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+15～+25 (ノビエ2.5Lまで)	500ml	●	●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

HOK-222-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													500ml		
東北	●2.5	●	●2	●始	●始	●始			●発生 期	●再生 前～始		+15～+25 (ノビエ2.5Lまで)			●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

HOK-223 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													500ml		
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始		+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2	●始※		●発生 期	●再生 前～始				●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することにより効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3

HOK-223-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3

HOK-983 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2	●	●始	●始		●始					●前	+15～+25(ノビエ 2Lまで)	500ml	●	●
東北															
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3
HSW-951 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2	●	●2			●2					●前	エゾノササユヅガサ:2L ミズアオイ:1L	+15～+25(ノビエ 2Lまで)	1000ml	●
東北															
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3
KPP-444-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●1.5	●	●始	●始		●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	SU抵抗性ホタルイ:2L	+10～+20(ノビエ 1.5Lまで)	1kg	● ●
東北	○1.5	○	○始	○始	○始	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ:草丈3cm SU抵抗性ホタルイ:2L			● ○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することにより効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
オモダカ・クログワイ・シズイ防除は、有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3
KPP-444D-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北															
北陸	○1.5	○	○始		○始	○始	●始					+10～+20(ノビエ 1.5Lまで)		●	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	○始	●始※	●始※	○発生 期	●再生 前～始		SU抵抗性ホタルイ:1L		●	○
近・中・四	●1.5	●	●始		●始	●始	●始			●再生 前～始	●前			●	●
九州	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することにより効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3
KPP-445 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													500ml		
東北	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+10～+20 (ノビエ1.5Lまで)			●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3
KPP-445Q フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道													500ml		
東北															
北陸	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+10～+20(ノビエ 1.5Lまで)		●	●
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。A-3
KUH-003D-0.25kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道													250g		
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2	●始※		●発生 期	●再生 前～始		+15～25(ノビエ 2.5Lまで)		●	●
関東・東海															
近・中・四															
九州															

※: クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
湛水周縁部散布では藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な葉害や効果不足を生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。A-3
KUH-013D-0.25kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道													250g		
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		●	●
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
湛水周縁部散布では藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な葉害や効果不足を生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。A-3
KUH-021-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	●3	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	ミズアオイ: 2L	1kg	●	●
東北	●3	●	●3	●始	●2	●2	●始※	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前	コウキヤガラ: 始 シズイ: 草丈3cm		●	●
北陸	●3	●	●3		●3	●2	●始	●始	●発生 期	●再生 前～始				●	●
関東・東海	●3	●	●3		●3	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	SU抵抗性コナキ: 2L		●	●
近・中・四	●3	●	●3		●3	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
九州	●3	●	●3		●3	●3	●始※	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前	コウキヤガラ: 始		●	●

※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することにより効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ・シズイ防除は、有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3
KUH-023D フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道														500ml		
東北																
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始			+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始		SU抵抗性ホタルイ:2L			●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●	●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●	●

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3
KUH-023K フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道														500ml		
東北	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前		+15～+25 (ノビエ2.5Lまで)		●	●
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3
KUH-031 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●4	●	●4	●3		●4							+15～+35 (ノビエ4Lまで)	3kg		●
東北	●4	●	●4	●4	●3	●3		●草丈 30cm※								●
北陸	●4	●	●4		●3	●4										●
関東・東海	●4	●	●4		●4	●4										●
近・中・四 (管)	●4	●	●4		●4	●3									●	●
九州	●3	●	●4		●4	●4							+15～+35 (ノビエ3Lまで)		●	●

※: オモダカ防除は、有効な前処理剤との組み合わせで連年施用することにより効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: ごく浅水で散布し、2日間は入水しない。
 散布後に降雨等で湛水されると効果が低下することがある。
 前処理剤との組み合わせで使用する。
 オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3
KUH-983-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○4												+15～+35(ノビエ 4L)	1kg	○	○
東北	○4														○	○
北陸	○4														○	○
関東・東海	○4														○	○
近・中・四	○4														○	○
九州	○4														○	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

MK-243D-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始	●前※	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前	+15～+25 (ノビエ2.5Lまで)			●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3

MY-100DC① ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土
北海道													50g×10㊦		
東北															
北陸															
関東・東海															
近・中・四	●2	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+10～+25(ノビエ 2Lまで)			●
九州															

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3

MY-100DC① フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土
北海道													500ml		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性ホタルイ:1L		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	●2.5	●	●2	●前	●2	●2	●始※	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前	コウキヤカラ:始		●	●

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3

MY-100DC①-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※			○再生 前～始		+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	●2.5	●	●2	●前	●2	●2	●始※	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3

MY-100NC-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道														1kg		
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前		+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		○	○
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●	●
関東・東海																
近・中・四																
九州																

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3

NBA-941-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道														1kg		
東北																
北陸	●3	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前		+20～+30(ノビエ 3Lまで)		●	●
関東・東海																
近・中・四																
九州																

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3

NC-329 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道														3kg		
東北																
北陸																
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2	●始※	●始	●発生 期	●再生 前～始	●前		+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		●	●
近・中・四																
九州																

※: クログワイ防除は、有効剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
オモダカ・クログワイ防除は有効剤との組み合わせで使用する。

A-3

NC-329-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道														1kg		
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ: 草丈3cm コウキヤ ガラ: 始 2.5Lまで	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		○	○
北陸	○2.5	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2				○再生 前～始	○前				○	○
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●	●
九州																

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組合せで使用する。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
コウキヤガラ・シズイ防除は、有効剤との組み合わせで使用する。

A-3
NC-385SB-1kg 粒

HC-3653D-1A2 型																
地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土	
北海道												+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)	1kg			
東北																
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期						●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●	●
九州																
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。																

A-3
NC-604 フロアフル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道												+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)	500ml		
東北															
北陸															
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2	●始※		●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
九州															

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することにより効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3
NC-606-1kg 粒

DC-006 1kg 5L															
地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg +15～+25 (ノビエ2.5Lまで)		
東北	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●始				●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●始				●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●始			●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●始			●	●
九州										●再生 前～始	●始				
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。															

A-3
NC-612-1kg 粒

NC-012-1kg粒															
地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●3.5	●	●4	●3		●4			●発生 期	●再生 前～始	●始	+15～+30 (ノビエ3.5Lまで)	1kg		●
東北	●3.5	●	●3	●3	●3	●2			●発生 期	●再生 前～始	●始				●
北陸	●3.5	●	●3		●3	●3			●発生 期						●
関東・東海（普）	●3.5	●	●3		●3	●3			●発生 期	●再生 前～始	●始				●
近・中・四	●3.5	●	●3		●3	●3			●発生 期	●再生 前～始	●始				●
九州	●3.5	●	●4		●4	●4			●発生 期	●再生 前～始	●始				●
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。															

A-3

NH-104-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2	●始	●発生 期	●再生 前～始			+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前	イボクサ:再生始			●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2	●始	●発生 期	●再生 前～始	●前				●	●
九州															

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3

NH-806 ジェルボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													50g×10コ		
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2		●発生 期	●再生 前～始	●前		+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		●	●
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	イボクサ:再生始	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		○	○
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2		●発生 期	●再生 前～始	●前		+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		●	●
九州															

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な葉害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3

PSS①D-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北															
北陸															
関東・東海															
近・中・四	●2	●	●2		●2	●2		●発生 期	●再生 前～始	●前		+10～+25(ノビエ 2Lまで)		●	●
九州															

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3

SB-554 ジェンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヒ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壇土
北海道														50g×10コ		
東北	●1.5	●	●始		●始		●前※		●発生 期			シズイ:草丈3cm	+10～+20 (ノビエ1.5Lまで)		●	●
北陸	●1.5	●	●始		●始				●発生 期						●	●
関東・東海	○1.5	○	○始		○始		○前※		○発生 期						○	○
近・中・四																
九州																

※:クログワイ防除は、クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な葉害や効果不足が生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3

SB-554 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヒ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壇土
北海道														500ml		
東北	○1.5	○	○始		○始		●前※		○発生 期			シズイ:草丈3cm	+10～+20(ノビエ 1.5Lまで)		●	○
北陸	○1.5	○	○始		○始		●前		○発生 期						○	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始		●前※		○発生 期			イネ'クサ':再生始 SU抵抗性'ナギ':1L			○	○
近・中・四	●1.5	●	●始		●始	●前			●発生 期						●	●
九州																

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することにより効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組合せで使用する。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

クログワイ・シズイ防除は、有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3

SB-556 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヒ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壇土
北海道														500ml		
東北																
北陸																
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2						SU抵抗性'ホタルイ':2L, イ ネ'クサ':再生始	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期						●	●
九州	●2.5	●	●2	●前	●2	●2			●発生 期			イネ'クサ':再生始			●	●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3

SB-559①-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヒ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壇土
北海道														1kg		
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前		+15～+25 (ノビエ2.5Lまで)		●	●
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

SB-559①-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤 土	壤土 ～ 埴土
北海道														1kg		
東北																
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始			+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	SU抵抗性ホタルイ2L			●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●	●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●	●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

散布後の暑い・多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3

SL-0401-1kg 粒 (1kg/10a処理)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤 土	壤土 ～ 埴土
北海道	●4		●4	●3		●4			●生育 期				+20～+35 (ノビエ4Lまで)	1kg		●
東北	●4		●4			●3			●生育 期							●
北陸	●4		●4			●3			●生育 期							●
関東・東海	●4		●4			●3			●生育 期							●
近・中・四	●4		●4			●4			●生育 期							●
九州	●3		●4			●3			●生育 期				+20～+35 (ノビエ3Lまで)		●	●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

SL-0401-1kg 粒 (1.5kg/10a処理)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤 土	壤土 ～ 埴土
北海道	●5		●4	●4		●4			●生育 期				+30～+40 (ノビエ5Lまで)	1.5kg		●
東北	●5		●5			●4			●生育 期							●
北陸	●5		●4			●4			●生育 期							●
関東・東海	●5		●5			●4			●生育 期							●
近・中・四	●5		●5			●4			●生育 期							●
九州	●4		●5			●4			●生育 期				+30～+40 (ノビエ4Lまで)		●	●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

SL-0402-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤 土	壤土 ～ 埴土
北海道	●4		●4	●3		●4			●生育 期				+20～+35 (ノビエ4Lまで)	1kg		●
東北	●4		●4			●3			●生育 期							●
北陸	●4	●	●4			●3			●生育 期							●
関東・東海	●4	●	●4			●3			●生育 期							●
近・中・四	●4	●	●4			●4			●生育 期							●
九州	●3	●	●4			●3			●生育 期				+20～+35 (ノビエ3Lまで)			●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

SST-402-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北															
北陸															
関東・東海															
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		●	●
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3

SW-041⑩-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始	●始※	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前	SU抵抗性ホタル イ:1.5L (+15～+25 (ノビエ2.5Lまで)		●	●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することにより効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3

SW-907⑪ 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2	●	●2	●2		●2			●発生 期		●前	エゾノサヤスカグサ:2L (+15～+25(ノビエ 2Lまで)	3kg	●	●
東北															
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

TH-001 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													40g×100		
東北															
北陸															
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始		+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な葉害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3
TH-001-1kg 粒

F7-001-1kg粒															
地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 へ 壤土
北海道													1kg		
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ:草丈3cm	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)	○	○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始					○
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始				●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 前処理剤との組合せで使用する。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。															

A-3
TH-005 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 へ 壤土
北海道													50g×10㎡		
東北															
北陸															
関東・東海															
近・中・四	●2	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+12～+25(ノビエ 2Lまで)		●	●
九州															
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。															

A-3
YH-641-1kg 粒

TM-041-1kg 粒																
地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	塚土 へ 塚土
北海道														1kg		
東北	○2.5	○	○2		○2	○始	○前※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前		+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		○	○
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始	●始	●始	●発生 期	●再生 前～始					●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2	●始※	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前	SU抵抗性コナギ：1L			●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●	●
九州																

※：オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深：2cm/日以下

使用上の注意： 前処理剤との組合せで使用する。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
オモダカ、クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3
YH-652-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 へ 壤土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期			+15～+25 (ノビエ2.5Lまで)	1kg	●	●
東北	●2.5	●	●2	●始	●始	●始			●発生 期		SU抵抗性ホタルイ:2L			●	●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2	●始	●始	●発生 期					●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2	●始※	●始※	●発生 期		SU抵抗性ホタルイ:2L			●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2	●始	●始	●発生 期					●	●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期					●	●

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することにより効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3

YH-653-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土 土	壤土 土
北海道	○3.5	○	○3	○3		○3					○始	+20～+30(イネ5L以 降、ノビエ3.5Lまで)	1kg	○	○
東北	○3.5	○	○3	○3	○3	○2	●始※		●発生 期		○始			●	○
北陸	○3.5	○	○3		3 ○2	3 ○2	●始		○発生 期		●始			○	○
関東・東海	○3.5	○	○3		○3	○3	●始※		●発生 期		●始			○	○
近・中・四 (註)	○3.5	○	○3		○3	○3	●始		●発生 期		始 ○再			●	○
九州															

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することにより効果が向上する。
 滅水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 着しい高温条件では葉害を生じることがある。
 散布後の低温および急激な気温の上昇により葉害を生じることがある。
 クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 特殊雑草対象(アゼガヤ)

A-4 アゼガヤ

DEH-112-1kg 粒

地域名	対象雑草: アゼガヤ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州	●	5L	

使用上の注意:

A-4 特殊雑草対象(イボクサ)

A-4 イボクサ

KUH-911 液

地域名	対象雑草: イボクサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
全地域 関東・東海～九 州	○	+30～茎長30cm (東北以北は茎長20cmまで)	50～100ml(散布液量100L) 展着剤無加用

使用上の注意: 落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。

A-4 イボクサ

SB-554 フロアブル

地域名	対象雑草: イボクサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北			
北陸			
関東・東海	●	再生始	
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 イボクサ

SW-005(註) フロアブル

地域名	対象雑草: イボクサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北			
北陸			
関東・東海	●	再生始	
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 特殊雑草対象(オモダカ)

A-4 オモダカ
DASH-001 SC

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				100ml(散布液量100L)
東北	●	草丈30cm以下	※	
北陸	●	草丈30cm以下		
関東・東海	●	草丈30cm以下	※	
近・中・四	●	草丈30cm以下		
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。				

A-4 オモダカ
KPP-444-1kg 粒

地域名	対象雑草： オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ
KPP-444①-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ
KUH-011D-1kg 粒

地域名	対象雑草： オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ
KUH-011K-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ
KUH-013D-0.25kg 粒

※：オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。				
地域名	対象雑草： オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				250g
東北				
北陸				
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	○	始	※	
使用上の注意： オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ
KUH-013D-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
KUH-013K-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
KUH-021-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸	●	始		
関東・東海				
近・中・四				
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
KUH-031 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				3kg
東北	●	草丈30cm以下	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な前処理剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。
ごく浅水で散布し、2日間は入水しない。
散布後に降雨等で湛水されると効果が低下することがある。

A-4 オモダカ
NBA-093(改) シャンボ

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				40g×10 ²
東北				
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
SW-005D フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸	●	始		
関東・東海				
近・中・四				
九州				

使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
SW-012①-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ
SW-012②-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	始		
関東・東海				
近・中・四				
九州				
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ
SW-012③-1kg シャンボ

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始		40g×10 ²
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ
SW-041④-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始		1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ
SYJ-108 シャンボ

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始		30g×10 ²
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ
YH-641-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	○	始		1kg
東北	○	始	※	
北陸	○	始		
関東・東海	○	始	※	
近・中・四				
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
HOK-223 フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
KPP-2005 ジャンボ

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				50g×10 ²
東北	○	前	※	
北陸	●	前	※	
関東・東海	○	前	※	
近・中・四	○	前	※	
九州	○	前	※	

※:クログワイ防除は、クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
KPP-2005^① フロアブル(少量散布)

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				300ml
東北	○	前	※	
北陸	●	前	※	
関東・東海	○	前	※	
近・中・四	○	前	※	
九州	○	前	※	

※:クログワイ防除は、クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
KPP-2008-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	前	※	
北陸	●	前		
関東・東海	●	前	※	
近・中・四	●	前		
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
KPP-2011 フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	●	前	※	
北陸	●	前		
関東・東海	●	前	※	
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
KPP-444-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
KPP-444①-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	始		
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始		
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
KUH-011D-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
KUH-011K-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
KUH-013D-0.25kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				250g
東北				
北陸				
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	○	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
KUH-013K-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
KUH-013K-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
KUJH-021-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸	●	始		
関東・東海				
近・中・四				
九州	●	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
MY-100NC-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸	●	始		
関東・東海	○	始	※	
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
MY-100NDC-C-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	始		
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
NBA-093(改) ジャンボ

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				40g×10㍓
東北				
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
NC-391㊦ ジャンボ

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				30g×10㍓
東北	●	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
NC-604 フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
NH-806 ジェンボ

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				50g×10㎡
東北				
北陸				
関東・東海	○	始	※	
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
SB-528 フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	○	前	※	
北陸				
関東・東海	○	前	※	
近・中・四	○	前	※	
九州	○	前	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
SB-528◎ フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸				
関東・東海	●	前	※	
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
SB-529-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸				
関東・東海	●	前	※	
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
SB-554 フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	●	前	※	
北陸	●	前		
関東・東海	●	前	※	
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
SW-005◎ フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸	●	始		
関東・東海				
近・中・四				
九州				

使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
SW-012①-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
SW-012②-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	始		
関東・東海				
近・中・四				
九州				

使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
SW-024③-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				40g×10 ²
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
SW-041④-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
SYJ-108 シャンボ

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				30g×10 ²
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始		
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
TH-001 フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	○	前	※	
北陸				
関東・東海	○	始	※	
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
YH-641-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	前	※	
北陸	○	始		
関東・東海	○	始	※	
近・中・四				
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
YH-651 フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	●	前	※	
北陸	○	前	※	
関東・東海	○	前	※	
近・中・四	○	前	※	
九州	●	前	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
YH-652 フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	●	始	※	
北陸	○	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	前	※	
九州	●	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
YH-652-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	始		
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始		
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
YH-653-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸	●	始		
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始		
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 特殊雑草対象(コウキヤガラ)

A-4 コウキヤガラ
KUH-01D-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州	●	始	
使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。			

A-4 コウキヤガラ
KUH-021-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	●	始	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州	●	始	
使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。			

A-4 特殊雑草対象(シズイ)

A-4 シズイ
KPP-444-1kg 粒

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	●	草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意: シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。			

A-4 シズイ
KUH-011K-1kg 粒

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	●	草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意: シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。			

A-4 シズイ
KUH-013K-1kg 粒

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	●	草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意: シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。			

A-4 シズイ
KUH-021-1kg 粒

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	●	草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意: シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。			

A-4 シズイ
NBA-131a-1kg 粒

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	●	草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意: シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。			

A-4 シズイ
NC-604 フロアブル

NC-604 フロアブル

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北	●	草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意: シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 シズイ
SB-554 フロアブル

SB-554 フロアブル

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北	●	草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 特殊雑草対象(ミズアオイ)

A-4 ミズアオイ
KUH-021-1kg 粒

KUH-021-1kg 粒			
地域名	対象雑草: ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意・			

A-4 ミズアオイ
TH-001-1kg 粒

FH-001-1kg 粒			
地域名	対象雑草: ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	1L	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意・			

A-4 特殊雑草対象(SU抵抗性コナギ)

A-4 SU抵抗性コナギ
BAG-032 ジャンボ

BAG-U32 シャンホ			
地域名	対象雑草: SU抵抗性コナギ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			20g×10 ³
東北			
北陸			
関東・東海	●	2L	
近・中・四			
九州			
使用上の注意・			

A-4 SU抵抗性コナギ
KPP-2008 乳(EW)

KPT-2008 Ⅸ(EW)

地域名	対象雑草: SU抵抗性コナギ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500mi
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州			

使用上の注意・SU抵抗性コナギ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 SU抵抗性コナギ
KPP-2008-1kg 粒

地域名	対象雑草: SU抵抗性コナギ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州			
使用上の注意: SU抵抗性コナギ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。			

A-4 SU抵抗性コナギ
KUH-011D-1kg 粒

地域名	対象雑草: SU抵抗性コナギ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	1L	
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 SU抵抗性コナギ
KUH-021-1kg 粒

地域名	対象雑草: SU抵抗性コナギ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	2L	
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 SU抵抗性コナギ
YH-652-1kg 粒

地域名	対象雑草: SU抵抗性コナギ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	2L	
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 特殊雑草対象(SU抵抗性ホタルイ)

A-4 SU抵抗性ホタルイ
BAG-032 ジャンボ

地域名	対象雑草: SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			20g×10 [□]
東北	●	2L	
北陸			
関東・東海	○	2L	
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 SU抵抗性ホタルイ
KPP-2008-1kg 粒

地域名	対象雑草: SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州			
使用上の注意: 有効な剤との組み合わせで使用する。			

A-4 SU抵抗性ホタルイ

KPP-2011フロアブル

地域名	対象雑草: SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	始	500ml
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意: 有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 SU抵抗性ホタルイ

KPP-444-1kg粒

地域名	対象雑草: SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	1kg
東北	●	2L	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 SU抵抗性ホタルイ

KPP-444①-1kg粒

地域名	対象雑草: SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	1L	
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 SU抵抗性ホタルイ

KUH-011K-1kg粒

地域名	対象雑草: SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	●	2L	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 SU抵抗性ホタルイ

KUH-023Dフロアブル

地域名	対象雑草: SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北			
北陸			
関東・東海	●	2L	
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 SU抵抗性ホタルイ

SB-559①-1kg粒

地域名	対象雑草: SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	2L	
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 SU抵抗性ホタルイ
SST-402-1kg 粒

地域名	対象雑草: SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	2L	
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 SU抵抗性ホタルイ
SYJ-156-1kg 粒

地域名	対象雑草: SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	●	2L	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 SU抵抗性ホタルイ
YH-650 フロアブル

地域名	対象雑草: SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州			
使用上の注意: SU抵抗性ホタルイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。			

A-4 SU抵抗性ホタルイ
YH-652 フロアブル

地域名	対象雑草: SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北			
北陸			
関東・東海	●	2L	
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 SU抵抗性ホタルイ
YH-652-1kg 粒

地域名	対象雑草: SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	●	2L	
北陸			
関東・東海	●	2L	
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

B 直播栽培

B
HOK-221 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 〜 粘土
関東・東海〜九 州	●2.5	●	●2		●2	●2						イネ1L〜ノビエ 2.5L	50g×10 ³		●

灌水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、薬害や効果不足が生じることがある。

B

HOK-225-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北陸～九州	●3	●	●2		●2								イネ1L～ノビエ3L	1kg		●

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では葉害を生じる。

B

KPP-2008 乳(EW)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北陸～九州	●前	●	●前		●前								植代後～4	300ml		●

湛水直播 湛水条件で使用する

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 出芽時に湛水条件になると葉害を生じる。

B

KUH-011K-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道、東北	○2.5	○	○2	●始	○始	○始			○発生 期	○再生 前～始			イネ1L～ノビエ 2.5L	1kg		○

湛水直播

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では葉害を生じる。

B

KUH-013D ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北陸～九州	●2.5	●	●2	●2	●2				●発生 期	●再生 前～始			イネ1L～ノビエ 2.5L	25g×10 ³		●

湛水直播

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では葉害を生じる。

5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、葉害や効果不足が生じることがある。

B

KUH-013D-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北陸～九州	●3	●	●2		●2	●2				●再生 前～始			イネ1L～ノビエ 3L(砂壌土はイネ 1.5L～)	1kg	●	●

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では葉害を生じる。

B

KUH-013K-0.25kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道、東北	○2.5	○	○2	○始	○始				○発生 期	○再生 前～始		イネ1L～ノビエ 2.5L	250g		○

湛水直播

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では葉害を生じる。

B

KUH-013K-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道、東北	●3	●	●2	●始		●始			●発生 期	●再生 前～始		イネ1L～ノビエ3L	1kg		●

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では葉害を生じる。

B

KUH-983-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
全域	○4											イネ3L～ノビエ4L	1kg	●	○

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

イネの根が露出する条件では葉害を生じる。

B

MY-100DC フロアフル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道、東北	●2.5	●	●2	●始		●始			●発生 期	●再生 前～始		イネ1L～ノビエ 2.5L	500ml		●

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では葉害を生じる。

B

NBA-071-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
東北～九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始		イネ1L～ノビエ 2.5L	1kg		○

湛水直播

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では葉害を生じる。

B

NBA-071DEH-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
東北～九州	●3	●	●2		●2	●2						イネ1L～ノビエ3L	1kg		●

湛水直播 湛水条件で使用する

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では葉害を生じる。

B

NC-331 水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツツ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
関東・東海～九 州		●	●前		●前	●前			●発生 前	●再生 前～始		入水前10～2日	90～ 180g(散 布液量 100L)		●

乾田直播 乾田条件で使用する。

使用上の注意:

B

NC-385SB 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツツ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
東北～九州	○2.5	○	○2		○2	●2						イネ1L～ノビエ 2.5L	80g(散 布液量 500ml)		○

湛水直播

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では葉害を生じる。

B

NOJ-101-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツツ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北陸～近畿・中 国・四国	●3	●	●2		●2	●2						イネ1.5L～ノビエ 3L	1kg		●

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では葉害を生じる。

B

NOJ-104-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツツ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北陸～近畿・中 国・四国	●3	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始		イネ1.5L～ノビエ 3L	1kg		●

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では葉害を生じる。

B

PSSD-D-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツツ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
全域 (九州を除く)	○2	○	○2		●2	○2			○発生 期			イネ1.5L～ノビエ 2L (砂壌土はイネ2L ～)	1kg	●	○

湛水直播

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では葉害を生じる。
前処理剤との組み合わせで使用する。

B

SB-556 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツツ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
東北～九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期			イネ1L～ノビエ 2.5L	500ml	○	○

湛水直播

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では葉害を生じる。

B

SW-002①フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北陸～九州	○2.5	○	○2		○2	2 ○始			○発生 期	○再生 前～始		イネ1L～ノビエ 2.5L	500ml	●	○

湛水条件で使用する。

減水深：2cm/日以下

使用上の注意： イネの根が露出する条件では葉害を生じる。

B

SW-012②1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道、東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始		イネ1L～ノビエ 2.5L	1kg	●	●

湛水条件で使用する。

減水深：2cm/日以下

使用上の注意： イネの根が露出する条件では葉害を生じる。

B

SW-973-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道～近畿・ 中国・四国	○3.5	○	3 ○2		○2	3 ○2			○発生 期		●始	イネ5L～ノビエ 3.5L	1kg	○	○

湛水条件で使用する。

減水深：2cm/日以下

使用上の注意： 著しい高温条件では葉害を生じることがある。
散布後の低温および急激な気温の上昇により葉害を生じることがある。
前処理剤との組み合わせで使用する。

B

ZK-122 液

地域名	対象雑草	処理時期	使用量(散布液量) /10a	適用土壌
関東・東海～九州	全草種	雑草生育期(播種前14日～出芽前)	250～500ml(散布液量50～100L)	全土壌

使用上の注意：

C 畦畔雑草

C

MCP-Na 液

地域名	対象雑草	処理時期	使用量(散布液量) /10a	適用土壌
全域	広播雑草およびスギナ	雑草生育期(草丈30cm以下)	200～400ml (散布液量100L)	全土壌

使用上の注意：

C

MRS-195 液

地域名	対象雑草	処理時期	使用量(散布液量) /10a	適用土壌
全域	全草種(スギナを除く)	雑草生育期(草丈30cm以下)	一年生雑草：250～500ml 多年生雑草：500～1,000ml (散布液量50～100L、50Lは専用ノズル使用)	全土壌

使用上の注意：

C

NC-622 液

地域名	対象雑草	処理時期	使用量(散布液量) /10a	適用土壌
全域	全草種	雑草生育期(草丈30cm以下)	200～500ml (散布液量25～50L、専用ノズル使用)	全土壌
	スギナ	スギナ生育期	1,500～2,000ml (散布液量50～100L、50Lは専用ノズル使用)	

使用上の注意:

C

ZK-122 液

地域名	対象雑草	処理時期	使用量(散布液量) /10a	適用土壌
全域	全草種	雑草生育期(草丈30cm以下)	一年生雑草:250～500ml 多年生雑草:500～1,000ml (散布液量50L、専用ノズルを使用)	全土壌
	スギナ	スギナ生育期	スギナ:1,500～2,000ml (散布液量50～100L、50Lは専用ノズルを使用)	

使用上の注意:

D 耕起前

D

AH-01 液

地域名	対象雑草	処理時期	使用量(散布液量) /10a	適用土壌
全域	全草種	耕起7日以前 雑草生育期(草丈30cm以下)	500ml (散布液量100L)	全土壌

使用上の注意:

E 休耕田

E

NC-622 液

地域名	対象雑草	処理時期	使用量(散布液量) /10a	適用土壌
全域	全草種	雑草生育期(草丈1m以下)	一年生雑草:200～500ml 多年生雑草:500～1,000ml (散布液量25～50L、専用ノズルを使用)	全土壌

使用上の注意:

その他

その他

DEH-112 乳(EW)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	
全域 北海道	○5											播種後10日～ノビ エ5L	100ml(散 布液量 100L)	

機械移植育苗に使用する

使用上の注意:

水稻関係除草剤使用基準の表示について

- 過年度、既に実用化の認められている適用草種・土壌条件に○を印した。
(本年度の試験の結果、特に拡大のない場合も含む)
草種欄の数字、字句で草種ごとの葉齢を示した。[例:○始(発生始)、○2(2葉期まで)]
作期に限定がある場合は、地域名の後に適用作期を普通期:(普), 早期:(早)と記した。
使用上の注意は別途一覧表に沿って文章で備考欄に記載した。
- 本年度、新たに使用基準が作成された場合、A、Bの試験区分においては、
実用化可能となった適用草種・土壌に●を印し、処理時期および使用量を記載した。
C(畦畔), D(耕起前), E(休耕田)の試験区分においては、地域名全体にアンダーラインを付して、
対象雑草、処理時期、使用量、適用土壌を記載した。
- 過年度の基準に適用条件拡大が可能となった場合、
作 期 の 拡 大 : 作期の限定がなくなった場合、作期の記載を取消線で消した。(例:(普))
草 種 の 拡 大 : 拡大可能となった草種に●を印した。
葉 齢 の 拡 大 : 拡大可能となった葉齢に、アンダーラインを付した。(例:○2.5)
処理時期、使用量の拡大 : 拡大部分にアンダーラインを付した。(例:±3~ノビ±2L, 50~75ml/a)
土 壌 条 件 の 拡 大 : 拡大可能となった土壌に●を印した。

選べる3剤型!!早めにつかって長く効く!

安心がプラス!

アゼナ、ホタルイ等への効果をプラス。

水稲用一発
処理除草剤

TREDDY
トレディプラスの
トレードマーク




トレディプラス® 顆粒

トレディプラス® ジャンボ

トレディプラス® 1キロ
粒 剤



トレフィちゃん



JAグループ
農 協 全 農 経済連

登録商標 第1902445号



日産化学工業株式会社

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-7-1(興和一橋ビル)
TEL 03(3296)8141 <http://www.nissan-nouyaku.net/>