

新登録除草剤・植物成長調整剤一覧

農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課
平成17年11月1日～平成18年3月31日

(1)水稲作(移植・直播)

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作 物 名	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使 用 量	使 用 時 期	使 用 方 法	使 用 回 数	登 録 会 社
イマゾス ルフロン・ カフェン ストロー ル・ベン ゾビシク ロン水和 剤	イッテツ フロアブ ル	1-(2-クロロイミダゾ[1,2-a]ピ リジン-3-イルスルホニル)-3- (4,6-ジメチルピリミジン-2-イ ル)尿素・・・1.7%, N,N-ジエ チル-3-メチルスルホニル-1H- 1,2,4-トリアゾール-1-カルボキ サド・・・5.7%, 3-(2-クロロ 4-メチルベンゾイル)-2-フェニ ルチオビシク[3.2.1]オクタ-2-エ ン-4-オン・・・3.8%	水 和 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑草及びマツ バイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズカヤ ヅリ(北海道を除く)、ヘラオモ ダガ(北海道、東北、九州)、 ヒルムシロ(北陸を除く)、セリ、 エゾノササカサ(北海道)、 シズイ(東北)、オモダガ(北海 道、東北)、クログワイ(東北、 関東・東山・東海)、コウキヤ ガラ(東北)、アオドロ・藻類 による表層はく離(北陸を除く)	北海道 全域(北海道 を除く)の普 通期及び早 期栽培地帯	砂壤土 ～塩土	500ml/ 10a	移植後5～20日(ノ ビエ2.5葉期まで) 移植後5～15日(ノ ビエ2.5葉期まで) 移植後15～25日 (ノビエ2.5葉期ま で)(移植前後の初 期除草剤による土 壌処理との体系で 使用)	原液湛 水散 布、水 口施用 又は無 人ヘリ コプタ ーによ る滴下	本剤の使用回 数・・・1回、イマゾス ルフロンを含む農 薬の総使用回 数・・・2回以内、カ フェンストロー ルを含む農薬の総使用 回数・・・1回、ベン ゾビシクロンを含む農 薬の総使用回 数・・・2回以内	協友アグ リ㈱
イマゾス ルフロン・ カフェン ストロー ル・ベン ゾビシク ロン粒剤	イッテツ1 キロ粒剤	1-(2-クロロイミダゾ[1,2-a]ピ リジン-3-イルスルホニル)-3- (4,6-ジメチルピリミジン-2-イ ル)尿素・・・0.90%, N,N-ジエ チル-3-メチルスルホニル- 1H-1,2,4-トリアゾール-1-カ ルボキサド・・・3.0%, 3-(2-ク ロロ4-メチルベンゾイル)-2- フェニルチオビシク[3.2.1]オク タ-2-エン-4-オン・・・2.0%	粒 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑草及びマツ バイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズカヤ ヅリ(北海道を除く)、ヘラオモ ダガ(北海道、東北)、シズイ (東北)、ヒルムシロ、セリ、アオド ロ・藻類による表層はく 離(北陸、関東・東山・東 海を除く)	北海道 東北 全域(北海 道、東北を除 く)の普通期 栽培地帯、関 東・東山・東 海及び九州 の早期栽培 地帯 東北 北陸	砂壤土 ～塩土 塩土～ 塩土	1kg/10a	移植後5～20日(ノ ビエ2.5葉期まで) 移植後5～15日(ノ ビエ2.5葉期まで) 移植後15～25日 (ノビエ2.5葉期ま で)(移植前後の初 期除草剤による土 壌処理との体系で 使用)	湛水散 布	本剤の使用回 数・・・1回、イマゾス ルフロンを含む農 薬の総使用回 数・・・2回以内、カ フェンストロー ルを含む農薬の総使用 回数・・・1回、ベン ゾビシクロンを含む農 薬の総使用回 数・・・2回以内	協友アグ リ㈱
イマゾス ルフロン・ カフェン ストロー ル・ダイム ロン粒剤	クラッシュ EXジャン ボ	1-(2-クロロイミダゾ[1,2-a]ピ リジン-3-イルスルホニル)-3- (4,6-ジメチルピリミジン-2-イ ル)尿素・・・1.8%, N,N-ジエ チル-3-メチルスルホニル-1H- 1,2,4-トリアゾール-1-カルボキ サド・・・4.2%, 1-(α , α -ジ メチルベンゾイル)-3-(ヘ トリル)尿素・・・20.0%	粒 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑草及びマツ バイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズカヤ ヅリ(北海道を除く)、ヘラオモ ダガ(北海道、北陸)、ヒルムシ ロ(北陸を除く)、セリ、アオド ロ・藻類による表層はく離	北海道 東北 北陸 関東以西の 普通期及び 早期栽培地 帯	砂壤土 ～塩土 塩土～ 塩土 砂壤土 ～塩土	小包装 (パッ ク)10個 (500g)/ 10a	移植後3日～移植 後15日(ノビエ2葉 期まで) 移植後3日～移植 後12日(ノビエ2葉 期まで) 移植後3日～移植 後10日(ノビエ2葉 期まで)	水田に 小包装 (パッ ク)のま ま投入 される。	本剤の使用回 数・・・1回、イマゾス ルフロンを含む農 薬の総使用回 数・・・2回以内、カ フェンストロー ルを含む農薬の総使用 回数・・・1回、ダイ ムロンを含む農薬の 総使用回数・・・3回 以内(育苗箱散布 は1回以内、本田で は2回以内)	協友アグ リ㈱
イマゾス ルフロン・ カフェン ストロー ル・ダイム ロン粒剤	クラッシュ 1キロ粒 剤	1-(2-クロロイミダゾ[1,2-a]ピ リジン-3-イルスルホニル)-3- (4,6-ジメチルピリミジン-2-イ ル)尿素・・・0.90%, N,N-ジエ チル-3-メチルスルホニル- 1H-1,2,4-トリアゾール-1-カ ルボキサド・・・3.0%, 1-(α , α -ジメチルベンゾイル)-3-(ヘ トリル)尿素・・・15.0%	粒 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑草及びマツ バイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズカヤ ヅリ(北海道を除く)、ヘラオモ ダガ(北海道、東北、北陸)、 クログワイ(北海道、関東・東 山・東海)の早期栽培地 帯を除く)、オモダガ(近畿・ 中国・四国、九州)の早期 栽培地帯を除く)、ヒルムシ ロ、セリ、アオドロ・藻類に よる表層はく離	北海道 北海道を除 く全域	砂壤土 ～塩土 (減水深 2cm/日 以下)	1kg/10a	移植後5～20日(ノ ビエ2.5葉期まで) 移植後5～15日(ノ ビエ2.5葉期まで)	湛水散 布、湛 水周縁 散布又 は無人 ヘリコ プターに よる散布	本剤の使用回 数・・・1回、イマゾス ルフロンを含む農 薬の総使用回 数・・・2回以内、カ フェンストロー ルを含む農薬の総使用 回数・・・1回、ダイ ムロンを含む農薬の 総使用回数・・・3回 以内(育苗箱散布 は1回以内、本田で は2回以内)	協友アグ リ㈱

(1)つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作 物 名	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使 用 量	使 用 時 期	使 用 方 法	使 用 回 数	登 録 会 社
シメトリ ン・モリ ネート・M CPB粒 剤	マメットS M1キロ 粒剤	2-メチルチオ-4,6-ビス(エチルア ミノ)-s-トリアジン...4.5%、S- エチルヘキサヒドロ-1H-アゼビ ン-1-カーボチオエート... 24.0%、2-メチル-4-クロロフェノ キシ酢酸エチル...2.4%	粒 剤	移植 水 稲	水田一年生雑草及びマツ バイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤ ツリ、ヘラオモダカ、アオミドロ・藻 類による表層はく離	北海道、東 北、北陸、関 東以西(九州 を除く)の普 通期栽培地 帯及び関東・ 東山・東海、 九州の早期 栽培地帯	砂壌土 ～植土、 但し、近 畿以西は 砂壌土を 除く(減水 深2cm/ 日以下)	1kg/10a	移植後15～20日 (ビエの3.5葉期、 但し、北海道は2.5 葉期まで)	湛水散 布	本剤の使用回 数...1回、シメトリ ンを含む農薬の総使 用回数...2回以 内、モリネートを含 む農薬の総使用回 数...2回以内、M CPBを含む農薬の 総使用回数...2回 以内	協友アグ リ
				移植 水 稲	水田一年生雑草及びマツ バイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤ ツリ、ヘラオモダカ(北海道、東 北、北陸)、オモダカ(東北、 北陸)、アオミドロ・藻類によ る表層はく離	北海道、東 北、北陸、関 東以西(九州 を除く)の普 通期栽培地 帯及び関東・ 東山・東海、 九州の早期 栽培地帯	砂壌土 ～植土、 但し、近 畿以西は 砂壌土を 除く(減水 深2cm/ 日以下)	1kg/10a	移植後20～30日 (ビエの3.5葉期、 但し、北海道は2.5 葉期まで)(移植前 後の初期除草剤 による土壌処理と の体系で使用)			
				直 播 水 稲	水田一年生雑草及びマツ バイ、ホタルイ	全域(九州を 除く)	壤土～ 植土		稲5葉期～ビエ 3.5葉期まで(但し、 収穫90日前ま で)(は種前後の初 期除草剤による土 壌処理との体系で 使用)	湛水散 布又は 無人ヘ リコプ ターによ る散布		
ジメタメ トリン・ビ リブチカル ブ・プレ チラク ロール水 和剤	農将軍ブ ロアブル	2-メチルチオ-4-エチルアミ ノ-6-(1,2-ジメチルプロピルアミ ノ)-s-トリアジン...0.50%、 O-3-tert-ブチルフェニル=6- トキシ-2-ピリジル(メチル)チオ カルバマート...10.0%、2-クロ ロ-2',6'-ジエチル-N-(2-ブ ロキシエチル)アセトアニリド... 5.0%	水 和 剤	移植 水 稲	水田一年生雑草及びマツ バイ、ホタルイ、ヘラオモダカ(北 海道、東北)、アオミドロ・藻 類による表層はく離(北 海道、東北、北陸、関東・ 東山・東海)	北海道	壤土～ 植土	500ml/ 10a	移植直後～移植 後10日(ビエ1葉 期まで)	原液湛 水散布	本剤の使用回 数...1回、ジメタメ トリンを含む農薬の 総使用回数...2回 以内、ビリブチカル ブを含む農薬の総 使用回数...2回以 内、プレチラクロー ルを含む農薬の総 使用回数...2回以 内	協友アグ リ
				移植 水 稲	水田一年生雑草及びマツ バイ、ホタルイ、ヘラオモダカ(北 海道、東北)、アオミドロ・藻 類による表層はく離(北 海道、東北、北陸、関東・ 東山・東海)	東北、北陸	砂壌土 ～植土		移植直後～移植 後10日(ビエ1.5 葉期まで)			
				移植 水 稲	水田一年生雑草及びマツ バイ、ホタルイ、ヘラオモダカ(北 海道、東北)、アオミドロ・藻 類による表層はく離(北 海道、東北、北陸、関東・ 東山・東海)	関東・東山・ 東海の普通 期及び早期 栽培地帯			植代後～移植4日 前まで、移植直後 ～移植後10日(ビ エ1.5葉期まで)			
				移植 水 稲	水田一年生雑草及びマツ バイ、ホタルイ、ヘラオモダカ(北 海道、東北)、アオミドロ・藻 類による表層はく離(北 海道、東北、北陸、関東・ 東山・東海)	近畿・中国・ 四国の普通 期及び早期 栽培地帯			移植直後～移植 後5日(ビエ1葉 期まで)			
				移植 水 稲	水田一年生雑草及びマツ バイ、ホタルイ、ヘラオモダカ(北 海道、東北)、アオミドロ・藻 類による表層はく離(北 海道、東北、北陸、関東・ 東山・東海)	九州の普通 期及び早期 栽培地帯	壤土～ 植土					
				移植 水 稲	水田一年生雑草及びマツ バイ、ホタルイ、ヘラオモダカ(北 海道、東北)、アオミドロ・藻 類による表層はく離(北 海道、東北、北陸、関東・ 東山・東海)	北海道	砂壌土 ～植土	300ml/ 10a(少 量散布)	移植直後～移植 後5日(ビエ1葉 期まで)(移植後 に使用する除草剤 との体系で使用)			
						北陸、関東・ 東山・東海の 普通期及び 早期栽培地 帯			植代後～移植4日 前まで、移植直後 ～移植後5日(ビ エ1葉期まで)(水口 施用は移植直後 ～移植後5日)(移 植後に使用する 除草剤との体系で 使用)	原液湛 水散布 又は水 口施用		

(1)つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物 名	適用雑草	適用地帯	適用土 壌	使用量	使用時期	使用方 法	使用回数	登録会社
ビラゾス ルフロン エチル・ モリネー ト粒剤	ベルーフ 粒剤	エチル=5-(4,6-ジメチルピリ ジン-2-イルカルバモイルスルファ モイル)-1-メチルピラゾール-4- カルボキシレート...0.070%, S-エチルヘキサヒドロ-1H-アゼ ピン-1-カーボチオエート... 7.0%	粒 剤	水 稲	水田一年生雑草及びマツ バイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤ ヅリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セ リ、エゾノサヤスグサ	北海道	砂壤土 ～ 埴土 (減水深 1.5cm/ 日以下)	3kg/10a	移植後5～15日(ビエ2.5葉期まで)	湛水散 布	本剤の使用回 数...1回、ビラゾス ルフロンエチルを 含む農薬の総使用 回数...1回、モリ ネートを含む農薬 の総使用回数...2 回以内	協友アグ リ㈱
					水田一年生雑草及びマツ バイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤ ヅリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、オ モダカ、セリ、クロクワイ、コウキヤ ガラ(東北)、シズイ(東北)	東海、北陸以 北の普通期 栽培地帯(但 し、北海道を 除く)						
					水田一年生雑草及びマツ バイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤ ヅリ、ヒルムシロ、ヘラオモダカ、セ リ、コウキヤガラ(九州)	関東以西の 早期栽培地 帯						
					水田一年生雑草及びマツ バイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤ ヅリ、ヒルムシロ、ヘラオモダカ、セ リ、クロクワイ、コウキヤガラ(九 州)	近畿以西の 普通期栽培 地帯						
					水田一年生雑草及びマツ バイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤ ヅリ、ヘラオモダカ、セリ、オモダ カ、クロクワイ	東北、北陸	砂壤土 ～ 埴土 (減水深 2.0cm/ 日以下)		移植後7～25日(ビエ2.5葉期ま で)(移植前後の初 期除草剤)による土 壌処理との体系で 使用)			
シメトリ ン・モリ ネート粒 剤	マメット粒 剤	2-メチルチオ-4,6-ビス(エチルア ミノ)-s-トリアジン...1.5%, S- エチルヘキサヒドロ-1H-アゼピ ン-1-カーボチオエート...6.0%	粒 剤	普 通 移 植 水 稲	/ビエ、その他水田一年生 雑草及びマツバイ	全域の普通 期及び早期 栽培地帯	砂壤土 ～ 埴土 (極端な 漏水田 を除く)	3～ 4kg/10a	移植後7～15日(ビエ2.5葉期まで。 寒地では2.0葉期 まで)	湛水散 布(土 壌処 理、茎 葉処 理)	本剤の使用回 数...1回、シメトリ ンを含む農薬の総使 用回数...2回以 内、モリネートを含 む農薬の総使用回 数...2回以内	協友アグ リ㈱
						関東・東山以 北(北海道を 除く)の普通 期栽培地帯			移植後25日まで/ ビエの2.5葉期ま で。(移植前後の 初期除草剤)による 土壌処理との体系 で使用)			
						東北以南(九 州、四国の暖 地を除く)の 普通期栽培 地帯、関東・ 東山の早期 栽培地帯	埴土～ 埴土(極 端な漏 水田を 除く)		移植後20～25日/ ビエの2葉期まで。 (移植前後の初期 除草剤)による土壌 処理との体系で使 用)			
						ホタルイ	東北、北陸	砂壤土 ～ 埴土 (極端な 漏水田 を除く)		移植後7～15日ホ タルイの発生始～3 葉期まで		
						/ビエ、その他水田一年生 雑草及びマツバイ	関東以西	埴土～ 埴土(極 端な漏 水田を 除く)		乾田直播の入水 後～ビエ2葉期ま で(但し、収穫90日 前まで)		

(1)つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作 物 名	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使 用 量	使 用 時 期	使 用 方 法	使 用 回 数	登 録 会 社
モリネー ト粒剤	オードラ ム粒剤	S-エチルヘキサヒドロ-1H-アゼ ピン-1-カーボオエート... 8.0%	粒 剤	移植 水稲	ノビエ、マツバイ、ホタルイ	全域(北海道 を除く)の普 通期栽培地 帯	砂壤土 ～塩土 (但し、 九州・南 四国など の暖地 では 塩土～ 塩土(減 水深2 cm/日 以下)	3～ 4kg/10a	植代後～移植前4 日又は移植後/ビ エ2葉期まで	湛水散 布	本剤の使用回 数...2回以内、モリ ネートを含む農薬 の総使用回数...2 回以内	協友アグ リ㈱
				直播 水稲	ノビエ、マツバイ	全域		3kg/10a	イネ出芽揃～ノビエ の1.5葉期まで(但 し、収穫90日前ま で)			
イマゾス ルフロ ン・カ ブフェ ン スト ル・ベン ゾビシ クロ ン粒剤	イッツ ェンボ ン	1-(2-クロロミタツ[1,2-a]ピ リジン-3-イルスルホニル)-3- (4,6-ジメチルピリジン-2-イ ル)尿素...2.25%, N,N-ジ エチル-3-メチルスルホニル 1H-1,2,4-トリアゾール-1-カ ルボキサミド...7.5%, 3-(2- クロロ-4-メチルベンジル)-2- フェニルチオビシクロ[3.2.1]オク タ-2-エン-4-オン...5.0%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生雑草及びマツ バイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガ ヤツリ(北海道を除く)、ヘラオモ ダカ(北海道、東北)、ヒルムシ ロ、セリ、アオミドロ・藻類によ る表層はく離(東北、北 陸、関東、東山・東海を除 く)	北海道	塩土～ 塩土	小包装 (ハッ ク)10個 (400g)/ 10a	移植後5日～20日 (ノビエ2.5葉期ま で)	水田に 小包装 (ハッ ク)の まま 投入 れる。	本剤の使用回 数...1回、イマゾス ルフロロンを含む農 薬の総使用回 数...2回以内、カ ブフェンストロール を含む農薬の総使用 回数...1回以内、 ベンゾビシクロン を含む農薬の総使用 回数...2回以内	住化武田 農業㈱、 ㈱エス・ デー・エ ス・ハイ オテック、 協友ア グリ㈱
イマゾス ルフロ ン・フ ェント ラザミ ド・プロ モブチ ド粒剤	ドニチS1 キロ粒剤	1-(2-クロロミタツ[1,2-a]ピ リジン-3-イルスルホニル)-3- (4,6-ジメチルピリジン-2-イ ル)尿素...0.90%, 4-(2-クロ ロフェニル)-N-ニコロヘキシル N-エチル-4,5-ジヒドロ-5-オ キソ-1H-テトラゾール-1-カル ボキサミド...3.0%, (RS)-2- プロモ-N-(α , α -ジメチルベン ジル)-3,3-ジメチルプロパミ ド...9.0%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生雑草及びマツ バイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガ ヤツリ(北海道を除く)、ヘラオモ ダカ(北海道、東北)、ヒルムシ ロ、セリ、アオミドロ・藻類によ る表層はく離	北海道	塩土～ 塩土	1kg/10a	移植後5日～移植 後20日(ノビエの2.5 葉期まで)	湛水散 布	本剤の使用回 数...1回、イマゾス ルフロロンを含む農 薬の総使用回 数...2回以内、フ ェントラザミドを含む 農薬の総使用回 数...1回、プロモブ チドを含む農薬の 総使用回数...2回 以内	住化武田 農業㈱
フエント ラザミ ド・プロ モブチ ド・ベン スル フロ ンメ チル 粒 剤	クサトリ DX1キ ロ粒剤H7 5	4-(2-クロロフェニル)-N-ニコ ロヘキシル-N-エチル-4,5-ジヒ ドロ-5-オキソ-1H-テトラゾール -1-カルボキサミド...3.0%, (RS)-2-プロモ-N-(α , α - ジメチルベンジル)-3,3-ジメ チルプロパミド...9.0%, メチ ル = α -(4,6-ジメチルピリジン -2-イルカルバモイルスルファモ イル)-オトルアト...0.75%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生雑草及びマツ バイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミ ズガヤツリ(東北)、ウリカワ、ヒル ムシロ、セリ、アオミドロ・藻類に よる表層はく離	北海道	塩土～ 塩土	1kg/10a	移植後3～20日(ノ ビエ2.5葉期まで)	湛水散 布	本剤の使用回 数...1回、フエント ラザミドを含む農薬 の総使用回数...1 回、プロモブチドを 含む農薬の総使用 回数...2回以内、 ペンシルフロ ンメチルを含む農薬の 総使用回数...2回以 内	三共アグ ロ㈱
						東北			移植後3～15日(ノ ビエ2.5葉期まで)			
フエント ラザミ ド・プロ モブチ ド・ベン スル フロ ンメ チル 粒 剤	クサトリ DX1キ ロ粒剤H7 5	4-(2-クロロフェニル)-N-ニコ ロヘキシル-N-エチル-4,5-ジヒ ドロ-5-オキソ-1H-テトラゾール -1-カルボキサミド...3.0%, (RS)-2-プロモ-N-(α , α - ジメチルベンジル)-3,3-ジメ チルプロパミド...9.0%, メチ ル = α -(4,6-ジメチルピリジン -2-イルカルバモイルスルファモ イル)-オトルアト...0.75%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生雑草及びマツ バイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミ ズガヤツリ(東北)、ウリカワ、ヒル ムシロ、セリ、アオミドロ・藻類に よる表層はく離	北海道	塩土～ 塩土	1kg/10a	移植後3～20日(ノ ビエ2.5葉期まで)	湛水散 布	本剤の使用回 数...1回、フエント ラザミドを含む農薬 の総使用回数...1 回、プロモブチドを 含む農薬の総使用 回数...2回以内、 ペンシルフロ ンメチルを含む農薬の 総使用回数...2回以 内	デュボン ㈱、バイエ ルクロップ サイエンス ㈱
						東北			移植後3～15日(ノ ビエ2.5葉期まで)			
ジメタメ リン・プレ トラク ロール粒 剤	バレーJ 粒剤	2-メチルチオ-4-エチルアミノ 6-(1,2-ジメチルプロピルアミ ノ)-5-トリアジン...0.10%, 2- クロロ-2',6'-ジエチル-N-(2- プロボキシエチル)アゼアニ ド...2.0%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生雑草及びマツ バイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミ ズガヤツリ、アオミドロ・藻類に よる表層はく離	東北・北陸以 北	砂壤土 ～塩土 (減水深 2cm/日 以下)(但 し、近 畿・中 国・四 国・九 州では 砂壤土 を除く)	3kg/10a	移植後3日～10日 (ノビエの1.5葉期 まで)	湛水散 布	本剤の使用回 数...1回、ジメタメ リンを含む農薬の 総使用回数...2回 以内、プレトラク ロールを含む農薬 の総使用回数...2 回以内	協友アグ リ㈱
						関東以西の 普通期及び 早期栽培地 帯			移植後3日～7日 (ノビエの1.5葉期 まで)			

(1)つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作 物 名	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使 用 量	使 用 時 期	使 用 方 法	使 用 回 数	登 録 会 社
クミルロ ン・ペント キサゾン 剤	草笛ジャ ンボ	1-(2-クロロベンジル)-3-(1- メチル-1-フェニルエチル)クレ ア…15.0%、3-(4-クロロ-5- シクロペンチルオキシ-2-フルオ フェニル)-5-イソプロピリデン- 1,3-オキサゾリジン-2,4-ジシ オ…4.5%	そ の 他	移 植 水 稲	水田一年生雑草及びマツ バイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヘラ オモダカ(北海道)	全域の普通 期及び早期 栽培地帯	砂壌土 ～塩土	20個 (1kg)/1 0a	植代後～移植前4 日又は移植直後 ～移植後5日(ビ エ1葉期まで)	水田に 投げ入 れる。	本剤の使用回 数…1回、クミルロ ンを含む農薬の総 使用回数…2回以 内、ペントキサゾン を含む農薬の総使 用回数…2回以内	協友アグ リ㈱
					水田一年生雑草及びマツ バイ、ホタルイ、ミズガヤツリ(北 海道を除く)、ヘラオモダカ (北海道・東北)、クロクワイ (東北・関東・東山・東海、 近畿・中国・四国、九州)	北海道		10個 (500g)/ 10a	移植直後～移植 後5日(ビエ1葉期 まで)(移植後に使 用する除草剤との 体系で使用)			
						全域(北海道 を除く)の普 通期及び早 期栽培地帯			植代後～移植前4 日又は移植直後 ～移植後5日(ビ エ1葉期まで)(移植 後に使用する除 草剤との体系で使 用)			
クミルロ ン・ペント キサゾン 水和剤	草笛フロ アブル	1-(2-クロロベンジル)-3-(1- メチル-1-フェニルエチル)クレ ア…27.4%、3-(4-クロロ-5- シクロペンチルオキシ-2-フルオ フェニル)-5-イソプロピリデン- 1,3-オキサゾリジン-2,4-ジシ オ…8.2%	水 和 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑草及びマツ バイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヘラ オモダカ(北海道・東北)	全域の普通 期及び早期 栽培地帯	砂壌土 ～塩土	500ml/ 10a	植代時～移植前4 日又は移植直後 ～移植後5日(ビ エ1葉期まで、但し 近畿・中国・四国、 九州はビエ発生 始期まで)	原液湛 水散布	本剤の使用回 数…1回、クミルロ ンを含む農薬の総 使用回数…2回以 内、ペントキサゾン を含む農薬の総使 用回数…2回以内	協友アグ リ㈱
					水田一年生雑草及びマツ バイ、ホタルイ、ミズガヤツリ(北 海道を除く)、コウキヤガラ(九 州)、クロクワイ(東北・関東・ 東山・東海、近畿・中国・ 四国、九州)	北海道		300ml/ 10a(少 量散布)	移植直後～移植 後5日(ビエ1葉期 まで)(移植後に使 用する除草剤との 体系で使用)			
						全域(北海道 を除く)の普 通期及び早 期栽培地帯			植代後～移植前4 日又は移植直後 ～移植後5日(ビ エ1葉期まで)(移植 後に使用する除 草剤との体系で使 用)			
オキサジ ンクロメ ホン・クロ メブロッ プ・プロモ チド粒剤	黒帯1キ ロ粒剤	3-[1-(3,5-シクロロフェニル)- 1-メチルエチル]-3,4-ジヒド ロ-6-メチル-5-フェニル-2H- 1,3-オキサジン-4-オン… 0.60%、(RS)-2-(2,4-シクロ ロ-m-トリルオキシ)プロピオン ニド…3.5%、(RS)-2-プロ モ-N-(α , α -ジメチルベンジ ル)-3,3-ジメチルプロピルアミ ド…6.0%	粒 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑草及びマツ バイ、ホタルイ、ヘラオモダカ(北 海道)、ミズガヤツリ(北海道、 東北を除く)	北海道	塩土～ 塩土	1kg/10a	移植直後～移植 後20日(ビエ2.5葉 期まで)	湛水散 布	本剤の使用回 数…1回、オキサジ ンクロメホンを含む農 薬の総使用回 数…2回以内、クロ メブロップを含む農 薬の総使用回 数…2回以内、プロ モチドを含む農 薬の総使用回 数…2回以内	日本農薬 ㈱
						全域(北海道 及び近畿・中 国・四国の早 期栽培地帯 を除く)の普 通期及び早 期栽培地帯			移植直後～移植 後15日(ビエ2.5葉 期まで)			
オキサジ ンクロメ ホン・クロ メブロッ プ・プロモ チド水和 剤	黒帯フロ アブル	3-[1-(3,5-シクロロフェニル)- 1-メチルエチル]-3,4-ジヒド ロ-6-メチル-5-フェニル-2H- 1,3-オキサジン-4-オン… 1.2%、(RS)-2-(2,4-シクロ ロ-m-トリルオキシ)プロピオン ニド…7.0%、(RS)-2-プロモ N-(α , α -ジメチルベンジ ル)-3,3-ジメチルプロピルアミ ド…18.0%	水 和 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑草及びマツ バイ、ホタルイ、ヘラオモダカ(北 海道)、ミズガヤツリ(北海道 を除く)	北海道	塩土～ 塩土	500ml/ 10a	移植直後～移植 後20日(ビエ2.5葉 期まで)	手振り 原液湛 水散布	本剤の使用回 数…1回、オキサジ ンクロメホンを含む農 薬の総使用回 数…2回以内、クロ メブロップを含む農 薬の総使用回 数…2回以内、プロ モチドを含む農 薬の総使用回 数…2回以内	日本農薬 ㈱
						全域(北海道 及び近畿・中 国・四国の早 期栽培地帯 を除く)の普 通期及び早 期栽培地帯			移植直後～移植 後15日(ビエ2.5葉 期まで)			

(1)つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作 物 名	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使 用 量	使 用 時 期	使 用 方 法	使 用 回 数	登 録 会 社
イマゾス ルフロン ・ダイム ロン・メ フェナ セット 粒剤	STバトル 1キロ粒 剤	1-(2-クロロイタリル[1,2-a]ピ リジン-3-イルスルホニル)-3- (4,6-ジメチルピリジン-2-イ ル)尿素...0.90%, 1-(α , α -ジメチルベンジル)-3-(β - ナトリル)尿素...15.0%, 2- ベンゾチアゾール-2-イルオキシ -N-メチルアゼアニド... 10.0%	粒 剤	移植 水 稲	水田一年生雑草及びマツ バイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤ ツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、オ モダカ(北海道を除く)、クロ クワイ(北海道を除く)、セリ、 アオミドロ・藻類による表層 はく離(北陸を除く)、エゾノ サヤカサ、シズイ、コウキヤ ラ	北海道	砂壤土 ～粘土 (減水深 2cm/日 以下 但し、砂 壤土で は減水 深 1.5cm/ 日以下)	1kg/10a	移植後5～20日(/ ビエ2.5葉期まで)	湛水散 布	本剤の使用回 数...1回、イマゾス ルフロンを含む農 薬の総使用回 数...2回以内、ダイ ムロンを含む農薬 の総使用回数...3 回以内(育苗箱散 布は1回以内、本 田では2回以内)、メ フェナセットを含む 農薬の総使用回 数...2回以内	住化武田 農薬(株)
						東北、北陸、 関東・東山・ 東海の普通 期及び早期 栽培地帯	砂壤土 ～粘土 (減水深 2cm/日 以下)		移植後5～15日(/ ビエ2.5葉期まで)			
						近畿・中国・ 四国の早期 栽培地帯	砂壤土 ～粘土 (減水深 1cm/日 以下)					
						近畿・中国・ 四国の普通 期栽培地帯	砂壤土 ～粘土 (減水深 2cm/日 以下)		移植後5～17日(/ ビエ3葉期まで)			
						九州の早期 及び普通期 栽培地帯	砂壤土 ～粘土 (減水深 1.5cm/ 日以下)					
カフエン ストロ ール・シ クロ スル ファミ ロン・ダ イム ロン・ベ ンノビ シクロ ン 粒剤	サスケ ーラジ カル ジャン ボ	N,N-ジエチル-3-メチルスル ホニル-1H-1,2,4-トリアゾール -1-カルボキサリド...10.5%, 1-[2-(5-クロロピリルカルボ ニル)アミル]スルホニル]-3-(4,6- ジメチルピリジン-2-イル)尿 素...2.25%, 1-(α , α -ジ メチルベンジル)-3-(β -ナトリ ル)尿素...22.5%, 3-(2-クロ ロ-4-メチルベンジル)-2-フェ ニルチオビシクロ[3.2.1]オク タ-2- エン-4-オン...10.0%	粒 剤	移植 水 稲	水田一年生雑草及びマツ バイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤ ツリ(北海道を除く)、ヘラオモ ダカ(北海道、東北)、ヒルムシ ロ、セリ(北陸、九州を除く)、 アオミドロ・藻類による表層 はく離(九州を除く)	北海道、東北	壤土～ 粘土	小包装 (バツ ク)10個 (200g)/ 10a	移植後3～15日(/ ビエ2葉期まで)	水田に 小包装 (バツク) のまま 投げ入 れる。	本剤の使用回 数...1回、カフエン ストロールを含む農 薬の総使用回 数...1回、シクロ スルファミロンを含む 農薬の総使用回 数...1回、ダイム ロンを含む農薬の総 使用回数...3回以 内(育苗箱散布は1 回以内、本田では2 回以内)、ベンノビ シクロンを含む農 薬の総使用回 数...2回以内	BASFア グロ(株)
						北陸、近畿、 中国・四国、 九州の普通 期及び早期 栽培地帯			移植後3～12日(/ ビエ2葉期まで)			
						関東・東山・ 東海の普通 期及び早期 栽培地帯	砂壤土 ～粘土					
チアジ ニル・イ ンダ ノファン ・クロ メ プロ ップ・ベ ン スル フ ロ ン・メ チ ル 粒 剤	パイゲ ット ダイナ マ 粒 剤	3'-クロロ-4,4'-ジメチル- 1,2,3-チアジノ[5,4-b]ピ リジン-2-イルカルボキサリド...6.0%, (RS)- 2-[2-(3-クロロフェニル)-2,3- エポキシプロピル]-2-エチルイ ンダン-1,3-ジオン...0.46%, (RS)-2-(2,4-ジクロロ-m-トリ ルオキシ)アゾビオニアリド... 1.16%, メチル= α -(4,6-ジメ チルピリジン-2-イルカルボキ ルスルファミロン)-o-トルア ニド...0.25%	粒 剤	移植 水 稲	いもち病、水田一年生雑 草及びマツバイ、ホタルイ、ヘ ラオモダカ、ミズガヤツリ(東北)、 ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミ ドロ・藻類による表層はく離	北海道	壤土～ 粘土	3kg/10a	移植後5～20日(/ ビエ2.5葉期まで)	湛水散 布	本剤の使用回 数...1回、チアジ ニルを含む農薬の総 使用回数...3回以 内(育苗箱散布及 び側条施用は合計 1回以内、本田で は2回以内)、イ ンダノファンを含む 農薬の総使用回 数...2回以内、ク ロメプロップを含む 農薬の総使用回 数...2回以内、ベ ンスルファミロン を含む農薬の総 使用回数...2回以内	日本農薬 (株)
						東北			移植後5～15日(/ ビエ2.5葉期まで)			

[illegible]

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稻刈跡・畑作・野菜作・永年作物・非農耕地対象

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用作物名	適用雑草	適用場所 ・適用土壌	使用量・散布流量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	
イマザビル・グリホサートイソプロピルアミン塩液剤	リプロ液剤	イソプロピルアンモニウム(RS)-2-(4-イソプロピル-4-メチル-5-オキソ-2-イミダゾリル-2-イル)ニコチナート... 8.3%, イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホメチル)グリシナート... 23.0%	液剤	樹木等	一年生雑草及び多年生雑草	鉄道、工場敷地(タンクヤード等)、駐車場等	1~2L/10a、希釈水量100L/10a	雑草生育期(草丈30cm以下)	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	本剤の使用回数...2回以内、イマザビルを含む農薬の総使用回数...2回以内、グリホサートを含む農薬の総使用回数...3回以内	BASF770ロ麟
グリホサートイソプロピルアミン塩・ピラフルフェンエチル水和剤	クサキングエースフロアブル	イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホメチル)グリシナート...30.0%, エチル=2-クロロ-5-(4-クロロ-5-シフルオロメチル-1-メチルピラゾール-3-イル)-4-フルオロフェノキシアセート... 0.16%	水和剤	かんきつ りんご なし もも ぶどう だいこん キャベツ	一年生及び多年生雑草	-	400~600ml/10a、希釈水量100L/10a	雑草生育期(草丈30cm以下)但し、収穫7日前まで	雑草茎葉散布	本剤の使用回数...3回以内、グリホサートを含む農薬の総使用回数...3回以内、ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数...3回以内	興ニチナーサービス
				樹木等	一年生及び多年生雑草	公園、庭園、堤とう、道路、運動場、宅地、鉄道、のり面等	500~1000ml/10a、希釈水量100L/10a	雑草生育期(草丈50cm以下)	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	本剤の使用回数...3回以内、グリホサートを含む農薬の総使用回数...3回以内、ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数...3回以内	
				スギナ			1000~2000ml/10a、希釈水量100L/10a	雑草生育期(草丈30cm以下)			
グリホサートイソプロピルアミン塩・ピラフルフェンエチル水和剤	ネコンギクイックフロFL	イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホメチル)グリシナート...30.0%, エチル=2-クロロ-5-(4-クロロ-5-シフルオロメチル-1-メチルピラゾール-3-イル)-4-フルオロフェノキシアセート... 0.16%	水和剤	かんきつ りんご なし もも ぶどう だいこん キャベツ	一年生及び多年生雑草	-	0.4~0.6ml/m ² 、希釈水量100ml/m ²	雑草生育期(草丈30cm以下)但し、収穫7日前まで	雑草茎葉散布	本剤の使用回数...3回以内、グリホサートを含む農薬の総使用回数...3回以内、ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数...3回以内	レイナー薬品
				樹木等	一年生及び多年生雑草	公園、庭園、堤とう、道路、運動場、宅地、鉄道、のり面等	0.5~1ml/m ² 、希釈水量100ml/m ²	雑草生育期(草丈50cm以下)	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	本剤の使用回数...3回以内、グリホサートを含む農薬の総使用回数...3回以内、ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数...3回以内	
				スギナ			1~2ml/m ² 、希釈水量100ml/m ²	雑草生育期(草丈30cm以下)			

(2)つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用作物名	適用雑草	適用場所 ・適用土壌	使用量・散布液量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数			
グリホサートイソプロピルアミン塩液剤	三共クサトリキング	イソプロピルアンモニウムN-(ホスホノメチル)グリシナート・・・41.0%	液 剤	果樹類(キウ フルーツ、パイ ナップを除く)	一年生雑 草	-	250～500ml/10a、通 常散布50～ 100L/10a 少量散 布25～50L/10a	収穫7日前ま で(雑草生育 期:草丈30cm 以下)	雑草茎葉散 布	本剤の使用回数・・・ 3回以内、グリホサートを含む農薬の総使用回数・・・3回以内	北海三 共興		
					多年生雑 草		500～1000ml/10a、 通常散布50～ 100L/10a 少量散 布25～50L/10a						
					豆類(種実、 ただし、だい ず、らっかせ いを除く)		畑地一年 生雑草	250～500ml/10a、通 常散布50～ 100L/10a 少量散 布25～50L/10a		は種10日以前(雑草生育 期)		本剤の使用回数・・・ 1回、グリホサートを含む農薬の総使用回数・・・1回	
					だいず			は種後出芽 前まで(雑草 生育期:草丈 30cm以下)		本剤の使用回数・・・ 2回以内、グリホサートを含む農薬の総使用回数・・・2回以内			
					えだまめ			は種10日以前(雑草生育 期)		本剤の使用回数・・・ 1回、グリホサートを含む農薬の総使用回数・・・1回			
					大麦			250～500ml/10a、希 釈水量100L/10a		耕起10日以前(雑草生育 期)		本剤の使用回数・・・ 3回以内、グリホサートを含む農薬の総使用回数・・・3回以内	
					小麦			耕起10日前ま で(雑草生育 期:草丈30cm 以下)					
							畑地多年 生雑草	500～1000ml/10a、 希釈水量100L/10a					
					キャベツ		畑地一年 生雑草	250～500ml/10a、希 釈水量100L/10a		耕起7日前ま で(雑草生育 期)			
					はくさい			250～500ml/10a、通 常散布50～ 100L/10a 少量散 布25～50L/10a					
					だいこん			250～500ml/10a、希 釈水量100L/10a					
					ねぎ、たまね ぎ			250～500ml/10a、通 常散布50～ 100L/10a 少量散 布25～50L/10a		収穫30日前ま で(雑草生育 期)(定植後畦 間処理)			
					水田作物(水 稲を除く)		一年生雑 草	250～500ml/10a、希 釈水量100L/10a		耕起20～10 日前(雑草生 育期)		本剤の使用回数・・・ 1回、グリホサートを含む農薬の総使用回数・・・1回	
					移植水稻		水田刈跡					本剤の使用回数・・・ 1回、グリホサートを含む農薬の総使用回数・・・1回	
					直播水稻								
					水田作物(水 田刈跡)			耕起10日以前(雑草生育 期)		本剤の使用回数・・・ 1回、グリホサートを含む農薬の総使用回数・・・1回			
		多年生雑 草		500～1000ml/10a、 希釈水量100L/10a									

(2)つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用作物名	適用雑草	適用場所 ・適用土壌	使用量・散布液量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数		
グリホサートイソプロピルアミン塩液剤 つづき	三共クサトリキング	イソプロピルアンモニウム-N-(ホスホメチル)グリシナート・・・41.0%	液 剤	水田作物(水田畦畔)	一年生雑草	水田畦畔	250～500ml/10a、通常散布100L/10a 少量散布25L/10a	収穫14日前まで(雑草生育期:草丈30cm以下)	雑草茎葉散布	本剤の使用回数・・・2回以内、グリホサートを含む農薬の総使用回数・・・2回以内		
					多年生雑草		500～1000ml/10a、通常散布100L/10a 少量散布25L/10a					
				水田作物、畑作物(休耕田)	一年生雑草	休耕田	250～500ml/10a、通常散布50～100L/10a 少量散布25～50L/10a	雑草生育期(草丈50cm以下)				
					牧草	一年生及び多年生雑草	牧野、草地(更新・造成)	250～500ml/10a、少量散布25～50L/10a				は種10日前～は種当日(耕起整地後:雑草発生前期)
				樹木等	一年生雑草	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、鉄道、のり面等	250～500ml/10a、希釈水量50L/10a	更新・造成の10日以前(雑草生育期)	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	本剤の使用回数・・・1回、グリホサートを含む農薬の総使用回数・・・2回以内		
					一年生雑草		250～500ml/10a、希釈水量50L/10a					
					多年生雑草		500～1000ml/10a、希釈水量50L/10a					
				樹木等	一年生雑草	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、鉄道、のり面等	500ml/10a、通常散布100L/10a 少量散布25L/10a	雑草生育期	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	本剤の使用回数・・・3回以内、グリホサートを含む農薬の総使用回数・・・3回以内		
					多年生雑草		1000ml/10a、通常散布100L/10a 少量散布25L/10a					
					スキナ		2000ml/10a、少量散布25～50L/10a	生育盛期				
ターバシル・テトラピオン・テブチロン粒剤	ノンウィード粒剤	3-ターシャリーブチル-5-クロロ-6-メチルウラシル・・・2.5%、2,2,3,3-テトラフルオロプロピオン酸ナトリウム・・・4.0%、1-(5-tert-ブチル-1,3,4-チアジアゾール-2-イル)-1,3-ジメチル尿素・・・2.5%	粒 剤	樹木等	一年生雑草	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、鉄道等	7.5～15kg/10a	雑草発生前～雑草生育期(草丈30cm以下)	植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布	本剤の使用回数・・・1回、ターバシルを含む農薬の総使用回数・・・2回以内、テブチロンを含む農薬の総使用回数・・・3回以内	㈱日本クリンアンドガーデン	
イソウロン粒剤	クサキン粒剤、ハイキック粒剤	3-(5-ターシャリーブチル-3-イソオキサゾリル)-1,1-ジメチル尿素・・・1.0%	粒 剤	さとうきび(春植又は夏植)	畑地一年生雑草、ムラサキカバミ	～(全土壌)	6～8kg/10a(但し、砂土～砂壤土では2～4kg/10a)	植付後～発芽前	全面土壌散布	本剤の使用回数・・・1回、イソウロン粒剤を含む農薬の総使用回数・・・1回	㈱ニチノサービス、(株)ニチノ緑化	
								排土後又は中耕後				
				さとうきび(株出)								
樹木等	一年生雑草	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、鉄道等(全土壌)	15～25kg/10a	生育初期(草丈20cm以下)	植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布	本剤の使用回数・・・3回以内、イソウロン粒剤を含む農薬の総使用回数・・・3回以内						

(2)つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用作物名	適用雑草	適用場所 ・適用土壌	使用量・散布液量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	
グリホサートイソプロピルアミン塩・ピラフルフェンエチル水和剤	サンダーボルト007AL	イソプロピルアンモニウム-N-(ホスホメチル)グリシナート...1.2%, エチル=2-クロロ-5-(4-キシ-1-メチルピラゾール-3-イル)-4-フルオロフェニルセタート...0.0064%	水和剤	樹木等	一年生及び多年生雑草(スキナを除く)	宅地、駐車場、道路等	25ml/m ² 原液散布	雑草生育期(草丈50cm以下)	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	本剤の使用回数...3回以内、グリホサートを含む農薬の総使用回数...3回以内、ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数...3回以内	日本農薬㈱
DCBN粒剤	GFベンボール粒剤	2,6-ジクロロベンザミド...4.0%	粒剤	日本芝	ヒメクサ、スキナ、畑地多年生広葉雑草	-	10~20g/m ²	春期芝生育期(雑草発生前~生育初期)	局所散布	本剤の使用回数...1回、DCBN粒剤を含む農薬の総使用回数...1回	住化タケダ園芸㈱
					畑地一年生広葉雑草		10g/m ²				
					畑地一年生雑草		7.5~10g/m ²	秋期芝生育期(雑草発生前~生育初期)	全面均一散布		
				樹木等	スキナ	家の周り	10~20g/m ²	雑草生育初期~生育期	植栽地を除く樹木等の周辺地に全面均一散布	本剤の使用回数...3回以内、DCBN粒剤を含む農薬の総使用回数...3回以内	

日本帰化植物写真図鑑

清水矩宏・森田弘彦・廣田伸七／編著 B6判 548頁 本体価格 4,300円

●帰化植物630余種を1,700余点のカラー写真で紹介。飼料作物畑の雑草害と対策も解説

ヒエという植物

本書は、ヒエの植物としての側面、農耕地の雑草としての側面、食料としての側面など、多面的にヒエを解説した。15人の専門家が分担執筆。

藪野友三郎／監修
山口 裕文／編集
A5判 208ページ
本体 3,500円

全国農村教育協会
<http://www.zennokyo.co.jp>

〒110-0016 東京都台東区台東1-26-6
TEL03-3833-1821 FAX03-3833-1665