

新登録除草剤・植物成長調整剤一覧

農林水産省消費・安全局農産安全管理課
平成18年4月1日～平成18年10月30日

(1) 水稻

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用作 物名	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用量	使用時期	使用 方法	使用回数	登録会社
アニロホ ス・ダイム ロン・ベン スルフロン メチル粒 剤	ガスバ1キ ロ粒剤51	1-(α , α -ジメチルベン ジル)-3-(パラトリル)尿 素...4.5%, メチル= α - (4,6-ジメチルピリジン- 2-イルカルバモイルスルファ モイル)-o-トルアート... 0.51%, S-4-クロロ-N-イ ソプロピルカルバニロイルメ チル=0,0-ジメチル=ホスホ ロシチオアート...4.5%	粒 剤	移植水 稲	水田一年生雑草、マツバ イ、ホタルイ、ミズカヤツリ、ウ リカワ、ヒルムシロ(九州)、セ リ、アオミドロ・藻類による 表層はく離(近畿・中国・ 四国)	近畿・中国・ 四国、九州 の普通期栽 培地帯、九 州の早期栽 培地帯	壤土～埴 土	1kg/10a	移植後3～ 15日(ビエ 2.5葉期ま で)	湛水 散布	本剤の使用回 数...1回、アニロ ホスを含む農薬の 総使用回数...2 回以内、ダイムロ ンを含む農薬の総 使用回数...3回 以内(育苗箱散布 は1回以内、本田 では2回以内)、ベ ンスルフロンメ チルを含む農薬の 総使用回数...2 回以内	三共アグロ (株)、デュー ン(株)
シハロホッ プ・ベン ジシクロ ン・MCP B粒剤	カービー1 キロ粒剤	2-メチル-4-クロロフェノキシ 酢酸エチル...2.4%、ブ チル(R)-2-[4-(4-シ ノ-2-フルオロフェノキシ)フェ ノキシ]プロピオナート... 1.8%、3-(2-クロロ-4-メ シルベンゾイル)-2-フェニ ルチオビシクロ[3.2.1]オク タ-2-エン-4-オン... 2.0%	粒 剤	移植水 稲	水田一年生雑草、マツバ イ、ホタルイ、ミズカヤツリ、ウ リカワ(北陸、関東・東山・東 海、近畿・中国・四国)、ヒ ルムシロ(関東・東山・東 海、近畿・中国・四国、九 州)	北陸、関東 以西の普通 期及び早期 栽培地帯	砂壤土～ 埴土	1kg/10a	移植後20 ～30日(ビ エ3葉期ま で)[移植前 後の初期 除草剤によ る土壌処理 との体系で 使用]	湛水 散布	本剤の使用回 数...1回、シハロ ホップ・ベンジ シクロンを含む 農薬の総使用 回数...3回以内、 ベンジシクロン を含む農薬の総 使用回数...2回以 内、MCPBを含む 農薬の総使用回 数...2回以内	三共アグロ (株)、(株)エ ス・デー・エ ス・バイオテ ク、タウ・ケ ミカル日本(株)
オキサジ クロメホ ン・クロメ プロップ・ プロモブ チド・ベン スルフロン メチル粒 剤	ホームラン キングジャ ンボ、ゴウ ワンジャン ボ	(RS)-2-(2,4-ジクロロ m-トリルオキシ)プロピオン アミド...6.0%、(RS)- 2-プロモ-N-(α , α -ジ メチルベンジル)-3,3-ジメ チルブチルアミド... 12.0%、メチル= α -(4,6- ジメチルピリジン-2-イ ルカルバモイルスルファモイ ル)-o-トルアート... 1.5%、3-[1-(3,5-ジクロ ロフェニル)-1-メチルエチ ル]-3,4-ジヒドロ-6-メチ ル-5-フェニル-2H-1,3- オキサジン-4-オン... 1.2%	粒 剤	移植水 稲	水田一年生雑草、マツバ イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズカ ヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミ ドロ・藻類による表層はく 離	東北	壤土～埴 土	小包装 (バッグ)10 個 (500g)/1 0a	移植後1～ 15日(ビエ2 葉期まで)	水田 に小 包装 (バッグ) のまま 投げ 入れ る。	本剤の使用回 数...1回、オキサ ジクロメホンを含む 農薬の総使用回 数...2回以内、ク ロメプロップを含む 農薬の総使用回 数...2回以内、プ ロモブチドを含む 農薬の総使用回 数...2回以内、ベ ンスルフロンメ チルを含む農薬の 総使用回数...2 回以内	北興化学 工業(株)、デ ューン(株)、北 興産業(株)
オキサジ クロメホ ン・ベン スルフロン メチル・ベン ジシクロ ン粒剤	プラスワ ンジャンボ	メチル= α -(4,6-ジメチ ルピリジン-2-イルカルバ モイルスルファモイル)-o-ト ルアート...1.5%、3-[1- (3,5-ジクロロフェニル)-1- メチルエチル]-3,4-ジヒド ロ-6-メチル-5-フェニル- 2H-1,3-オキサジン-4- オン...1.2%、3-(2-クロ ロ-4-メチルベンゾイル)- 2-フェニルチオビシクロ [3.2.1]オクタ-2-エン-4- オン...4.0%	粒 剤	移植水 稲	水田一年生雑草、マツバ イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズカ ヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシ ロ、セリ	東北	壤土～埴 土	小包装 (バッグ)10 個 (500g)/1 0a	移植後1～ 15日(ビエ2 葉期まで)	水田 に小 包装 (バッグ) のまま 投げ 入れ る。	本剤の使用回 数...1回、オキサ ジクロメホンを含む 農薬の総使用回 数...2回以内、ベ ンスルフロンメ チルを含む農薬の 総使用回数...2 回以内、ベンジ シクロンを含む農 薬の総使用回 数...2回以内	北興化学 工業(株)、デ ューン(株)
オキサジ クロメホ ン・ベン スルフロン メチル・ベン ジシクロ ン水和剤	プラスワ ンプロアブル	メチル= α -(4,6-ジメチ ルピリジン-2-イルカルバ モイルスルファモイル)-o-ト ルアート...1.4%、3-[1- (3,5-ジクロロフェニル)-1- メチルエチル]-3,4-ジヒド ロ-6-メチル-5-フェニル- 2H-1,3-オキサジン-4- オン...1.2%、3-(2-クロ ロ-4-メチルベンゾイル)- 2-フェニルチオビシクロ [3.2.1]オクタ-2-エン-4- オン...4.0%	水 和 剤	移植水 稲	水田一年生雑草、マツバ イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズカ ヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシ ロ、セリ、アオミドロ・藻類に よる表層はく離	東北	壤土～埴 土	500ml /10a	移植直後 ～移植後 15日(ビエ 2.5葉期ま で)	原液 湛水 散布	本剤の使用回 数...1回、オキサ ジクロメホンを含む 農薬の総使用回 数...2回以内、ベ ンスルフロンメ チルを含む農薬の 総使用回数...2 回以内、ベンジ シクロンを含む農 薬の総使用回 数...2回以内	北興化学 工業(株)、デ ューン(株)

(1) 水稻つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用作 物名	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用量	使用時期	使用 方法	使用回数	登録会社
プレチラク ロール・ベ ンズルフロ ンメチル 粒剤	STゴロポ 1キロ粒剤 51	2-(2-クロロ-2',6'-ジエチル N-(2-プロポキシエチル) アゼトニリド...6.0%, メ チル=α-(4,6-ジメトキシ ピリミジン-2-イルカルハモ イルスルファモイル)-o-トル アト...0.51%	粒 剤	移植水 稲	水田一年生雑草、マツバ イ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガ ヤツリ、オモダカ、ヒルムシロ、 クロクワイ、セリ、アオミドロ・藻 類による表層はく離	北陸・関東・ 東山・東海 の早期栽培 地帯	壤土～埴 土(減水深 2cm/日以 下)	1kg/10a	移植後3～ 13日(ビエ の2.0葉期 まで)	湛水 散布	本剤の使用回 数...1回、プレチ ラクロールを含む 農薬の総使用回 数...2回以内、ベ ンズルフロンメチ ルを含む農薬の 総使用回数...2 回以内	住化武田 農薬㈱
						関東・東山・ 東海の普通 期栽培地帯		1kg/10a	移植後3～ 10日(ビエ の2.0葉期 まで)			
						近畿・中国・ 四国の早期 栽培地帯	壤土～埴 土(減水深 1cm/日以 下)	1kg/10a	移植後3～ 13日(ビエ の2.0葉期 まで)			
						近畿・中国・ 四国の普通 期栽培地帯			移植後3～ 10日(ビエ の2.0葉期 まで)			
						九州の早期 栽培地帯			移植後5～ 13日(ビエ の2.0葉期 まで)			
フェントラ ザミド・ベ ンゾフェ ナップ・ベ ンフレ ゼート粒 剤	バン チャー1キ ロ粒剤	2-[4-(2,4-ジクロロ-m トルオイル)-1,3-ジメチル ピラゾール-5-イルオキシ]- 4'-メチルアゼトフェノ... 8.0%, 2,3-ジビドロ- 3,3-ジメチルベンゾフラン -5-イル=エタンスルホナ ト...5.0%, 4-(2-クロロ フェニル)-N-シクロヘキシル -N-エチル-4,5-ジビドロ -5-オキソ-1H-テトラゾール -1-カルボキサミド... 3.0%	粒 剤	移植水 稲	水田一年生雑草、マツバ イ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガ ヤツリ(北海道を除く)、ヘラ オモダカ(北海道、東北)、 ヒルムシロ、セリ(近畿・中 国・四国)、アオミドロ・藻類 による表層はく離(北海 道、近畿・中国・四国、九 州)	北海道	壤土～埴 土	1kg/10a	移植後5～ 20日(ビエ 2.5葉期ま で)	湛水 散布	本剤の使用回 数...1回、フェント ラザミドを含む農 薬の総使用回 数...1回、ベンゾ フェナップを含む 農薬の総使用回 数...2回以内、ベ ンフレゼートを含 む農薬の総使用 回数...2回以内	ハイエルク ロップサイエ ンス㈱
						全域(北海 道、九州を 除く)の普通 期及び早期 栽培地帯			移植後5～ 15日(ビエ 2.5葉期ま で)			
						九州の普通 期及び早期 栽培地帯	砂壤土～ 埴土	1kg/10a	移植後5～ 15日(ビエ 2.5葉期ま で)			
フェントラ ザミド・ブ ロモブチ ド・ベンズ ルフロンメ チル水和 剤	バイエイレ ノバDX アップフロ アブル	(RS)-2-プロモ-N-(α, α-ジメチルベンジル)- 3,3-ジメチルアゾアミ ド...18.0%, メチル=α- (4,6-ジメトキシピリミジン 2-イルカルハモイルスルファ モイル)-o-トルアト... 1.4%, 4-(2-クロロフェ ニル)-N-シクロヘキシル-N- エチル-4,5-ジビドロ-5- オキソ-1H-テトラゾール -1-カルボキサミド...4.0%	水 和 剤	移植水 稲	水田一年生雑草、マツバ イ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミ ズガヤツリ(東北)、ウリカワ (北海道)、ヒルムシロ、セリ、 アオミドロ・藻類による表 層はく離	東北	壤土～埴 土	500ml /10a	移植後3～ 15日(ビエ 2.5葉期ま で)	原液 湛水 散布	本剤の使用回 数...1回、フェント ラザミドを含む農 薬の総使用回 数...1回、プロモ ブチドを含む農薬 の総使用回数...2 回以内、ベンズル フロンメチルを含 む農薬の総使用 回数...2回以内	ハイエルク ロップサイエ ンス㈱
						北海道		500ml /10a	移植後3～ 20日(ビエ 2.5葉期ま で)			
オキサジ アゾン・ク ロメブロッ プ水和剤	用心棒フ ロアブル	5-ターシャリーアチル-3- (2,4-ジクロロ-5-イソプロ ボキシフェニル)-1,3,4-オ キシアゾール-2(3H)-オ ン...6.7%, (RS)-2- (2,4-ジクロロ-m-トリオ キシ)プロピオンアミド... 6.7%	水 和 剤	移植水 稲	水田一年生雑草、マツバ イ、ホタルイ、アオミドロ・藻類 による表層はく離(北海 道を除く)	東北、北陸	砂壤土～ 埴土	300～ 500ml/1 0a	植代後～ 移植4日前 まで又は移 植直後～ 移植後5日 まで(ビエ1 葉期まで)	手振り 原液 湛水 散布	本剤の使用回 数...1回、オキサ ジアゾンを含む農 薬の総使用回 数...1回、クロメ ブロップを含む農 薬の総使用回数...2 回以内	ハイエルク ロップサイエ ンス㈱
						関東・東山・ 東海、近畿・ 中国・四国 の普通期及 び早期栽培 地帯	壤土～埴 土	300～ 500ml/1 0a				
						九州の普通 期及び早期 栽培地帯	砂壤土～ 埴土	500ml/1 0a				

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用作 物名	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	登録会社
オキサジ クロメホ ン・クロメ ブロップ・ プロモブ チド・ベン スルフロ ンメチル水 和剤	ゴウワンフ ロアブル	(RS)-2-(2,4-ジクロロ m-トリロキシ)プロピオン アミド・・・6.0%、(RS)- 2-プロモN-(α , α -ジ メチルベンジル)-3,3-ジメ チルブチルアミド・・・ 12.0%、メチル = α -(4,6- ジメチルピリジン-2-イ ルカルバモイルスルファモイ ル)-オートルート・・・ 1.4%、3-[1-(3,5-ジクロ ロフェニル)-1-メチルエチ ル]-3,4-ジヒドロ-6-メチ ル-5-フェニル-2H-1,3- オキサジン-4-オン・・・ 1.2%	水 和 剤	移植水 稲	水田一年生雑草、マツバ イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガ ヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミ ドロ・藻類による表層はく離	北海道	砂壤土～ 埴土	500ml/1 0a	移植直後 ～移植後 20日(ビエ 2.5薬期ま で)	原液 湛水 散布	本剤の使用回 数・・・1回、オキサ ジクロメホンを含む 農薬の総使用回 数・・・2回以内、ク ロメブロップを含む 農薬の総使用回 数・・・2回以内、プ ロモブチドを含む 農薬の総使用回 数・・・2回以内、ベン スルフロンメチ ルを含む農薬の 総使用回数・・・2 回以内	北興産業 ㈱
						東北		500ml/1 0a	移植直後 ～移植後 15日(ビエ 2.5薬期ま で)			
オキサジ クロメホ ン・クロメ ブロップ・ プロモブ チド・ベン スルフロ ンメチル水 和剤	ゴウワンフ ロアブル	(RS)-2-(2,4-ジクロロ m-トリロキシ)プロピオン アミド・・・6.0%、(RS)- 2-プロモN-(α , α -ジ メチルベンジル)-3,3-ジメ チルブチルアミド・・・ 12.0%、メチル = α -(4,6- ジメチルピリジン-2-イ ルカルバモイルスルファモイ ル)-オートルート・・・ 1.0%、3-[1-(3,5-ジクロ ロフェニル)-1-メチルエチ ル]-3,4-ジヒドロ-6-メチ ル-5-フェニル-2H-1,3- オキサジン-4-オン・・・ 1.2%	水 和 剤	移植水 稲	水田一年生雑草、マツバ イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガ ヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミ ドロ・藻類による表層はく 離(近畿・中国・四国、九 州)	北陸、関東 以西の普通 期及び早期 栽培地帯	砂壤土～ 埴土	500ml/1 0a	移植直後 ～移植後 15日(ビエ 2.5薬期ま で)	原液 湛水 散布	本剤の使用回 数・・・1回、オキサ ジクロメホンを含む 農薬の総使用回 数・・・2回以内、ク ロメブロップを含む 農薬の総使用回 数・・・2回以内、プ ロモブチドを含む 農薬の総使用回 数・・・2回以内、ベン スルフロンメチ ルを含む農薬の 総使用回数・・・2 回以内	北興産業 ㈱
オキサジ クロメホ ン・クロメ ブロップ・ プロモブ チド・ベン スルフロ ンメチル粒 剤	ゴウワン1 キロ粒剤5 1	(RS)-2-(2,4-ジクロロ m-トリロキシ)プロピオン アミド・・・3.0%、(RS)- 2-プロモN-(α , α -ジ メチルベンジル)-3,3-ジメ チルブチルアミド・・・ 6.0%、メチル = α -(4,6- ジメチルピリジン-2-イ ルカルバモイルスルファモイ ル)-オートルート・・・ 0.51%、3-[1-(3,5-ジク ロフェニル)-1-メチルエチ ル]-3,4-ジヒドロ-6-メチ ル-5-フェニル-2H-1,3- オキサジン-4-オン・・・ 0.80%	粒 剤	移植水 稲	水田一年生雑草、マツバ イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガ ヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミ ドロ・藻類による表層はく 離	北陸、関東・ 東山・東海、 近畿・中国・ 四国の普通 期及び早期 栽培地帯	埴土～埴 土	1kg/10a	移植後5～ 15日(ビエ 2.5薬期ま で)	湛水 散布	本剤の使用回 数・・・1回、オキサ ジクロメホンを含む 農薬の総使用回 数・・・2回以内、ク ロメブロップを含む 農薬の総使用回 数・・・2回以内、プ ロモブチドを含む 農薬の総使用回 数・・・2回以内、ベン スルフロンメチ ルを含む農薬の 総使用回数・・・2 回以内	北興産業 ㈱
						九州の普通 期及び早期 栽培地帯	砂壤土～ 埴土	1kg/10a				
オキサジ クロメホ ン・クロメ ブロップ・ プロモブ チド・ベン スルフロ ンメチル粒 剤	ゴウワン1 キロ粒剤7 5	(RS)-2-(2,4-ジクロロ m-トリロキシ)プロピオン アミド・・・3.0%、(RS)- 2-プロモN-(α , α -ジ メチルベンジル)-3,3-ジメ チルブチルアミド・・・ 6.0%、メチル = α -(4,6- ジメチルピリジン-2-イ ルカルバモイルスルファモイ ル)-オートルート・・・ 0.75%、3-[1-(3,5-ジク ロフェニル)-1-メチルエチ ル]-3,4-ジヒドロ-6-メチ ル-5-フェニル-2H-1,3- オキサジン-4-オン・・・ 0.80%	粒 剤	移植水 稲	水田一年生雑草、マツバ イ、ホタルイ、ウリカワ(北海 道)、ミズガヤツリ(東北)、ヘ ラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、 アオミドロ・藻類による表 層はく離(北海道)	北海道	埴土～埴 土	1kg/10a	移植後5～ 20日(ビエ 2.5薬期ま で)	湛水 散布	本剤の使用回 数・・・1回、オキサ ジクロメホンを含む 農薬の総使用回 数・・・2回以内、ク ロメブロップを含む 農薬の総使用回 数・・・2回以内、プ ロモブチドを含む 農薬の総使用回 数・・・2回以内、ベン スルフロンメチ ルを含む農薬の 総使用回数・・・2 回以内	北興産業 ㈱
						東北		1kg/10a	移植後5～ 15日(ビエ 2.5薬期ま で)			

(1) 水稻つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用作 物名	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用量	使用時期	使用 方法	使用回数	登録会社
イマノス ルフロ ン・ダイ ムロ ン・ビ リブ チカル ブ・メ フェ ナ セ ット水 和 剤	STロン ゲット フロ アブル	1-(2-クロロイタリル[1,2- a]ピリジン-3-イル)スルホ ニル-3-(4,6-ジメチルピ リジン-2-イル)尿素... 1.5%, 1-(α , α -ジメチ ルベンジル)-3-(ヘキサ リル)尿素...18.0%, O- 3-tert-ブチルフェニル =6-メチル-2-ピリジル(メ チル)チオカルバマート... 10.0%, 2-ベンゾチア ゾール-2-イルオキシ-N-メ チルアセトアニリド...8.0%	水 和 剤	移植水 稲	水田一年生雑草、マツバ イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガ ヤツリ(北海道を除く)、ヘ アオモタカ(東北)、ヒルムシロ (北陸を除く)、セリ、アオミ ドロ・藻類による表層はく 離(北陸を除く)	北海道	砂壤土～ 埴土(減水 深2cm/日 以下、但し、 砂壤土で は1.5cm/ 日以下)	500ml/1 0a	移植直後 ～移植後 20日(ビエ 2.5葉期ま で)	原液 湛水 散布 又は 水口 施用 (東北)	本剤の使用回 数...1回、イマノ スルフロ ンを含む農 薬の総使用回 数...2回以内、ダ イムロンを含む農 薬の総使用回 数...3回以内(育 苗箱散布は1回以 内、本田では2回 以内)、ビリブチカ ルブを含む農薬の 総使用回数...2 回以内、メフェナ セットを含む農薬 の総使用回数...2 回以内	住化武田 農薬㈱
						東北、北陸、 関東・東山・ 東海の普通 期栽培地帯	砂壤土～ 埴土(減水 深2cm/日 以下)	500ml/1 0a	移植直後 ～移植後 15日(ビエ 2.5葉期ま で)			
						関東・東山・ 東海の早期 栽培地帯	砂壤土～ 埴土(減水 深2cm/日 以下、但し、 砂壤土で は減水深 1cm/日以下)	500ml/1 0a				
						近畿・中国・ 四国の普通 期栽培地帯 及び九州の 早期栽培地 帯	砂壤土～ 埴土(減水 深1.5cm/ 日以下)	500ml/1 0a				
						近畿・中国・ 四国の早期 栽培地帯	埴土～埴 土(減水深 1cm/日以下)	500ml/1 0a				
						九州の普通 期栽培地帯	砂壤土～ 埴土(減水 深2cm/日 以下)	500・ /10a				
ジメタメ トリ ン・プレ チ クロ ール 粒 剤	STバー ー 粒 剤	2-メチルチオ-4-エチルア ミノ-6-(1,2-ジメチルプロ ピルアミノ)-s-トリアジ ン...0.10%, 2-クロロ- 2',6'-ジエチル-N-(2- プロポキシエチル)アセトア ニリド...2.0%	粒 剤	移植水 稲	水田一年生雑草、マツバ イ、ホタルイ、ヘアオモタカ、ミ ズガヤツリ、アオミドロ・藻類 による表層はく離	東北・北陸 以北	砂壤土～ 埴土(減水 深2cm/日 以下)(但 し、近畿・中 国・四国・ 九州では 砂壤土を 除く)	3kg/10a	移植後3日 ～10日(ビ エの1.5葉 期まで)	湛水 散布	本剤の使用回 数...1回、ジメタ メトリンを含む農 薬の総使用回数...2 回以内、プレチ クロールを含む農 薬の総使用回 数...2回以内	住化武田 農薬㈱
						関東以西の 普通期及び 早期栽培地 帯	砂壤土を 除く)	3kg/10a	移植後3日 ～7日(ビエ の1.5葉期 まで)			
オキサジ クロメ ホン・ク ロメ ブ ロ ッ プ・シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル・ペン ス ル フ ロ ン メ チ ル 粒 剤	カルテ ット 1キ ロ 粒 剤 51	(RS)-2-(2,4-ジクロロ- m-トリルオキシ)プロピオン アニリド...3.5%, メチル α -(4,6-ジメチルピ リジン-2-イル)カルバモイルス ルファミド...0.51%, プチ ル=[R]-2-[4-(4-シア 2-フルオロフェニル)フェ ニル]プロピオナート... 1.5%, 3-[1-(3,5-ジクロ ロフェニル)-1-メチルエチ ル]-3,4-ジヒドロ-6-メチ ル-5-フェニル-2H-1,3- オキサジン-4-オン... 0.60%	粒 剤	移植水 稲	水田一年生雑草、マツバ イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガ ヤツリ、ヒルムシロ、セリ(北陸 を除く)、アオミドロ・藻類に よる表層はく離	北陸、関東・ 東山・東海、 近畿・中国・ 四国の普通 期及び早期 栽培地帯	埴土～埴 土	1kg/10a	移植後5日 ～20日(ビ エ3葉期ま で)	湛水 散布	本剤の使用回 数...1回、オキサ ジクロメ ホンを含む農 薬の総使用回 数...2回以内、ク ロメブ ロップを含む農 薬の総使用回 数...2回以内、シ ハロホ ップブチ ルを含む農薬の 総使用回数...3 回以内、ペン スルフロ ンメチルを含む 農薬の総使用回 数...2回以内	北興化学 工業㈱

(1) 水稻つづき

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	登録会社
シハロホップ・ブチル・デニル・クロール・ペンシル・フロノメチル・粒剤	ビシント粒剤17	2-クロロ-N-(3-メチル-2-テニル)-2',6'-ジメチルアセトアニリド...0.70%, メチル=α-(4,6-ジメチルピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-o-トルアート...0.17%, プチル=(R)-2-[4-(4-シアノ-2-フルオロフェノキシ)フェノキシ]プロピオナート...0.60%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草、マツバ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離(関東・東山・東海)	北陸・関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯	壤土～埴土	3kg/10a	移植後5～20日(ビエ3葉期まで)	湛水散布	本剤の使用回数...1回、シハロホップ・ブチルを含む農薬の総使用回数...3回以内、デニル・クロールを含む農薬の総使用回数...2回以内、ペンシル・フロノメチルを含む農薬の総使用回数...2回以内	日本農薬株式会社、北興化学工業株式会社
						近畿・中国・四国の早期栽培地帯		3kg/10a				
						近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	砂壤土～埴土	3kg/10a				
						九州の普通期栽培地帯		3kg/10a	移植後5～17日(ビエ3葉期まで)			
イマノ・スルフロ・カフエンス・トロール・ダイムロ・ベンゾ・ビシクロ・水和剤	テッテイロアブル	1-(2-クロロミタゲ[1,2-a]ピリジン-3-イルスルホニル)-3-(4,6-ジメチルピリミジン-2-イル)尿素...1.7%, 1-(α, α-ジメチルベンジル)-3-(パラトリル)尿素...7.6%, N,N-ジエチル-3-メチルスルホニル-1H-1,2,4-トリアゾール-1-カルボキサミド...4.0%, 3-(2-クロロ-4-メチルベンジル)-2-フェニルチオビシクロ[3.2.1]オクタ-2-エン-4-オン...3.8%	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草、マツバ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ(近畿・中国・四国、九州)、アオミドロ・藻類による表層はく離(九州を除く)	北陸・関東以西の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～埴土	500ml/10a	移植後3日～12日(ビエ2葉期まで)	原液湛水散布	本剤の使用回数...1回、イマノ・スルフロを含む農薬の総使用回数...2回以内、カフエンス・トロールを含む農薬の総使用回数...1回、ダイムロを含む農薬の総使用回数...3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)、ベンゾ・ビシクロを含む農薬の総使用回数...2回以内	関エス・ディー・エス・バイオテック
オキサジクロメホン・ペンシル・フロノメチル・ベンゾ・ビシクロ・粒剤	プラスワン1キロ粒剤75	メチル=α-(4,6-ジメチルピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-o-トルアート...0.75%, 3-[1-(3,5-ジクロロフェニル)-1-メチルエチル]-3,4-ジヒドロ-6-メチル-5-フェニル-2H-1,3-オキサジン-4-オン...0.80%, 3-(2-クロロ-4-メチルベンジル)-2-フェニルチオビシクロ[3.2.1]オクタ-2-エン-4-オン...2.0%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草、マツバ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	東北	壤土～埴土	1kg/10a	移植後5日～15日(ビエ2.5葉期まで)	湛水散布	本剤の使用回数...1回、オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数...2回以内、ペンシル・フロノメチルを含む農薬の総使用回数...2回以内、ベンゾ・ビシクロを含む農薬の総使用回数...2回以内	北興化学工業株式会社、デューボン株式会社
オキサジクロメホン・ホームラン・キングL・ジャンボ・プロモブチド・ペンシル・フロノメチル・粒剤	ホクコーホームランキングLジャンボ、ゴウワンLジャンボ	(RS)-2-(2,4-ジクロロ-m-トリオキシ)プロピオンアミド...6.0%, (RS)-2-プロモ-N-(α, α-ジメチルベンジル)-3,3-ジメチルブチルアミド...12.0%, メチル=α-(4,6-ジメチルピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-o-トルアート...1.02%, 3-[1-(3,5-ジクロロフェニル)-1-メチルエチル]-3,4-ジヒドロ-6-メチル-5-フェニル-2H-1,3-オキサジン-4-オン...1.2%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草、マツバ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離(北陸・近畿・中国・四国、九州)	北陸	砂壤土～埴土	小包装(パック)10個(500g)/10a	移植後1日～12日(ビエ2葉期まで)	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。	本剤の使用回数...1回、オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数...2回以内、クロメブチドを含む農薬の総使用回数...2回以内、プロモブチドを含む農薬の総使用回数...2回以内、ペンシル・フロノメチルを含む農薬の総使用回数...2回以内	北興化学工業株式会社、デューボン株式会社、北興産業株式会社
						関東・東山・東海、九州の普通期及び早期栽培地帯	壤土～埴土	小包装(パック)10個(500g)/10a				
						近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	砂壤土～埴土	小包装(パック)10個(500g)/10a	移植後1日～12日(但し、砂壤土では移植後3日～12日)(ビエ2葉期まで)			

(1) 水稻つづき

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	登録会社
カフエントローラー・ダイムロン・ペンシルフロンメチル粒剤	クサトリエース粒剤17	1-(α , α -ジメチルベンジル)-3-(β -トリル)尿素...2.0%、メチル= α -(4,6-ジメチキシリジン)-2-イルカルバモイルスルファモイル- α -トルアト...0.17%、N,N-ジエチル-3-メチルスルホニル-1H-1,2,4-トリアゾール-1-カルボキサミド...1.0%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草、マツバ、ホタルイ、ウリカ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ(関東・東山・東海の普通期)、ヘラオモタガ(北陸)、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	北陸、関東・東山・東海の早期及び普通期栽培地帯	砂壤土～壇土	3kg/10a	移植後5～15日(ノビエ2.5葉期まで)	湛水散布	本剤の使用回数...1回、カフエントローラーを含む農薬の総使用回数...1回、ダイムロンを含む農薬の総使用回数...3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)、ペンシルフロンメチルを含む農薬の総使用回数...2回以内	三共アグロ(株)
					水田一年生雑草、マツバ、ホタルイ、ウリカ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ(九州の普通期を除く)、アオミドロ・藻類による表層はく離	近畿・中国・四国の早期及び普通期栽培地帯	壤土～壇土	3kg/10a				
						九州の早期及び普通期栽培地帯	砂壤土～壇土	3kg/10a				
オキサジクロメホン・ジメタマトリン・ピラノスルフロネエチル・ベンゾビシクロン粒剤	シリウスターボジャンボ	2-メチルチオ-4-エチルアミノ-6-(1,2-ジメチルプロピルアミド)-s-トリジン...2.0%、エチル=5-(4,6-ジメキシリジン)-2-イルカルバモイルスルファモイル-1-メチルピラゾール-4-カルボキシラート...1.0%、3-[1-(3,5-ジクロロフェニル)-1-メチルエチル]-3,4-ジヒドロ-6-メチル-5-フェニル-2H-1,3-オキサジン-4-オン...2.7%、3-(2-クロロ-4-メチルベンゾイル)-2-フェニルチオビシクロ[3.2.1]オクタ-2-エン-4-オン...6.7%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草、マツバ、ホタルイ、ウリカ、ミズガヤツリ、ヘラオモタガ(東北)、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	東北、関東・東山・東海の普通期栽培地帯	壇土～壇土	小包装(パック)10個 300g/10a	移植後5日～15日(ノビエ2.5葉期まで)	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。	本剤の使用回数...1回、オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数...2回以内、ジメタマトリンを含む農薬の総使用回数...2回以内、ピラノスルフロネエチルを含む農薬の総使用回数...1回、ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数...2回以内	日産化学工業(株)
オキサジクロメホン・ピラノスルフロネエチル・ベンゾビシクロン粒剤	シリウスいぶき1キロ粒剤	エチル=5-(4,6-ジメキシリジン)-2-イルカルバモイルスルファモイル-1-メチルピラゾール-4-カルボキシラート...0.30%、3-[1-(3,5-ジクロロフェニル)-1-メチルエチル]-3,4-ジヒドロ-6-メチル-5-フェニル-2H-1,3-オキサジン-4-オン...0.80%、3-(2-クロロ-4-メチルベンゾイル)-2-フェニルチオビシクロ[3.2.1]オクタ-2-エン-4-オン...2.0%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草、マツバ、ホタルイ、ウリカ、ミズガヤツリ、ヘラオモタガ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	東北	壇土～壇土	1kg/10a	移植後3～15日(ノビエ2.5葉期まで)	湛水散布	本剤の使用回数...1回、オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数...2回以内、ピラノスルフロネエチルを含む農薬の総使用回数...1回、ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数...2回以内	日産化学工業(株)
オキサジクロメホン・ピラノスルフロネエチル・ベンゾビシクロン粒剤	シリウスいぶきジャンボ	エチル=5-(4,6-ジメキシリジン)-2-イルカルバモイルスルファモイル-1-メチルピラゾール-4-カルボキシラート...0.30%、3-[1-(3,5-ジクロロフェニル)-1-メチルエチル]-3,4-ジヒドロ-6-メチル-5-フェニル-2H-1,3-オキサジン-4-オン...2.0%、3-(2-クロロ-4-メチルベンゾイル)-2-フェニルチオビシクロ[3.2.1]オクタ-2-エン-4-オン...6.7%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草、マツバ、ホタルイ、ウリカ、ミズガヤツリ、ヘラオモタガ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	東北	壇土～壇土	小包装(パック)10個 300g/10a	移植後3日～15日(ノビエ2.5葉期まで)	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。	本剤の使用回数...1回、オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数...2回以内、ピラノスルフロネエチルを含む農薬の総使用回数...1回、ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数...2回以内	日産化学工業(株)

(1) 水稲つづき


種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用作 物名	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用量	使用時期	使用 方法	使用回数	登録会社
オキサジ クロメホ ン・ピラゾ スルフロ ンエチル ベンゾビ シクロン水 和剤	シリウスい ぶき顆粒	エチル=5-(4,6-ジメチルベン ジリジン-2-イルカルバモ イルスルファモイル)-1-メチ ルピラゾール-4-カルボキ シラート...3.5%, 3-[1- (3,5-ジクロロフェニル)-1- メチルエチル]-3,4-ジヒド ロ-6-メチル-5-フェニル 2H-1,3-オキサジン-4- オン...10.0%, 3-(2-ク ロロ-4-メチルベンゾイ ル)-2-フェニルチオビシ クロ[3.2.1]オクタ-2-エン-4- オン...33.0%	水 和 剤	移植水 稲	水田一年生雑草、マツバ イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガ ヤツリ、ヘオモダカ、ヒルムシ ロ、セリ、アオミドロ・藻類に よる表層はく離	東北	壤土～塩 土	60g/10a	移植後3～ 15日(ノビエ 2.5葉期ま で)	湛水 散布	本剤の使用回 数...1回、オキサ ジクロメホンを含む 農薬の総使用回 数...2回以内、ピ ラゾスルフロネ チルを含む農薬の 総使用回数...1 回、ベンゾビシク ロンを含む農薬の 総使用回数...2回 以内	日産化学 工業㈱
カフエンス トロール・ ダイムロ ン・ペン スルフロ ンメチル ベン ゾビシクロ ン粒剤	シロノック 1キロ粒剤 51	1-(α , α -ジメチルベン ジリジン-3-(パラトリル)尿 素...6.0%, メチル= α - (4,6-ジメチルベンジリジン- 2-イルカルバモイルスル ファモイル)-オートルート... 0.51%, N,N-ジエチル- 3-メチルスルホニル-1H- 1,2,4-トリアゾール-1-カ ルボキサミド...3.0%, 3- (2-クロロ-4-メチルベンゾ イル)-2-フェニルチオビシ クロ[3.2.1]オクタ-2-エン- 4-オン...2.0%	粒 剤	移植水 稲	水田一年生雑草、マツバ イ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウ リカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミ ドロ・藻類による表層はく 離	北陸、関東 以西の普通 期及び早期 栽培地帯	砂壤土～ 塩土	1kg/10a	移植後3～ 15日(ノビエ 2.5葉期ま で)	湛水 散布	本剤の使用回 数...1回、カフエ ンストロールを含 む農薬の総使用 回数...1回、ダイ ムロンを含む農薬 の総使用回数...3 回以内(育苗箱散 布は1回以内、本 田では2回以内)、 ペンスルフロネ チルを含む農薬の 総使用回数...2 回以内、ベンゾビ シクロンを含む農 薬の総使用回 数...2回以内	三共アグロ ㈱、デュボ ン㈱、㈱エ ス・ディー・エ ス・バイオテッ ク
カフエンス トロール・ ダイムロ ン・ペン スルフロ ンメチル ベン ゾビシクロ ン粒剤	シロノック 1キロ粒剤 75	1-(α , α -ジメチルベン ジリジン-3-(パラトリル)尿 素...6.0%, メチル= α - (4,6-ジメチルベンジリジン- 2-イルカルバモイルスル ファモイル)-オートルート... 0.75%, N,N-ジエチル- 3-メチルスルホニル-1H- 1,2,4-トリアゾール-1-カ ルボキサミド...3.0%, 3- (2-クロロ-4-メチルベンゾ イル)-2-フェニルチオビシ クロ[3.2.1]オクタ-2-エン- 4-オン...2.0%	粒 剤	移植水 稲	水田一年生雑草、マツバ イ、ホタルイ、ヘオモダカ、ミ ズガヤツリ(東北)、ウリカワ、 ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻 類による表層はく離	北海道	砂壤土～ 塩土	1kg/10a	移植後3～ 20日(ノビエ 2.5葉期ま で)	湛水 散布	本剤の使用回 数...1回、カフエ ンストロールを含 む農薬の総使用 回数...1回、ダイ ムロンを含む農薬 の総使用回数...3 回以内(育苗箱散 布は1回以内、本 田では2回以内)、 ペンスルフロネ チルを含む農薬の 総使用回数...2 回以内、ベンゾビ シクロンを含む農 薬の総使用回 数...2回以内	三共アグロ ㈱、デュボ ン㈱、㈱エ ス・ディー・エ ス・バイオテッ ク
カフエンス トロール・ ダイムロ ン・ペン スルフロ ンメチル ベン ゾビシクロ ン粒剤	三共シロ ノックH ジャンボ	1-(α , α -ジメチルベン ジリジン-3-(パラトリル)尿 素...14.3%, メチル= α - (4,6-ジメチルベンジリジン- 2-イルカルバモイルスル ファモイル)-オートルート... 2.1%, N,N-ジエチル- 3-メチルスルホニル-1H- 1,2,4-トリアゾール-1-カ ルボキサミド... 7.1%, 3-(2-クロロ-4-メ チルベンゾイル)-2-フェ ニルチオビシクロ[3.2.1]オ クタ-2-エン-4-オン... 5.7%	粒 剤	移植水 稲	水田一年生雑草、マツバ イ、ホタルイ、ヘオモダカ、ミ ズガヤツリ(東北)、ウリカワ、 ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻 類による表層はく離	北海道	壤土～塩 土	小包装 (パック)10 個 (350g)/1 0a	移植後3～ 20日(ノビエ 2.5葉期ま で)	水田 に小 包装 (パック) のまま 投げ 入れ る。	本剤の使用回 数...1回、カフエ ンストロールを含 む農薬の総使用 回数...1回、ダイ ムロンを含む農薬 の総使用回数...3 回以内(育苗箱散 布は1回以内、本 田では2回以内)、 ペンスルフロネ チルを含む農薬の 総使用回数...2 回以内、ベンゾビ シクロンを含む農 薬の総使用回 数...2回以内	三共アグロ ㈱、デュボ ン㈱、㈱エ ス・ディー・エ ス・バイオテッ ク
カフエンス トロール・ ダイムロ ン・ペン スルフロ ンメチル ベン ゾビシクロ ン粒剤						東北	小包装 (パック)10 個 (350g)/1 0a	移植後3～ 15日(ノビエ 2.5葉期ま で)				

(1) 水稻つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用作 物名	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用量	使用時期	使用 方法	使用回数	登録会社
シメトリン・ モリネー ト・MCPB 粒剤	協友マメッ トSM粒剤	2-メチルチオ-4,6-ビス(エ チルアミノ)-s-トリアジ ン...1.5%、S-エチルヘキ サヒドロ-1H-アゼピン- 1-カーボチオエート... 8.0%、2-メチル-4-クロロ フェノキシ酢酸エチル... 0.80%	粒 剤	直播水 稲	水田一年生雑草、マツハ イ	関東以西	壤土～塩 土	3～ 4kg/10a	乾田直播 の入水後7 日～(ビエ 3.5葉期ま で(但し収 穫90日前ま で)	湛水 散布	本剤の使用回 数...1回、シメト リンを含む農薬の総 使用回数...2回 以内、モリネート を含む農薬の総使 用回数...2回以 内、MCPBを含む 農薬の総使用回 数...2回以内	協友アグリ (株)
				普通移 植水稲	水田一年生雑草、マツハ イ、ウリカワ、ホタルイ、ミズガ ヤツリ、ヘラオモダカ	北海道	砂壤土～ 塩土	3～ 4kg/10a	移植後15 ～20日(ビ エ2.5葉期ま で)			
						全域(北海 道を除く)の 普通期及び 早期栽培地 帯		3～ 4kg/10a	移植後10 ～20日(ビ エ3.5葉期ま で)			
					水田一年生雑草、マツハ イ、ヘラオモダカ、ホタルイ、ア オミドロ・藻類による表層 はく離	北海道		3～ 4kg/10a	移植後20 ～30日(ビ エ3.5葉期ま で)(移植前 後の初期 除草剤によ る土壌処理 との体系で 使用)			
				育苗移 植水稲	水田一年生雑草、マツハ イ、ウリカワ、ホタルイ、ミズガ ヤツリ、ヘラオモダカ	関東以西の 普通期及び 早期栽培地 帯		3～ 4kg/10a	移植後15 ～20日(ビ エ3.5葉期ま で)			
					ヒメホタルイ	関東・東山・ 東海の普通 期及び早期 栽培地帯		3～ 4kg/10a				
					水田一年生雑草、マツハ イ、オモダカ、ホタルイ、ウリカ ワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダ カ、アオミドロ・藻類による 表層はく離	北海道		3～ 4kg/10a	移植後20 ～30日(ビ エ2.5葉期ま で)(移植前 後の初期 除草剤によ る土壌処理 との体系で 使用)			
						全域(北海 道を除く)の 普通期及び 早期栽培地 帯		3～ 4kg/10a				
					ヒメホタルイ	関東・東山・ 東海の普通 期及び早期 栽培地帯		3～ 4kg/10a				
					クログワイ	東北、北陸、 関東・東山・ 東海の普通 期栽培地帯		3～ 4kg/10a				

(1) 水稲つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用作 物名	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用量	使用時期	使用 方法	使用回数	登録会社
ダイムロ ン・フェン トラザミド・ プロモブ チド・ベン スルフロ ンメチル粒 剤	バイエルラ イジキング1 キロ粒剤7 5	1-(α , α -ジメチルベン ジル)-3-(パラトリル)尿 素...4.5%, (RS)-2-ブ ロモ-N-(α , α -ジメチル ベンジル)-3,3-ジメチル ブチルアミド...9.0%, メチ ル= α -(4,6-ジメチルピ リミジン-2-イルカルバモイ ルスルファモイル)-オートル アート...0.75%, 4-(2-ク ロロフェニル)-N-シクロヘキ シル-N-エチル-4,5-ジヒ ドロ-5-オキソ-1H-テトラ ゾール-1-カルボキサミ ド...3.0%	粒剤	移植水 稲	水田一年生雑草、マツハ イ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミ ズガヤツリ(東北)、ウリカワ、 ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻 類による表層はく離	北海道	壤土～埴 土	1kg/10a	移植直後 ～移植後 20日(ノビエ 2.5葉期ま で)	湛水 散布	本剤の使用回 数...1回、ダイム ロンを含む農薬の 総使用回数...3 回以内(育苗箱散 布は1回以内、本 田では2回以内)、 フェントラザミドを 含む農薬の総使 用回数...1回、ブ ロモブチドを含む 農薬の総使用回 数...2回以内、ベ ンスルフロ ンメチルを含む農薬の 総使用回数...2 回以内	バイエルク ロップサイエ ンス㈱
						東北	砂壤土～ 埴土	1kg/10a	移植直後 ～移植後 15日(ノビエ 2.5葉期ま で)			



(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稻刈跡・畑作・野菜作・永年作物・緑地管理対象

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名(適用場所)	適用雑草・使用目的	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	会社名	
イソウロン・DBN粒剤	ネコソギA粒剤	3-(5-ターシャリーフチル-3-イソオキサゾリル)-1,1-ジメチル尿素・・・1.0%、2,6-ジクロロベンゾニトリル・・・2.0%	粒剤	樹木等	一年生雑草	10～15g/㎡	雑草発生前～生育初期(草丈20cm以下)	植栽地を除く樹木の周辺地に全面土壌散布	本剤の使用回数・・・3回以内、イソウロンを含む農薬の総使用回数・・・3回以内、DBNを含む農薬の総使用回数・・・3回以内	レインボー薬品株	
						15～30g/㎡	雑草生育期				
					多年生広葉雑草、スギナ	15～30g/㎡	雑草発生前～生育期				
トリフルラリン乳剤	STトレファノサイド乳剤	α, α, α-トリフルオロ-2,6-ジニトロ-N,N-ジプロピル-パラ-トルイジン・・・44.5%	乳剤	ぶどう、もも、なし	畑地一年生雑草(ツユクサ、カヤツグサ、キク・アブラナ科を除く)	300～400ml/10a、希釈水量100L/10a	春～秋期雑草発生前 但し、収穫30日前まで	土壌表面散布	本剤の使用回数・・・2回以内、トリフルラリンを含む農薬の総使用回数・・・2回以内	住化武田農薬株	
						りんご	300～400ml/10a、希釈水量100L/10a	春期雑草発生前 但し、収穫150日前まで	本剤の使用回数・・・1回、トリフルラリンを含む農薬の総使用回数・・・1回		
						キャベツ(直播栽培)	200～300ml/10a、希釈水量100L/10a	は種直後			
						キャベツ(移植栽培)	200～300ml/10a、希釈水量100L/10a	定植前(植穴掘前)			
							200～300ml/10a、希釈水量100L/10a	定植直後			畦間土壌表面散布
						はくさい(直播栽培)	200～300ml/10a、希釈水量100L/10a	は種直後			土壌表面散布
						はくさい(移植栽培)	200～300ml/10a、希釈水量100L/10a	定植前(植穴掘前)			
	200～300ml/10a、希釈水量100L/10a	定植直後	畦間土壌表面散布								

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稲刈跡・畑作・野菜作・永年作物・緑地管理対象つづき

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名(適用場所)	適用雑草・使用目的	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	会社名	
トリフルラリン乳剤つづき	STトレファノサイド乳剤	α, α, α -トリフルオロ-2,6-ジニトロ-N,N-ジプロピル-パラ-トルイジン... 44.5%	乳剤	なたね	畑地一年生雑草(ツユクサ、カヤツクサ、キク・アブラナ科を除く)	200～300ml/10a、希釈水量 100L/10a	は種直後	土壌表面散布	本剤の使用回数...1回、トリフルラリンを含む農薬の総使用回数...1回	住化武田農業(株)	
						200～300ml/10a、希釈水量 100L/10a	定植前(植穴掘前)				
						200～300ml/10a、希釈水量 100L/10a	定植直後	畦間土壌表面散布			
				ねぎ、わけぎ	200～300ml/10a、希釈水量 100L/10a		土壌表面散布				
					トマト(露地栽培)、ミニトマト(露地栽培)、ピーマン(露地栽培)、とうがらし類(露地栽培)	200～300ml/10a、希釈水量 100L/10a	定植前(植穴掘前)				
						200～300ml/10a、希釈水量 100L/10a	定植直後	畦間土壌表面散布			
				らっきょう(露地栽培)		200～300ml/10a、希釈水量 100L/10a	植付後、春期雑草発生前 但し、収穫120日前まで	土壌表面散布			本剤の使用回数...2回以内、トリフルラリンを含む農薬の総使用回数...2回以内
					すいか(トンネル・マルチ栽培)	200～300ml/10a、希釈水量 100L/10a	定植前(植穴掘前)(マルチ前)				
						200～300ml/10a、希釈水量 100L/10a	収穫45日前までの生育期(トンネル除去前)	畦間土壌表面散布			
				すいか(露地栽培)	200～300ml/10a、希釈水量 100L/10a	定植キャップ後 但し、収穫45日前まで	土壌表面散布				

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稻刈跡・畑作・野菜作・永年作物・緑地管理対象つづき

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名 (適用場所)	適用雑草・使用 目的	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	会社名	
トリフル ラリン 乳剤つ づき	STトレ ファノサ イド乳剤	α, α, α -トリフルオロ- 2,6-ジニトロ-N,N-ジプロ ピル-パラ-トルイジン... 44.5%	乳 剤	メロン(露地栽培 (トンネル・マル チ栽培))	畑地一年生雑 草(ツユクサ、カヤツ グサ、キク・アブラナ 科を除く)	150～ 200ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	定植前(植穴 掘前)(マルチ 前)	土壌表面 散布	本剤の使用回数...2 回以内、トリフルラリン を含む農薬の総使用 回数...2回以内	住化武田農薬 ㈱	
						200～ 300ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	収穫45日前 までの生育 期(トンネル除 去前)	畦間土壌 表面散布			
						150～ 200ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	定植前(植穴 掘前)	土壌表面 散布			本剤の使用回数...1 回、トリフルラリンを含 む農薬の総使用回 数...1回
						200～ 250ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	は種直後				
						200～ 250ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	定植前(植穴 掘前)				
						200～ 250ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	定植直後	畦間土壌 表面散布			
				しろり(露 地栽培)		150～ 200ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	定植前(植穴 掘前)	土壌表面 散布	本剤の使用回数...1 回、トリフルラリンを含 む農薬の総使用回 数...1回		
				きゅうり(露 地栽培(直 播栽培))		200～ 250ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	は種直後				
				きゅうり(露 地栽培(移 植栽培))		200～ 250ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	定植前(植穴 掘前)				
				なす(露地 栽培)		200～ 300ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	定植前(植穴 掘前)	土壌表面 散布			
実えんどう (露地栽 培)、さやえ んどう(露地 栽培)		300ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	は種直後								
さやいんげ ん(露地栽 培)		200～ 300ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a									
さやいんげ ん(露地・マル チ栽培)		200～ 300ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	は種前(マルチ 前)								

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稲刈跡・畑作・野菜作・永年作物・緑地管理対象つづき

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名 (適用場所)	適用雑草・使用 目的	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	会社名	
トリフル ラリン 乳剤つ づき	STトレ ファノサ イド乳剤	α, α, α -トリフルオロ 2,6-ジニトロ-N,N-ジプロ ピル-パラートルイジン... 44.5%	乳 剤	だいこん(露 地栽培)、は つかだいこ ん(露地栽 培)	畑地一年生雑 草(ツユクサ、カヤツ クサ、キク・アブラナ 科を除く)	150～ 200ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	は種直後	土壌表面 散布	本剤の使用回数...1 回、トリフルラリンを含 む農薬の総使用回 数...1回	住化武田農薬 ㈱	
				にんじん、 ごぼう(露地 栽培)、葉ご ぼう(露地栽 培)		200～ 300ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a					
				しょうが		200～ 300ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a					植付直後
				たまねぎ(本 畑)		200～ 300ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	定植後 但 し、収穫75日 前まで				本剤の使用回数...2 回以内、トリフルラリン を含む農薬の総使用 回数...2回以内
				アスパラガス		200～ 300ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	萌芽前、収穫 打切後(雑草 発生前)				本剤の使用回数...1 回、トリフルラリンを含 む農薬の総使用回 数...1回
				かんしよ		200～ 300ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	植付直後				
				さといも		300～ 400ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	植付後(マルチ 前) 但し、植 付7日後まで				
				やまのい も、やまの いも(むかご)		200～ 300ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	植付直後				生育初期 但 し、植付30日 後まで
				だいず、え だまめ		200～ 300ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	は種直後				

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稲刈跡・畑作・野菜作・永年作物・緑地管理対象つづき

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名 (適用場所)	適用雑草・使用 目的	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	会社名
トリフル ラリン 乳剤つ づき	STトレ ファノサ イド乳剤	α, α, α -トリフルオロ 2,6-ジニトロ-N,N-ジ'プロ ビル-パラ-トルイジン... 44.5%	乳 剤	らっかせい	畑地一年生雑 草(ツユクサ、カヤツ グサ、キク・アブラナ 科を除く)	200～ 300ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	は種直後	土壌表面 散布	本剤の使用回数...1 回、トリフルラリンを含 む農薬の総使用回 数...1回	住化武田農薬 ㈱
				なばな(移植 栽培)		200ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	定植直後	畦間土壌 表面散布		
				なばな類(直 播栽培)、非 結球あぶら な科葉菜類		150～ 200ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	は種直後	土壌表面 散布		
				かぶ		150ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a				
				食用べにば な(花)		300ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a				
				みつば、べ にばないん げん		300ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	は種後発芽 前			
				ひまわり(種 子)		200～ 300ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a				
				葉しょうが		200～ 300ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	植付直後			
				はなっこりー (移植栽培)		200～ 300ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	定植前(植穴 掘前)	本剤の使用回数...1 回、トリフルラリンを含 む農薬の総使用回 数...2回以内(定植前 は1回以内、定植後は 1回以内)		
		200～ 300ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	定植後 但 し、収穫21日 前まで	畦間土壌 表面散布						

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稲刈跡・畑作・野菜作・永年作物・緑地管理対象つづき

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名 (適用場所)	適用雑草・使用 目的	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	会社名
トリフル ラリン 乳剤つ づき	STトレ ファノサ イド乳剤	α, α, α -トリフルオロ- 2,6-ジニトロ-N,N-ジ'プロ ピル-ヘパールトルイジン... 44.5%	乳 剤	まくわうり(露 地栽培(トンネ ル・マルチ栽 培))	畑地一年生雑 草(ツユクサ、カヤツ グサ、キク・アブラナ 科を除く)	200～ 300ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	定植前(植穴 掘前)(マルチ 前)	土壌表面 散布	本剤の使用回数...1 回、トリフルラリンを含 む農薬の総使用回 数...2回以内(定植前 は1回以内、生育期は 1回以内)	住化武田農薬 (株)
						200～ 300ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	収穫45日前 までの生育 期(トンネル除 去前)	畦間土壌 表面散布		
					こんにゃく	200～ 300ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	植付直後、中 耕培土直後 (萌芽前)	土壌表面 散布	本剤の使用回数...2 回以内、トリフルラリン を含む農薬の総使用 回数...2回以内	
					茶	300～ 400ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	1番茶発芽 前、摘採後 (雑草発生前) 但し、摘採40 日前まで			
					桑(苗床)	200～ 300ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	は種後、伏込 後(挿木)		本剤の使用回数...1 回、トリフルラリンを含 む農薬の総使用回 数...1回	
					桑(本畑)	300～ 400ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	桑発芽前、春 切後、夏切後 (雑草発生前)			
					ゆり、チューリッ プ、しゃくや く	200～ 300ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	植付後～萌 芽前			
					きく(露地栽 培)	200～ 300ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	定植後	畦間土壌 表面散布		
					たばこ	200～ 250ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	大土寄直後		本剤の使用回数...2 回以内、トリフルラリン を含む農薬の総使用 回数...2回以内	
					樹木類	200～ 300ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	植付後、生育 期(雑草発生前)	畦間・株間 土壌表面 散布		

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稲刈跡・畑作・野菜作・永年作物・緑地管理対象につき

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名(適用場所)	適用雑草・使用目的	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	会社名	
トリフル ラリン 乳剤つ づき	STトレ ファノサ イド乳剤	α, α, α -トリフルオロ- 2,6-ジニトロ-N,N-ジプロ ビル-パラ-トルイジン... 44.5%	乳 剤	林木苗(す ぎ・ひのき・ あかまつ・か らまつ(播種 床))	畑地一年生雑 草(ツユクサ、カヤツ グサ、キク・アブラナ 科を除く)	300ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	は種後～生 育中	土壌表面 散布	本剤の使用回数...2 回以内、トリフルラリン を含む農薬の総使用 回数...2回以内	住化武田農薬 株	
				林木苗(す ぎ・ひのき・ あかまつ・か らまつ(床替 床))		300ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	床替後～生 育中				
				直播水稲	ノビエ	300ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	乾田直播の は種後発芽 前(ノビエ発生 前)	乾田状態 で土壌表 面散布	本剤の使用回数...1 回、トリフルラリンを含 む農薬の総使用回 数...1回		
				麦類	畑地一年生雑 草(ツユクサ、カヤツ グサ、キク・アブラナ 科を除く)	200～ 300ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	は種後発芽 前	土壌表面 散布	本剤の使用回数...2 回以内、トリフルラリン を含む農薬の総使用 回数...2回以内		
				あずき		200～ 300ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a					
				にんにく		300ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	植付後、春期 中耕除草後 但し、収穫90 日前まで		本剤の使用回数...2 回以内、トリフルラリン を含む農薬の総使用 回数...2回以内		
						300ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	植付前(マルチ 前)		本剤の使用回数...1 回、トリフルラリンを含 む農薬の総使用回 数...2回以内		
				いんげんま め	畑地一年生イ ネ科雑草	200～ 300ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	は種後6日～ 発芽2日前ま で		本剤の使用回数...1 回、トリフルラリンを含 む農薬の総使用回 数...1回		
	ブロッコリー	畑地一年生雑 草(ツユクサ、カヤツ グサ、キク・アブラナ 科を除く)	200～ 300ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	定植前(植穴 掘前)							
	樹木等	一年生雑草(ツ ユクサ、カヤツグサ、キ ク・アブラナ科を除 く)	300～ 400ml/1 0a、希釈 水量 100L/10 a	雑草発生前	植栽地を 除く樹木等 の周辺地 に全面土 壌散布	本剤の使用回数...3 回以内、トリフルラリン を含む農薬の総使用 回数...3回以内					

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稲刈跡・畑作・野菜作・永年作物・緑地管理対象つぎ

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名(適用場所)	適用雑草・使用目的	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	会社名
プロマシル粉粒剤	快速除草、オールキラースピードX微粒剤	5-プロモ-3-セコンタリーブチル-6-メチルウラシル...1.0%	粉粒剤	樹木等	一年生雑草及び多年生広葉雑草	15～30g/m ²	雑草生育初期(草丈20cm以下)	植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布又は雑草茎葉散布	本剤の使用回数...2回以内、プロマシルを含む農薬の総使用回数...2回以内	丸和ハイオケミカル(株)、ファミラー(株)
グリホサートイソプロピルアミン塩液剤	グリホキシングシャワー	イソプロピルアンモニウムN-(ホスホノメチル)グリシナート...1.0%	液剤	樹木等	一年生雑草	25～40・/1m ² (原液散布)	雑草生育期(草丈30cm以下)	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	本剤の使用回数...3回以内、グリホサートを含む農薬の総使用回数...3回以内	㈱シンスイ
イソウロン・DBN粒剤	キレイジャン粒剤	3-(5-ターシャリーブチル-3-イソオキサゾール)-1,1-ジメチル尿素...1.0%、2,6-ジクロロベンゾニトリル...2.0%	粒剤	樹木等	一年生雑草	10～15kg/10a	雑草発生前～生育初期(草丈20cm以下)	植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布	本剤の使用回数...3回以内、イソウロンを含む農薬の総使用回数...3回以内、DBNを含む農薬の総使用回数...3回以内	日本農薬(株)
					一年生雑草	15～30kg/10a	雑草生育期			
					多年生広葉雑草、スキナ	15～30kg/10a	雑草発生前～生育期			
グリホサートカリウム塩液剤	ラウンドアップKロード	カリウムN-(ホスホノメチル)グリシナート...52.0%	液剤	かんきつ、りんご、なし、ぶどう	一年生雑草	250～500ml/10a、通常散布50～100L/10a、少量散布25～50L/10a	雑草生育期但し、収穫7日前まで	雑草茎葉散布	本剤の使用回数...3回以内、グリホサートを含む農薬の総使用回数...3回以内	日産化学工業(株)
					多年生雑草	500～1000ml/10a、通常散布50～100L/10a、少量散布25～50L/10a				
				水田作物(水田畦畔)	一年生及び多年生雑草(スキナを除く)	250～500ml/10a、通常散布50～100L/10a、少量散布25～50L/10a	雑草生育期但し、収穫14日前まで		本剤の使用回数...2回以内、グリホサートを含む農薬の総使用回数...2回以内	

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稲刈跡・畑作・野菜作・永年作物・緑地管理対象つづき

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名(適用場所)	適用雑草・使用目的	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	会社名
グリホサート カリウム 塩液剤 つづき	ラウンド アップK ロード	カリウム=N-(ホスホノメチル) グリシナート...52.0%	液 剤	水田作物、 畑作物(休 耕田)	一年生及び多 年生雑草(スキナ を除く)	250～ 500ml/1 0a、通常 散布50 ～ 100L/10 a、少量 散布25 ～ 50L/10a	雑草生育期	雑草茎葉 散布	本剤の使用回数...2 回以内、グリホサート を含む農薬の総使用 回数...2回以内	日産化学工業 (株)
				樹木等	一年生及び多 年生雑草	500～ 1000ml/ 10a、通 常散布 50～ 100L/10 a、少量 散布25 ～ 50L/10a		植栽地を 除く樹木等 の周辺地 に雑草茎 葉散布	本剤の使用回数...3 回以内、グリホサート を含む農薬の総使用 回数...3回以内	
					スキナ	1500～ 2000ml/ 10a、通 常散布 50～ 100L/10 a、少量 散布25 ～ 50L/10a	生育期			
					クズ等のつる性 多年生雑草、サ サ類	1000～ 2000ml/ 10a、通 常散布 50～ 100L/10 a、少量 散布25 ～ 50L/10a				
グリホ サート カリウム 塩液剤	ラウンド アップ マックス ロード	カリウム=N-(ホスホノメチル) グリシナート...48.0%	液 剤	かんきつ、り んご、なし、 ぶどう	一年生雑草	200～ 500ml/1 0a、通常 散布50 ～ 100L/10 a、少量 散布25 ～ 50L/10a	収穫7日前ま で(雑草生育 期)	雑草木茎 葉散布	本剤の使用回数...3 回以内、グリホサート を含む農薬の総使用 回数...3回以内	
					多年生雑草	500～ 1000ml/ 10a、通 常散布 50～ 100L/10 a、少量 散布25 ～ 50L/10a				

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稻刈跡・畑作・野菜作・永年作物・緑地管理対象つづき

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名 (適用場所)	適用雑草・使用 目的	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	会社名		
グリホ サート カリウム 塩液剤 つづき	ラウンド アップ マックス ロード	カリウム=N-(ホスホノメチル) グリシナート・・・48.0%	液 剤	水田作物 (水田畦畔)	一年生雑草及 び多年生雑草	200～ 500ml/1 0a、少量 散布25 ～ 50L/10a	収穫14日前 まで(雑草生 育期)	雑草木茎 葉散布	本剤の使用回数・・・2 回以内、グリホサート を含む農薬の総使用 回数・・・2回以内	日産化学工業 (株)		
					スギナ	1500～ 2000ml/ 10a、通 常散布 50～ 100L/10 a						
				水田作物、 畑作物(休 耕田)	一年生雑草	200～ 500ml/1 0a、少量 散布25 ～ 50L/10a	雑草生育期					
					多年生雑草	500～ 1000ml/ 10a、少 量散布 25～ 50L/10a						
				樹木等	一年生雑草	200～ 500ml/1 0a、通常 散布50 ～ 100L/10 a、少量 散布25 ～ 50L/10a		植栽地を 除く樹木等 の周辺地 に雑草木 茎葉散布			本剤の使用回数・・・3 回以内、グリホサート を含む農薬の総使用 回数・・・3回以内	
					多年生雑草	500～ 1000ml/ 10a、通 常散布 50～ 100L/10 a、少量 散布25 ～ 50L/10a						
				スギナ	1500～ 2000ml/ 10a、通 常散布 50～ 100L/10 a							

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稲刈跡・畑作・野菜作・永年作物・緑地管理対象つづき

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名(適用場所)	適用雑草・使用目的	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	会社名
レナシル・PAC水和剤	レナパシク顆粒水和剤	3-シクロヘキシル-5,6-トリメチレンウラシル・・・40.0% 1-フェニル-4-アミノ-5-クロロピリジン-6・・・30.0%	水和剤	てんさい(移植栽培)	畑地一年生雑草	200～300g/10a、希釈水量50～100L/10a	定植活着後、中耕後(雑草発生始期)但し、収穫60日前まで	雑草茎葉散布又は全面土壌散布	本剤の使用回数・・・2回以内、レナシルを含む農薬の総使用回数・・・2回以内、PACを含む農薬の総使用回数・・・2回以内	北興化学工業(株)、丸和バイオケミカル(株)、BASFアグロ(株)、デュボン(株)
				てんさい(直播栽培)	畑地一年生雑草	200g/10a、希釈水量100L/10a	本葉2葉期			
						200～300g/10a、希釈水量100L/10a	中耕後(雑草発生始期)但し、収穫60日前まで			
				日本芝	一年生雑草	200～300g/10a、希釈水量200～300L/10a	雑草発生前～始期	全面土壌散布		
ベンプレセート水和剤	フルスロット顆粒水和剤	2,3-ジヒドロ-3,3-ジメチルヘンソフラン-5-イル=エタンスルホナート・・・30.0%	水和剤	西洋芝(ヘントグラス)	スズメノカタビラ	200～300g/10a、希釈水量100～200L/10a	春期芝生育期(雑草発生初期～3葉期)	雑草茎葉散布	本剤の使用回数・・・2回以内、ベンプレセートを含む農薬の総使用回数・・・2回以内	日本曹達(株)
					一年生イネ科雑草	100～200g/10a、希釈水量100～200L/10a	秋期芝生育期(雑草発生初期～3葉期)			
プロマシル粒剤	ウィードキラー粒剤、ネコソギトップX粒剤	5-プロモ-3-セコンダリーフチル-6-メチルウラシル・・・3.0%	粒剤	樹木等	一年生雑草	5～10kg/10a	雑草生育期(草丈30cm以下)	植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布	本剤の使用回数・・・1回、プロマシルを含む農薬の総使用回数・・・1回	関エニカス、レインボー薬品(株)
					多年生雑草	15～25kg/10a	雑草生育初期(草丈20cm以下)			
ジメテナミド乳剤	フィールドスター乳剤	(RS)-2-クロロ-N-(2,4-ジメチル-3-チエニル)-N-(2-メトキシ-1-メチルエチル)アゼアミド・・・79.4%	乳剤	キャベツ	畑地一年生雑草(アカサ科・アブラナ科・タデ科を除く)	75～100ml/10a、希釈水量100L/10a	定植後 雑草発生前(定植後10日まで)	全面土壌散布	本剤の使用回数・・・1回、ジメテナミドを含む農薬の総使用回数・・・1回	BASFジャパン(株)
					だいず、とうもろこし、飼料用とうもろこし	100～150ml/10a、希釈水量100L/10a	は種後発芽前(雑草発生前)			