

平成18年度水稻作関係除草剤試験成績概要

財団法人 日本植物調節剤研究協会

平成18年度水稻作関係除草剤試験成績中央検討会は、平成18年12月7日、8日の2日間、東京ガーデンパレスにおいて、適1試験成績検討会は、これに先立ち平成18年10月17日 台東1丁目区民館にて開催された。ここに、これら検討会における判定結果を報告する。

1) 第一次適用性試験(適1)は、北海道地域(植調北海道試験地)、東北地域(植調古川試験地)、北陸地域(植調新潟試験地)、関東地域(植調研究所)、近畿・中国・四国

地域(植調滋賀試験地)、九州地域(植調福岡試験地)の全国6地域および砂壤土(植調霞ヶ浦試験地)で44薬剤(のべ269点)について実施した。その判定結果は、第2表のとおりである。

2) 第二次適用性試験(適2)は、のべ505剤(総点数2,549点)であり、その内訳を第1表にまとめた。これら適2試験の判定結果は第3表のとおりであり、「実・継」と判定された薬剤の使用基準を後に掲載した。

第1表 平成18年度適2試験実施点数

A-1 移植栽培(一発処理)	134 剤 1,254 点	A-4 特殊雑草対象 内訳	
A-2 移植栽培(体系処理:初期)	16 剤 120 点	アシカキ	2 剤 3 点
A-3 移植栽培(体系処理:中後期)	62 剤 453 点	アゼガヤ	2 剤 8 点
A-4 移植栽培(特殊雑草対象)	のべ 244 剤 550 点	イボクサ	2 剤 2 点
B 直播栽培	41 剤 113 点	エゾノサヤヌカグサ	9 剤 9 点
C 畦畔雑草	2 剤 24 点	オモダカ	65 剤 190 点
D 耕起前	3 剤 12 点	クサネム	3 剤 6 点
E 休耕田	2 剤 21 点	クログワイ	74 剤 206 点
その他	1 剤 2 点	コウキヤガラ	33 剤 64 点
		シズイ	16 剤 16 点
		ミズアオイ	16 剤 16 点
		SU 抵抗性コナギ	6 剤 6 点
		SU 抵抗性ホタルイ	16 剤 24 点

第2表 平成18年度 水稻関係除草剤適1試験 判定結果一覧

注) 評価欄の記入については、◎:極めて有望、○:有望、□:可能性有り、△:再検討、×:見込みなし を表す。

NO	試験名・剤型 [委託会社]	有効成分及び含有率 (%)	実施場所別総合評価							中央判定 [今後の検討課題]
			北海道	北川	古湯	新植	滋賀	福岡	霞ヶ浦(砂)	
1	AKD-7155 フロアブル [アグロカネショウ]	ベントキサゾン:4% ACN:18%	○	□	□	○	□	□	○	□ 体系処理(初期) [年次変動の確認]
2	BCH-062 シャンボ [ハイエール]	AVH-301:7.5% フェントラザミド:7.5%	□	○	○	□	◎	◎	△	□ 一発処理 [薬害発生要因]
3	BCH-063 シャンボ [ハイエール]	AVH-301:6% メフェナセツト:20%	□	○	○	□	○	◎	□	□ 一発処理 [薬害発生要因]
4	BCH-064 シャンボ [ハイエール]	AVH-301:10% ピラクロニル:6%	□	○	○	○	◎	○	□	□ 一発処理 [薬害発生要因]
5	BCH-064 フロアブル [ハイエール]	AVH-301:6% ピラクロニル:3.6%	□	○	○	○	◎	○	□	□ 一発処理 [薬害発生要因]
6	BCH-064-1kg 粒 [ハイエール]	AVH-301:3% ピラクロニル:1.8%	□	□	□	○	◎	○	□	□ 一発処理 [薬害発生要因]
7	BCH-065L フロアブル [ハイエール]	ダイムロン:9%(W/V) フェントラザミド:6%(W/V) プロモプチド:15%(W/V) ヘンズルフロメチル:1%(W/V)				○	○	○	□	○ 一発処理 [年次変動の確認]
8	HOK-0401(L) シャンボ [*北興、デュボン]	オキサジクロメホン:1.2% ヘンズルフロメチル:1.02% ヘンゾビシクロン:4%			□	◎	◎	□	△	□ 一発処理 [薬害発生要因]
9	HOK-0601-1kg 粒 [北興]	フレチラクロール:4.5% ベンゾフェナツブ:10% プロモプチド:10%	△	□	△				□	△ 一発処理 [効果・薬害の確認]
10	HOK-0605 シャンボ [*北興、デュボン]	フェントラザミド:6% クロメブロップ:9% ヘンズルフロメチル:1.5%	□	○						□ 一発処理 [効果の確認]
11	HOK-0605 フロアブル [*北興、デュボン]	フェントラザミド:6% クロメブロップ:9% ヘンズルフロメチル:1.4%	□	□						□ 一発処理 [効果の確認]
12	HOK-0605 (L) フロアブル [*北興、デュボン]	フェントラザミド:6% クロメブロップ:9% ヘンズルフロメチル:1.0%			□	□	◎	○	△	□ 一発処理 [効果・薬害の確認]
13	HOK-0605-1kg 粒 [*北興、デュボン]	フェントラザミド:3% クロメブロップ:4.5% ヘンズルフロメチル:0.75%	△	□						□ 一発処理 [効果の確認]
14	HOK-0605 (L) -1kg 粒 [*北興、デュボン]	フェントラザミド:3% クロメブロップ:4.5% ヘンズルフロメチル:0.51%			□	□	◎	□	□	□ 一発処理 [効果・薬害の確認]

注) 評価欄の記入については、◎：極めて有望、○：有望、□：可能性有り、△：再検討、×：見込みなし を表す。

NO	試験名 ・ 剤型 [委託会社]	有効成分及び含有率 (%)	実施場所別総合評価							中 央 判 定 [今後の検討課題]
			北海道	青森県	新潟県	滋賀県	福岡県	鹿児島県		
15	HOK-0605S-1kg 粒 [*北興, デュボン]	フェントラサミド:3% クロメプロップ:4.5% ペンシルフロノメチル:0.51% タイムロン:4.5%			□	□	◎	□	□	□ 一発処理 [効果・被害の確認]
16	HOK-0611-1kg 粒 [*北興, デュボン]	オキサジクロメホン:0.8% クロメプロップ:3.5% ペンシルフロノメチル:0.51% シメリン:1.5%				□			□	□ 一発処理 [効果・被害の確認]
17	IR-78N-1kg 粒 [ISAGRO]	オルソスルフアムロン (IR-78):0.75% フェントラサミド:3%	□	□	□	△	△	□	□	△ 一発処理 [効果・被害の確認]
18	KUH-061-1kg 粒 [クミ化]	未公開A(既知):0.5% 未公開B(既知):12%	○	○	○	□	○	○	○	○ 一発処理 [年次変動の確認]
19	KUH-983-0.25kg 粒 [クミ化]	ビリミノバックメチル:4.8%	◎	○	○	○	◎	○	◎	○ ノビエ専用剤 [年次変動の確認]
20	NC-621-1kg 粒 [日産]	NC-620(新規成分):1% 未公開(既知):10%	□	○	○	□	○	○	○	□ 一発処理 [効果・被害の確認]
21	SB-569 フロアブル [SDS]	未公開(既知):4% 未公開(既知):3% 未公開(既知):4%	□	○	□	□	◎	○	○	□ 一発処理 [効果・被害の確認]
22	SB-569-1kg 粒 [SDS]	未公開(既知):2% 未公開(既知):2% 未公開(既知):2.1%	□	□	□	□	◎	○	◎	□ 一発処理 [効果・被害の確認]
23	SB-570 フロアブル [SDS]	未公開(既知):36% 未公開(既知):4% 未公開(既知):4%	○	◎	○	◎	◎	○	○	◎ 一発処理 [年次変動の確認]
24	SB-570-1kg 粒 [SDS]	未公開(既知):18% 未公開(既知):2% 未公開(既知):2%	○	◎	○	◎	◎	○	◎	◎ 一発処理 [年次変動の確認]
25	SB-572-1kg 粒 [SDS]	未公開(既知):0.9% 未公開(既知):21%	○	□	○	□	○	○	○	○ 一発処理 [年次変動の確認]
26	SL-0401 ジャンボ [石原]	フルセツスフロノ (SL-0401):0.44%	□	○	□	□	○	△	□	□ 一発処理 [効果・被害の確認]
27	SL-0401 顆粒水和 [石原]	フルセツスフロノ:10%	□	○	□	□	○	△	□	□ 一発処理 [効果・被害の確認]
28	SL-0601 ジャンボ [石原]	フルセツスフロノ (SL-0401):0.44% 未公開A(既知):1.8%	□	□	□	□	○	△	□	□ 一発処理 [効果・被害の確認]

注) 評価欄の記入については、◎:極めて有望、○:有望、□:可能性有り、△:再検討、×:見込みなし を表す。

NO	試験名 ・ 剤型 [委託会社]	有効成分及び含有率 (%)	実施場所別総合評価							中央判定 [今後の検討課題]
			北海道	古川	新潟	植調	滋賀	福岡	霞ヶ浦(砂)	
29	SL-0601-1kg 粒 [石原]	フルセツスルフロ (SL-0401):0.22% 未公開A(既知):0.9%	□	○	□	□	○	△	○	□ 一発処理 [効果・被害の確認]
30	SL-0602-1kg 粒 [石原]	フルセツスルフロ:0.22% 未公開A(既知):0.9% 未公開B(既知):0.1%	○	○	□	□	○	□	○	□ 一発処理 [効果・被害の確認]
31	SL-0603 ジャンボ [石原]	フルセツスルフロ (SL-0401):0.44% 未公開A(既知):1.8% 未公開C(既知):12%	○	△	□	□	○	□	○	□ 一発処理 [効果・被害の確認]
32	SL-0603-1kg 粒 [石原]	フルセツスルフロ:0.22% 未公開A(既知):0.9% 未公開C(既知):6%	○	△	□	□	◎	□	○	□ 一発処理 [効果・被害の確認]
33	SL-0604-1kg 粒 [石原]	フルセツスルフロ (SL-0401):0.22% 未公開C(既知):6% 未公開D(既知):4.5%	□	□	□	□	○	△	□	□ 一発処理 [効果・被害の確認]
34	SL-0606 粒 [石原]	フルセツスルフロ:0.11% 未公開E(既知):11%	□	○	□	○	○	△	□	□ 体系処理(中後期) [効果・被害の確認]
35	SL-0611 顆粒水和 [石原]	フルセツスルフロ (SL-0401):10%	□	□	□	□	○	△	□	北海道～近畿□, 九州△ 体系処理(中後期) [効果・被害の確認]
36	SL-0612 顆粒水和 [石原]	フルセツスルフロ:10% 未公開A(既知):20%	□	△	△	△	○	△	□	北海道～近畿□, 九州△ 体系処理(中後期) [効果・被害の確認]
37	SL-0613 顆粒水和 [石原]	フルセツスルフロ:0.3% 未公開F(既知):20%	□	○	□	○	◎	△	□	北海道～近畿□, 九州△ 体系処理(中後期) [効果・被害の確認]
38	SST-404 ジャンボ [協友アグリ]	ピラクロニル:5% イマゾスルフロ:2.25% プロモプチド:22.5%	◎	○	○	○	○	○	◎	◎ 一発処理 [年次変動の確認]
39	SW-061-1kg 粒 [三共アグリ]	ピラゾレート:10% ベンゾフェゼート:4.5% ピラクロニル:2%	○	○	◎	○	◎	□	◎	○ 一発処理 [年次変動の確認]
40	SW-062 プロアブル [三共アグリ]	ピラゾレート:20% ベンゾピシクロン:4% ピラクロニル:3.6%	□	◎	◎	◎	◎	○	◎	北海道□, 東北～九州◎ 一発処理 [効果・被害の確認]
41	SW-063-1kg 粒 [三共アグリ]	ペノキスラム:0.6% ダイムロン:10%	□	□	□	□	○	○	□	○ 体系処理(中後期) [年次変動の確認]
42	TH-547 (Z) ジャンボ [住化武田]	TH-547:2.25%	○	○	○	□	○	○	◎	○ 一発処理 [年次変動の確認]

注) 評価欄の記入については、◎：極めて有望、○：有望、□：可能性有り、△：再検討、×：見込みなし を表す。

NO	試験名 ・ 剤型 [委託会社]	有効成分及び含有率 (%)	実施場所別総合評価							中 央 判 定 [今後の検討課題]
			北 海 道	古 川	新 潟	植 調 研	滋 賀	福 岡	霞 ヶ 浦 (砂)	
43	TH-547 (Z) フロアブル [住化武田]	TH-547:1.8% (w/v)	○	○	○	□	○	○	◎	○ 一発処理 [年次変動の確認]
44	THI-913CS ジャンボ [住化武田]	イマゾスルフロン:1.8% カブエンストロール:4.2% タイムロン:20% ヘンズルタップ(殺虫剤):32%					○			○ 一発処理 [年次変動の確認]

第3表 平成18年度 水稻関係除草剤適2試験判定結果一覧

区 分	実・継		継	
A-1 一発処理	BAG-032 シャンボ'	BCH-031-1kg 粒	BCH-052 フロアブル	BCH-053 フロアブル
	BCH-032-1kg 粒	BCH-033-1kg 粒	BCH-062 シャンボ'	BCH-063 シャンボ'
	BCH-044-1kg 粒	BCH-045L-1kg 粒	BCH-064 シャンボ'	BCH-064 フロアブル
	<u>BCH-051 シャンボ'</u>	<u>BCH-051 フロアブル</u>	BCH-064-1kg 粒	BCH-065L フロアブル
	DKH-311-1kg 粒	DKH-411-1kg 粒	HOK-0401(L) シャンボ'	HOK-0501-1kg 粒
	<u>HOK-0301 フロアブル</u>	HOK-0301-1kg 粒	HOK-0601-1kg 粒	HOK-0605 シャンボ'
	HOK-0401 シャンボ'	HOK-0401 フロアブル	HOK-0605 フロアブル	HOK-0605(L) フロアブル
	<u>HOK-0401(L) フロアブル</u>	HOK-0401-1kg 粒	HOK-0605-1kg 粒	HOK-0605(L)-1kg 粒
	<u>HOK-0401(L)-1kg 粒</u>	<u>HOK-0501 シャンボ'</u>	HOK-0605S-1kg 粒	HOK-0611-1kg 粒
	<u>HOK-0501 フロアブル</u>	HOK-222 シャンボ'	HSW-051-1kg 粒	HSW-052 フロアブル
	HOK-222-1kg 粒	HOK-223 シャンボ'	KUH-061-1kg 粒	NC-617-1kg 粒
	HOK-223-1kg 粒	HOK-225-1kg 粒	NC-621-1kg 粒	SB-569 フロアブル
	KPP-444-1kg 粒	KPP-444(L)-1kg 粒	SB-569-1kg 粒	SB-570 フロアブル
	KPP-445 フロアブル	KPP-445(L) フロアブル	SB-570-1kg 粒	SB-572-1kg 粒
	KUH-013D-1kg 粒	KUH-013K-1kg 粒	SL-0601 シャンボ'	SL-0601-1kg 粒
	KUH-021-1kg 粒	KUH-023D シャンボ'	SL-0602-1kg 粒	SL-0603 シャンボ'
	KUH-023D フロアブル	KUH-023K シャンボ'	SL-0603-1kg 粒	SL-0604-1kg 粒
	KUH-032 シャンボ'	KUH-041-1kg 粒	SW-061-1kg 粒	SW-062 フロアブル
	MY-100NC-1kg 粒	MY-100NDC-1kg 粒	SYJ-167-1kg 粒	TH-547(Z) シャンボ'
	MY-100TSC フロアブル	NBA-101SB シャンボ'	TH-547(Z) フロアブル	
	NBA-131a-1kg	NC-385SB 顆粒水和		
	NC-385SB-1kg 粒	NC-397-1kg 粒		
	<u>NC-604 シャンボ'</u>	NC-604 フロアブル		
	<u>NC-604-1kg 粒</u>	<u>NC-606 シャンボ'</u>		
	NC-606-1kg 粒	<u>NC-607 シャンボ'</u>		
	<u>NC-607 顆粒水和</u>	<u>NC-607-1kg 粒</u>		
	<u>NC-609-1kg 粒</u>	<u>NH-051(H) フロアブル</u>		
	<u>NH-051(H)-1kg 粒</u>	NH-102 フロアブル		
	NH-104-1kg 粒	NH-301-1kg 粒		
	NH-302 フロアブル	NH-403 フロアブル		
	NOJ-101-1kg 粒	NOJ-104-1kg 粒		
	PSS(L)D 粒	SB-526 フロアブル		
	SB-526-1kg 粒	SB-563(L)-1kg 粒		
	<u>SB-564 シャンボ'</u>	SB-564 フロアブル		
	SB-564-1kg 粒	SST-402-1kg 粒		
	SST-403 フロアブル	SST-403-1kg 粒		
	<u>SST-404 フロアブル</u>	<u>SST-404-1kg 粒</u>		
	SW-024(L) シャンボ'	SW-032 フロアブル		
	SW-032(L) フロアブル	SW-041(H)-1kg 粒		
	SW-042(H) シャンボ'	SW-042(L) シャンボ'		
	SW-043-1kg 粒	<u>SW-052 シャンボ'</u>		

区 分	実・継		継	
A-1 一発処理 つづき	SYJ-108 シャンボ' SYJ-156-1kg 粒 SYJ-166 フロアブル TH-001-1kg 粒 TH-224 フロアブル TH-547(Z)-1kg 粒 YH-652 シャンボ'	SYJ-150 フロアブル SYJ-157-1kg 粒 TH-001 シャンボ' TH-122-1kg 粒 TH-421 シャンボ' THI-913CS シャンボ'		
A-2 体系(初期)	KPP-2012 フロアブル MY-100MS フロアブル SB-529-1kg 粒 YH-650 フロアブル YH-651 フロアブル ブタクロール 乳	MAT-159 シャンボ' SB-528(L) フロアブル SYJ-167-1kg 粒 YH-650-1kg 粒 YH-651-1kg 粒 ブタクロール-1kg 粒	AKD-7138 フロアブル NC-611 フロアブル	AKD-7155 フロアブル NSK-863 フロアブル
A-3 体系(中後期)	AVH-301-1kg 粒 BCH-044-1kg 粒 DASH-001 SC DBH-1295 液(ME) DEH-112乳(EW) HOK-0301-1kg 粒 HSW-941-1kg 粒 KPP-445(L) フロアブル KUH-013K-1kg 粒 KUH-985 フロアブル NBA-071-1kg 粒 NBA-101SB シャンボ' NC-385SB 顆粒水和 NC-604 フロアブル NC-607-1kg 粒 NH-101 シャンボ' SB-554 シャンボ' SB-556 フロアブル SL-0401-1kg 粒 SST-403-1kg 粒 SW-032 フロアブル SW-042(L) シャンボ' TH-001 シャンボ' TH-001-1kg 粒 TH-122-1kg 粒 TH-421 シャンボ'	BAG-032 シャンボ' BCH-045L-1kg 粒 DBH-1294-1kg 粒 DEH-112-1kg 粒 DKH-311-1kg 粒 HOK-221 シャンボ' KPP-445 フロアブル KUH-013D-1kg 粒 KUH-031 粒 KUH-985(L) フロアブル NBA-071DEH-1kg 粒 NBA-941S-1kg 粒 NC-385SB-1kg 粒 NC-606-1kg 粒 NC-612-1kg 粒 NH-102 フロアブル SB-554 フロアブル SB-563(L)-1kg 粒 SST-403 フロアブル SW-005(L) フロアブル SW-041(H)-1kg 粒 SW-051-1kg 粒 TH-001 フロアブル TH-005 シャンボ' TH-224 フロアブル TH-913(H) 粒	KUH-983-0.25kg 粒 SL-0401 顆粒水和 SL-0604-1kg 粒 SL-0611 顆粒水和 SL-0613 顆粒水和	SL-0401 シャンボ' SL-0601-1kg 粒 SL-0606 粒 SL-0612 顆粒水和 SW-063-1kg 粒
A-4 アシカキ			BAG-032 シャンボ'	YH-652 フロアブル
A-4 アゼガヤ	DEH-112乳(EW)	DEH-112-1kg 粒		
A-4 イボクサ	NC-612-1kg 粒		BAG-032 シャンボ'	

区 分	実・継		継	
A-4 エゾノサヤヌカグサ	<u>BCH-044-1kg 粒</u> <u>YH-652 フロアブル</u>	<u>HOK-0301-1kg 粒</u>	<u>DKH-311-1kg 粒</u> <u>NH-051(H) フロアブル</u> <u>NH-403 フロアブル</u>	<u>KPP-444-1kg 粒</u> <u>NH-051(H)-1kg 粒</u> <u>SW-032 フロアブル</u>
A-4 オモダカ	<u>BAG-032 シャンボ'</u> <u>BCH-032-1kg 粒</u> <u>BCH-044-1kg 粒</u> <u>CGM-71 フロアブル</u> <u>KPP-444(L)-1kg 粒</u> <u>KPP-445(L) フロアブル</u> <u>KUH-013D-0.25kg 粒</u> <u>KUH-021-1kg 粒</u> <u>KUH-023K フロアブル</u> <u>MY-100DC(L) フロアブル</u> <u>NC-612-1kg 粒</u> <u>NOJ-101-1kg 粒</u> <u>SB-559(L)-1kg 粒</u> <u>SB-564-1kg 粒</u> <u>SYJ-108 シャンボ'</u> <u>TH-001-1kg 粒</u> <u>TH-421 シャンボ'</u> <u>YH-650 フロアブル</u> <u>YH-652-1kg 粒</u>	<u>BCH-031-1kg 粒</u> <u>BCH-033-1kg 粒</u> <u>BCH-045L-1kg 粒</u> <u>KPP-444-1kg 粒</u> <u>KPP-445 フロアブル</u> <u>KUH-011D-1kg 粒</u> <u>KUH-013D-1kg 粒</u> <u>KUH-023D フロアブル</u> <u>KUH-031 粒</u> <u>MY-100DC(L)-1kg 粒</u> <u>NHF-401 粒</u> <u>SB-559(H)-1kg 粒</u> <u>SB-564 フロアブル</u> <u>SW-005(L) フロアブル</u> <u>TH-001 シャンボ'</u> <u>TH-122-1kg 粒</u> <u>YH-641-1kg 粒</u> <u>YH-652 フロアブル</u>	<u>DKH-311-1kg 粒</u> <u>HOK-222-1kg 粒</u> <u>NC-606-1kg 粒</u> <u>NH-051(H) フロアブル</u> <u>NH-403 フロアブル</u> <u>SL-0602-1kg 粒</u> <u>SL-0604-1kg 粒</u> <u>SL-0613 顆粒水和</u> <u>SST-404-1kg 粒</u> <u>SW-042(L) シャンボ'</u> <u>SW-751 粒</u> <u>SYJ-156-1kg 粒</u> <u>YH-650-1kg 粒</u> <u>YH-651-1kg 粒</u>	<u>HOK-222 フロアブル</u> <u>KUH-041-1kg 粒</u> <u>NC-607-1kg 粒</u> <u>NH-051(H)-1kg 粒</u> <u>SB-563(L)-1kg 粒</u> <u>SL-0603-1kg 粒</u> <u>SL-0606 粒</u> <u>SST-404 フロアブル</u> <u>SW-032 フロアブル</u> <u>SW-051-1kg 粒</u> <u>SYJ-150 フロアブル</u> <u>TH-224 フロアブル</u> <u>YH-651 フロアブル</u> <u>SL-496 粒</u>
A-4 クサネム	<u>DASH-001 SC</u> <u>YH-652 フロアブル</u>	<u>KUH-911 液</u>		
A-4 クログワイ	<u>BAG-032 シャンボ'</u> <u>BCH-032-1kg 粒</u> <u>BCH-044-1kg 粒</u> <u>FSS-115 粒</u> <u>HOK-991 シャンボ'</u> <u>KPP-445 フロアブル</u> <u>KUH-011D-1kg 粒</u> <u>KUH-013D-1kg 粒</u> <u>KUH-023D フロアブル</u> <u>MAT-159 シャンボ'</u> <u>NC-604 フロアブル</u> <u>NC-612-1kg 粒</u> <u>NHF-401 粒</u> <u>NOJ-104-1kg 粒</u> <u>SB-528(L) フロアブル</u> <u>SB-554 フロアブル</u>	<u>BCH-031-1kg 粒</u> <u>BCH-033-1kg 粒</u> <u>BCH-045L-1kg 粒</u> <u>G-315B 乳</u> <u>KPP-444(L)-1kg 粒</u> <u>KPP-445(L) フロアブル</u> <u>KUH-013D-0.25kg 粒</u> <u>KUH-021-1kg 粒</u> <u>KUH-023K フロアブル</u> <u>MY-100TSC フロアブル</u> <u>NC-606-1kg 粒</u> <u>NH-806 シャンボ'</u> <u>NOJ-101-1kg 粒</u> <u>SB-528 フロアブル</u> <u>SB-554 シャンボ'</u> <u>SB-559(H)-1kg 粒</u>	<u>DKH-311-1kg 粒</u> <u>KUH-041-1kg 粒</u> <u>NH-051(H) フロアブル</u> <u>NH-403 フロアブル</u> <u>SL-0401-1kg 粒</u> <u>SL-0602-1kg 粒</u> <u>SL-0604-1kg 粒</u> <u>SL-0611 顆粒水和</u> <u>SL-0613 顆粒水和</u> <u>SST-403-1kg 粒</u> <u>SST-404-1kg 粒</u> <u>SW-042(L) シャンボ'</u> <u>SYJ-150 フロアブル</u> <u>TH-224 フロアブル</u>	<u>HOK-0301 フロアブル</u> <u>NC-607-1kg 粒</u> <u>NH-051(H)-1kg 粒</u> <u>SB-563(L)-1kg 粒</u> <u>SL-0601-1kg 粒</u> <u>SL-0603-1kg 粒</u> <u>SL-0606 粒</u> <u>SL-0612 顆粒水和</u> <u>SST-403 フロアブル</u> <u>SST-404 フロアブル</u> <u>SW-032 フロアブル</u> <u>SW-051-1kg 粒</u> <u>SYJ-156-1kg 粒</u>

区 分	実 ・ 継		継	
A-4 クログワイ つづき	SB-559(L)-1kg 粒 SB-564-1kg 粒 SW-005 (L) フロアブル TH-001 シャンボ TH-001-1kg 粒 TH-122-1kg 粒 YH-641-1kg 粒 YH-652-1kg 粒	SB-564 フロアブル SST-402-1kg 粒 SYJ-108 シャンボ TH-001 フロアブル TH-005 シャンボ TH-421 シャンボ YH-651-1kg 粒		
A-4 コウキヤガラ	KUH-021-1kg 粒 SB-528 フロアブル SB-564-1kg 粒 TH-001-1kg 粒	NC-612-1kg 粒 SB-564 フロアブル TH-001 フロアブル	KPP-2005 シャンボ KPP-2008 乳(EW) KPP-444-1kg 粒 KUH-013D-1kg 粒 SB-554 シャンボ SL-0401-1kg 粒 SL-0602-1kg 粒 SL-0604-1kg 粒 SL-0611 顆粒水和 SL-0613 顆粒水和 SST-404-1kg 粒 TH-224 フロアブル YH-651 フロアブル	KPP-2005(H) フロアブル KPP-2008-1kg 粒 KPP-444(L)-1kg 粒 KUH-041-1kg 粒 SB-554 フロアブル SL-0601-1kg 粒 SL-0603-1kg 粒 SL-0606 粒 SL-0612 顆粒水和 SST-404 フロアブル TH-122-1kg 粒 TH-421 シャンボ YH-651-1kg 粒
A-4 シズイ	KPP-445 フロアブル NC-612-1kg 粒 SB-564 フロアブル SST-402-1kg 粒	KUH-023K フロアブル SB-559(H)-1kg 粒 SB-564-1kg 粒 TH-001 シャンボ	DKH-311-1kg 粒 KPP-2005(H) フロアブル NH-403 フロアブル SYJ-150フロアブル	HOK-222 フロアブル NH-051(H) フロアブル SW-041(H)-1kg 粒 TH-224 フロアブル
A-4 ミズアオイ	BCH-044-1kg 粒 KUH-023K フロアブル SB-559(H)-1kg 粒 SB-564-1kg 粒 TH-001 シャンボ	KPP-444-1kg 粒 SB-554 フロアブル SB-564 フロアブル SYJ-156-1kg 粒	DKH-311-1kg 粒 NC-385SB 顆粒水和 SB-554 シャンボ SST-404-1kg 粒	KPP-445 フロアブル NC-385SB-1kg 粒 SST-404 フロアブル
A-4 SU抵抗性コナギ	KPP-444(L)-1kg 粒 NC-612-1kg 粒	KPP-445(L) フロアブル SYJ-157-1kg 粒	SST-404 フロアブル	SST-404-1kg 粒
A-4 SU抵抗性ホタルイ	KPP-445 フロアブル KUH-023D フロアブル NC-385SB 顆粒水和 NC-604 フロアブル SB-559(H)-1kg 粒 SYJ-156-1kg 粒	KPP-445(L) フロアブル KUH-023K フロアブル NC-385SB-1kg 粒 NC-612-1kg 粒 SW-032 フロアブル SYJ-157-1kg 粒	BCH-044-1kg 粒 SST-404 フロアブル	DKH-311-1kg 粒 SST-404-1kg 粒

区 分	実・継		継	
B 直播栽培	HOK-221 シャンボ'	KPP-2008 乳(EW)	BCH-044-1kg 粒	BCH-045L-1kg 粒
	KUH-011K-1kg 粒	KUH-013D シャンボ'	DASH-001 SC	DKH-311-1kg 粒
	KUH-013D-1kg 粒	KUH-013K-0.25kg 粒	HOK-222 フロアフル	HOK-223-1kg 粒
	KUH-013K-1kg 粒	MY-100TSC フロアフル	KUH-031 粒	KUH-911 液
	NBA-071DEH-1kg 粒	NBA-941S-1kg 粒	NC-385SB-1kg 粒	SB-528(L) フロアフル
	<u>NC-622 液</u>	<u>NH-104-1kg 粒</u>	SB-563(L)-1kg 粒	SL-0401-1kg 粒
	<u>SB-528 フロアフル</u>	<u>SB-551-1kg 粒</u>	SW-005(L) フロアフル	SW-032 フロアフル
	<u>SST-402-1kg 粒</u>	SW-012(H)-1kg 粒	SW-041(H)-1kg 粒	SW-042(L) シャンボ'
	<u>SYJ-171 液</u>	<u>TH-001 シャンボ'</u>	TH-122-1kg 粒	TH-224 フロアフル
	<u>TH-001 フロアフル</u>	<u>TH-001-1kg 粒</u>	TH-421 シャンボ'	
C 畦畔	NC-622 液	<u>SYJ-171 液</u>		
D 耕起前	AH-01 液	<u>NC-622 液</u>		
	<u>SYJ-171 液</u>			
E 休耕田	NC-622 液	<u>SYJ-171 液</u>		
その他	DEH-112 乳(EW)			

注): 1) 本年度新規に使用基準が作成されたものは、薬剤名にアンダーラインを記した。

2) 本年度は「実」、「継?」及び「中止」と判定された薬剤はなかった。

※ 薬剤名はアルファベット順に記載した。

平成18年度 水稻関係除草剤使用基準

A 移植栽培

A-1 一発処理

A-1

BAG-032 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土 ～ 壤土
北海道	○2	○	○始	○始		○始		●前※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2L	20g×10コ	○ ○
東北	○2	○	○2	○始	○始	○始	●前※	●前※	○発生 期	○再生 前～始	○前	SL抵抗性オモダカ2L		○ ○
北陸	○2	○	○2		○始	○始	●前※	●前※	○発生 期	●再生 前～始	○前			○ ○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○始	●前※	●前※	○発生 期	○再生 前～始	○前	SL抵抗性オモダカ2L SL抵抗性ツリ2L		○ ○
近・中・四	○2	○	○2		○2	○2	●前※	●前※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○ ○
九州	○2	○	○2		○2	○2	●前※	●前※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○ ○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

BCH-031-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土 ～ 壤土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	1kg	● ○
東北	○2.5	○	○2	○始	○始	○始			○発生 期	○再生 前～始				○ ○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始				○ ○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2		●始※	○発生 期	○再生 前～始				○ ○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				● ○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※		○発生 期	○再生 前～始				● ○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

BCH-032-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土 ～ 壤土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	1kg	● ○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始				○ ○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○ ○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○ ○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○ ○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				● ○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

BCH-033-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始			+5～ノビエ2.5L	1kg	●	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2		●始※		○発生 期	○再生 前～始						○
北陸	○2.5	○	○2		2 ○始	○始			○発生 期	○再生 前～始					●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始						○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始						○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2		●始※	○発生 期							○
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。																
減水深: 2cm/日以下																
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。																
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。																
オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。																

A-1

BCH-044-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期 +0～ノビエ2.5L	使用量 /10a 1kg	砂 壤土	壤土 ～ 埴土		
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前					●	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前					○	○
北陸	○2.5	○	○2			○2	○始		○発生 期	○再生 前～始	○前					○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前					○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前					○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前					○	○

田植同時散布可能
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

BCH-045L-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道																
東北																
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始	●始	●始	○発生 期	○再生 前～始	○前		+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
田植同時散布可能																
減水深: 2cm/日以下																
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。 オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。																

A-1

BCH-051 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	礫土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	30g×10㎡		●
東北	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始					●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期						●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期						●
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。															

A-1

BCH-051 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	500ml		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始					●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始					●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

DKH-311-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+3～)	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	2 ○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

田植同時散布確認(北海道、東北) 可能

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-1

DKH-411-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道												+3～ノビエ2.5L	1kg		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

HOK-0301 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道												+5～ノビエ2.5L	500ml		
東北															
北陸															
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●前					●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●前					●
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-1

HOK-0301-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土		
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期		○前	エゾノオササギノサ:2L	+5～ノビエ2.5L	1kg	○	○	
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始	○始※		○発生 期							○	○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始	○始※		○発生 期		○前					○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期		○前					○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○始	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前					○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期		○前					○	○

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

HOK-0401 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													50g×10コ		
東北	○2	○	○2	○始	○始	○始			○発生 期	○再生 前～始		+1～ノビエ2L			○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

A-1

HOK-0401 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													500ml		
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L		○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

田植同時散布可能 確認(東北)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-1

HOK-0401(L) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道																
東北																
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期				+0～ノビエ2.5L	500ml		●
関東・東海																
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始			+0～ノビエ2.5L	500ml		●
九州																

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-1

HOK-0401-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	±0.45～ノビエ2.5L(砂 壤土は+5→)		●	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

田植同時散布確認(東北)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 低温等による活着不良の場合には被害が生じる事がある。

A-1

HOK-0401(L)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	1kg		●
関東・東海															
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	1kg		●
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-1

HOK-0501 シェンゴ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始		+1～ノビエ2.5L	50g×10コ		●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じる事がある。

A-1

HOK-0501 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+0～ノビエ2.5L	500ml		●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-1

HOK-222 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2	○	○2	○始		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+1～ノビエ2L	50g×100	●	○
東北	○2	○	○2	●前	○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。

A-1

HOK-222-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	2 ○始	○始	○始			○発生 期	○再生 前～始				●	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 低温等による活着不良の場合には被害が生じることがある。(東北)

A-1

HOK-223 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	○2	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+1～ノビエ2L	50g×100	○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○
近・中・四 (注)	○2	○	○2		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+1～ノビエ2L(砂 壌土は+3～)		○	○
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+1～ノビエ2L		●	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

HOK-223-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	1kg	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

HOK-225-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 塩土
北海道																
東北																
北陸	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期		○前		+5～ノビエ3L	1kg	○	○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
九州	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

KPP-444-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 塩土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始		●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性オモダカ・2L ミズイ・1L	+0～ノビエ1.5L	1kg	○	○
東北	○1.5	○	○始	○始	○始	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ・重丈3cm SU抵抗性オモダカ・2L			○	○
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

田植同時散布確認(北海道、東北)
 ※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

KPP-444(L)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 塩土
北海道																
東北																
北陸	○1.5	○	○始		○始	○始	○始	●始※					+0～ノビエ1.5L	1kg	○	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	●前	SU抵抗性コナシ・始 SU抵抗性オモダカ・1L			○	○
近・中・四	○1.5	○	○始		○始	○始	○始	●始※		○再生 前～始	○前				○	○
九州	○1.5	○	○始		○始	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○

田植同時散布可能
 ※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

KPP-445 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 塩土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始		●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性オモダカ・2L	+0～ノビエ1.5L	500ml	●	○
東北	○1.5	○	○始		○始	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ・重丈3cm SU抵抗性オモダカ・2L			●	○
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

田植同時散布確認(北海道、東北)
 ※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

KPP-445(L) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道															
東北															
北陸	○1.5	○	○始		○始	○始	●始※		○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ1.5L	500ml	○	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始		SL低抵抗性コナギ2L		●	○
近・中・四	○1.5	○	○始		○始	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始		+0～ノビエ1.5L(砂 壌土は+3～)		●	○
九州	○1.5	○	○始		○始	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ1.5L		●	○

田植同時散布可能

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

KUH-013D-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道															
東北															
北陸	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ3L	1kg	○	○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○3	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

田植同時散布確認(北陸・関東・東海・近畿・中国・四国・九州) 可能

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

KUH-013K-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○3	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ3L(砂 壌土は+3～)	1kg	○	○
東北	○3	○	○2	○2	○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ草丈3cm	+0～ノビエ3L	○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

田植同時散布確認(北海道・東北)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

KUH-021-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズカヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○3	○	○2	○2		○2			○発生 期前～始	○再生 期前～始	○前	ミズアオイ2L	+3～ノビエ3L(砂 壌土は+7～)	1kg	○	○
東北	○3	○	○3	○始	○2	○2	○始※	○始※	○発生 期前～始	○再生 期前～始	○前	コナギ草丈3cm シズイ草丈3cm			○	○
北陸	○3	○	○3		○3	○2	○始	○始	○発生 期前～始	○再生 期前～始					○	○
関東・東海	○3	○	○3		○3	○2			○発生 期前～始	○再生 期前～始	○前	SU低抵抗性コナギ2L			○	○
近・中・四	○3	○	○3		○3	○2			○発生 期前～始	○再生 期前～始	○前				○	○
九州	○3	○	○3		○3	○3	○始※	○始※	○発生 期前～始	○再生 期前～始	○前	コナギ草丈始			○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

KUH-023D ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L	25g×10 ³	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

KUH-023D フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始		+3～ノビエ2.5L	500ml	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	SU抵抗性※タライ2L			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

KUH-023K ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	25g×10 ³	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。

A-1

KUH-032 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2	○	○始	○2					○発生 期			+3～ノビエ2L	25g×10 ³	●	○
東北	○2	○	2 ○始	○2	2 ○始				○発生 期					●	○
北陸	○2	○	○始						○発生 期					●	○
関東・東海	○2	○	○2		○2				○発生 期					●	○
近・中・四	○2	○	○2		○始				○発生 期						○
九州	○2	○	○2		○2				○発生 期					●	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

KUH-041-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○3	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0 +3～ノビエ3L(砂 壤土は+3～)	1kg	●	○
東北	○3	○	○3	○2	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
北陸	○3	○	○3	○2	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	●前			●	○
関東・東海	○3	○	○3		○3	○2			○発生 期	○再生 前～始		+3～ノビエ3L		●	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○3	○	○3		○3	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

MY-100NC-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壤土は+5～)	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○2	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	○始		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+1～ノビエ2.5L(砂 壤土は+5～)		○	○
九州	○2.5	○	○2	○前	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		○	○

田植同時散布確認(東北・関東・東海)
 ※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

MY-100NDC-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○3	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ3L	1kg	○	○
東北	○3	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○3	○	○2		○2	○2	○始		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	●前			○	○

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

MY-100TSC 70アブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○前	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

田植同時散布可能 水口処理可能(東北・関東・東海・九州)
 ※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

NBA-101SB ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+1～ノビエ2.5L	30g×10 ³	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

NBA-131a-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2	○	○2	○始		○始		○始	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2L	1kg	○	○
東北	○2	○	○2	●2	○始	○始	○前※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

田植同時散布確認(北海道、東北分) 可能

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

NC-385SB 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○始		○2		○始	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	80g(散布液 量500ml)	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

顆粒のまま水口処理が可能(東北、北陸、関東・東海)

田植同時散布確認(東北、関東・東海)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

NC-385SB-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生 期			+0～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		○	○

田植同時散布可能

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-397-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ1.5L	1kg		○
東北	○1.5	○	○始	○始	○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ1.5L		○	○
北陸	○1.5	○	○始		○始	○前				○再生 前～始		+0+3～ノビエ1.5L(砂 壌土は+3～)		●	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ1.5L		●	○
近・中・四															
九州															

田植同時散布確認(東北、北陸、関東・東海) 可能

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-1

NC-604 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2	●	●始	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+5～ノビエ2L	30g×10コ		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+5～ノビエ2.5L			●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-604 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ、草丈3cm		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

※: クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

NC-604-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+5～ノビエ2.5L	1kg		●
東北	●2	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+5～ノビエ2L			●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+5～ノビエ2.5L			●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
近・中・四 (普)	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-606 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●始	+5～ノビエ2.5L	30g×10 ³		●
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○始			●	○
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期		●始			●	●
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	2 ○始			○発生 期	○再生 前～始	○始			●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○始			●	○
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●始				●

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-606-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○始	+5～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	●始	○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○始			●	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○始			●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※		○発生 期	○再生 前～始	○始			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始		○発生 期	○再生 前～始	○始			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○始			●	○

※: クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

NC-607 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+3～ノビエ2.5L	30g×10 ³		●
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-607 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L	60g(散布液 量500ml)	●	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+3～)		●	○
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始		+3～ノビエ2.5L			●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●

顆粒のまま水口処理確認(東北、北陸、関東・東海) 可能
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-607-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 堆土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+3～ノビエ2.5L	1kg		●
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壤土は+3～)		●	○
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+3～ノビエ2.5L			●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
近・中・四 (昔)	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●

田植同時散布確認(東北)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミス'ガヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-609-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 堆土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+3～ノビエ2.5L	1kg		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期		●前				●
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-1

NH-051(H) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 堆土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+0～ノビエ2.5L	500ml		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-1

NH-051(H)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 堆土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+0～ノビエ2.5L	1kg		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-1

NH-102 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	○始	○始	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始	○始	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
田植同時散布可能 ※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。 オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。															

A-1

NH-104-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	○始		○発生 期	○再生 前～始		+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
田植同時散布可能 ※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。 クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。															

A-1

NH-301-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2								+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2		○前									○	○
北陸	○2.5	○	○2		○前									●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2										○
近・中・四 (害)	○2.5	○	○2		○2									●	○
九州	○2.5	○	○2		○2										○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。															

A-1

NH-302 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2								+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2		○始									○	○
北陸	○2.5	○	○2		○前									●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2										○
近・中・四 (害)	○2.5	○	○2		○2									●	○
九州	○2.5	○	○2		○2										○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。															

A-1

NH-403 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	500ml	●	○
東北	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

A-1

NOJ-101-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○3	○	○2	○2		○2		○前	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ3L(砂 壤土は+5～)	1kg	○	○
東北	○3	○	○2	○2	○2	○2	○前※	○前※	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ厚さ3cm		○	○
北陸	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ3L(砂 壤土は+5～)		●	○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2	○前※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ3L(砂 壤土は+5～)		○	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2	○前※		○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ3L(砂 壤土は+5～)		○	○
九州	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ3L(早期お よび砂壤土は+5～)		○	○

田植同時散布可能
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効剤との組み合わせで使用。

A-1

NOJ-104 1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ3L(砂 壤土は+5～)	1kg	○	○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ3L(砂 壤土は+5～)		○	○
九州	○3	○	○2	○2	○2	○2		○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

田植同時散布可能
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効剤との組み合わせで使用。

A-1

PSS(L)D 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													3kg		
東北	○2	○	○2	○始	○2	○2			○発生 期		○始	+0～ノビエ2L		○	○
北陸	○2	○	○2		○始	○2					○始			○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期		○始	+0～ノビエ2L(普 通期は+3～)		○	○
近・中・四	○2	○	○2	○2	○始	○2			○発生 期		○始	+0～ノビエ2L(砂 壤土は+3～)		○	○
九州	○2	○	○2		○始	○2			○発生 期			+0～ノビエ2L		○	○

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

SB-526 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2	○	○始	○2					○発生 期			+3～ノビエ2L	500ml	○	○
東北	○2	○	○2	○始	○2				○発生 期					○	○
北陸	○2	○	○2		○2				○発生 期					○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2				○発生 期					○	○
近・中・四	○2	○	○2		○始				○発生 期					○	○
九州	○2	○	○2		○始				○発生 期					○	○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。															

A-1

SB-526-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2	○	○2	○2					○発生 期				+3～ノビエ2L	1kg	○	○
東北	○2	○	○2	○始	○2				○発生 期						○	○
北陸	○2	○	○2		○始				○発生 期						○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2				○発生 期						○	○
近・中・四	○2	○	○2		○2				○発生 期						○	○
九州	○2	○	○2		○始				○発生 期						○	○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。																

A-1

SB-563(L)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		2 ○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0 +3～ノビエ2.5L	1kg	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L (砂壤土は+5～)		○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L		○	○
田植同時散布確認(北陸、関東・東海)															
減水深: 2cm/日以下															
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。															

A-1

SB-564(旧 SBX-568) シャンホ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	埴 土
北海道	●2	●	●始	●始		●始			●発生 期			+3～ノビエ2L	30g×10 ³		●
東北	●2	●	●2	●前	●始	●始			●発生 期						●
北陸	●2	●	●始		●始	●始			●発生 期						●
関東・東海	●2	●	●2		●2	●2			●発生 期						●
近・中・四（昔）	●2	●	●2		●始	●始			●発生 期					●	●
九州	●2	●	●2	●始	●2	●2			●発生 期						●
減水深：2cm/日以下 使用上の注意：5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。															

A-1

SB-564 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2	○	○始	○2		○始			○発生 期			シズイ・草丈2L	+3～ノビエ2L	500ml	●	○
東北	○2	○	○2	○前	○始	○始	●始※	●始※	○発生 期			シズイ・草丈3cm			●	○
北陸	○2	○	○2		○始	○始			○発生 期						●	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○始		●始※	○発生 期						●	○
近・中・四	○2	○	○2		○始	○始	●始		○発生 期						○	○
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期			コウキヤガラ・始			●	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

SB-564-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2	○	○始	○2		○始			○発生 期			シズイ・草丈2L	+3～ノビエ2L	1kg	●	○
東北	○2	○	○始	○前	○始	○始	●始※	●始※	○発生 期			シズイ・草丈3cm			●	○
北陸	○2	○	○始		○始	○始			○発生 期						●	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○2		●始※	○発生 期						●	○
近・中・四	○2	○	○2		○始	○始	●始		○発生 期						○	○
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期			コウキヤガラ・始			●	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

SST-402-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前		+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始	●始※		○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ・草丈3cm	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+6～)		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○始	●始※		○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性オモダカ・2L	+0～ノビエ2.5L		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○

田植同時散布可能
 ※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

SST-403 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前		+0～ノビエ1.5L	500ml	●	○
東北	○1.5	○	○始	○前	○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前				●	○
北陸	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前				●	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前				●	○
近・中・四	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
九州	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前				●	○

田植同時散布可能
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

SST-403-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ1.5L	1kg	●	○
東北	○1.5	○	○始	○始	○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
北陸	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
近・中・四	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始				○	○
九州	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
田植同時散布可能 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。															

A-1

SST-404 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2	●	●始	●始		●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+0～ノビエ2L	500ml		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+0～ノビエ2.5L			●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
九州	●2	●	●2	●始	●2	●2			●発生 期	●再生 前～始		+0～ノビエ2L		●	●
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。															

A-1

SST-404-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2	●	●始	●始		●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+0～ノビエ2L	1kg		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+0～ノビエ2.5L			●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
九州	●2	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始		+0～ノビエ2L		●	●
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。															

A-1

SW-024(L) ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L	40g×10 ³	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性*タリ:1L		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。															

A-1

SW-032 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	SL抵抗性 ² 対 ¹ イ 2L	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+3～)	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	SL抵抗性 ² 対 ¹ イ 2L			○	○
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

田植同時散布確認(北海道,東北)
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

A-1

SW-032(L) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道																
東北																
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	●再生 前～始	●前		+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+3～)	500ml	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前		+3～ノビエ2.5L		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○

田植同時散布確認(北陸)
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

SW-041(H)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		○始	○発生 期	○再生 前～始	○前	SL抵抗性 ² 対 ¹ イ 1.5L	+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	SL抵抗性 ² 対 ¹ イ 1.5L			○	○
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
田植同時散布確認(北海道,東北)
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

SW-042(H) ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前		+3～ノビエ2.5L	35g×10コ	●	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前				●	○
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。

A-1

SW-042(L) ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L	35g×10㎡	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

SW-043-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期		○前	+0～ノビエ2.5L	1kg	●	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期		○前			●	○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生 期					●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期		○前			●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期		○前			○	○
九州 (※)	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期		○前			●	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

SW-052 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期		●前	+1～ノビエ2.5L	50g×10㎡		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期		●前				●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期		●前				●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期					●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期		●前				●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期		●前				●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

SVJ-108 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○3	○	○2	○2		○2		○始	○発生 期	○再生 前～始	○始	+5～ノビエ3L	30g×10㎡	○	○
東北	○3	○	○2	○2	○2	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○始	※サイズ: 長さ3cm		○	○
北陸	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○始			○	○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○始			○	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2	○始		○発生 期	○再生 前～始	○始			○	○
九州	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○始			○	○

※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

SYJ-150 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤 土	壤土 ～ 堆土
北海道	○3	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ3L (砂壤土は+5～)	500ml	○	○
東北	○3	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ3L(砂壤 土は+5～)		●	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	●再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壤土は+3～)	350ml	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	●前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壤土は+3～)		●	○

田植同時散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

SYJ-156-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤 土	壤土 ～ 堆土
北海道	○3	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	ミズアオイ:2L SU抵抗性オキイ:2L +0 +5～ノビエ3L(砂 壤土は+5～)	1kg	●	○
東北	○3	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性オキイ:2L		●	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

田植同時散布確認(北海道,東北)
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

A-1

SYJ-157-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤 土	壤土 ～ 堆土
北海道															
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期		●前	+0～ノビエ2.5L	1kg		●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	SU抵抗性:ナギ:1L SU抵抗性オキイ:1L			●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+3～ノビエ2.5L			●

田植同時散布確認(関東・東海)
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

SYJ-166 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤 土	壤土 ～ 堆土
北海道	●3	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+5～ノビエ3L	500ml		●
東北	●3	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

A-1

TH-001 シェンホ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 殖土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ・1L	+5～ノビエ2.5L	40g×10	●	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	●始※		○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ・草丈3cm			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始					○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始		○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

TH-001-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 殖土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ・1L	+5～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始	●始※		○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ・草丈3cm			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始					●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始		コシキヤツリ・始			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始		○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

オモダカ・クログワイ・コシキヤツリ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

TH-122-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 殖土
北海道	○2.5	○	○2	○2		2 ○始		●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前		+0 +5～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前				●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前		+0 +5～ノビエ2.5L		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前		+0 +5～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)		○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前		+5～ノビエ2.5L		○	○

田植同時散布確認(北海道・東北・北陸・関東・東海・近畿・中国・四国) 可能

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

TH-224 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 殖土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前		+0 +5～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)	500ml	●	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前				●	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前				●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前		+0 +5～ノビエ2.5L			○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前		+0 +5～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)		●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前		+5～ノビエ2.5L		●	○

田植同時散布確認(北海道・東北・北陸・関東・東海・近畿・中国・四国) 可能

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

TH-421 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始		●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	40g×10 ^コ	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期		○前			●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始				○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

TH-547(Z)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	1kg		●
東北	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始					●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始					●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始				●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

THI-913CS ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道												+0～ノビエ2L	50g×10 ^コ		
東北															
北陸															
関東・東海															
近・中・四	●2	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

YH-652 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期		●前	+5～ノビエ2.5L	50g×10 ^コ		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期						●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期						●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期					●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期		●前				●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期						●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-2 体系処理(初期)

A-2

KPP-2012 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1	○	○始	○始		○始						+0～+5(ノビエ1L)	500ml	●	○
東北	○1	○	○始	○前	○始	○始						植代後～+4,+0～ +5(ノビエ1L)		●	○
北陸	○1	○	○始		○始	○前								●	○
関東・東海	○1	○	○始		○始	○始								●	○
近・中・四	○1	○	○始		○始	○始								○	○
九州	○1	○	○始		○始	○始								●	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 深水条件では薬害を生じることがある。

A-2

MAT-159 シャンボ'

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1	○	○始	○始								+1～+5(ノビエ1L)	50g×10 ³	○	○
東北	○1	○	○始	○始	○前							植代後～+4,+1～ +5(ノビエ1L)		○	○
北陸	○1	○	○始		○前									○	○
関東・東海	○1	○	○始		○始		○前※							●	○
近・中・四	○1	○	○始		○始									○	○
九州	○1	○	○始		○始									○	○

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-2

MY-100MS フロアブル(少量散布)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1	○	○始	○始		○始						+0～+5(ノビエ1L)	300ml	●	○
東北	○1	○	○始	○始	○始	○始								○	○
北陸	○1	○	○始		○始	○始								●	○
関東・東海	○1	○	○始		○始	○始								●	○
近・中・四	○1	○	○始		○始	○始						+0～+5(ノビエ1L) (砂壤土は+4～)		○	○
九州	○1	○	○始		○始							+0～+5(ノビエ1L)		○	○

一発処理型除草剤の前処理として少量散布(300ml/10a)が可能。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-2

SB-528(L) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1	○	○始	○始								+0～+5(ノビエ1L)	500ml	○	○
東北	○1	○	○始	○前			●前※					植代時～+4,+0～ +5(ノビエ1L)		○	○
北陸	○1	○	○始		○前		●前							○	○
関東・東海	○1	○	○始		○始		○前※							○	○
近・中・四	○1	○	○始		○始		●前							○	○
九州	○1	○	○始	○前	○始							植代後～+4,+0～ +5(ノビエ1L)		○	○

植代時は土壌混和処理

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-2

SB-529-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1	○	○始	○始								+0～+5(ノビエ1L)	1kg	○	○
東北	○1	○	○始	○始	○前							植代後～+4,+0～ +5(ノビエ1L)		○	○
北陸	○1	○	○始	○始										○	○
関東・東海	○1	○	○始		○前		○前※					+0～+5(ノビエ1L)		○	○
近・中・四	○1	○	○始		○前							植代後～+4,+0～ +5(ノビエ1L)		○	○
九州	○1	○	○始									+0～+5(ノビエ1L)		○	○

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 深水条件では薬害を生じることがある。
 クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-2

SYJ-167-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●1	●	●始	●始								+0～ノビエ1L	1kg		●
東北	●1	●	●始	●始	●始							植代後～+4,+0～ ノビエ1L			●
北陸	●1	●	●始		●始				●発生 期						●
関東・東海	●1	●	●始		●始										●
近・中・四	●1	●	●始		●始										●
九州	●1	●	●始		●始							+0～ノビエ1L		●	●

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意:

A-2

YH-650フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1.5	○	○始	○始		●始			○発生 期			+0～ノビエ1.5L	500ml	○	○
東北	○1.5	○	○始	○始		●前			●発生 期			植代後～+4,+0～ ノビエ1.5L		○	○
北陸	○1.5	○	○始			○始		●前	○発生 期					○	○
関東・東海	○1.5	○	○始			○始		●前※	○発生 期		SU抵抗性ホタルイ始			○	○
近・中・四	○1.5	○	○始			○始			○発生 期					○	○
九州	○1.5	○	○始											○	○

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: SU抵抗性ホタルイ防除は、有効な剤との組み合わせで使用する。
 オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-2

YH-650-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1.5	○	○始	○始		●始			○発生 期			+0～ノビエ1.5L	1kg	○	○
東北	○1.5	○	○始	○始		●前			●発生 期			植代後～+4,+0～ ノビエ1.5L		○	○
北陸	○1.5	○	○始			○始			○発生 期					○	○
関東・東海	○1.5	○	○始			○始			○発生 期					○	○
近・中・四	○1.5	○	○始			○始			○発生 期					○	○
九州	○1.5	○	○始											○	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意:

A-2

YH-651 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1.5	○	○始	○始		●始			○発生 期			+0～ノビエ1.5L	500ml	●	○
東北	○1.5	○	○始	○始	○始	●始			●発生 期			植代後～4.0～ ノビエ1.5L		○	○
北陸	○1.5	○	○始		○始	○始	○前※		○発生 期					○	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	○始	○前※		○発生 期		○始			○	○
近・中・四 (管)	○1.5	○	○始		○始	始 ○前	○前※		○発生 期		●前			○	○
九州	○1.5	○	○始		○始									○	○

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-2

YH-651-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1.5	○	○始	○始		●始			●発生 期			+0～ノビエ1.5L	1kg	●	○
東北	○1.5	○	○始		○始	●始	●前※		●発生 期			植代後～4.0～ ノビエ1.5L		●	○
北陸	○1.5	○	○始		始 ○前	●始	●前※		●発生 期					●	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	●始	●前※		●発生 期					●	○
近・中・四	○1.5	○	○始		○始	●始	●前※		●発生 期					○	○
九州	○1.5	○	○始		○始		●前※							●	○

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-2

ブタコール 乳

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	1 ○前	○	始 ○前	始 ○前								植代時(-4まで)+1 ～ノビエ1L	300～500ml 植代時+400 ～500ml		○
東北	○1	○	○始	○始	○前							植代時(-4まで)+1 ～+6(ノビエ1L)	300～ 500ml		○
北陸	○前	○	○前		○前							植代時(-4まで)	350～ 500ml		○
関東・東海	○前	○	○前		○前								300～ 500ml		○
近・中・四 (管)	○前	○											350～ 500ml		○
九州 (管)	○前	○													○

植代時は土壌混和処理

混和時の水深3～5cm

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-2

ブタコール-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1	○	○始	○前							※アオイ:始	+0～+6(ノビエ1L)	1kg	○	○
東北	○1	○	○始		○始							植代後～4.0～+6(ノ ビエ1L)(砂壤土+1 ～)		○	○
北陸	○1	○	○始		○始							植代後～4.0～ +6(ノビエ1L)		○	○
関東・東海	○1	○	○始		○始							植代後～4.0～+4～ +6(ノビエ1L)		○	○
近・中・四	○1	○	○始		○始							植代後～4.0～+1～ +6(ノビエ1L)		○	○
九州	○1	○	○始		○始									○	○

田植同時散布確認(北陸・関東・東海)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 浅植え、植え付け精度不良等で根が露出すると薬害を生じることがある。

A-3 体系処理(中後期)

A-3

AVH-301-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸															
関東・東海		●	●2		●2	●2			●発生 期			+15～+20	1kg		●
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

BAG-032 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北	●2	●	●2	●始	●始	●始	●前※	●前※	●発生 期	●再生 前～始	●前	+15～+25(ノビエ 2Lまで)	20g×10コ	●	●
北陸															
関東・東海	●2	●	●2		●2	●始	●前※	●前※	●発生 期	●再生 前～始	●前	+15～+25(ノビエ 2Lまで)	20g×10コ	●	●
近・中・四															
九州															

※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3

BCH-044-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+20～+30 (ノビエ2.5Lまで)	1kg	●	●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始	●始※	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		●	●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2	●始※	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●

※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3

BCH-045L-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始	●始	●始	●発生 期	●再生 前～始	●前	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)	1kg	●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3

DASH-001 SC

JAS-F001 SC															
地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 堆土
北海道	○5	○	○花茎 抽出始	○5		○4			○生育 期	○生育 期		+25～+40(イネ6L以 降、ノビエ5Lまで)	100ml(散布 液量100L)	○	○
東北	○5	○	○花茎 抽出始	○4	○4	○4	○草丈 20cm※	○草丈 30cm※	○生育 期	○生育 期				○	○
北陸	○5	○	○花茎 抽出始		○4	○5	○草丈 30cm	○草丈 30cm	○生育 期	○生育 期				○	○
関東・東海	○5	○	○花茎 抽出始		○5	○5	○草丈 30cm※	○草丈 30cm※	○生育 期	○生育 期				○	○
近・中・四	○5	○	○花茎 抽出始		○5	○5	○草丈 30cm	○草丈 30cm		○生育 期		※オモダカ・生育期(草丈 20cm以下)		○	○
九州	○5	○	○花茎 抽出始		○6	○6			○生育 期	○生育 期				○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組合せで使用する。

落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。

オモダカ・クログワイ防除有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3

DBH-1294-1kg 粒(1kg/10a)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 堆土
北海道												+15～+40(ノビエ 3Lまで)	1kg		●
東北	●3														●
北陸	●3														●
関東・東海	●3											+15～+40(ノビエ 4Lまで)			●
近・中・四	●4											+15～+40(ノビエ 3Lまで)			●
九州	●3														●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

DBH-1294-1kg 粒(1.5kg/10a)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 堆土
北海道												+15～+40(ノビエ 4Lまで)	1.5kg		●
東北	●4														●
北陸															●
関東・東海	●4											+15～+40(ノビエ 5Lまで)	1.5kg		●
近・中・四	●5											+15～+40(ノビエ 4Lまで)			●
九州	●4														●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

DBH-1295 液(ME)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 堆土
北海道	●6											+20～+40(ノビエ 6Lまで)	100ml(散布 液量100L)		●
東北	●5											+20～+40(ノビエ 5Lまで)			●
北陸	●5														●
関東・東海	●5														●
近・中・四	●6											+20～+40(ノビエ 6Lまで)		●	●
九州	●5											+20～+40(ノビエ 5Lまで)			●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

DEH-112-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	○5											+15～ノビエ5L	1～1.5kg/ ノビエ4Lを越 える場合は 1.5kg)	○	○
東北	○5													○	○
北陸	○5													○	○
関東・東海	○5										キノウスズメノヒエ・再生 茎2～4葉			○	○
近・中・四	○5										キノウスズメノヒエ・再生茎 2～4葉（7センチ以上生育 期(茎長20cm以下)）			○	○
九州	○5										キノウスズメノヒエ・再生茎 2～4葉（7センチ以上生育 期(茎長20cm以下)）			○	○
減水深：2cm/日以下															
使用上の注意： 前処理剤との組み合わせで使用する。 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。 キノウスズメノヒエ防除は展開葉が水面に接する条件で使用する。（関東・東海～九州）															

A-3

DEH-112 乳(EW)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	6 ○5											+25～ノビエ6L	100ml (注)	○	○
東北	6 ○5													○	○
北陸	○5													○	○
関東・東海	6 ○5										キノコスズメノヒエ*	+25～ノビエ6L		○	○
近・中・四	6 ○5										キノコスズメノヒエ*		○	○	
九州	6 ○5										キノコスズメノヒエ* 7センチ以上生育期(茎 長20cm以上)		○	○	

注) 散布液量25～100L/10a。ただし、25～50L散布は少量散布用ノズルを使用。展着剤加用。

*. 再生茎3～6葉期(関東・東海～九州)、畦畔からの匍匐茎1m以内(関東・東海～九州)

畦畔からの侵入個体には全体にかける(関東・東海～九州)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

DKH-311-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+20～+30 (ノビエ2.5Lまで) +15～+25(ノビエ 2.5Lまで)	1kg	●	●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。															

A-3

HOK-0301-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道												+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)	1kg		
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始	●始※		●発生 期					●	●
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始	●始※		●発生 期		●前			●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2	●始※		●発生 期		●前			●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●始	●始※		●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
九州															
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。															
減水深: 2cm/日以下															
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。															
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。															
クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。															

A-3

HOK-221 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸															
関東・東海															
近・中・四	●2	●	●2	●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前		+10～+25 (ノビエ2Lまで)	50g×10=	●	●
九州															

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。

A-3

HSW-941-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2	●	●2	●2		●2		●発生 期		●前	エゾノササガサキ2L	+15～+25 (ノビエ2Lまで)	1kg	●	●
東北															
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

KPP-445 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●1.5	●	●始	●始		●始		●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前	SU抵抗性オモダカ:2L	+10～+20(ノビエ 1.5Lまで)	500ml	● ●
東北	○1.5	○	○始		○始	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	シバノ重丈3cm SU抵抗性オモダカ:2L			● ○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 オモダカ・クログワイ・シバノ防除は有効剤との組み合わせで使用する。

A-3

KPP-445(L) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	○1.5	○	○始		○始	○始	●始※		○発生 期	○再生 前～始	○前		+10～+20(ノビエ 1.5Lまで)	500ml	○ ○
関東・東海	●1.5	●	●始		●始	●始	●始※	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前	SU抵抗性オモダカ:始 SU抵抗性オモダカ:1L			● ●
近・中・四	●1.5	●	●始		●始	●始	●始※	●始※	●発生 期	●再生 前～始					● ●
九州	●1.5	●	●始		●始	●始	●始※	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前				● ●

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 オモダカ・クログワイ防除は有効剤との組み合わせで使用する。

A-3

KUH-013D-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	●3	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+20～+30(ノビエ 3Lまで)	1kg	●	●
関東・東海	●3	●	●2		●2	●2	●始※	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
近・中・四	●3	●	●2		●2	●2	●始※	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
九州	●3	●	●2		●2	●2	●始※	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。															
減水深: 2cm/日以下															
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。															
散布後の暑い・多雨条件により除草効果が低下することがある。															
オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。															

A-3

KUH-013K-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土	
北海道												+20～+30(ノビエ 3Lまで)	1kg			
東北	●3	●	●2	●2	●2	●2	●始※	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前			シズイ草式3cm	●	●
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: <u>前処理剤との組み合わせで使用する。</u> <u>オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。</u>																

A-3

KUH-031 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○4	○	○4	○3		○4		●発生盛期 ～矢張集積 出現迄				+15～+35(ノビエ 4Lまで)	3kg	●	○
東北	○4	○	○4	○4	○3	○3		○東北 20～40cm 盛期～矢張 集積出現迄						●	○
北陸	○4	○	○4		○3	○4		●発生盛期 ～矢張集積 出現迄						●	○
関東・東海	○4	○	○4		○4	○4		●発生盛期 ～矢張集積 出現迄						●	○
近・中・四 (第)	○4	○	○4		○4	○3		●発生盛期 ～矢張集積 出現迄						○	○
九州	○3	○	○4		○4	○4		●発生盛期 ～矢張集積 出現迄				+15～+35 (ノビエ3Lまで)		○	○
※:オモダカ防除は、有効な前処理剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: ごく浅水で散布し、2日間は入水しない。 散布後に降雨等で湛水されると効果が低下することがある。 前処理剤との組み合わせで使用する。 オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。															

A-3

KUH-985 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土	
北海道																
東北	●3	●	●2	●前	●2	●2	●前※	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前	シズイ:草丈3cm	+20～+30(ノビエ 3Lまで)	500ml	●	●
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3

KUH-985(L) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土 ～ 塩土
北海道														
東北														
北陸	●3	●	●2		●2	●2	●始※		●発生 期	●再生 前～始	●前	+20～+30(ノビエ 3Lまで)	500ml	● ●
関東・東海	●3	●	●2		●2	●2	●始※	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前			● ●
近・中・四	●3	●	●2		●2	●2	●始※	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前			● ●
九州	●3	●	●2		●2	●2	●始※	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前			● ●

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 滅水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3

NBA-071-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土 ～ 塩土
北海道														
東北														
北陸														
関東・東海														
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※		○発生 期	○再生 前～始	○前	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)	1kg	○ ○
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			● ●

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 滅水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 クログワイ防除は有効な剤と組み合わせで使用する。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3

NBA-071DEH-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土 ～ 塩土
北海道														
東北	●3	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+20～+30(ノビエ 3Lまで)	1kg	● ●
北陸														
関東・東海														
近・中・四														
九州														

滅水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3

NBA-101SB ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土 ～ 塩土
北海道														
東北														
北陸														
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)	30g×100	● ●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			● ●
九州														

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

A-3

NBA-941S-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	●3	●	●2		●2	●2						+20～+30(ノビエ 3Lまで)	1kg	●	●
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3

NC-385SB 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始		+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)	80g (500ml)	●	●
関東・東海															
近・中・四															
九州															

顆粒のまま水口処理が可能
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3

NC-385SB-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生 期					○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3

NC-604 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始	●始※		●発生 期	●再生 前～始	●前	※ズイ草丈3cm	500ml	●	●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期					●	●
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州															

※: クログワイ防除は、有効剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 クログワイ・ズイ防除は有効剤との組み合わせで使用する。

A-3

NC-606-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													1kg		
東北	○2.5	○	○2	●始	○始	○始		○発生 期	○再生 前～始	○始		+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		●	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始		○発生 期	○再生 前～始	○始				●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始		○再生 前～始	○始				○	○
九州	●2.5	●	●2		●2	●2		●発生 期	●再生 前～始	●前				●	●

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3

NC-607-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始		●発生 期	●再生 前～始	●前		+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)	1kg	●	●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始		●発生 期	●再生 前～始	●前				●	
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2		●発生 期	●再生 前～始	●前				●	
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3

NC-612-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○3.5	○	○4	○3		○4		●生育期 (矢張葉3L まで)※	○発生 期	○再生 前～始	○始	+15～+30 (ノビエ3.5Lまで)	1kg	●	○
東北	○3.5	○	○3	○3	○3	○2	●生育期 (葉丈30cm 以下)※	●生育期 (矢張葉3L まで)※	○発生 期	○再生 前～始	○始	+15～+35 +30 (ノビエ3.5Lまで)		●	○
北陸	○3.5	○	○3		○3	○3	●生育期 (葉丈30cm 以下)※	●生育期 (矢張葉3L まで)※	○発生 期	○再生 前～始				●	○
関東・東海	○3.5	○	○3		○3	○3	●生育期 (葉丈30cm 以下)※	●生育期 (矢張葉3L まで)※	○発生 期	○再生 前～始	○始			●	○
近・中・四	○3.5	○	○3		○3	○3	●生育期 (葉丈30cm 以下)※	●生育期 (矢張葉3L まで)※	○発生 期	○再生 前～始	○始			●	○
九州	○3.5	○	○4		○4	○4	●生育期 (葉丈30cm 以下)※	●生育期 (矢張葉3L まで)※	○発生 期	○再生 前～始	○始			●	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネ4L未満では、薬害を生じることがある(関・東)
 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

NH-101 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●2	●前※	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)	50g×10コ	●	●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
 オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3

NH-102 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道																
東北																
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2	●始	●始	●発生 期	●再生 前～始	●前		+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)	500ml	●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2	●始※	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前	イボクサ・再生始			●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2	●始	●始	●発生 期	●再生 前～始	●前				●	●
九州																

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-3

SB-554 シェンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●1.5	●	●始	●始				●発生 期					+10～+20(ノビエ 1.5Lまで)	50g×10×	●	●
東北	○1.5	○	○始		○始		○前※	○発生 期			シズイ・草丈3cm				○	○
北陸	○1.5	○	○始		○始			○発生 期							○	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始		○前※	○発生 期							○	○
近・中・四																
九州																

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用。
 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-3

SB-554 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●1.5	●	●始	●始				●発生 期			シズイ・草丈3cm		+10～+20(ノビエ 1.5Lまで)	500ml	●	●
東北	○1.5	○	○始		○始		○前※	○発生 期			シズイ・草丈3cm				○	○
北陸	○1.5	○	○始		○始		○前※	○発生 期							○	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始		○前※	○発生 期			イボクサ・再生始 SU抵抗性コナギ:1L				○	○
近・中・四	○1.5	○	○始		○始	○前	●前※	○発生 期							○	○
九州																

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組合せで使用。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-3

SB-556 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道																
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始		●発生 期			シズイ・草丈3cm		+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)	500ml	●	●
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始		●発生 期							●	●
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2					SU抵抗性コナギ:2L イボクサ・再生始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2		○発生 期							○	○
九州	○2.5	○	○2	○前	○2	○2		○発生 期			イボクサ・再生始				○	○

水口処理可能
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-3

SB-563(L)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)	1kg	●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。															

A-3

SL-0401-1kg 粒(1kg/10a)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○4		○4	○3		○4			○生育 期			+20～+35 (ノビエ4Lまで)	1kg	●	○
東北	○4		○4			○3			○生育 期			+14 +20～+35(ノビ エ4Lまで)		●	○
北陸	○4		○4			○3			○生育 期					●	○
関東・東海	○4		○4			○3			○生育 期					●	○
近・中・四	○4		○4			○4			○生育 期					●	○
九州	○3		○4			○3			○生育 期			+14 +30～+35(ノビ エ3Lまで)		○	○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。															

A-3

SL-0401-1kg 粒(1.5kg/10a)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○5		○4	○4		○4			○生育 期			+30～+40 (ノビエ5Lまで)	1.5kg	●	○
東北	○5		○5			○4			○生育 期						○
北陸	○5		○4			○4			○生育 期			+14 +30～+40 (ノビエ5Lまで)			○
関東・東海	○5		○5			○4			○生育 期					●	○
近・中・四	○5		○5			○4			○生育 期			+14 +30～+40(ノビエ5L まで、砂壌土は+30～)		●	○
九州	○4		○5			○4			○生育 期			+30～+40 (ノビエ4Lまで)		○	○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。															

A-3

SST-403 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●1.5	●	●始	●始		●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+10～+20(ノビエ 1.5Lまで)	500ml	●	●
東北	●1.5	●	●始	●前	●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
北陸	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
関東・東海	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
近・中・四	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
九州	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。															

A-3

SB-563(L)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)	1kg	●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3

SL-0401-1kg 粒 (1kg/10a)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○4		○4	○3		○4			○生育 期			+20～+35 (ノビエ4Lまで)	1kg	●	○
東北	○4		○4			○3			○生育 期			+14 +20～+35(ノビ エ4Lまで)		●	○
北陸	○4		○4			○3			○生育 期					●	○
関東・東海	○4		○4			○3			○生育 期					●	○
近・中・四	○4		○4			○4			○生育 期					●	○
九州	○3		○4			○3			○生育 期			+14 +20～+35(ノビ エ3Lまで)		○	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

SL-0401-1kg 粒 (1.5kg/10a)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○5		○4	○4		○4			○生育 期			+30～+40 (ノビエ5Lまで)	1.5kg	●	○
東北	○5		○5			○4			○生育 期						○
北陸	○5		○4			○4			○生育 期			+14 +30～+40 (ノビエ5Lまで)			○
関東・東海	○5		○5			○4			○生育 期					●	○
近・中・四	○5		○5			○4			○生育 期			+14 +30～+40(ノビエ5L まで、砂壌土は+30～)		●	○
九州	○4		○5			○4			○生育 期			+30～+40 (ノビエ4Lまで)		○	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

SST-403 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●1.5	●	●始	●始		●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+10～+20(ノビエ 1.5Lまで)	500ml	●	●
東北	●1.5	●	●始	●前	●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
北陸	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
関東・東海	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
近・中・四	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
九州	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3

SST-403-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハエ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 埴土
北海道	●1.5	●	●始	●始		●始			●発生 期	●再生 前～始	●前		+10～+20(ノビエ 1.5Lまで)	1kg	●	●
東北	●1.5	●	●始	●始	●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●	●
北陸	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●	●
関東・東海	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●	●
近・中・四	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始					●	●
九州	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●	●
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。																

A-3

SW-005(L) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハエ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道																
東北																
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2	●始	●始	●発生 期				+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)	500ml	●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	イボクサ・再生始			●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●	●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●	●
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。																

A-3

SW-032 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハエ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土	
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	SU抵抗性オタネイ2L	+20～+30 (ノビエ2.5Lまで)	500ml	●	●	
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	SU抵抗性オタネイ2L	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		●	●	
北陸																	
関東・東海																	
近・中・四																	
九州																	
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。																	

A-3

SW-041(H)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2		●始	●発生 期	●再生 前～始	●前	SU抵抗性オタ イ1.5L	+20～+30 (ノビエ2.5Lまで)	1kg	●	●
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性オタ イ1.5L	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		○	○
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。																
減水深: 2cm/日以下																
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。 オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。																

A-3

SW-042(L) シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)	35g×10a	●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始				●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3

SW-051-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北	●3.5	●	●3		●3	●3			●発生 期	●再生 前～始		+20～+30(ノビエ 3.5Lまで)	1kg		●
北陸	●3.5	●	●3		●3	●3			●発生 期	●再生 前～始					●
関東・東海	●3.5	●	●3		●4	●3			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四 (皆)	●3.5	●	●3		●2	●3			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●3.5	●	●3		●4	●4			●発生 期						●

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

TH-001 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸															
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始		+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)	40g×10a	○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●

※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3

TH-001 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2		●始	●発生 期	●再生 前～始	●前	+20～+30 (ノビエ2.5Lまで)	500ml	●	●
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○2	○前※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2	○始	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 水口処理可能
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3

TH-001-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヒ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2		●発生 期	●再生 前～始	●前	ミズアオイ:1L		+20～+30 (ノビエ2.5Lまで)	1kg	●	●
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ:重さ3cm		+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始		○発生 期	○再生 前～始						●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	コキヤガラ:始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始		○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2		○発生 期	○再生 前～始	○前					○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組合せで使用する。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 オモダカ・クログワイ・コキヤガラ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3

TH-005 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヒ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道																
東北																
北陸																
関東・東海	●2	●	●2		●2	●始	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前			+12～+25(ノビエ 2Lまで)	50g×10コ	●	●
近・中・四	○2	○	○2		○2	○始	●始	○発生 期	○再生 前～始	○前					○	○
九州																

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3

TH-122-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヒ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2		●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前		+20～+30 (ノビエ2.5Lまで)	1kg	●	●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始	●始※	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前		+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		●	●
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始	●始※	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前				●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2	●始※	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前				●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2	●始※	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前				●	●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2	●始※	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前				●	●

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3

TH-224 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヒ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2		●発生 期	●再生 前～始	●前			+20～+30 (ノビエ2.5Lまで)	500ml	●	●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始		●発生 期	●再生 前～始	●前			+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		●	●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始		●発生 期	●再生 前～始	●前					●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2		●発生 期	●再生 前～始	●前						●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2		●発生 期	●再生 前～始	●前					●	●
九州																

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-3

TH-421 シェンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤 土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始		●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前	+20～+30 (ノビエ2.5Lまで)	40g×10㎡	●	●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始	●始※	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前	+15～+25(ノビエ 2.5Lまで)		●	●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2	●始※	●始※	●発生 期		●前			●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2	●始※	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2	●始※	●始※	●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
九州															

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3

TH-913(H) 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤 土	壤土 ～ 埴土
北海道		○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始		±25 +10～+15	3kg	○	○
東北		○	○2		○2	○2	○始※					±25 +10～+15			○
北陸		○	○2		○2	○2									○
関東・東海 (※)		○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期	○再生 前～始		+10～+25		○	○
近・中・四 (普)		○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州 (普)		○	○2		○2	○2	○始※					+10～+15		○	○

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

クログワイ、シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 特殊雑草(アゼガヤ)

A-4 アゼガヤ

DEH-112 乳(EW)

地域名	対象雑草: A-4 アゼガヤ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			100ml(散布液量100L)
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州	●	生育期(草丈60cm以下)	

使用上の注意:

A-4 アゼガヤ

DEH-112-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 アゼガヤ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四	●	生育期(草丈20cm以下)	
九州	○	5L 生育期(草丈20cm以下)	

使用上の注意:

A-4 特殊雑草(イボクサ)

A-4 イボクサ

NC-612-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 イボクサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	生育期(茎長20cm以下)	
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 特殊雑草(エゾノサヤヌカグサ)

A-4 エゾノサヤヌカグサ

BCH-044-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 エゾノサヤヌカグサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 エゾノサヤヌカグサ

HOK-0301-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 エゾノサヤヌカグサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 エゾノサヤヌカグサ

YH-652 フロアブル

地域名	対象雑草: A-4 エゾノサヤヌカグサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	500ml
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 特殊雑草(オモダカ)

A-4 オモダカ

BAG-032 ジェンボ

地域名	対象雑草: A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	前	※	20g×10 ²
東北	●	前	※	
北陸	●	前	※	
関東・東海	●	前	※	
近・中・四	●	前	※	
九州	●	前	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

BCH-031-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

BCH-032-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

BCH-033-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州	●	始	※	
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

BCH-044-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州	●	始	※	
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

BCH-045L-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	始		
関東・東海				
近・中・四				
九州				
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

CGM-71 フロアブル

地域名	対象雑草: A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	●	始		
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

KPP-444-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始	※	1kg
東北	○	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

KPP-444(L)-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

KPP-445 フロアブル

地域名	対象雑草: A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始	※	500ml
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。				
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

KPP-445(L) フロアブル

地域名	対象雑草: A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

KUH-011D-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸				
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	○	始	※	
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

KUH-013D-0.25kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				250g
東北				
北陸	●	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	○	始	※	
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

KUH-013D-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸				
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	○	始	※	
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

KUH-021-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	始	※	
北陸	○	始		
関東・東海				
近・中・四				
九州	○	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

KUH-023D フロアブル

地域名	対象雑草: A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

KUH-023K フロアブル

地域名	対象雑草: A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

KUH-031 粒

地域名	対象雑草: A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	発生盛期～矢尻葉抽出期	※	3kg
東北	○	草丈30cm以下 発生盛期～矢尻葉抽出期	※	
北陸	●	発生盛期～矢尻葉抽出期	※	
関東・東海	●	発生盛期～矢尻葉抽出期	※	
近・中・四	●	発生盛期～矢尻葉抽出期	※	
九州	●	発生盛期～矢尻葉抽出期	※	

※:オモダカ防除は、有効な前処理剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。
ごく浅水で散布し、2日間は入水しない。
散布後に降雨等で灌水されると効果が低下することがある。

A-4 オモダカ

MY-100DC(L) フロアブル

地域名	対象雑草: A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸				
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	○	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

MY-100DC(L)-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸				
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	○	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

NC-612-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道	●	生育期(矢尻葉3Lまで)	※	1kg
東北	●	生育期(矢尻葉3Lまで)	※	
北陸	●	生育期(矢尻葉3Lまで)	※	
関東・東海	●	生育期(矢尻葉3Lまで)	※	
近・中・四	●	生育期(矢尻葉3Lまで)	※	
九州	●	生育期(矢尻葉3Lまで)	※	

※:オモダカ防除は、連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意:

A-4 オモダカ

NHF-401 粒

地域名	対象雑草: A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				3kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

NOJ-101-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道	○	前		1kg
東北	○	前	※	
北陸				
関東・東海	○	始	※	
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

SB-559(H)-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

SB-559(L)-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

SB-564 フロアブル

地域名	対象雑草: A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

SB-564-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

SW-005(L) フロアブル

地域名	対象雑草: A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸	○	始		
関東・東海				
近・中・四				
九州				
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

SYJ-108 ジャンボ

地域名	対象雑草: A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	○	始		30g×10 ³
東北	○	始	※	
北陸				
関東・東海	○	始	※	
近・中・四				
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

TH-001 ジャンボ

地域名	対象雑草： A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				40g×10 ³
東北				
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

TH-001-1kg 粒

地域名	対象雑草： A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				
※：オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意： オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

TH-122-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始	※	1kg
東北	●	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

TH-421 シャンボ

地域名	対象雑草: A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始	※	40g×10 ²
東北	●	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

YH-641-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	○	始		1kg
東北	○	始	※	
北陸	○	始		
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	●	始		
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。				
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

YH-650 フロアブル

地域名	対象雑草: A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸	●	前		
関東・東海	●	前	※	
近・中・四				
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。				
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

YH-652 フロアブル

地域名	対象雑草: A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始	※	500ml
東北	●	始	※	
北陸	○	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	○	始	※	
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

YH-652-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始	※	1kg
東北	●	始	※	
北陸	○	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	●	始	※	
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 特殊雑草(クサネム)

A-4 クサネム

DASH-001 SC

地域名	対象雑草: A-4 クサネム	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			100mℓ(散布容量100ℓ)
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四	●	生育期(草丈20cm以下)	
九州			
使用上の注意: 落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。			

A-4 クサネム

YH-911 液

地域名	対象雑草: A-4 クサネム	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
全域	○	+30～草丈40cm (九州は～草丈30cm)	25～50ml(散布液量100L) 展着剤加用 50～100ml(散布液量100L) 展着剤無加用
使用上の注意: 落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。			

A-4 クサネム

YH-652 フロアブル

地域名	対象雑草: A-4 クサネム	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北			
北陸			
関東・東海	●	本葉2L	
近・中・四	●	本葉1L	
九州			
使用上の注意:			

A-4 特殊雑草(クログワイ)

A-4 クログワイ

BAG-032 ジャンボ

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				20g×10 ³
東北	●	前	※	
北陸	●	前	※	
関東・東海	●	前	※	
近・中・四	●	前	※	
九州	●	前	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

BCH-031-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州	●	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。				
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

BCH-032-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。				
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

BCH-033-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

KPP-445 フロアブル

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

KPP-445(L) フロアブル

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

KUH-011D-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸				
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	○	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

KUH-013D-0.25kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				250g
東北				
北陸	●	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	○	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

KUH-013D-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸				
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	○	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

KUH-021-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	始	※	
北陸	○	始		
関東・東海				
近・中・四				
九州	○	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

KUH-023D フロアブル

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

KUH-023K フロアブル

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

MAT-159 シャンボ

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				50g×10㎡
東北				
北陸				
関東・東海	○	前	※	
近・中・四				
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

MY-100TSC フロアブル

地域名	対象雑草： A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始		
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

NC-604 フロアブル

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	○	始	※	
北陸				
関東・東海	○	始	※	
近・中・四				
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

NC-606-1kg 粒

地域名	対象雑草： A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始		
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

NC-612-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	生育期(草丈30cm以下)	※	
北陸	●	生育期(草丈30cm以下)	※	
関東・東海	●	生育期(草丈30cm以下)	※	
近・中・四	●	生育期(草丈30cm以下)	※	
九州	●	生育期(草丈30cm以下)	※	
※:クログワイ防除は、連年施用することによりさらに効果が向上する。				
使用上の注意:				

A-4 クログワイ

NH-806 ジェンボ

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				50g×10コ
東北				
北陸				
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	●	始		
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

NHF-401 粒

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				3kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

NOJ-101-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	前	※	
北陸				
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	前	※	
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

NOJ-104-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸				
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

SB-528 フロアフル

地域名	対象雑草： A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	○	前	※	
北陸	●	前	※	
関東・東海	○	前	※	
近・中・四	○	前	※	
九州	○	前	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

SB-528(L) フロアブル

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	●	前	※	
北陸	●	前		
関東・東海	○	前	※	
近・中・四	●	前		
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

SB-554 ジャンボ

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				50×10 ³
東北				
北陸				
関東・東海				
近・中・四	●	前		
九州				

使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

SB-554 フロアブル

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	○	前	※	
北陸	○	前	※	
関東・東海	○	前	※	
近・中・四	●	前	※	
九州	●	前	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

SB-559(H)-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

SB-559(L)-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

SB-564 フロアブル

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四	●	始		
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

SB-564-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四	●	始		
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

SST-402-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

SW-005(L) フロアブル

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸	○	始		
関東・東海				
近・中・四				
九州				

使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

SYJ-108 シャンボ

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				30g×10 ²
東北	○	始	※	
北陸				
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始		
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

TH-001 シャンボ

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				40g×10 ²
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始		
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。				
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

TH-001 フロアブル

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	○	前	※	
北陸				
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	●	始		
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

TH-001-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始		
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

TH-005 ジャンボ

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				50g×10 ³
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始		
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

TH-122-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

TH-421 ジャンボ

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				40g×10 ³
東北	●	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

YH-641-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	前	※	
北陸	○	始		
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	●	始		
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

YH-651-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	前	※	
北陸	●	前	※	
関東・東海	●	前	※	
近・中・四	●	前	※	
九州	●	前	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

YH-652-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸	○	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	●	始	※	
※: クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 特殊雑草(コウキヤガラ)

A-4 コウキヤガラ

KUJ-021-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	○	始	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州	○	始	
使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。			

A-4 コウキヤガラ

NC-612-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	●	生育期(草丈30cm以下)	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州	●	生育期(草丈30cm以下)	
使用上の注意:			

A-4 コウキヤガラ

SB-528 フロアブル

地域名	対象雑草: A-4 コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北			
北陸			
関東・東海	●	前	
近・中・四			
九州			
使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。			

A-4 コウキヤガラ

SB-564 フロアブル

地域名	対象雑草: A-4 コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州	●	始	
使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。			

A-4 コウキヤガラ

SB-564-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州	●	始	
使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。			

A-4 コウキヤガラ

TH-001 フロアブル

地域名	対象雑草: A-4 コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北	○	始	
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州			

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

TH-001-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州			

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 特殊雑草(シズイ)

A-4 シズイ

KPP-445 フロアブル

地域名	対象雑草: A-4 シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北	●	草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意: シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 シズイ

KUH-023K フロアブル

地域名	対象雑草: A-4 シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北	●	草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意: シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 シズイ

NC-612-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	●	生育期(草丈30cm以下)	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 シズイ

SB-559(H)-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	●	草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意: シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 シズイ

SB-564 フロアブル

地域名	対象雑草: A-4 シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●		500ml
東北		草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意: シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。			

A-4 シズイ

SB-564-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●		1kg
東北		草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意: シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。			

A-4 シズイ

SST-402-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●		1kg
東北		草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意: シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。			

A-4 シズイ

TH-001 ジャンボ

地域名	対象雑草: A-4 シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●		40g×10コ
東北		草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意: シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。			

A-4 特殊雑草(ミズアオイ)

A-4 ミズアオイ

BCH-044-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	始	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 ミズアオイ

KPP-444-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	1L	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 ミズアオイ

KUH-023K フロアブル

地域名	対象雑草: A-4 ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	1L	500ml
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 ミズアオイ

SB-554 フロアブル

地域名	対象雑草: A-4 ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	始	500ml
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 ミズアオイ

SB-559(H)-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	1L	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 ミズアオイ

SB-564 フロアブル

地域名	対象雑草: A-4 ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	500ml
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 ミズアオイ

SB-564-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 ミズアオイ

SYJ-156-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 ミズアオイ

TH-001 ジャンボ

地域名	対象雑草: A-4 ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	1L	40g×10コ
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 特殊雑草(SU抵抗性コナギ)

A-4 SU抵抗性コナギ

KPP-444(L)-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 SU抵抗性コナギ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 SU抵抗性コナギ

KPP-445(L) フロアフル

地域名	対象雑草: A-4 SU抵抗性コナギ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 SU抵抗性コナギ

NC-612-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 SU抵抗性コナギ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	3L	
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 SU抵抗性コナギ

SYJ-157-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 SU抵抗性コナギ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	1L	
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 特殊雑草(SU抵抗性ホタルイ)

A-4 SU抵抗性ホタルイ

KPP-445 フロアフル

地域名	対象雑草： A-4 SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	500ml
東北	●	2L	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意：			

A-4 SU抵抗性ホタルイ

KPP-445(L) フロアブル

地域名	対象雑草： A-4 SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北			
北陸			
関東・東海	●	1L	
近・中・四			
九州			
使用上の注意：			

A-4 SU抵抗性ホタルイ

KUH-023D フロアブル

地域名	対象雑草： A-4 SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北			
北陸			
関東・東海	○	2L	
近・中・四			
九州			
使用上の注意：			

A-4 SU抵抗性ホタルイ

KUH-023K フロアブル

地域名	対象雑草: A-4 SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	1L	500ml
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 SU抵抗性ホタルイ

NC-385SB 顆粒水和

地域名	対象雑草: A-4 SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	80g(散布水量500ml)
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 SU抵抗性ホタルイ

NC-385SB-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 SU抵抗性ホタルイ

NC-604 フロアブル

地域名	対象雑草： A-4 SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	500ml
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意：			

A-4 SU抵抗性ホタルイ

NC-612-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	2L	
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 SU抵抗性ホタルイ

SB-559(H)-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 SU抵抗性ホタルイ

SW-032 フロアブル

地域名	対象雑草: A-4 SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	500ml
東北	●	2L	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 SU抵抗性ホタルイ

SYJ-156-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	1kg
東北	○	2L	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 SU抵抗性ホタルイ

SYJ-157-1kg 粒

地域名	対象雑草: A-4 SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	1L	
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

B 直播栽培

B

HOK-221 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北陸関東・東海 ～九州	○2.5	○	○2		○2	○2						イネ1L～ノビエ 2.5L	50g×10		○

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、薬害や効果不足が生じることがある。

B

KPP-2008 乳(EW)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北陸～九州	○前	○	○前		○前							植代後 代かき後 ～4	300ml	●	○

湛水直播

湛水条件で使用する

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 出芽時に湛水条件になると薬害を生じる。

B

KUH-011K-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道、東北	○2.5	○	○2	○始	○始	○始			○発生 期	○再生 前～始		イネ1L～ノビエ 2.5L	1kg	●	○

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

KUH-013D シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北陸～九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始		イネ1L～ノビエ 2.5L	25g×10		○

湛水直播

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、薬害や効果不足が生じることがある。

B

KUH-013D-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北陸～九州	○3	○	○2		○2	○2				○再生 前～始		イネ1L～ノビエ 3L(砂壌土はイネ 1.6L～)	1kg	○	○

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

KUH-013K-0.25kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道、東北	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始		イネ1L～ノビエ 2.5L	250g	●	○

湛水直播

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

KUH-013K-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道、東北	○3	○	○2	○始	●始	○始			○発生 期	○再生 前～始			イネ1L～ノビエ3L	1kg	●	○

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

MY-100TSC フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
全域	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始			イネ1L～ノビエ 2.5L	500ml	●	○

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

NBA-071DEH-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
東北～九州	○3	○	○2		○2	○2							イネ1L～ノビエ3L	1kg		○

湛水直播

湛水条件で使用する

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

NBA-941S-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
全域 (北海道を除く)	○3	○	○2	●2	○2					○再生 前～始			イネ1L～ノビエ3L (東北はイネ1.6L～)	1kg		○

湛水直播

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

NC-622 液

地域名		対象雑草	処理時期	使用量(散布液量) /10a	適用土壌
全域		全草種	雑草生育期(播種前～イネ出芽前)	200～500ml(散布液量25～50L)	全土壌

乾田直播 乾田条件で使用する 専用ノズルを用いる

使用上の注意:

B

NH-104-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北陸～九州	●2.5	●	●2		●2	●2							イネ1L～ノビエ 2.5L	1kg		●

湛水条件で使用する

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

SB-528 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
東北～九州	●前	●	●前		●前							代かき後～4	300ml	●	●

湛水直播

湛水条件で使用する

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 出芽時に湛水条件になると薬害を生じる。

B

SB-551-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北陸～九州	●3	●	●3		●2	●始						イネ4L～ノビエ3L	1kg		●

湛水条件で使用する

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の低温および急激な気温の上昇により薬害を生じることがある。
前処理剤との組み合わせで使用する。

B

SST-402-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
全域	●2.5	●	●2		●2	●2				●再生 前～始		イネ1L～ノビエ 2.5L	1kg		●

湛水条件で使用する

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

SW-012(H)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道、東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始		イネ1L～ノビエ 2.5L	1kg	○	○

湛水条件で使用する

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

SYJ-171 液

地域名	対象雑草	処理時期	使用量(散布液量) /10a	適用土壌
全域	全草種	雑草生育期(播種前～イネ出芽前)	500～1000ml(散布液量100～150L)	全土壌

乾田直播 乾田条件で使用する

使用上の注意: 水稲種初に薬液がかかると出芽を阻害する。

B

TH-001 シェンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北陸～九州	●2.5	●	●2		●2	●2				●再生 前～始		イネ1L～ノビエ 2.5L	40g×10コ		●

湛水条件で使用する

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。
5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、薬害や効果不足が生じることがある。

B

TH-001 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズカヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
全域	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始			イネ1L～ノビエ 2.5L	500ml		●

湛水条件で使用する
減水深:2cm/日以下
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

TH-001-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズカヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
全域	●2.5	●	●2	●始	●2	●2			●発生 期	●再生 前～始			イネ1L～ノビエ 2.5L	1kg		●

湛水条件で使用する
減水深:2cm/日以下
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

C 畦畔

C

NC-622 液

地域名		対象雑草	処理時期	使用量(散布液量) /10a	適用土壌
全域		全草種 雑草全般	雑草生育期(草丈30cm以下)	雑草全般: 200～500ml (散布液量25～50L, 100L, 25～50Lは専用ノズルを使用)	全土壌
		スギナ	スギナ生育期(草丈30cm以下)	1500～2000ml (散布液量25 50～100L, 25～50Lは専用ノズルを使用)	
		アシカキ、キシュウスズメノヒエ、 ハイコヌカグサ等 多年生イネ科雑草	雑草生育期(草丈30cm以下)	500～1000ml (散布液量25～100L, 25～50Lは専用ノズルを使用)	

使用上の注意: 水田内に流入または飛散すると薬害を生じる。

C

SYJ-171 液

地域名		対象雑草	処理時期	使用量(散布液量) /10a	適用土壌
全域		雑草全般	雑草生育期(草丈30cm以下)	一年生雑草:500～1000ml, 多年生雑草:1000～2000ml (散布液量100～150L)	全土壌

使用上の注意: 水田内に流入または飛散すると薬害を生じる。

D 耕起前

D

AH-01 液

地域名		対象雑草	処理時期	使用量(散布液量) /10a	適用土壌
全域		全草種 雑草全般	耕起7日以前 耕起前 雑草生育期(草丈30cm以下)	300～500ml (散布液量100～150L)	全土壌

使用上の注意:

D

NC-622 液

地域名		対象雑草	処理時期	使用量(散布液量) /10a	適用土壌
全域		雑草全般	耕起前 雑草生育期(草丈30cm以下)	200～500ml (散布液量25～100L, 25～50Lは専用ノズルを使用)	全土壌
使用上の注意:					

D

SYJ-171 液

地域名		対象雑草	処理時期	使用量(散布液量) /10a	適用土壌
全域		雑草全般	耕起前 雑草生育期(草丈30cm以下)	500～1000ml (散布液量100～150L)	全土壌
使用上の注意:					

E 休耕田

E

NC-622 液

地域名		対象雑草	処理時期	使用量(散布液量) /10a	適用土壌
全域		全草種 雑草全般	雑草生育期(草丈1m以下)	一年生雑草:200～500ml 多年生雑草:500～1000ml (散布液量25～50 100 L, 25～50Lは専用ノ ズルを使用)	全土壌
使用上の注意:					

E

SYJ-171 液

地域名		対象雑草	処理時期	使用量(散布液量) /10a	適用土壌
全域		雑草全般	雑草生育期(草丈50cm以下)	一年生雑草:500～1000ml 多年生雑草:1000～2000ml (散布液量100～150L)	全土壌
使用上の注意:					

その他

その他

DEH-112 乳(EW)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土
全域	○5												播種後10日～ノビ エ6L 雑草生育期(ノビエ 5Lまで)	0.1ml(散 布液量 100ml)/ ㎡		
機械移植育苗に使用する。展着剤加用。																
使用上の注意:																