

新登録除草剤・植物成長調整剤一覧

農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課
平成18年11月1日～平成19年3月31日

(1) 水稲作(移植・直播)

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作 物 名	適用雑草	適用地域	適用 土壌	使用量	使用時期	使用 方法	使用回数	登録 会社
イマゾス ルフロ ン・プロ モブチ ド・ペン トキサ ゾン 粒剤	ヨシキタ 1キロ粒 剤	1-(2-クロロイタツ[1,2- a]ピリジン-3-イルスルホ ニル)-3-(4,6-ジメチルピ リジン-2-イル)尿素... 0.90%、(RS)-2-プロモ N-(α , α -ジメチルベン ジル)-3,3-ジメチルブチ ル...9.0%、3-(4-クロ ロ-5-シクロペンチルオキシ 2-フルオロフェニル)-5-イ ソプロピルピリジン-1,3-オキサ ゾリン-2,4-ジオン... 3.9%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生雑 草、マツバイ、ホタル イ、ウリカワ、ミズガ ヤツ(北海道を除 く)、ヘラオモガ(北 海道、東北)、ヒル シロ、セリ、アオド ロ・薬類による表 層はく離(近畿・ 中国・四国を除 く)	北海道、東北 北陸、関東・ 東山・東海、 九州の普通 期及び早期 栽培地帯	壤土～ 埴土	1kg/10a	移植直後～移植 後12日(ビエの 1.5葉期まで)	湛水 散布	本剤の使用回 数...1回、イマ ゾスルフロ ンを含む農 薬の総使用回 数...2回以内、 プロモブチド を含む農薬の 総使用回数... 2回以内、ペン トキサゾン を含む農薬の 総使用回数... 2回以内	住化武 田農薬 ㈱、科 研製薬 ㈱
								1kg/10a	移植直後～移植 後10日(ビエの 1.5葉期まで)			
								1kg/10a				
イマゾス ルフロ ン・プロ モブチ ド・ペン トキサ ゾン 水和剤	ヨシキタ フロア ブル	1-(2-クロロイタツ[1,2- a]ピリジン-3-イルスルホ ニル)-3-(4,6-ジメチルピ リジン-2-イル)尿素... 1.7%、(RS)-2-プロモ N-(α , α -ジメチルベン ジル)-3,3-ジメチルブチ ル...16.3%、3-(4-クロ ロ-5-シクロペンチルオキシ 2-フルオロフェニル)-5-イ ソプロピルピリジン-1,3-オキサ ゾリン-2,4-ジオン... 7.0%	水和 剤	移植 水稲	水田一年生雑 草、マツバイ、ホタル イ、ウリカワ、ミズガ ヤツ(北海道を除 く)、ヘラオモガ(北 海道、東北)、ヒル シロ、セリ、アオド ロ・薬類による表 層はく離	北海道、東北 北陸、関東・ 東山・東海、 九州の普通 期及び早期 栽培地帯	壤土～ 埴土	500ml/10a	移植直後～移植 後12日(ビエの 1.5葉期まで)	原液 湛水 散布	本剤の使用回 数...1回、イマ ゾスルフロ ンを含む農 薬の総使用回 数...2回以内、 プロモブチド を含む農薬の 総使用回数... 2回以内、ペン トキサゾン を含む農薬の 総使用回数... 2回以内	住化武 田農薬 ㈱、科 研製薬 ㈱
								500ml/10a	移植直後～移植 後10日(ビエの 1.5葉期まで)			
								500ml/10a				
ピリミ ン・バク メチル ・ペン タナ ン 粒剤	ヒエク リー ン・バ グ ラ ン 粒 剤	3-イソプロピル-2,1,3-ヘ ンゾチン-5-イル(4- 2,2-ジメチル-ナリウム 塩...11.0%、メチル-2- (4,6-ジメチルピリジン- 2-イルオキシ)-6-(1-メチ ンミエチル)ヘンゾエ ト...0.40%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生雑 草、マツバイ、ホタル イ、ウリカワ、ミズガ ヤツ(北海道を除 く)、ヘラオモガ(北 海道、東北)、オ モガ(東北)	北海道、東北 北陸、関東・ 東山・東海 の普通 期及び早期 栽培地帯	壤土～ 埴土	3kg/10a	移植後15～35日 (ビエ4葉期ま で)(移植前後の 初期除草剤との 体系で使用)	ごく 浅く 湛水 して 散布	本剤の使用回 数...1回、ピリ ミン・バクメ チルを含む農 薬の総使用回 数...2回以内、 ペンタナ ンを含む農薬 の総使用回数... 2回以内	パイ 化学工 業 ㈱、 BASF グル ー
								3kg/10a				
								3kg/10a	移植後15～35日 (ビエ3葉期ま で)(移植前後の 初期除草剤との 体系で使用)			
ブタ ロール ・ACN 粒剤	アー ク エ ー ス 1 キ ロ 粒 剤	2-アミノ-3-クロロ-1,4-ナ フトキノン...9.0%、2-クロ ロ-2',6'-ジエチル-N-(ア トキシメチル)アセトア ニド...7.5%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生雑 草、マツバイ、ホタル イ、ヘラオモガ(北 海道、東北)、ミ ズガヤツ(北海道 を除く)、ウリカ ワ、ヒルシロ、セ リ、アオドロ・薬 類による表層はく 離	北海道 全城(北海道 を除く)の普 通期及び早 期栽培地帯	砂壤土 ～埴土	1kg/10a	移植後3日～12 日(ビエ1.5葉 期まで)	湛水 散布	本剤の使用回 数...1回、ブタ ロールを含む 農薬の総使用 回数...2回以 内、ACNを含 む農薬の総使 用回数...2回 以内	アグ ロカ ネシ ョウ ㈱
								1kg/10a	植代時～移植 4日前または移 植後3日～10日 (ビエ1.5葉期 まで)			
イマゾス ルフロ ン・オキ サジク ロメ ホ ン・ ペン ビ ン シ ク ロ ン 水和剤	キチ ット フロ ア ブル	1-(2-クロロイタツ[1,2- a]ピリジン-3-イルスルホ ニル)-3-(4,6-ジメチルピ リジン-2-イル)尿素... 1.7%、3-[1-(3,5-シクロ ロフェニル)-1-メチルエチ ル]-3,4-ジヒドロ-6-メチ ル-5-フェニル-2H-1,3- オキサジン-4-オン... 1.2%、3-(2-クロロ-4-メ チルベンジル)-2-フェニルチ オビシクロ[3.2.1]オク タ-2-エン-4-オン...3.8%	水和 剤	移植 水稲	水田一年生雑 草、マツバイ、ホタル イ、ヘラオモガ(北 海道、東北)、ミ ズガヤツ(北海道 を除く)、ウリカ ワ、ヒルシロ、セ リ、アオドロ・薬 類による表層はく 離	北海道 全城(北海道 を除く)の普 通期及び早 期栽培地帯	埴土～ 埴土	500ml/10a	移植後5日～20 日(ビエ2.5葉 期まで)	原液 湛水 散布	本剤の使用回 数...1回、イマ ゾスルフロ ンを含む農 薬の総使用回 数...2回以内、 オキサジク ロメホンを含 む農薬の総使 用回数...2回 以内、ペン ビンシクロ ンを含む農薬 の総使用回数... 2回以内	協友 アグ リ ㈱
								500ml/10a	移植後5日～15 日(ビエ2.5葉 期まで)			

(1) つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作 物 名	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使 用 量	使 用 時 期	使 用 方 法	使 用 回 数	登 録 会 社
プロモブ チド・ベ ンスル ロンメチ ル・ベン トキサゾ ン水和 剤	クサカリ テイオー Lフロア ブル	(RS)-2-プロモ-N-(α -, α -ジメチルベンジル)- 3,3-ジメチルプロピルアミ ド...16.5%, メチル α - (4,6-ジメチルピリジン- 2-イルカルバモイルスルファ モイル)-オトルアート... 0.94%, 3-(4-クロロ-5-シ クロペンチルオキシ)-2-フル オフェニル)-5-イソプロピル デン-1,3-オキサゾリジン- 2,4-ジオン...7.2%	水 和 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑 草、マツハイ、ホタル イ、ミズガヤツリ、ウリ カワ、ヒルムシロ、セ リ、アオドロ・藻類 による表層はく 離(北陸、九州)	関東・東山・ 東海、近畿・ 中国・四国、 九州の普通 期及び早期 栽培地帯 北陸	壤土～ 埴土 砂壤土 ～埴土	500ml/10a	移植直後～移植 後10日(ビエ1.5 葉期まで)	原液 湛水 散布	本剤の使用回 数...1回、プロモ ブチドを含む農 薬の総使用回 数...2回以内、 ベントキサゾ ンを含む農薬 の総使用回数... 2回以内、ベント キサゾンを含む 農薬の総使用回 数...2回以内	科研製 薬(株)、三井化 学(株) クワ アライ フ(株)
								500ml/10a	移植後10日～移 植後20日(ビエ 1.5葉期まで)(移 植前後の初期除 草剤との体系で 使用)			
								500ml/10a	移植直後～移植 後12日(ビエ1.5 葉期まで)			
プロモブ チド・ベ ンスル ロンメチ ル・ベン トキサゾ ン水和 剤	クサカリ テイオー Lフロア ブル	(RS)-2-プロモ-N-(α -, α -ジメチルベンジル)- 3,3-ジメチルプロピルアミ ド...16.5%, メチル α - (4,6-ジメチルピリジン- 2-イルカルバモイルスルファ モイル)-オトルアート... 1.4%, 3-(4-クロロ-5-シ クロペンチルオキシ)-2-フル オフェニル)-5-イソプロピル デン-1,3-オキサゾリジン- 2,4-ジオン...7.2%	水 和 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑 草、マツハイ、ホタル イ、ヘラオモダガ(北 海道)、ミズガヤツ (東北)、ウリカワ、ヒ ルムシロ、セリ、アミ ドロ・藻類による 表層はく離	北海道、東北 東北	壤土～ 埴土	500ml/10a	移植直後～移植 後12日(ビエ1.5 葉期まで)	原液 湛水 散布	本剤の使用回 数...1回、プロモ ブチドを含む農 薬の総使用回 数...2回以内、 ベントキサゾ ンを含む農薬 の総使用回数... 2回以内、ベント キサゾンを含む 農薬の総使用回 数...2回以内	科研製 薬(株)、三井化 学(株) クワ アライ フ(株)
								500ml/10a	移植後12日～20 日(ビエ1.5葉期 まで)(移植前後の 初期除草剤との 体系で使用)			
ビラゾ レート・ ペン トキサゾ ン水和 剤	スウィー プフロア ブル	4-(2,4-ジクロロベンジル) -1,3-ジメチル-5-ビラ ゾリル-4-トリス(ヒドロキ シ)メチル...20.0%, 3-(4-クロ ロ-5-シクロペンチルオキシ)- 2-フルオフェニル)-5-イ ソプロピルデン-1,3-オキサ ゾリジン-2,4-ジオン... 4.0%	水 和 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑 草、マツハイ、ホタル イ、ヘラオモダガ(北 海道、東北)、ミ ズガヤツリ(北海道を 除く)、ウリカワ	北海道 東北、北陸、 関東・東山・ 東海 九州の普通 期及び早期 栽培地帯 近畿・中国・ 四国の普通 期及び早期 栽培地帯	壤土～ 埴土 砂壤土 ～埴土	500ml/10a	移植直後～移植 後5日(ビエ1葉 期まで)	原液 湛水 散布	本剤の使用回 数...1回、ビラ ゾレートを含む農 薬の総使用回数... 2回以内、ベント キサゾンを含む 農薬の総使用回 数...2回以内	科研製 薬(株)、三井化 学(株) クワ アライ フ(株)
								500ml/10a	移植後～移植前 4日又は移植直 後～移植後5日(ビ エ1葉期まで)			
								500ml/10a	移植直後～移植 後5日(ビエ1.5葉 期まで)			
インダ ン・ク ロメ ブ プロモ ブチド・ ベ ンスル ロンメチ ル水和 剤	メガ ン フロア ブル	(RS)-2-(2,4-ジクロロ- m-トリルオキシ)プロピ ニル...7.0%, (RS)-2- プロモ-N-(α -, α -ジメチ ルベンジル)-3,3-ジメチ ルプロピルアミド...12.0%, メチル α -(4,6-ジメチ ルピリジン-2-イルカルバ モイルスルファモイル)- オトルアート...1.4%, (RS)- 2-(2-(3-クロロフェニル)- 2,3-エポキシプロピル)- 2-エチルインガン-1,3-ジ オン...2.8%	水 和 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑 草、マツハイ、ホタル イ、ヘラオモダガ(北 海道)、ミズガヤツ (東北)、ウリカワ、ヒ ルムシロ、セリ、アミ ドロ・藻類による 表層はく離	北海道 東北	壤土～ 埴土	500ml/10a	移植後5～20日(ビ エ2.5葉期まで)	原液 湛水 散布	本剤の使用回 数...1回、イン ダン・クロメブ プロップを含む農 薬の総使用回 数...2回以内、ク ロメブプロップを 含む農薬の総使用 回数...2回以 内、プロモブチ ドを含む農薬の 総使用回数...2 回以内、ベント キサゾンを含む 農薬の総使用回 数...2回以内	デボ ン(株)、日本農 薬(株)
								500ml/10a	移植後5～15日(ビ エ2.5葉期まで)			
フェン ト ラザミ ド・ベン ゾ フェナ ップ・ ベン プレ セー ト剤	ホク コ ラザミ ド・ベン ゾ フェナ ップ キ ロ 粒 剤	2-(4-(2,4-ジクロロ-m- トリルオキシ)-1,3-ジメチ ルプロピル)-5-イルオキシ -4-メチルアセトフェン... 8.0%, 2,3-ジヒドロ -3,3-ジメチルベンゾ フラン-5-イルエタニルホ ン...5.0%, 4-(2-クロ ロフェニル)-N-シクロヘキ シル-N-エチル-4,5-ジヒ ドロ-5-オキシ-1H-テ トラゾール-1-カルボキ シド...3.0%	粒 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑 草、マツハイ、ホタル イ、ウリカワ、ミズガ ヤツリ(北海道を除 く)、ヘラオモダガ(北 海道、東北)、ク ワワイ(北海道を 除く)、ヒルムシ ロ、セリ(近畿・中 国・四国)、アミ ドロ・藻類による表 層はく離(東北を除 く)	北海道 全域(北海道 を除く)の普 通期及び早 期栽培地帯	砂壤土 ～埴土	1kg/10a	移植後5～20日(ビ エ2.5葉期まで)	湛水 散布	本剤の使用回 数...1回、フェ ントラザミドを 含む農薬の総使 用回数...1回、 ベンゾフェナ ップを含む農 薬の総使用回 数...2回以内、 ベンプレセー トを含む農薬 の総使用回数... 2回以内	北興化 学工業 (株)
								1kg/10a	移植後5～15日(ビ エ2.5葉期まで)			
クミ ル ロ ン・ デ ニ ル ク ロ ール 剤	マ ット タ ブ ジ ヤ ン ボ	2-クロロ-N-(3-メチル 2-フェニル)-2',6'-ジメチ ルアセトアミド...3.0%, 1- (2-クロロベンジル)-3-(1- メチル-1-フェニルエチル)ウ レ...18.0%	そ の 他	移 植 水 稲	水田一年生雑 草、マツハイ、ホタル イ、ミズガヤツリ(北 海道を除く)、ヘ ラオモダガ(北海道、 東北)、クワワ (関東・東海)	北海道 全域(北海道 を除く)の普 通期及び早 期栽培地帯	砂壤土 ～埴土 (但し、 関東・東 海は埴土 ～埴土)	10個 (500g)/10a	移植後1～5日(ビ エ1葉期まで)	水田 に投 げ入 れる	本剤の使用回 数...1回、クミ ルロンを含む農 薬の総使用回 数...2回以内、 デニルクロール を含む農薬の 総使用回数... 2回以内	丸紅 (株)、日 本農薬 (株)、 クヤマ
								10個 (500g)/10a	植代後～移植前 4日又は移植後1 ～5日(ビエ1葉 期まで)			

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稲刈跡・畑作・野菜作・永年作物・非農耕地対象

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場所・ 適用土壌	使用量・ 散布液量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	会社名
プロマ シル・D CMU 粒剤	クサ レン ジャー	5-プロモ-3-セコン ダリー・ブチル-6-メチ ルウラシル・・・ 1.0%、3-(3,4-ジ クロフェニル)-1,1- ジメチル尿素・・・ 3.0%	粒 剤	樹木等	一年生 雑草及 び多年 生広葉 雑草	-	公園、庭 園、堤とう、 駐車場、道 路、運動 場、宅地等	10～20g/m ²	雑草生育初期 (草丈20cm以 下)	植栽地を除く 樹木等の周 辺地に雑草 茎葉散布又 は全面土壌 散布	本剤の使用回数・・・ 2回以内、プロマシ ルを含む農薬の総 使用回数・・・2回以 内、DCMUを含む 農薬の総使用回 数・・・3回以内	丸和バイ オケイカル ㈱、住化 タケダ園 芸㈱
DBN 粒剤	草取り 上手	2,6-シクロヘンゾ ニトリ・・・4.5%	粒 剤	水田作物 (水田畦 畔)	一年生 雑草及 び多年 生広葉 雑草(ほ め科を除く)、ス ギナ	北海道、東北、 北陸	水田畦畔	6～8kg/10a	秋冬期(11～ 12月積雪前)	全面土壌散 布	本剤の使用回数・・・ 1回、DBNを含む 農薬の総使用回 数・・・1回	セルティス ジャパン ㈱
				樹木等	一年生 雑草及 び多年 生広葉 雑草、ス ギナ	-	公園、庭 園、堤とう、 駐車場、運 動場、道 路、宅地、 のり面等	8～12kg/10a	雑草発生前～ 発生始期	植栽地を除く 樹木等の周 辺地に全面 土壌散布	本剤の使用回数・・・ 3回以内、DBNを 含む農薬の総使用 回数・・・3回以内	
グリホ サート カリウム 塩液剤	タッチ ダウ AL	カリウム=N-(ホスホ ニル)グリシナー ト・・・0.86%	液 剤	樹木等	一年生 雑草、多 年生雑 草 スギナ	-	公園、庭 園、堤とう、 駐車場、道 路、鉄道、 運動場、宅 地、のり面 等	25～50ml/m ² (原液散布) 100ml/m ² (原 液散布)	雑草生育期 (草丈50cm以 下) 雑草生育期 (草丈20～ 30cm)	植栽地を除く 樹木等の周 辺地に雑草 茎葉散布	本剤の使用回数・・・ 3回以内、グリホ サートを含む農薬 の総使用回数・・・3 回以内	シンジェン タジャパン ㈱
アシュ ラム・グ ルホシ ネット 液剤	キング ロード 液剤、ク サ オール 液剤	N-メトキシカルボニ ルスルファニルアミドナ トリウム・・・24.0%、 アンモニウム=DL-ホ モアラニン-4-イル(メ チル)ホスファター ト・・・12.0%	液 剤	樹木等	一年生 雑草、多 年生雑 草	-	公園、庭 園、堤とう、 駐車場、道 路、運動 場、宅地、 鉄道等	1000～2000ml /10a、希釈水 量100L/10a	雑草生育期 (草丈50cm以 下)	植栽地を除く 樹木等の周 辺地に雑草 茎葉散布	本剤の使用回数・・・ 3回以内、アシュ ラムを含む農薬の総 使用回数・・・3回以 内、グルホシネット を含む農薬の総使 用回数・・・3回以内	バイエルカ ロップサイ エンス㈱、 ㈱日本 グリーンア ントガーデ ン
アシュ ラム・グ ルホシ ネット 液剤	キング ロードL 液剤、ク サ オール H液剤	N-メトキシカルボニ ルスルファニルアミドナ トリウム・・・12.0%、 アンモニウム=DL-ホ モアラニン-4-イル(メ チル)ホスファター ト・・・6.0%	液 剤	樹木等	一年生 雑草、多 年生雑 草	-	公園、庭 園、堤とう、 駐車場、道 路、運動 場、宅地、 鉄道等	1500～3000ml /10a、希釈水 量200L/10a	雑草生育期 (草丈30cm以 下)	植栽地を除く 樹木等の周 辺地に雑草 茎葉散布	本剤の使用回数・・・ 3回以内、アシュ ラムを含む農薬の総 使用回数・・・3回以 内、グルホシネット を含む農薬の総使 用回数・・・3回以内	バイエルカ ロップサイ エンス㈱、 ㈱日本 グリーンア ントガーデ ン
カルブ チレート ・テト ラビオン 粒剤	ロング ワイド 粒剤、ク サダ ウロン グ粒 剤、草 ぼうず	3-(3,3-ジメチルウ レイト)フェニルニター シャープ・ブチルカルバ マート・・・1.5%、 2,2,3,3-テトラフル オロプロピオン酸ナ トリウム・・・1.0%	粒 剤	樹木等	一年生 雑草、多 年生雑 草	-	公園、堤とう、 駐車場、道 路、運動 場、宅地、 鉄道等	20～40kg/10a	雑草生育初期 (草丈20cm以 下)	植栽地を除く 樹木等の周 辺地に全面 土壌散布	本剤の使用回数・・・ 2回以内、カルブチ レートを含む農薬の 総使用回数・・・2回 以内、テトラビオン を含む農薬の総使 用回数・・・2回以内	㈱エス ・ディー・エス バイオテック、北興 産業㈱、住商アグ ロインターナ ショナル㈱
プロマ シル粉 粒剤	クサ キール FG	5-プロモ-3-セコン ダリー・ブチル-6-メチ ルウラシル・・・1.0%	粉 粒 剤	樹木等	一年生 雑草及 び多年 生広葉 雑草	-	公園、庭 園、堤とう、 駐車場、道 路、運動 場、宅地等	15～30g/m ²	雑草生育初期 (草丈20cm以 下)	植栽地を除く 樹木等の周 辺地に全面 土壌散布又 は雑草茎葉 散布	本剤の使用回数・・・ 2回以内、プロマシ ルを含む農薬の総 使用回数・・・2回以 内	北興産 業㈱
ベン ディメタ リン水 和剤	グリー ンケア G顆粒 水和剤	N-(1-エチルプロピ ル)-3,4-ジメチル- 2,6-ジニトロアニ リン・・・53.0%	水 和 剤	日本芝	一年生 雑草(キ 科を除く)	-	-	300～ 600g/10a、希 釈水量200～ 300L/10a	雑草発生前	全面土壌散 布	本剤の使用回数・・・ 3回以内、ベンディ メタリンを含む農薬 の総使用回数・・・3 回以内	㈱エス ・ディー・エス バイオテック
				樹木等	一年生 雑草(キ 科、ワユ サを除く)	-	公園、庭 園、堤とう、 駐車場、道 路、運動 場、宅地、 のり面、鉄 道等	300～ 600g/10a、希 釈水量100～ 150L/10a		植栽地を除く 樹木等の周 辺地に全面 土壌散布		

(2) つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場所・ 適用土壌	使用量・ 散布流量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	会社名	
グリホ サート トリメシ ウム塩液 剤	クサリウ ム	トリメスルホニウム =N-(ホスホノメチル) グリシナート・・・ 40.0%	液 剤	移植水稻	一年生 雑草	－	－	400～750ml /10a、通常散 布100L/10a、 少量散布 25L/10a	春期耕起10 日以前(雑草 生育期)	雑草茎葉散 布	本剤の使用回数・・・ 1回、グリホサートを含 む農薬の総使用 回数・・・1回	シンジェ ンタ ジャバ ン	
				直播水稻				400～750ml /10a、 通常散布 100L/10a、 少量散布 25L/10a			本剤の使用回数・・・ 1回、グリホサートを含 む農薬の総使用 回数・・・耕起栽培は 2回以内(耕起前は1 回以内)、乾田不耕 起栽培は2回以内		
				水田作物 (水田刈 跡)	ミズガヤツ リ			500～750ml /10a、 希釈水量50～ 100L/10a	秋期水稻刈取 後10日からミズ ガヤツリの塊茎 形成盛期まで		本剤の使用回数・・・ 1回、グリホサートを含 む農薬の総使用 回数・・・1回		
					セリ			500～750ml /10a、希釈水 量50～ 100L/10a	秋期水稻刈取 後、セリ生育期				
				水田作物、畑作 物(休耕 田)	一年生 雑草		休耕地	400～600ml /10a、希釈水 量100L/10a	雑草生育期 (草丈30cm以 下)		本剤の使用回数・・・ 1回、グリホサートを含 む農薬の総使用 回数・・・2回以内		
					多年生 雑草			600～800ml /10a、希釈水 量100L/10a					
				水田作物 (水田畦 畔)	一年生 雑草		水田畦畔	200～400ml /10a、希釈水 量100L/10a	収穫14日前ま で(雑草生育 期:草丈30cm 以下)		本剤の使用回数・・・ 2回以内、グリホ サートを含む農薬 の総使用回数・・・2 回以内		
					多年生 雑草			400～600ml /10a、希釈水 量100L/10a					
				小麦	一年生 雑草、シ バムギ		－	200～400ml /10a、通常散 布50～ 100L/10a、少 量散布25～ 50L/10a	雑草生育期 (耕起7日以 前)		本剤の使用回数・・・ 1回、グリホサートを含 む農薬の総使用 回数・・・1回		
				果樹類	一年生 雑草			200～400ml /10a、通常散 布50～ 100L/10a、少 量散布25～ 50L/10a	収穫7日前ま で(雑草生育 期:草丈30cm 以下)		本剤の使用回数・・・ 3回以内、グリホ サートを含む農薬 の総使用回数・・・3 回以内		
					多年生 雑草			400～600ml /10a、通常散 布50～ 100L/10a、少 量散布25～ 50L/10a					
				だいこ ん、はっ かだいこ ん	一年生 雑草			－	200～400ml /10a、希釈水 量100L/10a		耕起またはは 種7日以前(雑 草生育期)		本剤の使用回数・・・ 1回、グリホサートを含 む農薬の総使用 回数・・・1回
				キャベ ツ、はくさ い			200～400ml /10a、希釈水 量100L/10a		耕起または定 植7日以前(雑 草生育期)				
				桑			200～400ml /10a、希釈水 量100L/10a		春期桑発芽 前・夏期桑発 芽前(雑草生 育期:草丈 30cm以下)		本剤の使用回数・・・ 3回以内、グリホ サートを含む農薬 の総使用回数・・・4 回以内		
					多年生 雑草		400～600ml /10a、希釈水 量100L/10a						

(2) つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場所・ 適用土壌	使用量・ 散布液量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	会社名	
グリホ サート トリメシ ウム塩液 剤 つづき	クサリウ ム	トリメチルスルホニウム =N-(ホスホノメチル) グリシナート... 40.0%	液 剤	牧草	ふき	-	牧野、草地 (更新)	800～1000ml /10a、通常散 布50～ 100L/10a少量 散布25～ 50L/10a	更新10日以前 (雑草生育 期)	雑草茎葉散 布	本剤の使用回数... 2回以内、グリホ サートを含む農薬 の総使用回数...2 回以内	シンジェン タジャバ ン(株)	
					一年生 雑草、多 年生雑 草			400～800ml /10a、通常散 布50～ 100L/10a少量 散布25～ 50L/10a					
								200～400ml /10a、少量散 布25～ 50L/10a	耕起整地後は 種10日前～は 種当日(雑草 生育期)				
				林木	ススキ、ササ 類、クサ 等の多 年生雑 草、落葉 雑草かん 木		造林地(地 ごしらえ)	1000～1500ml /10a、希釈水 量30L/10a	生育盛期以降 (夏～秋期)		本剤の使用回数... 3回以内、グリホ サートを含む農薬 の総使用回数...3 回以内		
				樹木等	一年生 雑草		公園、庭 園、堤とう、 駐車場、道 路、運動 場、宅地、 のり面、鉄 道等	250～500ml /10a、通常散 布50～ 100L/10a少量 散布25～ 50L/10a	雑草生育期 (草丈50cm以 下)	植栽地を除く 樹木等の周 辺地に雑草 茎葉散布			
					多年生 雑草	500～1000ml /10a、通常散 布50～ 100L/10a少量 散布25～ 50L/10a							
					スギナ	2000ml/10a、 通常散布50～ 100L/10a少量 散布25～ 50L/10a		雑草生育期					
				水田作物 (水田畦 畔)	一年生 雑草、多 年生雑 草		水田畦畔	400～600ml /10a、希釈水 量4～10L/10a	収穫14日前ま で(雑草生育 期:草丈30cm 以下)	雑草茎葉散 布	本剤の使用回数... 2回以内、グリホ サートを含む農薬 の総使用回数...2 回以内		
				かんき つ、なし、 ぶどう			-	400～600ml /10a、希釈水 量4～10L/10a	収穫7日前ま で(雑草生育 期:草丈30cm 以下)		本剤の使用回数... 3回以内、グリホ サートを含む農薬 の総使用回数...3 回以内		
				樹木等			公園、庭 園、堤とう、 駐車場、道 路、運動 場、宅地、 のり面、鉄 道等	500～1000ml /10a、希釈水 量4～10L/10a	雑草生育期 (草丈50cm以 下)	植栽地を除く 樹木等の周 辺地に雑草 茎葉散布			
				林木	クサ		林地	原液、1ml/株	出芽・展葉期	株頭処理	-		
						2倍液、1～ 2ml/株							
								クサ・フジ 等のつ る類		原液、2倍液、 つる径(cm) 処 理量(ml/株)、 2cm以下 0.5 ml/株、2.1～ 3.0cm 1.0ml/ 株、3.1～4.0cm 1.5ml/株、4.1 ～5.0cm 2.0m l/株、5.1cm以 上 適宜増量	生育初期		つる処理

(2) つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場所・ 適用土壌	使用量・ 散布流量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	会社名
ピラフルフェンエチル・プロマシル粉粒剤	ソクガレ	5-プロモ-3-セコン ダリー・チル-6-メチ ルウラシル… 2.0%, エチル=2-ク ロロ-5-(4-クロロ- 5-シフルオロメキシ -1-メチルピラゾール -3-イル)-4-フルオ ロフェノキシセター ト…0.015%	粉 粒 剤	樹木等	一年生 雑草及 び多年 生広葉 雑草	-	公園、庭 園、堤とう、 駐車場、道 路、運動 場、宅地等	15~30g/m ²	雑草生育初期 (草丈20cm以 下)	植栽地を除く 樹木等の周 辺地に全面 土壌散布又は 雑草茎葉 散布	本剤の使用回数… 1回、ピラフルフェン エチルを含む農薬 の総使用回数…3 回以内、プロマシル を含む農薬の総使 用回数…1回	丸和ハイ オクミカル (株)
MCPP 粉粒剤	MCPP 微粒 剤、シ バニー ド微粒 剤	α-(2-メチル-4-ク ロロフェノキシ)プロピ オン酸カウム… 3.0%	粉 粒 剤	日本芝(こ うらいし ば)	一年生 広葉雑 草、クロー バー、スキ ナ	-	-	10~20g/m ²	芝生育期雑草 生育期	雑草茎葉散 布	本剤の使用回数… 3回以内、MCPPを 含む農薬の総使用 回数…3回以内	㈱日本 グリーンア ントカーデ ン、住化 タケダ園 芸㈱
				樹木等	一年生 広葉雑 草、多年 生広葉 雑草、スキ ナ	-	公園、庭 園、堤とう、 駐車場、道 路、運動 場、宅地等	10~20g/m ²	雑草生育期	植栽地を除く 樹木等の周 辺地に雑草 茎葉散布		
グリホ サート イソプ ロピル アミン 塩液剤	カルナ クス	イソプロピルアンモニ ウム=N-(ホスホノメ ル)グリサート… 41.0%	液 剤	果樹類 (キウイフ ルーツ、 パイナップ ルを除く)	一年生 雑草	-	-	250~500ml /10a、通常散 布50~ 100L/10a少量 散布25~ 50L/10a	収穫7日前ま で(雑草生育 期:草丈30cm 以下)	雑草茎葉散 布	本剤の使用回数… 3回以内、グリホ サートを含む農薬 の総使用回数…3 回以内	協友アグ リ㈱
					多年生 雑草			500~1000ml /10a、通常散 布50~ 100L/10a少量 散布25~ 50L/10a				
				豆類(種 実、た だし、だ いず、ち つかけ を除く)	畑地一 年生雑 草			250~500ml /10a、通常散 布50~ 100L/10a少量 散布25~ 50L/10a	は種10日前ま で(雑草生育 期)		本剤の使用回数… 2回以内、グリホ サートを含む農薬 の総使用回数…2 回以内	
				だいず				250~500ml /10a、通常散 布50~ 100L/10a少量 散布25~ 50L/10a				
								250~500ml /10a、通常散 布50~ 100L/10a少量 散布25~ 50L/10a	は種後出芽前 まで(雑草生 育期:草丈 30cm以下)			
				えだまめ				250~500ml /10a、通常散 布50~ 100L/10a少量 散布25~ 50L/10a	は種10日前ま で(雑草生育 期)		本剤の使用回数… 1回、グリホサート を含む農薬の総使 用回数…3回以内	
				小麦				250~500ml /10a、希釈水 量100L/10a	耕起10日前ま で(雑草生育 期:草丈30cm 以下)		本剤の使用回数… 1回、グリホサート を含む農薬の総使 用回数…1回	
					畑地多 年生雑 草			500~1000ml /10a、希釈水 量100L/10a				
				麦類(小 麦を除く)	畑地一 年生雑 草			250~500ml /10a、希釈水 量100L/10a	耕起10日前ま で(雑草生育 期)			
				かんしょ、 キャベツ				250~500ml /10a、希釈水 量100L/10a	耕起7日前ま で(雑草生育 期)			

(2) つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場所・ 適用土壌	使用量・ 散布液量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	会社名
グリホ サート イソプ ロピル アミン 塩液剤 つづき	カルナ クス	イソプロピルアンモニ ウム-N-(ホスホノメチ ル)グリシナート… 41.0%	液 剤	はくさい	畑地一 年生雑 草	-	-	250～500ml /10a、通常散 布50～ 100L/10a少量 散布25～ 50L/10a	耕起7日前ま で(雑草生育 期)	雑草茎葉散 布	本剤の使用回数… 1回、グリホサート を含む農薬の総使用 回数…1回	協友アグ リカル
				だいこ ん、はつ かだいこ ん				250～500ml /10a、希釈水 量100L/10a				
				ねぎ、た まねぎ				250～500ml /10a、通常散 布50～ 100L/10a少量 散布25～ 50L/10a				
								250～500ml /10a、通常散 布50～ 100L/10a少量 散布25～ 50L/10a	定植後畦間処 理 但し、収穫 30日前まで (雑草生育期)			
				さとうきび (春植え)				250～500ml /10a、通常散 布50～ 100L/10a少量 散布25～ 50L/10a	耕起10日前ま で(雑草生育 期)			
					畑地多 年生雑 草			500～1000ml /10a、通常散 布50～ 100L/10a少量 散布25～ 50L/10a				
				茶	一年生 雑草			250～500ml /10a、少量散 布25～ 50L/10a	摘採7日前ま で(雑草生育 期)			
				花木				250～500ml /10a、通常散 布50～ 100L/10a少量 散布25～ 50L/10a	雑草生育期			
				水田作物 (水稻を除く)				250～500ml /10a、希釈水 量100L/10a	耕起20～10 日前(雑草生 育期)			
				移植水稻				250～500ml /10a、希釈水 量100L/10a				
					多年生 雑草			250～500ml /10a、希釈水 量50L/10a	灌水前30～5 日前(雑草生 育期)(不耕起 栽培)			
				直播水稻	一年生 雑草			250～500ml /10a、希釈水 量100L/10a	耕起20～10 日前(雑草生 育期)			
								250～500ml /10a、希釈水 量50L/10a	耕起直後～出 芽前(雑草生 育期)(乾田耕 起栽培)			
					多年生 雑草			500ml/10a、希 釈水量 50L/10a				
					一年生 雑草			250～500ml /10a、希釈水 量50L/10a	は種30日前～ 出芽前(雑草 生育期)(乾田 不耕起栽培)			
					多年生 雑草			500ml/10a、希 釈水量 50L/10a				

(2) つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場所・ 適用土壌	使用量・ 散布流量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	会社名
グリホ サート イソプ ロピル アミン 塩液剤 つづき	カルナ クス	イソプロピルアンモニ ウム=N-(ホスホノメチ ル)グリホサート・・・ 41.0%	液 剤	水田作物 (水田刈 跡)	一年生 雑草	-	水田刈跡	250～500ml /10a、希釈水 量100L/10a	耕起10日前ま で(雑草生育 期)	雑草茎葉散 布	本剤の使用回数・・・ 1回、グリホサートを含 む農薬の総使用 回数・・・1回	協友アグ リカル
					多年生 雑草			500～1000ml /10a、希釈水 量100L/10a				
				水田作物 (水田畦 畔)	一年生 雑草	水田畦畔	250～500ml /10a、通常散 布100L/10a少 量散布 25L/10a	収穫14日前ま で(雑草生育 期:草丈30cm 以下)		本剤の使用回数・・・ 2回以内、グリホ サートを含む農薬 の総使用回数・・・2 回以内		
					多年生 雑草		500～1000ml /10a、通常散 布100L/10a少 量散布 25L/10a					
				水田作 物、畑作 物(休耕 田)	一年生 雑草	休耕田	250～500ml /10a、通常散 布50～ 100L/10a少量 散布25～ 50L/10a	雑草生育期 (草丈50cm以 下)				
					牧草		250～500ml /10a、希釈水 量50L/10a					更新・造成の 10日前まで (雑草生育期)
					多年生 雑草	500～1000ml /10a、希釈水 量50L/10a						
					一年生 及び多 年生雑 草	250～500ml /10a、少量散 布25～ 50L/10a	は種10日前～ は種当日(耕 起整地後:雑 草発生摘期)					
				樹木等	一年生 雑草	公園、庭 園、堤とう、 駐車場、道 路、運動 場、宅地、 のり面、鉄 道等	500ml/10a、通 常散布 100L/10a少量 散布25L/10a	雑草生育期	植栽地を除く 樹木等の周 辺地に雑草 茎葉散布	本剤の使用回数・・・ 3回以内、グリホ サートを含む農薬 の総使用回数・・・3 回以内		
					多年生 雑草							1000ml/10a、 通常散布 100L/10a少量 散布25L/10a
					スギ・サ							2000ml/10a、 少量散布25～ 50L/10a
				林木	ススキ、サ サ類、クサ 等の多 年生雑 草、落葉 雑かん 木	造林地(地 ごしらえ)	1000ml/10a、 希釈水量20～ 30L/10a	生育盛期以降	雑草木茎葉 散布	-		
					クサ							林地
落葉雑 かん木		原液又は2倍 液、1ml/ヶ所(樹 径ヶ所 数)(10cm以下 2 ～3、10～20cm 4～8、20cm以 上 10)	5～10月		立木注入処 理							