

平成19年4月1日～平成19年10月30日

(1) 水稻作(移植·直播)

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤型	適用作物名	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	登録会社
アジムスルフロン・シハロホップチル・デニルクロール・ペンシルフロンメチル粒剤	トリデアA-1キログラム剤36	2-クロロ-N-(3-メトキシ-2-フェニル)-2',6'-ジメチルアセトアニリド・・・2.1%、メチル α -(4,6-ジメトキシヒンジシン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-オートルート・・・0.30%、フチル(R)-2-[4-(4-シアン-2-フルオロフェノキシ)フェノキシ]プロピオナート・・・1.8%、1-(4,6-ジメトキシヒンジシン-2-イル)-3-[1-メチル-4-(2-メチル-2H-テトラゾール-5-イル)ピラゾール-5-イルスルホニル]尿素・・・0.060%	粒剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ヘラオモダガ(北海道、東北)、クログワイ(東北、近畿・中国・四国の普通期)、オモダガ(北海道、東北、近畿・中国・四国の普通期)、ヒルムシロ、セイ、シズイ(東北)、エゾノサヤヌカグサ(北海道)、ウキユヅ(東北、九州の普通期)、アオイトロ・藻類による表層は分離	北海道 東北、北陸以西の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～埴土(減水深2cm/日以下)	1kg/10a 1kg/10a	移植後5～25日(ノビエ3葉期まで) 移植後5～20日(ノビエ3葉期まで)	湛水散布	本剤の使用回数・・・1回、アジムスルフロンを含む農薬の総使用回数・・・1回、シハロホップチルを含む農薬の総使用回数・・・3回以内、デニルクロールを含む農薬の総使用回数・・・2回以内、ペンシルフロンメチルを含む農薬の総使用回数・・・2回以内	北興化学工業(株)
ビリファタリド・プレチラクロール・ベンシルフロンメチル水和剤	デビトロップLプロアブル	2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(2-ブロボキシエチル)アセトアニリド・・・12.5%、メチル α -(4,6-ジメトキシヒンジシン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-オートルート・・・1.5%、(RS)-7-(4,6-ジメトキシヒンジシン-2-イルチオ)-3-メチル-2-ベンゾフラン-1(3H)-オン・・・3.0%	水和剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セイ(北陸を除く)、アオイトロ・藻類による表層は分離(関東・東山・東海を除く)	北陸、関東、東山・東海、近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯 九州の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～埴土 埴土～埴土	350ml/10a 350ml/10a	移植直後～移植後15日(但し、砂壤土は移植後3～15日)(ノビエ2.5葉期まで) 移植直後～移植後15日(ノビエ2.5葉期まで)	原液湛水散布	本剤の使用回数・・・1回、ビリファタリドを含む農薬の総使用回数・・・2回以内、プレチラクロールを含む農薬の総使用回数・・・2回以内、ペンシルフロンメチルを含む農薬の総使用回数・・・2回以内	シンジェンタシート(株)
オキサジクロメホン・ペンシルフロンメチル・ベンゾビシクロン水和剤	プラスワンLプロアブル	メチル α -(4,6-ジメトキシヒンジシン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-オートルート・・・1.0%、3-[1-(3,5-ジクロロフェニル)-1-メチルエチル]-3,4-ジヒドロ-6-メチル-5-フェニル-2H-1,3-オキサジン-4-オン・・・1.2%、3-(2-クロロ-4-メルベンゾイル)-2-フェニルチオビシクロ[3.2.1]オクタ-2-エン-4-オン・・・4.0%	水和剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セイ(近畿・中国・四国)	北陸、近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯	埴土～埴土	500ml/10a	移植直後～ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	原液湛水散布	本剤の使用回数・・・1回、オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数・・・2回以内、ペンシルフロンメチルを含む農薬の総使用回数・・・2回以内、ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数・・・2回以内	北興化学工業(株)、デュボン(株)
オキサジクロメホン・ペンシルフロンメチル・ベンゾビシクロン粒剤	プラスワンLキログラム剤51	メチル α -(4,6-ジメトキシヒンジシン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-オートルート・・・0.51%、3-[1-(3,5-ジクロロフェニル)-1-メチルエチル]-3,4-ジヒドロ-6-メチル-5-フェニル-2H-1,3-オキサジン-4-オン・・・0.80%、3-(2-クロロ-4-メルベンゾイル)-2-フェニルチオビシクロ[3.2.1]オクタ-2-エン-4-オン・・・2.0%	粒剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セイ	北陸、近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯	埴土～埴土	1kg/10a	移植後5日～ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	湛水散布	本剤の使用回数・・・1回、オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数・・・2回以内、ペンシルフロンメチルを含む農薬の総使用回数・・・2回以内、ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数・・・2回以内	北興化学工業(株)、デュボン(株)
カプエンストロール・ベンゾビシクロン剤	テロスジャンボ	N,N-ジエチル-3-メチルスルホニル-1H-1,2,4-トリアゾール-1-カルボキサミド・・・8.4%、3-(2-クロロ-4-メルベンゾイル)-2-フェニルチオビシクロ[3.2.1]オクタ-2-エン-4-オン・・・8.0%	その他	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ヒルムシロ、ヘラオモダガ(北海道、東北)	全域(近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯) 近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～埴土 埴土～埴土	小包装(パック)10個(250g)/10a 小包装(パック)10個(250g)/10a	移植後3日～ノビエ2葉期 但し、移植後30日まで	水田に小包装(パック)のまま投入する	本剤の使用回数・・・1回、カプエンストロールを含む農薬の総使用回数・・・1回、ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数・・・2回以内	クマアイ化学工業(株)、エース・ディー・バイオテック

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稲刈跡・畑作・野菜作・永年作物・非農耕地対象

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物名	適用 雑草	使用 目的	適用場所・ 適用土壌	使用量・ 散布液量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	会社名
トリフロキシスルフロナトリウム塩水和剤	モノエントロキシルフロナトリウム塩水和剤	1-(4,6-ジメチルピリジン-2-イル)-3-[3-(2,2,2-トリフルオロエトキシ)-2-ピリジルスルホニル]尿素 ナトリウム塩・・・75.0%	水和剤	日本芝	一年生雑草	-	-	3~6g/10a、希釈水量150~250L/10a	雑草発生初期~生育期	雑草茎葉散布又は全面土壌散布	本剤の使用回数・・・2回以内、トリフロキシスルフロナトリウム塩を含む農薬の総使用回数・・・2回以内	シンジエンタジャパン株式会社
					ヒメクサ			3~6g/10a、希釈水量150~250L/10a	春夏期 雑草発生初期~生育期			
					スズメノヒエ類			4.5~6g/10a、希釈水量150~250L/10a				
					チガヤ			4.5~6g/10a、希釈水量150~250L/10a	雑草発生初期~出穂前			
					西洋芝 (パーミューダグラス)	一年生雑草		3~6g/10a、希釈水量150~250L/10a	雑草発生初期~生育期			
					樹木等	一年生雑草及び多年生広葉雑草	-	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等	6~12g/10a、希釈水量100L/10a	生育期又は刈取り後再生期 (草丈30cm以下)	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	
グリホサートカリウム塩液剤	ザッソージェース	カリウム=N-(ホスホニル)グリシナート・・・0.86%	液剤	樹木等	一年生雑草、多年生雑草	-	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、鉄道、運動場、宅地、のり面等	25~50ml/㎡ (原液散布)	雑草生育期 (草丈50cm以下)	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	本剤の使用回数・・・3回以内、グリホサートを含む農薬の総使用回数・・・3回以内	フマキラー株式会社
					スキナ			100ml/㎡ (原液散布)	雑草生育期 (草丈20~30cm)			
ヨードスルフロナトリウム塩水和剤	デステニーWDG	メチル=4-ヨード-2-[3-(4-メチル-6-メチル-1,3,5-トリアジン-2-イル)ウレイトスルホニル]安息香酸、ナトリウム塩・・・10.0%	水和剤	日本芝	一年生広葉雑草	-	-	15~20g/10a、希釈水量200~300L/10a	雑草発生前~発生初期	全面散布	本剤の使用回数・・・2回以内、ヨードスルフロナトリウム塩を含む農薬の総使用回数・・・2回以内	ハイエルクロップサイエンス株式会社
カルフェントランソニエチル乳剤	スポットライトプラス	(RS)-エチル=2-クロロ-3-[2-クロロ-5-(4-ジフルオロメチル)-4,5-ジヒドロ-3-メチル-5-オキソ-1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル]-4-フルオロフェニル]アロピオナート・・・6.4%	乳剤	ばれいしよ	-	茎葉枯凋	-	150~300ml/10a、使用液量100L/10a	茎葉黄変期 但し収穫3日前まで	茎葉散布	本剤の使用回数・・・2回以内、カルフェントランソニエチルを含む農薬の総使用回数・・・2回以内	エフエムシー・ケミカルズ株式会社、石原バイオサイエンス株式会社
オキサジアルギル・グリンホシネート粉粒剤	ウルクサバイバイV微粒剤、クサジャック微粒剤、オールキラダッシュ微粒剤	アンモニウム=DL-ホモアラニン-4-イル(メチル)ホスフィナート・・・1.0%、5-tert-ブチル-3-[2,4-ジクロロ-5-(プロパ-2-イニルオキシ)フェニル]-1,3,4-オキサジアゾール-2(3H)-オン・・・0.50%	粉粒剤	樹木等	一年生雑草	-	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、鉄道等	10~20kg/10a	雑草生育期 (草丈30cm以下)	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	本剤の使用回数・・・2回以内、オキサジアルギルを含む農薬の総使用回数・・・2回以内、グリンホシネートを含む農薬の総使用回数・・・3回以内	ハイエルクロップサイエンス株式会社、開日本グリンアン・ドカーテン、フマキラー株式会社
					多年生広葉雑草、スキナ			20~30kg/10a				
ターバシル・DBN粒剤	ネコゾギキング粒剤	3-ターシャリブチル-5-クロロ-6-メチルウラシル・・・3.0%、2,6-ジクロロベンゾニトリル・・・2.0%	粒剤	樹木等	一年生雑草	-	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、鉄道等	5~10g/㎡	雑草発生前	植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布	本剤の使用回数・・・1回、ターバシルを含む農薬の総使用回数・・・1回、DBNを含む農薬の総使用回数・・・3回以内	レインボー薬品株式会社
					多年生広葉雑草(セイタカアワダチソウを除く)、スキナ			10~20g/㎡	雑草生育初期 (草丈20cm以下)			
								10~20g/㎡				

(2) つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物名	適用 雑草	使用 目的	適用場所・ 適用土壌	使用量・ 散布流量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	会社名
オキサ ジアル ギル・ オキサ ジクロ メホン 水和 剤	サブライ ズフロア ブル	3-[1-(3,5-ジクロ フェニル)-1-メチルエ チル]-3,4-ジヒドロ- 6-メチル-5-フェニル -2H-1,3-オキサジ ン-4-オン... 15.0%、5-tert-ブ チル-3-[2,4-ジクロ ロ-5-(プロパ-2-イ ニルオキシ)フェニル]- 1,3,4-オキサジア ゾール-2(3H)-オ ン...17.0%	水 和 剤	日本芝	一年生雑草	-	-	100~200ml /10a、希釈水量 200~300L/10a	雑草発生前	散布	本剤の使用回 数...2回以内、 オキサジアルギ ルを含む農薬の 総使用回数...2 回以内、オキサ ジクロメホンを含 む農薬の総使用 回数...2回以内	バイエル クロップサイ エンス㈱
グリホ サート イソブ ロピル アミン 塩・フ ルミオ キサジ ン粉粒 剤	グラス ジャック微 粒剤、ネ コンギWク イック	イソプロピルアンモニウ ム=N-(ホスホメチル) グリシナート... 3.0%、N-(7-フルオ ロ-3,4-ジヒドロ-3- オキソ-4-プロパ-2- イニル-2H-1,4-ペ ンゾキサジン-6-イ ル)シクロヘキサ-1-エ ン-1,2-ジカルボキシ ド...0.10%	粉 粒 剤	樹木等	一年生雑草	-	公園、庭園、 堤とう、駐車 場、道路、運 動場、宅地、 鉄道等	10~20kg/10a	雑草生育期(草 丈50cm以下)	植栽地を除 く樹木等の 周辺地に雑 草茎葉散布	本剤の使用回 数...3回以内、 グリホサートを含 む農薬の総使用 回数...3回以 内、フルミオキサ ジンを含む農薬 の総使用回 数...3回以内	㈱日本 クリーンア ントガー デン、レイ ンボー薬 品㈱
プロジ アミン 水和剤	クサブロッ ク	5-シプロピルアミノ α, α, α-トリフルオ ロ-4,6-ジニトロ- オトルイジン... 65.0%	水 和 剤	日本芝、 西洋芝 (バー ミュダ グラス)	一年生イ ネ科雑草	-	-	80~100g/10a、 希釈水量250~ 300L/10a	春期雑草発 生前(芝生育期)	全面土壌散 布	本剤の使用回 数...2回以内、 プロジアミンを含 む農薬の総使用 回数...2回以内	シンジェ ンタ㈱
					一年生雑草 (キ科を除 く)			120~240g/10a、 希釈水量250~ 300L/10a				
								120~160g/10a、 希釈水量250~ 300L/10a	秋期雑草発 生前(芝生育期)			
				西洋芝 (ペントグ ラス)、西 洋芝(プ ルーグ ラス)	一年生イ ネ科雑草			60~100g/10a、 希釈水量200~ 300L/10a	春期雑草発 生前(芝生育期)			
					一年生雑草 (キ科を除 く)			120~240g/10a、 希釈水量250~ 300L/10a				
								120~160g/10a、 希釈水量250~ 300L/10a	秋期雑草発 生前(芝生育期)			
				樹木等			公園、堤と う、駐車場、 道路、運動 場、宅地、の り面、鉄道等	160~320g/10a、 希釈水量 100L/10a	雑草発生前	植栽地を除 く樹木等の 周辺地に全 面土壌散布		
フェンメ ディ フアム 乳剤	ベタナー ル乳剤	3-メチルカルボニル アミノフェニル-N- (3'-メチルフェニル) カーバメート... 14.7%	乳 剤	てんさい (移植栽 培)	広葉雑草、 イネ科雑草	-	全土壌	500~600ml /10a、希釈水量 50~80L/10a	移植活着後、中 耕後(雑草発生 摘期)但し、収穫 60日前まで	雑草茎葉散 布	本剤の使用回 数...3回以内、 フェンメディフ アムを含む農薬 の総使用回数...3 回以内	北海三 共㈱
								1.5ml/ヘーバー ポット6冊(0.75ml/ ㎡)、希釈水量 300ml/ヘーバー ポット6冊(150ml/ ㎡)	育苗期の本業 展開後(雑草発 生初期)			
				てんさい (直播栽 培)				500~600ml /10a、希釈水量 50~80L/10a	第2本業展開 後、中耕後(雑 草発生摘期)但し、 収穫60日前まで			
トリフロ キシス ルフロ ンナトリ ウム塩 水和剤	モニューメ ントフロア ブル	1-(4,6-ジメトキシピ リジン-2-イル)-3- [3-(2,2,2-トリフル オロエチン)-2-ヒ ドロキシ]スルホニル 尿素ナトリウム塩...10.0%	水 和 剤	樹木等	一年生及び 多年生広葉 雑草	-	公園、庭園、 堤とう、駐車 場、道路、運 動場、宅地、 のり面、鉄道 等	50~100ml /10a、希釈水量 100L/10a	雑草生育初期 又は刈り取り後 再生期	植栽地を除 く樹木等の 周辺地に雑 草茎葉散布	本剤の使用回 数...2回以内、 トリフロキシス ルフロンナトリ ウム塩を含む農 薬の総使用回 数...2回以内	シンジェ ンタ㈱
					多年生イ ネ科雑草	草丈 抑制に よる刈 り取り 軽減		50~100ml /10a、希釈水量 100L/10a	雑草生育期又 は刈り取り後 再生期			