

平成19年度水稲作関係除草剤試験成績概要

財団法人 日本植物調節剤研究協会

平成19年度水稲作関係除草剤試験成績中央検討会は、平成19年12月6日、7日の2日間、東京ガーデンパレスにおいて、適1試験成績検討会は、これに先立ち平成19年10月16日 東京ガーデンパレスにて開催された。ここに、これら検討会における判定結果を報告する。

1) 第一次適用性試験(適1)は、北海道地域(植調北海道試験地)、東北地域(植調古川試験地)、北陸地域(植調新潟試験地)、関東地域(植調研究所)、近畿・中国・四国

地域(植調滋賀試験地)、九州地域(植調福岡試験地)の全国6地域および砂壤土(植調霞ヶ浦試験地)で34薬剤(のべ201点)について実施した。その判定結果は、第2表のとおりである。

2) 第二次適用性試験(適2)は、のべ455剤(総点数2,436点)であり、その内訳を第1表にまとめた。これら適2試験の判定結果は第3表のとおりであり、「実・継」と判定された薬剤の使用基準を後に掲載した。

第1表 平成19年度適2試験実施点数

A-1 移植栽培(一発処理)	152 剤 1,396 点	A-4 特殊雑草対象 内訳	
A-2 移植栽培(体系処理:初期)	19 剤 111 点	アゼガヤ	1 剤 1 点
A-3 移植栽培(体系処理:中後期)	20 剤 272 点	イボクサ	1 剤 1 点
A-4 移植栽培(特殊雑草対象)	のべ 214 剤 507 点	エゾノサヤヌカグサ	12 剤 12 点
B 直播栽培	45 剤 128 点	オモダカ	60 剤 200 点
C 畦畔雑草	2 剤 11 点	クサネム	1 剤 2 点
D 耕起前	1 剤 3 点	クログワイ	57 剤 174 点
E 休耕田	2 剤 8 点	コウキヤガラ	35 剤 67 点
		シズイ	20 剤 20 点
		ミズアオイ	15 剤 15 点
		SU 抵抗性コナギ	2 剤 2 点
		SU 抵抗性ホタルイ	10 剤 13 点

第3表 平成19年度 水稻関係除草剤適2試験判定結果一覧

区 分	実・継		継	
A-1 一発処理	AC-014A-1kg 粒	BCH-031-1kg 粒	HOK-0601-1kg 粒	HOK-0701S シャンボ'
	BCH-032-1kg 粒	BCH-033-1kg 粒	KPP-398 フロアブル	KPP-398(L) フロアブル
	BCH-044-1kg 粒	BCH-045H-1kg 粒	KPP-446H シャンボ'	KPP-446L シャンボ'
	BCH-045L-1kg 粒	BCH-051 シャンボ'	KUH-021-0.25kg 粒	KUH-074-1kg 粒
	BCH-051 フロアブル	<u>BCH-052 フロアブル</u>	NC-617SB-1kg 粒	NC-618-1kg 粒
	<u>BCH-053 フロアブル</u>	<u>BCH-062 シャンボ'</u>	NC-621 シャンボ'	NC-621 フロアブル
	<u>BCH-063 シャンボ'</u>	<u>BCH-064 シャンボ'</u>	NH-051(H) シャンボ'	NH-071D シャンボ'
	<u>BCH-064 フロアブル</u>	<u>BCH-064-1kg 粒</u>	NH-071D フロアブル	NH-071D-1kg 粒
	<u>BCH-065L フロアブル</u>	DKH-311-1kg 粒	SB-572 シャンボ'	SB-572 フロアブル
	FSS-115 粒	HOK-0301 フロアブル	SB-582 フロアブル	SB-582-1kg 粒
	HOK-0301-1kg 粒	HOK-0401 フロアブル	SL-0701-1kg 粒	SL-4902-1kg 粒
	HOK-0401-1kg 粒	<u>HOK-0401(L) シャンボ'</u>	SW-071(H) フロアブル	TH-501 シャンボ'
	HOK-0401(L) フロアブル	HOK-0401(L)-1kg 粒	TH-501 フロアブル	TH-501-1kg 粒
	<u>HOK-0501-1kg 粒</u>	<u>HOK-0605 シャンボ'</u>	TH-601 フロアブル	TH-601-1kg 粒
	<u>HOK-0605 フロアブル</u>	<u>HOK-0605-1kg 粒</u>		
	<u>HOK-0605(L) フロアブル</u>	<u>HOK-0605(L)-1kg 粒</u>		
	<u>HOK-0605S-1kg 粒</u>	<u>HOK-0611-1kg 粒</u>		
	<u>HOK-201D-1kg 粒</u>	<u>HOK-201DS-1kg 粒</u>		
	HOK-222 フロアブル	HOK-222-1kg 粒		
	HOK-223 シャンボ'	HOK-223 フロアブル		
	HOK-223-1kg 粒	HSW-051-1kg 粒		
	<u>HSW-052 フロアブル</u>	KPP-444-1kg 粒		
	KPP-445 フロアブル	KPP-445(L) フロアブル		
	KUH-004D-1kg 粒	KUH-013D-0.25kg 粒		
	KUH-013D-1kg 粒	KUH-013K-1kg 粒		
	KUH-023D シャンボ'	KUH-023D フロアブル		
	KUH-032 シャンボ'	KUH-041-1kg 粒		
	MY-100DC フロアブル	MY-100DC-1kg 粒		
	MY-100NC-1kg 粒	MY-100NDC-1kg 粒		
	MY-100TS フロアブル	NBA-101SB シャンボ'		
	NBA-941S-1kg 粒	NC-385 顆粒水和		
	NC-385SB 顆粒水和	NC-385SB-1kg 粒		
	NC-604 シャンボ'	NC-604-1kg 粒		
	NC-606 シャンボ'	NC-607 シャンボ'		
	NC-607 顆粒水和	NC-607-1kg 粒		
	NC-609-1kg 粒	<u>NC-621-1kg 粒</u>		
	NH-051(H) フロアブル	NH-051(H)-1kg 粒		
	<u>NH-061-1kg</u>			
	<u>(H)KUH-061-1kg) 粒</u>	NH-102 フロアブル		
	NH-104-1kg 粒	NH-301-1kg 粒		
	NH-302 フロアブル	SB-556 フロアブル		

区 分	実・継		継	
A-1 一発処理 つづき	SB-556-1kg 粒	SB-563㊦-1kg 粒		
	SB-564 シ'ヤンホ'	SB-564 フロアフル		
	SB-564-1kg 粒	SB-570 フロアフル		
	SB-570-1kg 粒	SL-0601 シ'ヤンホ'		
	SL-0601-1kg 粒	SL-0602-1kg 粒		
	SL-498-1kg 粒	SST-402-1kg 粒		
	SST-403 シ'ヤンホ'	SST-404 シ'ヤンホ'		
	SST-404 フロアフル	SST-404-1kg 粒		
	SW-005㊦ フロアフル	SW-032 フロアフル		
	SW-032㊦ フロアフル	SW-041㊦ -1kg 粒		
	SW-041㊦-1kg 粒	SW-042㊦ シ'ヤンホ'		
	SW-043-1kg 粒	SW-052 シ'ヤンホ'		
	SW-061-1kg 粒	SW-062 フロアフル		
	SW-991-1kg 粒	SYJ-108 シ'ヤンホ'		
	SYJ-150 フロアフル	SYJ-156-1kg 粒		
	SYJ-157-1kg 粒	SYJ-167-1kg 粒		
	TH-001-1kg 粒	TH-122-1kg 粒		
	TH-224 フロアフル	TH-421 シ'ヤンホ'		
	TH-547(Z) シ'ヤンホ'	TH-547(Z) フロアフル		
	TH-547(Z)-1kg 粒	THI-913CS シ'ヤンホ'		
	YH-652 シ'ヤンホ'	NOJ-103-1kg 粒		
	SB-526 フロアフル	SB-559(L)-1kg 粒		
A-2 体系(初期)	AKD-7138 フロアフル	AKD-7155 フロアフル	NC-619 EW	SL-4901-1kg 粒
	CGM-71 フロアフル	KH-183(L)-1kg 粒		
	KPP-2012 フロアフル	KUH-958 フロアフル		
	MY-100MS フロアフル (少量散布)	NSK-863 フロアフル (少量散布)		
	SB-528 フロアフル	SB-528(L) フロアフル		
	SB-529-1kg 粒	YH-650 フロアフル		
	YH-650-1kg 粒	YH-651 フロアフル		
	YH-651-1kg 粒	ブ'タクロール-1kg 粒		
	ブ'タクロール 乳			
A-3 体系(中後期)	DASH-001 SC	DBH-1294-1kg 粒	HOK-0721 粒	
	DEH-112 乳(EW)	DEH-112-1kg 粒		
	KUH-073-1kg 粒	KUH-983-0.25kg 粒		
	NC-612-1kg 粒	SB-551-1kg 粒		
	SL-0401 シ'ヤンホ'	SL-0401 顆粒水和		
	SL-0401-1kg 粒	SL-0401-1kg (1.5kg/10a処理) 粒		
	SL-0601-1kg 粒	SL-0604-1kg 粒		
	SL-0611 顆粒水和	SL-0613 顆粒水和		
	SW-051-1kg 粒	SW-063-1kg 粒		
A-4 アゼガヤ	DEH-112 乳(EW)			
A-4 イボクサ	BAG-032 シ'ヤンホ'			

区 分	実・継		継	
A-4 エゾノサヤヌカグサ	<u>DKH-311-1kg 粒</u>	<u>KPP-444-1kg 粒</u>	BCH-031-1kg 粒	BCH-032-1kg 粒
	<u>NH-051(H) フロアブル</u>	<u>NH-051(H)-1kg 粒</u>	BCH-033-1kg 粒	BCH-052 フロアブル
	<u>NH-403 フロアブル</u>	<u>SW-032 フロアブル</u>	BCH-053 フロアブル	KPP-445 フロアブル
A-4 オモダカ	BCH-031-1kg 粒	BCH-032-1kg 粒	BCH-045H-1kg 粒	BCH-052 フロアブル
	BCH-033-1kg 粒	BCH-044-1kg 粒	BCH-053 フロアブル	HOK-0301-1kg 粒
	BCH-045L-1kg 粒	CGM-71 フロアブル	HSW-051-1kg 粒	HSW-052 フロアブル
	<u>DKH-311-1kg 粒</u>	<u>HOK-222 フロアブル</u>	KPP-2012 フロアブル	KUH-985(L) フロアブル
	<u>HOK-222-1kg 粒</u>	KPP-445① フロアブル	MY-100MS フロアブル	NH-061-1kg (旧KUH-061-1kg) 粒
	KUH-013D-1kg 粒	KUH-021-1kg 粒	SB-556 フロアブル	SB-564 シャンボ
	<u>KUH-041-1kg 粒</u>	MY-100DC(L) フロアブル	SL-498-1kg 粒	SW-063-1kg 粒
	MY-100DC(L)-1kg 粒	<u>NC-606-1kg 粒</u>	SYJ-157-1kg 粒	TH-547(Z) シャンボ
	<u>NC-607-1kg 粒</u>	<u>NH-051(H) フロアブル</u>	TH-547(Z) フロアブル	TH-547(Z)-1kg 粒
	<u>NH-051(H)-1kg 粒</u>	<u>NH-403 フロアブル</u>		
	NHF-401 粒	NOJ-101-1kg 粒		
	<u>SB-563①-1kg 粒</u>	<u>SL-0602-1kg 粒</u>		
	<u>SL-0604-1kg 粒</u>	<u>SL-0613 顆粒水和</u>		
	<u>SL-496① 粒</u>	<u>SST-404 フロアブル</u>		
	<u>SST-404-1kg 粒</u>	SW-005① フロアブル		
	<u>SW-032 フロアブル</u>	<u>SW-042① シャンボ</u>		
	<u>SW-051-1kg 粒</u>	<u>SW-751 粒</u>		
	SYJ-108 シャンボ	<u>SYJ-150 フロアブル</u>		
	<u>SYJ-156-1kg 粒</u>	<u>TH-224 フロアブル</u>		
	YH-650 フロアブル	<u>YH-650-1kg 粒</u>		
	<u>YH-651 フロアブル</u>	<u>YH-651-1kg 粒</u>		
A-4 クサネム			NC-612-1kg 粒	
A-4 クログワイ	BCH-031-1kg 粒	BCH-032-1kg 粒	BCH-045H-1kg 粒	BCH-052 フロアブル
	BCH-033-1kg 粒	BCH-044-1kg 粒	BCH-053 フロアブル	KPP-2012 フロアブル
	BCH-045L-1kg 粒	<u>DKH-311-1kg 粒</u>	KUH-031 粒	NH-061-1kg (旧KUH-061-1kg) 粒
	G-315B 乳	<u>HOK-0301 フロアブル</u>	SB-528 フロアブル	SB-564 シャンボ
	KUH-013D-1kg 粒	KUH-021-1kg 粒	SW-063-1kg 粒	SYJ-157-1kg 粒
	<u>KUH-041-1kg 粒</u>	MAT-159 シャンボ	TH-547(Z) シャンボ	TH-547(Z) フロアブル
	NC-604 フロアブル	NC-606-1kg 粒	TH-547(Z)-1kg 粒	
	<u>NC-607-1kg 粒</u>	<u>NH-051(H) フロアブル</u>		
	<u>NH-051(H)-1kg 粒</u>	<u>NH-403 フロアブル</u>		
	NOJ-101-1kg 粒	NOJ-104-1kg 粒		
	SB-554 シャンボ	<u>SB-563①-1kg 粒</u>		
	SB-564 フロアブル	SB-564-1kg 粒		
	<u>SL-0401-1kg 粒</u>	<u>SL-0401-1kg (1.5kg/10a処理) 粒</u>		
	<u>SL-0601-1kg 粒</u>	<u>SL-0602-1kg 粒</u>		

区 分	実・継		継	
A-4 クログワイ つづき	SL-0604-1kg 粒	SL-0611 顆粒水和		
	SL-0613 顆粒水和	SST-402-1kg 粒		
	SST-403 フロアブル	SST-403-1kg 粒		
	SST-404 フロアブル	SST-404-1kg 粒		
	SW-005① フロアブル	SW-032 フロアブル		
	SW-042① シャンボ	SW-051-1kg 粒		
	SYJ-108 シャンボ	SYJ-150 フロアブル		
	SYJ-156-1kg 粒	TH-224 フロアブル		
A-4 コウキヤガラ	KPP-2005 シャンボ	KPP-2005(H) フロアブル (少量散布)	G-315B 乳	KPP-445① フロアブル
	KPP-2008 乳(EW)	KPP-2008-1kg 粒	SST-402-1kg 粒	SST-403 フロアブル
	KPP-444①-1kg 粒	KPP-444-1kg 粒	SST-403-1kg 粒	TH-001 シャンボ
	KUH-013D-1kg 粒	KUH-021-1kg 粒	TH-547(Z) シャンボ	TH-547(Z) フロアブル
	KUH-041-1kg 粒	NC-612-1kg 粒	TH-547(Z)-1kg 粒	
	SB-554 シャンボ	SB-554 フロアブル		
	SL-0401-1kg 粒	SL-0401-1kg (1.5kg/10a処理) 粒		
	SL-0601-1kg 粒	SL-0602-1kg 粒		
	SL-0604-1kg 粒	SL-0611 顆粒水和		
	SL-0613 顆粒水和	SST-404 フロアブル		
	SST-404-1kg 粒	TH-122-1kg 粒		
	TH-224 フロアブル	TH-421 シャンボ		
	YH-651 フロアブル	YH-651-1kg 粒		
A-4 シズイ	DKH-311-1kg 粒	HOK-222 フロアブル	BCH-045H-1kg 粒	DASH-001 SC
	NH-051(H) フロアブル	NH-403 フロアブル	NC-604-1kg 粒	NH-051(H)-1kg 粒
	SW-005 フロアブル	SW-041(H) -1kg 粒	SL-0401-1kg 粒	SL-0401-1kg (1.5kg/10a処理) 粒
	SYJ-150 フロアブル	TH-224 フロアブル	SST-404 フロアブル	SW-032 フロアブル
			SYJ-156-1kg 粒	TH-122-1kg 粒
			TH-421 シャンボ	TH-547(Z) フロアブル
A-4 ミズアオイ	DKH-311-1kg 粒	KPP-445 フロアブル	BCH-032-1kg 粒	BCH-033-1kg 粒
	NC-385SB 顆粒水和	NC-385SB-1kg 粒	BCH-052 フロアブル	BCH-053 フロアブル
	SST-404-1kg 粒		HSW-051-1kg 粒	HSW-052 フロアブル
			SW-032 フロアブル	TH-547(Z) シャンボ
			TH-547(Z) フロアブル	TH-547(Z)-1kg 粒
A-4 SU抵抗性コナギ	SST-404-1kg 粒		SL-0601-1kg 粒	
A-4 SU抵抗性ホタルイ	BCH-044-1kg 粒	DKH-311-1kg 粒	BCH-032-1kg 粒	BCH-033-1kg 粒
	NC-385SB-1kg 粒	SST-404-1kg 粒	BCH-052 フロアブル	BCH-053 フロアブル
			HSW-051-1kg 粒	HSW-052 フロアブル
B 直播栽培	BCH-044-1kg 粒	BCH-045L-1kg 粒	BCH-045H-1kg 粒	DEH-112 シャンボ
	DASH-001 SC	DKH-311-1kg 粒	HOK-222-1kg 粒	HOK-223 フロアブル
	HOK-221 シャンボ	HOK-222 フロアブル	KUH-021-1kg 粒	NH-051(H) フロアブル
	HOK-223-1kg 粒	HOK-225-1kg 粒	NH-051(H)-1kg 粒	NH-301-1kg 粒
	KUH-013D シャンボ	KUH-031 粒	NH-302 フロアブル	SB-528(L) フロアブル

区 分	実・継		継
B 直播栽培 つづき	KUH-911 液	NBA-941S-1kg 粒	SL-0611 顆粒水和 SL-0612 顆粒水和 SW-043-1kg 粒
	NC-331 水和	<u>NC-385SB-1kg 粒</u>	
	NH-104-1kg 粒	PSS(L)D-1kg 粒	
	SB-528 フロアフル	<u>SB-563①-1kg 粒</u>	
	<u>SL-0401-1kg 粒</u>	<u>SL-0401-1kg</u> <u>(1.5kg/10a処理) 粒</u>	
	SST-402-1kg 粒	<u>SW-005① フロアフル</u>	
	<u>SW-032 フロアフル</u>	SW-041④ -1kg 粒	
	SW-042① シャンボ	SW-991-1kg 粒	
	TH-001 シャンボ	TH-001 フロアフル	
	TH-001-1kg 粒	<u>TH-122-1kg 粒</u>	
	<u>TH-224 フロアフル</u>	<u>TH-421 シャンボ</u>	
C 畦畔	NC-622 液	ZK-122 液	
D 耕起前	ZK-122 液		
E 休耕田	NC-622 液	ZK-122 液	

注): 1) 本年度新規に使用基準が作成されたものは、薬剤名にアンダーラインを記した。

2) 本年度は「実」、「継？」及び「中止」と判定された薬剤はなかった。

※ 薬剤名はアルファベット順に記載した。

平成19年度 水稻関係除草剤使用基準一覧表

A 移植栽培

A-1 一発処理

A-1

AC-014A-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1.5	○	○2	○2		○2		○前※	○発生 期	○前	ミズアオイ:1L				
東北	○1.5	○	○2		○2	○2	○前※	○前※	○発生 期	○前					
北陸	○1.5	○	○2		○2	○2		○前※		○前					
関東・東海	○1.5	○	○2		○2	○2	○前※	○前※	○発生 期	○前	SU抵抗性ナギ・始				
近・中・四	○1.5	○	○2		○2	○2	○前※	○前※	○発生 期	○前					
九州	○1.5	○	○2		○2	○2	○前※	○前※	○発生 期	○前		+0～ノビエ1.5L(砂 壌土は+3～)		●	○

田植同時散布可能
※:オモダカ・クログワイ防除は、クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: クログワイ・オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下する場合がある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

BCH-031-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始				●	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始				●*	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2		○始※	○発生 期	○再生 前～始				●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期	●再生 前～始				○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: *:浅植え、植付け精度不良等で薬害を生じることがある。
セリは再生が早い場合は効果が劣る(九州)。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下する場合がある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果がある。
オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

BCH-032-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始				●	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●*	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ3L		●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ2.5L		●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	●再生 前～始				○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: *:浅植え、植付け精度不良等で薬害を生じることがある。
セリは再生が早い場合は効果が劣る(九州)。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下する場合がある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果がある。
オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

BCH-033-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	●始	○始※		○発生 期	○再生 前～始					
北陸	○3	○	○2		○2	○始			●発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ3L		○	○
関東・東海	○3	○	○3		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始					
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ2.5L		●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期	●再生 前～始					

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: セリは再生が早い場合は効果が劣る(九州)。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

BCH-044-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前 エゾノササゲ+2L ミズアオイ始 SL根除機+2L	+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前				
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前				

田植同時散布可能

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

BCH-045H-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	1kg		○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前				
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

田植同時散布可能

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-1

BCH-045L-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始	○始	○始	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				

田植同時散布可能

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

BCH-051 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	30g×10コ		○
東北	○2.5	○	○2	●始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始				●	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始				●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	●再生 前～始				●	○

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: セリは再生が早い場合は効果が劣る(九州)。
5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

BCH-051 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	500ml	●	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始				●	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始				●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2				○発生 期	○再生 前～始					○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	●再生 前～始				●	○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: セリは再生が早い場合は効果が劣る(九州)。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。															

A-1

BCH-052 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	500ml	●	●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始				●	●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始					●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始				●	●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

薬液が付着した稲体には白化症状が生ずることがある。

セリは再生が早い場合は効果が劣る(九州)。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

BCH-053 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	500ml	●	●
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始					●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始				●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 薬液が付着した稲体には白化症状が生ずることがある。
セリは再生が早い場合は効果が劣る(九州)。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

BCH-062 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	40g×10 ³		●
東北															
北陸															
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	40g×10 ³		●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: セリは再生が早い場合は効果が劣る(九州)。
 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

BCH-063 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期			+5～ノビエ2.5L	50g×10 ³		●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四															
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	50g×10 ³		●

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: セリは再生が早い場合は効果が劣る(九州)。
 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

BCH-064 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	30g×10 ³		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期						●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: セリは再生が早い場合は効果が劣る(九州)。
 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

BCH-064 プロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	500ml		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始				●	●
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期						●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: セリは再生が早い場合は効果が劣る(九州)。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

HOK-0301 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期			+5～ノビエ2.5L	500ml		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期					●	●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期					●	●
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※		○発生 期		○前			●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※		○発生 期		○前			●	○
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期						●

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

クログワイ防除は、有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

HOK-0301-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期		○前	+5～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始	○始※		○発生 期					○	○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始	○始※		○発生 期		○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期		○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○始	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期		○前			○	○

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

HOK-0401 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

水口処理可能 田植同時散布確認(東北)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-1

HOK-0401-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)	1kg	○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

田植同時散布確認(東北2)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 低温等による活着不良の場合には薬害が生じる事がある。

A-1

HOK-0401(L) ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始		+1～ノビエ2.5L	50g×10	●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

HOK-0401(L) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生 期	●再生 前～始		+0～ノビエ2.5L	500ml	●	○
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●

田植同時散布確認(関東・東海・九州)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

HOK-0401(L)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	1kg		○
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始					○
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

HOK-0501-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+0～ノビエ2.5L	1kg	●	●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 低温等による活着不良の場合には薬害が生じる事がある(東北)。

A-1

HOK-0605 シェンボ'

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+0～ノビエ2.5L	50g×10コ		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始					●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。

A-1

HOK-0605 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+0～ノビエ2.5L	500ml		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始				●	●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

田植同時散布確認(東北)
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意:

A-1

HOK-0605-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期	●再生 前～始		+0～ノビエ2.5L	1kg		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始				●	●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

田植同時散布確認(北海道, 東北)
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意:

A-1

HOK-0605(L) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始		+0～ノビエ2.5L	500ml	●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始				●	
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始				●	
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始				●	

田植同時散布可能
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果がある。

A-1

HOK-0605(L)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道																
東北																
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始				●再生 前～始			+0～ノビエ2.5L	1kg	●	●
関東・東海	●2	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前		+0～ノビエ2L			●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前		+0～ノビエ2.5L			●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始						●
田植同時散布可能 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。																

A-1

HOK-0605S-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道																
東北																
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始			+0～ノビエ2.5L	1kg	●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始						●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始						●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前					●
田植同時散布可能 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。																

A-1

HOK-0611-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道																
東北																
北陸																
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前		+5～ノビエ2.5L	1kg		●
近・中・四																
九州																
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:																

A-1

HOK-201D-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道																
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始			+0～ノビエ2.5L	1kg		●
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:																

A-1

HOK-201DS-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始					●前	+0～ノビエ2.5L	1kg	●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

A-1

HOK-222 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始		●始	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始		●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ草丈3cm		○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

水口処理可能 田種同時散布可能
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: オモダカ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

HOK-222-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		●始	○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○始	○始		●始※	○発生 期	○再生 前～始				○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 低温等による活着不良の場合には薬害が生じることがある。(東北)
オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

HOK-223 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	○2	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+1～ノビエ2L	50g×10㊦	○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
近・中・四	○2	○	○2		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+1～ノビエ2L(砂 壌土は+3～)		○	○
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+1～ノビエ2L		○	○

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

HOK-223 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始		+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期	○再生 前～始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

田植同時散布可能
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

HOK-223-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	1kg	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

HSW-051-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期			+3～ノビエ2.5L	1kg		●
東北															
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

A-1

HSW-052 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期			+3～ノビエ2.5L	500ml		●
東北															
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

A-1

KPP-444-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始		○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コシノミナシダグモ2L SU抵抗性オモダカ2L ミズガヤ1L	+0～ノビエ1.5L	1kg	○	○
東北	○1.5	○	○始	○始	○始	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コシノミナシダグモ2L SU抵抗性オモダカ2L ミズガヤ1L			○	○
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

田植同時散布可能
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。
コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

KPP-445 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始		○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性オモダカ2L ミズガヤ1L	+0～ノビエ1.5L	500ml	○	○
東北	○1.5	○	○始		○始	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ草丈3cm SU抵抗性オモダカ2L			○	○
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

田植同時散布可能
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

KPP-445① フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道																
東北																
北陸	○1.5	○	○始		○始	○始	○始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前		+0～ノビエ1.5L	500ml	○	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性コシノミナシダグモ2L SU抵抗性オモダカ1L			○	○
近・中・四	○1.5	○	○始		○始	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前		+0～ノビエ1.5L (砂壌土は+3～)		○	○
九州	○1.5	○	○始		○始	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前		+0～ノビエ1.5L		○	○

田植同時散布可能
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。
クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

KUH-004D-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道																
東北																
北陸	○3	○	○2		○2	○2	○始※			○再生 前～始	○前		+0～ノビエ3L	1kg	○	○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2	○始※	○始	○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
九州	○3	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
田植同時散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

KUH-013D-0.25kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壌土 ～ 塩土
北海道																
東北																
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前		+0～ノビエ2.5L	250g	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 湛水周縁部散布可能
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 湛水周縁部散布では藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足を生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

KUH-013D-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壌土 ～ 塩土
北海道																
東北																
北陸	○3	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前		+0～ノビエ3L	1kg	○	○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コナキナガタ:発生始			○	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
九州	○3	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 田植同時散布可能
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。
 オモダカ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

KUH-013K-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壌土 ～ 塩土
北海道	○3	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前		+0～ノビエ3L(砂 壌土は+3～)	1kg	○	○
東北	○3	○	○2	○2	○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズク草丈3cm	+0～ノビエ3L		○	○
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 田植同時散布可能
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: オモダカ・クログワイ・シズク防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

KUH-023D ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壌土 ～ 塩土
北海道																
東北																
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前		+3～ノビエ2.5L	25g×10コ	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

KUH-023D フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始		+3～ノビエ2.5L	500ml	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	SU抵抗性オモダカ2L			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

KUH-032 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2	○	○始	○2					○発生 期			+3～ノビエ2L	25g×10コ	○	○
東北	○2	○	○2	○2	○2				○発生 期					○	○
北陸	○2	○	○始		○始				○発生 期					○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2				○発生 期					○	○
近・中・四	○2	○	○2		○始				○発生 期					●	○
九州	○2	○	○2		○2				○発生 期					○	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

KUH-041-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○3	○	○2	○2		○2		●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ3L(砂 壌土は+3～)	1kg	○	○
東北	○3	○	○3	○2	○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コシキガラ・発生始		○	○
北陸	○3	○	○3		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○3	○	○3		○3	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	●前	コシキガラ・発生始		○	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○3	○	○3		○3	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	●前	コシキガラ・発生始		○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ・コシキガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

MY-100DC フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○始				○前	○発生 期	○再生 前～始		+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始	○前※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ・最大3cm		○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

水口処理可能 田植同時散布可能
 ※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

MY-100DC-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ツリガリ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○始		○2		○前	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○2	○前※	○前※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

田植同時散布可能

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

MY-100NC-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ツリガリ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○2	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	○始		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+1～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)		○	○
九州	○2.5	○	○2	○前	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+1～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)		○	○

田植同時散布可能

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

MY-100NDC-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ツリガリ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○3	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ3L	1kg	○	○
東北	○3	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○3	○	○2		○2	○2	○始		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+1～ノビエ3L(砂 壌土は+5～)		○	○

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

MY-100TSフロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ツリガリ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○2	○前※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ:発生始 ～3cm		○	○
北陸	○2.5	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○前※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

水口処理可能

田植同時散布可能

※:クログワイ防除は、クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

オモダカ防除は、オモダカに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下する場合がある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

クログワイ・オモダカ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

NBA-101SB ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+1～ノビエ2.5L	30g×10 ³	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

NBA-941S-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○3	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ3L	1kg	○	○
東北	○3	○	○2	○始	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○
北陸	○3	○	○2		○2	○2			●再生 前～始			+0～ノビエ3L		○	○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ3L		○	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始		+0～ノビエ3L			○
九州	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ3L		○	○

田植同時散布確認(北陸・近畿・中国・四国)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-385 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L 60g(散布 液量250～)		○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2	○始	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始		+0～ノビエ2.5L (砂壌土は+5～)		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L (砂壌土は+5～)		○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		○	○

顆粒のまま水口処理が可能

田植同時散布可能(500ml希釈)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-385SB 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○始		○2		○始	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	80g(散布 液量)	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

顆粒のまま水口処理が可能

田植同時散布可能

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

NC-385SB-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土	
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	SU播種機385B-1L	+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前		+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始			+0～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始					○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前		+5～ノビエ2.5L		○	○

田植同時散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-604 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2L	30g×10 ²		○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ2.5L		●	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。															

A-1

NC-604-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	1kg	●	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		●	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○
近・中・四 (替)	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。															

A-1

NC-606 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○始	+5～ノビエ2.5L	30g×10 ²	●	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○始			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期		○始			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○始			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○始			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○始			●	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-607 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ネタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L	30g×10 ³	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始					○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-607 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ネタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L	60g(散布 液量)	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+3～)		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始		+3～ノビエ2.5L		●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○

顆粒のまま水口処理が可能 田植同時散布確認(東北)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-607-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ネタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L	1kg	●	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+3～)		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L			○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
近・中・四 (替)	○2.5	○	○2		○2	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始				●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○

田植同時散布確認(東北2)

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

NC-609-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ネタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L	1kg	●	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-1

NC-621-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●3	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ3L	1kg		●
東北	●3	●	●2	●2	●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
北陸	●3	●	●3		●始	●始			●発生 期						●
関東・東海	●3	●	●3		●3	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四	●3	●	●3		●2	●2				●再生 前～始					●
九州	●3	●	●3		●3	●3			●発生 期	●再生 前～始					●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

NH-051(H) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		●始	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	500ml	●	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

田植同時散布確認(北海道, 東北)

※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

NH-051(H)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		●始	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	1kg	●	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

田植同時散布確認(北海道, 東北)

※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

NH-061-1kg (旧KUHH-061-1kg) 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●3	●	●3	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+3～ノビエ3L	1kg		●
東北	●3	●	●3		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始				●	●
北陸	●3	●	●2		●始	●2									●
関東・東海	●3	●	●3		●3	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四	●2.5	●	●2		●3	●3			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●3	●	●3		●3	●3			●発生 期	●再生 前～始					●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

NH-102 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道																
東北																
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	○始	○始	○発生 期	○再生 前～始	○前		+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	イシガキ再生始			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始	○始	○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前		+0～ノビエ2.5L		○	○

田植同時散布可能
※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

NH-104-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道														1kg		
東北																
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	○始		○発生 期	○再生 前～始	●前		+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前	イシガキ再生始			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始		○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○

田植同時散布可能
※: クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

NH-301-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2									+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2		○前										○	○
北陸	○2.5	○	○2		○前										○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2										●*	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2										○	○
九州	○2.5	○	○2		○2										●	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: * : 浅植え、植付け精度不良等で薬害を生ずることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

NH-302 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2									+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2		○始										○	○
北陸	○2.5	○	○2		○前										○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2										●*	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2										○	○
九州	○2.5	○	○2		○2										●	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: * : 浅植え、植付け精度不良等で薬害を生ずることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

NOJ-103-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○3	○	○2	○2		○2		○始	○発生 期	○再生 前～始	○前		+0～ノビエ3L(砂 壌土は+5～)	1kg	○	○
東北	○3	○	○2	○2	○2	○2	○前※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ草丈3cm			○	○
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

田植同時散布可能
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

SB-526 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2	○	○始	○2					○発生 期					500ml	○	○
東北	○2	○	○2	○始	○2				○発生 期						○	○
北陸	○2	○	○2		○2				○発生 期						○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2				○発生 期						○	○
近・中・四	○2	○	○2		○始				○発生 期						○	○
九州	○2	○	○2		○始				○発生 期						○	○

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

SB-556 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期		スズノギヤツリ等2L シズイ草1L		+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期		シズイ草丈3cm				○	○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生 期						○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期		SL50%他30%×2L 40%×1再生始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期						○	○
九州	○2.5	○	○2	○前	○2	○2			○発生 期		40%×1再生始				○	○

水口処理可能 田植同時散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

SB-556-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2	●	●2	●始		●始			●発生 期				+0～ノビエ2L	1kg		●
東北	●2	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期							●
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始							+0～ノビエ2.5L			●
関東・東海	●2	●	●2		●2	●2			●発生 期				+0～ノビエ2L			●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期				+0～ノビエ2.5L			●
九州	●2	●	●2		●2	●2			●発生 期				+0～ノビエ2L			●

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 活着不良の場合、散布後の低湿および急激な気温の上昇により障害を生じることがある(東北)。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

SB-559(L)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始		+3～ノビエ2.5L	1kg	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

SB-563(D)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始	●始	●始	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

田植同時散布可能
 ※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1

SB-564 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	○2	○	○始	○始		○始			○発生 期			+3～ノビエ2L	30g×10a	●	○
東北	○2	○	○2	○前	○2	○始			○発生 期					●	○
北陸	○2	○	○始		○始	○始			○発生 期					●	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期					●	○
近・中・四 (注)	○2	○	○2		○始	○始			○発生 期					○	○
九州	○2	○	○2	○始	○2	○2			○発生 期					●	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な葉害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

SB-564 プロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	○2	○	○始	○2		○始			○発生 期		ミスアオイ2L	+3～ノビエ2L	500ml	○	○
東北	○2	○	○2	○始	○始	○始	○始※	○始※	○発生 期		シズイ:草丈3cm			○	○
北陸	○2	○	○2		○始	○始			○発生 期					○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○2		○始※	○発生 期					○	○
近・中・四	○2	○	○2		○始	○始	○始		○発生 期					○	○
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期		コサヤガラ:始			○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ・コサヤガラ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

SB-564-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2	○	○始	○2		○始			○発生 期			ミスアオイ2L	+3～ノビエ2L	1kg	○	○
東北	○2	○	○2	○始	○始	○始	○始※	○始※	○発生 期			シズイ:置丈3cm			○	○
北陸	○2	○	○2		○始	○始			○発生 期						○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○2		○始※	○発生 期						○	○
近・中・四	○2	○	○2		○始	○始	○始		○発生 期						○	○
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期			コウキヤガラ始			○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ・シズイ防除は有効剤との組み合わせで使用する。

A-1

SB-570 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2	●	●始	●始		●始			●発生 期				+0～ノビエ2L	500ml		●
東北	●2	●	●2	●始	●始	●始			●発生 期							●
北陸	●2	●	●始		●始	●始			●発生 期						●	●
関東・東海	●2	●	●2		●2	●始			●発生 期							●
近・中・四	●2	●	●2		●始	●始			●発生 期							●
九州	●2	●	●2	●始	●2	●2			●発生 期							●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

SB-570-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2	●	●始	●始		●始			●発生 期				+0～ノビエ2L	1kg		●
東北	●2	●	●2	●始	●始	●始			●発生 期						●	●
北陸	●2	●	●始		●始	●始			●発生 期						●	●
関東・東海	●2	●	●2		●2	●始			●発生 期							●
近・中・四	●2	●	●2		●始	●始			●発生 期							●
九州	●2	●	●2	●始	●2	●2			●発生 期							●

田植同時散布可能

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

SL-0601 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道													+7～ノビエ4L	50g×10 ³		
東北	●4	●	●3			●3			●発生 期	●再生 前～始						●
北陸	●4	●	●4			●2			●発生 期	●再生 前～始						●
関東・東海													+7～ノビエ3L	50g×10 ³		
近・中・四																
九州	●3	●	●4			●4			●発生 期	●再生 前～始						●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

A-1

SL-0601-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北	●4	●	●4	●4		●3	●草丈 10cm※	●発生 期	●再生 前～始			+14～ノビエ4L	1kg		●
北陸	●4	●	●3			●2		●発生 期				+7～ノビエ4L			●
関東・東海	●3	●	●3			●3	●草丈 10cm※	●発生 期	●再生 前～始		コキヤガラ株	+7～ノビエ3L			●
近・中・四	●4	●	●3			●3	●草丈 10cm	●発生 期	●再生 前～始			+7～ノビエ4L			●
九州	●3	●	●4			●4		●発生 期	●再生 前～始		コキヤガラ株	+7～ノビエ3L			●

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

SL-0602-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北	●4	●	●3		●4	●3	●草丈 10cm※	●矢じり 葉抽出前 ※	●発生 期	●再生 前～始		コキヤガラ株	1kg		●
北陸	●4	●	●4		●2	●2		●矢じり 葉抽出前 ※							●
関東・東海	●4	●	●4		●4	●3	●草丈 10cm※	●矢じり 葉抽出前 ※	●発生 期	●再生 前～始		コキヤガラ株			●
近・中・四	●4	●	●3		●3	●3	●草丈 10cm	●矢じり 葉抽出前 ※	●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●4	●	●4		●4	●4			●発生 期	●再生 前～始		コキヤガラ株			●

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

SL-498-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北	○2	○	○始	○始	○始	○始			○発生 期		○前	+0～ノビエ2L	1kg	○	○
北陸	○2	○	○2		○2	○2					○前			○	○
関東・東海	○2	○	○2			○2					○前	イダナ・再生始		○	○
近・中・四	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期		○前			○	○
九州	○2	○	○2		○2	○2					○前			○	○

田植同時散布可能
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

SST-402-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生 期	○再生 前～始		+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前	ノビエ草丈3cm		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○始	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前	5L抵抗性800L-2L		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

田植同時散布可能
 ※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。
 シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

SST-403 シンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北	●1.5	●	●始	●始	●始	●始			●発生 期	●再生 前～始		+0～ノビエ1.5L	40g×10コ	●	●
北陸															
関東・東海	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始		+0～ノビエ1.5L	40g×10コ		●
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

A-1

SST-404 シンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期	●再生 前～始		+0～ノビエ2.5L	40g×10コ		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始				●	●
北陸	●2.5	●	●2		●始	●2			●発生 期	●再生 前～始				●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始				●	●
九州	●2	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始		+0～ノビエ2L			●

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果がある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果がある。

A-1

SST-404 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土	
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始		●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	SL振動性効果あり、 SL安定性あり、 SL7.5L	+0～ノビエ2.5L	500ml	●	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	SL振動性効果あり、 SL安定性あり、 SL7.5L	+0～ノビエ2.5L		●	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コキヤガラ付 SL振動性効果あり、 SL安定性効果あり、 SL7.5L	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+3～)		●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前		+0～ノビエ2.5L		●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前					○
九州	○2.5	○	○2	○始	○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前		+0～ノビエ2.5L		○	○

田植同時散布可能

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

SST-404-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始		●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	1kg	●	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L		●	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L		○	○

田植同時散布可能
 ※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ・コキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1

SW-005①フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	○始	○始	○発生 期	○再生 前～始		+3～ノビエ2.5L	500ml	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	イデクサ・再生始			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

水口処理可能
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

SW-032フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		●始	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

田植同時散布可能
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

SW-032①フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

田植同時散布確認(北陸2)
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

SW-041①-1kg粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		○始	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
田植同時散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。
シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

SW-041①-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壌土 ～ 堆土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始		+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+3～)	1kg	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始		+3～ノビエ2.5L		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

田植同時散布確認(北陸2)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

SW-042① シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壌土 ～ 堆土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	●始	●始	○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L	35g×10コ	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

SW-043-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壌土 ～ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期		○前	+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期		○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生 期					○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期		○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期		○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期		○前			○	○

田植同時散布可能

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

SW-052 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壌土 ～ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期		○前	+1～ノビエ2.5L	50g×10コ	●	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期		○前			●	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期		○前			●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期					○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期		○前			●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期		○前			●	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

SW-061-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ワカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●2			●発生 期			+5～ノビエ2.5L	1kg	●	●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始								●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期						●
近・中・四 (普)	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期					●	●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期						●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

SW-062 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ワカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期			+0～ノビエ2.5L	500ml		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期					●	●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期					●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期						●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期						●
九州	●2.5	●	●2	●始	●2	●2			●発生 期						●

田植同時散布確認(東北・関東・東海)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

SW-991-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ワカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○始		○2			○発生 期	○前	エノキヤスガダシ	+5～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2	○	○2	○始	○始	○始			○発生 期			+5～ノビエ2L			○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2				○前		+5～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○前	イダササ、再生始			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2								○	○
九州	○2.5	○	○2	○前	○2	○2			○発生 期					○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

SVJ-108 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ワカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○3	○	○2	○2		○2		○始	○発生 期	○再生 前～始	○始	+5～ノビエ3L	30g×10 ²	○	○
東北	○3	○	○2	○2		○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○始			○	○
北陸	○3	○	○2		○2	○2		●始※	○発生 期	○再生 前～始	○始			○	○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○始			○	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○始			○	○
九州	○3	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○始	+1～ノビエ3L(砂 土は+5～)		○	○
									○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ3L		○	○

※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な障害や効果不足が生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

SYJ-150 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○3	○	○2	○2		○2	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前		+0～ノビエ3L(砂 壌土は+5～)	500ml	○	○
東北	○3	○	○2	○2	○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ葉丈3cm		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+3～)	350ml	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

水口処理可能(北海道、東北:500ml、北陸～九州:350ml)
 田植同時散布可能(北海道、東北:500ml、北陸～九州:350ml)
 ※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

SYJ-156-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○3	○	○2	○2		○2	●始	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ葉丈2L SU抵抗性オモダカ1L	+0～ノビエ3L(砂 壌土は+5～)	1kg	○	○
東北	○3	○	○2	○2	○2	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性オモダカ1L		○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

田植同時散布可能
 ※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

SYJ-157-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	●再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	1kg		○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性オモダカ1L SU抵抗性オモダカ1L		●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+3～)		●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+3～)		●	○

田植同時散布可能
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

SYJ-167-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●1.5	●	●始	●始					●発生 期			+0～ノビエ1.5L	1kg		●
東北	●1.5	●	●始	●始	●始									●	●
北陸	●2	●	●始		●始							+0～ノビエ2L		●	●
関東・東海	●2	●	●2		●始				●前						●
近・中・四	●2	●	●始		●始				●前						●
九州	●1.5	●	●始		●始							+0～ノビエ1.5L			●

田植同時散布可能
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

TH-001-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 〜 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前〜始 期	○前	+5〜ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始	○始※		○発生 期	○再生 前〜始 期	○前	シズイ、基太3cm		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生 期	○再生 前〜始 期				○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前〜始 期		コウキヤガラ始		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始		○発生 期	○再生 前〜始 期	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前〜始 期	○前			○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。
オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

TH-122-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 〜 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		○始※	○発生 期	○再生 前〜始 期	○前	+0〜ノビエ2.5L(砂 壤土は+5〜)	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前〜始 期	○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前〜始 期	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前〜始 期	○前	コウキヤガラ始	+0〜ノビエ2.5L	○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前〜始 期	○前		+0〜ノビエ2.5L(砂 壤土は+5〜)	○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前〜始 期	○前		+0〜ノビエ2.5L(砂 壤土は+5〜)	○	○

田植同時散布可能
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。
コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

TH-224 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 〜 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		●始※	○発生 期	○再生 前〜始 期	○前	+0〜ノビエ2.5L(砂 壤土は+5〜)	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前〜始 期	○前	シズイ、基太3cm		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前〜始 期	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前〜始 期	○前	コウキヤガラ始	+0〜ノビエ2.5L(砂 壤土は+5〜)	●*	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前〜始 期	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前〜始 期	○前		+0〜ノビエ2.5L(砂 壤土は+5〜)	○	○

田植同時散布可能
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: *:浅植え、植付け精度不良等で被害を生ずることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

TH-421 ジェンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 〜 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始		○始※	○発生 期	○再生 前〜始 期	○前	+5〜ノビエ2.5L	40g×10 ³	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前〜始 期	○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前〜始 期	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前〜始 期	○前	コウキヤガラ始		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前〜始 期	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前〜始 期	○前			○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。
コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

TH-547(Z) シャンボ

H-557(2) シンズ															
地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 塚 土	塚 土 ～ 埋 土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	40g×10 ^コ		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始					●
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期					●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始				●	●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期						●
減水深: 2cm/日以下															
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。															
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。															
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。															
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。															

A-1

TH-547(Z) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 塚 土	塚 土 ～ 埋 土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期	●再生 前～始					
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始					
北陸	●2.5	●	●始		●始	●始			●発生 期						
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期						
北陸は全面散布															
減水深：2cm/日以下															
使用上の注意：散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。															

A-1

TH-547(Z)-1kg 粒

H-59/2(JR18) 社															
地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 塚 土	塚 土 ～ 埋 土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	1kg	●	○
東北	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始				●	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	●再生 前～始				●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期					●	○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。															

A-1

THI-913CS シャンボ

HF-913CS シェンホ																
地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 塚 土	塚 土 ～ 埋 土	
北海道																
東北																
北陸																
関東・東海	●2	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始		+0～ノビエ2L	50g×10コ		●	
近・中・四	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				●	○
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。																

A-1

YH-652 ジェンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期		○前	+5～ノビエ2.5L	50g×10コ	●	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期					●	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期					●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期					○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期		○前			●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期					●	○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。															

A-2 体系(初期)

A-2

AKD-7138 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカリ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道											●盛	移植後藻類発生 始～盛期	500ml		●
東北											●盛				●
北陸											●盛			●	●
関東・東海															
近・中・四															
九州															
水口処理可能															
減水深: 2cm/日以下															
使用上の注意:															

A-2

AKD-7155 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズカヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土	
北海道	●1	●	●始	●始							●始	+0～ノビエ1L	500ml		●	
東北	●1	●	●始	●始	●始						●始				●	●
北陸	●1	●	●前		●前						●前					●
関東・東海	●1	●	●始		●前						●前					●
近・中・四	●1	●	●始		●前											●
九州	●1	●	●始		●始						●始					●
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 深水条件では薬害を生じることがある。																

A-2

CGM-71 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道	○1	○	○始	○始		○始		●始				植代時(～4),+0 ～ノビエ1L	500ml	○	○
東北	○1	○	○始	○始	○始	○始		○始						○	○
北陸	○1	○	○始		○始	○始		●始						○	○
関東・東海	○1	○	○始		○始	○始		●始※						○	○
近・中・四	○1	○	○始		○始	○始		●始						○	○
九州	○1	○	○始		○始	○始		●始※						○	○
水口処理可能 田植同時散布可能 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。															

A-2

KH-183(L)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 堆土
北海道	○1.5	○	○始	○始						○始		+0～ノビエ1.5L	1kg	○	○
東北	○1.5	○	○始	○始	○始					○始		植代後～4,+0～ノ ビエ1.5L		○	○
北陸	○1.5	○	○始		○始					○始				○	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始					○始				○	○
近・中・四	○1.5	○	○始		○始					○始		植代後～4,+3～ ノビエ1.5L		○	○
九州	○1.5	○	○始		○始					○始				○	○
田植同時散布可能 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:															

A-2

KPP-2012 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 堆土
北海道	○1	○	○始	○始		○始						+0～ノビエ1L	500ml	○	○
東北	○1	○	○始	○前	○始	○始						植代後～4,+0～ ノビエ1L		○	○
北陸	○1	○	○始		○始	○前								○	○
関東・東海	○1	○	○始		○始	○始								○	○
近・中・四	○1	○	○始		○始	○始								○	○
九州	○1	○	○始		○始	○始								○	○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 深水条件では葉害を生じることがある。															

A-2

KUH-958 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 堆土
北海道	○1	○	○始									植代後～4,+0～ ノビエ1L	500ml	○	○
東北	○1	○	○始	○始	○前		○前※					植代後～4,+0～ ノビエ1L		○	○
北陸	○1	○	○始		○始		○前※					植代後～4,+0～ノ ビエ1L(*:砂壌土は 移植前処理を除く)		○*	○
関東・東海	○1	○	○始		○始		○前※					+0～ノビエ1L		○	○
近・中・四	○1	○	○始		○始		○前※					植代後～4,+0～ノ ビエ1L(早期は移植 前処理を除く)		○	○
九州	○1	○	○始		○始		○前※							○	○
水口処理可能 田植同時散布可能 ※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 深水条件では葉害を生じることがある。 クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。															

A-2

MY-100MS フロアブル(少量散布)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 堆土
北海道	○1	○	○始	○始		○始						+0～ノビエ1L	300ml	○	○
東北	○1	○	○始	○始	○始	○始								○	○
北陸	○1	○	○始		○始	○始								○	○
関東・東海	○1	○	○始		○始	○始								○	○
近・中・四	○1	○	○始		○始	○始								○	○
九州	○1	○	○始		○始									○	○
一発処理型除草剤の前処理として少量散布(300ml/10a)が可能。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:															

A-2

NSK-863 フロアブル(少量散布)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北	●1	●	●始	●始	●始							植代後～4, +0～ ノビエ1L	300ml	●	●
北陸	●1	●	●前		●前									●	●
関東・東海	●1	●	●始		●始										●
近・中・四	●1	●	●始		●前							植代後～4, +0～ノ ビエ1L(※:砂壌土は 移植前処理を除く)		●*	●
九州															

一発処理型除草剤の前処理として少量散布(300ml/10a)が可能。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意:

A-2

SB-528 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1	○	○始	○始							シズイ・オキ シズイ・オキ	植代後～4, +0～ ノビエ1L	500ml	○	○
東北	○1	○	○始	○始	○始		○前※				シズイ・発生前 コウキヤガラ・前			○	○
北陸	○1	○	○始	○始	○始		○前※				コウキヤガラ・前			○	○
関東・東海	○1	○	○始		○始		○前※							○	○
近・中・四	○1	○	○始		○始		○前※							○	○
九州	○1	○	○始		○始		○前※				コウキヤガラ・発生始			○	○

水口処理可能 田植同時散布可能
 ※:クログワイ防除は、クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 コウキヤガラ防除は、コウキヤガラに有効な一発処理剤との体系で使用する
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 深水条件では被害を生じることがある。
 クログワイ・シズイ・コウキヤガラ防除は、有効な剤との組み合わせで使用する

A-2

SB-528(L) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1	○	○始	○始								+0～ノビエ1L	500ml	○	○
東北	○1	○	○始	○前			○前※					植代時～4, +0～ ノビエ1L		○	○
北陸	○1	○	○始		○前		○前							○	○
関東・東海	○1	○	○始		○始		○前※							○	○
近・中・四	○1	○	○始		○始		○前							○	○
九州	○1	○	○始	○前	○始									○	○

植代時は土壌混和処理 田植同時散布可能
 ※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-2

SB-529-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1	○	○始	○始								+0～ノビエ1L	1kg	○	○
東北	○1	○	○始	○始	○前							植代時～4, +0～ ノビエ1L		○	○
北陸	○1	○	○始	○始										○	○
関東・東海	○1	○	○始		○前		○前※					+0～ノビエ1L		○	○
近・中・四	○1	○	○始		○前							植代時～4, +0～ ノビエ1L		○	○
九州	○1	○	○始									+0～ノビエ1L		○	○

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 田植同時散布可能
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 深水条件では被害を生じることがある。
 クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-2

YH-650 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始			○発生 期			+0～ノビエ1.5L	500ml	○	○
東北	○1.5	○	○始	○始		○前			○発生 期			植代後～4、+0～ ノビエ1.5L		○	○
北陸	○1.5	○	○始			○始		○前	○発生 期					○	○
関東・東海	○1.5	○	○始			○始		○前※	○発生 期		SL抵抗性ホタルイ防除			○	○
近・中・四	○1.5	○	○始			○始		●前	○発生 期					○	○
九州	○1.5	○	○始			●始		●前※	●発生 期					○	○

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: SU抵抗性ホタルイ防除は、有効な剤との組み合わせで使用する。

オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-2

YH-650-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始			○発生 期			+0～ノビエ1.5L	1kg	○	○
東北	○1.5	○	○始	○始		○前			○発生 期			植代後～4、+0～ ノビエ1.5L		○	○
北陸	○1.5	○	○始			○始		●前	○発生 期					○	○
関東・東海	○1.5	○	○始			○始		●前※	○発生 期					○	○
近・中・四	○1.5	○	○始			○始		●前	○発生 期					○	○
九州	○1.5	○	○始			●始		●前※	●発生 期					○	○

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-2

YH-651 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始			○発生 期			+0～ノビエ1.5L	500ml	○	○
東北	○1.5	○	○始	○始	○始	○始			○発生 期			植代後～4、+0～ ノビエ1.5L		○	○
北陸	○1.5	○	○始		○始	○始	○前※	●前	○発生 期					○	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	○始	○前※	●前※	○発生 期		○始			○	○
近・中・四 (特)	○1.5	○	○始		○始	○始	○前※	●前	○発生 期		○前			○	○
九州	○1.5	○	○始		○始	●始		●前※	●発生 期					○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-2

YH-651-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始			○発生 期			+0～ノビエ1.5L	1kg	○	○
東北	○1.5	○	○始		○始	○始	○前※		○発生 期			植代後～4、+0～ ノビエ1.5L		○	○
北陸	○1.5	○	○始		○始	○始	○前※	●前	○発生 期					○	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	○始	○前※	●前※	○発生 期					○	○
近・中・四	○1.5	○	○始		○始	○始	○前※	●前	○発生 期					○	○
九州	○1.5	○	○始		○始	●始	○前※	●前※	●発生 期					○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-2

ブタロール-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1	○	○始	○前							ミズアオイ始	+0～ノビエ1L	1kg	○	○
東北	○1	○	○始		○始							植代後～4.10～ノ ビエ1L(砂壌土は 4.1～)		○	○
北陸	○1	○	○始		○始							植代後～4.10～ ノビエ1L		○	○
関東・東海	○1	○	○始		○始									○	○
近・中・四	○1	○	○始		○始									○	○
九州	○1	○	○始		○始							植代後～4.1～ ノビエ1L		○	○

田植同時散布可能

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 浅植え, 植え付け精度不良等で根が露出すると被害を生じることがある。

A-2

ブタロール 乳

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1	○	○始	○始								植代時(-4まで)+1 ～ノビエ1L	300～500cc(圃 場400～500cc)		○
東北	○1	○	○始	○始	○前								300～ 500ml		○
北陸	○前	○	○前		○前							植代時(-4まで)	350～ 500ml		○
関東・東海	○前	○	○前		○前								300～ 500ml		○
近・中・四 (管)	○前	○											350～ 500ml		○
九州 (管)	○前	○											350～ 500ml		○

植代時は土壌混和処理

混和時の水深3～5cm

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-3 体系(中後期)

A-3

DASH-001 SC

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○5	○	○花茎 抽出始	○5		○4			○生育 期	○生育 期		+25～+40(イネ6L以 降、ノビエ5Lまで)	100ml(散 布液量)	○	○
東北	○5	○	○花茎 抽出始	○4	○4	○4	○草丈 20cm※	○草丈 30cm※	○生育 期	○生育 期				○	○
北陸	○5	○	○花茎 抽出始		○4	○5	○草丈 30cm	○草丈 30cm	○生育 期	○生育 期				○	○
関東・東海	○5	○	○花茎 抽出始		○5	○5	○草丈 30cm※	○草丈 30cm※	○生育 期	○生育 期				○	○
近・中・四	○5	○	○花茎 抽出始		○5	○5	○草丈 30cm	○草丈 30cm	○生育 期	○生育 期				○	○
九州	○5	○	○花茎 抽出始		○6	○6			○生育 期	○生育 期				○	○

※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組合せで使用する。

落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。

オモダカ・クログワイ防除有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3

DBH-1294-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●3											+15～+40(ノビエ 3Lまで)	1kg		●
東北	○3														○
北陸	○3														○
関東・東海	○3														○
近・中・四	○4											+15～+40(ノビエ 4Lまで)			○
九州	○3											+15～+40(ノビエ 3Lまで)			○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

DBH-1294-1kg 粒 (1.5kg/10a)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズカヤ ツグ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壌土 ～ 埴土
北海道	●4											+15～+40(ノビエ 4Lまで)	1.5kg		●
東北	○4														○
北陸															
関東・東海	○4											+15～+40(ノビエ 4Lまで)	1.5kg		○
近・中・四	○5											+15～+40(ノビエ 5Lまで)			○
九州	○4											+15～+40(ノビエ 4Lまで)			○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

DEH-112 乳(EW)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズカヤ ツグ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壌土 ～ 埴土
北海道	○6											+25～ノビエ6L	100ml (注)	○	○
東北	○6													○	○
北陸	○6											+25～ノビエ6L		○	○
関東・東海	○6										キシュウスズメヒエ	+25～ノビエ6L		○	○
近・中・四	○6										キシュウスズメヒエ アビダマ: 生育期(草 丈60cm以下)			○	○
九州	○6										キシュウスズメヒエ アビダマ: 生育期(草 丈60cm以下)			○	○

(注) 散布液量25～100L/10a。ただし、25～50L散布は少量散布用ノズルを使用。展着剤加用。

*: 再生茎3～6葉期(関東・東海～九州)、畦畔からの匍匐茎1m以内(関東・東海～九州)

畦畔からの侵入個体には全体にかかる(関東・東海～九州)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

DEH-112-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズカヤ ツグ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壌土 ～ 埴土
北海道	○5											+15～ノビエ5L	1～1.5kg/ノビ エ4Lを超える 場合(1.5kg)	○	○
東北	○5													○	○
北陸	○5													○	○
関東・東海	○5										キシュウスズメヒエ: 再生 茎2～4葉			○	○
近・中・四	○5										キシュウスズメヒエ: 再生茎2 ～4葉 アビダマ: 生育期 (草丈20cm以下)			○	○
九州	○5										キシュウスズメヒエ: 再生茎2～4 葉 アビダマ: 生育期(草 丈30cm以下)			○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

キシュウスズメヒエ防除は展開葉が水面に接する条件で使用する。(関東・東海～九州)

A-3

KUH-031 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズカヤ ツグ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壌土 ～ 埴土
北海道	○4	○	○4	○3		○4		○発生盛 期～矢尻 葉抽出期				+15～+35(ノビエ 4Lまで)	3kg	○	○
東北	○4	○	○4	○4	○3	○3		○発生盛 期～矢尻 葉抽出期						○	○
北陸	○4	○	○4		○3	○4		○発生盛 期～矢尻 葉抽出期						○	○
関東・東海	○4	○	○4		○4	○4		○発生盛 期～矢尻 葉抽出期						○	○
近・中・四	○4	○	○4		○4	○3		○発生盛 期～矢尻 葉抽出期						○	○
九州	○4	○	○4		○4	○4		○発生盛 期～矢尻 葉抽出期				+15～+35(ノビエ 4Lまで)		○	○

(注) オモダカ防除は、有効な前処理剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: ごく浅水で散布し、2日間は入水しない。

散布後に降雨等で湛水されると効果が低下することがある。

前処理剤との組み合わせで使用する。

オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-3

KUH-073-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壤土
北海道	●3.5	●	●3	●2		●2					●始	+20～+30(イネ5L以 降、ノビエ3.5Lまで)	1kg		●
東北	●3.5	●	●3	●2	●3	●2		●発生 期		●始		+20～+35(イネ5L以 降、ノビエ3.5Lまで)		●	●
北陸	●3.5	●	●3		●2	●2		●発生 期		●始		+20～+30(イネ6L以 降、ノビエ3.5Lまで)		●	●
関東・東海	●3.5	●	●3		●3	●3		●発生 期		●前					●
近・中・四	●3.5	●	●3		●3	●3				●前					●
九州 (早)	●3.5	●	●3	●2	●4	●4		●発生 期							●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

著しい高温条件では悪害を生じることがある。

散布後の低温および急激な気温の上昇により悪害を生じることがある。

A-3

KUH-983-0.25kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壤土
北海道	●4											+15～+35(ノビエ4L まで)	250g		●
東北	●4													●	●
北陸	●4													●	●
関東・東海	●4														●
近・中・四	●4														●
九州	●4														●

周縁部散布可能

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

湛水周縁部散布では藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な悪害や効果不足を生じることがある。

A-3

NC-612-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壤土
北海道	○3.5	○	○4	○3		○4		○生育期 (失良葉3L まで)H	○発生 期	○再生 前～始	○始	+15～+35(ノビエ 3.5Lまで)	1kg	○	○
東北	○3.5	○	○3	○3	○3	○2	○生育期 (葉丈30cm 以下)H	○生育期 (失良葉3L まで)H	○発生 期	○再生 前～始	○始	+15～+35(ノビエ 3.5Lまで)		○	○
北陸	○3.5	○	○3		○3	○3	○生育期 (葉丈30cm 以下)H	○生育期 (失良葉3L まで)H	○発生 期	○再生 前～始				○	○
関東・東海	○3.5	○	○3		○3	○3	○生育期 (葉丈30cm 以下)H	○生育期 (失良葉3L まで)H	○発生 期	○再生 前～始	○始			○	○
近・中・四	○3.5	○	○3		○3	○3	○生育期 (葉丈30cm 以下)H	○生育期 (失良葉3L まで)H	○発生 期	○再生 前～始	○始			○	○
九州	○3.5	○	○4		○4	○4	○生育期 (葉丈30cm 以下)H	○生育期 (失良葉3L まで)H	○発生 期	○再生 前～始	○始			○	○

※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年適用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネ4L未満では、悪害を生じることがある(関・東)

前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

SB-551-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壤土
北海道															
東北															
北陸	○3	○	○3		○2	○2						+20～+30(イネ5L以 降、ノビエ3Lまで)	1kg	○	○
関東・東海	○3	○	○3		○2	○2		○発生 期						○	○
近・中・四	○3	○	○3		○2	○2		○発生 期						○	○
九州	○3	○	○3		○2			○発生 期						○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の低温および急激な気温の上昇により悪害を生じることがある。

前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

SL-0401 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道															
東北	●4	●マツハ イ	●4			●3			●生育 期			+14～+35(ノビエ 4Lまで)	50g×10	●	●
北陸	●4		●3			●2			●生育 期						●
関東・東海															
近・中・四															
九州	●3		●4	●2		●4			●生育 期			+14～+35(ノビエ 3Lまで)	50g×10		●
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。															

A-3

SL-0401 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道															
東北	●4	●マツハ イ	●4	●3		●3			●生育 期			+14～+35(ノビエ 4Lまで)	22g(散布液 量500ml)	●	●
北陸	●4		●3			●2			●生育 期						●
関東・東海															
近・中・四															
九州															
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。															

A-3

SL-0401-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○4		○4	○3		○4			○生育 期			+20～+35 (ノビエ4Lまで)	1kg	○	○
東北	○4		○4			○3	●草丈 10cm※		○生育 期			+14～+35(ノビエ 4Lまで)		○	○
北陸	○4		○4			○3			○生育 期					○	○
関東・東海	○4		○4			○3			○生育 期		コウキヤガラ・草丈10cm	+7～+35(ノビエ4L まで)		○	○
近・中・四	○4		○4			○4	●草丈 10cm		○生育 期					○	○
九州	○4		○4			○3			○生育 期		コウキヤガラ・草丈10cm	+7～+35(ノビエ4L まで)		○	○
※: クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。 クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。															

A-3

SL-0401-1kg(1.5kg/10a処理) 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○5		○4	○4		○4			○生育 期			+30～+40 (ノビエ5Lまで)	1.5kg	○	○
東北	○5		○花茎 抽出始			○4	●草丈 15cm※		○生育 期					●	○
北陸	○5		○4			○4			○生育 期			+14～+40(ノビエ 5Lまで)		●	○
関東・東海	○5		○5			○4	●草丈 15cm※		○生育 期		コウキヤガラ・草丈15cm			○	○
近・中・四	○5		○5			○4	●草丈 15cm		○生育 期			+14～+40(ノビエ5Lま で・砂壌土は+30cm)		○	○
九州	○5		○5			○4			○生育 期		コウキヤガラ・草丈15cm	+14～+40(ノビエ 5Lまで)		○	○
※: クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。 クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。															

A-3

SL-0601-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスギヤ ツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北	●4	●	●4			●3	●草丈 10cm※	●生育 期	●再生 前～始			+14～+35(ノビエ 4Lまで)	1kg		●
北陸	●4	●	●3			●3		●発生 期	●再生 前～始					●	●
関東・東海	●3	●	●4			●3	●草丈 10cm※	●生育 期	●再生 前～始		コナキヤガラ・発生始	+14～+35(ノビエ 3Lまで)			●
近・中・四	●4	●	●4			●3	●草丈 10cm	●生育 期				+14～+35(ノビエ 4Lまで)			●
九州															

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

SL-0604-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスギヤ ツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●4	●	●4	●4		●3		●発生 期		●始		+14～+35(イネ5L以 降、ノビエ4Lまで)	1kg		●
東北	●4	●	●4	●3	●3	●3	●草丈 10cm※	●矢じり 葉抽出前 ※	●生育 期			+14～+35(イネ4L以 降、ノビエ4Lまで)			●
北陸	●4	●	●4		●3	●3	●草丈 10cm	●矢じり 葉抽出前 ※	●発生 期	●始				●	●
関東・東海	●4	●	●4		●4	●3	●草丈 10cm※	●矢じり 葉抽出前 ※	●発生 期	●始	コナキヤガラ・発生始				●
近・中・四	●4	●	●4		●3	●3	●草丈 10cm	●矢じり 葉抽出前 ※	●生育 期	●始					●
九州 (早)	●3	●	●4		●4	●4		●発生 期			コナキヤガラ・発生始	+14～+35(イネ4L以 降、ノビエ3Lまで)			●

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

著しい高温条件では薬害を生じることがある。

オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

SL-0611 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスギヤ ツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北	●5		●4	●3		●4	●生育期 (草丈20cm 以下)※	●生育 期			コナキヤガラ・生育期 (草丈20cm以下)	+14～+40(イネ4L以 降、ノビエ5Lまで)	30g(散布 液量100L)		●
北陸															
関東・東海	●4		●5			●5	●生育期 (草丈20cm 以下)※	●生育 期			コナキヤガラ・生育期 (草丈20cm以下)	+14～+40(イネ4L以 降、ノビエ4Lまで)	30g(散布 液量100L)		●
近・中・四															
九州															

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。

クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

SL-0613 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスギヤ ツ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北	●5	●	●花葉 抽出始	●3	●5	●4	●生育期 (草丈30cm 以下)※	●※	●生育 期	●生育 期	コナキヤガラ・生育期 (草丈30cm以下)	+14～+40(イネ4L以 降、ノビエ5Lまで)	1000g(散布 液量100L)		●
北陸															
関東・東海	●5	●	●5		●5	●4	●生育期 (草丈30cm 以下)※	●※	●生育 期	●生育 期	コナキヤガラ・生育期 (草丈30cm以下)	+14～+40(イネ4L以 降、ノビエ5Lまで)	1000g(散布 液量100L)		●
近・中・四	●5	●	●5		●5	●5	●生育期 (草丈30cm 以下)※	●※	●生育 期	●生育 期					●
九州															

※:発生盛期～矢じり葉抽出期(草丈30cm以下)

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。

降雨などにより散布後2日間以上落水もしくは浅水状態が維持されない、効果が低下することがある。

オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

SW-051-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤 土 ～ 植 土
北海道															
東北	○3.5	○	○3		○3	○3	●草丈 20cm※	●広葉形 葉4L※	○発生 期	○再生 前～始		+20～+30(ノビエ 3.5Lまで)	1kg	●	○
北陸	○3.5	○	○3		○3	○3		●広葉形 葉4L	○発生 期	○再生 前～始					○
関東・東海	○3.5	○	○3		○4	○3	●草丈 20cm※	●広葉形 葉4L※	○発生 期	○再生 前～始				●	○
近・中・四 (※)	○3.5	○	○3		3 ○2	○3			○発生 期	○再生 前～始				●	○
九州	○3.5	○	○3		○4	○4			○発生 期	○再生 前～始				●	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

クログワイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。(東北)

クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。(関・東)

A-3

SW-063-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤 土 ～ 植 土
北海道	●5	●	●3	●4		●4			●発生 期			+25～+40(イネ4L以 降、ノビエ5Lまで)	1kg		●
東北	●5	●	●花茎 抽出始	●4	●5	●2			●発生 期			+25～+40(ノビエ 5Lまで)		●	●
北陸	●5	●	●5		●4	●3			●生育 期	●生育 期				●	●
関東・東海	●4	●	●5		●4	●4			●生育 期	●生育 期		+25～+40(ノビエ 4Lまで)			●
近・中・四	●4	●	●4		●3	●4			●生育 期						●
九州	●5	●	●5		●5	●6			●生育 期			+25～+40(ノビエ 5Lまで)			●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 特殊雑草対象(アゼガヤ)

A-4 アゼガヤ

DEH-112 乳(EW)

地域名	対象雑草: アゼガヤ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			100m(散布水量100L)
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四	●	生育期(草丈60cm以下)	
九州	○	生育期(草丈60cm以下)	

使用上の注意:

A-4 特殊雑草対象(イボクサ)

A-4 イボクサ

BAG-032 ジャンボ

地域名	対象雑草: イボクサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			20g×10コ
東北	●	再生始	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 特殊雑草対象(エゾノサヤヌカグサ)

A-4 エゾノサヤヌカグサ

DKH-311-1kg 粒

地域名	対象雑草: エゾノサヤヌカグサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 エゾノサヤヌカグサ
KPP-444-1kg 粒

地域名	対象雑草: エゾノサヤヌカグサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 エゾノサヤヌカグサ
NH-051(H) フロアブル

地域名	対象雑草: エゾノサヤヌカグサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	500ml
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 エゾノサヤヌカグサ
NH-051(H)-1kg 粒

地域名	対象雑草: エゾノサヤヌカグサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 エゾノサヤヌカグサ
NH-403 フロアブル

地域名	対象雑草: エゾノサヤヌカグサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	500ml
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 エゾノサヤヌカグサ
SW-032 フロアブル

地域名	対象雑草: エゾノサヤヌカグサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	500ml
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 特殊雑草対象(オモダカ)

A-4 オモダカ
BCH-031-1kg 粒

地域名	対象雑草： オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸				
関東・東海	○	始	※	
近・中・四				
九州				
※：オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意： オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ
BCH-032-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ
BCH-033-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州	○	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
BCH-044-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州	○	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
BCH-045L-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	○	始		
関東・東海				
近・中・四				
九州				

使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
CGM-71 フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始		500ml
東北	○	始		
北陸	●	始		
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始		
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
DKH-311-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始		1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
HOK-222 フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始		500ml
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
HOK-222-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始		1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
KPP-445① フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸	●	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	○	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
KUH-013D-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	○	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
KUH-021-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始	※	1kg
東北	○	始	※	
北陸	○	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	○	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
KUH-041-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始	※	1kg
東北	●	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
MY-100DC(L) フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸	●	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	○	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
MY-100DC(L)-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	○	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
NC-606-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始	※	1kg
東北	●	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
NC-607-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始	※	1kg
東北	●	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
NH-051(H)フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始		500ml
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
NH-051(H)-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始		1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
NH-403 フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始		500ml
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
NHF-401 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道		始	※	3kg
東北	○	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
NOJ-101-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	○	前	※	1kg
東北	○	前	※	
北陸				
関東・東海	○	始	※	
近・中・四				
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
SB-563(D)-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	始		
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
SL-0602-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	矢じり葉抽出前	※	
北陸	●	矢じり葉抽出前		
関東・東海	●	矢じり葉抽出前	※	
近・中・四	●	矢じり葉抽出前		
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
SL-0604-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	矢じり葉抽出前	※	
北陸	●	矢じり葉抽出前		
関東・東海	●	矢じり葉抽出前	※	
近・中・四	●	矢じり葉抽出前		
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
SL-0613 顆粒水和

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1000g(散布液量100L)
東北	●	発生盛期～矢じり葉抽出期(草丈30cm以下)	※	
北陸				
関東・東海	●	発生盛期～矢じり葉抽出期(草丈30cm以下)	※	
近・中・四	●	発生盛期～矢じり葉抽出期(草丈30cm以下)		
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
SL-496(L) 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				3kg
東北	●	始		
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

SST-404 フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始	※	500ml
東北	●	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

SST-404-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始	※	1kg
東北	●	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

SW-005(L) フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸	○	始		
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
YH-224 フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始	※	500ml
東北	●	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ
YH-650 フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸	○	前		
関東・東海	○	前	※	
近・中・四	●	前		
九州	●	前	※	
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ
YH-650-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	前		
関東・東海	●	前	※	
近・中・四	●	前		
九州	●	前	※	
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。				
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ
YH-651 フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸	●	前		
関東・東海	●	前	※	
近・中・西	●	前		
九州	●	前	※	
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ
YH-651-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	前		
関東・東海	●	前	※	
近・中・四	●	前		
九州	●	前	※	
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 特殊雑草対象(クログワイ)

A-4 クログワイ
BCH-031-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州	○	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
BCH-032-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

BCH-033-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

BCH-044-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州	○	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

BCH-045L-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	○	始		
関東・東海				
近・中・四				
九州				

使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

DKH-311-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

G-315B 乳

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	●	前	※	
北陸	●	前	※	
関東・東海	●	前	※	
近・中・四	○	前	※	
九州	●	前	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

HOK-0301 フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

KUH-013D-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	○	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

KUH-021-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	始	※	
北陸	○	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	○	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

KUH-041-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

MAT-159 ジャンボ

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				50g×10コ
東北	●	前	※	
北陸	●	前	※	
関東・東海	○	前	※	
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

NC-604 プロアプル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	○	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

NC-606-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	●	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

NC-607-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

NH-051(H) プロアプル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

NH-051(H)-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

NH-403 フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

NOJ-101-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	前	※	
北陸				
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	前	※	
九州	●	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

NOJ-104-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸				
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	●	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

SB-563□-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	始		
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

SB-554 シェンボ

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				50g×10回
東北	○	前	※	
北陸				
関東・東海	○	前	※	
近・中・四	○	前		
九州	●	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

SB-564 フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	○	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四	○	始		
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
SB-564-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四	○	始		
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
SL-0401-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	草丈10cm	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四	●	草丈10cm		
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
SL-0401-1kg(1.5kg/10a処理) 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1.5kg
東北	●	草丈15cm	※	
北陸				
関東・東海	●	草丈15cm	※	
近・中・四	●	草丈15cm		
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
SL-0601-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	草丈10cm	※	
北陸				
関東・東海	●	草丈10cm	※	
近・中・四	●	草丈10cm		
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
SL-0602-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	草丈10cm	※	
北陸				
関東・東海	●	草丈10cm	※	
近・中・四	●	草丈10cm		
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
SL-0604-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	草丈10cm	※	
北陸	●	草丈10cm		
関東・東海	●	草丈10cm	※	
近・中・四	●	草丈10cm		
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
SL-0611 顆粒水和

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				30g(散布液量100L)
東北	●	生育期(草丈20cm以下)	※	
北陸				
関東・東海	●	生育期(草丈20cm以下)	※	
近・中・四	●	生育期(草丈20cm以下)		
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
SL-0613 顆粒水和

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1000g(散布液量100L)
東北	●	生育期(草丈30cm以下)	※	
北陸				
関東・東海	●	生育期(草丈30cm以下)	※	
近・中・四	●	生育期(草丈30cm以下)		
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
SST-402-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	始	※	
北陸				
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	●	始		
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
SST-403 フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始		
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
SST-403-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始		
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
SST-404 フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	●	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
SST-404-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
SW-005 〇 フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸	○	始		
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
SW-032 フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
SW-042① シンボ

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				35g×10㎡
東北				
北陸	●	始		
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
SW-051-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	草丈20cm	※	
北陸				
関東・東海	●	草丈20cm	※	
近・中・四				
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する(東北)。 クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する(関東・東)。				

A-4 クログワイ
SYJ-108 シンボ

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				30g×10㎡
東北	○	始	※	
北陸				
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	●	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
SYJ-150 フロアブル

地域名	対象雑草： クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	●	始	※	
北陸	●	始	※	350ml
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意： クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
SYJ-156-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
TH-224 フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	●	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 特殊雑草対象(コウキヤガラ)

A-4 コウキヤガラ

KPP-2005 シャンボ

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			50g×10㎡
東北			
北陸			
関東・東海	●	前	
近・中・四			
九州			

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

KPP-2005(H) フロアブル(少量散布)

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			300ml
東北			
北陸			
関東・東海	●	前	
近・中・四			
九州			

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

KPP-2008 乳(EW)

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北	●	前	
北陸			
関東・東海	●	前	
近・中・四			
九州	●	前	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

KPP-2008-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	●	前	
北陸			
関東・東海	●	前	
近・中・四			
九州	●	前	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

KPP-444(D)-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州	●	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

KPP-444-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	●	始	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

KUH-013D-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州			

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ
KUH-021-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	○	始	
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州	○	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ
KUH-041-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	●	始	
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州	●	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ
NC-612-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	○	草丈30cm	
北陸			
関東・東海	●	草丈30cm	
近・中・四			
九州	○	草丈30cm	

使用上の注意:

A-4 コウキヤガラ
SB-554 シヤンボ

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			50g×10コ
東北	●	前	
北陸			
関東・東海	●	前	
近・中・四			
九州	●	前	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ
SB-554 フロアブル

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北	●	前	
北陸			
関東・東海	●	前	
近・中・四			
九州	●	前	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ
SL-0401-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	草丈10cm	
近・中・四			
九州	●	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ
SL-0401-1kg(1.5kg/10a処理) 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1.5kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	草丈15cm	
近・中・四			
九州	●	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ
SL-0601-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州	●	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ
SL-0602-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	●	始	
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州	●	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ
SL-0604-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州	●	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ
SL-0611 顆粒水和

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			30g(散布液量100L)
東北	●	生育期(草丈20cm以下)	
北陸			
関東・東海	●	生育期(草丈20cm以下)	
近・中・四			
九州	●	生育期(草丈20cm以下)	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ
SL-0613 顆粒水和

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1000g(散布液量100L)
東北	●	生育期(草丈30cm以下)	
北陸			
関東・東海	●	生育期(草丈30cm以下)	
近・中・四			
九州	●	生育期(草丈30cm以下)	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ
SST-404 フロアブル

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州			

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ
SST-404-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州			

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

TH-122-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州			

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

TH-224 フロアブル

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州			

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

TH-421 ジャンボ

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			40g×10コ
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州			

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

YH-651 フロアブル

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州			

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

YH-651-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州			

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 特殊雑草対象(シズイ)

A-4 シズイ

DKH-311-1kg 粒

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	●	草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意: シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 シズイ

HOK-222 フロアブル

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北	●	草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意: シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 シズイ

NH-051(H) フロアブル

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●		500ml
東北		草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意: シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 シズイ

NH-403 フロアブル

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●		500ml
東北		草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意: シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 シズイ

SW-005 フロアブル

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●		500ml
東北		草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意: シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 シズイ

SW-041⑩ -1kg 粒

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●		1kg
東北		草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意: シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 シズイ

SYJ-150 フロアブル

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●		500ml
東北		草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意: シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 シズイ

TH-224 フロアブル

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●		500ml
東北		草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意: シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 特殊雑草対象(ミズアオイ)

A-4 ミズアオイ

DKH-311-1kg 粒

地域名	対象雑草: ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	始	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 ミズアオイ
KPP-445 フロアブル

地域名	対象雑草: ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	1L	500ml
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 ミズアオイ
NC-385SB 顆粒水和

地域名	対象雑草: ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	80g(500ml)
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 ミズアオイ
NC-385SB-1kg 粒

地域名	対象雑草: ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 ミズアオイ
SST-404-1kg 粒

地域名	対象雑草: ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 特殊雑草対象(SU抵抗性コナギ)

A-4 SU抵抗性コナギ
SST-404-1kg 粒

地域名	対象雑草: SU抵抗性コナギ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	2L	
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 特殊雑草対象(SU抵抗性ホタルイ)

A-4 SU抵抗性ホタルイ
BCH-044-1kg 粒

地域名	対象雑草: SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 SU抵抗性ホタルイ
DKH-311-1kg 粒

地域名	対象雑草: SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	1kg
東北	●	2L	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 SU抵抗性ホタルイ
NC-385SB-1kg 粒

地域名	対象雑草: SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	○	2L	1kg
東北	●	2L	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 SU抵抗性ホタルイ
SST-404-1kg 粒

地域名	対象雑草: SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	1kg
東北	●	2L	
北陸			
関東・東海	●	2L	
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

B 直播栽培

B

BCH-044-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壇土
全域	●2.5	●	●2		●2	●始						イネ1L～ノビエ 2.5L	1kg		●

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 出芽時に湛水条件になると薬害を生じる。

B

BCH-045L-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壇土
北陸～九州	●2.5	●	●2		●2							イネ1L～ノビエ 2.5L	1kg		●

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

DASH-001 SC

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壇土
全域	●5	●	●4	●4	●4	●4			●生育 期	●生育 期		イネ6L以降、ノビ エ5Lまで	100ml(散 布液量 100L)		●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する

落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。

B

DKH-311-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壇土
北海道～東北	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期	●再生 前～始		イネ1L～ノビエ 2.5L	1kg		●

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

HOK-221 シェンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツ	ウリカ	クログワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北陸～九州	○2.5	○	○2		○2	○2				●再生 前～始		イネ1L～ノビエ 2.5L	50g×10コ	●	○

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、薬害や効果不足が生じることがある。

B

HOK-222 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツ	ウリカ	クログワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道～東北	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始		イネ1L～ノビエ 2.5L	500ml		●

湛水直播 湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

HOK-223-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツ	ウリカ	クログワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北陸～九州	●2.5	●	●2		●2	●2						イネ1L～ノビエ 2.5L	1kg		●

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

HOK-225-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツ	ウリカ	クログワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北陸～九州	○3	○	○2		○2	●2						イネ1L～ノビエ3L	1kg		○

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

KUH-013D シェンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツ	ウリカ	クログワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北陸～九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始		イネ1L～ノビエ 2.5L	25g×10コ	●	○

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、薬害や効果不足が生じることがある。

B

KUH-031 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツ	ウリカ	クログワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
全域	●4	●	●4									イネ3L以降、ノビ エ4Lまで	3kg		●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する

ごく浅水で散布し、2日間以上入水しない。

散布後に降雨等で湛水されると効果が低下することがある。

B

KUH-911 液(入水前)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
東北～近・中・四	○5	○											ノビエ3L～ノビエ 5L(入水前)	100～ 200ml(散 布液量 100L)		○

乾田直播
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 処理後黄化症状がみられる場合がある。

B

KUH-911 液(入水後)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
東北～近・中・四												イボクサ: 30cm クサネム: 40cm	イネ4L以降(入水 後)	50～ 100ml(散 布液量 100L)		○

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。
前処理剤との組み合わせで使用する。
処理後黄化症状がみられる場合がある。

B

NBA-941S-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
全域 (北海道を除く)	○3	○	○2	○2	○2	●始				○再生 前～始			イネ1L～ノビエ3L	1kg	●	○

湛水条件で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

NC-331 水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
関東・東海～九 州		○	○前		○前	○前			○発生 期	○再生 前～始			入水前10～2日(イ ネ2L以降、雑草草 丈30cm以下)	90～ 180g(散 布液量 100L)		○

乾田直播
乾田条件で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

B

NC-385SB-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
東北～九州	●2.5	●	●2		●始	●始				●再生 前～始			イネ1L～ノビエ 2.5L	1kg		●

湛水条件で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

NH-104-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北陸～九州	○2.5	○	○2		○2	○2							イネ1L～ノビエ 2.5L	1kg		○

湛水条件で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

PSS(L)D-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
全域 (九州を除く)	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期			イネ1.5L～ノビエ 2L(砂壌土はイネ 2L～)	1kg	○	○

湛水直接

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

前処理剤との組み合わせで使用する。

B

SB-528 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
東北～九州	○前	○	○前		○前							代かき後～4	300ml	○	○

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 出芽時に湛水条件になると薬害を生じる。

B

SB-563○-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北陸～九州	●2.5	●	●2		●2	●2						イネ1L～ノビエ 2.5L	1kg	●	●

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

SL-0401-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
全域	●3		●3			●2						イネ3L以降、ノビ エ3Lまで	1kg		●

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する

B

SL-0401-1kg(1.5kg/10a処理) 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道～近・中・ 四	●4		●4			●3						イネ3L以降、ノビ エ4Lまで	1.5kg		●

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する

B

SST-402-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
全域	○2.5	○	○2		○2	○2				○再生 前～始		イネ1L～ノビエ 2.5L	1kg	●	○

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

SW-005① フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北陸～九州	●2.5	●	●2		●2	●始						イネ1L～ノビエ 2.5L	500ml		●

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

SW-032 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道～東北	●2.5	●	●2		●2							イネ1L～ノビエ 2.5L	500ml		●

湛水直接

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

SW-041⑩ -1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道～東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始						イネ1L～ノビエ 2.5L	1kg		●

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

SW-042① ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
関東・東海～九州	●2.5	●	●2		●2	●始						イネ1L～ノビエ 2.5L	35g×10㌢		●

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、薬害や効果不足が生じることがある。

B

SW-991-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
全域	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期			イネ1L～ノビエ 2.5L	1kg		○

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

TH-001 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
全域	○2.5	○	○2		○2	○2			●発生 期	○再生 前～始		イネ1L～ノビエ 2.5L	40g×10㌢		○

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、薬害や効果不足が生じることがある。

B

TH-001 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハエ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
全域	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始			イネ1L～ノビエ 2.5L	500ml	●	○

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では葉害を生じる。

B

TH-001-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハエ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
全域	○2.5	○	○2	○始	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始			イネ1L～ノビエ 2.5L	1kg	●	○

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では葉害を生じる。

B

TH-122-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハエ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
全域	●2.5	●	●2		●2	●2							イネ1L～ノビエ 2.5L	1kg		●

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では葉害を生じる。

B

TH-224 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハエ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道～近・中・ 四	●2.5	●	●2	●2	●2	●始				●再生 前～始			イネ1L～ノビエ 2.5L	500ml		●

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では葉害を生じる。

B

TH-421 ジェンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハエ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道～近・中・ 四	●2.5	●	●2		●2	●始				●再生 前～始			イネ1L～ノビエ 2.5L	40g×10コ		●

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では葉害を生じる。

5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、葉害や効果不足が生じることがある。

C 畦畔雑草

C

NC-622 液

地域名	対象雑草	処理時期	使用量(散布液量) /10a	適用土壌
全域	①雑草全般 ②スギナ ③アシカキ、キシュウズメノヒエ、ハイコヌカグサ等多年生イネ科雑草、セリ	①雑草生育期(草丈30cm以下) ②スギナ生育期(草丈30cm以下) ③雑草生育期(草丈30cm以下)	①200～500ml(散布液量25～100L, 25～50Lは専用ノズルを使用) ②1500～2000ml(散布液量25～100L, 25～50Lは専用ノズルを使用) ③500～1000ml(散布液量25～100L, 25～50Lは専用ノズルを使用)	全土壌
使用上の注意: 水田内に流入または飛散すると薬害を生じる。				

C

ZK-122 液

地域名	対象雑草	処理時期	使用量(散布液量) /10a	適用土壌
全域	①全草種 ②スギナ	①雑草生育期(草丈30cm以下) ②スギナ生育期(草丈30cm以下)	①一年生雑草:250～500ml、多年生雑草:500～1000ml(散布液量50～100L, 50Lは専用ノズルを使用) ②スギナ:1500～2000ml(散布液量50～100L, 50Lは専用ノズルを使用)	全土壌
使用上の注意: のり面には使用しない。 水田内に流入または飛散すると薬害を生じる。				

D 耕起前

D

ZK-122 液

地域名	対象雑草	処理時期	使用量(散布液量) /10a	適用土壌
全域	一年生雑草全般	耕起前(草丈30cm以下)	250～500ml (散布液量25～100L, 25～50Lは専用ノズルを使用)	全土壌
使用上の注意:				

E 休耕田

E

NC-622 液

地域名	対象雑草	処理時期	使用量(散布液量) /10a	適用土壌
全域	①雑草全般 ②スギナ	①雑草生育期(草丈1m以下) ②スギナ生育期(草丈30cm以下)	一年生雑草:200～500ml 多年生雑草:500～1000ml スギナ:1500～2000ml (散布液量25～100L, 25～50Lは専用ノズルを使用)	全土壌
使用上の注意:				

E

ZK-122 液

地域名	対象雑草	処理時期	使用量(散布液量) /10a	適用土壌
全域	雑草全般(スギナを除く)	雑草生育期(草丈50cm以下)	一年生雑草:250～500ml 多年生雑草:500～1000ml (散布液量50～100L, 50Lは専用ノズルを使用)	全土壌
使用上の注意:				

使用基準の更新

以下の剤について、使用基準を策定した。

1. 過去の使用基準を元に現行の様式による使用基準を策定。
2. 過去の使用基準に特殊雑草対象の本年度判定結果を加え、使用基準を策定。

A-1

BAG-032 ジェンボ

地域名	地域判定	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壊土 ～ 壊土
北海道		○2	○	○始	○始		○始		○前※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2L	20g×10コ	○	○
東北		○2	○	○2	○始	○始	○始	○前※	○前※	○発生 期	○再生 前～始	○前	イネ等：始 SU抵抗性オモダカ2L		○	○
北陸		○2	○	○2		○始	○始	○前※	○前※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海		○2	○	○2		○2	○始	○前※	○前※	○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性オモダカ2L SU抵抗性オモダカ2L		○	○
近・中・四		○2	○	○2		○2	○2	○前※	○前※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州		○2	○	○2		○2	○2	○前※	○前※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

※：オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深：2cm/日以下
使用上の注意：5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

KPP-444 1kg 粒

地域名	地域判定	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壊土 ～ 壊土
北海道														1kg		
東北																
北陸		○1.5	○	○始		○始	○始	○始	○始※				+0～ノビエ1.5L	1kg	○	○
関東・東海		○1.5	○	○始		○始	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コキヤガラ：発生始 SU抵抗性コキヤガラ SU抵抗性オモダカ1L		○	○
近・中・四		○1.5	○	○始		○始	○始	○始	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州		○1.5	○	○始		○始	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コキヤガラ：発生始		○	○

田植同時散布可能
※：オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深：2cm/日以下
使用上の注意：散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。
コキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1

KUH-021 1kg 粒

地域名	地域判定	ノビエ	一年生 広葉・マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壊土 ～ 壊土	
北海道		○3	○	○2	○2		○2		●始※	○発生期	○再生前～始	○前	ミズアズミ2L	+3～ノビエ3L(砂壤土は+7～)	1kg	○	○
東北		○3	○	○3	○始	○2	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前～始	○前	コキヤガラ始 シズイ:草丈3cm			○	○
北陸		○3	○	○3		○3	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前～始					○	○
関東・東海		○3	○	○3		○3	○2	●始※	●始※	○発生期	○再生前～始	○前	コキヤガラ：始 SU抵抗性コキヤガラ2L			○	○
近・中・四		○3	○	○3		○3	○2	●始※	●始※	○発生期	○再生前～始	○前				○	○
九州		○3	○	○3		○3	○3	○始※	○始※	○発生期	○再生前～始	○前	コキヤガラ：始			○	○

※：オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深：2cm/日以下

使用上の注意：

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

MY-100DC(L) フロアブル

地域名	地域判定	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土 ～ 植土
北海道														500ml	
東北															
北陸		○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)		○ ○
関東・東海		○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	SL添付性スクリュー		○ ○
近・中・西		○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○ ○
九州		○2.5	○	○2	○前	○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コウキヤガラ、発生始		○ ○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

田植同時散布可能(北陸、関東・東海、近畿・中国・四国)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

MY-100DC(L)-1kg 粒

地域名	地域判定	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土 ～ 植土
北海道														1kg	
東北															
北陸		○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	●始※		○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)		○ ○
関東・東海		○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○ ○
近・中・西		○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○ ○
九州		○2.5	○	○2	○前	○2	○2	○始※	○始※	○再生 前～始	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		○ ○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

田植同時散布可能(北陸、関東・東海、近畿・中国・四国)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

NC-604 フロアブル

地域名	地域判定	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土 ～ 植土			
北海道		○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	SU添付性スクリュー2L	+5～ノビエ2.5L	500ml	○	○	
東北		○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前	ノビエ草丈3cm				○	○
北陸		○2.5	○	○2		○2	○2	●始		○発生 期							○	○
関東・東海		○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前					○	○
近・中・西		○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前					○	○
九州		○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前					○	○

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

シズメ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

NC-606-1kg 粒

地域名	地域判定	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土 ～ 植土
北海道		○2.5	○	○2	○2		○2		●始※	○発生 期	○再生 前～始	○始	+5～ノビエ2.5L	1kg	○ ○
東北		○2.5	○	○2	○始	○始	○始		●始※	○発生 期	○再生 前～始	○始			○ ○
北陸		○2.5	○	○2		○2	○始		●始※	○発生 期	○再生 前～始	○始			○ ○
関東・東海		○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○始			○ ○
近・中・西		○2.5	○	○2		○2	○2	○始	●始※		○再生 前～始	○始			○ ○
九州		○2.5	○	○2		○2	○2		●始※	○発生 期	○再生 前～始	○始			○ ○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

NH-403 フロアブル

地域名	地域判定	ノビエ	一年生・広葉・マツハイ	ホタルイ	ヘラオモダカ	ミズガヤツリ	ウツカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・表層剥離	処理時期	使用量/10a	砂壌土	壤土～埴土	
北海道		○2.5	○	○2	○2		○2		●始	○発生期	○再生前～始	○前	※ノビエ3L(砂壌土は+5～)	+5～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北		○2.5	○	○2		○2	○始	●始※	●始※	○発生期	○再生前～始	○前				○	○
北陸																	
関東・東海																	
近・中・四																	
九州																	

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

NOJ-101-1kg 粒

地域名	地域判定	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道		○3	○	○2	○2		○2		○前※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ3L(砂壌土は+5～)	1kg	○	○
東北		○3	○	○2	○2	○2	○2	○前※	○前※	○発生 期	○再生 前～始	○前	※ノビエ3cm		○	○
北陸		○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海		○3	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ3L		○	○
近・中・四		○3	○	○2		○2	○2	○前※		○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ3L(砂壌土は+5～)		○	○
九州		○3	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

田植同時散布可能
 ※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。
 シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

NOJ-104-1kg 粒

地域名	地域判定	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道														1kg		
東北																
北陸		○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ3L	1kg	○	○
関東・東海		○3	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四		○3	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ3L(砂壌土は+5～)		○	○
九州		○3	○	○2	○2	○2	○2	●始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

田植同時散布可能
 ※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用。
 クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1

SB-554 シャンボ

地域名	地域判定	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道		○1.5	○	○始	○始					○発生 期			+0～ノビエ1.5L	50g×100	○	○
東北		○1.5	○	○始		○始				○発生 期		※ノビエ3cm			○	○
北陸		○1.5	○	○始		○始				○発生 期					○	○
関東・東海		○1.5	○	○始		○始		○前※		○発生 期					○	○
近・中・四		○1.5	○	○始		○始	○前			○発生 期					○	○
九州		○1.5	○	○始	○前	○前	○前	●始※		○発生 期					○	○

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な障害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 クログワイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用。
 シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

SB-554 フロアブル

地域名	地域判定	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道		○1.5	○	○始	○始					○発生 期		SL阻性性+9% イ1.5L	+0～ノビエ1.5L	500ml	○	○
東北		○1.5	○	○始		○始		○前※		○発生 期		20%以上発生前 ノビエ草丈3cm			○	○
北陸		○1.5	○	○始		○始		○前		○発生 期					○	○
関東・東海		○1.5	○	○始		○始		○前※		○発生 期		20%以上発生前 イノダチ発生始 SL阻性性+9%1.5L			○	○
近・中・四		○1.5	○	○始		○始	○前			○発生 期					○	○
九州		○1.5	○	○始	○前	○始	○前			○発生 期		20%以上発生前			○	○

田植同時散布可能
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。
ミズガヤツリ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1

SL-496① 粒

地域名	地域判定	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道		○1.5	○	○始	○始		○始			○発生 期				3～4kg		○
東北		○2	○	○2	○2	○始	○2		●始	○発生 期						○
北陸		○2	○	○2	○2	○始	○2			○発生 期					○	○
関東・東海 ####		○2	○	○2	○2	○始	○2			○発生 期				3～4kg(+0～ +2は3kg)	○	○
近・中・四		○2	○	○2		○始	○2			○発生 期					○*	○
九州 ####		○2	○	○2		○2	○2			○発生 期					○	○

*: 早期のみ
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 砂壌土では著しい高温条件で葉害(白化)を生じることがある。
泥炭質土壌では効果が低下することがある。
オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1

SL-970 フロアブル

地域名	地域判定	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道		○1.5	○	○2	○2		○2			○発生 期			+0～ノビエ1.5L		○	○
東北		○2	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期					○	○
北陸		○2	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期					○	○
関東・東海		○2	○	○2		○2	○2			○発生 期					○	○
近・中・四		○2	○	○2		○2	○2			○発生 期					○*	○
九州		○2	○	○2		○2	○2			○発生 期						○

*: 普通期のみ 水口処理可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

SST-403 フロアブル

地域名	地域判定	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道		○1.5	○	○始	○始		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ1.5L	500ml	○	○
東北		○1.5	○	○始	○前	○始	○始	●始※		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸		○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海		○1.5	○	○始		○始	○始	●始※		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四		○1.5	○	○始		○始	○始	●始		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州		○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

田植同時散布可能
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1

SST-403-1kg 粒

地域名	地域判定	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘリオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ワカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道		○1.5	○	○始	○始		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ1.5L	1kg	○	○
東北		○1.5	○	○始	○始	○始	●始※			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸		○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海		○1.5	○	○始		○始	●始※			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四		○1.5	○	○始		○始	●始			○発生 期	○再生 前～始				○	○
九州		○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

田植同時散布可能
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-2

G-315B 乳

地域名	地域判定	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘリオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ワカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道														250～ 350ml		
東北		○前	○	○前	○前	○前		●前※					植代時(-4まで)		○	○
北陸		○前	○	○前	○前	○前		●前※							○	○
関東・東海		○前	○	○前		○前		●前※							○	○
近・中・四		○前	○	○前		○前		○前※								○
九州 (昔)		○前	○	○前		○前		●前※								○

土壌混和処理
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-2

KPP-2005 ジャンボ

地域名	地域判定	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘリオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ワカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道		○1	○	○始	○始								+0～+5(ノビエ1L)	50g×10コ	○	○
東北		○1	○	○始	○始	○前		○前※					植代後～-4,+1～ +5(ノビエ1L)		○	○
北陸		○1	○	○前		○前		○前※					植代後～-4,+0～ +5(ノビエ1L)		○	○
関東・東海		○1	○	○始		○始		○前※				コウキヤガラ発生前			○	○
近・中・四		○1	○	○始		○前		○前※							○	○
九州		○1	○	○始		○前		○前※					植代後～-4,+1～ +5(ノビエ1L)		○	○

体系処理の前処理として50g×10コ/10a処理が可能
※:クログワイ防除は、クログワイに有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-2

KPP-2005(H) フロアブル(少量散布)

地域名	地域判定	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘリオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ワカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道		○1	○	○始									+0～+5(ノビエ1L)	300ml	○	○
東北		○1	○	○始		○前		○前※					植代後～-4,+0～ +5(ノビエ1L)		○	○
北陸		○1	○	○始		○始									○	○
関東・東海		○1	○	○始		○始		○前※				コウキヤガラ発生前			○	○
近・中・四		○1	○	○始		○始		○前※							○	○
九州		○1	○	○始		○始		○前※							○	○

※クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
一発処理型除草剤の前処理として少量散布(300ml/10a)が可能。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。
コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-2

KPP-2008 乳(EW)

地域名	地域判定	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土
北海道		○1	○	○始	○前							ミズアオイ始	+0～+5(ノビエ1L)	500ml	○	○
東北		○1	○	○始		○始		○前※				コキヤガラ発生前	種代後～+4,+0～ +5(ノビエ1L)		○	○
北陸		○1	○	○始		○始		○前※				コキヤガラ発生前			○	○
関東・東海		○1	○	○始		○始		○前※				コキヤガラ発生前 SU抵抗性コナギ始			○	○
近・中・四		○1	○	○始		○始		○前※							○	○
九州		○1	○	○始		○始		○前※				コキヤガラ発生前			○	○

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

深水条件では薬害を生じることがある。

イネに付着すると軽微な薬害を生じることがある。

クログワイ・SU抵抗性コナギ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-2

KPP-2008-1kg 粒

地域名	地域判定	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土
北海道		○1	○	○始	○始								+0～+5(ノビエ1L)	1kg	○	○
東北		○1	○	○始	○前	○始		○前※				コキヤガラ発生前	種代後～+4,+0～ +5(ノビエ1L)		○	○
北陸		○1	○	○始		○始		○前				コキヤガラ発生前			○	○
関東・東海		○1	○	○始		○始		○前※				コキヤガラ発生前 SU抵抗性コナギ始 SU抵抗性ホタルイ始			○	○
近・中・四		○1	○	○始		○始		○前					種代後～+4,+0～+5(ノ ビエ1L) (砂壌土は+0 ～)		○	○
九州		○1	○	○始		○始						コキヤガラ発生前	種代後～+4,+0～ +5(ノビエ1L)		○	○

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

田植同時散布可能

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

深水条件では薬害を生じることがある。

クログワイ・SU抵抗性コナギ・SU抵抗性ホタルイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-2

MAT-159 ジャンボ

地域名	地域判定	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土
北海道		○1	○	○始	○始								+1～ノビエ1L	50g×10コ	○	○
東北		○1	○	○始	○始	○前		●前※					種代後～+4,+1～ノ ビエ1L		○	○
北陸		○1	○	○始		○前		●前							○	○
関東・東海		○1	○	○始		○始		○前※							○	○
近・中・四		○1	○	○始		○始									○	○
九州		○1	○	○始		○始									○	○

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

5cm程度の水深で散布する。

クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-2

SL-498E-1kg粒

地域名	地域判定	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土
北海道		○1.5	○	○始	○始					○発生 前		○前	+0～ノビエ1.5L	1kg	○	○
東北		○1.5	○	○始	○始	○始	○始					○前			○	○
北陸		○1.5	○	○始		○始	○始								○	○
関東・東海		○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 前		○前			○	○
近・中・四		○1.5	○	○始		○始	○始					○始	+0～ノビエ1.5L(普通 期の砂壌土はノビエ1L まで)		○	○
九州		○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期			+0～ノビエ1.5L		○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-2

SL-970 フロアブル

地域名	地域判定	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 (/10a)	砂 壤土	壤土 ～ 壇土
北海道		○1	○	○始	○始								植代後～4, +0～ ノビエ1L		○	○
東北		○1	○	○始	○始	○始									○	○
北陸		○1	○	○始		○始									○	○
関東・東海		○1	○	○始								イダサ:再生始			○	○
近・中・四		○1	○	○始											○	○
九州		○1	○	○始											○	○
初期剤として500ml/10a散布が可能。 水口処理可能 田植同時散布可能 減水深:2cm/日以下 使用上の注意:																

A-2

SL-970 フロアブル(少量散布)

地域名	地域判定	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 (/10a)	砂 壤土	壤土 ～ 壇土
北海道		○前	○	○前									+0～+5(ノビエ発 生前)			○
東北		○1	○	○始									+0～ノビエ1L		○	○
北陸		○1	○	○始											○	○
関東・東海		○1*	○	○始									+0～ノビエ1L(*:早期 はノビエ始まで)		○	○
近・中・四		○1*	○	○始									+0～ノビエ1L(*:砂壤 土はノビエ始まで)		○	○
九州																
一発処理型除草剤の前処理として少量散布(300ml/10a)が可能。																
減水深:2cm/日以下																
使用上の注意:																

A-2

SW-751 粒

地域名	地域判定	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 壇土	
北海道		○1	○	○始	○2					○発生 期			植代後～4, +0～ ノビエ1L	3～4kg		○	
東北		○1	○	○始	○2	○始	○2		●始※	○発生 期						○	○
北陸		○1	○	○始	○2	○始	○2			○発生 期						○	○
関東・東海 #####		○1	○	○始		○始	○2		○始※	○発生 期						○	○
近・中・四		○1.5	○	○始		○始	○2			○発生 期			植代後～4, +0～ ノビエ1.5L		○	○	
九州 #####		○2	○	○始		○始	○2			○発生 期			植代後～4, +0～ ノビエ2L		○	○	
※:オモダカ防除は、クログワイに有効な剤との組み合わせで適年施用することによりさらに効果が向上する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 砂壤土では著しい高温条件下で薬害(白化)を生じることがある。 オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。																	

水稻関係除草剤使用基準の表示について

1. 過年度、既に実用化の認められている適用草種・土壌条件に○を印した。
 (本年度の試験の結果、特に拡大のない場合も含む)
 草種欄の数字、字句で草種ごとの葉齢を示した。[例: ○始(発生始)、○2(2葉期まで)]
 作期に限定がある場合は、地域名の後に適用作期を普通期:(普), 早期:(早)と記した。
 使用上の注意は別途一覧表に沿って文章で備考欄に記載した。
2. 本年度、新たに使用基準が作成された場合は、実用化可能となった適用草種・土壌に●を印し、
 処理時期及び使用量を記載した。
 C(畦畔), D(耕起前), E(休耕田)の試験区分において、判定欄の○は前年度までに実用化の
 認められている地域を示す。
3. 過年度の基準に適用条件拡大が可能となった場合、
 作 期 の 拡 大 : 作期の限定がなくなった場合、作期の記載を取消線で消した。(例: ~~(普)~~)
 草 種 の 拡 大 : 拡大可能となった草種に●を印した。
 葉 齢 の 拡 大 : 拡大可能となった葉齢に、アンダーラインを付した。(例: ○2.5)
 処理時期, 使用量の拡大 : 拡大部分にアンダーラインを付した。(例: +3~ピエ2L, 250~500ml/10a)
 土 壌 条 件 の 拡 大 : 拡大可能となった土壌に●を印した。