

新登録除草剤・植物成長調整剤一覧

農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課
平成19年11月1日～平成20年3月31日

(1) 水稲作(移植・直播)

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物 名	適用雑草	適用地帯	適用 土壌	使用量	使用時期	使用 方法	使用回数	登録 会社
フェント ラザミド・ ベンゾ フェナッ プ・ベン プレセー ト水和剤	パン チャーフ ロアブル	2-[4-(2,4-ジクロロ-m- トルオイル)-1,3-ジメチル- 7-フル-5-イソオキシ]- 4'-メチルアセトフェノン... 16.0%、2,3-ジヒドロ- 3,3-ジメチルベンゾフラン- 5-イル=エタンスルホナ ト...10.0%、4-(2-クロロ フェニル)-N-シクロヘキシル -N-エチル-4,5-ジヒドロ- 5-オキソ-1H-テトラゾール -1-カルボキサミド...6.0%	水 和 剤	移植 水稲	水田一年生雑 草、マツバイ、ホタル イ、ウリカワ、ミスカヤ ヅ、ヒルムシロ、アオ シロ・藻類による 表層はく離	関東・東山・ 東海、近畿・ 中国・四国の 普通期及び 早期栽培地 帯	壤土～ 埴土	500ml /10a	移植後5日～ビ エ2.5葉期 但し、 移植後30日まで	原液 湛水 散布	本剤の使用回 数...1回、フェン トラザミドを含む 農薬の総使用回 数...1回、ベンゾ フェナップを含む 農薬の総使用回 数...2回以内、 ベンプレセート を含む農薬の総使 用回数...2回以 内	北興化 学工業 (株)、ハイ エルク ロップ サイエ ンス(株)
シハロ ホップブ チル・ジ メタメト リン・ハ ロスル フロメ チル・ベン ゾビシク ロン粒剤	ハイカッ ト1キロ 粒剤	2-メチルチオ-4-エチルアミ ノ-6-(1,2-ジメチルプロピル アミノ)-8-トリアジン... 1.0%、メチル=3-クロロ-5- (4,6-ジメチルピリミジン- 2-イルカルバモイルスルファ モイル)-1-メチルピラゾール -4-カルボキシラト... 0.90%、7-チル(R)-2- [4-(4-シアノ-2-フルオロ フェニル)フェニル]プロピ オナート...1.8%、3-(2-ク ロロ-4-メチルベンゾイル)- 2-フェニルチオビシクロ [3.2.1]オクタ-2-エン-4- オン...2.0%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生雑 草、マツバイ、ホタル イ、ウリカワ、ミスカヤ ヅ(北海道を除 く)、ヘラオモダカ(北 海道、東北)、ヒル ムシロ、セリ、オモダ カ、ククワイ(北海 道を除く)、コウキ ガワ(東北、九 州)、シズイ(東 北)、アオシロ・藻 類による表層は く離(北陸を除く)	北陸、関東・ 東山・東海、 近畿・中国・ 四国の普通 期及び早期 栽培地帯	砂壤土 ～埴土	1kg/10a	移植後15日～ビ エ3.5葉期 但し、 移植後30日まで	湛水 散布	本剤の使用回 数...1回、シハロ ホップブチルを含 む農薬の総使用 回数...3回以 内、ジメタメトリ ンを含む農薬の総 使用回数...2回 以内、ハロスルフ ロメチルを含む 農薬の総使用回 数...2回以内、 ベンゾビシクロ ンを含む農薬の 総使用回数...2 回以内	日産化 学工業 (株)、(株) エス・ デー・エ ス・ハイ オテック
カフェン ストロー ル・ダイ ムロン・ ハロスル フロメ チル・ベン ゾビシク ロン粒 剤	オークス ジャンボ	1-(α,α-ジメチルベン ジル)-3-(ハトリル)尿 素...16.7%、メチル=3-ク ロロ-5-(4,6-ジメチルピ リミジン-2-イルカルバモ イルスルファモイル)-1-メチル ピラゾール-4-カルボキシラ ト...2.0%、N,N-ジエチ ル-3-メチルスルホナ ト-1H-1,2,4-トリアゾール -1-カルボキサミド... 10.0%、3-(2-クロロ-4-メ チルベンゾイル)-2-フェニ ルチオビシクロ[3.2.1]オクタ -2-エン-4-オン...6.7%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生雑 草、マツバイ、ホタル イ、ウリカワ、ミスカヤ ヅ、ヘラオモダカ (北海道、東北)、ヒル ムシロ、セリ、アオシ ロ・藻類による表 層はく離(東北、 関東・東山・東海 を除く)	北海道	埴土～ 埴土	小包装 (パック)10個 300g/10a	移植後5日～ビ エ2葉期 但し、 移植後30日まで	水田 に小 包装 (パック) のまま 投げ 入れ る。	本剤の使用回 数...1回、カフェ ンストロールを含 む農薬の総使用 回数...1回、ダイ ムロンを含む農 薬の総使用回数... 3回以内(育苗箱 散布は1回以内、 本田では2回以 内)、ハロスルフ ロメチルを含む農 薬の総使用回 数...2回以内、 ベンゾビシクロ ンを含む農薬の 総使用回数...2 回以内	日産化 学工業 (株)、(株) エス・ デー・エ ス・ハイ オテック
ベノキス スラム水 和剤	ワイドア タックSC	3-(2,2-ジフルオロエトキ シ)-N-(5,8-ジメトキシ [1,2,4]トリアゾロ[1,5-c] ピリミジン-2-イル)-α, α,α-トリフルオロエ ン-2-スルホナミド...3.6%	水 和 剤	移植 水稲	水田一年生雑 草、マツバイ、ホタル イ、ウリカワ、ミスカヤ ヅ、ヘラオモダカ (東北)、セリ(関 東・東山・東海、 九州)、ヒルムシロ (関東・東山・東 海、九州)	全域(北海道 を除く)の普 通期栽培地 帯及び関東・ 東山・東海、 九州の早期 栽培地帯	埴土～ 埴土	100ml /10a 希釈水量 100L/10a	移植後25～40日 (イネ6葉期以降、ノ ビエ5葉期まで)但 し収穫30日前ま で	落水 散布	本剤の使用回 数...2回以内、 ベノキススラム を含む農薬の総 使用回数...2回 以内	タウ・ケ カル日 本(株)
ビラクロ ニル粒 剤	ビラクロ ン1キロ 粒剤	1-(3-クロロ-4,5,6,7-テ ラヒドロピラゾロ[1,5-a]ピ リジン-2-イル)-5-[メチル (プロパ-2-イル)アミ]ピ ラゾール-4-カルボニ ル...1.8%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生雑 草、マツバイ、ホタル イ、ヘラオモダカ(北 海道、東北)	北海道	埴土～ 埴土	1kg/10a	移植直後～ビエ 1.5葉期 但し、 移植後30日まで	湛水 散布	本剤の使用回 数...1回、ビラ クロニルを含む農 薬の総使用回 数...2回以内	協友ア グリ(株)
						全域(北海 道、近畿・中 国・四国を除 く)の普通期 及び早期栽 培地帯		1kg/10a	植代後～移植4 日前又は移植直 後～ビエ1.5葉期 ただし、移植後30 日まで			
						近畿・中国・ 四国の普通 期栽培地帯	砂壤土 ～埴土	1kg/10a				

(1) つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作 物 名	適用雑草	適用地帯	適用 土 壌	使用量	使用時期	使用 方法	使用回数	登録 会社
ピラクロ ニル水 和剤	ピラクロ ンフロア ブル	1-(3-クロロ-4,5,6,7-テ トラヒドロピラゾロ[1,5-a]ピ リジン-2-イル)-5-[メチル (プロパ-2-ニル)アミ]ピ ラゾール-4-カルボニトリ ル...3.6%	水 和 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑 草、マツバ、ホタル イ、ヘラオモダカ(北 海道、東北)	北海道	壤土～ 埴土	500ml /10a	移植直後～バ エ1.5葉期 ただし、 移植後30日まで	原液 湛水 散布	本剤の使用回 数...1回、ピラク ロニルを含む農 薬の総使用回数 ...2回以内	協友ア グリ株式会社
						全域(北海 道、近畿・中 国・四国を除 く)の普通期 及び早期栽 培地帯		500ml /10a	移植後～移植4 日前又は移植直 後～バエ1.5葉期 ただし、移植後30 日まで			
						近畿・中国・ 四国の普通 期栽培地帯	砂壤土 ～埴土	500ml /10a				
クミルロ ン・ピラ クロニル 水和剤	ピラクロ ン・ピラ クロニル ショット フロアブル	1-(2-クロロベンジル)-3- (1-メチル-1-フェニルエチ ル)グリ...20.0%、1- (3-クロロ-4,5,6,7-テトラ ヒドロピラゾロ[1,5-a]ピリ ジン-2-イル)-5-[メチル(プロ パ-2-ニル)アミ]ピラ ゾール-4-カルボニトリ ル...3.6%	水 和 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑 草、マツバ、ホタル イ、ミズガヤツリ、ヘ ラオモダカ(東北)、 クロクワイ(北陸、関 東・東山・東海、 近畿・中国・四 国)、アオミドロ、藻 類による表層は く離(関東・東山・ 東海)	東北、北陸、 九州の普通 期及び早期 栽培地帯	壤土～ 埴土	500ml /10a	移植後～移植4 日前又は移植直 後～バエ1.5葉期 ただし、移植後30 日まで	原液 湛水 散布	本剤の使用回 数...1回、クミ ルロニルを含む農 薬の総使用回数... 2回以内、ピラク ロニルを含む農薬 の総使用回数... 2回以内	協友ア グリ株式会社
						関東・東山・ 東海の普通 期及び早期 栽培地帯	砂壤土 ～埴土	500ml /10a				
						近畿・中国・ 四国の普通 期栽培地帯		500ml /10a				
ピラクロ ニル・ベ ンゾビシ クロン・ ペンゾ フェナッ プ粒剤	ピラクロ エース1 キロ粒剤	2-[4-(2,4-シクロ-m- トリオイル)-1,3-ジメチルピ ラゾール-5-イルオキシ]- 4'-メチルアセトフェン... 8.0%、1-(3-クロロ- 4,5,6,7-テトラヒドロピラ ゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イ ル)-5-[メチル(プロパ-2- ニル)アミ]ピラゾール-4- カルボニトリル...2.0%、3- (2-クロロ-4-メチルベンゾ イル)-2-フェニルチオピシ クロ[3,2,1]オクタ-2-エン- 4-オン...2.0%	粒 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑 草、マツバ、ホタル イ、ウリカ、ヒルシ ロ、ミズガヤツリ(北 海道を除く)、ヘラ オモダカ(北海道、 東北)	北海道、東 北、北陸	壤土～ 埴土	1kg/10a	移植後5日～バ エ2.5葉期 た だし、移植後30日 まで	湛水 散布	本剤の使用回 数...1回、ピラク ロニルを含む農 薬の総使用回数 ...2回以内、 ベンゾビシクロ ンを含む農薬の 総使用回数...2 回以内、ペンゾ フェナップを含 む農薬の総使用 回数...2回以内	協友ア グリ株式会社
						関東・東山・ 東海、近畿・ 中国・四国及 び九州の普 通期及び早 期栽培地帯	砂壤土 ～埴土	1kg/10a				
ピラクロ ニル・ベ ンゾビシ クロン・ ペンゾ フェナッ プ水和 剤	ピラクロ エースフ ロアブル	2-[4-(2,4-シクロ-m- トリオイル)-1,3-ジメチルピ ラゾール-5-イルオキシ]- 4'-メチルアセトフェン... 14.5%、1-(3-クロロ- 4,5,6,7-テトラヒドロピラ ゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イ ル)-5-[メチル(プロパ-2- ニル)アミ]ピラゾール-4- カルボニトリル...3.6%、3- (2-クロロ-4-メチルベンゾ イル)-2-フェニルチオピシ クロ[3,2,1]オクタ-2-エン- 4-オン...4.0%	水 和 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑 草、マツバ、ホタル イ、ウリカ、ヒルシ ロ、ミズガヤツリ(北 海道を除く)、ヘラ オモダカ(北海道、 東北)、クロクワイ (北陸、関東・東 山・東海、近畿・ 中国・四国)、ア オミドロ、藻類による 表層はく離(九 州)	東北	壤土～ 埴土	500ml /10a	移植後5日～バ エ2.5葉期 た だし、移植後30日 まで	原液 湛水 散布	本剤の使用回 数...1回、ピラク ロニルを含む農 薬の総使用回数 ...2回以内、 ベンゾビシクロ ンを含む農薬の 総使用回数...2 回以内、ペンゾ フェナップを含 む農薬の総使用 回数...2回以内	協友ア グリ株式会社
						全域(東北 を除く)の普 通期及び早 期栽培地帯	砂壤土 ～埴土	500ml /10a				
カフェン ストロー ル・ダイ ムロン・ ハロスフ ロンメ チル・ベ ンゾビシ クロン粒 剤	オークス 1キロ粒 剤	1-(α,α-ジメチルベン ジル)-3-(パラトリル)尿 素...5.0%、メチル-3-ク ロロ-5-(4,6-ジメチルピ リジン-2-イル)カルボニ スルファモイル)-1-メチルピ ラゾール-4-カルボニ トリル...0.60%、N,N-ジエ チル-3-メチルスルホニル 1H-1,2,4-トリアゾール 1-カルボキシル... 3.0%、3-(2-クロロ-4-メ チルベンゾイル)-2-フェニ ルチオピシクロ[3,2,1]オ クタ-2-エン-4-オン...2.0%	粒 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑 草、マツバ、ホタル イ、ウリカ、ミズガ ヤツリ(北海道を除 く)、ヘラオモダカ(北 海道、東北)、ヒ ルシロ、セリ、ア オミドロ、藻類による 表層はく離(関東・ 東山・東海を除 く)	全域(東北 を除く)の普 通期及び関東・ 東山・東海、 九州の早期 栽培地帯	壤土～ 埴土	1kg/10a	移植後5日～バ エ2.5葉期 た だし、移植後30日 まで	湛水 散布	本剤の使用回 数...1回、カ フェンストロー ルを含む農薬の 総使用回数... 1回、ダイム ロンを含む農薬 の総使用回数... 3回以内(育苗 箱散布は1回以 内、本田では2 回以内)、ハ ロスフロンメ チルを含む農 薬の総使用回 数...2回以 内、ベンゾビ シクロンを含 む農薬の総 使用回数...2 回以内	日産化 学工業 (株)、 エス・ ディー・ エス・ バイオ テック
						東北		1kg/10a	移植後5日～バ エ2.5葉期 た だし、移植後30日 まで			

(1) つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作 物 名	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壤	使 用 量	使 用 時 期	使 用 方 法	使 用 回 数	登 録 会 社
ビラクロ ニル・ビ ラゾレー ト・ベン ゾピシ クロン粒剤	イネキン グ1キロ 粒剤	4-(2,4-ジクロロベンゾイ ル)-1,3-ジメチル-5-ヒ ゾリル-p-トルエン スルホネート...10.0%、1-(3-クロ ロ-4,5,6,7-テトラヒドロ ピラゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イ ル)-5-[メチル(プロパ-2- イニル)アミ]ピラゾール-4- カルボニトリル...2.0%、3- (2-クロロ-4-メシルベンゾ イル)-2-フェニルチオピ シクロ[3.2.1]オクタ-2-エン -4-オン...2.0%	粒 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑 草、マツバイ、ホタル イ、ヘラオモダカ(北 海道、東北)、ミズ ガヤツ(北海道を除 く)、ウリカワ、ヒル ムシロ、アオミドロ、 藻類による表層 はく離(北陸を除 く)	全域(近畿・ 中国・四国を 除く)の普通 期及び早期 栽培地帯	壤土～ 埴土	1kg/10a	移植直後～ビ エ2.5葉期 だし、 移植後30日まで	湛水 散布	本剤の使用回 数...1回、ビラ クロニルを含む農 薬の総使用回 数...2回以内、ビ ラゾレートを含む 農薬の総使用回 数...2回以内、 ベンゾピシクロ ンを含む農薬の 総使用回数...2回 以内	三共ア グロ(株)
ビラクロ ニル・ベン ゾピシ クロン粒 剤	サンシャ インジャン ボ	1-(3-クロロ-4,5,6,7-テ トラヒドロピラゾロ[1,5-a]ピ リジン-2-イル)-5-[メチル (プロパ-2-イニル)アミ]ピ ラゾール-4-カルボニ トリル...6.6%、3-(2-クロロ- 4-メシルベンゾイル)-2- フェニルチオピシクロ[3.2.1] オクタ-2-エン-4-オン... 6.7%	粒 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑 草、マツバイ、ホタル イ、ウリカワ、ミズガ ヤツ(北海道を除 く)、ヘラオモダカ(北 海道、東北、九 州)、ヒルムシロ	全域(近畿・ 中国・四国を 除く)の普通 期及び早期 栽培地帯	壤土～ 埴土	小包装 (パック)10個 (300g)/10a	移植後3日～ビ エ2葉期 だし、 移植後30日まで	水田 に小 包装 (パック) のまま 投げ 入れ る。	本剤の使用回 数...1回、ビラ クロニルを含む農 薬の総使用回 数...2回以内、 ベンゾピシクロ ンを含む農薬の 総使用回数...2回 以内	関エス・ ディー・エ ス・バイ テック
ビラクロ ニル・ベン ゾピシ クロン粒 剤	サンシャ イン1キ ロ粒剤	1-(3-クロロ-4,5,6,7-テ トラヒドロピラゾロ[1,5-a]ピ リジン-2-イル)-5-[メチル (プロパ-2-イニル)アミ]ピ ラゾール-4-カルボニ トリル...2.0%、3-(2-クロロ- 4-メシルベンゾイル)-2- フェニルチオピシクロ[3.2.1] オクタ-2-エン-4-オン... 2.0%	粒 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑 草、マツバイ、ホタル イ、ウリカワ、ミズガ ヤツ(北海道を除 く)、ヘラオモダカ(北 海道、東北)、ヒル ムシロ、クログワイ(東 北、近畿・中国・ 四国)、オモダカ (東北、関東・東 山・東海)、コウキ ガラ(九州)	全域の普通 期及び早期 栽培地帯	砂壤土 ～埴土	1kg/10a	移植後3日～ビ エ2葉期 だし、 移植後30日まで	湛水 散布	本剤の使用回 数...1回、ビラ クロニルを含む農 薬の総使用回 数...2回以内、 ベンゾピシクロ ンを含む農薬の 総使用回数...2回 以内	関エス・ ディー・エ ス・バイ テック、 協友ア グロ(株)
クミルロ ニル・ビ ラクロ ニル粒 剤	ビラクロ ショット1 キロ粒剤	1-(2-クロロベンジル)-3- (1-メチル-1-フェニルエチ ル)ウレア...12.0%、1- (3-クロロ-4,5,6,7-テトラ ヒドロピラゾロ[1,5-a]ピリ ジン-2-イル)-5-[メチル(プロ パ-2-イニル)アミ]ピラ ゾール-4-カルボニ トリル...1.8%	粒 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑 草、マツバイ、ホタル イ、ヘラオモダカ(北 海道)、ミズガヤツ (北海道を除く)、 ウリカワ(九州を除 く)、ヒルムシロ(九 州を除く)、クログ ワイ(北海道を除 く)	北海道	砂壤土 ～埴土	1kg/10a	移植直後～ビ エ1.5葉期 だし、 移植後30日まで	湛水 散布	本剤の使用回 数...1回、クミ ルロニルを含む農 薬の総使用回数... 2回以内、ビラ クロニルを含む農 薬の総使用回数... 2回以内	協友ア グロ(株)
ビラクロ ニル・ベン ゾピシ クロン・ ベンゾ フェナツ プ粒剤	ビラクロ エース ジャンボ	2-[4-(2,4-ジクロロ-m- トルオイル)-1,3-ジメチル ピラゾール-5-イルオキシ]- 4'-メチルアセトフェン... 14.5%、1-(3-クロロ- 4,5,6,7-テトラヒドロピラ ゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イ ル)-5-[メチル(プロパ-2- イニル)アミ]ピラゾール-4- カルボニトリル...3.6%、3- (2-クロロ-4-メシルベン ゾイル)-2-フェニルチ オピシクロ[3.2.1]オクタ-2- エン-4-オン...4.0%	粒 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑 草、マツバイ、ホタル イ、ヘラオモダカ(北 海道、東北)、ミズ ガヤツ(北海道を除 く)、ウリカワ、ヒル ムシロ、アオミドロ、 藻類による表層 はく離(北海道、 近畿・中国・四 国)	全域(関東・ 東山・東海を 除く)の普通 期及び早期 栽培地帯	壤土～ 埴土	小包装 (パック)10個 (500g)/10a	移植後5日～ビ エ2.5葉期 だし、 移植後30日まで	水田 に小 包装 (パック) のまま 投げ 入れ る。	本剤の使用回 数...1回、ビラ クロニルを含む農 薬の総使用回 数...2回以内、 ベンゾピシクロ ンを含む農薬の 総使用回数...2回 以内、ベンゾフェ ナツプを含む農 薬の総使用回 数...2回以内	協友ア グロ(株)
ビラクロ ニル・ブ ロモブ チド・ベン スル フロ ンメ チル 粒剤	インボ ン1キ ロ粒 剤75	(RS)-2-プロモ-N-(α, α-ジメチルベンジル)- 3,3-ジメチルブチルアミ ド...9.0%、メチル-α- (4,6-ジメチルピリジン- 2-イル)カルバミルスル ファミル)-o-トルア ート...0.75%、1-(3-クロ ロ-4,5,6,7-テトラヒ ドロピラゾロ[1,5-a]ピ リジン-2-イル)-5-[メ チル(プロパ-2-イ ニル)アミ]ピラゾール-4- カルボニトリル...2.0%	粒 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑 草、マツバイ、ホタル イ、ヘラオモダカ、ミ ズガヤツ(東北)、 ウリカワ、ヒルムシ ロ、アオミドロ、藻 類による表層は く離	北海道、東北	壤土～ 埴土	1kg/10a	移植直後～ビ エ2.5葉期 だし、 移植後30日まで	湛水 散布	本剤の使用回 数...1回、ビラ クロニルを含む農 薬の総使用回 数...2回以内、 ブロモブチドを含 む農薬の総使用 回数...2回以 内、ベンスル フロニルを含む農 薬の総使用回 数...2回以内	日本農 薬(株)、 デュボン (株)

(1) つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作 物 名	適用雑草	適用地帯	適用 土壌	使用量	使用時期	使用 方法	使用回数	登録 会社
プレチラ クロール 乳剤	エリジャ ンEW乳 剤	2-クロロ-2',6'-ジエチル N-(2-プロポキシエチル)ア セトアニド・・・38.5%	乳 剤	移植 水稲	水田一年生雑 草、マツバイ、ホタル イ、ヘラオモダカ(北 海道)、ミズガヤツ (北海道を除く)	北海道	砂壤土 ～壇土	100ml /10a希釈 水量100m l/10a(原 液)～500 ml/10a	移植直後～ビエ 1葉期 ただし、移 植後30日まで	湛水 散布 又は 水口 施用	本剤の使用回 数・・・1回、プレチ ラクロールを含む 農薬の総使用回 数・・・2回以内	シンジェ ンタジヤ バン(株)
						全城(北海道 を除く)の普 通期及び早 期栽培地帯		100ml /10a希釈 水量100m l/10a(原 液)～500 ml/10a	植代時～移植前 4日又は移植直 後～ビエ1葉期 ただし、移植後30 日まで			
ピラクロ ニル・ブ ロモブチ ド・ベン スルフロ ンメチル 水和剤	イッポン フロアブ ル	(RS)-2-プロモ-N-(α, α-ジメチルベンジル)- 3,3-ジメチルブチルアミ ド・・・18.0%, メチル-α- (4,6-ジメチルピリミジン- 2-イルカルバモイルスルファ モイル)-o-トルアート・・・ 1.4%, 1-(3-クロロ- 4,5,6,7-テトラヒドロピラゾ ロ[1,5-a]ピリジン-2-イ ル)-5-[メチル(プロパ-2- イニル)アミ]ピラゾール-4- カルボニル・・・4.0%	水 和 剤	移植 水稲	水田一年生雑 草、マツバイ、ホタル イ、ヘラオモダカ、ミ ズガヤツ(東北)、 ウリカワ、ヒルムシロ、 セリ、アオミドロ・藻 類による表層は く離	北海道、東北	壤土～ 壇土	500ml /10a	移植直後～ビエ 2.5葉期 ただし、 移植後30日まで	原液 湛水 散布	本剤の使用回 数・・・1回、ピラ クロニルを含む農 薬の総使用回 数・・・2回以内、 プロモブチドを含 む農薬の総使用 回数・・・2回以 内、ベンスルフロ ンメチルを含む農 薬の総使用回 数・・・2回以内	日本農 薬(株)、 デュボン (株)
ピラゾキ シフェ ン・プレ チラ クロール 粒剤	クサナイ ト粒剤	2-[4-(2,4-シクロヘン ゾイル)-1,3-ジメチルピラ ゾール-5-イルオキシ]アセ トフェノール・・・6.0%, 2-クロロ -2',6'-ジエチルN-(2- プロポキシエチル)アセトアニ ド・・・1.5%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生雑 草、マツバイ、ホタル イ、ウリカワ、ヘラオ モダカ、ミズガヤツ、 ヒルムシロ	全城(北海道 を除く)の普 通期及び早 期栽培地帯	砂壤土 ～壇土	3～ 4kg/10a	移植直後～移植 後10日(ビエ2葉 期まで)	湛水 散布	本剤の使用回 数・・・1回、ピラ ゾキシフェンを含む 農薬の総使用回 数・・・2回以内、 プレチラクロール を含む農薬の総 使用回数・・・2回 以内	石原ハ イオサイ エンス(株)
				い ぐ さ	水田一年生雑 草	全城	壇土～ 壤土	3kg/10a	植付後～スズメノ テッポウ3葉期ま たはビエ1.5葉期 まで	湛水 土壌 処理	本剤の使用回 数・・・2回以内、ピ ラゾキシフェンを含 む農薬の総使用 回数・・・2回以 内、プレチラ クロールを含む農 薬の総使用回 数・・・2回以内	

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稲刈跡・畑作・野菜作・永年作物・非農耕地対象

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場所・ 適用土壌	使用量・ 散布流量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	会社名
アラク ロー リ ニ ュ ロ ン 粒 剤	ラク サー 粒 剤	2-クロロ-2',6'-ジ エチル-N-(メキシメ チル)アセトアミド ...4.0%、3- (3,4-ジクロロフェニ ル)-1-メトキシ-1-メ チル尿素... 1.04%	粒 剤	だいず	一年生 雑草	全域 (北海道を 除く)	砂土を除く 全土壌	4~6kg/10a	は種後出芽前 (雑草発生前)	全面土壌散 布	本剤の使用回数... 1回、アラクロー ルを含む農薬の総使用 回数...1回、リニ ュロンを含む農薬の 総使用回数...1回	日産化 学工業 ㈱、デ ュ ボン ㈱
アトラジ ン・メ トラ ク ロー ル 水 和 剤	ゲザノ ンフロ アブル	2-クロロ-4-エチルア ミノ-6-イソプロピル アミノ-s-トリアジ ン...18.4%、2-ク ロロ-2'-エチル-N- (2-メトキシ-1-メチル エチル)-6'-メチルア セトアミド... 27.6%	水 和 剤	とうもろこ し、飼料 用とうもろ こし	畑地一 年生雑 草	-	-	200~400ml /10a、希釈水 量70~ 100L/10a	マルチ前・は種 前(雑草発生前)	全面土壌散 布	本剤の使用回数... 1回、アトラジンを含 む農薬の総使用回 数...1回、メトラ クロールを含む農薬 の総使用回数...1 回	シンジェ ン タ ン ジ ャ バ ン ㈱
				ソルガム				200~400ml /10a、希釈水 量70~ 100L/10a	は種後発芽前 (雑草発生前)			
				うど				200~400ml /10a、希釈水 量70~ 100L/10a	生育期(とうも ろこし2~4葉 期)			
								200~400ml /10a、希釈水 量70~ 100L/10a	は種直後			
								400ml/10a、希 釈水量 100L/10a	定植後萌芽前 (根株養成 圃)(雑草発生前)			
グリホ サート イソ プロ ピル アミ ン 塩・M CPA イ ソ プロ ピル ア ミ ン 塩 液 剤	ラビッド 液剤、 ダブル インバ クト	イソプロピルアンモ ニウム-N-(ホスホメチ ル)グリシナート... 33.2%、2-メチル- 4-クロロフェノキシ酢 酸イソプロピルアミ ン...6.2%	液 剤	樹木等	一年生 及び多 年生雑 草	-	公園、庭 園、堤とう、 駐車場、道 路、運動 場、宅地、 のり面、鉄 道等	1000~2000ml /10a、希釈水 量100L/10a	雑草生育期	植栽地を除く 樹木等の周 辺地に雑草 茎葉散布	本剤の使用回数... 3回以内、グリホ サートを含む農薬 の総使用回数...3 回以内、MCPAを含 む農薬の総使用回 数...3回以内	ニューファ ム ㈱、丸 井 オ イ ガ ミ カ ㈱
グリホ サート イソ プロ ピル アミ ン 塩 液 剤	クサブ ロー シャ ワー	イソプロピルアンモ ニウム-N-(ホスホメチ ル)グリシナート... 1.0%	液 剤	樹木等	一年生 雑草	-	公園、庭 園、堤とう、 駐車場、道 路、運動 場、宅地、 のり面等	25~40ml/m ² (原液散布)	雑草生育期 (草丈30cm以 下)	植栽地を除く 樹木等の周 辺地に雑草 茎葉散布	本剤の使用回数... 3回以内、グリホ サートを含む農薬 の総使用回数...3 回以内	丸善薬 品産業 ㈱
プロジ アミ ン 水 和 剤	バリ ケード フロア ブル	5-ジプロピルアミ ン-α, α, α-トリフル オロ-4,6-ジニトロ -o-トリイシン... 40.7%	水 和 剤	樹木等	一年生 雑草(ク 科を除く)	-	公園、庭 園、堤とう、 駐車場、道 路、運動 場、宅地、 のり面、鉄 道等	250~500ml /10a、希釈水 量100L/10a	雑草発生前	植栽地を除く 樹木等の周 辺地に全面 土壌散布	本剤の使用回数... 2回以内、プロジ アミンを含む農薬の 総使用回数...2回以 内	シンジェ ン タ ン ジ ャ バ ン ㈱
オリザ リン 水 和 剤	サーフ ランSC	3,5-ジニトロ- N,4,N'-4-ジプロ ピルスルホニルアミ ド...40.0%	水 和 剤	日本芝 (生産圃 場、ゴルフ 場)	一年生 雑草	-	-	200~400ml /10a、希釈水 量200~ 300L/10a	雑草発生前	全面土壌散 布	本剤の使用回数... 2回以内、オリザ リンを含む農薬の 総使用回数...2回以 内	ユービー エ ル ジ ャ バ ン ㈱
カフ ェ ン ス ト ロー ル 水 和 剤	ラボ スト フロ ア ブル	N,N'-ジエチル-3- メチルスルホニル- 1H-1,2,4-トリア ゾール-1-カルボキ サミド...40.0%	水 和 剤	日本芝	一年生イ ネ科雑草	-	-	250~500ml /10a、希釈水 量200~ 300L/10a	雑草発生前	全面土壌散 布	本剤の使用回数... 2回以内、カフ ェンストロー ルを含む農 薬の総使用回数... 2回以内	㈱エス ・デ ィ ー ・エ ス バ イ オ テ ッ ク
イソキ サ ベ ン ・リ フル ラ ン 粒 剤	スナッ プショッ ト粒剤	N-[3-(1-エチル- 1-メチルプロピル)イ ソキザレート-5-イ ル]-2,6-ジメチル ベンズアミド... 0.50%、α, α, α- トリフルオロ-2,6- ジニトロ-N,N'-ジ プロピルパラト リイ シン...2.0%	粒 剤	樹木類	一年生 雑草	-	-	6~8kg/10a	植付後(雑草 発生前)	土壌表面散 布	本剤の使用回数... 2回以内、イソキ サベンを含む農薬 の総使用回数...2 回以内、トリフル ランを含む農薬の 総使用回数...2回以 内	タウ・ケ カ 日 本 ㈱
								15~20kg/10a	植付活着後 (秋期雑草発 生前)			
								6~8kg/10a	秋期雑草発 生前	全面土壌散 布		

(2) つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場所・ 適用土壌	使用量・ 散布液量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	会社名
アトラジン水和剤	ゲザプリムフロアブル	2-クロロ-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ-s-トリアジン...45.0%	水和剤	とうもろこし、飼料用とうもろこし	畑地一年生雑草	-	砂土を除く全土壌	100~200ml/10a、希釈水量50~100L/10a	は種後~とうもろこし2~4葉期まで	全面土壌散布及び雑草茎葉散布	本剤の使用回数...1回、アトラジンを含む農薬の総使用回数...1回	シンジェンタジャパン㈱
				ソルガム	畑地一年生広葉雑草			100~200ml/10a、希釈水量100L/10a	は種後 雑草発生前~始期			
				はとむぎ	畑地一年生雑草			200ml/10a、希釈水量100L/10a	は種後~出芽前(雑草発生前)	全面土壌散布		
ジクワット液剤	レグロックス	1,1'-エチレン-2,2'-ビス(3,4,5-トリフルオロフェニル)プロピル...31.8%	液剤	果樹類	果樹園下草一年生雑草	-	-	300~500ml/10a、希釈水量70~100L/10a	雑草生育期(但し、収穫30日前まで)	雑草茎葉散布	本剤の使用回数...5回以内、ジクワットを含む農薬の総使用回数...5回以内	シンジェンタジャパン㈱
				ばれいしょ	畑地一年生雑草			200~300ml/10a、希釈水量70~100L/10a	雑草生育期(黄変期~枯渇期、但し収穫7日前まで)	散布	本剤の使用回数...2回以内、ジクワットを含む農薬の総使用回数...2回以内	
				麦(多株穴播栽培)				400ml/10a、希釈水量70~100L/10a	雑草生育期(は種5~10日前)	雑草茎葉散布	本剤の使用回数...1回、ジクワットを含む農薬の総使用回数...1回	
				桑				300~500ml/10a、希釈水量70~100L/10a	雑草生育期(春期発芽前又は夏切後)		本剤の使用回数...3回以内、ジクワットを含む農薬の総使用回数...3回以内	
				樹木等	一年生雑草			公園、庭園、堤とう、駐車場、宅地、のり面等	雑草生育期	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布		

新刊

カヤツリグサ科入門図鑑

谷城 勝弘

A5変形判 定価2,940円(税込)

ごく普通に見られる約200種を取り上げ、大きな写真、
ていねいな写真説明でわかりやすく解説します。

第1部 カヤツリグサ科の形

第2部 カヤツリグサ科200種

第3部 カヤツリグサ科の生える環境

第4部 標本でみるカヤツリグサ科

全国農村教育協会

〒110-0016 東京都台東区台東1-27-11

TEL03-3839-9160 FAX03-3839-9172

http://www.zennokyo.co.jp