

平成20年度 水稻作関係除草剤試験判定結果

財団法人 日本植物調節剤研究協会

平成20年度水稻作関係除草剤試験成績中央検討会は、平成20年12月11日、12日の2日間、東京ガーデンパレスにおいて、適1試験成績検討会は、これに先立ち平成20年10月15日 東京ガーデンパレスにて開催された。ここに、これら検討会における判定結果を報告する。

1) 第一次適用性試験(適1)は、北海道地域(植調北海道試験地)、東北地域(植調古川試験地)、北陸地域(植調新潟試験地)、関東地域(植調研究所)、近畿・中国・四

国地域(植調滋賀試験地)、九州地域(植調福岡試験地)の全国6地域および砂壤土(植調霞ヶ浦試験地)で33薬剤(のべ156点)について実施した。その判定結果は、第2表のとおりである。

2) 第二次適用性試験(適2)は、のべ422剤(総点数2,125点)であり、その内訳を第1表にまとめた。これら適2の判定結果は第3表のとおりであり、「実・継」と判定された薬剤の使用基準を後に掲載した。

第1表 平成20年度適2試験実施点数

A-1 移植栽培(一発処理)	137 剤 1,277 点	A-4 特殊雑草対象 内訳	
A-2 移植栽培(体系処理:初期)	13 剤 88 点	エゾノサヤヌカグサ	15 剤 15 点
A-3 移植栽培(体系処理:中後期)	21 剤 161 点	オモダカ	60 剤 199 点
A-4 移植栽培(特殊雑草対象)	のべ 214 剤 483 点	キシウスズメノヒエ	1 剤 1 点
B 直播栽培	37 剤 116 点	クサネム	1 剤 2 点
		クログワイ	63 剤 172 点
		コウキヤガラ	35 剤 55 点
		シズイ	17 剤 17 点
		ミズアオイ	13 剤 13 点
		SU 抵抗性コナギ	1 剤 1 点
		SU 抵抗性ホタルイ	8 剤 8 点

第2表 平成20年度 水稻関係除草剤適1試験 判定結果一覧

注) 評価欄の記入については、◎:極めて有望、○:有望、□:可能性有り、△:再検討、×:見込みなし を表す。

NO	試験名・剤型 [委託会社]	有効成分及び含有率 (%)	実施場所別総合評価							中央判定 、 [今後の検討課題]
			北海道	古川	新潟	植調	滋賀	福岡	霞ヶ浦(砂)	
1	BCH-085L-1kg 粒 [ハ・イエル]	フェントサニト [®] :3% プロモフチ [®] :9% ベンスルフロメチル:0.51%			△	□	○	□	□	□ 一発処理 [ノビエに対する効果の確認]
2	HOK-0611-1kg 粒 [*北興, テュボ [®] ン]	オキサジ [®] クロメホン:0.8% クロマ [®] ロップ [®] :3.5% シメリン:1.5% ベンスルフロメチル:0.51%			△					△ 一発処理 [ノビエに対する効果の確認]
3	HOK-0801 フロアフル [*北興, テュボ [®] ン]	プロモフチ [®] :18% ベンスルフロメチル:1.4% HOK-201:5% (w/v)	○	□						○ 一発処理 [年次変動の確認]
4	HOK-0801 (L) フロアフル [*北興, テュボ [®] ン]	プロモフチ [®] :18% ベンスルフロメチル:1% HOK-201:5% (w/v)				○	○	○	□ ◎	○ 一発処理 [年次変動の確認]
5	HOK-0801-1kg 粒 [*北興, テュボ [®] ン]	プロモフチ [®] :9% ベンスルフロメチル:0.75% HOK-201:2.5%	□	□						□ 一発処理 [ノビエに対する効果の確認]
6	HOK-0801 (L)-1kg 粒 [*北興, テュボ [®] ン]	プロモフチ [®] :9% ベンスルフロメチル:0.51% HOK-201:2.5%			○	□	○	□	○	□ 一発処理 [ノビエに対する効果の確認]
7	HOK-0801S-1kg 粒 [*北興, テュボ [®] ン]	タ [®] イムロン:4.5% プロモフチ [®] :9% ベンスルフロメチル:0.51% HOK-201:2.5%			□	□	○	□	○	□ 一発処理 [ノビエに対する効果の確認]
8	HOK-0802-1kg 粒 [北興]	シメリン:4.5% MCPB:2.4% 既知化合物A:0.3%			□	□	○		□	□ 体系処理(中・後期) [効果・被害の確認]
9	HOK-201-1kg 粒 [北興]	HOK-201:2.5%					□		□	□ 体系処理(初期) [効果の確認]
10	KPP-398-1kg 粒 [*科研, 丸紅]	クミロン:12% ベンスルフロメチル:0.75% ベントキサザン:3.9%	□	○						□ 一発処理 [効果の確認]
11	KPP-398 (L)-1kg 粒 [*科研, 丸紅]	クミロン:12% ベントキサザン:3.9% ベンスルフロメチル:0.51%			□	△	○	□	○	□ 一発処理 [効果の確認]
12	KPP-406 (L) フロアフル [科研]	カフェンストロール4.2% タ [®] イムロン:30% ベントキサザン:5% ベンスルフロメチル:1.02% (w/v)			△	□	○	□	□	□ 一発処理 [ノビエに対する効果の確認]

NO	試験名 ・ 剤型 [委託会社]	有効成分及び含有率 (%)	実施場所別総合評価							中央判定 [今後の検討課題]
			北海道	古川	新潟	植調	滋賀	福岡	霞ヶ浦(砂)	
13	KPP-501 フロアブル [科研]	ベントキザン:7.2% 既知化合物B:4.0% 既知化合物C:1.5% (w/v)	□	○						☐ 一発処理 [ノビエに対する効果の確認]
14	KPP-501(L) フロアブル [科研]	ベントキザン:7.2% 既知化合物B:4.0% 既知化合物C:1.02% (w/v)			□	□	◎	○	○	☐ 一発処理 [ノビエに対する効果の確認]
15	KPP-501-1kg 粒 [科研]	ベントキザン:3.6% 既知化合物B:2.0% 既知化合物C:0.75%	□	○						☐ 一発処理 [ノビエに対する効果の確認]
16	KPP-501(L)-1kg 粒 [科研]	ベントキザン:3.6% 既知化合物B:2.0% 既知化合物C:0.51%			□	△	◎	□	○	☐ 一発処理 [ノビエに対する効果の確認]
17	KUH-041 シャンホ [クミ化]	ビリスルファン:2.0% フェントラサミド:12.0%	◎	○	○	○	◎	□	◎	○ 一発処理 [年次変動の確認]
18	KUH-072D-0.25kg 粒 [クミ化, デュボン]	KUH-071(新規):8% プロモプチド:36% ベンスルフロニメチル:2%			○	○	○	□	◎	○ 一発処理 [年次変動の確認]
19	KUH-072K-0.25kg 粒 [クミ化, デュボン]	KUH-071(新規):8% プロモプチド:36% ベンスルフロニメチル:3%	□	○						○ 一発処理 [年次変動の確認]
20	KUH-074-0.25kg 粒 [クミ化]	オキサシクロメホン:2.4% ビリスルファン:2.2%	◎	○	○	○	◎	□	◎	○ 一発処理 [年次変動の確認]
21	KUH-074L-1kg 粒 [クミ化]	オキサシクロメホン:0.6% ビリスルファン:0.5%	◎	○	○	○	○	□	○	○ 一発処理 [年次変動の確認]
22	NC-606 フロアブル [日産]	オキサシクロメホン:1.6% シメタメリン:1.2% ビラゾスルフロニエチル:0.6% ベソゾビシクロン:4%	□	○	○	○	○	○	◎	○ 一発処理 [年次変動の確認]
23	S-9300-1kg 粒 [住友化学]	既知化合物A:0.9% 既知化合物B:2% 既知化合物C:9% 既知化合物D:2% 既知化合物E:3%		○		□			□	☐ 一発処理 [効果の確認]
24	SB-573 フロアブル [SDS]	既知化合物A:4% 既知化合物E:1.8% (w/v)	◎	□	○	□	◎	□	○	☐ 一発処理 [効果・薬害の確認]
25	SB-573-1kg 粒 [SDS]	既知化合物A:2% 既知化合物E:0.9%	◎	□	○	□	◎	□	○	☐ 一発処理 [効果・薬害の確認]
26	SB-585 フロアブル [SDS]	既知化合物A:4% 既知化合物B:4% 既知化合物C:1% (w/v)			△	△	○	□	○	☐ 一発処理 [ノビエに対する効果の確認]

NO	試験名 ・ 剤型 〔委託会社〕	有効成分及び含有率 (%)	実施場所別総合評価							中 央 判 定 〔今後の検討課題〕
			北 海 道	古 川	新 潟	植 調 研	滋 賀	福 岡	霞 ヶ 浦 (砂)	
27	SL-0613 顆粒水和(顆粒のままの散布) 〔石原〕	フルセスルフロニ:0.3% ベンザリンNa:20%		○	○	◎	△		□	□ 一発処理 〔効果・薬害の変動要因の確認〕
28	SL-0701-0.5kg 粒 〔石原〕	カフェンストロール:4.2% カルフェントラゾニエチル:1.8% フルセスルフロニ:0.44% ベンゾビシクロン:4%		○					□	□ 一発処理 〔効果の確認〕
29	SL-4901 フロアブル 〔石原〕	ビラゾキシフェン:200g/L ベンゾビシクロン:40g/L	○	○	○	○	○	□	◎	○ 体系処理(初期) 〔年次変動の確認〕
30	SL-4902 フロアブル 〔石原〕	カフェンストロール:42g/L ダイムロン:84g/L ビラゾキシフェン:200g/L ベンゾビシクロン:40g/L	□	□	□	□	○	□	◎	□ 一発処理 〔ノビエに対する効果の確認〕
31	SL-4903-1kg 粒 〔石原〕	アシムスルフロニ:0.12% カフェンストロール:2.1% ビラゾキシフェン:10% ベンゾビシクロン:2%	□	□	□	□	◎	□	◎	□ 一発処理 〔ノビエに対する効果の確認〕
32	SW-064-1kg 粒 〔三共アグロ〕	新規化合物A:3.5% 既知化合物B:7%	△	△	△	△	○	□	○	△ 一発処理 〔ノビエに対する効果、水稻への安全性について再検討〕
33	SYJ-219-1kg 粒 〔シンジェンタ〕	プレチラクロール:4.5% メトリオン:0.9% 既知化合物A:12%	△	○	□	○	○	○	□	北海道:△ 他地域:○ 一発処理 〔北海道:ノビエに対する効果について再検討 他地域:年次変動の確認〕

第3表 平成20年度 水稻関係除草剤適2試験判定結果一覧

区 分	実・継		継	
A-1 一発処理	BCH-031-1kg 粒	BCH-032-1kg 粒	BCH-085L-1kg 粒	HOK-0801 シャンボ'
	BCH-033-1kg 粒	BCH-044-1kg 粒	HOK-0801 フロアブル	HOK-0801(L) シャンボ'
	BCH-045L-1kg 粒	BCH-051 シャンボ'	HOK-0801(L) フロアブル	HOK-0801(L)-1kg 粒
	BCH-051 フロアブル	BCH-052 フロアブル	HOK-0801-1kg 粒	KPP-398(L)-1kg 粒
	BCH-053 フロアブル	BCH-062 シャンボ'	KPP-398-1kg 粒	KPP-406(L) フロアブル
	BCH-063 シャンボ'	BCH-065L フロアブル	KPP-501 フロアブル	KPP-501(L) フロアブル
	DPX-84ND(L) 粒	HOK-0301 フロアブル	KPP-501(L)-1kg 粒	KPP-501-1kg 粒
	HOK-0301-1kg 粒	HOK-0401 フロアブル	KUH-041 シャンボ'	KUH-041-0.25kg 粒
	HOK-0401(L) シャンボ'	HOK-0401(L) フロアブル	KUH-072D-0.25kg 粒	KUH-072D-1kg 粒
	HOK-0401(L)-1kg 粒	HOK-0401-1kg 粒	KUH-072K-0.25kg 粒	KUH-072K-1kg 粒
	<u>HOK-0601-1kg 粒</u>	HOK-0605 シャンボ'	KUH-074 シャンボ'	KUH-074-0.25kg 粒
	HOK-0605 フロアブル	HOK-0605(L) フロアブル	KUH-074L-1kg 粒	S-9300-1kg 粒
	HOK-0605(L)-1kg 粒	HOK-0605-1kg 粒	SB-573 フロアブル	SB-573-1kg 粒
	HOK-0605S-1kg 粒	HOK-0611-1kg 粒	SB-585 フロアブル	SL-0701-0.5kg 粒
	<u>HOK-0701S シャンボ'</u>	HOK-222-1kg 粒	SL-4902 フロアブル	SL-4903-1kg 粒
	HOK-223 シャンボ'	HOK-223 フロアブル	SL-954-0.5kg 粒	SYJ-219-1kg 粒
	HOK-223-1kg 粒	HSW-051-1kg 粒		
	HSW-052 フロアブル	<u>KPP-398 フロアブル</u>		
	<u>KPP-398(L) フロアブル</u>	KPP-444(L)-1kg 粒		
	<u>KPP-446H シャンボ'</u>	<u>KPP-446L シャンボ'</u>		
	<u>KUH-021-0.25kg 粒</u>	KUH-021-1kg 粒		
	KUH-041-1kg 粒	<u>KUH-074-1kg 粒</u>		
	MY-100NC 顆粒水和	MY-100NC-1kg 粒		
	NBA-941S-1kg 粒	NC-385SB 顆粒水和		
	NC-385SB-1kg 粒	NC-604 シャンボ'		
	NC-606 シャンボ'	<u>NC-606 フロアブル</u>		
	NC-607 シャンボ'	NC-607 顆粒水和		
	NC-607-1kg 粒	NC-609-1kg 粒		
	<u>NC-617SB-1kg 粒</u>	<u>NC-618-1kg 粒</u>		
	<u>NC-621 シャンボ'</u>	<u>NC-621 フロアブル</u>		
	NC-621-1kg 粒	<u>NH-051(H) シャンボ'</u>		
	NH-051(H) フロアブル	NH-051(H)-1kg 粒		
	NH-061-1kg 粒	<u>NH-071D シャンボ'</u>		
	<u>NH-071D フロアブル</u>	<u>NH-071D-1kg 粒</u>		
	<u>NH-303 シャンボ'</u>	SB-556-1kg 粒		
	SB-563(L)-1kg 粒	SB-564 シャンボ'		
	SB-564 フロアブル	SB-564-1kg 粒		
	SL-0601 シャンボ'	<u>SL-0601-0.5kg 粒</u>		
	SL-0601-1kg 粒	SL-0602-1kg 粒		
	<u>SL-0701-1kg 粒</u>	<u>SL-4902-1kg 粒</u>		

区 分	実・継		継	
A-1 一発処理 つづき	SL-954 シャンボ'	SST-402-1kg 粒		
	SST-403 シャンボ'	SST-403-1kg 粒		
	SST-404 シャンボ'	SST-404 フロアブル		
	SST-404-1kg 粒	SW-032(L) フロアブル		
	SW-041(H)-1kg 粒	SW-041(L)-1kg 粒		
	SW-043-1kg 粒	SW-062 フロアブル		
	SYJ-108 シャンボ'	SYJ-156-1kg 粒		
	SYJ-157-1kg 粒	SYJ-167-1kg 粒		
	<u>TH-501 シャンボ'</u>	<u>TH-501 フロアブル</u>		
	<u>TH-501-1kg 粒</u>	TH-547(Z) シャンボ'		
	TH-547(Z) フロアブル	TH-547(Z)-1kg 粒		
	<u>TH-601 フロアブル</u>	<u>TH-601-1kg 粒</u>		
	THI-913CS シャンボ'			
A-2 体系(初期)	AKD-7138 フロアブル	AKD-7155 フロアブル	HOK-201-1kg 粒	KUH-071-1kg 粒
	KPP-314 フロアブル	MAT-159 シャンボ'	SL-4901 フロアブル	
	NSK-850 フロアブル	RYH-118-1kg 粒		
	<u>SL-4901-1kg 粒</u>	SL-498E-1kg 粒		
	YH-650 フロアブル	YH-650-1kg 粒		
A-3 体系(中後期)	DASH-001 SC	DEH-112 乳(EW)	HOK-0802-1kg 粒	SL-0401-0.5kg 粒
	<u>HOK-0721 粒</u>	KUH-031 粒	SL-0613 顆粒水和(顆粒のままの散布)	
	KUH-073-1kg 粒	NC-612-1kg 粒		
	SB-551-1kg 粒	SL-0401 シャンボ'		
	SL-0401 顆粒水和	SL-0401-1kg 粒		
	SL-0401-1kg (1.5kg/10a処理) 粒	SL-0601-1kg 粒		
	SL-0604-1kg 粒	SL-0611 顆粒水和		
	SL-0613 顆粒水和	SW-051-1kg 粒		
	SW-063-1kg 粒	TH-913(H) 粒		
A-4 エゾノサヤヌカグサ	<u>BCH-031-1kg 粒</u>	<u>BCH-032-1kg 粒</u>	HOK-0301 フロアブル	HSW-051-1kg 粒
	<u>BCH-033-1kg 粒</u>	<u>BCH-052 フロアブル</u>	HSW-052 フロアブル	NH-061-1kg 粒
	<u>BCH-053 フロアブル</u>	<u>KPP-445 フロアブル</u>	TH-501 フロアブル	TH-501-1kg 粒
			TH-547(Z) シャンボ'	TH-547(Z) フロアブル
			TH-547(Z)-1kg 粒	
A-4 オモダカ	BCH-031-1kg 粒	BCH-032-1kg 粒	BCH-065L フロアブル	HOK-0605(L)-1kg 粒
	BCH-033-1kg 粒	BCH-044-1kg 粒	HOK-0605-1kg 粒	HOK-0605S-1kg 粒
	<u>BCH-045H-1kg 粒</u>	BCH-045L-1kg 粒	NBA-101SB シャンボ'	NC-385SB-1kg 粒
	<u>BCH-052 フロアブル</u>	<u>BCH-053 フロアブル</u>	NC-604 シャンボ'	NC-604 フロアブル
	DPX-84ND(L) 粒	<u>HOK-0301-1kg 粒</u>	NC-604-1kg 粒	NC-606 シャンボ'
	<u>HSW-051-1kg 粒</u>	<u>HSW-052 フロアブル</u>	NC-617SB-1kg 粒	NC-618-1kg 粒
	<u>KPP-2012 フロアブル</u>	KUH-021-1kg 粒	NH-071D シャンボ'	NH-071D フロアブル
	KUH-041-1kg 粒	KUH-985(L) フロアブル	NH-071D-1kg 粒	SL-0601 シャンボ'
	<u>MY-100MS フロアブル</u>	NC-385SB 顆粒水和	SL-0601-1kg 粒	SL-0701-1kg 粒

区 分	実・継		継	
A-4 オモダカ つづき	<u>NH-061-1kg 粒</u>	NHF-401 粒	SST-403 シャンボ	SST-403 フロアブル
	<u>SB-556 フロアブル</u>	SB-563(L)-1kg 粒	SST-403-1kg 粒	SST-404 シャンボ
	<u>SB-564 シャンボ</u>	SL-0613 顆粒水和	SW-043-1kg 粒	TH-501 フロアブル
	SL-496(L) 粒	<u>SL-498-1kg 粒</u>	TH-501-1kg 粒	
	SW-005(L) フロアブル	SW-042(L) シャンボ		
	SW-051-1kg 粒	<u>SW-063-1kg 粒</u>		
	<u>SYJ-157-1kg 粒</u>	<u>TH-547(Z) シャンボ</u>		
	<u>TH-547(Z) フロアブル</u>	<u>TH-547(Z)-1kg 粒</u>		
	YH-650 フロアブル			
A-4 キシュウスズメノヒエ			NC-612-1kg 粒	
A-4 クサネム	<u>NC-612-1kg 粒</u>			
A-4 クログワイ	BCH-031-1kg 粒	BCH-032-1kg 粒	BCH-065L フロアブル	HOK-0605(L)-1kg 粒
	BCH-033-1kg 粒	BCH-044-1kg 粒	HOK-0605S-1kg 粒	KPP-398(L) フロアブル
	<u>BCH-045H-1kg 粒</u>	BCH-045L-1kg 粒	KUH-073-1kg 粒	NBA-101SB シャンボ
	<u>BCH-052 フロアブル</u>	<u>BCH-053 フロアブル</u>	NC-385SB 顆粒水和	NC-385SB-1kg 粒
	DPX-84ND(L) 粒	HOK-0301 フロアブル	NC-604 シャンボ	NC-604-1kg 粒
	<u>KPP-2012 フロアブル</u>	KUH-021-1kg 粒	NC-606 シャンボ	NC-617SB-1kg 粒
	<u>KUH-031 粒</u>	KUH-041-1kg 粒	NC-618-1kg 粒	NH-071D シャンボ
	MAT-159 シャンボ	NC-604 フロアブル	NH-071D フロアブル	NH-071D-1kg 粒
	<u>NH-061-1kg 粒</u>	SB-563(L)-1kg 粒	SL-0401 シャンボ	SL-0401 顆粒水和
	<u>SB-564 シャンボ</u>	SB-564 フロアブル	SL-0601 シャンボ	SL-0701-1kg 粒
	SB-564-1kg 粒	SL-0401-1kg 粒	SST-403 シャンボ	SST-404 シャンボ
	SL-0401-1kg (1.5kg/10a処理) 粒	SL-0601-1kg 粒	SW-043-1kg 粒	TH-501 フロアブル
	SL-0602-1kg 粒	SL-0611 顆粒水和	YH-650 フロアブル	
	SL-0613 顆粒水和	SW-005(L) フロアブル		
	SW-042(L) シャンボ	SW-051-1kg 粒		
	<u>SW-063-1kg 粒</u>	SYJ-108 シャンボ		
	<u>SYJ-157-1kg 粒</u>	TH-001 フロアブル		
	<u>TH-547(Z) シャンボ</u>	<u>TH-547(Z) フロアブル</u>		
	<u>TH-547(Z)-1kg 粒</u>			
A-4 コウキヤガラ	G-315B 乳	<u>KPP-445(L) フロアブル</u>	DASH-001 SC	SL-0401 シャンボ
	KUH-021-1kg 粒	KUH-041-1kg 粒	SL-0401 顆粒水和	SL-0601 シャンボ
	NC-612-1kg 粒	SB-564 フロアブル	SL-0701-1kg 粒	SST-403 シャンボ
	SB-564-1kg 粒	SL-0401-1kg 粒	SST-404 シャンボ	SW-051-1kg 粒
	SL-0401-1kg (1.5kg/10a処理) 粒	SL-0601-1kg 粒	TH-501 フロアブル	YH-650 フロアブル
	SL-0602-1kg 粒	SL-0604-1kg 粒		
	<u>SST-402-1kg 粒</u>	<u>SST-403 フロアブル</u>		
	<u>SST-403-1kg 粒</u>	SST-404 フロアブル		
	SST-404-1kg 粒	<u>TH-001 シャンボ</u>		
	TH-001 フロアブル	TH-122-1kg 粒		

区 分	実・継		継	
A-4 コウキヤガラ つづき	TH-224 フロアブル TH-547(Z) シ'ャンボ' TH-547(Z)-1kg 粒	TH-421 シ'ャンボ' TH-547(Z) フロアブル		
A-4 シズイ	BCH-045H-1kg 粒 KPP-2005(H) フロアブル (少量散布) NH-051(H)-1kg 粒 SL-0401-1kg (1.5kg/10a処理) 粒 SW-032 フロアブル TH-122-1kg 粒 TH-547(Z) フロアブル	DASH-001 SC NC-604-1kg 粒 SL-0401-1kg 粒 SST-404 フロアブル SYJ-156-1kg 粒 TH-421 シ'ャンボ'	KUH-041-1kg 粒 SW-051-1kg 粒	SST-404-1kg 粒 TH-547(Z)-1kg 粒
A-4 ミズアオイ	BCH-032-1kg 粒 BCH-052 フロアブル HSW-051-1kg 粒 SW-032 フロアブル	BCH-033-1kg 粒 BCH-053 フロアブル HSW-052 フロアブル	SYJ-167-1kg 粒 TH-501-1kg 粒 TH-547(Z) フロアブル	TH-501 フロアブル TH-547(Z) シ'ャンボ' TH-547(Z)-1kg 粒
A-4 SU抵抗性コナギ	SL-0601-1kg 粒			
A-4 SU抵抗性ホタルイ	BCH-032-1kg 粒 BCH-044-1kg 粒 BCH-053 フロアブル HSW-052 フロアブル	BCH-033-1kg 粒 BCH-052 フロアブル HSW-051-1kg 粒	SYJ-167-1kg 粒	
B 直播栽培	BCH-045H-1kg 粒 DEH-112 シ'ャンボ' HOK-223 フロアブル KUH-021-1kg 粒 NC-331 水和 NC-385SB-1kg 粒 NH-301-1kg 粒 SL-0401-1kg 粒 SL-0611(乾直入水前) 顆粒水和 SW-032 フロアブル SW-043-1kg 粒 SW-991-1kg 粒	DASH-001 SC HOK-222-1kg 粒 KUH-004D-1kg 粒 KUH-911 液 NC-385SB 顆粒水和 NH-051(H) フロアブル SB-551-1kg 粒 SL-0401-1kg (1.5kg/10a処理) 粒 SL-0612 顆粒水和 SW-042(L) シ'ャンボ' SW-751 粒(少量散布) TH-224 フロアブル	BAS-3510(Na) 粒 NC-612-1kg 粒 NH-302 フロアブル SL-0611 顆粒水和 SL-4901 フロアブル SST-404 シ'ャンボ' SST-404-1kg 粒	NBA-101SB シ'ャンボ' NH-051(H)-1kg 粒 SL-0601-1kg 粒 SL-0613 顆粒水和 SL-4901-1kg 粒 SST-404 フロアブル

注) : 1) 本年度新規に使用基準が作成されたものは、薬剤名にアンダーラインを記した。

2) 本年度は「実」、「継?」及び「中止」と判定された薬剤はなかった。

※ 薬剤名はアルファベット順に記載した。

平成20年度 水稻関係除草剤使用基準一覧表

A 移植栽培

A-1 一発処理

A-1

BCH-031-1kg 粒

SCFH-031-1Rg NZ												処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 堆土	
地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離					
北海道	○2.5	○	○2	○2	○2			●始	○発生 期	○再生 前～始	エゾノギヤツリ等2.5L	+5～ノビエ2.5L	1kg	○	○	
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始		●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始				○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始					○*	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2		●始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2				○再生 前～始					○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期	○再生 前～始						

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: *:浅植え、植付け精度不良等で薬害を生じることがある。

セリは再生が早い場合は効果が劣る(九州)。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1

BCH-032-1kg 粒

CH-032-1kg 3L

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土 へ	壤土 へ
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		●始	○発生 期	○再生 前～始		エゾノギヤツリ等2.5L ミズアザミ2.5L タネハダシ等2.5L	+5～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始					○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	●始	●始	○発生 期	○再生 前～始					○*	○
関東・東海	○3	○	○3		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始			+5～ノビエ3L		○	○
近・中・四	○3	○	○3		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始			+5～ノビエ3L		○	○
九州	○3	○	○3		○3	○3			○発生 期	○再生 前～始			+5～ノビエ3L(砂 壌土は2.5Lまで)		○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: *:浅植え、植付け精度不良等で薬害を生じることがある。

セリは再生が早い場合は効果が劣る(九州)。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1

BCH-033-1kg 粒

BCH-033-1kg 型																
地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		●始	○発生 期	○再生 前～始		エゾノギヤツリ等2.5L ミズアザミ2.5L タネハダシ等2.5L	+5～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○3	○	○2	○2	○2	○始	○始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始			+5～ノビエ3L		○	○
北陸	○3	○	○2		○2	○始	●始	●始	○発生 期	○再生 前～始			+5～ノビエ3L		○	○
関東・東海	○3	○	○3		○2	○2	●始※		○発生 期	○再生 前～始					○	○
近・中・四	○3	○	○3		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始			+5～ノビエ3L		○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2		○始※	○発生 期	○再生 前～始			+5～ノビエ2.5L		○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: *:浅植え、植付け精度不良等で薬害を生じることがある。

セリは再生が早い場合は効果が劣る(九州)。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1

BCH-044-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

田植同時散布可能
※:オモダカ・クロクワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クロクワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1

BCH-045L-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 堆土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

田植同時散布可能
※:クロクワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クロクワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1

BCH-051 ジェンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	30g×10 ²	●	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始				○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期					○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: セリは再生が早い場合は効果が劣る(九州)。
5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

BCH-051 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始				○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期					○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: セリは再生が早い場合は効果が劣る(九州)。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

BCH-052 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 壤土
北海道	○3	○	○2	○2		○2		●始	○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ3L	500ml	○	○
東北	○3	○	○2	○2	○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始				○	○
北陸	○3	○	○2		○2	○2			●発生 期	○再生 前～始				●	○
関東・東海	○3	○	○3		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始					○
近・中・四	○3	○	○3		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始					○
九州	○3	○	○3		○3	○3			○発生 期	○再生 前～始				○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: ※:浅植え、植付け精度不良等で薬害を生じることがある。
薬液が付着した稲体には白化症状が生ずることがある。
セリは再生が早い場合は効果が劣る(九州)。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

BCH-053 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 壤土
北海道	○3	○	○2	○2		○2		●始	○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ3L	500ml	○	○
東北	○3	○	○2	○2	○2	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始				●	○
北陸	○3	○	○2		○2	○始			●発生 期	○再生 前～始				○	○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始					○
近・中・四	○3	○	○3		○2	○2			○発生 期	●再生 前～始				●	○
九州	○3	○	○3		○3	○3			○発生 期	○再生 前～始				●	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 薬液が付着した稲体には白化症状が生ずることがある。
セリは再生が早い場合は効果が劣る(九州)。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

BCH-062 シャンホ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 壤土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	40g×10コ	●	○
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始				●	●
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始					●
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: セリは再生が早い場合は効果が劣る(九州)。
5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

BCH-063 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	50g×10コ	●	●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始				●	●
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始				●*	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: ※浅植え、植付け精度不良等で悪害を生じることがある。

セリは再生が早い場合は効果が悪くなる(九州)。

5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な悪害や効果不足が生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

BCH-065L フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始			●発生 期	○再生 前～始		+0～ノビエ2.5L	500ml	●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	●前			●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○
九州	○2.5	○	○2	○始	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○

田植同時散布可能

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

DPX-84ND(L) 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道															
東北															
北陸	○3	○	○2		○2	○2			●発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ3L	3kg	○	○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2	○始	○始	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2		○始	○発生 期	○再生 前～始				○(※ 過期 のみ)	○
九州	○3	○	○2		○2	○2	○始	○始	○発生 期	○再生 前～始				○	○

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クログワイ防除は、有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

HOK-0301 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生 期			+5～ノビエ2.5L	500ml	●	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	●始※		○発生 期					○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始	●始※		○発生 期					○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期		○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期		○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※		○発生 期					●	○

※: クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

HOK-0301-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		●始※	○発生 期		○前	エゾノササキダケ等:2L	+5～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○始※	●始※	○発生 期						○	○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始	○始※	●始※	○発生 期		○前				○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	●始※	○発生 期		○前				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○始	○始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	●始※	○発生 期		○前				○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

HOK-0401 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道																
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前		+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

水口処理可能 田植同時散布可能

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

A-1

HOK-0401(L) シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道																
東北																
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始			+1～ノビエ2.5L	50g×10コ	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前		+1～ノビエ 2.5L(砂壌土は+5 ～)		●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前		+1～ノビエ2.5L		●	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な障害や効果不足が生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

HOK-0401(L) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道																
東北																
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始			+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始					●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始					○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				●	○

田植同時散布可能

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

HOK-0401(L)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	1kg	●*	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●*	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: * : 浅播え、植付け精度不良等で被害を生じることがある。
 散布後の着しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

HOK-0401-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ 2.5L(砂壌土は+5 ～)	1kg	○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

田植同時散布可能
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 低温等による活着不良の場合には薬害が生じる事がある。

A-1

HOK-0601-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2	●	●始	●始		●始			●発生 期			+0～ノビエ2L	1kg		●
東北	●2	●	●2	●始	●始	●始			●発生 期					●	●
北陸	●2	●	●始		●始	●始			●発生 期						●
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意:

A-1

HOK-0605 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	50g×10㎡	●	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始				●	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

A-1

HOK-0605 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 〜 壌土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生 期	○再生 前〜始	○前	+0〜ノビエ2.5L	500ml	●	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前〜始				○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															
田植同時散布可能 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:															

A-1

HOK-0605(L) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 〜 壌土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生 期	○再生 前〜始		+0〜ノビエ2.5L	500ml	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前〜始				●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前〜始				●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前〜始				●	○
田植同時散布可能 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミス'カ'ヤツリには効果が劣る。															

A-1

HOK-0605(L)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 〜 壌土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始				○再生 前〜始		+0〜ノビエ2.5L	1kg	○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前〜始	○前	+0〜ノビエ2L		●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前〜始	○前	+0〜ノビエ2.5L		●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前〜始				●	○
田植同時散布可能 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミス'カ'ヤツリには効果が劣る。															

A-1

HOK-0605-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 〜 壌土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生 期	○再生 前〜始		+0〜ノビエ2.5L	1kg	●	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前〜始				○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															
田植同時散布可能 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:															

A-1

HOK-0605S-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道																
東北																
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始			+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始					●	○
近・中・西	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始					●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			●発生 期	○再生 前～始	○前				●	○
田植同時散布可能 減水深：2cm/日以下 使用上の注意： 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。																

A-1

HOK-0611-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロダ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	埴土 ～ 壤土
北海道															
東北															
北陸															
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	±3～ノビエ2.5L	1kg	●	○
近・中・西															
九州															
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:															

A-1

HOK-0701S ジェンボ'

地域名	ノビエ	一年生 広葉: マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロタ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	埴土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸															
関東・東海															
近・中・四	●2	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前 (藻類)	+0～ノビエ2L	70g×10a	●	●
九州															
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な漏害や効果不足が生じることがある。															

A-1

HOK-222-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロタ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		○始	○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○始	○始		○始※	○発生 期	○再生 前～始	●前			○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・西															
九州															
田植同時散布確認(東北2) ※: オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 低温等による活着不良の場合には薬害が生じることがある。(東北) オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。															

A-1

HOK-223 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道															
東北															
北陸	○2	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+1～ノビエ2L	50g×10	○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
近・中・四	○2	○	○2		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+1～ノビエ2L(砂 壌土は+3～)		○	○
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+1～ノビエ2L		○	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

HOK-223 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始		+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期	○再生 前～始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

田植同時散布可能
 ※: クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

HOK-223-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L (砂壌土は+5～)	1kg	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

田植同時散布確認(北陸2)
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

HSW-051-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始		●始	○発生 期			+3～ノビエ2.5L	1kg	●	○
東北															
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

HSW-052 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始		●始	○発生 期			ミズアオイ:2L SU抵抗性:20L	+3～ノビエ2.5L	500ml	●	○
東北																
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

KPP-398 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●1.5	●	●始	●始		●始			●発生 期	●再生 前～始			+0～ノビエ1.5L	500ml		●
東北	●1.5	●	●始	●始	●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●	●
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

A-1

KPP-398(L) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道																
東北																
北陸	●1.5	●	●始		●前	●前			●発生 期	●再生 前～始			+0～ノビエ1.5L	500ml		●
関東・東海	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前					●
近・中・四 (管)	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前					●
九州	●1.5	●	●始		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前					●

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

KPP-444(L)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道																
東北																
北陸	○1.5	○	○始		○始	○始	○始	○始※					+0～ノビエ1.5L	1kg	○	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コナキダマ:発生始 SU抵抗性:コナキ:6g SU抵抗性:クログワイ:1L			○	○
近・中・四	○1.5	○	○始		○始	○始	○始	○始※		○再生 前～始	○前				○	○
九州	○1.5	○	○始		○始	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コナキダマ:発生始			○	○

田植同時散布可能
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。
コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

KPP-446H シェンボ'

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズ'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 堆土
北海道	●1.5	●	●始	●始		●始			●発生 期	●再生 前～始		+0～ノビエ1.5L	40g×100		●
東北	●1.5	●	●始	●始	●始	●始			●発生 期	●再生 前～始				●	●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

A-1

KPP-446L シェンボ'

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズ'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 堆土
北海道															
東北															
北陸	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+0～ノビエ1.5L	40g×100	●	●
関東・東海	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始				●	
近・中・四	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	
九州	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

KUH-021-0.25kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズ'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 堆土
北海道	●3	●	●3	●3		●2			●発生 期	●再生 前～始		+3～ノビエ3L	250g		●
東北	●3	●	●3	●2	●3	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
北陸	●3	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始				●	●
関東・東海	●3	●	●3		●3	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四	●3	●	●3		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●3	●	●3		●3	●3			●発生 期	●再生 前～始	●前				●

湛水周縁部散布可能(北海道～九州)
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 湛水周縁部散布では藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足を生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

KUH-021-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズ'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 堆土
北海道	○3	○	○2	○2		○2		○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ3L(砂 壌土は+7～)	1kg	○	○
東北	○3	○	○3	○始	○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○3	○	○3		○3	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始				○	○
関東・東海	○3	○	○3		○3	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○3	○	○3		○3	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○3	○	○3		○3	○3	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

※: オモダカ・クロクワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 シズメ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。
 オモダカ・クロクワイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

KUH-041-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 植土
北海道	○3	○	○2	○2		○2		○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ3L(砂 壌土は+3～)	1kg	○	○
東北	○3	○	○3	○3	○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コキヤツリ: 発生始		○	○
北陸	○3	○	○3		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○3	○	○3		○3	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コキヤツリ: 発生始	+3～ノビエ3L	○	○
近・中・四	○3	○	○3		○3	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○3	○	○3		○3	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コキヤツリ: 発生始		○	○

※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ・コキヤツリ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1

KUH-074-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 植土
北海道	●3	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始		+3～ノビエ3L	1kg		●
東北	●3	●	●2	●3	●3	●2			●発生 期	●再生 前～始				●	●
北陸	●3	●	●3		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
関東・東海	●3	●	●3		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四	●3	●	●3		●3	●3			●発生 期	●再生 前～始	●前 (藻類)				●
九州	●3	●	●3		●3	●3			●発生 期	●再生 前～始	●前 (藻類)				●

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 移植後の低湿および急激な気温の上昇により障害を生じることがある。(近畿・中国・四国)
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

MY-100NC 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 植土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		○始	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	80g(散布 液量 500ml)		○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		○	○
九州	○2.5	○	○2	○前	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○

田植同時散布可能
 顆粒のまま水口処理が可能(東北、北陸、関東・東海)
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

MY-100NC-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 植土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○2	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	○始		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+1～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)		○	○
九州	○2.5	○	○2	○前	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

田植同時散布可能
 ※: クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

NBA-941S-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 増土
北海道	○3	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ3L	1kg	○	○
東北	○3	○	○2	○始	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○
北陸	○3	○	○2		○2	○2				○再生 前～始		+0～ノビエ3L		○	○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ3L		○	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始		+0～ノビエ3L(砂 壌土は+5～)		●	○
九州	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ3L		○	○

田植同時散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミス'ガ'ヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-385SB 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 増土
北海道	○2.5	○	○2	○始		○2		○始	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	80g(散布 液量 500ml)	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

顆粒のまま水口処理が可能
田植同時散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミス'ガ'ヤツリには効果が劣る。
オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

NC-385SB-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 増土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生 期			+0～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L		○	○

田植同時散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミス'ガ'ヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-604 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 増土
北海道	○2	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2L	30g×10コ		○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ2.5L		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミス'ガ'ヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-606 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 殖土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○始	+5～ノビエ2.5L	30g×10 ³	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○始			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期		○始			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○始			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○始			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○始			○	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-606 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 殖土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期	●再生 前～始	●始	+5～ノビエ2.5L	500ml		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始					●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●始				●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●始				●
近・中・四 (管)	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●始				●
九州	●2.5	●	●2	●前	●2	●始			●発生 期		●始				●

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-607 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 殖土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L	30g×10 ³	●	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-607 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 殖土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L	60g(散布 後量 500ml)	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ 2.5L(砂壌土は+3 ～)		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始		+3～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○

顆粒のまま水口処理が可能 田植同時散布可能
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-607-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ 2.5L(砂壌土は+3 ～)		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L		●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四 (管)	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

田植同時散布可能
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1

NC-609-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	○3	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ3L(砂壌土 は+3～)	1kg	○	○
東北	○3	○	○2	○2	○3	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ3L		○	○
北陸	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期		○前	+3～ノビエ3L		○	○
関東・東海	○3	○	○3		○3	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ3L(砂壌土 は+3～)		●	○
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

A-1

NC-617SB-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	●3.5	●	●3	●3		●2			●発生 期	●再生 前～始		+7～ノビエ3.5L	1kg		●
東北	●4	●	●4	●4	●4	●3			●発生 期	●再生 前～始		+7～ノビエ4L			●
北陸															
関東・東海	●4	●	●4		●4	●3			●発生 期	●再生 前～始		+7～ノビエ4L	1kg		●
近・中・四	●4	●	●3		●3	●3			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●4	●	●4		●4	●4			●発生 期	●再生 前～始	●前 (藻類)				●

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-618-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	●3.5	●	●3	●3		●2			●発生 期	●再生 前～始		+7～ノビエ3.5L	1kg		●
東北	●3.5	●	●3	●始	●4	●3			●発生 期	●再生 前～始					●
北陸															
関東・東海	●3.5	●	●4		●3	●3			●発生 期	●再生 前～始		+7～ノビエ3.5L	1kg		●
近・中・四 (管)	●3.5	●	●4		●3	●3			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●3.5	●	●4		●4	●4			●発生 期	●再生 前～始	●前 (藻類)				●

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-621 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離			処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道																	
東北	●3	●	●3	●2	●3	●2			●発生 期	●再生 前～始			+5～ノビエ3L	40g×10 ³		●	●
北陸	●3	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始						●	●
関東・東海	●3	●	●3		●3	●2			●発生 期	●再生 前～始							●
近・中・四	●3	●	●3		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始							●
九州	●3	●	●3	●前	●4	●3			●発生 期	●再生 前～始							●
減水深：2cm/日以下																	
使用上の注意：5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足を生じることがある。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。																	

A-1

NC-621 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道																
東北	●3	●	●3	●3	●3	●2			●発生 期	●再生 前～始			+5～ノビエ3L	500ml	●	●
北陸	●3	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始					●	●
関東・東海	●3	●	●3		●3	●2			●発生 期	●再生 前～始					●	
近・中・西	●3	●	●3		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●	
九州	●3	●	●3	●前	●3	●2			●発生 期	●再生 前～始					●	
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 移植後の低温および急激な気温の上昇により薬害を生じることがある(近畿・中国・四国)。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。																

A-1

NC-621-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	○3	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ3L	1kg		○
東北	○3	○	○2	○2	○3	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○
北陸	○3	○	○3		○2	○2			○発生 期	●再生 前～始				●	○
関東・東海	○3	○	○3		○3	○2			○発生 期	○再生 前～始					○
近・中・四	○3	○	○3		○2, 3	○2			●発生 期	○再生 前～始				●	○
九州	○3	○	○3		○3	○3			○発生 期	○再生 前～始				●	○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。															

A-1

NH-051(H) シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモタカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期	●再生 前～始		+0～ノビエ2.5L	50g×10 ³		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足を生じることがある。															

A-1

NH-051(H) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壤土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		○始	○発生 期	○再生 前～始	○前	エゾノササキ等2.5L	+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイノ基式3cm			○	○
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

田植同時散布可能
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1

NH-051(H)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壤土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		○始	○発生 期	○再生 前～始	○前	エゾノササキ等2.5L	+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイノ基式3cm			○	○
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

田植同時散布可能
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1

NH-061-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壤土
北海道	○3	○	○3	○2		○2		●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前		+3～ノビエ3L	1kg	●	○
東北	○3	○	○3		○2	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始					○	○
北陸	○3	○	○2		○始	○2	●始※	●始※							●	○
関東・東海	○3	○	○3		○3	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始					●	○
近・中・四	○3	○	○3		○3	○3	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始			+3～ノビエ3L		●	○
九州	○3	○	○3		○3	○3	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始			+3～ノビエ3L		●	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1

NH-071D シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壤土
北海道																
東北																
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始			+0～ノビエ2.5L	50g×10コ	●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始						●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始						●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始						●

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な葉害や効果不足を生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

NH-071D フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 植土
北海道															
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+0～ノビエ2.5L	500ml	●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
田植同時散布可能 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。															

A-1

NH-071D-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 植土
北海道															
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始		+0～ノビエ2.5L	1kg	●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始				●	●
九州	●2.5	●	●2	●前	●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
田植同時散布可能 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。															

A-1

NH-303 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 植土
北海道															
東北	●2.5	●	●2	●始	●始							+0～ノビエ2.5L	60g×10コ		●
北陸	●2.5	●	●2		●始										●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2										●
近・中・四 (管)	●2	●	●2		●始							+0～ノビエ2L			●
九州															
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。															

A-1

SB-556-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 植土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期			+0～ノビエ2.5L	1kg		○
東北	○2	○	○2	○始	○2	○2		●始※	○発生 期			+0～ノビエ2L		●	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			●発生 期			+0～ノビエ2.5L		●	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期			+0～ノビエ2L		●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期			+0～ノビエ2.5L		●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期			+0～ノビエ2.5L		●	○
※: オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 活着不良の場合、散布後の低温および急激な気温の上昇により薬害を生じることがある(東北)。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。 オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。															

A-1

SB-563(L)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始	○始	○始	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始	●始	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ 2.5L(砂壌土は+3 ～)		○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L		○	○

田植同時散布可能
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミス'ガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1

SB-564 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道	○2	○	○始	○始		○始			○発生 期			+3～ノビエ2L	30g×10コ	○	○
東北	○2	○	○2	○始	○2	○始	●始※	●始※	○発生 期					○	○
北陸	○2	○	○始		○始	○始			○発生 期					○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期					○	○
近・中・四	○2	○	○2		○始	○始			○発生 期					○	○
九州	○2	○	○2	○始	○2	○2		●始※	○発生 期					○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な障害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミス'ガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1

SB-564 プロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道	○2	○	○始	○2		○始			○発生 期		シズイ:2L	+3～ノビエ2L	500ml	○	○
東北	○2	○	○2	○始	○始	○始	○始※	○始※	○発生 期		シズイ:草丈3cm			○	○
北陸	○2	○	○2		○始	○始			○発生 期					○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○2	●始※	○始※	○発生 期		コクキガ'ラ:始			○	○
近・中・四	○2	○	○2		○始	○始	○始		○発生 期					○	○
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期		コクキガ'ラ:始			○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミス'ガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。
クログワイ・コクキガ'ラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1

SB-564-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道	○2	○	○始	○2		○始			○発生 期		シズイ:2L	+3～ノビエ2L	1kg	○	○
東北	○2	○	○2	○始	○始	○始	○始※	○始※	○発生 期		シズイ:草丈3cm			○	○
北陸	○2	○	○2		○始	○始			○発生 期					○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○2	●始※	○始※	○発生 期		コクキガ'ラ:始			○	○
近・中・四	○2	○	○2		○始	○始	○始		○発生 期					○	○
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期		コクキガ'ラ:始			○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミス'ガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。
クログワイ・コクキガ'ラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1

SL-0601 シャンネ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズ'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 埋土
北海道															
東北	○4	○	○3	●4		○3			○発生 期	○再生 前～始		+7～ノビエ4L	50g×10コ	●	○
北陸	○4	○	○4			○2			○発生 期	○再生 前～始					○
関東・東海	●4	●	●4						●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・西	●4	●	●4			●3			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	○3	○	○4			○4			○発生 期	○再生 前～始		+7～ノビエ3L		●	○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。															

A-1

SL-0601-0.5kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズ'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 埋土
北海道															
東北	●3	●	●3	●3		●3			●発生 期	●再生 前～始		+7～ノビエ3L	500g		●
北陸	●4	●	●3			●2			●発生 期	●再生 前～始		+7～ノビエ4L			●
関東・東海															
近・中・西															
九州															
湛水周縁部散布確認(東北、北陸) 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。 湛水周縁部散布では藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足が生じることがある。															

A-1

SL-0601-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズ'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 埋土
北海道															
東北	○4	○	○4	○4		○3	○草丈 10cm※		○発生 期	○再生 前～始		+7～ノビエ4L	1kg	●	○
北陸	○4	○	○3			○2	●草丈 10cm		○発生 期			+7～ノビエ4L		●	○
関東・東海	○4	○	○4			○3	○草丈 10cm※		○発生 期	○再生 前～始	コウキヤダラ:始 SL低濃度コウキ:3L	+7～ノビエ4L		●	○
近・中・西	○4	○	○4			○3	○草丈 10cm		○発生 期	○再生 前～始		+7～ノビエ4L			○
九州	○4	○	○4			○4			○発生 期	○再生 前～始	コウキヤダラ:始	+7～ノビエ4L		●	○
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。															

A-1

SL-0602-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズ'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 埋土
北海道															
東北	○4	○	○3	●4	○4	○3	○草丈 10cm※	○矢じ り薬抽 出前※	○発生 期	○再生 前～始	コウキヤダラ:始	+7～ノビエ4L	1kg	●	○
北陸	○4	○	○4		○3	○3	●草丈 10cm	○矢じ り薬抽 出前※	●発生 期	●再生 前～始				●	○
関東・東海	○4	○	○4		○4	○3	○草丈 10cm※	○矢じ り薬抽 出前※	○発生 期	○再生 前～始	コウキヤダラ:始			●	○
近・中・西	○4	○	○4		○4	○3	○草丈 10cm	○矢じ り薬抽 出前※	○発生 期	○再生 前～始				●	○
九州	○4	○	○4		○4	○4			●発生 期	○再生 前～始	コウキヤダラ:始			●	○
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。 オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。															

A-1

SL-0701-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ワリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	●4	●	●3	●3		●3			●発生 期	●再生 前～始		+7～ノビエ4L	1kg		●
東北	●4	●	●4	●4		●3			●発生 期	●再生 前～始				●	●
北陸	●4	●	●4		●2	●3			●発生 期	●再生 前～始				●	●
関東・東海	●4	●	●4		●2				●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四	●4	●	●4		●2	●3			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●3	●	●4		●3	●3			●発生 期	●再生 前～始	●前	+7～ノビエ3L			●
減水深：2cm/日以下 使用上の注意： 移植後の低温および急激な気温の上昇により薬害を生じることがある(北陸)。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。															

A-1

SL-4902-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ワリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	●2	●	●始	●始		●始			●発生 期			+3～ノビエ2L	1kg		●
東北	●2	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期					●	●
北陸	●2	●	●2		●2	●2			●発生 期					●	●
関東・東海	●2	●	●2		●始				●発生 期	●前					●
近・中・四 (管)	●2	●	●2		●2	●2			●発生 期						●
九州	●2	●	●2		●2	●2			●発生 期						●
減水深：2cm/日以下 使用上の注意： 移植後の低温および急激な気温の上昇により薬害を生じることがある(北陸)。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。															

A-1

SL-954 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ワリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	○2	○	○2	○始		○2			○発生 期		スズノキヤスダサシ2L, SU抵抗性シズノキ2L	+3～ノビエ2L	50g×10回	○	○
東北	○2	○	○2	○始	○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	シズイ：草丈3cm SU抵抗性シズノキ2L			○	○
北陸	○2	○	○2		○始	○始			○発生 期					○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○始			○発生 期		SU抵抗性コナギ2L, SU抵抗性コナギ2L			○	○
近・中・四	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期					○	○
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○前	コナギヤスダサシ発生始			○	○
減水深：2cm/日以下 使用上の注意： 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。 コウキヤガラ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。															

A-1

SST-402-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ワリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○始	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
田植同時散布可能 ※：クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 減水深：2cm/日以下 使用上の注意： 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。 クログワイ・スズイ・セリ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。 シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。															

A-1

SST-403 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壌土
北海道															
東北	○1.5	○	○始	○始	○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	●前	+0～ノビエ1.5L	40g×10コ	○	○
北陸															
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始		+0～ノビエ1.5L	40g×10コ	●	○
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

A-1

SST-403-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壌土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ1.5L	1kg	○	○
東北	○1.5	○	○始	○始	○始	○始	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	コキヤガラ・始		○	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	○始	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○1.5	○	○始		○始	○始	○始		○発生 期	○再生 前～始				○	○
九州	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

田植同時散布可能
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
クログワイ・コウキヤガラ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1

SST-404 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壌土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生 期	○再生 前～始		+0～ノビエ2.5L	40g×10コ	●	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始				○	○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○2			○発生 期					○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
九州	○2.5	○	○2	●前	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	●前	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土はノビエ2L迄 C)		●	○

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

SST-404 フロアフル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壌土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始		○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ・草丈3cm		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始		+0～ノビエ 2.5L(砂壌土は+3 cm)		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コキヤガラ・始		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○
九州	○2.5	○	○2	○始	○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始		コキヤガラ・始		○	○

田植同時散布可能
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1

SST-404-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始		○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性でクロクワイ2L ノビエ1.5L	+0～ノビエ2.5L	1kg	○ ○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コナキガラシ2L SU抵抗性でクロクワイ2L			○ ○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前				○ ○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コナキガラシ2L SU抵抗性でクロクワイ2L			○ ○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前				○ ○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始		コナキガラシ2L			○ ○

田植同時散布可能
※: オモダカ・クロクワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
滅水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したオモダカ・クロクワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1

SW-032(L) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 埴土
北海道													500ml		
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L		○	○
田植同時散布可能															
滅水深: 2cm/日以下															
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。															

A-1

SW-041(H)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		○始	○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性でクロクワイ1.5L	+0～ノビエ2.5L	1kg	○ ○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ: 草丈3cm SU抵抗性でクロクワイ1.5L			○ ○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

※: オモダカ・クロクワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
田植同時散布可能
滅水深: 2cm/日以下
使用上の注意: オモダカ・クロクワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。
シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1

SW-041(L)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始		+0～ノビエ 2.5L(砂壌土は+3 ～)	1kg	○±	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	SU抵抗性コイキ [®] 1L SU抵抗性ダカ イ1.5L	+0～ノビエ2.5L		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始		+0～ノビエ 2.5L(砂壌土は+3 ～)		○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ2.5L		○	○
田植同時散布可能															
滅水深: 2cm/日以下															
使用上の注意: ※浅植え、植付け精度不良等で悪害を生じることがある。															
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。															
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。															

A-1

SW-043-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヒ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壇土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期		○前	+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期		○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生 期					○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期		○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期		○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期		○前			○	○

田植同時散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミス'カ'ヤツリには効果が劣る。

A-1

SW-062 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヒ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壇土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生 期			+0～ノビエ2.5L	500ml	●	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期					○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期					○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期					●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期					●	○
九州	○2.5	○	○2	○始	○2	○2			○発生 期					●	○

田植同時散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミス'カ'ヤツリには効果が劣る。

A-1

SYJ-108 シャンホ'

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヒ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壇土
北海道	○3	○	○2	○2		○2		○始	○発生 期	○再生 前～始	○始	+5～ノビエ3L	30g×10 ²	○	○
東北	○3	○	○2	○2	○2	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○始	シズイ草丈3cm		○	○
北陸	○3	○	○2		○2	○2	●始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○始			○	○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○始	+1～ノビエ3L		○	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○始	+1～ノビエ3L(砂 壌土は+5～)		○	○
九州	○3	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○始	+5～ノビエ3L		○	○

※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な障害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミス'カ'ヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。
シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

SYJ-156-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヒ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壇土
北海道	○3	○	○2	○2		○2		○始	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズ'イ草丈3L SU抵抗性59カレイ2L	+0～ノビエ3L(砂 壌土は+5～)	1kg	○	○
東北	○3	○	○2	○2	○2	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズ'イ草丈3cm SU抵抗性59カレイ2L			○	○
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

田植同時散布可能
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

SYJ-157-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	●始	●始	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	1kg	●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性ナシ・LL SU抵抗性ナシ・LL		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始	●始	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ 2.5L(砂壌土は+3 ～)		○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

田植同時散布可能
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
滅水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

SYJ-167-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1.5	○	○始	○始					○発生 期			+0～ノビエ1.5L	1kg	●	○
東北	○1.5	○	○始	○始	○始									○	○
北陸	○2	○	○始		○始							+0～ノビエ2L		○	○
関東・東海	○2	○	○2		○始				○前						○
近・中・四	○2	○	○始		○始				○前			+0～ノビエ2L(砂 壌土はノビエ1.5L まで)		●	○
九州	○1.5	○	○始		○始							+0～ノビエ1.5L		●	○

田植同時散布可能
滅水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

TH-501 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	40g×100		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始				●	●
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期					●*	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●

滅水深: 2cm/日以下
使用上の注意: *:浅植え、植付け精度不良等で薬害を生じることがある。
5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

TH-501 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	500ml		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期					●	●
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始				●*	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
近・中・四 (普)	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●

滅水深: 2cm/日以下
使用上の注意: *:浅植え、植付け精度不良等で薬害を生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

TH-501-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 埋土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	1kg		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始				●	●
北陸	●2.5	●	●始		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始				●*	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: *: 浅植え、植付け精度不良等で薬害を生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

TH-547(Z) ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 埋土
北海道	○3	○	○2	○2		○2		●始※	○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ3L	40g×10 ³		○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ2.5L		●	○
北陸	○3	○	○2		○始	○始	●始※	●始※	○発生 期			+5～ノビエ3L		○	○
関東・東海	○3	○	○3		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	コキヤガラ: 始			●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ2.5L		○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	●再生 前～始 (藻類)	コキヤガラ: 始			●	○

※: オモダカ・クログワイ防除は、有効薬剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ・コキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

TH-547(Z) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 埋土
北海道	○3	○	○2	○2		○2		●始※	○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ3L	500ml		○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	シズイ: 草丈3cm	+5～ノビエ2.5L		○	○
北陸	○2.5	○	○始		○始	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始				●	○
関東・東海	○3	○	○3		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	コキヤガラ: 始	+5～ノビエ3L		●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ2.5L			○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	●再生 前～始	コキヤガラ: 始			●	○

※: オモダカ・クログワイ防除は、有効薬剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ・コキヤガラ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

TH-547(Z)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 埋土
北海道	○3	○	○2	○2		○2		●始※	○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ3L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2		○2	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	コキヤガラ: 始	+5～ノビエ2.5L		○	○
北陸	○3	○	○2		○2	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ3L		○	○
関東・東海	○3	○	○3		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	コキヤガラ: 始			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ2.5L		○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	●再生 前～始	コキヤガラ: 始			○	○

※: オモダカ・クログワイ防除は、有効薬剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ・コキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

TH-601 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期	●再生 前～始		+0～ノビエ2.5L	500ml		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始				●	●
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期		●前				●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

TH-601-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期	●再生 前～始		+0～ノビエ2.5L	1kg		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始				●	●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始				●再生 前～始					●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前 (藻類)				●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

THI-913CS シャンホ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸															
関東・東海	○2	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始		+0～ノビエ2L	50g×10コ	●	○
近・中・四	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-2 体系処理(初期)

A-2

AKD-7138 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道											○盛	移植後藻類発生 始～盛期	500ml		○
東北											○盛			●	○
北陸											○盛			○	○
関東・東海															
近・中・四															
九州															

水口処理可能
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意:

A-2

AKD-7155 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'キ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壌土
北海道	○1	○	○始	○始							○始	+0～ノビエ1L	500ml	●	○
東北	○1	○	○始	○始	○始						○始	植代後～4, +0～ ノビエ1L		○	○
北陸	○1	○	○前		○前						○前			●	○
関東・東海	○1	○	○始		○前						○始			●	○
近・中・四	○1	○	○始		○前						●前				○
九州	○1	○	○始		○始						○始				○

水口処理可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 深水条件では薬害を生じることがある。

A-2

KPP-314 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'キ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壌土
北海道															
東北	○1	○										植代時～4, +0～ ノビエ1L	500ml		○
北陸	○1	○												○	○
関東・東海															
近・中・四															
九州															

植代時は土壌混和処理(混和時水深3～5cm、混和深2～3cm)
使用上の注意: 深水条件では薬害を生じることがある。

A-2

MAT-159 シ'ヤンホ'

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'キ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壌土
北海道	○1	○	○始	○始								+1～ノビエ1L	50g×10 ³	○	○
東北	○1	○	○始	○始	○前		○前※					植代後～4, +1～ ノビエ1L		○	○
北陸	○1	○	○始		○前		○前							○	○
関東・東海	○1	○	○始		○始		○前※							○	○
近・中・四	○1	○	○始		○始		●前							○	○
九州	○1	○	○始		○始									○	○

※: クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-2

NSK-850 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'キ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壌土
北海道	○1	○										植代後～4, +0～ ノビエ1L	500ml		○
東北	○1	○													○
北陸	○1	○													○
関東・東海 (管)	○1	○										植代後～4, +0～ ノビエ1L			○
近・中・四 (管)	○1	○													○
九州 (管)	○1	○												○	○

使用上の注意:

A-2

SL-4901-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道																
東北	●1	●	●始		●始	●前			●発生 期				植代後～4, +0～ ノビエ1L	1kg		●
北陸	●1	●	●前		●前	●前			●発生 前						●	●
関東・東海																
近・中・四																
九州																

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

A-2

SL-498E-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1.5	○	○始	○始					○発生 前		○前		+0～ノビエ1.5L	1kg	○	○
東北	○1.5	○	○始	○始	○始	○始					○前		植代後～4, +0～ ノビエ1.5L		○	○
北陸	○1.5	○	○始		○始	○始					●前				○	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 前		○前				○	○
近・中・四	○1.5	○	○始		○始	○始					○始		+0～ノビエ1.5L(普 通期の砂壌土はノ ビエ1Lまで)		○	○
九州	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期				+0～ノビエ1.5L		○	○

田植同時散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

A-2

RYH-118-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1	○											+0～ノビエ1L	1kg	○	○
東北	○1	○											植代後～4, +0～ ノビエ1L		○	○
北陸	○1	○													○	○
関東・東海	○1	○													○	○
近・中・四	○1	○													○	○
九州	○1	○													○	○

一発処理型除草剤の前処理として使用する。
田植同時散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 深水条件では悪害を生じることがある。

A-2

YH-650 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1.5	○	○始	○始					○発生 期				+0～ノビエ1.5L	500ml	○	○
東北	○1.5	○	○始	○始		○前			○発生 期				植代後～4, +0～ ノビエ1.5L		○	○
北陸	○1.5	○	○始			○始		○前	○発生 期						○	○
関東・東海	○1.5	○	○始			○始		○前※	○発生 期			SU抵抗性ホタルイ始			○	○
近・中・四	○1.5	○	○始			○始		○前	○発生 期						○	○
九州	○1.5	○	○始			○始		○前※	○発生 期						○	○

田植同時散布可能
※: オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: SU抵抗性ホタルイ防除は、有効な剤との組み合わせで使用。
オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-2

YH-650-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始			○発生 期			+0～ノビエ1.5L	1kg	○	○
東北	○1.5	○	○始	○始		○前			○発生 期			植代後～+4, +0～ ノビエ1.5L		○	○
北陸	○1.5	○	○始			○始		○前	○発生 期					○	○
関東・東海	○1.5	○	○始			○始		○前※	○発生 期					○	○
近・中・四	○1.5	○	○始			○始		○前	○発生 期					○	○
九州	○1.5	○	○始			○始		○前※	○発生 期					○	○

田植同時散布可能
※: オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
滅水深: 2cm/日以下
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-3 体系処理(中後期)

A-3

DASH-001 SC

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○5	○	○花茎 抽出始	○5		○4			○生育 期	○生育 期		+25～+40(イネ6L 以降、ノビエ5Lま で)	100mL散布 液量 100L)	○	○
東北	○5	○	○花茎 抽出始	○4	○4	○4	○草丈 20cm ※	○草丈 30cm ※	○生育 期	○生育 期	シズイ(生育期(20cm 以下)			○	○
北陸	○5	○	○花茎 抽出始		○4	○5	○草丈 30cm ※	○草丈 30cm ※	○生育 期	○生育 期				○	○
関東・東海	○5	○	○花茎 抽出始		○5	○5	○草丈 30cm ※	○草丈 30cm ※	○生育 期	○生育 期				○	○
近・中・四	○5	○	○花茎 抽出始		○5	○5	○草丈 30cm ※	○草丈 30cm ※	○生育 期	○生育 期	クサネム(生育期(草丈 20cm以下)			○	○
九州	○5	○	○花茎 抽出始		○6	○6			○生育 期	○生育 期				○	○

※: オモダカ・クロクワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
滅水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組合せで使用する。
落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。
オモダカ・クロクワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。
シズイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

DEH-112 乳(EW)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○6											+25～ノビエ6L	100ml (注)	○	○
東北	○6													○	○
北陸	○6													○	○
関東・東海	○6										キノコウスダノビエ*			○	○
近・中・四	○6										キノコウスダノビエ* アゼガヤ: 生育期(草 丈60cm以下)			○	○
九州	○6										キノコウスダノビエ* アゼガヤ: 生育期(草 丈60cm以下)			○	○

(注) 散布液量25～100L/10a。ただし、25～50L散布は少量散布用ノズルを使用。展着剤加用。
*: 再生茎3～6葉期(関東・東海～九州)、畦畔からの匍匐茎1m以内(関東・東海～九州)
畦畔からの侵入個体には全体にかける(関東・東海～九州)
滅水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

HOK-0721 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道															
東北	●5	●	●5	●5	●5	●4			●生育 期			+20～+40(イネ5L 以降、ノビエ5Lま で)	3kg	●	●
北陸	●4	●	●5		●5	●4			●生育 期			+20～+40(イネ5L 以降、ノビエ4Lま で)		●	
関東・東海	●4	●	●5		●5	●5			●生育 期					●	
近・中・四	●4	●	●5		●5	●4			●生育 期					●	
九州	●4	●	●5		●5	●5			●生育 期					●	

滅水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。
降雨などにより散布後2日間以上落水もしくは浅水状態が維持されないと効果が低下することがある。

A-3

KUH-031 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	○4	○	○4	○3		○4		○発生期 ～ 欠収期 出現後				+15～+35(ノビエ 4Lまで)	3kg	○	○
東北	○4	○	○4	○4	○3	○3	●草丈 15cm※	○発生期 ～ 欠収期 出現後						○	○
北陸	○4	○	○4		○3	○4		○発生期 ～ 欠収期 出現後						○	○
関東・東海	○4	○	○4		○4	○4	●草丈 15cm※	○発生期 ～ 欠収期 出現後						○	○
近・中・四	○4	○	○4		○4	○3	●草丈 15cm※	○発生期 ～ 欠収期 出現後						○	○
九州	○4	○	○4		○4	○4	●草丈 15cm※	○発生期 ～ 欠収期 出現後						○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な前処理剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: ごく浅水で散布し、2日間は入水しない。
散布後に降雨等で湛水されると効果が低下することがある。
前処理剤との組み合わせで使用する。
オモダカ・クログワイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

KUH-073-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	○3.5	○	○3	○2.5		○2.5		●発生 期			○始	+20～+35(イネ5L 以降、ノビエ3.5L まで)	1kg		○
東北	○3.5	○	○3	○2		○2		○発生 期			○始			○	○
北陸	○3.5	○	○3		○2	○2		○発生 期			○始			○	○
関東・東海	○3.5	○	○3		○3	○3		○発生 期			○前			●	○
近・中・四	○3.5	○	○3		○3	○3		●発生 期			○前			●	○
九州 (早)	○3.5	○	○3	○2	○4	○4		○発生 期							○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
著しい高温条件下では薬害を生じることがある。
散布後の低温および急激な気温の上昇により薬害を生じることがある。

A-3

NC-612-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	○3.5	○	○4	○3		○4		○生育期 (欠収期 3Lまで)	○発生 期	○再生 前～始	○始	+15～+35(ノビエ 3.5Lまで)	1kg	○	○
東北	○3.5	○	○3	○3	○3	○2	○生育期 (草丈30cm 以下)	○生育期 (欠収期 3Lまで)	○発生 期	○再生 前～始	○始			○	○
北陸	○3.5	○	○3		○3	○3	○生育期 (草丈30cm 以下)	○生育期 (欠収期 3Lまで)	○発生 期	○再生 前～始				○	○
関東・東海	○3.5	○	○3		○3	○3	○生育期 (草丈30cm 以下)	○生育期 (欠収期 3Lまで)	○発生 期	○再生 前～始	○始			○	○
近・中・四	○3.5	○	○3		○3	○3	○生育期 (草丈30cm 以下)	○生育期 (欠収期 3Lまで)	○発生 期	○再生 前～始	○始			○	○
九州	○3.5	○	○4		○4	○4	○生育期 (草丈30cm 以下)	○生育期 (欠収期 3Lまで)	○発生 期	○再生 前～始	○始			○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネ4L未満では、薬害を生じることがある(関東・東海)
前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

SB-551-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道													1kg		
東北															
北陸	○3	○	○3		○2	○2						+20～+30(イネ5L 以降、ノビエ3Lま で)		○	○
関東・東海	○3	○	○3		○2	○2		○発生 期						○	○
近・中・四	○3	○	○3		○2	○2		○発生 期				+15～+30(草類は +20～イネ5L以降、 ノビエ3Lまで)		○	○
九州	○3	○	○3		○2	●2		○発生 期				+15～+30(イネ5L 以降、ノビエ3Lま		○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の低温および急激な気温の上昇により薬害を生じることがある。
前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

SL-0401 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 埴土
北海道															
東北	○4	○マツ バ	○4			○3			○生育 期			+14～+35(ノビエ 4Lまで)	50g×10a	○	○
北陸	○4		○3			○2			○生育 期						○
関東・東海	●3		●4			●3			●発生 期			+14～+35(ノビエ 3Lまで)			●
近・中・四	●3		●3			●2			●発生 期						●
九州	○3		○4	○2		○4			○生育 期						○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

A-3

SL-0401 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 埴土
北海道															
東北	○4	○マツ バ	○4	○3		○3			○生育 期			+14～+35(ノビエ 4Lまで)	22g(散布 液量 500ml)	○	○
北陸	○4		○3			○2			○生育 期						○
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

SL-0401-0.5kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 埴土
北海道															
東北															
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

使用上の注意:

A-3

SL-0401-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 埴土
北海道	○4		○4	○3		○4			○生育 期			+20～+35(ノビエ 4Lまで)	1kg	○	○
東北	○4		○4	●4		○3	○草丈 10cm※		○生育 期		※2'イ: 草丈10cm	+7～+35(ノビエ4L まで)		○	○
北陸	○4		○4			○3			○生育 期					○	○
関東・東海	○4		○4			○3			○生育 期		※ウキヤガラ: 草丈 10cm	+7～+35(ノビエ4L まで)		○	○
近・中・四	○4		○4			○4	○草丈 10cm		○生育 期					○	○
九州	○4		○4			○3			○生育 期		※ウキヤガラ: 発生始			○	○

※: クロクワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

クロクワイ・ウキヤガラ・シズイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

SL-0401-1kg(1.5kg/10a処理)粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 〜 埴土
北海道	○5		○4	○4		○4			○生育 期			+30〜+40(ノビエ 5Lまで)	1.5kg	○	○
東北	○5		○花茎 抽出始	●4		○4	○草丈 15cm※		○生育 期		シズイ:草丈15cm	+14〜+40(ノビエ 5Lまで)		○	○
北陸	○5		○4			○4			○生育 期			+14〜+40(ノビエ 5Lまで)		○	○
関東・東海	○5		○5			○4	○草丈 15cm※		○生育 期		コウキヤガラ:草丈 15cm			○	○
近・中・四	○5		○5			○4	○草丈 15cm		○生育 期					○	○
九州	○5		○5			○4			○生育 期		コウキヤガラ:発生始			○	○

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 滅水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

SL-0601-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 〜 埴土
北海道															
東北	○4	○	○4	●4		○3	○草丈 10cm※		○生育 期	○再生 前〜始		+14〜+35(ノビエ 4Lまで)	1kg	●	○
北陸	○4	○	○3			○3	●草丈 10cm		○発生 期	○再生 前〜始				○	○
関東・東海	○4	○	○4			○3	○草丈 10cm※		○生育 期	○再生 前〜始	コウキヤガラ:発生始 SL0601粒剤:コウキ・3L	+14〜+35(ノビエ 4Lまで)			○
近・中・四	○4	○	○4			○3	○草丈 10cm		○生育 期			+14〜+35(ノビエ 4Lまで)		●	○
九州															

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 滅水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

SL-0604-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 〜 埴土
北海道	○4	○	○4	○4		○3			○発生 期		○始	+14〜+35(イネ4L 以降、ノビエ4Lま で)	1kg		○
東北	○4	○	○4	○3 4	○3 4	○3 4	○草丈 10cm※	○矢じり 葉抽出 前※	○生育 期		●始	+14〜+35(イネ4L 以降、ノビエ4Lま で)		●	○
北陸	○4	○	○4		○3	○3	○草丈 10cm	○矢じり 葉抽出 前※	○発生 期		○始			○	○
関東・東海	○4	○	○4		○4	○3	○草丈 10cm※	○矢じり 葉抽出 前※	○発生 期		○始	コウキヤガラ:発生始			○
近・中・四	○4	○	○4		○3	○3	○草丈 10cm	○矢じり 葉抽出 前※	○生育 期		○始			●	○
九州 (早)	○4	○	○4	●始	○4	○4			○発生 期		●始	+14〜+35(イネ4L 以降、ノビエ4Lま で)		●	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 滅水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 暑い高温条件では葉害を生じることがある。
 オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

SL-0611 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオネ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クログ'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 埴土	
北海道																
東北	○5		○4	○5		○5	○生育期 (草丈10cm以下)※		○生育期			コウキヤガラ:生育期 (草丈20cm以下)	+14〜+40(イネ4L以降、ノビエ5Lまで) ▽	30g(散布液量100L)	●	○
北陸	●5		●4			●4	○生育期 (草丈20cm以下)※		●生育期							●
関東・東海	○5		○5			○5	○生育期 (草丈20cm以下)※		○生育期			コウキヤガラ:生育期 (草丈20cm以下)	+14〜+40(イネ4L以降、ノビエ5Lまで)		●	○
近・中・西	●5		●5			●4	○生育期 (草丈20cm以下)※		●生育期				+14〜+40(イネ4L以降、ノビエ5Lまで) ▽		●	○
九州	●4		●5			●6			●生育期				+14〜+40(イネ4L以降、ノビエ4Lまで) ▽		●	○

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

滅水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。
クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

SL-0613 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	塩土 ～ 塩土
北海道																
東北	○5	○	○花茎 抽出始	○4	○5	○4	○生育期 (草丈30cm 以下)※	○(草丈 30cm以下) ※	○生育 期	○生育 期			+14～+40(イネ4L 以降、ノビエ5Lま で)	1000g(散 布後量100 %)		○
北陸	●5	●	●4		●4	●4	●生育期 (草丈30cm 以下)※	●(草丈 30cm以下) ※	●生育 期	●再生 前～始					●	
関東・東海	○5	○	○5		○5	○4	○生育期 (草丈30cm 以下)※	○(草丈 30cm以下) ※	○生育 期	○生育 期			コキヤカラ：生育期 (草丈30cm以下)		●	○
近・中・四	○5	○	○5		○5	○5	○生育期 (草丈30cm 以下)※	○(草丈 30cm以下) ※	○生育 期	○生育 期					●	○
九州	●4	●	●花茎 抽出始		●6	●6	○生育期 (草丈30cm 以下)※	○(草丈 30cm以下) ※	○生育 期	○生育 期			+14～+40(イネ4L 以降、ノビエ4Lま で)			●

※：発生盛期～矢じり薬抽出期
※：オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深：2cm/日以下

使用上の注意： 移植後の低温および急激な気温の上昇により被害を生じることがある(関東・東海)。
前処理剤との組み合わせで使用する。
落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。
降雨などにより散布後2日間以上落水もしくは浅水状態が維持されないとも効果が低下することがある。
オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

SW-051-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ グカ	ミズガヤ ツリ	ウリカバ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土 ～ 塩土	塩土 ～ 塩土
北海道															
東北	○3.5	○	○3		○3	○3	○草丈 20cm※	○広葉 形葉4L ※	○発生 前～始	○再生 前～始		+20～+30(ノビエ 3.5Lまで)	1kg	○	○
北陸	○3.5	○	○3		○3	○3	●草丈 20cm	○広葉 形葉4L ※	○発生 前～始	○再生 前～始				●	○
関東・東海	○3.5	○	○3		○4	○3	○草丈 20cm※	○広葉 形葉4L ※	○発生 前～始	○再生 前～始				○	○
近・中・四	○3.5	○	○3		○3	○3			○発生 前～始	○再生 前～始				○	○
九州	○3.5	○	○3		○4	○4			○発生 前～始	○再生 前～始				○	○

※：オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深：2cm/日以下
使用上の注意： 前処理剤との組み合わせで使用。
オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。
クログワイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用。(東北・北陸)
クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。(関東・東海)

A-3

SW-063-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ グカ	ミズガヤ ツリ	ウリカバ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土 ～ 塩土	塩土 ～ 塩土
北海道	○5	○	○3	○4		○4		●※	○発生 前～始			+25～+40(イネ4L 以降、ノビエ5Lま で)	1kg	●	○
東北	○5	○	○花茎 抽出始	○4	○5	○2		●※	○発生 前～始			+25～+40(ノビエ 5Lまで)		○	○
北陸	○5	○	○5		○4	○3	●草丈 30cm	●※	○生育 期	○生育 期				○	○
関東・東海	○4	○	○5		○4	○4		●※	○生育 期	○生育 期		+25～+40(ノビエ 4Lまで)		●	○
近・中・四	○4	○	○5		○3	○4	●草丈 30cm	●※	○生育 期					●	○
九州	○5	○	○5		○5	○6	●草丈 30cm※	●※	○生育 期			+25～+40(ノビエ 5Lまで)		●	○

※：発生盛期～矢じり薬抽出期(草丈30cm以下)
※：オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深：2cm/日以下
使用上の注意： 前処理剤との組み合わせで使用。
オモダカ・クログワイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用。

A-3

TH-913(H) 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ グカ	ミズガヤ ツリ	ウリカバ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土 ～ 塩土	塩土 ～ 塩土
北海道		○	○2	○2		○2			○発生 前～始	○再生 前～始		+10～+30	3kg	○	○
東北		○	○2		○2	○2	○始※		○発生 前～始	○再生 前～始				●	○
北陸		○	○2		○2	○2								●	○
関東・東海		○	○2		○2	○2	○始※		○発生 前～始	○再生 前～始				○	○
近・中・四 (※)		○	○2		○2	○2	○始※		○発生 前～始	○再生 前～始	○前			○	○
九州 (※)		○	○2		○2	○2	○始※		●発生 前～始	●再生 前～始				○	○

※：クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深：2cm/日以下
使用上の注意： 前処理剤との組み合わせで使用。
クログワイ、シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-4 特殊雑草対象(エンノサヤヌカグサ)

A-4 エンノサヤヌカグサ

BCH-031-1kg 粒

地域名	対象雑草: エノノサヤヌカグサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 エンノサヤヌカグサ

BCH-032-1kg 粒

地域名	対象雑草: エノノサヤヌカグサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 エンノサヤヌカグサ

BCH-033-1kg 粒

地域名	対象雑草: エンノサヤヌカグサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 エンノサヤヌカグサ

BCH-052 フロアブル

地域名	対象雑草: エンノサヤヌカグサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	500ml
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 エンノサヤヌカグサ

BCH-053 フロアブル

地域名	対象雑草： エノノサヤヌカグサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	500ml
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意：			

A-4 エンノサヤヌカグサ

KPP-445 フロアブル

地域名	対象雑草： エンノサヤヌカグサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	500ml
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意：			

A-4 特殊雑草対象(オモダカ)

A-4 オモダカ

BCH-031-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始		1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海	○	始	※	
近・中・四				
九州				
※:オモダカ防除は、有効な後処理剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する(東北・関東・東海)。 オモダカ防除は有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用する(北海道)。				

A-4 オモダカ

BCH-032-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始		1kg
東北	○	始	※	
北陸	●	始		
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

BCH-033-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始		1kg
東北	●	始	※	
北陸	●	始		
関東・東海				
近・中・四				
九州	○	始	※	
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

BCH-044-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	○	始	※	
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

BCH-045H-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

BCH-045L-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	○	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

BCH-052 フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始		500ml
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

BCH-053 フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始		500ml
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

DPX-84ND(L) 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				3kg
東北				
北陸				
関東・東海	○	始		
近・中・四	○	始		
九州	○	始		

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

HOK-0301-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始	※	1kg
東北	●	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な後処理剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する(東北、北陸)。
 オモダカ防除は有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用する(北海道、関東・東海、近畿・中国・四国、九州)。

A-4 オモダカ

HSW-051-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始		1kg
東北				
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

HSW-052 フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始		500ml
東北				
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

KPP-2012 フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始	※	500ml
東北	●	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-4 オモダカ

KUH-021-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	○	始	※	1kg
東北	○	始	※	
北陸	○	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	○	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な後処理剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する(東北、北陸、九州)。
オモダカ防除は有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用する(北海道、関東・東海、近畿・中国・四国)。

A-4 オモダカ

KUH-041-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	○	始	※	1kg
東北	○	始	※	
北陸	○	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	○	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な後処理剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する(東北、北陸)。
オモダカ防除は有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用する(北海道、関東・東海、近畿・中国・四国、九州)。

A-4 オモダカ

KUH-985(L) フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸				
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	○	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

MY-100MS フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始		500ml
東北	●	始	※	
北陸	●	始		
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

NC-385SB 顆粒水和

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	○	始		80g(散布液量500ml)
東北				
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

NH-061-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始	※	1kg
東北	●	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・西	●	始	※	
九州	●	始	※	
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

NHF-401 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				3kg
東北	○	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

SB-556 フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:オモダカ防除は、有効な後処理剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

SB-563(L)-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	○	始		
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	●	始		
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

SB-564 シャンボ

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				30g×10回
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州	●	始	※	
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

SL-0613 顆粒水和

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1000g(散布液量100L)
東北	○	発生盛期～矢じり葉抽出期(草丈30cm以下)	※	
北陸	●	発生盛期～矢じり葉抽出期(草丈20cm以下)		
関東・東海	○	発生盛期～矢じり葉抽出期(草丈30cm以下)	※	
近・中・四	○	発生盛期～矢じり葉抽出期(草丈30cm以下)		
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

SL-496(L) 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				3kg
東北	○	始		
北陸	●	始		
関東・東海				
近・中・四				
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

SL-498-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	始		
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

SW-005(L) フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸	○	始		
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	●	始		
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

SW-042(L) シャンボ

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				35g×10 ³
東北				
北陸	○	始		
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	●	始		
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

SW-051-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	広線形葉4L	※	
北陸	○	広線形葉4L		
関東・東海	○	広線形葉4L	※	
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

SW-063-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道	●	発生盛期～矢じり葉抽出期(草丈30cm以下)	※	1kg
東北	●	発生盛期～矢じり葉抽出期(草丈30cm以下)	※	
北陸	●	発生盛期～矢じり葉抽出期(草丈30cm以下)	※	
関東・東海	●	発生盛期～矢じり葉抽出期(草丈30cm以下)	※	
近・中・四	●	発生盛期～矢じり葉抽出期(草丈30cm以下)	※	
九州	●	発生盛期～矢じり葉抽出期(草丈30cm以下)	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
SYJ-157-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	始		
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始		
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
TH-547(Z) シャンボ

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始	※	40g×10㎡
東北	●	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
TH-547(Z) フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始	※	500ml
東北	●	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
TH-547(Z)-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始	※	1kg
東北	●	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
YH-650 フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸	○	前		
関東・東海	○	前	※	
近・中・四	○	前		
九州	○	前	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 特殊雑草対象(クサネム)

A-4 クサネム

地域名	対象雑草: クサネム	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	草丈20cm	
近・中・四	●	草丈20cm	
九州			

使用上の注意:

A-4 特殊雑草対象(クログワイ)

A-4 クログワイ

BCH-031-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州	○	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な後処理剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する(東北・九州)。
 クログワイ防除は有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用する(関東・東海)。

A-4 クログワイ

BCH-032-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	始	※	
北陸	●	始		
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

BCH-033-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	始	※	
北陸	●	始		
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

BCH-044-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	○	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

BCH-045H-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

BCH-045L-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	○	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

BCH-052 フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

BCH-053 フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

DPX-84ND(L) 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				3kg
東北				
北陸				
関東・東海	○	始		
近・中・四				
九州	○	始		

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

HOK-0301 フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	●	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	●	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な後処理剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する(関東・東海・近畿・中国・四国・九州)。
クログワイ防除は有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用する(東北・北陸・九州)。

A-4 クログワイ

KPP-2012 フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸	●	前		
関東・東海	●	前	※	
近・中・四	●	前		
九州	●	前	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

KUH-021-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	始	※	
北陸	○	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	○	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な後処理剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する(東北・北陸・近畿・中国・四国・九州)。
クログワイ防除は有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用する(関東・東海)。

A-4 クログワイ

KUH-031 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				3kg
東北	●	草丈15cm	※	
北陸				
関東・東海	●	草丈15cm	※	
近・中・四	●	草丈15cm	※	
九州	●	草丈15cm	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

KUH-041-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	始	※	
北陸	○	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	○	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な後処理剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する(東北)。

クログワイ防除は有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用する(北陸、関東・東海、近畿・中国・四国、九州)。

A-4 クログワイ

MAT-159 ジャンボ

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				50g×10回
東北	○	前	※	
北陸	○	前	※	
関東・東海	○	前	※	
近・中・四	●	前		
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

NC-604 フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	○	始	※	
北陸	○	始		
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	●	始		
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

NH-061-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

SB-563(L)-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	○	始		
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	●	始		
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

SB-564 ジャンボ

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				30g×10㎡
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

SB-564 フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	○	始	※	
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	○	始		
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

SB-564-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	始	※	
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	○	始		
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

SL-0401-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	草丈10cm	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四	○	草丈10cm		
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

SL-0401-1kg(1.5kg/10a処理) 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1.5kg
東北	○	草丈15cm	※	
北陸				
関東・東海	○	草丈15cm	※	
近・中・四	○	草丈15cm		
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

SL-0601-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	草丈10cm	※	
北陸	●	草丈10cm		
関東・東海	○	草丈10cm	※	
近・中・四	○	草丈10cm		
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

SL-0602-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	草丈10cm	※	
北陸	●	草丈10cm		
関東・東海	○	草丈10cm	※	
近・中・四	○	草丈10cm		
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

SL-0611 顆粒水和

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				30g(散布液量100L)
東北	○	生育期(草丈20cm以下)	※	
北陸	●	生育期(草丈20cm以下)		
関東・東海	○	生育期(草丈20cm以下)	※	
近・中・四	○	生育期(草丈20cm以下)		
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: クログワイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

SL-0613 顆粒水和

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1000g(散布液量100L)
東北	○	生育期(草丈30cm以下)	※	
北陸	●	生育期(草丈30cm以下)		
関東・東海	○	生育期(草丈30cm以下)	※	
近・中・四	○	生育期(草丈30cm以下)		
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: クログワイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

SW-005(L) フォアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸	○	始		
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	●	始		
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

SW-042(L) シャンボ

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				35g×10a
東北				
北陸	○	始		
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	●	始		
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

SW-051-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	草丈20cm	※	
北陸	●	草丈20cm		
関東・東海	○	草丈20cm	※	
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: クログワイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する(東北・北陸)。
 クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する(関東・東海)。

A-4 クログワイ

SW-063-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	草丈30cm		
関東・東海				
近・中・四	●	草丈30cm		
九州	●	草丈30cm	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

SYJ-108 ジャンボ

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				30g×10 ³
東北	○	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	○	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

SYJ-157-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	始		
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始		
九州	●	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

TH-001 フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	○	前	※	
北陸				
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始		
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

TH-547(Z) ジャンボ

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				40g×10 ³
東北	●	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

TH-547(Z) フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	●	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

TH-547(Z)-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 特殊雑草対象(コウキヤガラ)

A-4 コウキヤガラ

G-315B 乳

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北			
北陸			
関東・東海	●	前	
近・中・四			
九州			

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

KPP-445(L) フロアブル

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州	●	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

KUH-021-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	○	始	
北陸			
関東・東海	○	始	
近・中・四			
九州	○	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する(東北、九州)。
 コウキヤガラ防除は有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用する(関東・東海)。

A-4 コウキヤガラ

KUH-041-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	○	始	
北陸			
関東・東海	○	始	
近・中・四			
九州	○	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

NC-612-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	○	草丈30cm	
北陸			
関東・東海	○	草丈30cm	
近・中・四			
九州	○	草丈30cm	

使用上の注意:

A-4 コウキヤガラ

SB-564 フロアブル

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州	○	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

SB-564-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州	○	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

SL-0401-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	○	草丈10cm	
近・中・四			
九州	○	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

SL-0401-1kg(1.5kg/10a処理) 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1.5kg
東北			
北陸			
関東・東海	○	草丈15cm	
近・中・四			
九州	○	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

SL-0601-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	○	始	
近・中・四			
九州	○	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

SL-0602-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	○	始	
北陸			
関東・東海	○	始	
近・中・四			
九州	○	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

SL-0604-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	○	始	
近・中・四			
九州	○	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

SST-402-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州			

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

SST-403フロアブル

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州			

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

SST-403-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州			

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

SST-404フロアブル

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北			
北陸			
関東・東海	○	始	
近・中・四			
九州	●	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

SST-404-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	●	始	
北陸			
関東・東海	○	始	
近・中・四			
九州	●	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

TH-001 シャンボ

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			40g×10 [□]
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州			

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

TH-001 フロアブル

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北	○	始	
北陸			
関東・東海	○	始	
近・中・四			
九州			

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

TH-122-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	○	始	
近・中・四			
九州	●	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

TH-224 フロアブル

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北			
北陸			
関東・東海	○	始	
近・中・四			
九州	●	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

TH-421 シャンボ

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			40g×10 [□]
東北			
北陸			
関東・東海	○	始	
近・中・四			
九州	●	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

TH-547(Z) シャンボ

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			40g×10 [□]
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州	●	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ
TH-547(Z) フロアブル

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州	●	始	
使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 コウキヤガラ
TH-547(Z)-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	●	始	
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州	●	始	
使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 特殊雑草対象(シズイ)

A-4 シズイ

ECH-045H-1kg 粒			
地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●		1kg
東北		草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意: シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 シズイ

DASH-001 SC			
地域名	対象雑草：シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			100ml(散布液量100L)
東北	●	生育期(草丈20cm以下)	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意：シズイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 シズイ

KPP-2005(H) フロアブル(少量散布)

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			300ml
東北	●	前	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意: シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 シズイ

NC-604-1kg 粒			
地域名	対象雑草： シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	●	草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・西			
九州			
使用上の注意： シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 シズイ

NH-051(H)-1kg 粒

地域名	対象雑草： シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	●	草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意： シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 シズイ

SL-0401-1kg 粒

地域名	対象雑草： シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	●	草丈10cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意： シズイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 シズイ

SL-0401-1kg(1.5kg/10a処理) 粒

地域名	対象雑草： シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1.5kg
東北	●	草丈15cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意： シズイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 シズイ

SST-404 フロアブル

地域名	対象雑草： シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北	●	草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意： シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 シズイ

SW-032 フロアブル

地域名	対象雑草： シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北	●	草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意： シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 シズイ

SYJ-156-1kg 粒

地域名	対象雑草： シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	●	草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意： シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 シズイ

TH-122-1kg 粒

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●		1kg
東北		草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意: シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 シズイ

TH-421 シャンボ

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●		40g×10 ³
東北		草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意: シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 シズイ

TH-547(Z) フロアブル

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●		500ml
東北		草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意: シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 特殊雑草対象(ミズアオイ)

A-4 ミズアオイ

BCH-032-1kg 粒

地域名	対象雑草: ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 ミズアオイ

BCH-033-1kg 粒

地域名	対象雑草: ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 ミズアオイ

BCH-052 フロアブル

地域名	対象雑草: ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	500ml
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 ミズアオイ

BCH-053 フロアブル

地域名	対象雑草: ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	500ml
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 ミズアオイ

HSW-051-1kg 粒

地域名	対象雑草： ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・西			
九州			
使用上の注意:			

A-4 ミズアオイ

HSW-052 フロアブル

地域名	対象雑草: ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	500ml
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 ミズアオイ

SW-032 フロアブル

地域名	対象雑草： ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	始	500ml
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 特殊雑草対象(SU抵抗性コナギ)

A-4 SU抵抗性コナギ

SL-0601-1kg 粒

地域名	対象雑草： SU抵抗性コナギ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	3L	
近・中・四			
九州			
使用上の注意：			

A-4 特殊雑草対象(SU抵抗性ホタルイ)

A-4 SU抵抗性ホタルイ

BCH-032-1kg 粒

地域名	対象雑草: SU抵抗性ホタルイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

B

BCH-045H-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 堆土
北海道～東北	●2.5	●	●2			●始			●発生 期	●再生 前～始		イネ1L～ノビエ2.5L	1kg		●

湛水条件で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

DASH-001 SC

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 堆土
金城	○5	○	○4	○4	○4	○4			○生育 期	○生育 期		イネ6L以降、ノビ エ5Lまで	100ml(散 布液量 100L)		○

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する
落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。

B

DEH-112 シ'ャンボ'

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 堆土
金城	●4											播種後10日目以 降、ノビエ4Lまで	50g×20、 30g (但し50g ×20gは ノビエ3L まで)		●

湛水条件で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する
水深5～6cmの湛水条件で投入し、少なくとも1日間は十分な水位を維持する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、薬害や効果不足が生じることがある。

B

HOK-222-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 堆土
北海道～東北	●2	●	●2			●始			●発生 期	●再生 前～始		イネ1L～ノビエ2L	1kg		●

湛水条件で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

HOK-223 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 堆土
北陸～九州	●2.5	●	●2		●2	●始				●再生 前～始		イネ1L～ノビエ2.5L	500ml		●

湛水条件で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

KUH-004D-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 堆土
北陸～九州	●3	●	●2		●2	●2						イネ1L～ノビエ3L	1kg		●

湛水条件で使用する。
減水深2cm/日以下
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

KUH-021-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壇土
全域	●3	●	●2		●2	●2				●再生 前～始		イネ出芽後～ノビエ 3L	1kg		●

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 処理後に出芽したイネは生育抑制を受けることがある。
イネの根が露出する条件では薬害を生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

B

KUH-911 液

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壇土
東北～九州	○5	○										ノビエ3L～ノビエ 5L(入水前)	100～ 200ml(散 布液量 100L)		○

乾田直播

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 処理後黄化症状がみられる場合があり、高温条件では生育抑制を伴うことがある。

B

NC-331 水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壇土
関東・東海～九 州		○	○前		○前	○前			○発生 期	○再生 前～始		入水前10～2日 (イネ2L以降、雑 草草丈30cm以下)	90～ 180g(散 布液量 100L)		○

乾田直播乾田条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

B

NC-385SB 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壇土
東北～九州	○2.5	○	○2		○2	○2						イネ1L～ノビエ 2.5L	80g(散布 液量 500ml)	●	○

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

NC-385SB-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壇土
東北～九州	○2.5	○	○2		○始	○始				○再生 前～始		イネ1L～ノビエ 2.5L	1kg	●	○

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

NH-051(H) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壇土
北海道～東北	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生 期	●再生 前～始		イネ1L～ノビエ 2.5L	500ml		●

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

NH-301-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北陸～近・中・四	●2.5	●	●2									イネ1L～ノビエ 2.5L	1kg		●

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

SB-551-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北陸～九州	○3	○	○3		○2	○始						イネ4L～ノビエ3L	1kg	●	○

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の低温および急激な気温の上昇により薬害を生じることがある。

前処理剤との組み合わせで使用する。

B

SL-0401-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
全域	○3 4		○3			○2						イネ3L以降、ノビ エ4Lまで(九州は ノビエ3Lまで)	1kg		○

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する

B

SL-0401-1kg(1.5kg/10a処理) 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
全域	○4		○4			○3						イネ3L以降、ノビ エ4Lまで	1.5kg		○

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する

B

SL-0611(乾直入水前) 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
東北～近・中・四	●5											イネ2L以降、ノビ エ5Lまで(入水前)	30g(散布 液量 100L)		●

乾田直播 乾田条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

B

SL-0612 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロク'ワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
東北～近・中・四	●5											イネ2L以降、ノビ エ5Lまで(入水前)	30g(散布 液量 100L)		●

乾田直播 乾田条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

B

SW-032 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロダ'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道～東北	○2.5	○	○2		○2								イネ1L～ノビエ 2.5L	500ml		○

湛水直播

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

SW-042(L) シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロダ'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北陸～九州	○2.5	○	○2		○2	○始							イネ1L～ノビエ 2.5L	35g×10コ		○

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、薬害や効果不足が生じることがある。

B

SW-043-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロダ'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
東北～九州	●2.5	●	●2		●2	●始							イネ1L～ノビエ 2.5L	1kg		●

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

SW-751 粒(少量散布)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロダ'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
東北～近・中・四	●1	●	●始										+0～ノビエ1L	1.5kg		●

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 後処理剤との体系で使用する。

B

SW-991-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロダ'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
全域	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期				イネ1L～ノビエ 2.5L	1kg	●	○

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

TH-224 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガヤ ツリ	ウリカワ	クロダ'ワイ	オモダ'カ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道～近・中・ 四	○2.5	○	○2	○2	○2	○始				○再生 前～始			イネ1L～ノビエ 2.5L	500ml		○

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

使用基準の更新

以下の剤について、使用基準を策定した。

1. 過去の使用基準を元に現行の様式による使用基準を策定。
2. 過去の使用基準に特殊雑草対象の本年度判定結果を加え、使用基準を策定。

A 移植栽培

A-1 一発処理

A-1

BCH-045H-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前		+0～ノビエ2.5L	1kg		○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ・草丈3cm			○	○
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

田植同時散布可能
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
滅水深: 2cm/日以下
使用上の注意: オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

KPP-445 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始		○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性オモダカ:2L SU抵抗性ヒルムシロ:1L SU抵抗性セリ:2L	+0～ノビエ1.5L	500ml	○	○
東北	○1.5	○	○始		○始	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ・草丈3cm SU抵抗性オモダカ:2L			○	○
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

田植同時散布可能
滅水深: 2cm/日以下
使用上の注意: オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

KPP-445(L) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'カヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ
北海道																
東北																
北陸	○1.5	○	○始		○始	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前		+0～ノビエ1.5L	500ml	○	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始		SU抵抗性オモダカ:始 SU抵抗性ヒルムシロ:1L SU抵抗性セリ:始			○	○
近・中・四	○1.5	○	○始		○始	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始					○	○
九州	○1.5	○	○始		○始	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズイ・草丈3cm			○	○

田植同時散布可能
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
滅水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミス'カヤツリには効果が劣る。
オモダカ・ミス'カヤツリ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。
クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

MY-100MS フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 増土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始		●始				+0～ノビエ1.5L	500ml	○	○
東北	○1.5	○	○始	○始	○始	○始		●始※						○	○
北陸	○1.5	○	○始		○始	○始		●始						○	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	○始		●始※			SU部試験時44L			○	○
近・中・四	○1.5	○	○始		○始	○始								○	○
九州	○1.5	○	○始		○始	○始								○	○

田植同時散布可能(近畿・中国・四国、九州)
 ※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

NC-604 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 増土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	○始		○発生 期	○再生 前～始				○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。
 シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

NC-604-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 増土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
近・中・四 (管)	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

SL-496(L) 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 増土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始			○発生 期				3～4kg		○
東北	○2	○	○2	○2	○始	○2		○始	○発生 期						○
北陸	○2	○	○2	○2	○始	○2		●始	○発生 期					○	○
関東・東海	○2	○	○2	○2	○始	○2			○発生 期				3～4kg(+0 ～+2(±3kg))	○	○
近・中・四	○2	○	○2		○始	○2			○発生 期					○*	○
九州	○2	○	○2		○2	○2		●始※	○発生 期					○	○

※:早期のみ
 ※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 砂壌土では著しい高温条件で葉害(白化)を生じることがある。
 泥炭質土壌では効果が低下することがある。
 オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

SL-498-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道															
東北	○2	○	○始	○始	○始	○始			○発生 期		○前	+0～ノビエ2L	1kg	○	○
北陸	○2	○	○2		○2	○2		●始			○前			○	○
関東・東海	○2	○	○2			○2		●始※			○前	イネタチ再生始		○	○
近・中・四	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期		○前			○	○
九州	○2	○	○2		○2	○2		●始※			○前			○	○

田植同時散布可能
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1

SST-403 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ1.5L	500ml	○	○
東北	○1.5	○	○始	○前	○始	○始	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	○始	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前	イネタチ再生始		○	○
近・中・四	○1.5	○	○始		○始	○始	○始		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

田植同時散布可能
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
クログワイ・ヨウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1

SW-005(L) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	○始	○始	○発生 期			+3～ノビエ2.5L	500ml	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	イネタチ再生始		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始	●始	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

水口処理可能
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1

SW-032 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壤土	
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		○始	○発生 期	○再生 前～始	○前	ゴジノサタコサ:2L シズイ:2L SU抵抗性オモダカ:2L	+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性オモダカ:2L シズイ:最大3cm			○	○
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

田植同時散布可能

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

SW-042(L) シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	○始	○始	○発生 期前～始	○再生 期前～始	○前	+3～ノビエ2.5L	35g×10コ	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期前～始	○再生 期前～始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始	●始	○発生 期前～始	○再生 期前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期前～始	○再生 期前～始	○前			○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 滅水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な葉害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

TH-001 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	○2.5	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期前～始	○再生 期前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	40g×10コ	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○始※		○発生 期前～始	○再生 期前～始	○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期前～始	○再生 期前～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期前～始	○再生 期前～始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始		○発生 期前～始	○再生 期前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期前～始	○再生 期前～始	○前			○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 滅水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な葉害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

TH-122-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		○始※	○発生 期前～始	○再生 期前～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○始※	○始※	○発生 期前～始	○再生 期前～始	○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始	○始※	○始※	○発生 期前～始		○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期前～始	○再生 期前～始	○前	+0～ノビエ2.5L		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期前～始	○再生 期前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期前～始	○再生 期前～始	○前			○	○

田植同時散布可能
 ※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 滅水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。
 コウキヤガラ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

TH-224 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 増土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	ノビエ散布3cm		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コウキヤガラ・始		○*	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コウキヤガラ・始		○	○

田植同時散布可能
※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
滅水深: 2cm/日以下
使用上の注意: * 浅植え、植付け精度不良等で被害を生ずることがある。
散布後の寒い・多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1

TH-421 シヤンホ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 増土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始		○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ2.5L	40g×10㎡	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	ノビエ散布3cm		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コウキヤガラ・始		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コウキヤガラ・始		○	○

※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
滅水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。
散布後の寒い・多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。
コウキヤガラ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-2

G-315B 乳

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 増土
北海道	○前	○	○前	○前								植代時(-4まで)	500～ 750ml	○	○
東北	○前	○	○前	○前	○前		○前※							○	○
北陸	○前	○	○前	○前	○前		○前※							○	○
関東・東海	○前	○	○前	○前	○前		○前※				コウキヤガラ・前		500～ 650ml	○	○
近・中・四	○前	○	○前		○前		○前※							○	○
九州	○前	○	○前		○前		○前※							○	○

土壌混和処理(混和時の水深3～6cm 混和深2～3cm)
※: クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
滅水深: 2cm/日以下
使用上の注意: クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-2

KPP-2005(H) フロアブル(少量散布)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 増土
北海道	○1	○	○始									+0～+5(ノビエ1L)	300ml	○	○
東北	○1	○	○始		○前		○前※				ノビエ散布	植代後～-4,+0～ +5(ノビエ1L)		○	○
北陸	○1	○	○始		○始									○	○
関東・東海	○1	○	○始		○始		○前※				コウキヤガラ・発生前			○	○
近・中・四	○1	○	○始		○始		○前※							○	○
九州	○1	○	○始		○始		○前※				コウキヤガラ・発生始			○	○

※クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
一発処理型除草剤の前処理として少量散布(300ml/10a)が可能。
滅水深: 2cm/日以下
使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。
コウキヤガラ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-2

KPP-2012 フロアフル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウサカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	高麗・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 増土
北海道	○1	○	○始	○始		○始		●始※				+0～ノビエ1L	500ml	○	○
東北	○1	○	○始	○前	○始	○始		●始※				植代後～4, +0～ ノビエ1L		○	○
北陸	○1	○	○始		○始	○前	●前	●始※						○	○
関東・東海	○1	○	○始		○始	○始	●前※	●始※						○	○
近・中・四	○1	○	○始		○始	○始	●前							○	○
九州	○1	○	○始		○始	○始	●前※	●始※						○	○

※: オモダカ・クロクワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 灌水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 深水条件では薬害を生じることがある。
 オモダカ・クロクワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

水稻関係除草剤使用基準の表示について

1. 過年度、既に実用化の認められている適用草種・土壌条件に○を印した。

(本年度の試験の結果、特に拡大のない場合も含む)

草種欄の数字、字句で草種ごとの葉齢を示した。

[例: ○始 (発生始)、○2 (2葉期まで)]

作期に限定がある場合は、地域名の後に適用作期を普通期:(普), 早期:(早)と記した。

使用上の注意は別途一覧表に添って文章で備考欄に記載した。

2. 本年度、新たに使用基準が作成された場合は、実用化可能となった適用草種・土壌に●を印し、
処理時期及び使用量を記載した。

3. 過年度の基準に適用条件拡大が可能となった場合、

作 期 の 拡 大 : 作期の限定がなくなった場合、作期の記載を取消線で消した。(例: (普))

草 種 の 拡 大 : 拡大された草種に●を印した。

葉 齢 の 拡 大 : 拡大された葉齢に、アンタ(例: ○2.5)

処理時期、使用量の拡大 : 拡大部分にアンダーラインを付した(例: +3～ノビエ2L, 100～150ml/10a)

土 壌 条 件 の 拡 大 : 拡大された土壌に●を印した。