

新登録除草剤・植物成長調整剤一覧

農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課
平成20年11月1日～平成21年3月31日

(1) 水稲作(移植・直播)

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作 物 名	適用雑草	適用地帯	適 用 土 壌	使用量	使用時期	使用 方法	使用回数	登録 会社
ピラノ レート・ フェントラ ザミド・ベ ンフレ セート水 和剤	チャンス タイムフロ アブル	4-(2,4-ジクロロベンゾイ ル)-1,3-ジメチル-5-ヒラ ゾリル-p-トルエンホルネ ート…26.0%、4-(2-クロロ フェニル)-N-シクロヘキシル -N-エチル-4,5-ジヒドロ 5-オキソ-1H-テトラゾール -1-カルボキサミド… 5.5%、2,3-ジヒドロ 3,3-ジメチルベンゾフラン- 5-イル=エタンホルネ ート…7.0%	水 和 剤	移植 水 稲	水田一年生雑 草、マツバイ、ホ ルイ、ウリカワ、ヘ ラオモダカ、ヒルムシロ	北海道	壤土～埴 土	500mL/ 10a	移植後20日～ エ2.5葉期 た だし、移植後30 日まで	原液 湛水 散布	本剤の使用回数… 1回、ピラノレートを含 む農薬の総使用回 数…2回以内、 フェントラザミドを含 む農薬の総使用回 数…1回、ベンフレ セートを含む農薬 の総使用回数…2 回以内	北海 三共 ㈱
イマノス ルフロ ン・ピラ クロニ ル・プロ モブチ ド粒 剤	バッチリ ジャンボ	1-(2-クロロイミダゾ[1,2- a]ピリジン-3-イルスルホニ ル)-3-(4,6-ジメチルピリ ミジン-2-イル)尿素… 2.25%、1-(3-クロロ- 4,5,6,7-テトラヒドロピラ ゾ[1,5-a]ピリジン-2-イ ル)-5-[メチル(プロパ-2- イル)アミ]ピラゾール-4- カルボニトリル…5.0%、 (RS)-2-プロモ-N-(α , α -ジメチルベンジル)- 3,3-ジメチルブチルアミ ド…22.5%	粒 剤	移植 水 稲	水田一年生雑 草、マツバイ、ホ ルイ、ヘラオモダカ (北海道、東 北)、ミスガヤツ (北海道を除 く)、ウリカワ、ヒ ルムシロ、セリ(北 陸を除く)	北海道、関東・ 東山・東海の 普通期及び早 期栽培地帯	壤土～埴 土	小包装 (パッ ク)10個 (400g)/ 10a	移植直後～ノ ビエ2.5葉期まで ただし、移植後30 日まで	水田 に小 包装 (パッ ク)の まま 投げ 入れ る。	本剤の使用回数… 1回、イマノスルフロ ンを含む農薬の総 使用回数…2回以 内、ピラクロニルを 含む農薬の総使用 回数…2回以内、プ ロモブチドを含む農 薬の総使用回数… 2回以内	協友ア クリ㈱
イマノス ルフロ ン・プロ モブチ ド・ベン トキサ ゾン 粒 剤	ヨシキタ ジャンボ	1-(2-クロロイミダゾ[1,2- a]ピリジン-3-イルスルホニ ル)-3-(4,6-ジメチルピリ ミジン-2-イル)尿素… 2.25%、(RS)-2-プロモ N-(α , α -ジメチルベン ジル)-3,3-ジメチルブ チルアミド…22.5%、3-(4-ク ロロ-5-シクロペンチルオキシ -2-フルオロフェニル)-5-イ ソプロピルピリジン-1,3-オキサ ゾリジン-2,4-ジオン… 9.75%	粒 剤	移植 水 稲	水田一年生雑 草、マツバイ、ホ ルイ、ヘラオモダカ (東北)、ミスガヤ ツ、ウリカワ、ヒ ルムシロ、セリ	東北	砂壤土～ 埴土	小包装 (パッ ク)10個 (400g)/ 10a	移植直後～ノ ビエ1.5葉期 た だし、移植後30 日まで	水田 に小 包装 (パッ ク)の まま 投げ 入れ る。	本剤の使用回数… 1回、イマノスルフロ ンを含む農薬の総 使用回数…2回以 内、プロモブチドを 含む農薬の総使用 回数…2回以内、 ベントキサゾンを含 む農薬の総使用回 数…2回以内	住友 化学 ㈱、科 研製 薬㈱
ダイム ロン・フ ェン トラザ ミド・ プロモ ブチド ・ベン スル フロ ンメ チル 水 和 剤	イノーバ DXアップ Lフロア ブル	1-(α , α -ジメチルベン ジル)-3-(パラリル)尿 素…8.2%、4-(2-クロロ フェニル)-N-シクロヘキシル -N-エチル-4,5-ジヒドロ 5-オキソ-1H-テトラゾール -1-カルボキサミド… 5.5%、(RS)-2-プロモ N-(α , α -ジメチルベン ジル)-3,3-ジメチルブ チルアミド…13.7%、メチル= α -(4,6-ジメチルピリ ミジン-2-イルカルバモイルス ルファモイル)-o-トルア ート…0.90%	水 和 剤	移植 水 稲	水田一年生雑 草、マツバイ、ホ ルイ、ヘラオモダカ (九州)、ミスガヤ ツ、ウリカワ、ヒ ルムシロ、セリ	全域(北海道、 東北を除く)の 普通期及び早 期栽培地帯	壤土～埴 土	500mL/ 10a	移植直後～ノ ビエ2.5葉期 た だし、移植後30 日まで	原液 湛水 散布	本剤の使用回数… 1回、ダイムロンを含 む農薬の総使用回 数…3回以内(育苗 箱散布は1回以内、 本田では2回以 内)、フェントラザミ ドを含む農薬の総 使用回数…1回、プ ロモブチドを含む農 薬の総使用回数… 2回以内、ベンスル フロンメチルを含む 農薬の総使用回 数…2回以内	ハイ エル クロ ップ サイ エン ス㈱
ベントキ サゾン水 和剤	サインヨ シフロア ブル	3-(4-クロロ-5-シクロペン チルオキシ-2-フルオロフェ ニル)-5-イソプロピルピリ ジン-1,3-オキサゾリジン-2,4- ジオン…8.6%	水 和 剤	移植 水 稲	水田一年生雑 草、マツバイ	東北	壤土～埴 土	500mL/ 10a	移植直後～ノ ビエ1.5葉期 た だし、移植後30 日まで	原液 湛水 散布	本剤の使用回数… 2回以内、ベントキ サゾンを含む農薬 の総使用回数…2 回以内	科 研製 薬 ㈱
						北陸	砂壤土～ 埴土					

(1) つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作 物 名	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使 用 量	使 用 時 期	使 用 方 法	使 用 回 数	登 録 会 社	
ビリブチ カルブ・ プレチラ クロール 乳剤	北海三共 シリング乳 剤	O-3-tert-ブチルフェニル =6-メキシ-2-ピリジル(メ チル)チオカルバート... 12.0%、2-クロロ-2',6'- ジエチル-N-(2-プロホキ シエチル)アセトアニド... 8.0%	乳 剤	移植 水稲	水田一年生雑 草、マツハイ、ホタ ルイ、ミスガヤツリ、 ヘラオモダカ(北海 道)	全域の普通期 及び早期栽培 地帯(九州を除 く)	砂壤土～ 埴土(減 水深2cm/ 日以下、 但し早期 栽培は1 cm/日以下)	500mL/ 10a	植代時～移植4 日前まで	原液 湛水 散布	本剤の使用回数... 1回、ビリブチカル ブを含む農薬の総 使用回数...2回以 内、プレチラクロ ールを含む農薬の総 使用回数...2回以 内	北海 三共 ㈱	
						九州の普通期 及び早期栽培 地帯	砂壤土～ 埴土(減 水深1cm/ 日以下)						
				水田一年生雑 草、マツハイ、ホタ ルイ	北海道	北海道	埴土～埴 土(減水 深1.5cm/ 日以下)	300・ /10a (少量散 布)	植代時～移植4 日前まで(移植 後に使用する 除草剤との体 系で使用)				
						東北	砂壤土～ 埴土(減 水深 1.5cm/日 以下)						
						北陸、関東・東 山・東海の普 通期栽培地帯	砂壤土～ 埴土(減 水深 2cm/日 以下)						
						近畿・中国・四 国の普通期裁 培地帯	砂壤土～ 埴土(減 水深 1.5cm/日 以下)						
						九州の普通期 栽培地帯	砂壤土～ 埴土(減 水深1cm/ 日以下)						
						九州の早期裁 培地帯	砂壤土～ 埴土(減 水深1.5 cm/日以下)						
					水田一年生雑 草、マツハイ、ホタ ルイ	北海道	北海道	埴土～埴 土(減水 深2cm/ 日以下)	移植直後～移 植後5日(ビエ1 葉期まで)(移植 後に使用する 除草剤との体 系で使用)				
							東北	砂壤土～ 埴土(減 水深 1.5cm/日 以下)					
						北陸、関東・東 山・東海の早 期栽培地帯	埴土～埴 土(減水 深1cm/ 日以下)						
						関東・東山・東 海及び近畿・ 中国・四国の 普通期栽培地 帯	砂壤土～ 埴土(減 水深2cm/ 日以下)						
						近畿・中国・四 国の早期栽培 地帯	埴土～埴 土(減水 深1cm/日 以下)						
						九州の普通期 栽培地帯	砂壤土～ 埴土(減 水深1cm/ 日以下)						
						九州の早期裁 培地帯	砂壤土～ 埴土(減 水深1.5 cm/日以下)						

(1) つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作 物 名	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使 用 量	使 用 時 期	使 用 方 法	使 用 回 数	登 録 会 社
プロモブ チド・ベン スルフロ ンメチル・ ベントキ サンゾノ粒 剤	クミアイク サカリテイ オー1キ ロ粒剤51	(RS)-2-プロモ-N-(α , α -ジメチルベンジル)- 3,3-ジメチルブチルアミ ド...9.0%、メチル= α - (4,6-ジメチルシビリミジン- 2-イルカルバモイルスルファ モイル)- α -トルアート... 0.51%、3-(4-クロロ-5- シクロペンチルオキシ-2-フ ルオロフェニル)-5-イソプロ ピリデン-1,3-オキサゾリジ ン-2,4-ジオン...3.9%	粒 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑 草、マツハイ、ホタ ルイ、ミズガヤツ リ、ウリカワ、クログ ワイ、オモダカ、ヒル ムシロ(関東・東 山・東海、九 州)、セリ(北陸を 除く)、コウキヤガ ラ(関東・東山・東 海、九州)、アミ ドロ・藻類による 表層はく離(北 陸を除く)	全域(北海道、 東北を除く)の 普通期及び早 期栽培地帯	砂壤土～ 埴土	1kg/10 a	移植直後～ビ エ1.5葉期 だ だし、移植後30日 まで	湛水 散布	本剤の使用回数... 1回、プロモブチドを 含む農薬の総使用 回数...2回以内、 ベンスルフロンメチ ルを含む農薬の総 使用回数...2回以 内、ベントキサンゾ ンを含む農薬の総使 用回数...2回以内	クマイ 化学 工業 有限 会社
プロモブ チド・ベン スルフロ ンメチル・ ベントキ サンゾノ水 和剤	クミアイク サカリテイ オーLフ ロアブル	(RS)-2-プロモ-N-(α , α -ジメチルベンジル)- 3,3-ジメチルブチルアミ ド...16.5%、メチル= α - (4,6-ジメチルシビリミジン- 2-イルカルバモイルスルファ モイル)- α -トルアート... 0.94%、3-(4-クロロ-5- シクロペンチルオキシ-2-フ ルオロフェニル)-5-イソプロ ピリデン-1,3-オキサゾリジ ン-2,4-ジオン...7.2%	水 和 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑 草、マツハイ、ホタ ルイ、ミズガヤツ リ、ウリカワ、クログ ワイ、オモダカ、ヒル ムシロ、セリ、アミ ドロ・藻類による 表層はく離(北 陸、九州)	全域(北海道、 東北を除く)の 普通期及び早 期栽培地帯	砂壤土～ 埴土	500mL/ 10a	移植直後～ビ エ1.5葉期 た だし、移植後30日 まで	原液 湛水 散布	本剤の使用回数... 1回、プロモブチドを 含む農薬の総使用 回数...2回以内、 ベンスルフロンメチ ルを含む農薬の総 使用回数...2回以 内、ベントキサンゾ ンを含む農薬の総使 用回数...2回以内	クマイ 化学 工業 有限 会社
プロモブ チド・ベン スルフロ ンメチル・ ベントキ サンゾノ水 和剤	クミアイク サカリテイ オーフロ アブル	(RS)-2-プロモ-N-(α , α -ジメチルベンジル)- 3,3-ジメチルブチルアミ ド...16.5%、メチル= α - (4,6-ジメチルシビリミジン- 2-イルカルバモイルスルファ モイル)- α -トルアート... 1.4%、3-(4-クロロ-5-シ クロペンチルオキシ-2-フ ルオロフェニル)-5-イソプロ ピリデン-1,3-オキサゾリジ ン-2,4-ジオン...7.2%	水 和 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑 草、マツハイ、ホタ ルイ、ヘラオモダカ (北海道)、ミズガ ヤツ(東北)、ウリ カワ、クログワイ(東 北)、オモダカ、シ ズイ(東北)、ヒル ムシロ、セリ、アミ ドロ・藻類による 表層はく離	北海道、東北	砂壤土～ 埴土	500mL/ 10a	移植直後～ビ エ1.5葉期 だ だし、移植後30日 まで	原液 湛水 散布	本剤の使用回数... 1回、プロモブチドを 含む農薬の総使用 回数...2回以内、 ベンスルフロンメチ ルを含む農薬の総 使用回数...2回以 内、ベントキサンゾ ンを含む農薬の総使 用回数...2回以内	クマイ 化学 工業 有限 会社
プロモブ チド・ベン スルフロ ンメチル・ ベントキ サンゾノ粒 剤	クミアイク サカリテイ オー1キ ロ粒剤75	(RS)-2-プロモ-N-(α , α -ジメチルベンジル)- 3,3-ジメチルブチルアミ ド...9.0%、メチル= α - (4,6-ジメチルシビリミジン- 2-イルカルバモイルスルファ モイル)- α -トルアート... 0.75%、3-(4-クロロ-5- シクロペンチルオキシ-2-フ ルオロフェニル)-5-イソプロ ピリデン-1,3-オキサゾリジ ン-2,4-ジオン...3.9%	粒 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑 草、マツハイ、ホタ ルイ、ヘラオモダ カ、ミズガヤツ(東 北)、ウリカワ、ヒル ムシロ、クログワイ (東北)、オモダカ、 シズイ(東北)、セ リ、エゾノササカグ サ(北海道)、コウ キヤガラ(東北)、 アミドロ・藻類 による表層はく 離	北海道、東北	砂壤土～ 埴土	1kg/10 a	移植直後～ビ エ1.5葉期 た だし、移植後30日 まで	湛水 散布	本剤の使用回数... 1回、プロモブチドを 含む農薬の総使用 回数...2回以内、 ベンスルフロンメチ ルを含む農薬の総 使用回数...2回以 内、ベントキサンゾ ンを含む農薬の総使 用回数...2回以内	クマイ 化学 工業 有限 会社
オキサジ クロメホ ン・クロメ ブロップ シメトリ ン・ベン スルフロ ンメチル 粒剤	キモワザ1 キロ粒剤 51	3-[1-(3,5-ジクロロフェ ニル)-1-メチルエチル]-3,4- ジヒドロ-6-メチル-5-フェ ニル-2H-1,3-オキサジン -4-オン...0.80%、 (RS)-2-(2,4-ジクロロ m-トリルオキシ)プロピオン アミド...3.5%、2-メチルチ オ-4,6-ビス(エチルアミノ) s-トリアジン...1.5%、メチ ル= α -(4,6-ジメチルシビ リミジン-2-イルカルバモイ ルスルファモイル)- α -トルア ート...0.51%	粒 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑 草、マツハイ、ホタ ルイ、ウリカワ、ミ ズガヤツ、ヒルム シロ、セリ、アミ ドロ・藻類による 表層はく離	関東・東山・東 海の普通期及 び早期栽培地 帯	埴土～埴 土	1kg/10 a	移植後5日～ ビエ2.5葉期但 し、移植後30日 まで	湛水 散布	本剤の使用回数... 1回、オキサジクロ メホンを含む農薬 の総使用回数...2 回以内、クロメブ ロップを含む農薬 の総使用回数...2 回以内、シメトリ ンを含む農薬の総 使用回数...2回以 内、ベンスルフロ ンメチルを含む農 薬の総使用回数... 2回以内	北興 化学 工業 有限 会社、 デュボ ン有限 会社

(1) つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作 物 名	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使 用 量	使 用 時 期	使 用 方 法	使 用 回 数	登 録 会 社
シメトリン・ ピリミノ バックメチ ル・ベン フレゼート・MCP B粒剤	クミメート SM1キロ 粒剤	2-メチルチオ-4,6-ビス(エ チルアミノ)-s-トリアジン... 4.5%, メチル=2-(4,6-ジ メトキシピリミジン-2-イルオ キシ)-6-(1-メトキシイミノエ チル)ベンゾエート... 1.0%, 2,3-ジ'ヒド'ロ 3,3-ジ'メチル'ベンゾフラン 5-イル=エタンスルホナ ート...6.0%, 2-メチル-4-ク ロロフェニルキナ酸エチ ル...2.4%	粒 剤	移植水稲	水田一年生雑 草、マツバ、ホタ ルイ、ウリカワ、ミズ ガヤツリ(北海道 を除く)、ヘラオモ タカ(北海道、東 北、九州)、ヒルム シロ、アオシロ・藻 類による表層 はく離(九州を 除く)	東北、北陸 北海道、関東・ 東山・東海、近 畿・中国・四国 の普通期及び 早期栽培地 帯、九州の早 期栽培地帯	砂壤土～ 埴土 埴土～埴 土	1kg/10 a	移植後20日～ノ ビエ3.5葉期 但 し、移植後30日 まで	湛水 散布	本剤の使用回数... 1回、シメトリンを含 む農薬の総使用回 数...2回以内、ピリ ミノバックメチルを含 む農薬の総使用回 数...2回以内、ベン フレゼートを含む 農薬の総使用回 数...2回以内、MC PBエチルを含む農 薬の総使用回数... 2回以内	クミメ 化学 工業 ㈱
フェントラ ザミド・ベ ンゾビシ クロン・ベン ゾフェ ナップ粒 剤	バイエル スマート1 キロ粒剤	4-(2-クロロフェニル)-N-ジ クロヘキシル-N-エチル 4,5-ジ'ヒド'ロ-5-オキソ 1H-テトラゾール-1-カルボ キザミド...2.0%, 3-(2-ク ロロ-4-メチルベンゾイル)- 2-フェニルチオビシクロ [3.2.1]オクタ-2-エン-4- オン...2.0%, 2-[4- (2,4-ジ'クロロ'-m-トルオイ ル)-1,3-ジ'メチル'ピラゾ ール-5-イルオキシ]-4'-メチ ルアセトフェノン...8.0%	粒 剤	移植水稲	水田一年生雑 草、マツバ、ホタ ルイ、ウリカワ、ミズ ガヤツリ、ヘラオモ タカ、ヒルムシロ	全域(北陸、近 畿・中国・四国 を除く)の普通 期及び早期裁 培地帯 北陸、近畿・中 国・四国の普 通期及び早期 栽培地帯	埴土～埴 土	1kg/10 a	移植直後～ノ ビエ2.0葉期 但 し、移植後30日 まで 移植直後～ノ ビエ2.5葉期 但 し、移植後30日 まで	湛水 散布	本剤の使用回数... 1回、フェントラザミ ドを含む農薬の総使 用回数...1回、ベン ゾビシクロンを含 む農薬の総使用回 数...2回以内、ベン ゾフェナップを含 む農薬の総使用回 数...2回以内	バイエル クロップ サイエ ンス㈱



協和発酵バイオの
農薬です

植物成長調整剤

ジベレリン協和 粉末・錠剤・液剤
ジベレリン協和 パスト
フルメット®液剤

協和発酵バイオ株式会社

〒100-8185 東京都千代田区大手町1-6-1

TEL.03-3282-0083

<http://www.kyowahakko-bio.co.jp/products/agrochemical/>



(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稲刈跡・畑作・野菜作・永年作物・非農耕地対象

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場所・ 適用土壌	使用量・ 散布液量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	会社名
フルミオ キサジン 水和剤	ダイロー ドWDG	N-(7-フルオロ-3,4-ジ ヒドロ-3-オキソ-4-プロ パ-2-イニル)-2H- 1,4-ベンゾキサジン- 6-イル)シクロヘキサ-1- エン-1,2-ジカルボキシミ ド…50.0%	水 和 剤	樹木等	一年生 広葉雑 草	-	公園、庭園、 堤とう、駐車 場、道路、運 動場、宅地、 のり面、鉄 道等	20～ 40g/10a、 希釈水量 100L/10a	生育初期(草 丈20cm以 下)	植栽地を除 く樹木等の 周辺地に雑 草茎葉散 布	本剤の使用回数… 3回以内、フルミオ キサジンを含む農 薬の総使用回数… 3回以内	㈱日本 クリーン・ア ンド・ガー デン
					多年生 広葉雑 草(キク 科を除 く)			40～ 80g/10a、 希釈水量 100L/10a				
グリホ サートイ ンプロビ ルアミン 塩・ピラ フルフェ ンエチル 水和剤	ネコソギ イックプロ シャワー	イソプロピルアンモニウム =N-(ホスホノメチル)グリ シナート…0.30%、エチ ル=2-クロロ-5-(4-クロ ロ-5-フルオロオキシ- 1-メチルピラゾール-3- イル)-4-フルオロフェニ シアセート…0.0016%	水 和 剤	樹木等	一年生 及び多 年生雑 草(スキ ナを除 く)	-	公園、庭園、 堤とう、道 路、運動場、 宅地、鉄道、 のり面等	100mL/m ² 原液散布	雑草生育期 (草丈30cm 以下)	植栽地を除 く樹木等の 周辺地に雑 草茎葉散 布	本剤の使用回数… 3回以内、グリホ サートインプロビ ルアミン塩を含む農薬 の総使用回数…3 回以内、ピラフル フェンエチルを含む 農薬の総使用回 数…3回以内	日本農 薬㈱
グリホ サートイ ンプロビ ルアミン 塩・MCPA イソプロ ビルアミ ン塩液剤	草退治 シャワー ワイド	イソプロピルアンモニウム =N-(ホスホノメチル)グリ シナート…1.3%、2-メ チル-4-クロロフェノキシ 酢酸イソプロビルアミ ン…0.25%	液 剤	樹木等	一年生 及び多 年生雑 草	-	公園、庭園、 堤とう、駐車 場、道路、運 動場、宅地、 のり面、鉄 道等	25～40mL/ m ² (原液散布)	雑草生育期	植栽地を除 く樹木等の 周辺地に雑 草茎葉散 布	本剤の使用回数… 3回以内、グリホ サートインプロビ ルアミン塩を含む農薬 の総使用回数…3 回以内、MCPAイ ソプロビルアミン塩 を含む農薬の総使 用回数…3回以内	住友化 学園芸 ㈱
グリホ サートイ ンプロビ ルアミン 塩・MCPA イソプロ ビルアミ ン塩液剤	草退治ワ イド液剤	イソプロピルアンモニウム =N-(ホスホノメチル)グリ シナート…33.2%、2-メ チル-4-クロロフェノキシ 酢酸イソプロビルアミ ン…6.2%	液 剤	樹木等	一年生 及び多 年生雑 草	-	公園、庭園、 堤とう、駐車 場、道路、運 動場、宅地、 のり面、鉄 道等	1～2mL/m ² 、 希釈水量 100mL/m ²	雑草生育期	植栽地を除 く樹木等の 周辺地に雑 草茎葉散 布	本剤の使用回数… 3回以内、グリホ サートインプロビ ルアミン塩を含む農薬 の総使用回数…3 回以内、MCPAイ ソプロビルアミン塩 を含む農薬の総使 用回数…3回以内	住友化 学園芸 ㈱
ナプロバ ミド水和 剤	クサレス 顆粒水和 剤	2-(α -ナフトキシ)- N,N-ジエチルプロピオ ンアミド…51.0%	水 和 剤	日本芝	一年生 イネ科雑 草	-	-	400～ 600g/10a、 希釈水量200 ～300L/10a	雑草発生前 (芝生育期)	全面土壌 散布	本剤の使用回数… 3回以内、ナプロバ ミドを含む農薬の総 使用回数…3回以 内	ユービー エル・ヤ ハン(株)、 日本農 薬㈱
オリザリ ン・ベスロ ジン粒剤	ビバデル ン粒剤	3,5-ジニトロ- N ⁴ ,N ⁴ -ジ-シ-プロピル スルファニルアミド… 1.1%、N-フチル-N-エ チル- α , α , α -トリフル オロ-2,6-ジニトロ-p- トルイジン…1.1%	粒 剤	日本芝 (生産園 場、ゴルフ 場)	畑地一 年生雑 草	-	-	10～ 20kg/10a	春期雑草発 生前(芝生育 期)	全面土壌 散布	本剤の使用回数… 2回以内、オリザリ ンを含む農薬の総使 用回数…2回以 内、ベスロジンを含 む農薬の総使用回 数…2回以内	ユービー エル・ヤ ハン(株)
					畑地一 年生イ ネ科雑 草				秋期雑草発 生前(芝生育 期)			

(2) つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場所・ 適用土壌	使用量・ 散布流量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	会社名		
DCMU 水和剤	サンケイ カーメック スD、 カーメック スーD	3-(3,4-ジクロロフェニル)-1,1-ジメチル尿素…80.0%	水 和 剤	だいず	一年生 雑草	-	-	70～ 100g/10a、 希釈水量70 ～100L/10a	は種覆土後 ～発芽前	全面土壌 散布	本剤の使用回数… 1回、DCMUを含む農薬の総使用回数…1回	琉球産 経緯、 第一農 薬㈱		
				ばれいしよ					植付覆土後					
				さとうきび				100～ 150g/10a、 希釈水量70 ～100L/10a	植付覆土後 又は培土後		本剤の使用回数… 2回以内、DCMUを含む農薬の総使用回数…2回以内 (土壌散布は1回以内)			
					広葉雑草			100～ 150g/10a、 希釈水量 100L/10a	雑草生育期 (草丈15cm以下)ただし、 収穫90日前まで	雑草茎葉 散布				
				りんご	一年生 雑草			100～ 200g/10a、 希釈水量70 ～100L/10a	雑草発芽前	全面土壌 散布	本剤の使用回数… 1回、DCMUを含む農薬の総使用回数…1回			
				もも、かき、かんきつ、うめ				200～ 400g/10a、 希釈水量-	雑草生育期	雑草茎葉 散布				
				桑				100～ 200g/10a、 希釈水量70 ～100L/10a	雑草発芽前	全面土壌 散布				
				パイナップル				150～ 200g/10a、 希釈水量100 ～150L/10a	植付直後雑草発芽前					
				水田作物(水田畦畔)				寒地を除く地域	水田畦畔	150～ 300g/10a、 希釈水量70 ～100L/10a	雑草発生前～雑草発生初期		散布(茎葉兼土壌処理)	
				樹木等				-	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面等	300～ 600g/10a、 希釈水量100 ～200L/10a	雑草発生前～生育初期		植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布又は全面土壌散布	本剤の使用回数… 3回以内、DCMUを含む農薬の総使用回数…3回以内
	多年生 広葉雑草	1000～ 2000g/10a、 希釈水量100 ～200L/10a	生育初期～生育中期											
ピラフル フェンエチル水和 剤	芝用エコ バートFL	エチル=2-クロロ-5-(4-クロロ-5-ジフルオロメチル)-1-メチルピラゾール-3-イル)-4-フルオロフェノキシアセート…2.0%	水 和 剤	日本芝(こうらいしば)	一年生 広葉雑草	-	-	150～ 200mL/10a、 希釈水量100 ～200L/10a	芝休眠期(雑草生育初期)	雑草茎葉散布	本剤の使用回数… 1回、ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数…1回	㈱ニチノ緑化		
				西洋芝(ペンタグラス)				100～ 150mL/10a、 希釈水量100 ～200L/10a	秋期芝生育期(雑草生育初期)		本剤の使用回数… 1回、ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数…3回以内			
				コケ類				200～ 400mL/10a、 希釈水量100 ～200L/10a	春夏期芝生育期(コケ類生育期)		本剤の使用回数… 2回以内、ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数…3回以内			
MDBA 液剤	日曹バンペルーD液剤	2-メキシ-3,6-ジクロロ安息香酸ジメチルアミン…50.0%	液 剤	芝	一年生及び多年生 広葉雑草	-	-	100～ 200mL/10a、 希釈水量 100L/10a	雑草生育初期	雑草茎葉散布	本剤の使用回数… 3回以内、MDBAを含む農薬の総使用回数…3回以内	日本曹達㈱		
				樹木等	一年生 広葉雑草			200～ 400mL/10a、 希釈水量 100L/10a		植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布				
				牧草	キシキン			75～ 100mL/10a、 希釈水量 100L/10a	秋期最終刈取後30日以内	雑草茎葉散布	本剤の使用回数… 1回、MDBAを含む農薬の総使用回数…1回			

(2) つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場所・ 適用土壌	使用量・ 散布流量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	会社名
グリホ サートイン プロピル アミン塩・ プロマシ ル液剤	パワーボ ンバー・ 草退治 シャワー ロング ロング	イソプロピルアンモニウム =N-(ホスホノメチル)グリ シナート...2.0%、5-プ ロモ-3-セコンダリーフチ ル-6-メチルウシル... 0.40%	液 剤	樹木等	一年生 雑草、 多年生 雑草	-	公園、庭園、 堤とう、駐車 場、道路、運 動場、宅地 等	40~80mL/ ㎡	雑草生育期 (草丈30cm 以下)	植栽地を除 く樹木等の 周辺地に雑 草茎葉散 布兼全面 土壌散布	本剤の使用回数... 2回以内、グリホ サートインプロピル アミン塩を含む農薬 の総使用回数...3 回以内、プロマシル を含む農薬の総使 用回数...2回以内	丸和パ イオカ ル㈱、住 友化学 園芸㈱
オリザリン 水和剤	サーフ ラ-DF	3,5-ジニトロ N',N'-4-ジプロピル スルファニルアミド... 85.0%	水 和 剤	日本芝 (生産園 場、ゴルフ 場)	畑地一 年生雑 草	-	-	100~ 200g/10a、 希釈水量200 ~300L/10a	雑草発生前 (芝生育期)	全面土壌 散布	本剤の使用回数... 2回以内、オリザリン を含む農薬の総使 用回数...2回以内	ユービー エルシ ヤバン ㈱
デブチウ ロン・DB N粒剤	クサダウ ンV粒剤	1-(5-tert-ブチル 1,3,4-チアジアゾール- 2-イル)-1,3-ジメチル 尿素...0.80%、2,6- ジクロロベンゾニリ ル...2.0%	粒 剤	樹木等	一年生 雑草、 多年生 広葉雑 草、スキ ナ	-	公園、庭園、 駐車場、道 路、運動場、 鉄道、宅地 等	15~30g/㎡	雑草発生前 ~生育初期	植栽地を除 く樹木等の 周辺地に雑 草茎葉散 布	本剤の使用回数... 3回以内、デブチウ ロンを含む農薬の 総使用回数...3回 以内、DBNを含む 農薬の総使用回 数...3回以内	北興産 業㈱
グリホ サートイン プロピル アミン塩・ MCPAイ ソプロピ ルアミン 塩液剤	カラソー ゼ	イソプロピルアンモニウム =N-(ホスホノメチル)グリ シナート...1.1%、2-メ チル-4-クロロフェノキシ 酢酸イソプロピルアミ ン...0.20%	液 剤	樹木等	一年生 及び多 年生雑 草	-	公園、庭園、 堤とう、駐車 場、道路、運 動場、宅地、 のり面等	25~50mL/ ㎡	雑草生育期 (草丈30cm 以下)	植栽地を除 く樹木等の 周辺地に雑 草茎葉散 布	本剤の使用回数... 3回以内、グリホ サートインプロピル アミン塩を含む農薬 の総使用回数...3 回以内、MCPAイ ソプロピルアミン塩 を含む農薬の総使 用回数...3回以内	丸和パ イオカ ル㈱
オキサジ クロメホ ン・ヨード スルプロ ンメチル ナトリウム 塩水和剤	ウィーデ ンWDG	3-[1-(3,5-ジクロロフェ ニル)-1-メチルエチル]- 3,4-ジヒドロ-6-メチル -5-フェニル-2H-1,3- オキサジノン-4-オン... 30.0%、メチル=4-ヨード -2-[3-(4-メチル-6- メチル-1,3,5-トリアジン -2-イル)ウレイトスルホ ニル]安息香酸、ナトリウム 塩...2.0%	水 和 剤	日本芝	一年生 雑草及 び多年 生広葉 雑草	-	-	75~ 100g/10a、 希釈水量200 ~300L/10a	雑草発生前	全面散布	本剤の使用回数... 2回以内、オキサジ クロメホンを含む農 薬の総使用回数... 2回以内、ヨードス ルプロンメチルナトリ ウム塩を含む農薬 の総使用回数...2 回以内	バリエル グロップ サイエン ス㈱
グリホ サートイン プロピル アミン塩・ 2,4-PA イソプロ ピルアミ ン塩液剤	クサトロ ー	イソプロピルアンモニウム =N-(ホスホノメチル)グリ シナート...10.0%、 2,4-ジクロロフェノキシ 酢酸イソプロピルアミ ン...5.0%	液 剤	樹木等	一年生 及び多 年生雑 草(スキ ナを除く)	-	公園、庭園、 堤とう、駐車 場、道路、運 動場、宅地、 のり面、鉄 道等	1500~ 3000mL/10a 、 希釈水量 100L/10a	雑草生育期 (草丈30cm 以下)	植栽地を除 く樹木等の 周辺地に雑 草茎葉散 布	本剤の使用回数... 3回以内、グリホ サートインプロピル アミン塩を含む農薬 の総使用回数...3 回以内、2,4-PA イソプロピルアミ ン塩を含む農薬の総 使用回数...3回以 内	インテック ㈱

(2) つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場所・ 適用土壌	使用量・ 散布流量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	会社名
MDBA 粒剤	日曹バン ペルーD 粒剤	2-メキシ-3,6-ジクロ 安息香酸…2.5%	粒 剤	日本芝	クロー バー、オオ バコ、ヤハ スソウ等 畑地一年生及 び多年生広葉 雑草	-	-	20kg/10a	雑草発生初 期～雑草発 生盛期	散布	本剤の使用回数… 3回以内、MDBA を含む農薬の総使 用回数…3回以内	日本曹 達(株)
				樹木等	一年生 広葉雑 草、多 年生広 葉雑 草、スキ ナ		公園、庭園、 堤とう、駐車 場、道路、運 動場、宅地、 のり面、鉄 道等	15～ 20kg/10a	雑草生育期 (草丈20cm 以下)	植栽地を除 く樹木等の 周辺地に全 面均一散 布		
MCPA ナトリウム 塩液剤	家庭園芸 用日産M CPソーダ 塩	2-メチル-4-クロロフェ ニル酢酸ナトリウム… 19.5%	液 剤	麦類	広葉雑 草	全域	全土壌	200～ 300g/10a、 希釈水量25 ～100L/10a	(春播麦類)5 葉期 但し 収穫45日前 まで	雑草茎葉 散布	本剤の使用回数… 1回、MCPAナトリ ウム塩を含む農薬 の総使用回数…1 回	日産化 学工業 (株)
						北海道、東北、北 陸		200～ 300g/10a、 希釈水量70 ～100L/10a	(秋播麦類) 幼穂形成期 但し収穫45 日前まで			
				日本芝		全域		2000g/10a、 希釈水量200 ～300L/10a	芝の生育期		本剤の使用回数… 3回以内、MCPA ナトリウム塩を含む 農薬の総使用回 数…3回以内	
				樹木等	一年生 及び多 年生広 葉雑 草、スキ ナ		公園、堤と う、駐車場、 道路、運動 場、宅地、の り面、鉄道 等	400～ 600g/10a、 希釈水量70 ～100L/10a	雑草生育期 (草丈30cm 以下)	植栽地を除 く樹木等の 周辺地に雑 草茎葉散 布		
エトキシス ルフロ ン・ヨードス ルフロ ンメ チルナトリ ウム塩水 和剤	クリアコン ビWDG	1-(4,6-ジメチルピ リジン-2-イル)-3-(2-エ トキシフェニル)キシル 尿素…12.5%、メチル =4-ヨード-2-[3-(4-メ トキシ-6-メチル-1,3,5- トリアジン-2-イル)ウレ イドスルホン]安息香 酸、ナトリウム塩… 1.25%	水 和 剤	日本芝	一年生 及び多 年生広 葉雑草	-	-	100～ 200g/10a、 希釈水量200 ～300L/10a	雑草発生前	全面散布	本剤の使用回数… 2回以内、エトキシス ルフロンを含む農 薬の総使用回数… 3回以内、ヨードス ルフロンメチルナトリ ウム塩を含む農薬 の総使用回数…2 回以内	ハイエル ク ロップサイ エンス(株)
クロリロ ンエチル 水和剤	アトラク ティブ	エチル=2-(4-クロロ-6- メトキシピリジン-2-イル カルバモイルスルファモ イル)ベンゾアート… 25.0%	水 和 剤	日本芝 (こうらい しば)	一年生 及び多 年生広 葉雑草	-	-	20～ 40g/10a、 希釈水量 200L/10a	雑草生育期	雑草茎葉 散布	本剤の使用回数… 3回以内、クロリロ ンエチルを含む農 薬の総使用回数… 3回以内	丸和バ イ オケミカ ル(株)、 デュボン (株)
フルミオ キサジン 水和剤	フルミオ WDG	N-(7-フルオロ-3,4-ジ ビロ-3-オキソ-4-プロ パ-2-ニル)-2H- 1,4-ベンゾキサジン- 6-イル)シクロヘキサ-1- エン-1,2-ジカルボキシ ド…50.0%	水 和 剤	だいず	一年生 広葉雑 草	-	砂壤土～ 埴土	5～10g/10a、 希釈水量 100L/10a	は種後出芽 前(雑草発生 前)	全面土壌 散布	本剤の使用回数… 1回、フルミオキサジ ンを含む農薬の総 使用回数…1回	住友化 学(株)
ピラゾス ルフロ ンエチル 水和剤	アグリ ン顆粒水 和剤	エチル=5-(4,6-ジメ チルピリジン-2-イルカル バモイルスルファモ イル)-1-メチルピラゾ ール-4- カルボキシレート… 70.0%	水 和 剤	日本芝	一年生 及び多 年生広 葉雑草	-	-	20～ 30g/10a、 希釈水量150 ～300L/10a	秋冬期雑草 生育期	散布	本剤の使用回数… 3回以内、ピラゾス ルフロンエチルを含 む農薬の総使用回 数…3回以内	日産化 学工業 (株)