

新登録除草剤・植物成長調整剤一覧

農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課
平成21年4月1日～平成21年10月31日

(1) 水稲作(移植・直播)

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物 名	適用雑草	適用地帯	適用 土壌	使用量	使用時期	使用 方法	使用回数	登録 会社
プレチラ クロー ル・ペン ゾビシ ロン水和 剤	ホクサン クサコン トフロア ブル	2-クロロ-2',6'-ジエチル N-(2-プロホキシエチル)アセ トアミド...7.6%, 3-(2-ク ロロ-4-メチルペンゾイル)- 2-フェニルチオビシクロ [3.2.1]オクタ-2-エン-4-オ ン...3.8%	水和 剤	移植 水稲	水田一年生 雑草、マツバ イ、ホタルイ、ミズ ガヤツリ(北海 道を除く)、ヘラ オモダカ(北海 道、九州)、ヒル ムシロ、シズイ(東 北)	全域の普通 期及び早期 栽培地帯	砂壤土 ～壇土	500mL/ 10a	移植直後～ヒ エ1.5葉期 だし、 移植後30日まで	原液湛 水散布 又は水 口施用	本剤の使用 回数...1回、 プレチラ ロールを含む 農薬の総使 用回数...2回 以内、ペン ゾビシロンを 含む農薬の 総使用回 数...2回以内	北海三 共興
ダイムロ ン・ペノ キススラ ム粒剤	フオロー アップ1 キロ粒剤	1-(α , α -ジメチルベンジ ル)-3-(パラトリル)尿素... 10.0%, 3-(2,2-ジフルオ ロエトキシ)-N-(5,8-ジメチ シ[1,2,4]リアゾロ[1,5-c]ピ リミジン-2-イル)- α , α , α - トリフルオロメチル-2-スル ホンアミド...0.60%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生 雑草、マツバ イ、ホタルイ、ヘ ラオモダカ(東 北)、ミズガヤツ リ、ウリカワ、ヒル ムシロ、セリ(北 陸、関東・東 山・東海)	東北、北陸 関東・東山・ 東海、近畿・ 中国・四国の 普通期及び 早期栽培地 帯 九州の普通 期及び早期 栽培地帯	砂壤土 ～壇土 壇土～ 壇土	1kg/10a	移植後25日～ヒ エ5葉期 だし、 収穫90日前まで 移植後25日～ヒ エ4葉期 だし、 収穫90日前まで 移植後25日～ヒ エ5葉期 だし、 収穫90日前まで	湛水散 布	本剤の使用 回数...1回、 ダイムロンを 含む農薬の 総使用回 数...3回以内 (育苗箱散布 は1回以内、 本田では2回 以内)、ペノ キススラムを 含む農薬の 総使用回数...2 回以内	三井化 学アグロ ン、タウ ゲミカル 本興
フルセト スルフロ ン粒剤	スケダチ 1キロ粒 剤	1-[3-[(4,6-ジメチルピ リジン-2-イルカルボニル)ス ルファモイル]-2-ピリジ ン]-2-フルオロプロピル- アセタート...0.22%	粒 剤	移植 水稲	ヒエ、コナギ、 ホタルイ、ウリカ ワ、ヒルムシロ、ヘ ラオモダカ(北海 道)	全域(九州を 除く)の普通 期及び早期 栽培地帯 九州の普通 期及び早期 栽培地帯	壇土～ 壇土 砂壤土 ～壇土	1kg/10a	移植後20日～ヒ エ4葉期 だし、 収穫45日前まで 移植後20日～ヒ エ3葉期 だし、 収穫45日前まで	湛水散 布	本剤の使用 回数...1回、 フルセトス ルフロンを 含む農薬 の総使用 回数...1回	石原産 業興、石 原バイオ サイエ ンス興
フルセト スルフロ ン水和 剤	スケダチ 顆粒	1-[3-[(4,6-ジメチルピ リジン-2-イルカルボニル)ス ルファモイル]-2-ピリジ ン]-2-フルオロプロピル- アセタート...10.0%	水和 剤	移植 水稲	ヒエ、マツバイ (東北)、ホタル イ、ヘラオモダ カ(東北)、ウリカ ワ、ヒルムシロ	東北 北陸	砂壤土 ～壇土 壇土～ 壇土	22g/10a、 希釈水量 500mL/ 10a	移植後14日～ヒ エ4葉期 但し移植 後30日まで	湛水散 布	本剤の使用 回数...1回、 フルセトス ルフロンを 含む農薬 の総使用 回数...1回	石原産 業興、石 原バイオ サイエ ンス興
フルセト スルフロ ン粒剤	スケダチ ジャンボ	1-[3-[(4,6-ジメチルピ リジン-2-イルカルボニル)ス ルファモイル]-2-ピリジ ン]-2-フルオロプロピル- アセタート...0.44%	粒 剤	移植 水稲	ヒエ、マツバイ (東北)、ホタル イ、ヘラオモダ カ(九州)、ウリカ ワ、ヒルムシロ	東北 北陸 九州の普通 期及び早期 栽培地帯	砂壤土 ～壇土 壇土～ 壇土	小包装 (パック) 10個 (500g)/ 10a	移植後14日～ヒ エ4葉期 但し収穫 45日前まで 移植後14日～ヒ エ3葉期 但し収穫 45日前まで	水田に 小包装 (パック)の まま投 げ入れ る。	本剤の使用 回数...1回、 フルセトス ルフロンを 含む農薬 の総使用 回数...1回	石原産 業興、石 原バイオ サイエ ンス興

(1) つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作 物 名	適用雑草	適用地帯	適用 土 壌	使用量	使用時期	使用 方法	使用回数	登録 会社
シメトリ ン・フル セトスル フロン・ ペンフレ セート粒 剤	ナイスミ ドル1キ ロ粒剤	2-メチルチオ-4,6-ビス(エチ ルアミノ)-s-トリアジン… 4.50%, 1-[3-[(4,6-ジメチ ルキシビリミジン-2-イルカルバ モイル)スルファモイル]-2-ビ リシール]-2-フルオロプロピル= メトキシセタート…0.22%, 2,3-シヒドロ-3,3-ジメチル ヘンゾフラン-5-イル=エタン スルホナート…6.00%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生 雑草、マツバ イ、ヘラオモダカ (北海道、東 北)、ミズガヤツリ (北海道を除 く)、ウリカワ、クロ グワイ(北海道、 九州を除く)、 オモダカ(北海 道、九州を除 く)、ヒルムシロ、コ ウキヤカラ(関 東・東山・東 海、九州)、アオ ミドロ、藨類に よる表層はく 離(東北、九州 を除く)	全域(九州を 除く)の普通 期及び早期 栽培地帯	壤土～ 埴土	1kg/10a	移植後14日～ビ エ4葉期 但し収穫 90日前まで	湛水散 布	本剤の使用 回数…1回、 シメトリンを含 む農薬の総 使用回数…2 回以内、フル セトスルフロ ンを含む農薬 の総使用回 数…1回、ペ ンフレセート を含む農薬の 総使用回 数…2回以内	石原産 業㈱
カルフェ ントラン ンエチ ル・フル セトスル フロン粒 剤	フル チャー ン1キ ロ粒 剤	(RS)-エチル=2-クロロ-3- [2-クロロ-5-(4-ジフルオロ メチル-4,5-シヒドロ-3-メチ ル-5-オキソ-1H-1,2,4-ト リアゾール-1-イル)-4-フル オロフェニル]プロピオナ ート…0.90%, 1-[3-[(4,6- ジメチルキシビリミジン-2-イルカ ルバモイル)スルファモイル]- 2-ビリシール]-2-フルオロプロ ピル=メトキシセタート… 0.22%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生 雑草、マツバ イ、ホタルイ、ヘ ラオモダカ(東 北)、ウリカワ、クロ グワイ(北陸、九 州を除く)、ヒル ムシロ、セリ、コウ キヤカラ(関東・ 東山・東海、 九州)	東北	埴土～ 埴土	1kg/10a	移植後14日～ビ エ4葉期 但し収穫 45日前まで	湛水散 布	本剤の使用 回数…1回、 カルフェントラ ンエチルを含 む農薬の総 使用回数…2 回以内、フルセ トスルフロ ンを含む農薬 の総使用回数…1 回	石原産 業㈱
アジムス ルフロ ン・カル フェン トラン ンエチ ル・フル セトス ルフロ ン粒 剤	フル フォース 1キ ロ粒 剤	1-(4,6-ジメチルキシビリミジン -2-イル)-3-[1-メチル-4- (2-メチル-2H-テトラゾール 5-イル)ピラゾール-5-イルス ルホニル]尿素…0.10%、 (RS)-エチル=2-クロロ-3- [2-クロロ-5-(4-ジフルオロ メチル-4,5-シヒドロ-3-メチ ル-5-オキソ-1H-1,2,4-ト リアゾール-1-イル)-4-フル オロフェニル]プロピオナ ート…0.90%, 1-[3-[(4,6- ジメチルキシビリミジン-2-イルカ ルバモイル)スルファモイル]- 2-ビリシール]-2-フルオロプロ ピル=メトキシセタート… 0.22%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生 雑草、マツバ イ、ホタルイ、ミ ズガヤツリ、ウリ カワ、クログワイ(北 陸、九州を除 く)、オモダカ(九 州を除く)、ヒル ムシロ(北陸、九 州を除く)、セリ (北陸を除く)、 コウキヤカラ(東 北、関東・東 山・東海、九 州)	東北、九州の 普通期及び 早期栽培地 帯	埴土～ 埴土	1kg/10a	移植後7日～ビ エ4葉期 但し収穫 45日前まで	湛水散 布	本剤の使用 回数…1回、 アジムスルフ ロンを含む農 薬の総使用 回数…1回、 カルフェントラ ンエチルを含 む農薬の総 使用回数…2 回以内、フルセ トスルフロ ンを含む農薬 の総使用回数…1 回	石原産 業㈱

(1) つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作 物 名	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使 用 量	使 用 時 期	使 用 方 法	使 用 回 数	登 録 会 社
カルフェ ントラン ンエチ ル・フル セトスル フロン粒 剤	フル チャー ンジャン ボ	(RS)-エチル-2-クロロ-3- [2-クロロ-5-(4-シフルオロ メチル-4,5-シヒドロ-3-メチ ル-5-オキソ-1H-1,2,4-ト リアゾール-1-イル)-4-フル オロフェニル]プロピオナ ト...1.8%, 1-(3-[(4,6-ジ メトキシヒリミシン-2-イルカル バモイル)スルファモイル]-2- ヒリシル)-2-フルオロプロピ ル=メトキシセクト... 0.44%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生 雑草、マツバ イ、ホタルイ、ウリカ ワ、ヒルムシロ、セリ	東北、北陸 九州の普通 期及び早期 栽培地帯	壤土～ 埴土	小包装 (パック) 10個 (500g)/ 10a	移植後7日～バエ 4葉期 但し収穫 45日前まで 移植後7日～バエ 3葉期 但し収穫 45日前まで	水田に 小包装 (パック)の まま投 げ入れ る。	本剤の使用 回数...1回、 カルフェントラ ンエチルを含 む農薬の総 使用回数...2回以 内、フルセトス ルフロンを含 む農薬の総 使用回数...1 回	石原産 業(株)
ピラクロ ニル・ブ ロモブチ ド・ベン スルフロ ンメチル 粒剤	日農イッ ボンジャン ボ	1-(3-クロロ-4,5,6,7-テ トヒドロピラゾル[1,5-a]ピリジ ン-2-イル)-5-[メチル(プロ パ-2-イル)アミノ]ピラゾ ル-4-カルボニル... 4.0%, (RS)-2-プロモ-N- (α , α -ジメチルベンジ ル)-3,3-ジメチルプロピ ド...18.0%, メチル= α - (4,6-ジメトキシヒリミシン- 2-イルカルバモイルスルファモ イル)-o-トルアト...1.5%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生 雑草、マツバ イ、ホタルイ、ヘ アオモダカ、ミズ ガヤツリ(東北)、ウ リカワ、ヒルムシロ、 セリ、アオドロ・ 藻類による表 層はく離(東 北)	北海道、東北	壤土～ 埴土	小包装 (パック) 10個 (500g)/ 10a	移植直後～バエ 2.5葉期 ただし、 移植後30日まで	水田に 小包装 (パック)の まま投 げ入れ る。	本剤の使用 回数...1回、 ピラクロニル を含む農薬の 総使用回 数...2回以 内、プロモブ チドを含む農 薬の総使用 回数...2回以 内、ベンスル フロニメチル を含む農薬の 総使用回 数...2回以内	日本農 薬(株)、 デュボン (株)
カフエン ストロー ル・ダイ ムロン・ ベンスル フロニメ チル・ベ ンノビシ クロン粒 剤	MICシ ロノックL ジャンボ	N,N-ジエチル-3-メチル ルホニル-1H-1,2,4-トリア ゾール-1-カルボキサミド... 7.1%, 1-(α , α -ジメチル ベンジル)-3-(パラトリル)尿 素...14.3%, メチル= α - (4,6-ジメトキシヒリミシン- 2-イルカルバモイルスルファモ イル)-o-トルアト...1.5%, 3-(2-クロロ-4-メチルベンジ ル)-2-フェニルチオビシクロ [3.2.1]オクタ-2-エン-4-オ ン...5.7%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生 雑草、マツバ イ、ホタルイ、ミズ ガヤツリ、ウリカ ワ、ヒルムシロ、クロ クワイ(北陸、関 東・東山・東 海、近畿・中 国・四国)、オ モダカ(北陸、関 東・東山・東 海、近畿・中 国・四国)、セリ、 アオドロ・藻類 による表層は く離(関東・東 山・東海を除 く)	全域(北海道、 東北を除く)の 普通期及び 早期栽培地 帯	砂壤土 ～埴土	小包装 (パック) 10個 (350g)/ 10a	移植後3日～バエ 2.5葉期 ただし、 移植後30日まで	水田に 小包装 (パック)の まま投 げ入れ る。	本剤の使用 回数...1回、 カフエンスト ロールを含む 農薬の総使 用回数...1 回、ダイムロン を含む農薬の 総使用回 数...3回以内 (育苗箱敷布 は1回以内、 本田では2回 以内)、ベンス ルフロニメチ ルを含む農 薬の総使用 回数...2回以 内、ベンノビ シクロンを含 む農薬の総 使用回数...2 回以内	三井化 学アグロ (株)
				直播 水稲	水田一年生 雑草、マツバ イ、ホタルイ、ミズ ガヤツリ、ウリカ	全域(北海道、 東北を除く)	壤土～ 埴土		稲1葉期～バエ 2.5葉期 ただし、 収穫90日前まで		本剤の使用 回数...1回、 カフエンスト ロールを含む 農薬の総使 用回数...1 回、ダイムロン を含む農薬の 総使用回 数...2回以 内、ベンスル フロニメチル を含む農薬の 総使用回 数...2回以 内、ベンノビ シクロンを含 む農薬の総 使用回数...2 回以内	

(1) つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作 物 名	適用雑草	適用地帯	適用 土壌	使用量	使用時期	使用 方法	使用回数	登録 会社
カブフェン ストロー ル・ダイ ムロン・ ペンシル ブロンメ チル・ペ ンノビシ クロン水 和剤	MICシ ロノック フロアブ ル	N,N-ジエチル-3-メチルス ルホニル-1H-1,2,4-トリア ゾール-1-カルボキサミド... 5.5%, 1-(α , α -ジメチル ベンジル)-3-(パラトリル)尿 素...10.0%, メチル= α - (4,6-ジメチルピリミジン- 2-イルカルバモイルスルファモ イル)- α -トルアート...1.0%, 3-(2-クロロ-4-メシルベンゾ イル)-2-フェニルチオベンジ クロ [3.2.1]オクタ-2-エン-4-オ ン...4.0%	水 和 剤	移植 水稻	水田一年生 雑草、マツハ イ、ホタルイ、ミズ ガヤツリ、ウリカ ワ、クログワイ(北 陸・関東・東 山・東海、近 畿・中国・四 国)、オモダカ (北陸・関東・ 東山・東海、 近畿・中国・ 四国)、ヒルムシ ロ、セリ(北陸を 除く)、アオビ ロ・藻類による 表層はく離 (北陸を除く)	全域(北海道、 東北を除く)の 普通期及び 早期栽培地 帯	砂壤土 ～埴土	500mL/ 10a	移植後3日～バ エ2.5葉期 だし、 移植後30日まで	原液湛 水散布 又は水 口施用	本剤の使用 回数...1回、 カブフェン ストロー ルを含む 農薬の総使 用回数...1 回、ダイム ロンを含 む農薬の 総使用回 数...3回以 内(育苗箱 散布は1回 以内)、ペ ンシルブ ロンメチ ルを含む 農薬の総 使用回数...2回以 内、ペン ノビシク ロンを含 む農薬の 総使用回 数...2回 以内	三井化 学アグ ロ(株)
				直播 水稻	水田一年生 雑草、マツハ イ、ホタルイ、ミズ ガヤツリ、ウリカ ワ	全域(北海道、 東北を除く)	壤土～ 埴土		稲1葉期～バ エ2.5葉期 だし、 収穫90日前まで	原液湛 水散布	本剤の使用 回数...1回、 カブフェン ストロー ルを含む 農薬の総使 用回数...1 回、ダイム ロンを含 む農薬の 総使用回 数...2回以 内、ペン シルブ ロンメチ ルを含む 農薬の総 使用回 数...2回以 内、ペン ノビシク ロンを含 む農薬の 総使用回 数...2回 以内	
ピラノ レート・ ベントキ ザン水 和剤	MICス ウィーブ フロアブ ル	4-(2,4-ジクロロベンゾイ ル)-1,3-ジメチル-5-ピラ ノール- α -トルエン スルホネート...20.0%, 3-(4-クロ ロ-5-シクロヘンチルオキシ-2-フ ルオロフェニル)-5-イソプロピ リデン-1,3-オキサゾリジン- 2,4-ジオン...4.0%	水 和 剤	移植 水稻	水田一年生 雑草、マツハ イ、ホタルイ、ヘ ラオモダカ(北海 道、東北)、ミ ズガヤツリ(北海 道を除く)、ウ リカワ、クログ ワイ(北海道、 東北を除く)、 オモダカ(近 畿・中国・四 国を除く)	北海道 全域(北海道 を除く)の普 通期及び早 期栽培地帯	砂壤土 ～埴土	500mL/ 10a	移植直後～バ エ1葉期 だし、 移植後30日 まで 植代後～移植 前4日又は移 植直後～バ エ1葉期だ し、移植後 30日まで	原液湛 水散布	本剤の使用 回数...1回、 ピラノレ ートを含 む農薬の 総使用回 数...2回以 内、ベント キザンを 含む農薬 の総使用 回数...2回 以内	三井化 学アグ ロ(株)

(1) つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作 物 名	適用雑草	適用地帯	適用 土壌	使用量	使用時期	使用 方法	使用回数	登録 会社
ジメタメトリン・ピラゾレート・プレチラクロール・プロモブチド粒剤	MICスラッシャ粒剤	2-メチルチオ-4-エチルアミノ-6-(1,2-ジメチルプロピルアミノ)-s-トリアシン... 0.20%, 4-(2,4-ジクロロペンゾイル)-1,3-ジメチル-5-ピラゾリル-p-トルエンシルホネート...4.0%, 2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(2-プロホキシエチル)アセトアニリド...1.5%, (RS)-2-プロモ-N-(α , α -ジメチルベンジル)-3,3-ジメチルプロピルアミド...2.0%	粒剤	移植 水稻	水田一年生雑草、マツバ、イ、ホタルイ、ウカワ、ミズカヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、アオミドロ・藻類による表層はく離	全域(北海道を除く)の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土 ～壇土	3kg/10a	移植直後～ビエ2葉期 ただし、移植後30日まで	灌水散布	本剤の使用回数...1回、ジメタメトリンを含む農薬の総使用回数...2回以内、ピラゾレートを含む農薬の総使用回数...2回以内、プレチラクロールを含む農薬の総使用回数...2回以内、プロモブチドを含む農薬の総使用回数...2回以内	三井化学アグロ(株)
シハロホップブチル・シメトリン・ベンフレゼート・MCPB粒剤	MICザーベックスDX1キログラム粒剤	ブチル(R)-2-[4-(4-シアノ-2-フルオロフェノキシ)プロピオナート... 1.5%, 2-メチルチオ-4,6-ビス(エチルアミノ)-s-トリアシン...4.5%, 2,3-ジヒドロ-3,3-ジメチルベンゾフラン-5-イル=エタンスルホネート... 6.0%, 2-メチル-4-クロロフェノキシ酢酸エチル...2.4%	粒剤	移植 水稻	水田一年生雑草、マツバ、イ、ホタルイ、ヘラオモダカ(北海道、東北、九州の早期)、ミズカヤツリ(北海道を除く)、ウカワ(東北を除く)、クログワイ(東北、関東、東山・東海、近畿・中国・四国)、オモダカ(九州の早期を除く)、ヒルムシロ(東北、北陸を除く)、エゾノササカグサ(北海道)、シズイ(東北)、アオミドロ・藻類による表層はく離(東北、北陸を除く)	全域(九州を除く)の普通期栽培地帯及び関東・東山・東海、近畿・中国・四国、九州の早期栽培地帯	砂壤土 ～壇土	1kg/10a	移植後20～30日(ビエ3.5葉期まで)[移植前後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用]	灌水散布	本剤の使用回数...1回、シハロホップブチルを含む農薬の総使用回数...3回以内、シメトリンを含む農薬の総使用回数...2回以内、ベンフレゼートを含む農薬の総使用回数...2回以内、MCPBエチルを含む農薬の総使用回数...2回以内	三井化学アグロ(株)
				直播 水稻	水田一年生雑草、マツバ、イ、ホタルイ、ミズカヤツリ、ウカワ、ヒルムシロ、アオミドロ・藻類による表層はく離	全域(九州を除く)			稲5葉期～ビエ3.5葉期まで 但し、収穫60日前まで[は種後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用]			

(1) つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物 名	適用雑草	適用地帯	適用 土壌	使用量	使用時期	使用 方法	使用回数	登録 会社
シメトリ ン・ベン プレセー ト・MCP B粒剤	MIC ザーベッ クスSM 粒剤	2-メチルチオ-4,6-ビス(エチ ルアミノ)-s-トリアシソ... 1.5%, 2,3-ジヒドロ-3,3- ジメチルヘンゾフラン-5-イル =エタンスルホナート...2.0%、 2-メチル-4-クロロフェノキシ 酪酸エチル...0.80%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生 雑草、マツバ イ、ホタルイ、ウカ リ、ヘラオモダカ、 ヒルムシロ、エゾノ サヤカグサ	北海道	砂壤土 ～ 埴土	3kg/10a	移植後20日～/ビ エ2.5葉期 ただし、 移植後30日まで	湛水散 布	本剤の使用 回数...1回、 シメトリンを含 む農薬の総 使用回数...2 回以内、ベン プレセートを含 む農薬の 総使用回 数...2回以 内、MCPBエ チルを含む農 薬の総使用 回数...2回以 内	三井化 学アグロ 例
					水田一年生 雑草、マツバ イ、ホタルイ、ウカ リ、ミスガヤツリ、 ヘラオモダカ、オモ ダカ、クロクワイ、 シズイ(東北)	東北、北陸	埴土～ 埴土					
					水田一年生 雑草、マツバ イ、ホタルイ、ウカ リ、ミスガヤツリ、 オモダカ、クロク ワイ	関東・東山・ 東海の普通 期及び早期 栽培地帯	砂壤土 ～ 埴土					
						近畿・中国・ 四国の普通 期及び早期 栽培地帯	埴土～ 埴土					
オキサジ アノン・ ブタク ロール乳 剤	デルカッ ト乳剤	5-ターシャリ-フタル-3- (2,4-ジクロロ-5-イソフ)ロホ キシフェニル)-1,3,4-オキサ ジアゾール-2(3H)-オン... 8.0%、2-クロロ-2',6'-ジシ エチル-1,3,4-オキサジ アゾール-2(3H)-オン...12.0%	乳 剤	移植 水稲	水田一年生 雑草、マツバ イ、ホタルイ、ヘラ オモダカ、ミスガ ヤツリ、クロクワイ (北海道を除 く)、コウキヤガラ (関東・東山・ 東海)	全域の普通 期及び早期 栽培地帯	砂壤土 ～ 埴土	500mL/ 10a	植代時(移植4日 前まで)	植代時 に原液 のまま 散布し 混和す る。また は、植 代直後 原液の まま散 布し、た だちに 整地板 で均平 作業を 行う。	本剤の使用 回数...1回、 オキサジア ノンを含む農 薬の総使用回 数...1回、ブ タクロールを 含む農薬の 総使用回 数...2回以内	日産化 学工業 例
					水田一年生 雑草、マツバ イ、ホタルイ、ヘラ オモダカ、ミスガ ヤツリ	東北、北陸、 関東・東山・ 東海の普通 期及び早期 栽培地帯	埴土～ 埴土	250～ 350mL/ 10a(少量 散布)	植代時(移植4日 前まで)(移植後に 使用する除草剤と の体系で使用)			
						近畿・中国・ 四国、九州の 普通期栽培 地帯及び近 畿・中国・四 国の早期栽 培地帯	埴土～ 埴土					
			い ぐ さ		水田一年生 雑草、スズメ テッポウ	全域		300～ 500mL/ 10a	植付後～スズメテッ ポウ3葉期または/ ビエ1.5葉期	原液湛 水散布	本剤の使用 回数...1回、 オキサジア ノンを含む農 薬の総使用回 数...1回、ブ タクロールを 含む農薬の 総使用回 数...1回	

(1) つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作 物 名	適用雑草	適用地帯	適用 土壌	使用量	使用時期	使用 方法	使用回数	登録 会社
シメトリ ン・ベン フレセー ト・MCP B粒剤	MJC ザー・ベッ クスSM 1キロ粒 剤	2-メチルチオ-4,6-ビス(エチ ルアミノ)-s-トリアジン... 4.5%, 2,3-シトロ-3,3- ジメチルベンゾフラン-5-イル =エタンスルホナート...6.0%、 2-メチル-4-クロロフェノキシ 酸エチル...2.4%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生 雑草、マツバ イ、ホタルイ、ウリカ ワ、ミズカヤツリ (北海道を除く)、ヘラオモダカ (北海道、東 北、関東・東 山・東海)、ヒ ムシロ(北陸を 除く)、オモダカ (北陸を除く)、 クログワイ(東 北、関東・東 山・東海、近 畿・中国・四 国)、シズイ(東 北)、エノノサヤ カグサ(北海 道)、アオミロ ノ類類による表 層はく離(北 海道、関東・ 東山・東海、 近畿・中国・ 四国)	北海道、東北	砂壤土 ～ 埴土	1kg/10a	移植後20日～/ビ エ2.5葉期 ただし、 移植後30日まで	湛水散 布	本剤の使用 回数...1回、 シメトリンを含 む農薬の総 使用回数...2 回以内、ベン フレセートを含 む農薬の総 使用回数...2回以 内、MCPBエ チルを含む農 薬の総使用 回数...2回以 内	三井化 学アグロ ㈱
						北陸	埴土～ 埴土		移植後20日～/ビ エ3葉期 ただし、 移植後30日まで			
						関東・東山・ 東海の普通 期栽培地帯	砂壤土 ～ 埴土		移植後20日～/ビ エ2.5葉期 ただし、 移植後30日まで			
						関東・東山・ 東海の早期 栽培地帯	埴土～ 埴土		移植後20日～/ビ エ2葉期 ただし、 移植後30日まで			
						近畿・中国・ 四国の普通 期栽培地帯	砂壤土 ～ 埴土		移植後20日～/ビ エ3葉期 ただし、 移植後30日まで			
ダイムロ ン・ピラ クロナ ル・ プロモ ブチド ・ベン スル フロン メチ ル粒剤	日農イッ ボンD ジャンボ	1-(α 、 α -ジメチルベンジ ル)-3-(パラトリル)尿素... 8.0%、1-(3-クロロ- 4,5,6,7-テトラヒドロピラゾ [1,5-a]ピリジン-2-イル)- 5-[メチル(プロパ-2-イル)- アミノ]ピラゾール-4-カルボニ トール...4.0%、(RS)-2-ブ ロモ-N-(α 、 α -ジメチルベン ジル)-3,3-ジメチルブチル アミド...12.0%、メチル- α - (4,6-ジメチルピリミジン- 2-イルカルバモイルスルファモ イル)-o-トルアト...1.0%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生 雑草、マツバ イ、ホタルイ、ミ ズカヤツリ、ウリカ ワ、ヒムシロ、セリ	北陸	砂壤土 ～ 埴土	小包装 (パック) 10個 (500g)/ 10a	移植直後～/ビエ 2.5葉期 ただし、移 植後30日まで	水田に 小包装 (パック)の まま投 げ入れ る。	本剤の使用 回数...1回、 ダイムロンを 含む農薬の 総使用回 数...3回以内 (育苗箱散布 は1回以内、 本田では2回 以内)、ピラ クロナルを含 む農薬の総 使用回数...2回 以内、プロモ ブチドを含む 農薬の総使 用回数...2回 以内、ベンス ルフロンメチ ルを含む農 薬の総使用 回数...2回以 内	日本農 薬㈱、 デュボン ㈱
						関東・東山・ 東海、近畿・ 中国・四国、 九州の普通 期及び早期 栽培地帯	埴土～ 埴土					

(1) つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作 物 名	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使 用 量	使 用 時 期	使 用 方 法	使 用 回 数	登 録 会 社
オキサジ クロメホ ン・ピラ ンズル ロンエチ ル・ペノ キススラ ム・ベン ゾビシク ロン粒剤	シリウス ダッシュ 1キロ粒 剤	3-[1-(3,5-ジクロロフェニ ル)-1-メチルエチル]-3,4- ジヒドロ-6-メチル-5-フェニ ル-2H-1,3-オキサジン-4- オン・・・0.80%, エチル=5- (4,6-ジメチルピリミジン- 2-イルカルバモイルスルファモ イル)-1-メチルピラゾール- 4-カルボキシレート・・・ 0.21%, 3-(2-ジフルオロ エトキシ)-N-(5,8-ジメチル [1,2,4]トリアゾロ[1,5-c]ピ リミジン-2-イル)-α, α, α- トリフルオロトエン-2-スル ホニアミド・・・0.30%, 3-(2- クロロ-4-メシルベンゾイル)- 2-フェニルチオビシクロ [3.2.1]オクタ-2-エン-4-オ ン・・・2.0%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生 雑草、マツバ イ、ホタルイ、ウリ カ、ミズガヤツリ (北海道を除 く)、ヘラオモダカ (北海道、東 北)、ヒルムシロ、 ゼリ	全域の普通 期及び早期 栽培地帯(北 陸、近畿・中 国・四国の早 期栽培地帯 を除く)	壤土～ 埴土	1kg/10a	移植後7日～/ビエ 3.5葉期 ただし、 移植後30日まで	湛水散 布	本剤の使用 回数・・・1回、 ジメタメトリン を含む農薬の 総使用回 数・・・2回以 内、ピラノレー トを含む農薬 の総使用回 数・・・2回以 内、プレチラク ロールを含む 農薬の総使 用回数・・・2回 以内、プロモ ブチドを含む 農薬の総使 用回数・・・2回 以内	日産化 学工業 株式会社
オキサジ クロメホ ン・クロメ プロッ プ・プロ モブチド 粒剤	黒薔ジャ ンボ	3-[1-(3,5-ジクロロフェニ ル)-1-メチルエチル]-3,4- ジヒドロ-6-メチル-5-フェニ ル-2H-1,3-オキサジン-4- オン・・・1.0%, (RS)-2- (2,4-ジクロロ-m-トリルオキ シ)プロピオンアミド・・・ 5.83%, (RS)-2-プロモ N-(α, α, α-トリメチルベンジ ル)-3,3-ジメチルアセリタミ ド・・・15.0%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生 雑草、マツバ イ、ホタルイ、ヘ ラオモダカ(東 北)、ミズガヤツリ	東北、北陸、 関東・東山・ 東海の普通 期及び早期 栽培地帯 近畿・中国・ 四国の普通 期栽培地帯	壤土～ 埴土	小包装 (パック) 10個 (600g)/ 10a	移植直後～/ビエ 2.5葉期 但し、移 植後30日まで 移植直後～/ビエ2 葉期 但し、移植後 30日まで	水田に 小包装 (パック)の まま投 げ入れ る。	本剤の使用 回数・・・1回、 オキサジクロ メホンを含む 農薬の総使 用回数・・・2回 以内、クロメ プロップを含む 農薬の総使 用回数・・・2回 以内、プロモ ブチドを含む 農薬の総使 用回数・・・2回 以内	日本農 薬株式会社
ベンゾビ シクロ ン・ベン トキサゾ ン粒剤	ババット ジャンボ	3-(2-クロロ-4-メシルベンゾ イル)-2-フェニルチオビシクロ [3.2.1]オクタ-2-エン-4-オ ン・・・4.0%, 3-(4-クロロ-5- シクロペンチルオキシ-2-フル オロフェニル)-5-イソプロピ リデン-1,3-オキサゾリジン 2,4-ジオン・・・4.0%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生 雑草、マツバ イ、ホタルイ、ミ ズガヤツリ(北 海道を除く)、ヘ ラオモダカ(北 海道、九州)、ウ リカ(近畿・中 国・四国、九 州)、ヒルムシ ロ、クログワイ (東北、関東・ 東山・東海、 近畿・中国・ 四国、九州)、 シズイ(東北)、 コウキヤガラ (東北、関東・ 東山・東海、 九州)	全域の普通 期及び早期 栽培地帯	砂壤土 ～埴土	小包装 (パック) 10個 (500g)/ 10a	移植直後～/ビエ 1.5葉期 ただし、 移植後30日まで	水田に 小包装 (パック)の まま投 げ入れ る。	本剤の使用 回数・・・1回、 ベンゾビシク ロンを含む農 薬の総使用 回数・・・2回 以内、ベント キサゾンを含 む農薬の総 使用回数・・・ 2回以内	北興産 業株式会社
ベンゾビ シクロ ン・ベン トキサゾ ン水和 剤	ババット フロアプ ル	3-(2-クロロ-4-メシルベンゾ イル)-2-フェニルチオビシクロ [3.2.1]オクタ-2-エン-4-オ ン・・・3.9%, 3-(4-クロロ-5- シクロペンチルオキシ-2-フル オロフェニル)-5-イソプロピ リデン-1,3-オキサゾリジン 2,4-ジオン・・・3.9%	水 和 剤	移植 水稲	水田一年生 雑草、マツバ イ、ホタルイ、ミ ズガヤツリ(北 海道を除く)、ヘ ラオモダカ(北 海道、九州)、ウ リカ(近畿・中 国・四国、九 州)、クログワイ (北海道を除 く)、シズイ(東 北)、ヒルムシ ロ、コウキヤ ガラ(東北、 関東・東山・ 東海、九州)	全域の普通 期及び早期 栽培地帯	砂壤土 ～埴土	500mL/ 10a	移植直後～/ビエ 1.5葉期 ただし、 移植後30日まで	原液湛 水散布	本剤の使用 回数・・・1回、 ベンゾビシク ロンを含む農 薬の総使用 回数・・・2回 以内、ベント キサゾンを含 む農薬の総 使用回数・・・ 2回以内	北興産 業株式会社

(1) つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作 物 名	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使 用 量	使 用 時 期	使 用 方 法	使 用 回 数	登 録 会 社
ダイムロン・ピラクロニル・プロモブチド・ベンスルフロンメチル粒剤	日農イッポンD1キロ粒剤51	1-(α , α -ジメチルベンジル)-3-(β -ナトリル)尿素...4.0%, 1-(3-クロロ-4,5,6,7-テトラヒドロピラゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル)-5-[メチル(プロパ-2-イル)-アミ]ピラゾール-4-カルボニトリル...2.0%, (RS)-2-プロモ-N-(α , α -ジメチルベンジル)-3,3-ジメチルアチルアミド...6.0%, メチル= α -(4,6-ジメチルピリミジン-2-イル)カルバモイルスルファモイル)-o-トルアート...0.51%	粒剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツハ、ホタルイ、ヘラオモダカ(九州)、ミサガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ、藻類による表層はく離	関東・東山・東海及び九州の普通期及び早期栽培地帯	壤土～埴土	1kg/10a	移植直後～バエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布	本剤の使用回数...1回、ダイムロンを含む農薬の総使用回数...3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)、ピラクロニルを含む農薬の総使用回数...2回以内、プロモブチドを含む農薬の総使用回数...2回以内	日本農薬㈱、デュボン㈱
						北陸、近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～埴土		移植直後～バエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布		
									移植時	田植同時期で施用		
ダイムロン・ピラクロニル・プロモブチド・ベンスルフロンメチル水和剤	日農イッポンDフロアブル	1-(α , α -ジメチルベンジル)-3-(β -ナトリル)尿素...8.0%, 1-(3-クロロ-4,5,6,7-テトラヒドロピラゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル)-5-[メチル(プロパ-2-イル)-アミ]ピラゾール-4-カルボニトリル...4.0%, (RS)-2-プロモ-N-(α , α -ジメチルベンジル)-3,3-ジメチルアチルアミド...12.0%, メチル= α -(4,6-ジメチルピリミジン-2-イル)カルバモイルスルファモイル)-o-トルアート...1.0%	水和剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツハ、ホタルイ、ミサガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ、藻類による表層はく離	北陸	砂壤土～埴土	500mL/10a	移植直後～バエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	原液湛水散布	本剤の使用回数...1回、ダイムロンを含む農薬の総使用回数...3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)、ピラクロニルを含む農薬の総使用回数...2回以内、プロモブチドを含む農薬の総使用回数...2回以内	日本農薬㈱、デュボン㈱
						関東・東山・東海、近畿・中国・四国、九州の普通期及び早期栽培地帯	壤土～埴土		移植直後～バエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	原液湛水散布		
									移植時	田植同時期で施用		

(1) つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物 名	適用雑草	適用地帯	適用 土壌	使用量	使用時期	使用 方法	使用回数	登録 会社
フェント ラザミド・ プロモブ チド・ベ ンスルフ ロンメチ ル粒剤	MICク サトリー DX1キ ロ粒剤5 1	4-(2-クロロフェニル)-N-シ クロヘキシル-N-エチル-4,5- ジヒドロ-5-オキソ-1H-テ トラゾール-1-カルボキサミ ド・・・3.0%、(RS)-2-プロモ -N-(α , α -ジメチルベン ジル)-3,3-ジメチルブチルア ミド・・・6.0%、メチル= α - (4,6-ジメチルピリミジン- 2-イルカルバモイルスルファモ イル)-o-トルアート・・・0.51%	粒 剤	移植 水稻	水田一年生 雑草、マツバ イ、ホタルイ、ミズ ガヤツリ、ウリカワ、 ヒルムシロ、セリ、ア オミドロ・藻類に よる表層はく 離(九州)	北陸・関東・ 東山・東海の 普通期及び 早期栽培地 帯	砂壤土 ～壇土	1kg/10a	移植時	田植同 時同時 散布機 で施用	本剤の使用 回数・・・1回、	三井化 学アグロ ㈱
						近畿・中国・ 四国の普通 期及び早期 栽培地帯	壇土～ 壇土		移植直後～ビエ 2.5葉期 ただし、 移植後30日まで			
						北陸・関東・ 東山・東海の 普通期及び 早期栽培地 帯	砂壤土 ～壇土			流水散 布		
						近畿・中国・ 四国の普通 期及び早期 栽培地帯	壇土～ 壇土					
						九州の普通 期及び早期 栽培地帯	砂壤土 ～壇土					
フェント ラザミド・ プロモブ チド・ベ ンスルフ ロンメチ ル水和 剤	MICク サトリー DXフロ アブルL	4-(2-クロロフェニル)-N-シ クロヘキシル-N-エチル-4,5- ジヒドロ-5-オキソ-1H-テ トラゾール-1-カルボキサミ ド・・・6.0%、(RS)-2-プロモ -N-(α , α -ジメチルベン ジル)-3,3-ジメチルブチルア ミド・・・18.0%、メチル= α - (4,6-ジメチルピリミジン- 2-イルカルバモイルスルファモ イル)-o-トルアート・・・1.0%	水 和 剤	移植 水稻	水田一年生 雑草、マツバ イ、ホタルイ、ミズ ガヤツリ、ウリカワ、 ヒルムシロ、セリ (北陸を除く)、 アオミドロ・藻類 による表層はく 離(関東以 西)	北陸・関東・ 東山・東海、 近畿・中国・ 四国の普通 期及び早期 栽培地帯	砂壤土 ～壇土	500mL/ 10a	移植時	田植同 時同時 散布機 で施用	本剤の使用 回数・・・1回、 フェントラザミ ドを含む農薬 の総使用回 数・・・1回、プロ モブチドを 含む農薬の 総使用回 数・・・2回以 内、ベンスル フロメチル を含む農薬の 総使用回 数・・・2回以 内	三井化 学アグロ ㈱
						九州の普通 期及び早期 栽培地帯			移植直後～ビエ 2.5葉期 ただし、 移植後30日まで	原液湛 水散布		

(1) つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作 物 名	適用雑草	適用地帯	適 用 土 壌	使用量	使用時期	使用 方法	使用回数	登録 会社
カフエン ストロー ル・ダイ ムロン・ ペンシル フロンメ チル・ペ ンゾビシ クロン粒 剤	MICシ ロノック1 キロ粒剤 51	N,N-ジエチル-3-メチルス ルホニル-1H-1,2,4-トリア ゾール-1-カルボキシミド… 3.0%, 1-(α , α -ジメチル ベンジル)-3-(パラトリル)尿 素…6.0%, メチル- α - (4,6-ジメチキシピリミジン- 2-イルカルバモイルスルファモ イル)-o-トルアート… 0.51%, 3-(2-クロロ-4-メシ ルベンゾイル)-2-フェニルチ オキシクロ[3.2.1]オクタ-2- エン-4-オン…2.0%	粒 剤	移植 水稻	水田一年生 雑草、マツバ イ、ホタルイ、ミズ ガヤツ、ウリカワ、 クワワイ(北 陸、関東・東 山・東海、近 畿・中国・四 国)、オモダカ (北陸、関東・ 東山・東海、 近畿・中国・ 四国)、ヒルムシ ロ、セリ、アオミ ロ・藻類による 表層はく離	北陸、関東・ 東山・東海、 近畿・中国・ 四国の普通 期及び早期 栽培地帯	砂壤土 ～埴土	1kg/10a	移植時	田植同 時同時 散布機 で施用	本剤の使用 回数…1回、 カフエンスト ロールを含む 農薬の総使 用回数…1 回、ダイムロン を含む農薬の 総使用回数 …3回以内 (育苗箱散布 は1回以内、 本田では2回 以内)、ペンシ ルフロンメチ ルの総使用回 数…2回以 内、ペンゾビ シクロンを含 む農薬の総 使用回数…2 回以内	三井化 学アグロ ㈱
									移植直後～ノビエ 2.5葉期 ただし、 移植後30日まで	湛水散 布		
									移植後3日～ノビエ 2.5葉期 ただし、 移植後30日まで			
				直播 水稻	水田一年生 雑草、マツバ イ、ホタルイ、ミズ ガヤツ、ウリカワ	全城(北海道、 東北を除く)			稲1葉期～ノビエ 2.5葉期 ただし、 収穫90日前まで		本剤の使用 回数…1回、 カフエンスト ロールを含む 農薬の総使 用回数…1 回、ダイムロン を含む農薬の 総使用回数 …2回以 内、ペンシル フロンメチル を含む農薬の 総使用回数 …2回以 内、ペンゾビ シクロンを含 む農薬の総 使用回数…2 回以内	
ジメタメ リン・ピラ ノレー ト・プレ チラク ロール・ プロモ ブチド粒 剤	MICス ラッシュ 1キロ粒 剤	2-メチルチオ-4-エチルアミ ノ-6-(1,2-ジメチルプロピル アミノ)-s-トリアジン… 0.60%, 4-(2,4-ジクロロベ ンゾイル)-1,3-ジメチル-5- ピラゾリル-p-トルエンシルホ ネート…12.0%, 2-クロロ- 2',6'-ジエチル-N-(2-ブ ロホキシエチル)アセトアニ ド…4.5%, (RS)-2-ブromo -N-(α , α -ジメチルベン ジル)-3,3-ジメチルブチルア ミド…6.0%	粒 剤	移植 水稻	水田一年生 雑草、マツバ イ、ホタルイ、ウリ カワ、ミズガヤツ、 ヘラオモダカ(東 北)、ヒルムシロ、 セリ(近畿・中 国・四国)、ア オミロ・藻類に よる表層はく 離	全城(北海道 を除く)の普通 期及び早期 栽培地帯	砂壤土 ～埴土	1kg/10a	移植時	田植同 時同時 散布機 で施用	本剤の使用 回数…1回、 ジメタメリン を含む農薬の 総使用回数 …2回以 内、ピラノレ イトを含む農 薬の総使用回 数…2回以 内、プレチラ クロールを含 む農薬の総使 用回数…2回 以内、プロモ ブチドを含む 農薬の総使 用回数…2回 以内	三井化 学アグロ ㈱
									移植直後～ノビエ2 葉期 ただし、移植 後30日まで	湛水散 布		
				直播 水稻	水田一年生 雑草、マツバ イ、ホタルイ、ウリ カワ、ミズガヤツ、 ヒルムシロ	全城(九州を 除く)			稲1.5葉期～ノビエ 2葉期(砂壤土では、 稲2葉期～ノビエ2 葉期)ただし、収 穫90日前まで			

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作 物 名	適用雑草	適用地帯	適用 土壌	使用量	使用時期	使用 方法	使用回数	登録 会社
フェント ラザミド・ プロモプ チド・ペ ンシル ロンメチ ル粒剤	MICク サトリ DX1キ ロ粒剤H 75	4-(2-クロロフェニル)-N-シ クロヘキシル-N-エチル-4,5- ジヒドロ-5-オキシ-1H-テ トラゾール-1-カルボキサミ ド・・・3.0%、(RS)-2-プロモ N-(α , α -ジメチルベン ジル)-3,3-ジメチルブチルア ミド・・・9.0%、メチル= α - (4,6-ジメチルピリミジン 2-イルカルバモイルスルファモ イル)-o-トルアート・・・0.75%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生 雑草、マツバ イ、ホタルイ、ヘラ オモダカ、ミズガ ヤツリ(東北)、ウ リカワ、クログワイ (東北)、オモダ カ、ヒルムシロ、セ リ、シズイ(東 北)、エゾノサヤ カサ(北海 道)、ミヌアオイ (北海道)、アオ シロ・藻類によ る表層はく離	北海道、東北	砂壌土 ～埴土	1kg/10a	移植時	田植同時 散布機 で施用	本剤の使用 回数・・・1回、 フェントラザミ ドを含む農薬 の総使用回 数・・・1回、プ ロモプチドを 含む農薬の 総使用回 数・・・2回以 内、ペンシル フロンメチル を含む農薬 の総使用回 数・・・2回以 内	三井化 学アグロ ㈱
				直播 水稲	水田一年生 雑草、マツバ イ、ホタルイ、ヘラ オモダカ、ウリカ ワ、ミズガヤツリ、 ヒルムシロ、セリ		埴土～ 埴土		移植直後～ビエ 2.5葉期 ただし、 移植後30日まで	灌水散 布		
カフエン ストロー ル・ダイ ムロン・ ペンシル フロンメ チル粒 剤	MICク サトリ エースH ジャンボ	N,N-シエチル-3-メンチス ルホニル-1H-1,2,4-トリア ゾール-1-カルボキサミド・・・ 7.0%、1-(α , α -ジメチル ベンジル)-3-(パラトリル)尿 素・・・15.0%、メチル= α - (4,6-ジメチルピリミジン 2-イルカルバモイルスルファモ イル)-o-トルアート・・・2.5%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生 雑草、マツバ イ、ホタルイ、ウリカ ワ、ミズガヤツリ (東北)、コキヤ ガラ(東北)、オ モダカ、ヒルム シロ、ヘラオモダ カ、セリ、シズイ (東北)、クログ ワイ(東北)、エ ゾノサヤカサ(北 海道)、アオシロ ・藻類による表 層はく離(北海 道)	北海道	砂壌土 ～埴土 (減水深 2cm/日 以下、但 し砂壌 土は減 水深 1.5cm/ 日以下)	小包装 (パック) 10個 (300g)/ 10a	移植後3～15日(ビ エ2葉期まで)	水田に 小包装 (パック) のまま投 げ入れ る。	本剤の使用 回数・・・1回、 カフエンス トロールを 含む農薬 の総使用 回数・・・1 回、ダイム ロンを含む 農薬の総 使用回数 ・・・3回以 内(育苗箱 散布は1回 以内、本 田では2回 以内)、ペン シルフロン メチルを含 む農薬の 総使用回 数・・・2回 以内	三井化 学アグロ ㈱
						東北	砂壌土 ～埴土 (減水深 1.5cm/ 日以下)					
ビリブチ カルブ・ ペンシル フロンメ チル水 和剤	MICカ ルシヨ ンフロ アブル	O-3-tert-ブチルフェニル =6-メチル-2-ピリジル(メチ ル)チオカルバマート・・・ 12.0%、メチル= α -(4,6-ジ メチルピリミジン-2-イルカル バモイルスルファモイル)-o-ト ルアート・・・1.4%	水 和 剤	移植 水稲	水田一年生 雑草、マツバ イ、ホタルイ、ウリカ ワ、ミズガヤツリ、 ヘラオモダカ、オ モダカ(東北)、ヒ ルムシロ、セリ、 クログワイ(東 北)、コキヤカ サ(東北)、シズ イ、エゾノサ ヤカサ(北海 道)、アオシロ ・藻類による表 層はく離	北海道、東北	砂壌土 ～埴土 (減水深 2cm/日 以下)	500mL/ 10a	移植直後～移植 後10日(ビエ1.5 葉期まで)	原液湛 水散布、 水口施 用又は 無人ヘリ コプター による滴 下	本剤の使用 回数・・・1回、 ビリブチカル ブを含む農 薬の総使用 回数・・・2 回以内、ペン シルフロン メチルを含 む農薬の 総使用回 数・・・2回 以内	三井化 学アグロ ㈱

(1) つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作 物 名	適用雑草	適用地帯	適用 土壌	使用量	使用時期	使用 方法	使用回数	登録 会社
カフエン ストロー ル・ダイ ムロン・ ペンシル フロンメ チル・ペ ンゾビシ クロン粒 剤	MICシ ロノック1 キロ粒剤 75	N,N-ジエチル-3-メチルス ルホニル-1H-1,2,4-トリア ゾール-1-カルボキサミド… 3.0%, 1-(α , α -ジメチル ベンジル)-3-(β -ナトリル)尿 素…6.0%, メチル= α - (4,6-ジメチルピリミジン- 2-イルカルバモイルスルファモ イル)- α -トルアート… 0.75%, 3-(2-クロロ-4-メシ ルベンゾイル)-2-フェニルチ オビシクロ[3.2.1]オクタ-2- エン-4-オン…2.0%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生 雑草、マツバ イ、ホタルイ、ヘラ オモダカ、ミスガ ヤツリ(東北)、ウ リカワ、ヒルムシロ、 セリ、アオミドロ・ 藻類による表 層はく離	北海道、東北	砂壤土 ～壇土	1kg/10a	移植後3日～ β エ 2.5葉期 ただし、 移植後30日まで	湛水散 布	本剤の使用 回数…1回、 カフエンスト ロールを含む 農薬の総使 用回数…1 回、ダイムロン を含む農薬の 総使用回 数…3回以内 (育苗箱散布 は1回以内、 本田では2回 以内)、ペンシル フロンメチ ルを含む農 薬の総使用 回数…2回以 内、ペンゾビ シクロンを含 む農薬の総 使用回数…2 回以内	三井化 学アグロ ㈱
カフエン ストロー ル・ダイ ムロン・ ペンシル フロンメ チル・ペ ンゾビシ クロン水 和剤	MICシ ロノック Hフロア ブル	N,N-ジエチル-3-メチルス ルホニル-1H-1,2,4-トリア ゾール-1-カルボキサミド… 5.5%, 1-(α , α -ジメチル ベンジル)-3-(β -ナトリル)尿 素…10.0%, メチル= α - (4,6-ジメチルピリミジン- 2-イルカルバモイルスルファモ イル)- α -トルアート…1.4%, 3-(2-クロロ-4-メシルベンゾ イル)-2-フェニルチオビシクロ [3.2.1]オクタ-2-エン-4-オ ン…4.0%	水 和 剤	移植 水稲	水田一年生 雑草、マツバ イ、ホタルイ、ヘラ オモダカ、ミスガ ヤツリ(東北)、ウ リカワ、ヒルムシロ、 セリ、シズイ(東 北)、アオミドロ・ 藻類による表 層はく離	北海道、東北	砂壤土 ～壇土	500mL/ 10a	移植後3日～ β エ 2.5葉期 ただし、 移植後30日まで	原液湛 水散布	本剤の使用 回数…1回、 カフエンスト ロールを含む 農薬の総使 用回数…1 回、ダイムロン を含む農薬の 総使用回 数…3回以内 (育苗箱散布 は1回以内、 本田では2回 以内)、ペンシル フロンメチ ルを含む農 薬の総使用 回数…2回以 内、ペンゾビ シクロンを含 む農薬の総 使用回数…2 回以内	三井化 学アグロ ㈱
カフエン ストロー ル・ダイ ムロン・ ペンシル フロンメ チル粒 剤	MICク サトリ エースL ジャンボ	N,N-ジエチル-3-メチルス ルホニル-1H-1,2,4-トリア ゾール-1-カルボキサミド… 7.0%, 1-(α , α -ジメチル ベンジル)-3-(β -ナトリル)尿 素…15.0%, メチル= α - (4,6-ジメチルピリミジン- 2-イルカルバモイルスルファモ イル)- α -トルアート…1.7%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生 雑草、マツバ イ、ホタルイ、ウリ カワ、ミスガヤツリ、 ヘラオモダカ(北 陸)、クロクワイ (北陸を除く)、 オモダカ、ヒルム シロ、セリ、コウキヤ ラ(九州)、アオミ ドロ・藻類によ る表層はく離 (近畿・中国・ 四国)	北陸、関東・ 東山・東海、 近畿・中国・ 四国の普通 期及び早期 栽培地帯、九 州の早期栽 培地帯	砂壤土 ～壇土	小包装 (パック) 10個 (300g)/ 10a	移植後3日～ β エ 2葉期 ただし、移 植後30日まで	水田に 小包装 (パック) のまま投 げ入れ る。	本剤の使用 回数…1回、 カフエンスト ロールを含む 農薬の総使 用回数…1 回、ダイムロン を含む農薬の 総使用回 数…3回以内 (育苗箱散布 は1回以内、 本田では2回 以内)、ペンシル フロンメチ ルを含む農 薬の総使用 回数…2回以 内	三井化 学アグロ ㈱

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤型	適用作物名	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	登録会社
カフェンストロー・ダイムロン・ペンシルフロメチル・ベンゾビシクロン粒剤	MICシロノックHジャンボ	N,N-ジエチル-3-メチルスルホニル-1H-1,2,4-トリアゾール-1-カルボキサミド…7.1%, 1-(α , α -ジメチルペンシル)-3-(β -トリル)尿素…14.3%, メチル= α -(4,6-ジメトキシピリジン)-2-イルカルバモイルスルファモイル)-オトルアート…2.1%, 3-(2-クロロ-4-メシルペンゾイル)-2-フェニルチオビシクロ[3.2.1]オクタ-2-エン-4-オン…5.7%	粒剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツハイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ(東北)、ウリワリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	北海道、東北	砂壤土～埴土	小包装(パック) 10個 (350g)/ 10a	移植後3日～ビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。	本剤の使用回数…1回、カフェンストローを含む農薬の総使用回数…1回、ダイムロンを含む農薬の総使用回数…3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)、ペンシルフロメチルを含む農薬の総使用回数…2回以内、ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数…2回以内	三井化学agro
ペンシルフロメチル・メフエナセット粒剤	MICザーク1キログラム75	メチル= α -(4,6-ジメトキシピリジン)-2-イルカルバモイルスルファモイル)-オトルアート…0.75%, 2-ベンゾチアゾール-2-イルオキシ-N-メチルアセトアニト…10.0%	粒剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツハイ、ホタルイ、ウリワリ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、オモダカ、クログワイ、セリ、ヒルムシロ、エゾノササユギ(北海道)、シズイ、コウキヤガラ(東北)、アオミドロ・藻類による表層はく離	北海道 東北	埴土～埴土(減水深2cm/日以下)	1kg/10a	移植後5～20日(ビエ2.5葉期まで)	湛水散布	本剤の使用回数…1回、ペンシルフロメチルを含む農薬の総使用回数…2回以内、メフエナを含む農薬の総使用回数…2回以内	三井化学agro
フェントラザミド・プロモブチド・ペンシルフロメチル粒剤	MICクラサトリDXジャンボ	4-(2-クロロフェニル)-N-シクロヘキシル-N-エチル-4,5-ジヒドロ-5-オキシ-1H-テトラゾール-1-カルボキサミド…7.5%, (RS)-2-プロモ-N-(α , α -ジメチルペンシル)-3,3-ジメチルフルアルミド…15.0%, メチル= α -(4,6-ジメトキシピリジン)-2-イルカルバモイルスルファモイル)-オトルアート…1.27%	粒剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツハイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリワリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	全域(北海道、東北を除く)の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～埴土	小包装(パック) 10個 (400g)/ 10a	移植後3日～ビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。	本剤の使用回数…1回、フェントラザミドを含む農薬の総使用回数…1回、プロモブチドを含む農薬の総使用回数…2回以内、ペンシルフロメチルを含む農薬の総使用回数…2回以内	三井化学agro

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稻刈跡・畑作・野菜作・永年作物・非農耕地対象

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場所・ 適用土壌	使用量・ 散布液量	使用時期	使用方法	使用回数	登録 会社
プロピネ ブ水和 剤	プロテク メートW DG	プロピレンビスシ オカルバミン酸亜 鉛…70.0%	水 和 剤	西洋芝 (ヘントグラ ス)	藻類	-	-	2～3kg/10a、 希釈水量 500L/10a	藻類発生始 期(芝生育 期)	散布	本剤の使用回 数…6回以内、プ ロピネブを含む農 薬の総使用回 数…6回以内	バイエル クロップサイ エンス㈱
ベンチオ カーブ 乳剤	ボレロン エース乳 剤	S-(4-クロロベンジ ル)-N,N-ジエチル チオカーバメート… 90.0%	乳 剤	日本芝 (こうらい しば)	一年生イ ネ科雑 草	-	-	400～800mL/10a、 希釈水量 200～300L/10a	雑草発生前	全面土壌散 布	本剤の使用回 数…3回以内、ベン チオカーブを含む 農薬の総使用回 数…3回以内	アグロケミ カル工業 ㈱
フルボキ サム水 和剤	コング ルード顆 粒水和 剤	1-[4-クロロ-3- (2,2,3,3,3-ペンタ フルオロプロポキシメ チル)フェニル]-5- フェニル-1H- 1,2,4-トリアゾール -3-カルボキサミ ド…50.0%	水 和 剤	日本芝	一年生 雑草	-	-	150～300g/10a、 希釈水量 200～300L/10a	雑草発生前	散布	本剤の使用回 数…2回以内、フル ボキサムを含む 農薬の総使用回 数…2回以内	日本曹 達㈱
フルセト スルフロ ン水和 剤	ブロード ケア顆粒 水和剤	1-[3-[(4,6-ジメ キシピリジン-2-イ ルカルバモイル)スル ファモイル]-2-ピリ ジノル]-2-フルオロ ロピル-メチルアセ タート…50.0%	水 和 剤	日本芝	一年生 及び多 年生広 葉雑草	-	-	30～60g/10a、 希釈水量 100～200L/10a	雑草発生初 期	散布	本剤の使用回 数…3回以内、フル セトスルフロンを 含む農薬の総使 用回数…3回以内	両エス ・デー・エ ス・バイオ テック
1-ナフ タレン酢 酸ナトリ ウム水溶 剤	ターム水 溶剤	1-ナフトレン酢酸 ナトリウム…22.0%	水 溶 剤	温州み かん	全摘果	-	-	500～1000倍、 使用液量 250～500L/10a	一次生理落 果発生期(満 開10～20日 後)	立木全面散 布又は枝別 散布	本剤の使用回 数…1回、1-ナ フトレン酢酸ナト リウムを含む農薬 の総使用回数…4回 以内(生理落果発 生期は1回以内、 生理落果発生後 は3回以内)	アグロカネ ショウ㈱
					間引き 摘果	-	-	1000～1500倍、 使用液量 250～500L/10a	二次生理落 果発生期(満 開20～40日 後)			
					夏秋梢 伸長抑 制	-	-	1000～2000倍、 使用液量 250～500L/10a	新梢萌芽前 但し、収穫 前日まで		本剤の使用回 数…2～3回、1- ナフトレン酢酸ナ トリウムを含む農 薬の総使用回数…4 回以内(生理落果 発生期は1回以 内、生理落果発生 後は3回以内)	
1-ナフ タレン酢 酸ナトリ ウム液剤	アー克蘭 ド液剤	1-ナフトレン酢酸 ナトリウム…0.20%	液 剤	メロン	ネット形 成促進 及び果 実肥大 促進	-	-	1000～2000倍、 使用液量 100～200mL/株	縦ネット発生 期～横ネット 発生期但 し、収穫3日 前まで	散布	本剤の使用回 数…2回以内、1- ナフトレン酢酸ナ トリウムを含む農 薬の総使用回 数…2回以内	アグロカネ ショウ㈱
1-ナフ タレン酢 酸ナトリ ウム水溶 剤	ヒオモン 水溶剤	1-ナフトレン酢酸 ナトリウム…4.4%	水 溶 剤	りんご	収穫前 落果防 止	-	-	1000～1500倍、 使用液量 300～600L/10a	収穫開始予 定日の21～ 7日前	立木全面散 布	本剤の使用回 数…1回、1-ナ フトレン酢酸ナト リウムを含む農薬 の総使用回数…2回 以内(4.4%水溶剤 の1000～1500倍 希釈散布は1回以 内)	アグロカネ ショウ㈱
								2000倍、 使用液量 300～600L/10a	収穫開始予 定日の21～ 14日前及び その7～10 日後		本剤の使用回 数…2回以内、1- ナフトレン酢酸 ナトリウムを含む農 薬の総使用回 数…2回以内 (4.4%水溶剤の 1000～1500倍希 釈散布は1回以内)	

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場所・ 適用土壌	使用量・ 散布液量	使用時期	使用方法	使用回数	登録 会社
1-ナフ タレン酢 酸ナトリ ウム水溶 剤 つづき	ヒオモン 水溶剤	1-ナフタレン酢酸 ナトリウム…4.4%	水 溶 剤	日本な し	収穫前 落果防 止	-	-	1000～1500倍、 使用液量 200～300L/10a	収穫開始予 定日の21～ 7日前	立木全面散 布	本剤の使用回 数…1回、1-ナ フタレン酢酸ナトリ ウムを含む農薬の 総使用回数…2回 以内(4.4%水溶剤 の1000～1500倍 希釈散布は1回以 内)	アグロ カネ ショウ(株)
								2000倍、 使用液量 200～300L/10a	収穫開始予 定日の21～ 14日前及び その7～10 日後		本剤の使用回 数…2回以内、1 -ナフタレン酢酸 ナトリウムを含む農 薬の総使用回 数…2回以内 (4.4%水溶剤の 1000～1500倍希 釈散布は1回以内)	
オキサジ アルギル 水和剤	フェナク スフロ アブル	5-tert-ブチル- 3-[2,4-ジクロロ- 5-(プロパ-2-エニ ルオキシ)フェニル]- 1,3,4-オキサジア ゾール-2(3H)-オ ン…35.4%	水 和 剤	日本芝	一年生 雑草	-	-	100～200mL/10a、 希釈水量200～ 300L/10a	雑草発生前 (芝生育期)	全面土壌散 布	本剤の使用回 数…2回以内、オ キサジアルギルを 含む農薬の総使 用回数…2回以内	バイエルク ロップサイ エンス(株)
デシルア ルコー ル・プ トルア リン 乳剤	イエロー リボン	デシルアルコー ル…48.7% (RS)-N-sec-ブ チル-4-tert-ブチ ル-2,6-ジニトロア ニン…8.12%	乳 剤	たばこ	わき芽 抑制	-	-	50倍、 使用液量 20mL/株	芯止後	スポット散布	本剤の使用回 数…2回以内、デ シルアルコールを 含む農薬の総使 用回数…6回以内 (デシルアルコール・プ トルアリン乳剤を使用 した場合は4回以 内)、プトルアリンを 含む農薬の総使 用回数…2回以内	(株)エス・ ディー・エ ス・ハイオ テック、 ニューファ ム(株)
ダミノ ジッド液 剤	ビーナイ ンスブ レー	N-(シメチルアミノ) クシナミド酸… 0.41%	液 剤	きく(切 花用)	節間の 伸長抑 制	-	-	原液	摘芯後10日 目、定植後3 日目又は定 植後30日目	希釈せずそ のまま散布 する	本剤の使用回 数…2回以内、ダ ミノジッドを含む農 薬の総使用回 数…6回以内	日本曹 達(株)
				きく(ポッ マム)					摘芯後7日 目又は発蕾 初期		本剤の使用回 数…2回以内、ダ ミノジッドを含む農 薬の総使用回 数…3回以内	
				ハイトラン シア					定植後3～ 30日		本剤の使用回 数…2回以内、ダ ミノジッドを含む農 薬の総使用回 数…2回以内	
				はぼた ん					定植後3日 目		本剤の使用回 数…1回、ダミ ノジッドを含む農薬 の総使用回数…1 回	
				ベチュニア					定植後2週 間目又は摘 芯後7日目		本剤の使用回 数…1回、ダミ ノジッドを含む農薬 の総使用回数…1 回	

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名	適用雑草	適用地帯	適用場所・適用土壌	使用量・散布液量	使用時期	使用方法	使用回数	登録会社
エンドタールニナトリウム塩液剤	MICエンドタール液剤	(1R,2S,3R,4S)-7-オキサビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2,3-ジカルボン酸二ナトリウム塩... 1.85%	液剤	日本芝(こうらいしば)	スズメノカタビラ		-	8~12L/10a、希釈水量 200L/10a	雑草生育期(芝休眠期)	散布	本剤の使用回数...3回以内、エンドタールニナトリウム塩を含む農薬の総使用回数...6回以内	三井化学アグロ㈱
				西洋芝(ブルーグラス)				2~6L/10a、希釈水量 200L/10a	雑草生育期		本剤の使用回数...6回以内、エンドタールニナトリウム塩を含む農薬の総使用回数...6回以内	
グリホサートイソプロピルアミン塩液剤	草枯らしMIC	イソプロピルアンモニウム-N-(ホスホノメチル)グリシナート... 41.0%	液剤	果樹類(キウイフルーツ、パイナップルを除く)	一年生雑草	-	-	250~500mL/10a、希釈水量:通常散布 50~100L/10a、少量散布 25~50L/10a	収穫7日前まで(雑草生育期:草丈 30cm以下)	雑草茎葉散布	本剤の使用回数...3回以内、グリホサートを含む農薬の総使用回数...3回以内	三井化学アグロ㈱
					多年生雑草			500~1000mL/10a、希釈水量:通常散布 50~100L/10a、少量散布 25~50L/10a				
				豆類(種実、ただし、だいず、らっかせいを除く)	一年生雑草			250~500mL/10a、希釈水量:通常散布 50~100L/10a、少量散布 25~50L/10a	は種7日前まで(雑草生育期)		本剤の使用回数...2回以内、グリホサートを含む農薬の総使用回数...2回以内	
				だいず [※]					は種後出芽前まで(雑草生育期:草丈 30cm以下)			
				えだまめ					は種7日前まで(雑草生育期)		本剤の使用回数...1回、グリホサートを含む農薬の総使用回数...3回以内	
				小麦	多年生イネ科雑草、一年生雑草			250~500mL/10a、希釈水量 25~100L/10a	耕起前まで(雑草生育期:草丈 30cm以下)		本剤の使用回数...1回、グリホサートを含む農薬の総使用回数...1回	
					一年生雑草				は種7日前又はは種後出芽前(雑草生育期)			
				多年生雑草				500~1000mL/10a、希釈水量 100L/10a	耕起7日前まで(雑草生育期:草丈 30cm以下)			
				麦類(小麦を除く)、かんしょ、キャベツ	一年生雑草			250~500mL/10a、希釈水量 100L/10a	耕起7日前まで(雑草生育期)			
				はくさい				250~500mL/10a、希釈水量:通常散布 50~100L/10a、少量散布 25~50L/10a				
				だいこん、はつかだいこん				250~500mL/10a、希釈水量 100L/10a				

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場所・ 適用土壌	使用量・ 散布流量	使用時期	使用方法	使用回数	登録 会社
グリホ サートイ ソプロピ ルアミン 塩液剤 つづき	草枯らし MIC	イソプロピルアンモニ ウム-N-(ホスホノメチ ル)グリサート… 41.0%	液 剤	ねぎ、た まねぎ	一年生 雑草	—	—	250～500mL/10a、 希釈水量:通常散布 50～100L/10a、 少量散布 25～50L/10a	耕起7日前 まで(雑草生 育期)	雑草茎葉散 布	本剤の使用回 数…3回以内、グリ ホサートを含む農 薬の総使用回 数…3回以内	三井化 学アグロ (株)
									定植後畦間 処理 但し、 収穫30日前 まで(雑草生 育期)			
				さとうき び(春植 え)	多年生 雑草			250～500mL/10a、 希釈水量:通常散布 50～100L/10a、 少量散布 25～50L/10a	耕起10日前 まで(雑草生 育期)		本剤の使用回 数…1回、グリホ サートを含む農薬 の総使用回数…2 回以内	
				茶	一年生 雑草			500～1000mL/10a、 希釈水量:通常散布 50～100L/10a、 少量散布 25～50L/10a	摘採7日前 まで(雑草生 育期)			
				花木				250～500mL/10a、 希釈水量:通常散布 50～100L/10a、 少量散布 25～50L/10a	雑草生育期		本剤の使用回 数…4回以内、グリ ホサートを含む農 薬の総使用回 数…4回以内	
				水田作 物(水稻 を除く)				250～500mL/10a、 希釈水量 100L/10a	耕起20～10 日前(雑草生 育期)		本剤の使用回 数…1回、グリホ サートを含む農薬 の総使用回数…1 回	
				移植水 稲				250～500mL/10a、 希釈水量 50L/10a	湛水前30～ 5日前(雑草 生育期)(不 耕起栽培)			
					多年生 雑草			500～1000mL/10a、 希釈水量 50L/10a				
				直播水 稲	一年生 雑草			250～500mL/10a、 希釈水量 100L/10a	耕起20～10 日前(雑草生 育期)		本剤の使用回 数…3回以内、グリ ホサートを含む農 薬の総使用回 数…耕起栽培は2 回以内(耕起前は1 回以内)、乾田不耕 起栽培は2回以内	
								250～500mL/10a、 希釈水量 50L/10a	耕起直後～ 出芽前(雑草 生育期)(乾 田耕起栽培)			
				多年生 雑草				500mL/10a、 希釈水量 50L/10a				
					一年生 雑草			250～500mL/10a、 希釈水量 50L/10a	は種30日前 ～出芽前(雑 草生育 期)(乾田不 耕起栽培)			
				多年生 雑草				500mL/10a、 希釈水量 50L/10a				
				水田作 物(水田 刈跡)	一年生 雑草			水田刈跡	250～500mL/10a、 希釈水量 25～100L/10a	雑草生育期	本剤の使用回 数…1回、グリホ サートを含む農薬 の総使用回数…1 回	
					多年生 雑草				500～1000mL/10a、 希釈水量 25～100L/10a			
				水田作 物(水田 畦畔)	一年生 雑草			水田畦畔	250～500mL/10a、 希釈水量:通常散布 100L/10a、 少量散布 25L/10a	収穫14日前 まで(雑草生 育期:草丈 30cm以下)	本剤の使用回 数…2回以内、グリ ホサートを含む農 薬の総使用回 数…2回以内	

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場所・ 適用土壌	使用量・ 散布液量	使用時期	使用方法	使用回数	登録 会社					
グリホ サートイ ソプロピ ルアミン 塩液剤 つづき	草枯らし MIC	イソプロピルアンモニ ウム=N-(ホスホノメチ ル)グリシナート… 41.0%	液 剤	水田作 物(水田 畦畔)	多年生 雑草	-	水田畦畔	500～1000mL/10a、 希釈水量:通常散布 100L/10a、 少量散布 25L/10a	収穫14日前 まで(雑草生 育期:草丈 30cm以下)	雑草茎葉散 布	本剤の使用回 数…2回以内、グリ ホサートを含む農 薬の総使用回 数…2回以内	三井化 学アグロ 例					
				水田作 物、畑作 物(休耕 田)	一年生 雑草		休耕地	250～500mL/10a、 希釈水量:通常散布 50～100L/10a、 少量散布 25～50L/10a	雑草生育期 (草丈50cm 以下)								
				牧草	多年生 雑草		牧野、草地 (更新・造 成)	250～500mL/10a、 希釈水量 50L/10a	更新・造成 の10日前ま で(雑草生育 期)	本剤の使用回 数…1回、グリホ サートを含む農薬 の総使用回数…2 回以内							
								500～1000mL/10a、 希釈水量 50L/10a									
					一年生 及び多 年生雑 草			250～500mL/10a、 希釈水量:少量散布 25～50L/10a	は種10日前 ～は種当日 (耕起整地 後:雑草発生 摘期)								
				樹木等	一年生 雑草		公園、庭 園、堤とう、 駐車場、道 路、運動 場、宅地、	500mL/10a、希釈水 量:通常散布 100L/10a、少量散 布25L/10a	雑草生育期	植栽地を除 く樹木等の 周辺地に雑 草茎葉散布	本剤の使用回 数…3回以内、グリ ホサートを含む農 薬の総使用回 数…3回以内						
					多年生 雑草			1000mL/10a、 希釈水量:通常散布 100L/10a、 少量散布 25L/10a									
					スギナ			2000mL/10a、 希釈水量:少量散布 25～50L/10a	生育盛期								
				林木	ススキ、ササ 類、クズ 等の多 年生雑 草		造林地(地 ごしらえ)	1000mL/10a、 希釈水量 20～30L/10a	生育盛期以 降	雑草木茎葉 散布	-						
					クズ		林地	原液又は2倍液、 1～2mL/株	春期又は秋 期	株頭注入処 理							
					落葉雑 かん木			原液又は2倍液、 1mL/ヶ所、 樹径10cm以下:2～ 3ヶ所、 10～20cm:4～8ヶ 所、 20cm以上:10ヶ所	5～10月	立木注入処 理							
				竹類			林地、放置 竹林、畑地	原液、 5～15mL/本	夏～秋期	竹稈注入処 理							
				畑作物													
				樹木等	落葉雑 かん木		公園、庭 園、堤とう、 駐車場、道 路、運動 場、宅地、 のり面、鉄 道等	原液又は2倍液、 1mL/ヶ所、 樹径10cm以下:2～ 3ヶ所、 10～20cm:4～8ヶ 所、 20cm以上:10ヶ所	5～10月	立木注入処 理							

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名	適用雑草	適用地帯	適用場所・適用土壌	使用量・散布液量	使用時期	使用方法	使用回数	登録会社
イソプロン・グリホサートイソプロピルアミン塩・メコプロップ・イソプロピルアミン塩水和剤	シャルウィードPro顆粒水和剤	3-(5-ターシャリーブチル-3-イソキサゾリル)-1,1-ジメチル尿素...25.0%、イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリナート...40.0%、(R)-2-(4-クロロオトリルオキシ)プロピオン酸イソプロピルアミン塩...5.0%	水和剤	樹木等	一年生及び多年生雑草	-	-	1000~3000g/10a、希釈水量100~200L/10a	雑草生育期	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	本剤の使用回数...3回以内、イソプロンを含む農薬の総使用回数...3回以内、グリホサートイソプロピルアミン塩を含む農薬の総使用回数...3回以内、メコプロップイソプロピルアミン塩を含む農薬の総使用回数...3回以内	日本カーリット㈱

SU抵抗性雑草防除の切り札!!

水稲用一発処理除草剤

ホームランキング®

一発で
すべて刈り!



一発で
すべて刈り!



バケで
すべて刈り!



1キログラム剤 75/1キログラム剤 51 フロアブル/Lフロアブル ジャンボ/Lジャンボ

SU抵抗性雑草防除はおまかせ!!

水稲用一発処理除草剤

ゴウワン®

一発で
すべて刈り!



一発で
すべて刈り!



バケで
すべて刈り!



1キログラム剤 75/1キログラム剤 51 フロアブル/Lフロアブル ジャンボ/Lジャンボ

「低コスト」「省力」「安全」ニーズに応えるホームラン剤 **MP-100**

●ノビエ2.5葉期まで効果がある(ジャンボ剤は2葉期まで)

●ノビエに対する効果がながく続く

●稲への安全性が高い

JAグループ

農 協 | 全 農 | 経済連

☎ 登録販売者 第4702318号

北興化学工業株式会社

〒103-8341 東京都中央区日本橋本石町4-4-20
ホームページアドレス <http://www.hokkochem.co.jp/>

®は北興化学工業(株)の登録商標