

平成 21 年度 水稻作関係除草剤試験判定結果

財団法人 日本植物調節剤研究協会

平成 21 年度水稻作関係除草剤試験成績中央検討会は、平成 21 年 12 月 10 日、11 日の 2 日間、浅草ビューホテルにおいて、適 1 試験成績検討会は、これに先立ち平成 21 年 10 月 14 日 ホテルラングウッドにて開催された。ここに、これら検討会における判定結果を報告する。

1) 第一次適用性試験 (適 1) は、北海道地域 (植調北海道試験地)、東北地域 (植調古川試験地)、北陸地域 (植調新潟試験地)、関東地域 (植調研究所)、近畿・中

国・四国地域 (植調滋賀試験地)、九州地域 (植調福岡試験地) の全国 6 地域および砂壤土 (植調霞ヶ浦試験地) で 24 薬剤 (のべ 136 点) について実施した。その判定結果は、第 2 表のとおりである。

2) 第二次適用性試験 (適 2) は、のべ 2,324 剤 (総点数点) であり、その内訳を第 1 表にまとめた。これら適 2 の判定結果は第 3 表のとおりであり、「実・継」と判定された薬剤の使用基準を後に掲載した。

第1表 平成21年度適2試験実施点数

A-1 移植栽培(一発処理)	141 剤	1,390 点	A-4 特殊雑草対象 内訳		
A-2 移植栽培(体系処理:初期)	13 剤	100 点	エゾノサヤヌカグサ	20 剤	20 点
A-3 移植栽培(体系処理:中後期)	15 剤	88 点	オモダカ	76 剤	260 点
A-4 移植栽培(特殊雑草対象)	のべ 269 剤	616 点	キシウスズメノヒエ	1 剤	1 点
B 直播栽培	44 剤	130 点	クサネム	3 剤	6 点
			クログワイ	73 剤	199 点
			コウキヤガラ	44 剤	78 点
			シズイ	20 剤	20 点
			ミズアオイ	19 剤	19 点
			SU 抵抗性コナギ	3 剤	3 点
			SU 抵抗性ホタルイ	10 剤	10 点

第2表 平成21年度 水稻関係除草剤適1試験 成績判定結果一覧

注) 総合評価欄、中央判定欄の記号については、◎:極めて有望、○:有望、□:可能性有り、△:再検討、×:見込みなしを表す

No.	薬剤名・剤型 [委託者]	有効成分及び含有率 (%)	実施場所別総合評価							中央判定 [今後の検討課題]
			北海道	北川	古湯	新植	滋賀	福岡	霞ヶ浦(砂)	
1	KUH-091-1kg 粒 [クミ化]	既知化合物A:0.67% 既知化合物B:2.0%	○	○	○	□	◎	△	□	□ 一発処理 [ノビエに対する効果の確認]
2	KYH-0901 フロアブル [協友アグリ]	イマズスルフロン:1.8% オキサシクロメホン:0.6% ピラクロニル:4.0% プロモプチド:18.0% (w/v)				◎	○	◎	□	○ 一発処理 [年次変動の確認]
3	NC-609 ジャンボ [日産]	ピラクロニル:5% ピラゾスルフロンエチル:0.75% ブタクロール:18.75% ベンゾビシクロン:5%	○	○	○	○	◎	△	□	○ 一発処理 [年次変動の確認]
4	NC-626-1kg 粒 [日産]	オキサシクロメホン:0.4% ピラゾスルフロンエチル:0.3% ピラクロニル:2% ベンゾビシクロン:2%	○	○	○	□	◎	□	○	○ 一発処理 [年次変動の確認]
5	S-9058 フロアブル [住友化学]	プロピリスルフロン (TH-547):1.8% プロモプチド:18%(w/v)	○	○	◎	◎	◎	○	◎	○ 一発処理 [年次変動の確認]
6	S-9058-1kg 粒 [住友化学]	プロピリスルフロン (TH-547):0.9% プロモプチド:9.0%	○	○	◎	◎	◎	○	◎	○ 一発処理 [年次変動の確認]
7	S-9102 粒 [住友化学]	イマズスルフロン:0.3% カフエンストロール:0.7% ダイムロン:1.7% プロモプチド:3% カルタップ(殺虫剤):5.3%				◎	○	○	◎	○ 一発処理 [年次変動の確認]
8	S-9311-1kg 粒 [住友化学]	既知化合物A:0.9% 既知化合物B:15.0%	○	○	○	○	○	○	○	○ 一発処理 [年次変動の確認]
9	SB-531 フロアブル [SDS]	既知化合物A:4.0% ベンゾビシクロン:4.0%(w/v)	□	□	□	○	◎	○	□	□ 一発処理 [ノビエに対する効果の確認]
10	SB-531 フロアブル (少量散布) [SDS]	既知化合物A:4.0% ベンゾビシクロン:4.0%(w/v)	□	○	□	○	○	○	○	○ 体系処理(初期) [年次変動の確認]
11	SB-596 フロアブル [SDS]	既知化合物A:2.4% 既知化合物B:3.0% 既知化合物C:6.0%(w/v)	○	□	○	○	◎	○	○	○ 一発処理 [年次変動の確認]
12	SB-596-1kg 粒 [SDS]	既知化合物A:1.2% 既知化合物B:1.5% 既知化合物C:3.0%	○	□	○	○	◎	○	○	○ 一発処理 [年次変動の確認]

No.	薬剤名・剤型 [委託者]	有効成分及び含有率 (%)	実施場所別総合評価							中央判定 [今後の検討課題]
			北海道	北川	新潟	植調	滋賀	福岡	霞ヶ浦(砂)	
13	SL-0601(RC)-0.5kg 粒 (全面散布) [石原]	カルフェントラゾンエチル:1.8% フルセトスルフロ:0.44%		□	○				□	□ 一発処理 [ノビエ、ホタルイに対する効果の確認]
14	SL-0701(RC)-0.5kg 粒 (全面散布) [石原]	フルセトスルフロ:0.44% カブエンストロール:4.2% カルフェントラゾンエチル:1.8% ベンゾビシクロ:4.0%		□	□				□	□ 一発処理 [ミズガヤツリに対する効果の確認]
15	SL-4901-1kg 粒 [石原]	ビラゾキシフェン:10% ベンゾビシクロ:2.0%				○	◎			○ 体系処理(初期) [年次変動の確認]
16	SW-091-1kg 粒 [*三井化学アグロ, 科研]	ビラゾレート:12.0% ベンゾビシクロ:2.0% ベントキサゾン:3.6%	□	□	△	□	◎	□	△	□ 一発処理 [ノビエに対する効果の確認]
17	SYJ-156H シャンボ [シンジエンタ]	ビリフタリド:3.0% プレチラクロール:9.0% ペンシルフロメチル:1.5% メトリオン:1.8%	○	□						□ 一発処理 [効果・葉害の確認]
18	SYJ-156H-1kg 粒 [シンジエンタ]	ビリフタリド:1.5% プレチラクロール:4.5% ペンシルフロメチル:0.75% メトリオン:0.9%	□	□						□ 一発処理 [効果の確認]
19	SYJ-157H シャンボ [シンジエンタ]	ビリフタリド:3.0% プレチラクロール:9.0% ペンシルフロメチル:1.02% メトリオン:1.8%			○	□	◎	□	□	□ 一発処理 [効果・葉害の確認]
20	SYJ-157H-1kg 粒 [シンジエンタ]	ビリフタリド:1.5% プレチラクロール:4.5% ペンシルフロメチル:0.51% メトリオン:0.9%			○	○	◎	□	□	□ 一発処理 [効果の確認]
21	SYJ-167H-1kg 粒 [シンジエンタ]	プレチラクロール:4.5% メトリオン:0.9%	□	○	△	△	◎	□	△	□ 一発処理 [効果の確認]
22	SYJ-222-1kg 粒 [シンジエンタ]	既知化合物A:2.4% 既知化合物B:0.9% 既知化合物C:0.8%	□	□	○	○	○	○	□	○ 一発処理 [年次変動の確認]
23	HOK-0901 フロアブル [北興]	ベントキサゾン:5%(w/v)	□	□	△	□	□	□	□	□ 体系処理(初期) [効果の確認]
24	HOK-0901-1kg 粒 [北興]	ベントキサゾン:2.5%	□	□	△	□	△	□	□	□ 体系処理(初期) [効果の確認]

第3表 平成21年度 水稻関係除草剤適2試験判定結果一覧

区 分	実・継		継	
A-1 一発処理	* BAH-041-1kg 粒	BCH-031-1kg 粒	HOK-0801S-1kg 粒	KUH-072D シャンボ'
	BCH-032-1kg 粒	BCH-033-1kg 粒	KUH-072K シャンボ'	KUH-091-1kg 粒
	BCH-044-1kg 粒	BCH-051 シャンボ'	KYH-0901 フロアブル	NC-609 シャンボ'
	BCH-051 フロアブル	BCH-052 フロアブル	NC-626-1kg 粒	S-9058 シャンボ'
	BCH-053 フロアブル	BCH-062 シャンボ'	S-9058 フロアブル	S-9058-1kg 粒
	BCH-063 シャンボ'	BCH-065L フロアブル	S-9102 粒	S-9311-1kg 粒
	* BCH-085L-1kg 粒	DPX-84ND(L) 粒	S-9421 シャンボ'	SB-531 フロアブル
	HOK-0301 フロアブル	HOK-0401(L) フロアブル	SB-596 フロアブル	SB-596-1kg 粒
	HOK-0605 シャンボ'	HOK-0605 フロアブル	SL-0601(RC)-0.5kg 粒(全面散布)	SL-0701(RC)-0.5kg 粒(全面散布)
	HOK-0605(L) フロアブル	HOK-0605(L)-1kg 粒	SW-064-1kg 粒	SW-091-1kg 粒
	HOK-0605-1kg 粒	HOK-0605S-1kg 粒	SYJ-156H シャンボ'	SYJ-156H-1kg 粒
	HOK-0611-1kg 粒	* HOK-0801 シャンボ'	SYJ-157H シャンボ'	SYJ-157H-1kg 粒
	* HOK-0801 フロアブル	* HOK-0801(L) シャンボ'	SYJ-167H-1kg 粒	SYJ-222-1kg 粒
	* HOK-0801(L) フロアブル	* HOK-0801(L)-1kg 粒		
	* HOK-0801-1kg 粒	HOK-222 フロアブル		
	HOK-222-1kg 粒	HOK-223-1kg 粒		
	KPP-398 フロアブル	KPP-398(L) フロアブル		
	* KPP-398(L)-1kg 粒	* KPP-398-1kg 粒		
	* KPP-406(L) フロアブル	* KPP-501(L)-1kg 粒		
	* KPP-501-1kg 粒	* KUH-021 シャンボ'		
	KUH-021-0.25kg 粒	* KUH-041 シャンボ'		
	* KUH-041-0.25kg 粒	KUH-041-1kg 粒		
	* KUH-072D-0.25kg 粒	* KUH-072D-1kg 粒		
	* KUH-072K-0.25kg 粒	* KUH-072K-1kg 粒		
	* KUH-074 シャンボ'	* KUH-074-0.25kg 粒		
	KUH-074-1kg 粒	* KUH-074L-1kg 粒		
	NC-385SB-1kg 粒	NC-397-1kg 粒		
	NC-606 フロアブル	NC-609-1kg 粒		
	NC-617SB-1kg 粒	NC-618-1kg 粒		
	NC-621 シャンボ'	NC-621 フロアブル		
	NC-621-1kg 粒	NH-051(H) シャンボ'		
	NH-051(H) フロアブル	NH-051(H)-1kg 粒		
	NH-061-1kg 粒	NH-071D シャンボ'		
	NH-071D フロアブル	NH-071D-1kg 粒		
	NH-303 シャンボ'	* S-9421(旧SB-573) フロアブル		
	* S-9421(旧SB-573)-1kg 粒	SB-556-1kg 粒		
	SB-564 シャンボ'	SB-564 フロアブル		
	SB-564-1kg 粒	SL-0601 シャンボ'		
	SL-0601-1kg 粒	SL-0602-1kg 粒		
	SL-0701-1kg 粒	* SL-4902 フロアブル		
	SL-4902-1kg 粒	* SL-4903-1kg 粒		

区 分	実・継		継	
A-1 一発処理 つづき	SL-954 シャンボ SST-403 シャンボ SST-404 フロアブル SW-032(L) フロアブル SW-043-1kg 粒 SW-062 フロアブル SYJ-157-1kg 粒 * SYJ-219-1kg 粒 TH-501 フロアブル TH-547(Z) シャンボ TH-547(Z)-1kg 粒 TH-601 フロアブル HOK-221 シャンボ NC-627(HBCH-064) フロアブル BAG-032 シャンボ NC-606-1kg 粒 NC-604-1kg 粒	* SL-954-0.5kg 粒 SST-404 シャンボ SST-404-1kg 粒 SW-041(L)-1kg 粒 SW-052 シャンボ SW-907 粒 SYJ-167-1kg 粒 TH-501 シャンボ TH-501-1kg 粒 TH-547(Z) フロアブル * TH-601 シャンボ TH-601-1kg 粒 NC-627(HBCH-064) シャンボ NC-627(HBCH-064)-1kg 粒 NC-606 シャンボ NC-604 シャンボ		
A-2 体系(初期)	AKD-7155 フロアブル KPP-314 フロアブル NSK-850 フロアブル SL-4901-1kg 粒 YH-650-1kg 粒	* HOK-201-1kg 粒 * KUH-071-1kg 粒 * SL-4901 フロアブル YH-650 フロアブル	SB-531 フロアブル(少量散布) HOK-0901 フロアブル	SL-4901 フロアブル(少量散布) HOK-0901-1kg 粒
A-3 体系(中後期)	DASH-001 SC * HOK-0802-1kg 粒 SB-551-1kg 粒 SL-0401-1kg 粒 SL-0601-1kg 粒 SL-0613 顆粒水和 SW-051-1kg 粒 SW-973-1kg 粒	HOK-0721 粒 KUH-073-1kg 粒 SL-0401 シャンボ SL-0401-1kg(1.5kg処理) 粒 SL-0604-1kg 粒 * SL-0613 顆粒水和(顆粒のまま) SW-063-1kg 粒		
A-4 エゾノサヤヌカグサ	* HOK-0301 フロアブル * HSW-052 フロアブル * TH-501 フロアブル * TH-547(Z) シャンボ * TH-547(Z)-1kg 粒	* HSW-051-1kg 粒 * NH-061-1kg 粒 * TH-501-1kg 粒 * TH-547(Z) フロアブル	BCH-051 シャンボ BCH-062 シャンボ HOK-0605 シャンボ HOK-0605-1kg 粒 SL-4902 フロアブル SL-954-0.5kg 粒	BCH-051 フロアブル BCH-063 シャンボ HOK-0605 フロアブル KUH-021-1kg 粒 SL-4902-1kg 粒
A-4 オモダカ	BCH-031-1kg 粒 BCH-033-1kg 粒 BCH-053 フロアブル DPX-84ND(L) 粒 * HOK-0605-1kg 粒 * NBA-101SB シャンボ * NC-385SB-1kg 粒	BCH-032-1kg 粒 BCH-052 フロアブル * BCH-065L フロアブル * HOK-0605(L)-1kg 粒 * HOK-0605S-1kg 粒 NC-385SB 顆粒水和 * NC-604 シャンボ	BAH-041-1kg 粒 BCH-051 フロアブル BCH-063 シャンボ HOK-0301 フロアブル HOK-0605 フロアブル HOK-0721 粒 HOK-0801 フロアブル	BCH-051 シャンボ BCH-062 シャンボ BCH-085L-1kg 粒 HOK-0605 シャンボ HOK-0605(L) フロアブル HOK-0801 シャンボ HOK-0801(L) シャンボ

区 分	実・継		継	
A-4 オモダカ つづき	* NC-604 フロアブル	* NC-604-1kg 粒	HOK-0801(L) フロアブル	HOK-0801(L)-1kg 粒
	* NC-606 シャンボ	* NC-617SB-1kg 粒	HOK-0801-1kg 粒	KPP-398 フロアブル
	* NC-618-1kg 粒	* NH-071D シャンボ	KPP-398(L) フロアブル	KPP-398(L)-1kg 粒
	* NH-071D フロアブル	* NH-071D-1kg 粒	KPP-398-1kg 粒	KUH-073-1kg 粒
	* SL-0601 シャンボ	* SL-0601-1kg 粒	NC-609-1kg 粒	NC-621-1kg 粒
	SL-0602-1kg 粒	SL-0613 顆粒水和	NH-051(H) シャンボ	NJM-754 粒
	* SL-0701-1kg 粒	* SST-403 シャンボ	SL-4901-1kg 粒	SL-4903-1kg 粒
	* SST-403 フロアブル	* SST-403-1kg 粒	SST-402-1kg 粒	SW-052 シャンボ
	* SST-404 シャンボ	* SW-043-1kg 粒	SW-061-1kg 粒	SW-062 フロアブル
	SW-051-1kg 粒	* TH-501 フロアブル	TH-501 シャンボ	TH-601 フロアブル
	* TH-501-1kg 粒	YH-650 フロアブル	TH-601-1kg 粒	NC-627(HBCH-064) シャンボ
	YH-650-1kg 粒		NC-627(HBCH-064) フロアブル	NC-627(HBCH-064)-1kg 粒
			SB-556-1kg 粒	
A-4 キシュウスズメノヒエ	* NC-612-1kg 粒			
A-4 クサネム			BCH-031-1kg 粒	YH-650-1kg 粒
			BCH-032-1kg 粒	
A-4 クログワイ	BCH-031-1kg 粒	BCH-032-1kg 粒	BAH-041-1kg 粒	BCH-051 シャンボ
	BCH-033-1kg 粒	BCH-052 フロアブル	BCH-051 フロアブル	BCH-062 シャンボ
	BCH-053 フロアブル	* BCH-065L フロアブル	BCH-063 シャンボ	BCH-085L-1kg 粒
	DASH-001 SC	DPX-84ND(L) 粒	HOK-0605 シャンボ	HOK-0605 フロアブル
	* HOK-0605(L)-1kg 粒	* HOK-0605S-1kg 粒	HOK-0605(L) フロアブル	HOK-0605-1kg 粒
	* KPP-398(L) フロアブル	KUH-021-1kg 粒	HOK-0721 粒	HOK-0801 シャンボ
	* KUH-073-1kg 粒	MAT-159 シャンボ	HOK-0801 フロアブル	HOK-0801-1kg 粒
	* NBA-101SB シャンボ	* NC-385SB 顆粒水和	HOK-222-1kg 粒	KPP-398 フロアブル
	* NC-385SB-1kg 粒	* NC-604 シャンボ	KPP-398(L)-1kg 粒	KPP-398-1kg 粒
	NC-604 フロアブル	* NC-604-1kg 粒	KPP-406(L) フロアブル	NC-606 フロアブル
	* NC-606 シャンボ	* NC-617SB-1kg 粒	NC-609-1kg 粒	NC-621-1kg 粒
	* NC-618-1kg 粒	* NH-071D シャンボ	NH-051(H) シャンボ	SL-4903-1kg 粒
	* NH-071D フロアブル	* NH-071D-1kg 粒	SW-052 シャンボ	SW-061-1kg 粒
	* SL-0401 シャンボ	* SL-0601 シャンボ	SW-062 フロアブル	TH-501 シャンボ
	SL-0602-1kg 粒	SL-0613 顆粒水和	TH-501-1kg 粒	TH-601 フロアブル
	* SL-0701-1kg 粒	* SST-403 シャンボ	TH-601-1kg 粒	YH-650-1kg 粒
	SST-403 フロアブル	SST-403-1kg 粒		
	* SST-404 シャンボ	* SW-043-1kg 粒		
	SW-051-1kg 粒	SW-063-1kg 粒		
	TH-001 フロアブル	* TH-501 フロアブル		
	* YH-650 フロアブル			
A-4 コウキヤガラ	* DASH-001 SC	NC-612-1kg 粒	BAH-041-1kg 粒	BCH-031-1kg 粒
	* SL-0401 シャンボ	SL-0401-1kg 粒	BCH-032-1kg 粒	KPP-398(L) フロアブル
	SL-0401-1kg(1.5kg処理) 粒	* SL-0601 シャンボ	KPP-398(L)-1kg 粒	KUH-074-1kg 粒
	SL-0601-1kg 粒	SL-0602-1kg 粒	NH-051(H) フロアブル	NH-051(H)-1kg 粒
	SL-0604-1kg 粒	* SL-0701-1kg 粒	NH-061-1kg 粒	NH-071D シャンボ

区 分	実・継		継	
A-4 コウキヤガラ つづき	* SST-403 シャンボ SST-403-1kg 粒 SST-404 フロアブル TH-001 フロアブル TH-224 フロアブル TH-547(Z) フロアブル * YH-650 フロアブル	SST-403 フロアブル * SST-404 シャンボ * SW-051-1kg 粒 TH-122-1kg 粒 * TH-501 フロアブル TH-547(Z)-1kg 粒	NH-071D フロアブル SL-4901-1kg 粒 SL-4902-1kg 粒 TH-501 シャンボ TH-601 フロアブル YH-650-1kg 粒	NH-071D-1kg 粒 SL-4902 フロアブル SL-4903-1kg 粒 TH-501-1kg 粒 TH-601-1kg 粒
A-4 シズイ	* KUH-041-1kg 粒 * SW-051-1kg 粒 * TH-501 フロアブル	* SST-404-1kg 粒 * TH-547(Z)-1kg 粒	BCH-032-1kg 粒 KUH-031 粒 NC-606 シャンボ NC-617SB-1kg 粒 NH-051(H) シャンボ SL-0601-1kg 粒 SL-0613 顆粒水和 TH-547(Z) シャンボ	KPP-398 フロアブル NC-604 シャンボ NC-609-1kg 粒 NC-618-1kg 粒 NH-061-1kg 粒 SL-0602-1kg 粒 SST-404 シャンボ
A-4 ミズアオイ	* SYJ-167-1kg 粒 * TH-501-1kg 粒	* TH-501 フロアブル	BCH-031-1kg 粒 BCH-063 シャンボ NC-609-1kg 粒 SW-043-1kg 粒 TH-547(Z) シャンボ TH-547(Z)-1kg 粒 TH-601-1kg 粒 NC-627(IBCCH-064) シャンボ NC-627(IBCCH-064) フロアブル	BCH-062 シャンボ KUH-041-1kg 粒 SL-954-0.5kg 粒 SW-062 フロアブル TH-547(Z) フロアブル TH-601 フロアブル NC-627(IBCCH-064)-1kg 粒
A-4 SU抵抗性コナギ			SL-0602-1kg 粒 NC-618-1kg 粒	NC-617SB-1kg 粒
A-4 SU抵抗性ホタルイ			BCH-062 シャンボ NC-609-1kg 粒 SYJ-167-1kg 粒 NC-627(IBCCH-064) フロアブル NC-617SB-1kg 粒	BCH-063 シャンボ SL-954-0.5kg 粒 NC-627(IBCCH-064) シャンボ NC-627(IBCCH-064)-1kg 粒 NC-618-1kg 粒
B 直播栽培	NC-331 水和 SW-751 粒(少量散布) * NBA-101SB シャンボ NC-385SB-1kg 粒 * NH-302 フロアブル * SL-0601-1kg 粒 * SST-404-1kg 粒 * BAS-3510(Na) 粒 DEH-112 乳(EW) * NC-612-1kg 粒 SL-0401-1kg(1.5kg処理) 粒	SL-0612 顆粒水和(乾直入水前) SW-751 粒 NC-385SB 顆粒水和 * NH-051(H)-1kg 粒 SB-556 フロアブル * SST-404 フロアブル SW-043-1kg 粒 DASH-001 SC KUH-031 粒 SL-0401-1kg 粒	SL-4901 フロアブル SL-4901-1kg 粒 BCH-085L-1kg 粒 HOK-0605-1kg 粒 KUH-074-1kg 粒 NH-071D フロアブル SST-404 シャンボ SYJ-150 フロアブル NC-606 シャンボ HOK-0721 粒 SL-0613 顆粒水和 S-9146-1kg 粒	SL-4901 フロアブル(少量散布) BCH-065L フロアブル HOK-0605(L)-1kg 粒 HOK-0605S-1kg 粒 NH-061-1kg 粒 NH-071D-1kg 粒 SW-062 フロアブル SYJ-157-1kg 粒 NC-606 フロアブル KUH-073-1kg 粒 SW-063-1kg 粒

注): 1) 本年度新規に使用基準が作成されたものは、薬剤名に「*」を記した。

2) 本年度は「実」、「継」及び「中止」と判定された薬剤はなかった。

平成21年度 水稲関係除草剤使用基準一覧表

A 移植栽培

A-1 一発処理

A-1

BAH-041-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	オタノイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウツリ	クロツリ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	莠類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●1.5	●	●始	●始		●始			●発生期			+0～ノビエ1.5L	1kg		●
東北	●1.5	●	●始	●始	●始	●始			●発生期					●	●
北陸	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生期		●前				●
関東・東海	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生期		●前				●
近・中・四	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生期		●前			●	●
九州	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生期						●

田植同時散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:
散布後の暑い・多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

BCH-031-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	オタノイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウツリ	クロツリ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	莠類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		○始	○発生期	○再生前 ～始	エゾノギヤサツリ2L	+5～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始2	○2	○始	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始				○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始	●始※	●始	○発生期	○再生前 ～始				○*	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○始※	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○始※	●始※	●始		○再生前 ～始				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○始※		○始※	○発生期	○再生前 ～始				○	○

※: オモダカ・クロツリ防除は、有効な後処理剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:
*: 浅植え、植付け精度不良等で薬害を生じることがある。
セリは再生が早い場合は効果が劣る。(九州)
散布後の暑い・多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
クロツリ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する(東北・九州)。
クロツリ防除は有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用する(北陸・関東・東海・近畿・中国・四国)。
オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。(東北・関東・東海)
オモダカ防除は有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用する。(北海道・北陸・近畿・中国・四国)

A-1

BCH-032-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	オタノイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウツリ	クロツリ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	莠類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		○始	○発生期	○再生前 ～始	エゾノギヤサツリ2L [ミズイ: 2L 低濃度: 300ml: 2L]	+5～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始				○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始	○始	○始	○発生期	○再生前 ～始		+5～ノビエ2.5L		○*	○
関東・東海	○3	○	○3		○2	○始※	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始		+5～ノビエ3L		○	○
近・中・四	○3	○	○3		○2	○始	●始	●始	○発生期	○再生前 ～始				○	○
九州	○3	○	○3		○3	○3			○発生期	○再生前 ～始		+5～ノビエ3L (砂 土は2.5Lまで)		○	○

※: オモダカ・クロツリ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:
*: 浅植え、植付け精度不良等で薬害を生じることがある。
セリは再生が早い場合は効果が劣る。(九州)
散布後の暑い・多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クロツリ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

BCH-033-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	オラルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		○始	○発生期	○再生前 ～始	コノノキヤミタツツ2L ミズアライ2L SL/脂溶性のクログワイ2L	+5～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○3	○	○2	○2	○2	○始	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始		+5～ノビエ3L		○	○
北陸	○3	○	○2		○2	○始	○始	○始	○発生期	○再生前 ～始				○	○
関東・東海	○3	○	○3		○2	○2	○始※	●始	○発生期	○再生前 ～始				○	○
近・中・四	○3	○	○3		○2	○2	●始	●始	○発生期	○再生前 ～始				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2		○始※	○発生期	○再生前 ～始		+5～ノビエ2.5L		○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の低湿条件により強い生育抑制を受けることがある。(北海道)

セリは再生が早い場合は効果が劣る。(九州)

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

BCH-044-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	オラルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生期	○再生前 ～始	コノノキヤミタツツ2L ミズアライ2L SL/脂溶性のクログワイ2L	+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○

田植同時散布可能

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

BCH-051 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	オラルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生期	○再生前 ～始		+5～ノビエ2.5L	30g×10コ	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始2	○2	○始			○発生期	○再生前 ～始				○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生期	○再生前 ～始				○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: セリは再生が早い場合は効果が劣る。(九州)

5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な悪害や効果不足が生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

BCH-051 フラブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	オラルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生期	○再生前 ～始		+5～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生期	○再生前 ～始				○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生期	○再生前 ～始				○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: セリは再生が早い場合は効果が劣る。(九州)

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

BCH-052 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカワ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	○3	○	○2	○2		○2		○始	○発生期	○再生前 ～始		+5～ノビエ3L	500ml	○	○
東北	○3	○	○2	○2	○2	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始				○	○
北陸	○3	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				○*	○
関東・東海	○3	○	○3		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				●**	○
近・中・四	○3	○	○3		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				●*	○
九州	○3	○	○3		○3	○3			○発生期	○再生前 ～始				○	○

※:オモダカ・クロダワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

*: 散布後の低湿条件により強い生育抑制を受けることがある。

*: 浅植え、植付け精度不良等で薬害を生じることがある。

薬液が付着した稲体には白化症状が生ずることがある。

セリは再生が早い場合は効果が劣る。(九州)

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クロダワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

BCH-053 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカワ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	○3	○	○2	○2		○2		○始	○発生期	○再生前 ～始		+5～ノビエ3L	500ml	○	○
東北	○3	○	○2	○2	○2	○始	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始				○	○
北陸	○3	○	○2		○2	○始			○発生期	○再生前 ～始				○	○
関東・東海	○3	○	○3		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				●*	○
近・中・四	○3	○	○3		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				○	○
九州	○3	○	○3		○3	○3			○発生期	○再生前 ～始				○	○

※:オモダカ・クロダワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

*: 散布後の低湿条件により強い生育抑制を受けることがある。

*: 浅植え、植付け精度不良等で薬害を生じることがある。

薬液が付着した稲体には白化症状が生ずることがある。

セリは再生が早い場合は効果が劣る。(九州)

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クロダワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

BCH-062 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカワ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生期	○再生前 ～始		+5～ノビエ2.5L	40g×10コ	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生期	○再生前 ～始				○	○
北陸	○2.5	○	○2		○始2	○始2			○発生期	○再生前 ～始				●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

セリは再生が早い場合は効果が劣る(九州)。

5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

BCH-063 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカワ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生期	○再生前 ～始		+5～ノビエ2.5L	50g×10コ	●	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生期	○再生前 ～始				○	○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生期	○再生前 ～始				○*	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

*: 浅植え、植付け精度不良等で薬害を生じることがある。

セリは再生が早い場合は効果が劣る。(九州)

5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

BCH-085L フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ワカワ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始	●始	●始	○発生期	○再生前 ～始		+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始	●始	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始	●始	○発生期	○再生前 ～始	●前			○	○
九州	○2.5	○	○2	○始	○2	○2	●始※	●始※	○発生期	○再生前 ～始	●前			○	○

田植同時散布可能
※:オモダカ・クロダワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クロダワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

BCH-085L-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ワカワ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始	●前	+0～ノビエ2.5L	1kg	●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始	●前				●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始				●	●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始				●	●

田植同時散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

DPX-84ND(L) 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ワカワ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	○3	○	○2		○2	○2	●始	●始	○発生期	○再生前 ～始	○前	+5～ノビエ3L	3kg	○	○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2	○始	○始	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2	●始	○始	○発生期	○再生前 ～始				○(毎週 散布)	○
九州	○3	○	○2		○2	○2	○始	○始	○発生期	○再生前 ～始				○	○

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クロダワイ防除は、有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

HOK-0301 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ワカワ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生期		エゾノキヌササギ2.5L	+5～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○始※		○発生期					○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始	○始※		○発生期					○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生期		○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生期		○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生期					○	○

※:クロダワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
クロダワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

HOK-0401(L) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クロダウイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生期	○再生前 ～始		+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始	●前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○

田植同時散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

HOK-0605 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クロダウイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生期	○再生前 ～始	○前	+0～ノビエ2.5L	50g×10+	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生期	○再生前 ～始				○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

A-1

HOK-0605 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クロダウイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生期	○再生前 ～始	○前	+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生期	○再生前 ～始	●前			○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

田植同時散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

A-1

HOK-0605(L) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クロダウイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生期	○再生前 ～始		+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始	●前			○	○

田植同時散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

HOK-0605(L)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウツカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始	●始	●始		○再生前 ～始		+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始	○前	+0～ノビエ2.5L		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始	○前	+0～ノビエ2.5L		○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				○	○

田植同時散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 連播え、種付け精度不良等で悪害を生じることがある。(北陸)
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

HOK-0605-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウツカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生期	○再生前 ～始		+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始		●始※	○発生期	○再生前 ～始				○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

田植同時散布可能
※オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

HOK-0605S-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウツカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生期	○再生前 ～始		+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○

田植同時散布可能
※オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

HOK-0611-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウツカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道															
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生期	●再生前 ～始	●始	+3～ノビエ2.5L	1kg	●	●
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

A-1

HOK-0801 シヤンゴ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウツカワ	クロダツイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生期	●再生前 ～始		+0～ノビエ2.5L	50g×10コ		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生期	●再生前 ～始					●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な被害や効果不足を生じることがある。

A-1

HOK-0801 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウツカワ	クロダツイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生期	●再生前 ～始		+0～ノビエ2.5L	500ml		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生期	●再生前 ～始				●	●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

田植同時散布可能
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 田植前に生着したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

HOK-0801(L) シヤンゴ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウツカワ	クロダツイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道															
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始		+0～ノビエ2.5L	50g×10コ	●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始	●前				●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始				●	●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始					●

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な被害や効果不足を生じることがある。
 浅植え、植付け精度不良等で根が露出すると被害を生じることがある。(九州)
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生着したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

HOK-0801(L) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウツカワ	クロダツイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道															
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生期	●再生前 ～始		+0～ノビエ2.5L	500ml	●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始	●前				●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始	●前			●	●
九州	●2.5	●	●2	●始	●2	●2			●発生期	●再生前 ～始	●前				●

田植同時散布可能
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 浅植え、植付け精度不良等で根が露出すると被害を生じることがある。(九州)
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生着したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

HOK-0801(L)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスギヤ ツリ	ウリカワ	クロダウイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道															
東北															
北陸	●2.5	●	●2	●2	●始				●発生期	●再生前		+0～ノビエ2.5L	1kg	●	●
関東・東海	●2.5	●	●2	●始	●2				●発生期	●再生前					●
近・中・四	●2.5	●	●2	●2	●2				●発生期	●再生前				●	●
九州	●2.5	●	●2	●2	●2				●発生期	●再生前	●枯(表 層)				●

田植同時散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 浅植え、植付け精度不良等で根が露出すると障害を生じることがある。(九州)
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスギヤツリには効果が劣る。

A-1

HOK-0801-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスギヤ ツリ	ウリカワ	クロダウイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生期	●再生前		+0～ノビエ2.5L	1kg		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生期	●再生前				●	●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

田植同時散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

A-1

HOK-222 70アブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスギヤ ツリ	ウリカワ	クロダウイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始		○始	○発生期	○再生前	○前	+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始		○始※	○発生期	○再生前	○前			○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

水口処理可能 田植同時散布可能
※: オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: オモダカ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

HOK-222-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスギヤ ツリ	ウリカワ	クロダウイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		○始	○発生期	○再生前	○前	+5～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○始	○始		○始※	○発生期	○再生前	○前	+0～ノビエ2.5L (砂壌土は+5～)		○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

田植同時散布可能
※: オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 低湿等による活着不良の場合には障害が生じることがある。(東北)
オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1
HOK-223-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロダツイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壤土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始	○前	+0～ノビエ2.5L (砂 壌土は+5～)	1kg	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始	○前	+5～ノビエ2.5L		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○

田植同時散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1
KPP-398 フォアフル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロダツイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壤土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始			○発生期	○再生前 ～始		+0～ノビエ1.5L	500ml	●	○
東北	○1.5	○	○始	○始	○始	○始			○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

田植同時散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

A-1
KPP-398(L) フォアフル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロダツイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壤土
北海道															
東北															
北陸	○1.5	○	○始		○始	○前	●始		○発生期	○再生前 ～始	●前	+0～ノビエ1.5L	500ml	●	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生期	○再生前 ～始	○前			●	○
近・中・四 (2)	○1.5	○	○始		○始	○始	●始		○発生期	○再生前 ～始	○前			●	○
九州	○1.5	○	○始		○2	○始	●始※		○発生期	○再生前 ～始	○前			●	○

田植同時散布可能
※クロダツイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
クロダツイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1
KPP-398(L)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロダツイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壤土
北海道															
東北															
北陸	●1.5	●	●始		●始	●前				●再生前 ～始		+0～ノビエ1.5L	1kg	●	●
関東・東海	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生期	●再生前 ～始				●	●
近・中・四	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生期	●再生前 ～始				●	●
九州	●1.5	●	●始	●前	●始	●始				●再生前 ～始	●始(高 頻)			●	●

田植同時散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1
KPP-398-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	オタリイ	ヘラオモ タカ	ミスギヤ ツリ	ウツカワ	クロタツイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	落葉・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●1.5	●	●始	●始		●始			●発生期	●再生前 ～始		+0～ノビエ1.5L	1kg		●
東北	●1.5	●	●始	●前	●始	●始			●発生期	●再生前 ～始				●	●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															
田植同時散布可能 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:															

A-1
KPP-406(L) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	オタリイ	ヘラオモ タカ	ミスギヤ ツリ	ウツカワ	クロタツイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	落葉・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	●2	●	●2		●2	●始			●発生期	●再生前 ～始		+0～ノビエ2L	500ml	●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始	●前	+0～ノビエ2.5L		●	●
近・中・四	●2	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始		+0～ノビエ2L		●	●
九州	●2	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始	●前				●
全面散布(北陸) 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスギヤツリには効果が劣る。															

A-1
KPP-501(L)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	オタリイ	ヘラオモ タカ	ミスギヤ ツリ	ウツカワ	クロタツイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	落葉・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生期	●再生前 ～始		+0～ノビエ1.5L	1kg		●
関東・東海	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生期	●再生前 ～始					●
近・中・四	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生期	●再生前 ～始				●	●
九州	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生期	●再生前 ～始	●短く 弱				●
田植同時散布可能 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスギヤツリには効果が劣る。															

A-1
KPP-501-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	オタリイ	ヘラオモ タカ	ミスギヤ ツリ	ウツカワ	クロタツイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	落葉・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	●1.5	●	●始	●始		●始			●発生期	●再生前 ～始		+0～ノビエ1.5L	1kg		●
東北	●1.5	●	●始	●始	●始	●始			●発生期	●再生前 ～始				●	●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															
田植同時散布可能 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:															

A-1

KUH-021 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハエ	ホタルイ	ヘラオモ グカ	ミズギヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモグカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離			処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土
北海道																	
東北	●3	●	●2	●始	●2	●2			●発生期	●再生前 ～始			+3～ノビエ3L	25g×10㎡		●	
北陸	●3	●	●2		●2	●2			●発生期							●	
関東・東海	●3	●	●3		●3	●2			●発生期	●再生前 ～始						●	
近・中・西（管）	●3	●	●3		●3	●2			●発生期	●再生前 ～始						●	
九州	●3	●	●3		●3	●3			●発生期	●再生前 ～始						●	
減水深：2cm/日以下 使用上の注意：5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足を生じることがある。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズギヤツリには効果が劣る。																	

A-1

KUH-021-0.25kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハエ	ホタルイ	ヘラオモ グカ	ミズギヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモグカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道	○3	○	○3	○3		○2			○発生期	○再生前 ～始		+3～ノビエ3L	250g	●	○
東北	○3	○	○3	○2	○3	○2			○発生期	○再生前 ～始				●	○
北陸	○3	○	○2		○2	○始			○発生期	○再生前 ～始				○	○
関東・東海	○3	○	○3		○3	○2			○発生期	○再生前 ～始				●	○
近・中・四	○3	○	○3		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				●	○
九州	○3	○	○3		○3	○3			○発生期	○再生前 ～始	○前			●	○
湛水周縁部散布可能(北海道～九州) 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。 湛水周縁部散布では藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足を生じることがある。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズギヤツリには効果が劣る。															

A-1

KUH-041 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハエ	ホタルイ	ヘラオモ グカ	ミズギヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモグカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生期	●再生前 ～始		+3～ノビエ2.5L	25g×10㎡		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生期	●再生前 ～始					●
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始									●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始				●	●
近・中・四 (管)	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始					●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始	●前(湛 水)				●
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足を生じることがある。 浅植え、植付け精度不良等で根が露出すると薬害を生じることがある。(九州) 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズギヤツリには効果が劣る。															

A-1

KUH-041-0.25kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハエ	ホタルイ	ヘラオモ グカ	ミズギヤ ツリ	ウリカワ	クログワイ	オモグカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生期	●再生前 ～始		+3～ノビエ2.5L	250g		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生期	●再生前 ～始					●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生期						●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始					●
近・中・四 (管)	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始	●前				●
九州	●2.5	●	●2	●始	●2	●2			●発生期	●再生前 ～始	●前				●
湛水周縁部散布可能(東北～九州) 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。 湛水周縁部散布では藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足を生じることがある。 浅植え、植付け精度不良等で根が露出すると薬害を生じることがある。(九州) 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズギヤツリには効果が劣る。															

A-1

KUH-041-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	オサリイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	落葉・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○3	○	○2	○2		○2		○始※	○発生期	○再生前 ～始	○前	+0～ノビエ3L (砂壌土は+3～)	1kg	○	○
東北	○3	○	○3	○3	○2	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
北陸	○3	○	○3		○2	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
関東・東海	○3	○	○3		○3	○3	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
近・中・四	○3	○	○3		○3	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始	○前	+3～ノビエ3L		○	○
九州	○3	○	○3		○3	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○

※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

KUH-072D-0.25kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	オサリイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	落葉・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道															
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生期			+3～ノビエ2.5L	250g		●
関東・東海															
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始		+3～ノビエ2.5L	250g		●
九州															

湛水周縁部散布可能(北陸、近畿・中国・四国)
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 湛水周縁部散布では落葉・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な葉害や効果不足を生じることがある。

A-1

KUH-072D-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	オサリイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	落葉・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道															
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始				●再生前 ～始		+3～ノビエ2.5L	1kg		●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始	●前				●
近・中・四 (管)	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始				●	●
九州	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生期	●再生前 ～始					●

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 湛水、植付け精度不良等で根が露出すると葉害を生じることがある。(近畿・中国・四国、九州)
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

KUH-072K-0.25kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	オサリイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	落葉・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生期	●再生前 ～始		+3～ノビエ2.5L	250g		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生期	●再生前 ～始				●	●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

湛水周縁部散布可能(北海道、東北)
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 湛水、植付け精度不良等で根が露出すると葉害を生じることがある。(東北)
 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に落葉・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な葉害や効果不足が生じることがある。

A-1

KUH-072K-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クロタツイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土	
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生期 ～始	●再生前 ～始		+3～ノビエ2.5L	1kg		●	
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生期 ～始	●再生前 ～始					●	
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																
減水深：2cm/日以下 使用上の注意：浅植え、植付け精度不良等で根が露出すると障害を生じることがある。（東北）																

A-1

KUH-074 シャンゴ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クロタツイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生期	●再生前 ～始			+3～ノビエ2.5L	25g×10コ		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生期	●再生前 ～始						●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生期	●再生前 ～始					●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始					●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始						●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始						●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な障害や効果不足を生じることがある。
散布後の暑い・多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

KUH-074-0.25kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クロタツイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 埴土	
北海道	●2.5	●	●2	●2		●始			●発生期	●再生前 ～始		+3～ノビエ2.5L	250g		●	
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生期	●再生前 ～始					●	●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生期	●再生前 ～始					●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始					●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始	●始 (藻類)				●	●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始	●始 (藻類)			●	●	

湛水周縁部散布可能(北海道～北陸、近畿・中国・四国、九州)

減水深：2cm/日以下

使用上の注意：

5cm程度の水深で散布する。
湛水周縁部散布では藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な障害や効果不足を生じることがある。
散布後の暑い多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

KUH-074-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉、 マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クログサ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 土	壤土 埴土
北海道	○3	○	○2	○2		○2			○発生期	○再生前 ～始		+3～ノビエ3L	1kg		○
東北	○3	○	○2	○3	○3	○2			○発生期	○再生前 ～始				○	○
北陸	○3	○	○3		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				●	○
関東・東海	○3	○	○3		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				●	○
近・中・四	○3	○	○3		○3	○3			○発生期	○再生前 ～始	○前 (葉損)			●	○
九州	○3	○	○3		○3	○3			○発生期	○再生前 ～始	○前 (葉損)			●	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

浅植え、植付け精度不良等で根が露出すると障害を生じることがある。(北陸、九州)

移植後の低湿および急激な気温の上昇により障害を生じることがある。(近畿・中国・四国)

散布後の暑い多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

KUH-074L-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	オタリイ	ヘラオモ ダカ	ミスギヤ ツリ	ウツカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	高麗・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 塩土
北海道	●2	●	●始	●始		●始			●発生期	●再生前 ～始		+0～ノビエ2L	1kg		●
東北	●2	●	●2	●2	●始	●始			●発生期	●再生前 ～始					●
北陸	●2	●	●2		●始	●始			●発生期					●	●
関東・東海	●2	●	●2		●始	●始			●発生期	●再生前 ～始				●	●
近・中・四	●2	●	●2		●始	●始			●発生期	●再生前 ～始				●	●
九州	●1.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始		+0～ノビエ1.5L			●

田植同時散布可能
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスギヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-385SB-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	オタリイ	ヘラオモ ダカ	ミスギヤ ツリ	ウツカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	高麗・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 塩土	
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		●始※	○発生期	○再生前 ～始	○前	SU低粘性のサライズ はアライズ	+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	●始※	●始※	○発生期	○再生前 ～始	○前	SU低粘性のサライズ	+0～ノビエ2.5L (砂壤土は+5～)		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始	●始※	●始※	○発生期				+0～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生期	○再生前 ～始					○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生期	○再生前 ～始	○前				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生期	○再生前 ～始	○前		±0.5～ノビエ2.5L(砂 壤土は+5～)		○	○

田植同時散布可能
※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスギヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

NC-397-1kg 粒

C-39/1kg 粒																
地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	オサリイ	ヘラオモ タカ	ミスギヤ ツリ	ウツカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	高麗・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 塩土	
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始			○発生期	○再生前 ～始	○前	+3～ノビエ1.5L	1kg		○	
東北	○1.5	○	○始	○始	○始	○始			○発生期	○再生前 ～始	○前	+0～ノビエ1.5L		○	○	
北陸	○1.5	○	○始		○始	○前				○再生前 ～始		+0～ノビエ1.5L (砂壤土は+3～)		○	○	
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生期	○再生前 ～始	○前	+0～ノビエ1.5L		○	○	
近・中・国																
九州																
田植同時散布可能 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:																

A-1

NC-606 フロアブル

LC-006 757P R												処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	塩土 ～ 塩土
地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	オタリイ	ヘラオモ ダカ	ミスギヤ ツリ	ウツカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	高麗・ 表層剥離				
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生期	○再生前 ～始	○始	+5～ノビエ2.5L	500ml	●	○
東北	○2.5	○	○2	○始2	○2	○始			○発生期	○再生前 ～始	●始				
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生期	○再生前 ～始	○始				
関東・東海	○2.5	○	○2		○2				○発生期	○再生前 ～始	○始				
近・中・四 (※)	○2.5	○	○2		○2				○発生期	○再生前 ～始	○始				
九州	○2.5	○	○2	○前	○2	○始			○発生期	○再生前 ～始	○始				

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 浅植え、播付け精度不良等で根が露出すると薬害を生じることがある。(北陸)
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスギヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-609-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	オサリイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウサカ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○3	○	○2	○2		○2			○発生期	○再生前 ～始	○前	+0～ノビエ3L (砂壌土は+3～)	1kg	○	○
東北	○3	○	○2	○2	○3	○始			○発生期	○再生前 ～始	○前	+0～ノビエ3L		○	○
北陸	○3	○	○2		○2	○2			○発生期	●再生前 ～始	○前	+0+3～ノビエ3L (砂壌土は+3～)		○	○
関東・東海	○3	○	○3		○3	○2			○発生期	○再生前 ～始	○前	+0～ノビエ3L		○	○
近・中・四	●3	●	●3		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始					●
九州	●2.5	●	●3		●3	●3			●発生期	●再生前 ～始		+0～ノビエ2.5L			●

田植同時散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の強い多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-617SB-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	オサリイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウサカ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○3.5 4	○	○3	○3		○2 3		●始～矢 じりL	○発生期	○再生前 ～始		+7～ノビエ3.6L 4L	1kg		○
東北	○4	○	○4	○4	○4	○3			○発生期	○再生前 ～始		+7～ノビエ4L			○
北陸	●4	●	●4		●4	●3	●草丈 10cm							●	●
関東・東海	○4	○	○4		○4	○3			○発生期	○再生前 ～始				●	○
近・中・四	○4	○	○3 4		○3 4	○3 4	●草丈 10cm	●広葉形 葉～矢じ りL	○発生期	○再生前 ～始		+5+7～ノビエ4L			○
九州	○4	○	○4		○4	○4		●始～矢 じりL※	○発生期	○再生前 ～始	○前 (藻類)			●	○

※: オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の低温および急激な気温の上昇により悪害を生じることがある。(北陸)
深水条件では悪害を生じることがある。(北陸)
散布後の強い多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-618-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	オサリイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウサカ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○3.5 4	○	○3 4	○2 4		○2 3		●始～矢 じりL	○発生期	○再生前 ～始		+7～ノビエ3.6L 4L	1kg		○
東北	○3.5	○	○3	○3	○4	○3			○発生期	○再生前 ～始		+7～ノビエ3.5L			○
北陸	●3.5	●	●3		●3	●3	●草丈 10cm		●発生期					●	●
関東・東海	○3.5 4	○	○4		○3	○3			○発生期	○再生前 ～始		+7～ノビエ3.6L 4L		●	○
近・中・四 (※)	○3.5 4	○	○4		○3	○3	●草丈 10cm	●始～矢 じりL	○発生期	○再生前 ～始		+5+7～ノビエ3.5L 4L			○
九州	○3.5 4	○	○4		○4	○4		●始～矢 じりL※	○発生期	○再生前 ～始	○前 (藻類)			●	○

※: オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の低温および急激な気温の上昇により悪害を生じることがある。(北陸)
深水条件では悪害を生じることがある。(北陸)
散布後の強い多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-621 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	オサリイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウサカ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●3	●	●3	●2		●2			●発生期	●再生前 ～始		+5～ノビエ3L	40g×10コ		●
東北	○3	○	○3	○2	○3	○2			○発生期	○再生前 ～始				○	○
北陸	○3	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				○	○
関東・東海	○3	○	○3		○3	○2			○発生期	○再生前 ～始				●	○
近・中・四	○3	○	○3		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				●	○
九州	○3	○	○3	○前	○4	○3			○発生期	○再生前 ～始					○

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な悪害や効果不足を生じることがある。
散布後の強い多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-621 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガイ ツリ	ウツカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道	●3	●	●3	●2		●2			●発生期 ～始	●再生前 ～始		+5～ノビエ3L	500ml		●
東北	○3	○	○3	○3	○3	○2			○発生期 ～始	○再生前 ～始				○	○
北陸	○3	○	○2		○始	○始			○発生期 ～始	○再生前 ～始				○	○
関東・東海	○3	○	○3		○3	○2			○発生期 ～始	○再生前 ～始				●	○
近・中・四	○3	○	○3		○2	○2			○発生期 ～始	○再生前 ～始				●	○
九州	○3	○	○3	○前	○3	○2			○発生期 ～始	○再生前 ～始				●	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 移植後の低湿および急激な気温の上昇により被害を生じることがある。(近畿・中国・四国)
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガイツリには効果が劣る。

A-1

NC-621-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガイ ツリ	ウツカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道	○3	○	○2	○2		○2			○発生期 ～始	○再生前 ～始		+5～ノビエ3L	1kg		○
東北	○3	○	○2	○2	○3	○2			○発生期 ～始	○再生前 ～始				○	○
北陸	○3	○	○3		○2	○2			○発生期 ～始	○再生前 ～始				○	○
関東・東海	○3	○	○3		○3	○2			○発生期 ～始	○再生前 ～始				●*	○
近・中・四	○3	○	○3		○2 3	○2			○発生期 ～始	○再生前 ～始				○	○
九州	○3	○	○3		○3	○3			○発生期 ～始	○再生前 ～始				○	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: * 散布後の低湿条件により被害を生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガイツリには効果が劣る。

A-1

NH-051(H) シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガイ ツリ	ウツカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始 2			○発生期 ～始	○再生前 ～始		+0～ノビエ2.5L	50g×10 ³	●	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生期 ～始	○再生前 ～始	○前			●	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な被害や効果不足を生じることがある。

A-1

NH-051(H) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガイ ツリ	ウツカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		○始	○発生期 ～始	○再生前 ～始	○前	+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○始※	○始※	○発生期 ～始	○再生前 ～始	○前			○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

田植同時散布可能
 水口処理可能
 ※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

NH-051(40)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズギヤ ツリ	ウツカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		○始	○発生期	○再生前 ～始	○前	※0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始	○前	※0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

田植同時散布可能
※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

NH-061-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズギヤ ツリ	ウツカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道	○3	○	○3	○2		○2		○始※	○発生期	○再生前 ～始	○前	※0～ノビエ3L	1kg	○	○
東北	○3	○	○3		○2	○始	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始				○	○
北陸	○3	○	○3		○始 2	○2	○始※	○始※	●発生期	●再生前 ～始				○	○
関東・東海	○3	○	○3		○3	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始				○	○
近・中・四	○3	○	○3		○3	○3	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始				○	○
九州	○3	○	○3		○3	○3	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始				○	○

※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズギヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

NH-071D ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズギヤ ツリ	ウツカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始 2	●始	●始	○発生期	○再生前 ～始		※0～ノビエ2.5L	50g×10 ²	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始	●始	○発生期	○再生前 ～始				●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生期	○再生前 ～始				●	○

※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な要害や効果不足を生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズギヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

NH-071D フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズギヤ ツリ	ウツカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始	●始	●始	○発生期	○再生前 ～始	○前	※0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始	○前			●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始	●始	○発生期	○再生前 ～始				●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生期	○再生前 ～始	○前			●	○

田植同時散布可能
※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズギヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

NH-071D-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスギヤ ツリ	ウツカワ	クロタノイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 へ 壤土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始	●始	●始	○発生期	○再生前 ～始		+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始	○前			●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始	●始	○発生期	○再生前 ～始	●前			○	○
九州	○2.5	○	○2	○前	○2	○2	●始※	●始※	○発生期	○再生前 ～始	○前			●	○

田稈同時散布可能
※:オモダカ・クロタノイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田稈前に生育したミスギヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クロタノイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

NH-303 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスギヤ ツリ	ウツカワ	クロタノイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 へ 壤土
北海道															
東北	○2.5	○	○2	○始								+0～ノビエ2.5L	60g×10 ³	●	○
北陸	○2.5	○	○2		○始									●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2									●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○始							+0～ノビエ2.5L		●	○
九州															

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な悪書や効果不足が生じることがある。

A-1

S-9421(旧SB-573) フォアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスギヤ ツリ	ウツカワ	クロタノイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 へ 壤土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生期			+5～ノビエ2.5L	500ml		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生期						●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生期	●再生前 ～始					●
関東・東海	●2.5	●	●2		●3	●3			●発生期	●再生前 ～始					●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始					●
九州	●2.5	●	●3		●3	●3			●発生期	●再生前 ～始					●

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田稈前に生育したミスギヤツリには効果が劣る。

A-1

S-9421(旧SB-573)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスギヤ ツリ	ウツカワ	クロタノイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 へ 壤土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生期			+5～ノビエ2.5L	1kg		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生期						●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始					●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始					●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始					●
九州	●2.5	●	●3		●3	●3			●発生期	●再生前 ～始					●

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田稈前に生育したミスギヤツリには効果が劣る。

A-1

SB-556-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	オサリイ	ヘラオモ タガ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	莠類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生期			+0～ノビエ2.5L	1kg	●	○
東北	○2	○	○2	○始	○2	○2		○始※	○発生期			+0～ノビエ2L		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生期			+0～ノビエ2.5L		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期			+0～ノビエ2.5L		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期			+0～ノビエ2.5L		○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期					○	○

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

適量不良の場合、散布後の低温および急激な気温の上昇により薬害を生じることがある。(東北)
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

SB-564 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	オサリイ	ヘラオモ タガ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	莠類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2	○	○始	○始		○始			○発生期			+3～ノビエ2L	30g×10コ	○	○
東北	○2	○	○2	○始	○2	○始	○始※	○始※	○発生期					○	○
北陸	○2	○	○始		○始	○始			○発生期					○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生期					○	○
近・中・四	○2	○	○2		○始	○始			○発生期					○	○
九州	○2	○	○2	○始	○2	○2		○始※	○発生期					○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

5cm程度の水深で散布する。
散布時に莠類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

SB-564 フォブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	オサリイ	ヘラオモ タガ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	莠類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2	○	○始	○2		○始			○発生期		ミズアイ2L	±0+3～ノビエ2L (砂壌土は+3～)	500ml	○	○
東北	○2	○	○2	○始	○始	○始	○始※	○始※	○発生期		シズイ草丈3cm	±0+3～ノビエ2L		○	○
北陸	○2	○	○2		○始	○始			○発生期					○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生期		コウキヤツリ始			○	○
近・中・四	○2	○	○2		○始	○始	○始		○発生期					○	○
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生期		コウキヤツリ始	+3～ノビエ2L		○	○

田植同時散布可能

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。
クログワイ・コウキヤツリ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

SB-564-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	オサリイ	ヘラオモ タガ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	莠類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2	○	○始	○2		○始			○発生期		ミズアイ2L	±0+3～ノビエ2L (砂壌土は+3～)	1kg	○	○
東北	○2	○	○2	○始	○始	○始	○始※	○始※	○発生期		シズイ草丈3cm	±0+3～ノビエ2L		○	○
北陸	○2	○	○2		○始	○始			○発生期					○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生期		コウキヤツリ始			○	○
近・中・四	○2	○	○2		○始	○始	○始		○発生期					○	○
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生期		コウキヤツリ始	+3～ノビエ2L		○	○

田植同時散布可能

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。
クログワイ・コウキヤツリ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

SL-0601 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ワザカ	クロタノイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 塚土	塚土 ～ 塚土
北海道															
東北	○4	○	○3	○4		○3	●草丈 10cm※	●始※	○発生期 ～始	○再生前 ～始		+7～ノビエ4L	50g×10a	○	○
北陸	○4	○	○4			○2	●草丈 10cm	●始	○発生期 ～始	○再生前 ～始				●	○
関東・東海	○4	○	○4			●3	●草丈 10cm※	●始※	○発生期 ～始	○再生前 ～始	コナヤガラ始			●	○
近・中・四	○4	○	○4			○3	●草丈 10cm	●始	○発生期 ～始	○再生前 ～始				●	○
九州	○4	○	○4			○4			○発生期 ～始	○再生前 ～始	コナヤガラ始	+7～ノビエ3L 4L		○	○

※:オモダカ・クロタノイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な悪害や効果不足が生じることがある。
 散布後の暑い多雨条件により除草効果が低下することがある。
 オモダカ・クロタノイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

SL-0601-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ワザカ	クロタノイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 塚土	塚土 ～ 塚土
北海道															
東北	○4	○	○4	○4		○3	○草丈 10cm※	●矢じり 葉抽出前 ※	○発生期 ～始	○再生前 ～始	コナヤガラ始	+7～ノビエ4L	1kg	○	○
北陸	○4	○	○3			○2	○草丈 10cm	●矢じり 葉抽出前 ※	○発生期 ～始	○再生前 ～始				○	○
関東・東海	○4	○	○4			○3	○草丈 10cm※	●矢じり 葉抽出前 ※	○発生期 ～始	○再生前 ～始	コナヤガラ始 5L低粘性マキ:3L			○	○
近・中・四	○4	○	○4			○3	○草丈 10cm	●矢じり 葉抽出前 ※	○発生期 ～始	○再生前 ～始				●	○
九州	○4	○	○4			○4			○発生期 ～始	○再生前 ～始	コナヤガラ始			○	○

※:オモダカ・クロタノイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の暑い多雨条件により除草効果が低下することがある。
 オモダカ・クロタノイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

SL-0602-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ワザカ	クロタノイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 塚土	塚土 ～ 塚土
北海道															
東北	○4	○	○3	○4	○4	○3	○草丈 10cm※	○矢じり 葉抽出前 ※	○発生期 ～始	○再生前 ～始	コナヤガラ始	+7～ノビエ4L	1kg	○	○
北陸	○4	○	○4		○3	○3	○草丈 10cm	○矢じり 葉抽出前 ※	○発生期 ～始	○再生前 ～始				○	○
関東・東海	○4	○	○4		○4	○3	○草丈 10cm※	○矢じり 葉抽出前 ※	○発生期 ～始	○再生前 ～始	コナヤガラ始～基本 20cm			○	○
近・中・四	○4	○	○4		○4	○3	○草丈 10cm	○矢じり 葉抽出前 ※	○発生期 ～始	○再生前 ～始				○	○
九州	○4	○	○4		○4	○4			○発生期 ～始	○再生前 ～始	コナヤガラ始～基本 20cm			○	○

※:オモダカ・クロタノイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の暑い多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クロタノイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

SL-0701-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ワザカ	クロタノイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 塚土	塚土 ～ 塚土
北海道	○4	○	○3	○3		○3				○発生期 ～始	○再生前 ～始	+7～ノビエ4L	1kg		○
東北	○4	○	○4	○4		○3				○発生期 ～始	○再生前 ～始			○	○
北陸	○4	○	○4		○2	○3	●草丈 10cm	●矢じり 葉抽出前 ※	○発生期 ～始	○再生前 ～始				○	○
関東・東海	○4	○	○4		○2	●3			○発生期 ～始	○再生前 ～始	コナヤガラ始			●	○
近・中・四	○4	○	○4		○2	○3	●草丈 10cm	●矢じり 葉抽出前 ※	○発生期 ～始	○再生前 ～始				●	○
九州	○4	○	○4		○3	○3			○発生期 ～始	○再生前 ～始	○前	+7～ノビエ3L 4L		●	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 移植後の低温および急激な気温の上昇により悪害を生じることがある。(北陸)
 散布後の暑い多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クロタノイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

SL-4902 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヒ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズギヤ ツリ	ウツカワ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生期			+3～ノビエ2.5L	500ml		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生期					●	●
北陸	●2	●	●2		●始	●始			●発生期			+3～ノビエ2L		●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●前		+3～ノビエ2.5L		●	●
近・中・四 (皆)	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期					●	●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●前					●
全面散布(北陸、関東・東海) 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズギヤツリには効果が劣る。															

A-1

SL-4902-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヒ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズギヤ ツリ	ウツカワ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	○2	○	○始	○始		○始			○発生期			+3～ノビエ2L	1kg	●	○
東北	○2	○	○2	○始	○2	○始			○発生期					○	○
北陸	○2	○	○2		○2	○2			○発生期					○	○
関東・東海	○2	○	○2		○始	●始			○発生期	○前				●	○
近・中・四 (皆)	○2	○	○2		○2	○2			○発生期					●	○
九州	○2 2.5	○	○2		○2	○2			○発生期			+3～ノビエ2.5L		●	○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 移植後の低温および急激な気温の上昇により被害を生じることがある。(北陸) 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズギヤツリには効果が劣る。															

A-1

SL-4903-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヒ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズギヤ ツリ	ウツカワ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生期	●再生前 ～始		+5～ノビエ2.5L	1kg		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生期					●	●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始				●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始	●前				●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始				●	●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始					●
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズギヤツリには効果が劣る。															

A-1

SL-954 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヒ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズギヤ ツリ	ウツカワ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	○2	○	○2	○始		○2			○発生期		コノキヤツリ2L SU抵抗性2.5L	+3～ノビエ2L	50g×10コ	○	○
東北	○2	○	○2	○始	○始	○始			○発生期	○再生前 ～始	○前	コノキヤツリ2L SU抵抗性2.5L		○	○
北陸	○2	○	○2		○始	○始			○発生期			コノキヤツリ2L SU抵抗性2.5L		○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○始			○発生期			コノキヤツリ2L SU抵抗性2.5L		○	○
近・中・四	○2 2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	●前		+3～ノビエ2.5L		○	○
九州	○2 2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○前	コノキヤツリ2.5L SU抵抗性2.5L	+3～ノビエ2.5L (砂壌土はノビエ2.5L)		○	○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズギヤツリには効果が劣る。 コノキヤツリ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。															

A-1

SL-954-0.5kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	オタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウツワリ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 増土
北海道	●2	●	●始	●始		●始			●発生期			+5～ノビエ2L	500g		●
東北															
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

落水周縁部散布可能(北海道)
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
落水周縁部散布では藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な悪害や効果不足を生じることがある。

A-1

SST-403 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	オタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウツワリ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 増土
北海道															
東北	○1.5	○	○始	○始	○始	○始	●始※	●始※	○発生期	○再生前 ～始	○前	+0～ノビエ1.5L	40g×10コ	○	○
北陸	●1.5	●	●始		●始	●前			●発生期	●再生前 ～始				●	●
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	○始	●始※	●始※	○発生期	○再生前 ～始	223.173.13			○	○
近・中・四 (留)	●1.5	●	●始		●始	●始			●発生期	●再生前 ～始	●前				●
九段															

※: オモダカ・クロダワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な悪害や効果不足が生じることがある。
オモダカ・クロダワイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

SST-404 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	オタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウツワリ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 増土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始		●始	○発生期	○再生前 ～始		+0～ノビエ2.5L	40g×10コ	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始	●始※	●始※	○発生期	○再生前 ～始				○	○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○2	●始※	●始	○発生期					○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※		○発生期	○再生前 ～始	223.173.13			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始	○発生期	○再生前 ～始				○	○
九州	○2.5	○	○2	○前	○2	○2	●始※	●始※	○発生期	○再生前 ～始	○前	223.173.13 (砂壌土はノビエ2L 未満)		○	○

※: オモダカ・クロダワイ防除は、有効な後処理剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な悪害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ防除は有効な前処理または後処理剤との組み合わせで使用する。
クロダワイ防除は有効な前処理または後処理剤との組み合わせで使用する。(東北・北陸・近畿・中国・四国)
クロダワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。(関東・東海・九州)
コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

SST-404 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始		○始※	○発生期 ～始	○再生前 ～始	○前	+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○始※	○始※	○発生期 ～始	○再生前 ～始	○前	シズイ・草丈3cm コナキヤツリ・始		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生期 ～始	○再生前 ～始				○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生期 ～始	○再生前 ～始	○前	コナキヤツリ・始		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生期 ～始	○再生前 ～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2	○始	○2	○2	○始※	○始※	○発生期 ～始	○再生前 ～始		コナキヤツリ・始		○	○

田植同時散布可能
水口処理可能
※:オモダカ・クロダワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
使用上の注意: 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クロダワイ・コウキヤガラ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

SST-404-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始		○始※	○発生期 ～始	○再生前 ～始	○前	+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始	○始※	○始※	○発生期 ～始	○再生前 ～始	○前	コナキヤツリ・始 シズイ・草丈3cm SL形粒性コナキ・2L SL形粒性コナキ・2L		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生期 ～始	○再生前 ～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生期 ～始	○再生前 ～始	○前	コナキヤツリ・始 SL形粒性コナキ・2L SL形粒性コナキ・2L		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生期 ～始	○再生前 ～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生期 ～始	○再生前 ～始		コナキヤツリ・始		○	○

田植同時散布可能
※:オモダカ・クロダワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
使用上の注意: 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クロダワイ・コウキヤガラ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

SW-032(L) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始	○前	+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始	○前	±0±3～ノビエ2.5L		○	○

田植同時散布可能
減水深: 2cm/日以下
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
使用上の注意: 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

SW-041(L)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始		+0～ノビエ2.5L	1kg	○*	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始	SL形粒性コナキ・1L SL形粒性コナキ・1L			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始		+0～ノビエ2.5L (砂壌土は±0±3～)		○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始	○前	±0±3～ノビエ2.5L		○	○

田植同時散布可能
減水深: 2cm/日以下
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
使用上の注意: *: 浅植え、植付け精度不良等で悪害を生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

SW-043-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスギヤ ツリ	ウツカワ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藨類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埋土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		●始	○発生期		○前	+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	●始※	●始※	○発生期		○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始	●始	●始	○発生期					○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生期		○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生期		○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期		○前			○	○

田植同時散布可能
※:オモダカ・クロダワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年使用するによりさらに効果が向上する

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスギヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クロダワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

SW-052 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスギヤ ツリ	ウツカワ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藨類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埋土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生期		○前	+1～ノビエ2.5L	50g×10 ³	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生期		○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期		○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期					○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期		○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期		○前			○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藨類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスギヤツリには効果が劣る。

A-1

SW-062 フォアフル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスギヤ ツリ	ウツカワ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藨類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埋土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生期			+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生期					○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生期					○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期					○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期					○	○
九州	○2.5	○	○2	○始	○2	○2			○発生期					○	○

田植同時散布可能

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスギヤツリには効果が劣る。

A-1

SW-907 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスギヤ ツリ	ウツカワ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藨類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埋土
北海道															
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○2			●発生期		○前	+3～ノビエ2L 2.5L	3kg		○
北陸	○2	○	○2		○2	○2						+3～ノビエ2L			○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			●発生期		○前	+3～ノビエ2L 2.5L			○
近・中・四	○2	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始	○前	+3～ノビエ2L			○
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生期		○前			○	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 浅植え、植え付け精度不良等で根が露出すると薬害を生じる事がある。
シズメ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

SVJ-167-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズギヤ ツリ	ウリカ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	○始	○始	○発生期	○再生前 ～始	○前	+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始	○前	SL低粘性マツバ・ SL低粘性ホタルイ		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始	○始	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 土は+3～)		○	○
田植同時散布可能 ※:オモダカ・クロクワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズギヤツリには効果が劣る。 オモダカ・クロクワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。															

A-1

SVJ-167-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズギヤ ツリ	ウリカ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1.5	○	○始	○始					○発生期		ミズギヤツリ	+0～ノビエ1.5L	1kg	○	○
東北	○1.5	○	○始	○始	○始									○	○
北陸	○2	○	○始		○始							+0～ノビエ2L		○	○
関東・東海	○2	○	○2		○始				○前			+0～ノビエ2L(砂 土はノビエ1.5Lまで)		●	○
近・中・四	○2	○	○始		○始				○前			+0～ノビエ2L(砂 土はノビエ1.5Lまで)		○	○
九州	○1.5	○	○始		○始							+0～ノビエ1.5L		○	○
田植同時散布可能 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズギヤツリには効果が劣る。															

A-1

SVJ-219-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズギヤ ツリ	ウリカ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2	●	●始	●始		●始			●発生期			+0～ノビエ2L	1kg		●
東北	●2	●	●2	●始	●始	●始			●発生期					●	●
北陸	●2	●	●2		●始	●始			●発生期					●	●
関東・東海	●2	●	●2		●2	●2			●発生期					●	●
近・中・四	●2	●	●2		●2	●始			●発生期					●	●
九州	●2	●	●2		●2	●2			●発生期					●	●
田植同時散布可能 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズギヤツリには効果が劣る。															

A-1

TH-501 ジェル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズギヤ ツリ	ウリカ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5 3	○	○2 3	○2 3		○始 2			○発生期	○再生前 ～始		+5～ノビエ2.5L	40g×10コ		○
東北	○2.5 3	○	○2	○始 2	○2	○始 2			○発生期	○再生前 ～始				○	○
北陸	○2.5 3	○	○2		○始	○始			○発生期	●再生前 ～始	●前			○*	○
関東・東海	○2.5 3	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始	●前			●	○
近・中・四	○2.5 3	○	○2 3		○2 3	○2			○発生期	○再生前 ～始	○前			●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始		+5～ノビエ2.5L		●	○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: * : 浅植え、植付け精度不良等で悪害を生じることがある。 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な悪害や効果不足が生じることがある。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズギヤツリには効果が劣る。															

A-1

TH-501 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ネタリ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道	○2.5 3	○	○2 3	○2 3		○始 2		●始	○発生期	○再生前 ～始		+5～ノビエ2.6L 3L	500ml		○
東北	○2.5 3	○	○2	○始 2	○2	○始		●始※	○発生期	●再生前 ～始	エゾノミズガヤ2.5L ノビエ3L			○	○
北陸	○2.5 3	○	○2		○始 2	○始	●始	●始	○発生期	○再生前 ～始				○*	○
関東・東海	○2.5 3	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始	○前	コキヤガラ:始		●	○
近・中・四	○2.5 3	○	○2 3		○2 3	○2	●始	●始	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始	○前	コキヤガラ:始	+5～ノビエ2.5L	●	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: * : 浅植え、植付け精度不良等で被害を生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ・コキヤガラ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

TH-501-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ネタリ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道	○2.5 3	○	○2 3	○2 3		○始 2		●始	○発生期	○再生前 ～始		+5～ノビエ2.6L 3L	1kg		○
東北	○2.5 3	○	○2	○始 2	○2	○始			○発生期	○再生前 ～始				○	○
北陸	○2.5 3	○	○始 2		○始 2	○始			○発生期	○再生前 ～始	●前			○*	○
関東・東海	○2.5 3	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始	●前			●	○
近・中・四	○2.5 3	○	○2 3		○2 3	○2			○発生期	○再生前 ～始	○前			●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始	○前		+5～ノビエ2.5L	●	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: * : 浅植え、植付け精度不良等で被害を生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

TH-547(2) シャンド

地域名	ノビエ	一年生 広葉 マツハ	ネタリ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○3	○	○2	○2		○2		○始※	○発生期	○再生前 ～始	エゾノミズガヤ2.5L	+5～ノビエ3L	40g×107	●	○
東北	○2.5 3	○	○2	○始 2	○2	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始		+5～ノビエ2.6L 3L		○	○
北陸	○3	○	○2		○始	○始	○始※	○始※	○発生期	●再生前 ～始		+5～ノビエ3L		○	○
関東・東海	○3	○	○3		○2	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始	コキヤガラ:始			○	○
近・中・四	○2.5 3	○	○2 3		○2 3	○2 3	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始		+5～ノビエ2.6L 3L		○	○
九州	○2.5 3	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始	コキヤガラ:始			○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ・コキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

TH-547(2) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉 マツハ	ネタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ ツリ	ウツカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 堆土
北海道	○3	○	○2 3	○2 3		○2		○始※	○発生期	○再生前 ～始		エゾノオモダカ2.5L	+5～ノビエ3L	500ml	●	○
東北	○2.5 3	○	○2	○2	○2	○始	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始		シズイ: 草丈3cm コキヤガラ	+5～ノビエ2.6L 3L		○	○
北陸	○2.5 3	○	○始 2		○始	○始	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始					○	○
関東・東海	○3	○	○3		○2	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始		コキヤガラ: 始	+5～ノビエ3L		○	○
近・中・四	○2.5 3	○	○2 3		○2	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始			+5～ノビエ2.6L 3L		●	○
九州	○2.5 3	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始		コキヤガラ: 始			○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ・コキヤガラ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

TH-547(Z)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	オタリイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウツカ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 増土
北海道	○3	○	○2 3	○2 3		○2		○始※	○発生期	○再生前 ～始		+5～ノビエ3L	1kg	○	○
東北	○2.5 3	○	○2	●2	○2	○始	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始		+5～ノビエ2.5L 3L		○	○
北陸	○3	○	○2		○2	○始	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始		+5～ノビエ3L		○	○
関東・東海	○3	○	○3		○2	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始				○	○
近・中・四	○2.5 3	○	○2.5 3		○2	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始		+5～ノビエ2.5L 3L		○	○
九州	○2.5 3	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始				○	○

※:オモダカ・クロクワイ防除は、有効薬剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の暑い多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クロクワイ・コウキヤガラ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

TH-601 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	オタリイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウツカ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 増土
北海道															
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生期	●再生前 ～始		+0～ノビエ2.5L	20g×10コ		●
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生期	●再生前 ～始	●前				●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始					●
近・中・四 (皆)	●2.5	●	●2		●始	●2			●発生期	●再生前 ～始	●前	+0～ノビエ2.5L (砂壌土は+5～)		●	●
九州	●2	●	●2		●2	●2			●発生期	●再生前 ～始		+0～ノビエ2L			●

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足を生じることがある。
 散布後の暑い多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

TH-601 フアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	オタリイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウツカ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 増土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生期	○再生前 ～始		+0～ノビエ2.5L	500ml	●	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生期	○再生前 ～始				○	○
北陸	○2.5	○	○2		○始 2	○始			○発生期	●再生前 ～始	○前	+0～ノビエ2.5L (砂壌土は+5～)		●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始		+0～ノビエ2.5L		●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始	○前			●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始	○前			●	○

田植同時散布可能
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の暑い多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

TH-601-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	オタリイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウツカ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 増土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生期	○再生前 ～始		+0～ノビエ2.5L	1kg	●	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生期	○再生前 ～始				○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始 2			●発生期	○再生前 ～始				●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始	○前			●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				●	○

田植同時散布可能
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 残株、値付け精度不良等で根が露出すると薬害を生じることがある。(北陸)
 散布後の暑い多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

HOK-221 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	オタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埋土
北海道															
東北															
北陸	○2	○	○2		○2	○始			○発生期	○再生前 ～始		±0.4～ノビエ2L	50g×10 ³	○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○始			○発生期	○再生前 ～始				○	○
近・中・四	○2	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
九州	○2	○	○2		○2	○始			○発生期	○再生前 ～始	○前	+1～ノビエ2L		○	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-627(旧BCH-064) ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	オタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埋土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生期	○再生前 ～始		+5～ノビエ2.5L	30g×10 ³	●	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				●	○
北陸	○2.5	○	○2		○始 2	○始 2			○発生期	○再生前 ～始				●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始					○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始					○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始					○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: セリは再生が早い場合は効果が劣る。(九州)
 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。
 散布後著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-627(旧BCH-064) フラップル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	オタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埋土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生期	○再生前 ～始		+5～ノビエ2.5L	500ml		○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生期	○再生前 ～始				○	○
北陸	○2.5	○	○2		○始 2	○始 2			○発生期	○再生前 ～始				●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始					○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始					○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: セリは再生が早い場合は効果が劣る。(九州)
 散布後著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

NC-627(旧BCH-064)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	オタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埋土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生期	○再生前 ～始		+5～ノビエ2.5L	1kg	●	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始 2			○発生期	○再生前 ～始				●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始					○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: セリは再生が早い場合は効果が劣る。(九州)
 散布後著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1

BAG-032 シャンゴ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	オタカイ	ヘオモ タカ	ミズギヤ ツ	ウツカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 礫 土	壤土 ～ 塩土
北海道	○2	○	○始	○始		○始		○前※	○発生期	○再生前 ～始	○前	+3～ノビエ2L	20g×10コ	○	○
東北	○2	○	○2	○始	○始	○始	○前※	○前※	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
北陸	○2	○	○2		○始	○始	○前※	○前※	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○始	○前※	○前※	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
近・中・四	○2	○	○2		○2	○2	○前※	○前※	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
九州	○2	○	○2		○2	○2	○前※	○前※	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効薬剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な悪害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズギヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ防除は有効薬剤との組み合わせで使用する。

A-1

NC-606 シャンゴ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	オタカイ	ヘオモ タカ	ミズギヤ ツ	ウツカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 礫 土	壤土 ～ 塩土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		●始※	○発生期	○再生前 ～始	○始	+5～ノビエ2.5L	30g×10コ	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	●始※	●始※	○発生期	○再生前 ～始	○始			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生期		○始			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生期	○再生前 ～始	○始			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生期	○再生前 ～始	○始			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生期	○再生前 ～始	○始			○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効薬剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な悪害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズギヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ防除は有効薬剤との組み合わせで使用する。

A-1

NC-606-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	オタカイ	ヘオモ タカ	ミズギヤ ツ	ウツカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 礫 土	壤土 ～ 塩土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		○始※	○発生期	○再生前 ～始	○始	+5～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○始	○始		○始※	○発生期	○再生前 ～始	○始			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始		○始※	○発生期	○再生前 ～始	○始			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始	○始			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始	○始※		○再生前 ～始	○始			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2		○始※	○発生期	○再生前 ～始	○始			○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効薬剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズギヤツリには効果が劣る。
 オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。
 クログワイ防除は有効薬剤との組み合わせで使用する。

A-1

NC-604 シャンゴ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	オタカイ	ヘオモ タカ	ミズギヤ ツ	ウツカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 礫 土	壤土 ～ 塩土
北海道	○2	○	○2	○2		○2		●始※	○発生期	○再生前 ～始	○前	+5～ノビエ2L	30g×10コ		○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	●始※	●始※	○発生期	○再生前 ～始				○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生期	○再生前 ～始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効薬剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な悪害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズギヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

NC-604-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウツカワ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		●始※	○発生期 ～始	○再生前 ～始	○前	+5～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始		●始※	○発生期 ～始	○再生前 ～始	○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生期 ～始	○再生前 ～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生期 ～始	○再生前 ～始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生期 ～始	○再生前 ～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生期 ～始	○再生前 ～始	○前			○	○

※: オモダカ・クロダワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 滅水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果がある。
 オモダカ・クロダワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-2 体系(初期)

A-2

AKD-7155 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウツカワ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○1	○	○始	○始							○始	+0～ノビエ1L	500ml	○	○
東北	○1	○	○始	○始	○始						○始	植代後～4, +0～ノビエ1L		○	○
北陸	○1	○	○前		○前						○前			○	○
関東・東海	○1	○	○始		○前						○始			○	○
近・中・四	○1	○	○始		○前始						○前			●	○
九州	○1	○	○始		○始						○始			●	○

水口処理可能
 滅水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 深水条件では悪害を生じることがある。

A-2

HOK-201-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウツカワ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道															
東北															
北陸															
関東・東海															
近・中・四 (管)	●2.5	●	●始		●始							+0～ノビエ2.5L	1kg	●	●
九州															

滅水深: 2cm/日以下
 使用上の注意:

A-2

KPP-314 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウツカワ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道															
東北	○1	○	●始	●始								植代時～4, +0～ノビエ1L	500ml		○
北陸	○1	○	●前											○	○
関東・東海	●1	●	●始									植代後～4, +0～ノビエ1L		●	●
近・中・四 (管)	●1	●												●	●
九州	●1	●													●

植代時は土壌混和処理(混和時水深3～5cm、混和深2～3cm)
 滅水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の高温により楊葉・流れ葉などの悪害症状が助長され、強い生育抑制につながる可能性がある。(九州)
 深水条件では悪害を生じることがある。

A-2

KUH-071-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカワ	クロダツイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壌土
北海道															
東北	●2.5	●										+3～ノビエ2.5L	1kg		●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 浅植え, 植付け精度不良等で悪害を生じることがある。(東北)

A-2

NSK-850 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカワ	クロダツイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壌土
北海道	○1	○										植代後～4, +0～ノビエ 1L(砂壌土は+0～)	500ml	●	○
東北	○1	○										植代後～4, +0～ノビエ1L		●	○
北陸	○1	○												●	○
関東・東海 (株)	○1	○												●	○
近・中・四 (株)	○1	○										植代後～4, +0～ノビエ 1L(砂壌土は+0～)		●	○
九州 (株)	○1	○										植代後～4, +0～ノビエ1L		○	○

田圃同歩散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

A-2

SL-4901 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカワ	クロダツイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壌土
北海道															
東北	●1	●	●始	●前	●始	●前			●発生期			植代後～4, +0～ノビエ1L	500ml	●	●
北陸	●1	●	●始		●始	●始			●発生期						●
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

A-2

SL-4901-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカワ	クロダツイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壌土
北海道															
東北	○1	○	○始		○始	○前			○発生期			植代後～4, +0～ノビエ1L	1kg	●	○
北陸	○1	○	○前		○前	○前			○発生前					○	○
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

A-2

YH-650 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	オタノイ	ヘラオモ ダカ	ミスギヤ ツ	ウツカ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	落葉・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埋土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始		● 前～始	○発生期			+0～ノビエ1.5L	500ml	○	○
東北	○1.5	○	○始	○始		○前		●始	○発生期		コキヤガラ	植代後～4, +0～ノビエ1.5L		○	○
北陸	○1.5	○	○始			○始		○前	○発生期					○	○
関東・東海	○1.5	○	○始			○始	●前※	○前※	○発生期		SU抵抗性のオモダカ コキヤガラ			○	○
近・中・西	○1.5	○	○始			○始	●前	○前	○発生期					○	○
九州	○1.5	○	○始			○始		○前※	○発生期					○	○

田植同時散布可能
※:オモダカ・クロクワイ防除は、有効な後処理剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水限: 2cm/日以下
使用上の注意: SU抵抗性ホタルイ防除は、有効な剤との組み合わせで使用する。
オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。(北陸・関・東・近・中・西・九州)
オモダカ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。(東北)
オモダカ防除は有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用する。(北海道)
クロクワイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-2

YH-650-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	オタノイ	ヘラオモ ダカ	ミスギヤ ツ	ウツカ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	落葉・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埋土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始			○発生期			+0～ノビエ1.5L	1kg	○	○
東北	○1.5	○	○始	○始		○前			○発生期			植代後～4, +0～ノビエ1.5L		○	○
北陸	○1.5	○	○始			○始		○前	○発生期					○	○
関東・東海	○1.5	○	○始			○始		○前※	○発生期					○	○
近・中・西	○1.5	○	○始			○始		○前	○発生期					○	○
九州	○1.5	○	○始			○始		○前※	○発生期					○	○

田植同時散布可能
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水限: 2cm/日以下
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-3 体系(中後期)

A-3

DASH-001 SC

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	オタノイ	ヘラオモ ダカ	ミスギヤ ツ	ウツカ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	落葉・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埋土
北海道	○5	○	○花茎抽出始	○5		○4			○生育期	○生育期		+25～+40(イネ5L以降、 ノビエ5Lまで)	100ml (散布器蓋 100L)	○	○
東北	○5	○	○花茎抽出始	○4	○4	○4	○草丈 20cm※	○草丈 30cm※	○生育期	○生育期		シバノイ:生育期(20cm 以下)		○	○
北陸	○5	○	○花茎抽出始		○4	○5	○草丈 30cm	○草丈 30cm	○生育期	○生育期				○	○
関東・東海	○5	○	○花茎抽出始		○5	○5	○草丈 30cm※	○草丈 30cm※	○生育期	○生育期		コキヤガラ:草丈20cm		○	○
近・中・西	○5	○	○花茎抽出始		○5	○5	○草丈 30cm	○草丈 30cm		○生育期		コキヤガラ:草丈20cm以下		○	○
九州	○5	○	○花茎抽出始		○6	○6			○生育期	○生育期		+20+25～+40(イネ5L 以降、ノビエ5Lまで)		○	○

※:オモダカ・クロクワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水限: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組合せで使用する。
落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。
オモダカ・クロクワイ防除は有効な剤との組合せで使用する。
コウキヤガラ・シズイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

HOK-0721 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	オタノイ	ヘラオモ ダカ	ミスギヤ ツ	ウツカ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	落葉・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埋土
北海道	5												3kg		
東北	○5	○	○5	○5	○5	○4			○生育期			+20～+40(イネ5L以降、 ノビエ5Lまで)		○	○
北陸	○4	○	○5		○5	○4			○生育期			+20～+40(イネ5L以降、 ノビエ4Lまで)		●	○
関東・東海	○4	○	○5		○5	○5			○生育期					●	○
近・中・西	○4	○	○5		○5	○4			○生育期					●	○
九州	○4	○	○5		○5	○5			○生育期						○

減水限: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組合せで使用する。
落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。
降雨などにより散布後2日間以上落水もしくは浅水状態が維持されないとい効果低下することがある。

A-3

HOK-0802-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズギヤ ツ	ウツカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 礫 土	壤土 〜 礫土
北海道															
東北	●3.5	●	●3	●3	●3	●3			●発生期		●始	+15〜+35(イネ5L以降, ノビエ3.5Lまで)	1kg		●
北陸															
関東・東海	●3.5	●	●3		●2	●3			●生育期			+15〜+35(イネ5L以降, ノビエ3.5Lまで)	1kg		●
近・中・四 (管)	●3.5	●	●3		●3	●3			●発生期					●	●
九州															

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 新しい気温条件では薬害を生じることがある。
 散布後の低温および急激な気温の上昇により薬害を生じることがある。

A-3

KUH-073-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズギヤ ツ	ウツカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 礫 土	壤土 〜 礫土
北海道	○3.5	○	○3	○3		○3			○発生期		○始	+20〜+35(イネ5L以降, ノビエ3.5Lまで)	1kg	●	○
東北	○3.5	○	○3	○2	○3	○2	●結実		○発生期		○始			○	○
北陸	○3.5	○	○3		○2	○2	●結実		○発生期		○始			○	○
関東・東海	○3.5	○	○3		○3	○3			○発生期		○前			○	○
近・中・四	○3.5	○	○3		○3	○3	●結実		○発生期		○前			○	○
九州 (準)	○3.5	○	○3	○2	○4	○4	●結実		○発生期					○	○

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 新しい気温条件では薬害を生じることがある。
 散布後の低温および急激な気温の上昇により薬害を生じることがある。
 クログワイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

SB-551-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズギヤ ツ	ウツカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 礫 土	壤土 〜 礫土
北海道															
東北															
北陸	○3	○	○3		○2	○2						+20〜+30(イネ5L以降, ノビエ3Lまで)	1kg	○	○
関東・東海	○3	○	○3		○2	○2			○発生期					○	○
近・中・四	○3	○	○3		○2	○2			○発生期			+15〜+30(準期は+20 〜イネ5L以降、ノビエ 3Lまで)		○	○
九州	○3	○	○3		○2	○2			○発生期			+15〜+30(イネ5L以降, ノビエ3Lまで)		○	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の低温および急激な気温の上昇により薬害を生じることがある。
 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

SL-0401 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズギヤ ツ	ウツカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 礫 土	壤土 〜 礫土
北海道															
東北	○4	○マツハ	○3			○2	●草丈 10cm		○生育期			+14〜+35 (ノビエ4Lまで)	50g×10 ³	○	○
北陸	○4		○3			○2	●草丈 10cm		○生育期					●	○
関東・東海	○3.4		○4			○3			○発生期		フタヤガラ草丈10cm	+14〜+35 (ノビエ4Lまで)		●	○
近・中・四	○3.4		○3.4			○3.3	●始		○発生期					○	
九州	○3.4		○4	○2		○4			○生育期					○	

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
 クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。
 ヨウキヤガラ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

SL-0401-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガイ ツリ	ウツカ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道	○4		○4	○3		○4			○生育期			+20～+35 (ノビエ4Lまで)	1kg	○	○
東北	○4		○4	○4		○3	○草丈 10cm※		○生育期		シズイ:草丈10cm コナキヤガラ:草丈10cm	+7～+35 (ノビエ4Lまで)		○	○
北陸	○4		○4			○3			○生育期					○	○
関東・東海	○4		○4			○3			○生育期		ツキヤガラ:草丈10cm			○	○
近・中・四	○4		○4			○4	○草丈 10cm		○生育期					○	○
九州	○4		○4			○3			○生育期		ツキヤガラ:発生始			○	○

※:クロダワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用。
クロダワイ・コウキヤガラ・シズイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用。

A-3

SL-0401-1kg(1.5kg処理) 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガイ ツリ	ウツカ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道	○5		○4	○4		○4			○生育期			+30～+40 (ノビエ5Lまで)	1.5kg	○	○
東北	○5		○花茎抽 出始	○4		○4	○草丈 15cm※		○生育期		シズイ:草丈15cm コナキヤガラ:草丈15cm	+14～+40 (ノビエ5Lまで)		○	○
北陸	○5		○4			○4			○生育期					○	○
関東・東海	○5		○5			○4	○草丈 15cm※		○生育期		ツキヤガラ:草丈15cm			○	○
近・中・四	○5		○5			○4	○草丈 15cm		○生育期					○	○
九州	○5		○5			○4			○生育期		ツキヤガラ:発生始			○	○

※:クロダワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用。
クロダワイ・コウキヤガラ・シズイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用。

A-3

SL-0601-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガイ ツリ	ウツカ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道															
東北	○4	○	○4	○4		○3	○草丈 10cm※	●矢尻前 ※	○生育期	○再生前 ～始		+14～+35 (ノビエ4Lまで)	1kg	○	○
北陸	○4	○	○3			○3	○草丈 10cm	●矢尻前 ※	○発生期	○再生前 ～始				○	○
関東・東海	○4	○	○4			○3	○草丈 10cm※	●矢尻前 ※	○生育期	○再生前 ～始	ツキヤガラ:発生始 20cm SU根抵抗性ツナギ:3L			●	○
近・中・四	○4	○	○4			○3	○草丈 10cm	●矢尻前 ※	○生育期					○	○
九州											ツキヤガラ:始～20cm				

※:オモダカ・クロダワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用。
オモダカ・クロダワイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-3

SL-0604-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガイ ツリ	ウツカ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道	○4	○	○4	○4		○3			○発生期	○始		+14～+35(イネ5L 以降、ノビエ4Lまで)	1kg	●	○
東北	○4	○	○4	○4	○4	○4	○草丈 10cm※	○矢尻前 抽出前※	○生育期	○始	ツキヤガラ:始	+14～+35(イネ4L 以降、ノビエ4Lまで)		○	○
北陸	○4	○	○4		○3	○3	○草丈 10cm	○矢尻前 抽出前	○発生期	○始				○	○
関東・東海	○4	○	○4		○4	○3	○草丈 10cm※	○矢尻前 抽出前※	○発生期	○始	ツキヤガラ:発生始			●	○
近・中・四	○4	○	○4		○3	○3	○草丈 10cm	○矢尻前 抽出前	○生育期	○始				○	○
九州 (早)	○4	○	○4	○始	○4	○4			○発生期	○始	ツキヤガラ:発生始			○	○

※:オモダカ・クロダワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用。
暑い高温条件では葉害を生じることがある。
オモダカ・クロダワイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-3

SL-0613 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	オタリ	ヘラオモ タガ	ミスギヤ ツリ	ウツカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	莖類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北	○5	○	○花茎抽 出始	○4	○5	○4	○生育期(草 丈30cm以下) ※	○*草丈30 cm以下) ※	○生育期	○生育期		コキヤグワ:生育期(草 丈30cm以下) +14～+40(イネ4L以降、 ノビエ5Lまで)	1000g (散布量 100L)	●	○
北陸	○5	○	○4		○4	○4	○生育期(草 丈30cm以下) ※	○*草丈20 cm以下) ※	○生育期	○再生前 ～始				○	○
関東・東海	○5	○	○5		○5	○5	○生育期(草 丈30cm以下) ※	○*草丈 30cm以下) ※	○生育期	○生育期		コキヤグワ:生育期(草 丈30cm以下)		○	○
近・中・四	○5	○	○5		○5	○5	○生育期(草 丈30cm以下) ※	○*草丈 30cm以下) ※	○生育期	○生育期				○	○
九州	○4.5	○	○花茎抽 出始		○6	○6			○生育期	○生育期		+14～+40(イネ4L以降、 ノビエ4.5Lまで)		○	○

※: 発生盛期～矢じり葉抽出期(草丈30cm以下)
※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
滅水期: 2cm/日以下
使用上の注意: 移植後の低湿および急激な気温の上昇により薬害を生じることがある。(関東・東海)
前処理剤との組み合わせで使用する。
落水もしくは浸水で散布し、2日間以上入水しない。
降雨などにより散布後2日間以上落水もしくは浸水状態が維持されないと効果が低下することがある。
オモダカ・クログワイ・コキヤグワ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

SL-0613 顆粒水和(顆粒のまき)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	オタリ	ヘラオモ タガ	ミスギヤ ツリ	ウツカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	莖類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北	●4	●	●4	●4	●3	●3			●生育期	●生育期		+14～+40(イネ4L以降、 ノビエ4Lまで)	1kg (顆粒のまき 量)	●	●
北陸	●4	●	●4		●3	●2			●生育期	●再生前 ～始		+14～+40(イネ5L以降、 ノビエ4Lまで)		●	●
関東・東海	●4	●	●4		●3	●4			●発生期	●再生前 ～始		+14～+40(イネ6L以降、 ノビエ4Lまで)		●	●
近・中・四 (管)	●4	●	●4		●4	●3			●生育期	●再生前 ～始		+14～+40(イネ4L以降、 ノビエ4Lまで)		●	●
九州															

滅水期: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
落水もしくは浸水で散布し、2日間以上入水しない。
降雨などにより散布後2日間以上落水もしくは浸水状態が維持されないと効果が低下することがある。

A-3

SW-051-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	オタリ	ヘラオモ ダカ	ミスギヤ ツリ	ウツカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	莖類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土
北海道															
東北	○3.5	○	○3	●3	○3	○3	○草丈 20cm※	○広線形 葉4L※	○発生期	○再生前 ～始	コキヤグワ:草丈15cm 以下、草丈10cm 以上	+20～+30 (ノビエ3.5Lまで)	1kg	○	○
北陸	○3.5	○	○3		○3	○3	○草丈 20cm※	○広線形 葉4L	○発生期	○再生前 ～始				○	○
関東・東海	○3.5	○	○3		○4	○3	○草丈 20cm※	○広線形 葉4L※	○発生期	○再生前 ～始	コキヤグワ:草丈15cm 以下			○	○
近・中・四	○3.5	○	○3		○3	○3	●草丈 20cm※	●広線形 葉4L	○発生期	○再生前 ～始				○	○
九州	○3.5	○	○3		○4	○4			○発生期					○	○

※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
滅水期: 2cm/日以下
使用上の注意:
前処理剤との組み合わせで使用する。
オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。
クログワイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。(東北・北陸)
クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。(関東・東海)
クログワイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。(近畿・中国・四国)
コキヤグワ・シズイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

SW-063-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	オタリ	ヘラオモ タガ	ミスギヤ ツリ	ウツカ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	莖類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○5	○	○3	○4		○4		○* ※	○発生期			+25～+40(イネ4L以 降、ノビエ5Lまで)	1kg	○	○
東北	○5	○	○花茎抽 出始	○4	○5	○2	●草丈 15cm	○* ※	○発生期 生育期			+25～+40 (ノビエ5Lまで)		○	○
北陸	○5	○	○5		○4	○3	○草丈 30cm	○* ※	○生育期	○生育期				○	○
関東・東海	○4.5	○	○5		○4	○4	●草丈 20cm	○* ※	○生育期	○生育期		+25～+40 (ノビエ4.5Lまで)		○	○
近・中・四	○4.5	○	○5		○3	○4	○草丈 30cm	○* ※	○生育期					○	○
九州	○5	○	○5		○5	○6	○草丈 30cm※	○* ※	○生育期			+25～+40 (ノビエ5Lまで)		○	○

※: 発生盛期～矢じり葉抽出期(草丈30cm以下)
※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
滅水期: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
オモダカ・クログワイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

SW-973-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハエ	オケイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウツタ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 粘土
北海道	○3.5	○	○3	○2		○3		○始	○発生期		○始	エゾノサヤスカグサ: 2L *20～+30(イネSL以降、ノ ビエ3.5Lまで)	1kg	○	○
東北	○3.5	○	○2	○始	○2		○始※	○始				シズイ: 始～3cm オケイ: 本葉2L *20～+30(イネSL以降、 ノビエ3.5Lまで)		○	○
北陸	○3.5	○	○2		○2	○2								○	○
関東・東海	○3.5	○	○3		○3	○3	○始※	○始	○生育期		○始	オケイ: 発生始(1～3 葉)		○	○
近・中・四	○3.5	○	○2		○3	○3	○始※	○始	○発生期		○始			○	○
九州												*20～+30(イネSL以降、 ノビエ3.5Lまで)		○	○

※: クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 撒水機: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の低温条件により薬害を生じることがある。
 暑い高温条件では薬害を生じることがある。
 散布後の低温および急激な気温の上昇により薬害を生じることがある。
 前処理剤との組み合わせで使用する。
 オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-4 特殊雑草対象(エゾノサヤスカグサ)

A-4 エゾノサヤスカグサ

HOK-0301 フロアブル

地域名	対象雑草: エゾノサヤスカグサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	500ml
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 エゾノサヤスカグサ

HSW-051-1kg 粒

地域名	対象雑草: エゾノサヤスカグサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 エゾノサヤスカグサ

HSW-052 フロアブル

地域名	対象雑草: エゾノサヤスカグサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	500ml
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 エゾノサヤスカグサ

NH-061-1kg 粒

地域名	対象雑草: エゾノサヤスカグサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 エゾノサヤスカグサ

TH-501 フロアブル

地域名	対象雑草: エゾノサヤスカグサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	500ml
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 エゾノサヤヌカグサ

TH-501-1kg 粒

地域名	対象雑草: エゾノサヤヌカグサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 エゾノサヤヌカグサ

TH-547(Z) ジャンボ

地域名	対象雑草: エゾノサヤヌカグサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	40g×10 ²
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 エゾノサヤヌカグサ

TH-547(Z) フロアブル

地域名	対象雑草: エゾノサヤヌカグサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	500ml
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 エゾノサヤヌカグサ

TH-547(Z)-1kg 粒

地域名	対象雑草: エゾノサヤヌカグサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 特殊雑草対象(オモダカ)

A-4 オモダカ

BCH-031-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	○	始		1kg
東北	○	始	※	
北陸	●	始		
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	●	始		
九州				
※: オモダカ防除は、有効な後処理剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する(東北、関東・東海)。 オモダカ防除は有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用する(北海道、北陸、近畿・中国・四国)。				

A-4 オモダカ

BCH-032-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道	○	始		1kg
東北	○	始	※	
北陸	○	始		
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	●	始		
九州				
※: オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

BCH-033-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道	○	始	※	1kg
東北	○	始	※	
北陸	○	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	○	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

BCH-053 フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道	○	始		1kg
東北	○	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

BCH-053 フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道	○	始		500ml
東北	○	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

BCH-065L フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道	○			500ml
東北	○	始		
北陸	●	始		
関東・東海	●	始		
近・中・四	●	始		
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

DPX-84ND(L) 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				3kg
東北				
北陸	●	始		
関東・東海	○	始		
近・中・四	○	始		
九州	○	始		

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

HOK-0605(L)-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	始		
関東・東海				
近・中・四				
九州				

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

HOK-0605-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

HOK-0605S-1kg 粒

対象雑草:		オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道					1kg
東北					
北陸					
関東・東海					
近・中・四					
九州		●	始	※	
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用する。					

A-4 オモダカ

NBA-101SB ジャンボ

地域名	対象雑草:	オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道					30g×10a
東北	●		始	※	
北陸					
関東・東海	●		始	※	
近・中・四	●		始		
九州					
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。					

A-4 オモダカ

NC-385S 顆粒水和

地域名	対象雑草:	オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	○		始		80g (散布液量500ml)
東北	●		始	※	
北陸					
関東・東海	●		始	※	
近・中・四 九州					
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。					

A-4 オモダカ

NC-385SB-1kg 粒

地域名	対象雑草:	オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●		始	※	1kg
東北	●		始	※	
北陸	●		始	※	
関東・東海	●		始	※	
近・中・四	●		始	※	
九州	●		始	※	
			終	※	
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。					

A-4 オモダカ

NC-604 ジャンボ

地域名	対象雑草:	オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●		始	※	30g×10 ³
東北	●		始	※	
北陸	●		始	※	
関東・東海	●		始	※	
近・中・四	●		始	※	
九州	●		始	※	
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。					

A-4 オモダカ

NC-604 フロアブル

地域名	対象雑草:	オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●		始	※	500ml
東北	●		始	※	
北陸	●		始	※	
関東・東海	●		始	※	
近・中・四	●		始	※	
九州	●		始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

NC-604-1kg 粒

地域名	対象雑草:	オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●		始	※	1kg
東北	●		始	※	
北陸	●		始	※	
関東・東海	●		始	※	
近・中・四	●		始	※	
九州	●		始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

NC-606 シャンボ

地域名	対象雑草:	オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●		始	※	30g×10 ²
東北	●		始	※	
北陸	●		始	※	
関東・東海	●		始	※	
近・中・四	●		始	※	
九州	●		始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

NC-617SB-1kg 粒

地域名	対象雑草:	オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●		始～矢じり薬1L		1kg
東北	●				
北陸	●				
関東・東海	●				
近・中・四	●		広線形薬～矢じり薬1L		
九州	●		始～矢じり薬1L	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意:

A-4 オモダカ

NC-618-1kg 粒

地域名	対象雑草:	オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●		始～矢じり薬1L		1kg
東北	●				
北陸	●				
関東・東海	●				
近・中・四	●		始～矢じり薬1L		
九州	●		始～矢じり薬1L	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意:

A-4 オモダカ

NH-071D シャンボ

地域名	対象雑草:	オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●				50g×10 ²
東北	●				
北陸	●		始		
関東・東海	●				
近・中・四	●		始		
九州	●		始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
NH-071D フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸	●	始		
関東・東海				
近・中・四	●	始		
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
NH-071D-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	始		
関東・東海				
近・中・四	●	始		
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
SL-0601 シャンボ

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				50g×10回
東北	●	矢じり葉抽出前	※	
北陸	●	矢じり葉抽出前		
関東・東海	●	矢じり葉抽出前	※	
近・中・四	●	矢じり葉抽出前		
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
SL-0601-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	矢じり葉抽出前	※	
北陸	●	矢じり葉抽出前		
関東・東海	●	矢じり葉抽出前	※	
近・中・四	●	矢じり葉抽出前		
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
SL-0602-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	矢じり葉抽出前	※	
北陸	○	矢じり葉抽出前		
関東・東海	○	矢じり葉抽出前	※	
近・中・四	○	矢じり葉抽出前		
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
SL-0613 顆粒水和

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1000g(散布液量100L)
東北	○	発生盛期～矢じり葉抽出期(草丈30cm以下)	※	
北陸	○	発生盛期～矢じり葉抽出期(草丈20cm以下)		
関東・東海	○	発生盛期～矢じり葉抽出期(草丈30cm以下)	※	
近・中・四	○	発生盛期～矢じり葉抽出期(草丈30cm以下)		
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
SL-0701-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	矢じり葉抽出前		
関東・東海				
近・中・四	●	矢じり葉抽出前		
九州				

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
SST-403 ジャンボ

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				40g×10 ²
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
SST-403 アンプル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
SST-403-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
SST-404 ジャンボ

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始		40g×10 ²
東北	●	始	※	
北陸	●	始		
関東・東海				
近・中・四	●	始		
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
SW-043-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始		1kg
東北	●	始	※	
北陸	●	始		
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

SW-051-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	広縁形葉4L	※	
北陸	○	広縁形葉4L		
関東・東海	○	広縁形葉4L	※	
近・中・四	●	広縁形葉4L		
九州				

※: オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

TH-501 フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始		500ml
東北	●	始	※	
北陸	●	始		
関東・東海				
近・中・四	●	始		
九州				

※: オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

TH-501-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	始		1kg
東北				
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※: オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

YH-650 フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	前～始		500ml
東北	●	始		
北陸	○	前		
関東・東海	○	前	※	
近・中・四	○	前		
九州	○	前	※	

※: オモダカ防除は、有効な後処理剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。(北陸、関東・東海、近畿・中国・四国、九州)
オモダカ防除は有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用する。(北海道)
オモダカ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。(東北)

A-4 オモダカ

YH-650-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	○	前		
関東・東海	○	前	※	
近・中・四	○	前		
九州	○	前	※	

※: オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 特殊雑草対象(キシウスズメノヒエ)

A-4 キシウスズメノヒエ

NC-612-1kg 粒

地域名	対象雑草: キシウスズメノヒエ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四	●	3L	
九州			

使用上の注意:

A-4 特殊雑草対象(クログワイ)

A-4 クログワイ

BCH-031-1kg 粒

BCH-031-1kg 粒				
地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	○	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な後処理剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する(東北・九州)。 クログワイ防除は有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用する(北陸・関東・東海・近畿・中国・四国)。				

A-4 クログワイ

BCH-032-1kg 粒

RGCH-032-1kg 粒					
地域名	対象雑草:	クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道					1kg
東北		○	始	※	
北陸		○	始		
関東・東海		○	始	※	
近・中・四		●	始		
九州					
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。					

A-4 クログワイ

BCH-033-1kg 粒

ECH-033-1kg 概					
地域名	対象雑草:	クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道					1kg
東北		○	始	※	
北陸		○	始		
関東・東海		○	始	※	
近・中・四		●	始		
九州					
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。					

A-4 クログワイ

BCH-052 フロアブル

ECH-052 ヲコバ				
地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	○	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

BCH-053 フロアブル

ECH-053 ヲコギ				
地域名	対象雑草: クロギ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	○	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※: クロギ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クロギ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

BCH-065L フロアブル

ICH-065L フォアブル				
地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸	●	始		
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始		
九州	●	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
DASH-001 SC

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				100ml (散布液量100L)
東北	○	草丈20cm以下	※	
北陸	○	草丈30cm以下		
関東・東海	○	草丈30cm以下	※	
近・中・四	○	草丈30cm以下		
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。				

A-4 クログワイ
DPX-84ND(L) 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				3kg
東北				
北陸	●	始		
関東・東海	○	始		
近・中・四	●	始		
九州	○	始		
使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
HOK-0605(L)-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	始		
関東・東海				
近・中・四				
九州				
使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
HOK-0605S-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州	●	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
KPP-398(L) フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸	●	始		
関東・東海				
近・中・四	●	始		
九州	●	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ
KUH-021-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	始	※	
北陸	○	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	○	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な後処理剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する(東北、北陸、近畿・中国・四国、九州)。 クログワイ防除は有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用する(関東・東海、近畿・中国・四国)。				

A-4 クログワイ
KUH-073-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸	●	始		
関東・東海				
近・中・四	●	始		
九州	●	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
MAT-159 シャンゴ

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				50g×10 [□]
東北	○	前	※	
北陸	○	前		
関東・東海	○	前	※	
近・中・四	○	前		
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
NBA-101SB シャンゴ

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				30g×10 [□]
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始		
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
NC-385SB 顆粒水和

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				80g (散布液量500ml)
東北				
北陸	●	始		
関東・東海				
近・中・四				
九州				

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
NC-385SB-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ
NC-604 シャンゴ

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				30g×10 [□]
東北	●	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

NC-604 フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	○	始	※	
北陸	○	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	●	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

NC-604-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	始		
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始		
九州	●	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

NC-606 シャンゴ

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				30g×10㎡
東北	●	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

NC-617SB-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	草丈10cm		
関東・東海				
近・中・西	●	草丈10cm		
九州				
使用上の注意:				

A-4 クログワイ

NC-618-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	草丈10cm		
関東・東海				
近・中・四	●	草丈10cm		
九州				
使用上の注意:				

A-4 クログワイ

NH-071D シャンゴ

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				50g×10㎡
東北				
北陸	●	始		
関東・東海				
近・中・四	●	始		
九州	●	始	※	
※: クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果は向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

NH-071D フアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸	●	始		
関東・東海				
近・中・四	●	始		
九州	●	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

NH-071D-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	始		
関東・東海				
近・中・四	●	始		
九州	●	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

SL-0401 ジャンボ

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				50g×10㎡
東北	●	草丈10cm		
北陸	●	草丈10cm		
関東・東海				
近・中・四	●	始		
九州				

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

SL-0601 ジャンボ

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				50g×10㎡
東北	●	草丈10cm	※	
北陸	●	草丈10cm		
関東・東海	●	草丈10cm	※	
近・中・四	●	草丈10cm		
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

SL-0602-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	草丈10cm	※	
北陸	○	草丈10cm		
関東・東海	○	草丈10cm	※	
近・中・四	○	草丈10cm		
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

SL-0613 顆粒水和

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1000g (散布液量100L)
東北	○	生育期(草丈30cm以下)	※	
北陸	○	生育期(草丈30cm以下)		
関東・東海	○	生育期(草丈30cm以下)	※	
近・中・四	○	生育期(草丈30cm以下)		
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: クログワイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

SL-0701-1kg 粒

地域名	対象雑草:	クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道					1kg
東北					
北陸	●		草丈10cm		
関東・東海					
近・中・西	●		草丈10cm		
九州					

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

SST-403 シャンゴ

地域名	対象雑草:	クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道					40g×10㎡
東北	●		始	※	
北陸					
関東・東海	●		始	※	
近・中・西					
九州					

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

SST-403 プロアブル

地域名	対象雑草:	クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道					500ml
東北	○		始	※	
北陸					
関東・東海	○		始	※	
近・中・西	○		始		
九州					

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

SST-403-1kg 粒

地域名	対象雑草:	クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道					1kg
東北	○		始	※	
北陸					
関東・東海	○		始	※	
近・中・西	○		始		
九州					

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

SST-404 シャンゴ

地域名	対象雑草:	クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道					40g×10㎡
東北	●		始	※	
北陸	●		始	※	
関東・東海	●		始	※	
近・中・西	●		始	※	
九州	●		始	※	

※:クログワイ防除は、有効な後処理剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。(関東・東海・九州)
クログワイ防除は有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用する。(東北・北陸・近畿・中国・四国)

A-4 クログワイ

SW-043-1kg 粒

地域名	対象雑草:	クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道					1kg
東北	●		始	※	
北陸	●		始		
関東・東海	●		始	※	
近・中・西					
九州					

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

SW-051-1kg 粒

地域名	対象雑草:	クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道					1kg
東北		○	草丈20cm	※	
北陸		○	草丈20cm	※	
関東・東海		○	草丈20cm	※	
近・中・四		●	草丈20cm	※	
九州					

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: クログワイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する(東北・北陸)。
 クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する(関東・東海)。
 クログワイ防除は有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用する。(近畿・中国・四国)

A-4 クログワイ

SW-063-1kg 粒

地域名	対象雑草:	クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道					1kg
東北		●	草丈15cm		
北陸		○	草丈30cm		
関東・東海		●	草丈20cm		
近・中・四		○	草丈30cm		
九州		○	草丈30cm	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: クログワイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

TH-001 フロアブル

地域名	対象雑草:	クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道					500ml
東北		○	前	※	
北陸					
関東・東海		○	始	※	
近・中・四		○	始	※	
九州		●	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

TH-501 フロアブル

地域名	対象雑草:	クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道					500ml
東北					
北陸		●	始		
関東・東海					
近・中・四		●	始		
九州					

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

YH-650 フロアブル

地域名	対象雑草:	クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道					500ml
東北					
北陸					
関東・東海		●	前	※	
近・中・四		●	前		
九州					

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 特殊雑草対象(コウキヤガラ)

A-4 コウキヤガラ

DASTH-001 SC

地域名	対象雑草:	コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道				100ml (散布水量100L)
東北				
北陸				
関東・東海		●	草丈20cm	
近・中・四				
九州				

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

NC-612-1kg 粒

地域名	対象雑草:	コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○		草丈30cm	
北陸				
関東・東海	○		草丈30cm	
近・中・西	●		草丈30cm	
九州	○		草丈30cm	

使用上の注意:

A-4 コウキヤガラ

SL-0401 ジャンボ

地域名	対象雑草:	コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道				50g×10 [□]
東北				
北陸				
関東・東海	●		草丈10cm	
近・中・西				
九州				

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

SL-0401-1kg 粒

地域名	対象雑草:	コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●		草丈10cm	
北陸				
関東・東海	○		草丈10cm	
近・中・西				
九州	○		始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

SL-0401-1kg(1.5kg処理) 粒

地域名	対象雑草:	コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道				1.5kg
東北	●		草丈15cm	
北陸				
関東・東海	○		草丈15cm	
近・中・西				
九州	○		始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

SL-0601 ジャンボ

地域名	対象雑草:	コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道				50g×10 [□]
東北				
北陸				
関東・東海	●		始	
近・中・西				
九州	●		始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

SL-0601-1kg 粒

地域名	対象雑草:	コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●		始	
北陸				
関東・東海	○		始	
近・中・西				
九州	○		始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

SL-0602-1kg 粒

地域名	対象雑草	コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道				1kg
東北		○	始	
北陸				
関東・東海		○	始～茎丈20cm	
近・中・四				
九州		○	始～茎丈20cm	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

SL-0604-1kg 粒

地域名	対象雑草	コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道				1kg
東北		●	始	
北陸				
関東・東海		○	始	
近・中・四				
九州		○	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

SL-0701-1kg 粒

地域名	対象雑草	コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸				
関東・東海		●	始	
近・中・四				
九州		●	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

SST-403 シャンボ

地域名	対象雑草	コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道				40g×10㎡
東北				
北陸				
関東・東海		●	始	
近・中・四				
九州				

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

SST-403 フロアブル

地域名	対象雑草	コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸				
関東・東海		○	始	
近・中・四				
九州				

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

SST-403-1kg 粒

地域名	対象雑草	コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸				
関東・東海		○	始	
近・中・四				
九州				

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ
SST-404 シャンゴ

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			40g×10 [□]
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・西			
九州	●	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ
SST-404 フロアブル

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北	●	始	
北陸			
関東・東海	○	始	
近・中・西			
九州	○	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ
SW-051-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	●	草丈15cm	
北陸			
関東・東海	●	草丈15cm	
近・中・西			
九州			

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ
TH-001 フロアブル

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北	○	始	
北陸			
関東・東海	○	始	
近・中・西			
九州	●	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ
TH-122-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	●	始	
北陸			
関東・東海	○	始	
近・中・西			
九州	○	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ
TH-224 フロアブル

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北	●	始	
北陸			
関東・東海	○	始	
近・中・西			
九州	○	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

TH-501 フロアブル

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北	●	始	
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州	●	始	
使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 コウキヤガラ

TH-547(Z) フロアブル

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北	●	始	
北陸			
関東・東海	○	始	
近・中・四			
九州	○	始	
使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 コウキヤガラ

TH-547(Z)-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	○	始	
北陸			
関東・東海	○	始	
近・中・四			
九州	○	始	
使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 コウキヤガラ

YH-650 フロアブル

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北	●	前	
北陸			
関東・東海	●	前	
近・中・四			
九州			
使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 特殊雑草対象(シズイ)

A-4 シズイ

KUHT-041-1kg 粒

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	●	3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意: シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 シズイ

SST-404-1kg 粒

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	●	3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意: シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 シズイ
SW-051-1kg 粒

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●		1kg
東北		10cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意: シズイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 シズイ
TH-547(2)-1kg 粒

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●		1kg
東北		3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意: シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 シズイ
TH-501 フロアブル

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●		500ml
東北		3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意: シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 特殊雑草対象(ミズアオイ)

A-4 ミズアオイ
SVJ-167-1kg 粒

地域名	対象雑草: ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	1L	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 ミズアオイ
TH-501 フロアブル

地域名	対象雑草: ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	1L	500ml
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

A-4 ミズアオイ
TH-501-1kg 粒

地域名	対象雑草: ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	1L	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			

使用上の注意:

B 直播栽培

入水前

B

NC-331 水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズカギ ツリ	ウツカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	莖類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
関東・東海～九州		○	○前		○前	○前			○発生期	○再生前 ～始		入水前10～2日 (イネ2L以降、雑草草 丈30cm以下)	90～180g (散布後量 100L)		○

乾田直播乾田条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

B

SL-0612 顆粒水和(乾直入水前)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズカギ ツリ	ウツカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	莖類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
東北～近・中・四	○5											イネ2L以降、ノビエ 5Lまで(入水前)	30g (散布後量 100L)		○

乾田直播 乾田条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

入水後(移植A-2区分で検討している剤)

B

SW-751 粒(少量散布)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズカギ ツリ	ウツカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	莖類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
東北～近・中・四 九州	○1	○	○始									+0～ノビエ1L	1.5kg	●	○

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 後処理剤との体系で使用する。

B

SW-751 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズカギ ツリ	ウツカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	莖類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道～関東・東海	○1	○	○始	○2		○2						+0～3～+7(ノビエ1L)	3kg (但し4kgは 播種前のみ)	●	○
近・中・四～九州	○1.5	○	○始			○2						+0～3～+7(ノビエ1.5L) (砂壌土はノビエ1L)			

湛水直播

湛水条件で使用する

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 後処理剤との組み合わせで使用する

入水後(移植A-1区分で検討している剤)

B

NBA-101SB ジェンダ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズカギ ツリ	ウツカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	莖類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
全域	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生期			イネ1L～ノビエ2.5L	30g×10 ³		●

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では悪害を生じる。

B

NC-385SB 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズカギ ツリ	ウツカワ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	莖類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
東北～九州 全域	○2.5	○	○2		○2	○2						イネ1L～ノビエ2.5L	80g (散布後量 500ml)	○	○

湛水条件で使用する。

顆粒のまま水口処理が可能。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では悪害を生じる。

B

NC-385SB-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロタ'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	莖類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
東北～九州 全域	○2.5	○	○2		○始	○始				○再生前 ～始		イネ1L～ノビエ2.5L	1kg	○	○

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

NH-051(H)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロタ'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	莖類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道～東北	●2.5	●	●2			●始			●発生期	●再生前 ～始		イネ1L～ノビエ2.5L	1kg		●

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

NH-302 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロタ'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	莖類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
全域	●2.5	●	●2									イネ1.5L～ノビエ2.5L	500ml		●

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

SB-556 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロタ'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	莖類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
東北～九州 全域	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期			イネ1L～ノビエ2.5L (北海道はノビエ2Lま で)	500ml	○	○

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

SL-0601-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロタ'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	莖類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
東北～九州	●4	●	●3									イネ1L～ノビエ4L	1kg		●

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

SST-404 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロタ'ワイ	オモタ'カ	ヒルムシロ	セリ	莖類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
全域	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生期	●再生前 ～始		イネ1L～ノビエ2.5L	500ml	●	●

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B

SST-404-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ササユイ	ヘラオモ ダカ	ミズガキ ツリ	ウツカワ	クロタツイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	落葉・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道～ 近・中・四	●2.5	●	●2							●再生前 ～始		イネ1L～ノビエ2.5L	1kg		●

灌水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では悪害を生じる。

B

SW-043-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ササユイ	ヘラオモ ダカ	ミズガキ ツリ	ウツカワ	クロタツイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	落葉・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
東北～九州 全域	○2.5	○	○2		○2	○始						イネ1L～ノビエ2.5L	1kg		○

灌水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では悪害を生じる。

入水後(移植A～3区分で検討している剤)

B

BAS-3510(Na) 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ササユイ	ヘラオモ ダカ	ミズガキ ツリ	ウツカワ	クロタツイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	落葉・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
全域		●	●5		●5							雑草生育期 (イネ3L以降、入水50 日後まで)	3kg		●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する

落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。

B

DASH-001 SC

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ササユイ	ヘラオモ ダカ	ミズガキ ツリ	ウツカワ	クロタツイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	落葉・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
全域	○5	○	○4	○4	○4	○4			○生育期	○生育期		イネ3L以降、ノビ エ5Lまで	100ml (散布水量 100L)	●	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する

落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。

B

DEH-112 乳(EW)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ササユイ	ヘラオモ ダカ	ミズガキ ツリ	ウツカワ	クロタツイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	落葉・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
全域	○5											ノビエ3L～6L 播種後～ノビエ5L (ノビエ生育期) イネ3L以降、ノビエ 4Lまで	100ml (散布水量 250～ 100L 展着剤加 用)	○ (九州 のみ)	○

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

使用直前に希釈する。

B

KUH-031 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ササユイ	ヘラオモ ダカ	ミズガキ ツリ	ウツカワ	クロタツイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	落葉・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
全域	○4	○	○4									イネ3L以降、ノビエ 4Lまで	3kg	●	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する

ごく浅水で散布し、2日間以上入水しない。

散布後に降雨等で灌水されると効果が低下することがある。

B

NC-612-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
全域	●3.5	●	●3										イネ3L以降、ノビエ 3.5Lまで	3kg		●

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する

B

SL-0401-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
全域	○4		○3			○2							イネ3L以降、ノビエ 4Lまで(9Lはノビエ 3Lまで)	1kg	●	○

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する

B

SL-0401-1kg(1.5kg処理) 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロダワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
全域	○4.5		○4			○3							イネ3L以降、ノビエ 4Lまで	1.5kg	●	○

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する

使用基準の更新

以下の剤について、使用基準を策定した。

1. 過去の使用基準を元に現行の様式による使用基準を策定。
2. 過去の使用基準に特殊雑草対象の本年度判定結果を加え、使用基準を策定。

A 移植栽培

A-1 一発処理

A-1

HOK-0301 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウラボシ	クロタビ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	落類・ 表層剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生期			ミズアオイ:2L SU花菱草:2L エンバヤ:2L	+5～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○始※		○発生期						○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始	○始※		○発生期						○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生期		○前				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生期		○前				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生期						○	○

※:クロタビ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

滅水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
クロタビ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

HSW-051-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウラボシ	クロタビ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	落類・ 表層剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始		○始	○発生期			ミズアオイ:2L SU花菱草:2L エンバヤ:2L	+3～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北																
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

滅水深: 2cm/日以下

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

HSW-052 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウラボシ	クロタビ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	落類・ 表層剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始		○始	○発生期			ミズアオイ:2L SU花菱草:2L エンバヤ:2L	+3～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北																
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

滅水深: 2cm/日以下

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

KUH-021-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	オサリイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○3	○	○2	○2		○2		○始※	○発生期	○再生前 ～始	○前	※7～ノビエ2L(砂壌土 は7～)	1kg	○	○
東北	○3	○	○3	○始	○2	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始	○前	※7～ノビエ2L(砂壌土 は7～)		○	○
北陸	○3	○	○3		○3	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始				○	○
関東・東海	○3	○	○3		○3	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始	○前	※7～ノビエ2L(砂壌土 は7～)		○	○
近・中・四	○3	○	○3		○3	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
九州	○3	○	○3		○3	○3	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始	○前	※7～ノビエ2L(砂壌土 は7～)		○	○

※:オモダカ・クロクワイ防除は、有効な後処理剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。
 オモダカ・コウキヤツリ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。
 クロクワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する(東北・近畿・中国・四国、九州)
 クロクワイ防除は有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用する(関東・東海・近畿・中国・四国)

A-1

NBA-1015B シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	オサリイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		○始※	○発生期	○再生前 ～始	○前	※1～ノビエ2.5L	30g×10㎡	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始	●始※	●始※	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始	●始	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●始	●始	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○

※:オモダカ・クロクワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クロクワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

NC-3855B 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	オサリイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○始		○2		○始	○発生期	○再生前 ～始	○前	※10～ノビエ2.5L	80g(散布液 量500ml)	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	●始	●始※	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始				○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2		●始※	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○

※:オモダカ・クロクワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クロクワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

NC-604 フアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	オサリイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クロクワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		●始※	○発生期	○再生前 ～始	○前	※10～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○始※	●始※	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	●始※	○発生期	○再生前 ～始				○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	●始※	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	●始※	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○

※:オモダカ・クロクワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 クロクワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。
 シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。
 オモダカ・クロクワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

NC-621-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヒ	オサリイ	ヘラオモ ダカ	ミズギヤ ツリ	ウツカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 増土
北海道	○3	○	○2	○2		○2			○発生期 ～始	○再生前 ～始		+5～ノビエ3L	1kg		○
東北	○3	○	○2	○2	○3	○2			○発生期 ～始	○再生前 ～始				○	○
北陸	○3	○	○3		○2	○2			○発生期 ～始	○再生前 ～始				○	○
関東・東海	○3	○	○3		○3	○2			○発生期 ～始	○再生前 ～始					○
近・中・四	○3	○	○3		○2・3	○2			○発生期 ～始	○再生前 ～始	コウキヤガラ:2L			○	○
九州	○3	○	○3		○3	○3			○発生期 ～始	○再生前 ～始				○	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズギヤツリには効果が劣る。

A-1

SST-403 70777ル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヒ	オサリイ	ヘラオモ ダカ	ミズギヤ ツリ	ウツカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 増土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始			○発生期 ～始	○再生前 ～始	○前	+0～ノビエ1.5L	500ml	○	○
東北	○1.5	○	○始	○前	○始	○始	○始※	●始※	○発生期 ～始	○再生前 ～始	○前			○	○
北陸	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生期 ～始	○再生前 ～始	○前			○	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	○始	○始※	●始※	○発生期 ～始	○再生前 ～始	○前	コウキヤガラ:始		○	○
近・中・四	○1.5	○	○始		○始	○始	○始		○発生期 ～始	○再生前 ～始	○前			○	○
九州	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生期 ～始	○再生前 ～始	○前			○	○

田植同時散布可能
 ※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズギヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

SST-403-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヒ	オサリイ	ヘラオモ ダカ	ミズギヤ ツリ	ウツカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 増土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始			○発生期 ～始	○再生前 ～始	○前	+0～ノビエ1.5L	1kg	○	○
東北	○1.5	○	○始	○始	○始	○始	○始※	●始※	○発生期 ～始	○再生前 ～始	○前			○	○
北陸	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生期 ～始	○再生前 ～始	○前	コウキヤガラ:始		○	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	○始	○始※	●始※	○発生期 ～始	○再生前 ～始	○前			○	○
近・中・四	○1.5	○	○始		○始	○始	○始		○発生期 ～始	○再生前 ～始				○	○
九州	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生期 ～始	○再生前 ～始	○前			○	○

田植同時散布可能
 ※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズギヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

TH-001 70777ル

TH-001 フォアブル												処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 増土	
地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヒ	オサリイ	ヘラオモ ダカ	ミズギヤ ツリ	ウツカワ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	藻類・ 表層剥離					
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		○始	○発生期 ～始	○再生前 ～始	○前	コウキヤガラ:2L シズイオイ:1L	+20～+30 (ノビエ2.5Lまで)	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○2	○前※	○始※	○発生期 ～始	○再生前 ～始	○前	シズイオイ:3cm SU根付防止剤:2L コウキヤガラ:始	+15～+25(ノビエ2.5L まで)		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生期 ～始	○再生前 ～始	○前	コウキヤガラ:始 SU根付防止剤:2L			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生期 ～始	○再生前 ～始	○前	コウキヤガラ:始 SU根付防止剤:2L			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※		○発生期 ～始	○再生前 ～始	○前				○	○
九州	○2.5	○	○2	○始	○2	○2	●始※		○発生期 ～始	○再生前 ～始	○前	コウキヤガラ:始			○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
水口処理可能
減水深:2cm/日以下
使用上の注意:前処理剤との組み合わせで使用。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ・シズイオイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

TH-122-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズギヤ ツリ	ウツリ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	落葉・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壤土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		○始※	○発生期	○再生前 ～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始	○前	ノビエ・草丈3cm コシキガサ・始		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始	○前	コシキガサ・始	+0～ノビエ2.5L	○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始	○前		+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)	○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始	○前	コシキガサ・始	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)	○	○

田植同時散布可能
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
滅水際: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズギヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。
コシキガサ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

TH-224 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズギヤ ツリ	ウツリ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	落葉・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壤土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		○始※	○発生期	○再生前 ～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始	○前	ノビエ・草丈3cm コシキガサ・始		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始	○前	コシキガサ・始	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)	○*	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始	○前	コシキガサ・始	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)	○	○

田植同時散布可能
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
滅水際: 2cm/日以下
使用上の注意: *: 速乾性、塗付け精度不良等で悪害を生ずることがある。
田植前に生育したミズギヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ・コシキガサ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

TH-547(Z) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズギヤ ツリ	ウツリ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	落葉・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壤土
北海道	○3	○	○2	○2		○2		○始※	○発生期	○再生前 ～始		+5～ノビエ3L	500ml		○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始		+5～ノビエ2.5L		○	○
北陸	○2.5	○	○始		○始	○始	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始				○	○
関東・東海	○3	○	○3		○2	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始	コシキガサ・始	+5～ノビエ3L		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始		+5～ノビエ2.5L			○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生期	○再生前 ～始	コシキガサ・始			○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
滅水際: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズギヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ・コシキガサ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

NC-612-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズギヤ ツリ	ウツリ	クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	落葉・ 表層剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壤土
北海道	○3.5	○	○4	○3		○4		○生育期 失効(草丈3cm) 以上	○発生期	○再生前 ～始	○始	+15～+35(ノビエ3.5L まで)	1kg	○	○
東北	○3.5	○	○3	○3	○3	○2	○生育期 失効(草丈3cm) 以上	○生育期 失効(草丈3cm) 以上	○発生期	○再生前 ～始	○始	コシキガサ・草丈30cm ノビエ・生育期(草丈 50cm以下)		○	○
北陸	○3.5	○	○3		○3	○3	○生育期 失効(草丈3cm) 以上	○生育期 失効(草丈3cm) 以上	○発生期	○再生前 ～始				○	○
関東・東海	○3.5	○	○3		○3	○3	○生育期 失効(草丈3cm) 以上	○生育期 失効(草丈3cm) 以上	○発生期	○再生前 ～始	○始	コシキガサ・草丈30cm以下 ノビエ・生育期(草丈 50cm以下)		○	○
近・中・四	○3.5	○	○3		○3	○3	○生育期 失効(草丈3cm) 以上	○生育期 失効(草丈3cm) 以上	○発生期	○再生前 ～始	○始	コシキガサ・草丈20cm コシキガサ・草丈30cm		○	○
九州	○3.5	○	○4		○4	○4	○生育期 失効(草丈3cm) 以上	○生育期 失効(草丈3cm) 以上	○発生期	○再生前 ～始	○始	コシキガサ・草丈30cm		○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
滅水際: 2cm/日以下
使用上の注意: イネ4L未満では、悪害を生ずることがある(関東・東海)
前処理剤との組み合わせで使用する。

水稲関係除草剤使用基準の表示について

1. 過年度、既に実用化の認められている適用草種・土壌条件に○を印した。

(本年度の試験の結果、特に拡大のない場合も含む)

草種欄の数字、字句で草種ごとの葉齢を示した。

[例: ○始(発生始)、○2(2葉期まで)]

作期に限定がある場合は、地域名の後に適用作期を普通期:(普)、早期:(早)と記した。

使用上の注意は別途一覧表に添って文章で備考欄に記載した。

2. 本年度、新たに使用基準が作成された場合は、実用化可能となった適用草種・土壌に●を印し、
処理時期及び使用量を記載した。

3. 過年度の基準に適用条件拡大が可能となった場合、

作 期 の 拡 大 : 作期の限定がなくなった場合、作期の記載を取消線で消した。(例: ~~(普)~~)

草 種 の 拡 大 : 拡大された草種に●を印した。

葉 齢 の 拡 大 : 拡大された葉齢に、アンダーラインを付した。(例: ○2.5)

処理時期、使用量の拡大 : 拡大部分にアンダーラインを付した。(例: +3〜/ピエ2L, 100〜150ml/10a)

土 壌 条 件 の 拡 大 : 拡大された土壌に●を印した。