

新登録除草剤・植物成長調整剤一覧

農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課
平成21年11月1日～平成22年3月31日

(1) 水稲作(移植・直播)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	登録会社
オキサジクロメホン・クロメプロップ・ダイムロシ・プロモブチド・ペンシルフロメチル粒剤	ゴウワンD Lジャンボ	3-[1-(3,5-ジクロロフェニル)-1-メチルエチル]-3,4-ジヒドロ-6-メチル-5-フェニル-2H-1,3-オキサジシン-4-オン…0.86%、(RS)-2-(2,4-ジクロロ-m-トリルオキシ)プロピオンアミド…4.3%、1-(α , α -ジメチルベンシル)-3-(β -トリル)尿素…6.4%、(RS)-2-プロモ-N-(α , α -ジメチルベンシル)-3,3-ジメチルブチルアミド…8.6%、メチル= α -(4,6-ジメチキシリジン)-2-イルカルバモイルスルファミル)- α -トルアート…0.73%	粒剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオシロ・藻類による表層はく離	近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～壇土	小包装(パック)10個(700g)/10a	移植直後～ β E2葉期 ただし、移植後30日まで	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。	本剤の使用回数…1回、オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数…2回以内、クロメプロップを含む農薬の総使用回数…2回以内、ダイムロシを含む農薬の総使用回数…3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)、プロモブチドを含む農薬の総使用回数…2回以内、ペンシルフロメチルを含む農薬の総使用回数…2回以内	北興化学工業(株)
イマノスルフロニル・ピラクロニル・ペンゾビシクロン粒剤	意1キログラム	1-(2-クロロミタツ[1,2-a]ピリジン-3-イルスルホニル)-3-(4,6-ジメチキシリジン-2-イル)尿素…0.90%、1-(3-クロロ-4,5,6,7-テトラヒドロピラゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル)-5-[メチル(プロパ-2-イル)アミノ]ピラゾール-4-カルボニリル…2.0%、3-(2-クロロ-4-メチルベンゾイル)-2-フェニルチオビシクロ[3.2.1]オクタ-2-エン-4-オン…2.0%	粒剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ヘラオモダ(北海道、東北)、ヒルムシロ(北陸を除く)、セリ、アオシロ・藻類による表層はく離(関東・東山・東海)	東北	砂壤土～壇土	1kg/10a	移植直後～ β E2.5葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布	本剤の使用回数…1回、イマノスルフロニルを含む農薬の総使用回数…2回以内、ピラクロニルを含む農薬の総使用回数…2回以内、ペンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数…2回以内	住友化学(株)
イマノスルフロニル・ピラクロニル・ペンゾビシクロン水和剤	意フロアブル	1-(2-クロロミタツ[1,2-a]ピリジン-3-イルスルホニル)-3-(4,6-ジメチキシリジン-2-イル)尿素…1.8%、1-(3-クロロ-4,5,6,7-テトラヒドロピラゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル)-5-[メチル(プロパ-2-イル)アミノ]ピラゾール-4-カルボニリル…3.9%、3-(2-クロロ-4-メチルベンゾイル)-2-フェニルチオビシクロ[3.2.1]オクタ-2-エン-4-オン…3.9%	水和剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ヘラオモダ(北海道、東北)、ヒルムシロ、セリ(北陸を除く)、アオシロ・藻類による表層はく離(北陸、近畿・中国・四国、九州)	東北	砂壤土～壇土	500mL/10a	移植直後～ β E2.5葉期 ただし、移植後30日まで	原液湛水散布	本剤の使用回数…1回、イマノスルフロニルを含む農薬の総使用回数…2回以内、ピラクロニルを含む農薬の総使用回数…2回以内、ペンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数…2回以内	住友化学(株)
プロモブチド・ペンシルフロメチル・ペンタキサゾン粒剤	クサカリテイオー Lジャンボ	(RS)-2-プロモ-N-(α , α -ジメチルベンシル)-3,3-ジメチルブチルアミド…22.5%、メチル= α -(4,6-ジメチキシリジン)-2-イルカルバモイルスルファミル)- α -トルアート…1.9%、3-(4-クロロ-5-シクロペンチルオキシ)-2-フルオロフェニル)-5-イソプロピリデン-1,3-オキサゾリジン-2,4-ジオン…9.8%	粒剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ(東北)、ヘラオモダ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ	北海道	壇土～壇土	小包装(パック)10個(400g)/10a	移植直後～ β E1.5葉期 ただし、移植後30日まで	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。	本剤の使用回数…1回、プロモブチドを含む農薬の総使用回数…2回以内、ペンシルフロメチルを含む農薬の総使用回数…2回以内	科研製薬(株)、三井化学(株)
プロモブチド・ペンシルフロメチル・ペンタキサゾン粒剤	クサカリテイオー Lジャンボ	(RS)-2-プロモ-N-(α , α -ジメチルベンシル)-3,3-ジメチルブチルアミド…22.5%、メチル= α -(4,6-ジメチキシリジン)-2-イルカルバモイルスルファミル)- α -トルアート…1.3%、3-(4-クロロ-5-シクロペンチルオキシ)-2-フルオロフェニル)-5-イソプロピリデン-1,3-オキサゾリジン-2,4-ジオン…9.8%	粒剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオシロ・藻類による表層はく離(北陸、近畿・中国・四国、九州)	北陸	砂壤土～壇土	小包装(パック)10個(400g)/10a	移植直後～ β E1.5葉期 ただし、移植後30日まで	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。	本剤の使用回数…1回、プロモブチドを含む農薬の総使用回数…2回以内、ペンシルフロメチルを含む農薬の総使用回数…2回以内、ペンタキサゾンを含む農薬の総使用回数…2回以内	科研製薬(株)、三井化学(株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	登録会社
タイムロン・ペンシルフロロンメチル・メフェナセット粒剤	MICザークD粒剤17	1-(α , α -ジメチルベンジル)-3-(β -ナトリウム)尿素...1.5%, メチル= α -(4,6-ジメチルピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)- α -トルアート...0.17%, 2-ベンゾチアゾール-2-イルオキシ-N-メチルアセトアミド...3.5%	粒剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバ、ホタルイ、ウリカワ、ヘオモダ、ヒルムシロ、ミズガヤツリ、オモダ、クロクワイ、セリ、コウキヤガラ(九州)、アオトドロ、藻類による表層はく離	北陸、関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～埴土	3kg/10a	移植後5日～ β エ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布	本剤の使用回数...1回、タイムロンを含む農薬の総使用回数...3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)、ペンシルフロロンメチルを含む農薬の総使用回数...2回以内、メフェナセットを含む農薬の総使用回数...2回以内	三井化学アグロ(株)
ペンシルフロロンメチル・メフェナセット粒剤	MICザーク粒剤25	メチル= α -(4,6-ジメチルピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)- α -トルアート...0.25%, 2-ベンゾチアゾール-2-イルオキシ-N-メチルアセトアミド...4.0%	粒剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバ、ホタルイ、ウリカワ、ヘオモダ、ヒルムシロ、ミズガヤツリ、オモダ、クロクワイ、シズイ、エゾノヤスカグサ(北海道)、セリ、アオトドロ、藻類による表層はく離	北海道 東北、北陸、関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯	埴土～埴土(減水深2cm/日以下)	3kg/10a	移植後5～20日(β エ2.5葉期まで) 移植後5～15日(β エ2.5葉期まで)	湛水散布	本剤の使用回数...1回、ペンシルフロロンメチルを含む農薬の総使用回数...2回以内、メフェナセットを含む農薬の総使用回数...2回以内	三井化学アグロ(株)
タイムロン・ペンシルフロロンメチル・メフェナセット粒剤	MICザークD1キロ粒剤51	1-(α , α -ジメチルベンジル)-3-(β -ナトリウム)尿素...4.5%, メチル= α -(4,6-ジメチルピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)- α -トルアート...0.51%, 2-ベンゾチアゾール-2-イルオキシ-N-メチルアセトアミド...10.0%	粒剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバ、ホタルイ、ウリカワ、ヘオモダ、ミズガヤツリ、オモダ、クロクワイ、セリ、ヒルムシロ、コウキヤガラ(九州)、アオトドロ、藻類による表層はく離	北陸、関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯、近畿・中国・四国の早期栽培地帯	砂壤土～埴土	1kg/10a	移植後5日～ β エ2.5葉期 ただし、移植後30日まで 移植後5日～ β エ3葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布	本剤の使用回数...1回、タイムロンを含む農薬の総使用回数...3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)、ペンシルフロロンメチルを含む農薬の総使用回数...2回以内、メフェナセットを含む農薬の総使用回数...2回以内	三井化学アグロ(株)
				直播水稲	水田一年生雑草、マツバ、ミズガヤツリ(近畿・中国・四国)	北陸、近畿・中国・四国	埴土～埴土		稲1葉期～ β エ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで		本剤の使用回数...1回、タイムロンを含む農薬の総使用回数...2回以内、ペンシルフロロンメチルを含む農薬の総使用回数...2回以内、メフェナセットを含む農薬の総使用回数...2回以内	
						九州	砂壤土～埴土					
ペンキスラム・ペンタゾン粒剤	ワイドパワー粒剤	3-(2,2-シフロロエトキシ)-N-(5,8-ジメチル[1,2,4]トリアゾロ[1,5-c]ピリミジン-2-イル)- α , α - α -トリフルオロエチル-2-スルホナート...0.12%, 3-イソプロピル-2,1,3-ベンゾチアジン-7-イル(4)-2,2-ジエトキソ...11.0%	粒剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘオモダ(東北)、ヒルムシロ	東北 全域(北海道、東北を除く)の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～埴土	3kg/10a	移植後20日～ β エ5葉期 但し、収穫60日前まで 移植後20日～ β エ4葉期 但し、収穫60日前まで	落水散布又はごく浅く湛水して散布	本剤の使用回数...1回、ペンキスラムを含む農薬の使用回数...2回以内、ペンタゾンを含む農薬の総使用回数...2回以内	北興化学工業(株)、BASF ジャパン(株)
オキサジクロメホン・ジメタトリン・ピラゾスルフロエンチル・ペンジピシクロン水和剤	シリウスターボフロアブル	3-[1-(3,5-シクロフェニル)-1-メチルエチル]-3,4-ジヒドロ-6-メチル-5-フェニル-2H-1,3-オキサジン-4-オン...1.6%, 2-メチルチオ-4-エチルアミノ-6-(1,2-ジメチルアゾビラミド)- α -トルアジン...1.2%, エチル=5-(4,6-ジメチルピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-1-メチルピラゾール-4-カルボキシアート...0.60%, 3-(2-クロロ-4-メチルペンゾイル)-2-フェニルチオピシクロン[3.2.1]オクタ-2-エン-4-オン...4.0%	水和剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ヘオモダが北海道、東北、九州)、ヒルムシロ、セリ(九州を除く)、アオトドロ、藻類による表層はく離(東北を除く)	全域の普通期栽培地帯及び関東・東山・東海、九州の早期栽培地帯	埴土～埴土	500mL/10a	移植後5日～ β エ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	原液湛水散布	本剤の使用回数...1回、オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数...2回以内、ジメタトリンを含む農薬の総使用回数...2回以内、ピラゾスルフロエンチルを含む農薬の総使用回数...1回、ペンジピシクロンを含む農薬の総使用回数...2回以内	日産化学工業(株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	登録会社
カフェンストローロ・ダイムロン・ペンシルフロロンメチル水和剤	MICラクダーHフロアブル	N,N-ジエチル-3-メチルスルホニル-1H-1,2,4-トリアゾール-1-カルボキサミド…5.5%, 1-(α , α -ジメチルベンジル)-3-(パラトリル)尿素…10.0%, メチル= α -(4,6-ジメチルピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)- α -トルアート…1.4%	水和剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバ、オタリ、ウリカ、ミズガヤツリ(東北)、ヒルムシロ、ヘラオモガカ、オモガカ、クログワイ(東北)、セリ、シズイ(東北)、コウキヤグサ(東北)、エゾノササカグサ(北海道)、アミドロ・藻類による表層はく離	北海道	砂壤土～塩土(減水深2cm/日以下、但し砂壤土は減水深1.5cm/日以下)	500mL/10a	移植後3～20日(ビエ2.5葉期まで)	原液湛水散布又は水口施用	本剤の使用回数…1回、カフェンストローロを含む農薬の総使用回数…1回、ダイムロンを含む農薬の総使用回数…3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)、ペンシルフロロンメチルを含む農薬の総使用回数…2回以内	三井化学アグロ
				直播水稲	水田一年生雑草、マツバ、オタリ、ヘラオモガカ	東北	砂壤土～塩土(減水深2cm/日以下)		移植後3～15日(ビエ2.5葉期まで)			
				直播水稲	水田一年生雑草、マツバ、オタリ、ヘラオモガカ		塩土(減水深1.5cm/日以下)		湛水直播の稲1.5葉期～ビエ2.5葉期まで(但し、収穫90日前まで)	原液湛水散布	本剤の使用回数…1回、カフェンストローロを含む農薬の総使用回数…1回、ダイムロンを含む農薬の総使用回数…2回以内、ペンシルフロロンメチルを含む農薬の総使用回数…2回以内	
カフェンストローロ・ダイムロン・プロモブチド・ペンシルフロロンメチル水和剤	MICラクダープロフロアブル	N,N-ジエチル-3-メチルスルホニル-1H-1,2,4-トリアゾール-1-カルボキサミド…5.5%, 1-(α , α -ジメチルベンジル)-3-(パラトリル)尿素…10.0%, (RS)-2-プロモ-N-(α , α -ジメチルベンジル)-3,3-ジメチルプロパルアミド…12.0%, メチル= α -(4,6-ジメチルピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)- α -トルアート…1.0%	水和剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバ、オタリ、ウリカ、ミズガヤツリ、オモガカ、ヒルムシロ(北陸を除く)、クログワイ、セリ(北陸を除く)、アミドロ・藻類による表層はく離(北陸を除く)	全域(北海道、東北を除く)の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～塩土	500mL/10a	移植後3日～ビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	原液湛水散布又は水口施用	本剤の使用回数…1回、カフェンストローロを含む農薬の総使用回数…1回、ダイムロンを含む農薬の総使用回数…3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)、プロモブチドを含む農薬の総使用回数…2回以内、ペンシルフロロンメチルを含む農薬の総使用回数…2回以内	三井化学アグロ
				直播水稲	水田一年生雑草、マツバ、オタリ、ミズガヤツリ、ウリカ、ヒルムシロ、セリ	全域(北海道、東北を除く)			稲1葉期～ビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	原液湛水散布	本剤の使用回数…1回、カフェンストローロを含む農薬の総使用回数…1回、ダイムロンを含む農薬の総使用回数…2回以内、プロモブチドを含む農薬の総使用回数…2回以内、ペンシルフロロンメチルを含む農薬の総使用回数…2回以内	
カルフェントラン・エチル・フルセトスルフロロン粒剤	ベストコンピ1キログラム粒剤	(RS)-エチル=2-クロロ-3-[2-クロロ-5-(4-シフルオメチル-5-オキソ-1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)-4-フルオロフェニル]プロピオナート…0.90%, 1-[3-[(4,6-ジメチルピリミジン-2-イルカルバモイル)スルファモイル]-2-ピリジル]-2-フルオロプロピル=メチルアセート…0.22%	粒剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバ、オタリ、ヘラオモガカ(東北)、ウリカ、クログワイ(北陸、九州を除く)、ヒルムシロ、セリ、コウキヤグサ(関東・東山・東海、九州)	東北	壤土～塩土	1kg/10a	移植後14日～ビエ4葉期 但し、収穫45日前まで	湛水散布	本剤の使用回数…1回、カルフェントラン・エチルを含む農薬の総使用回数…2回以内、フルセトスルフロロンを含む農薬の総使用回数…1回	石原ハイオサイエンス
						関東・東山・東海、九州の普通期及び早期栽培地帯			移植後7日～ビエ3葉期 但し、収穫45日前まで			
						北陸、近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯			移植後7日～ビエ4葉期 但し、収穫45日前まで			

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	登録会社
カフェンストロー・ダイムロン・プロモブチド・ペンスルフロ・メチル水和剤	MICラクタープロアブル	N,N-ジエチル-3-メチルスルホニル-1H-1,2,4-トリアゾール-1-カルボキサミド…5.5%、1-(α , α -ジメチルベンジル)-3-(β -ナトリウム)尿素…10.0%、(RS)-2-プロモ-N-(α , α -ジメチルベンジル)-3,3-ジメチルプロピルアミド…12.0%、メチル- α -(4,6-ジメチルピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-o-トルアート…1.4%	水和剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ネタリイ、ウリカワ、ミズガヤツリ(東北)、ヘラオモダカ、セリ、ヒルムシロ、オモダカ、クワ(東北)、コウキカラ(東北)、エゾノササカグサ(北海道)、シズイ(東北)、アミドロ・藻類による表層は離	北海道、東北	砂壌土～壇土	500mL/10a	移植後3日～ビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	原液澆水散布又は水口施用	本剤の使用回数…1回、カフェンストローを含む農薬の総使用回数…1回、ダイムロンを含む農薬の総使用回数…3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)、プロモブチドを含む農薬の総使用回数…2回以内、ペンスルフロ・メチルを含む農薬の総使用回数…2回以内	三井化学アグリ
				直播水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ネタリイ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		壇土～壇土		稲1葉期～ビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	原液澆水散布	本剤の使用回数…1回、カフェンストローを含む農薬の総使用回数…1回、ダイムロンを含む農薬の総使用回数…2回以内、プロモブチドを含む農薬の総使用回数…2回以内、ペンスルフロ・メチルを含む農薬の総使用回数…2回以内	
フルセトスルフロ・ン水和剤	バックアタックDF	1-[3-[(4,6-ジメチルピリミジン-2-イルカルバモイル)スルファモイル]-2-トリジン]-2-フルオロプロピル=メトキシセタート…10.0%	水和剤	移植水稲	ビエ、ネタリイ、ヘラオモダカ(東北)、ウリカワ、クワ(九州を除く)、ヒルムシロ、コウキカラ(東北、関東・東山・東海、九州)	東北、関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯	砂壌土～壇土	30g/10a、希釈水量100L/10a	移植後14日～ビエ4葉期(イネ4葉期～幼穂形成期前)但し収穫60日前まで	落水散布又はごく浅く湛水して散布	本剤の使用回数…1回、フルセトスルフロを含む農薬の総使用回数…1回	石原産業
						北陸、近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯	壇土～壇土		移植後14日～ビエ4葉期(イネ4葉期～幼穂形成期前)但し収穫60日前まで			
				直播水稲	ビエ	全域(北海道、九州を除く)			乾田直播のイネ2葉期(入水前)但し収穫60日前まで			
フルセトスルフロ・ン水和剤	アンカーマンDF	1-[3-[(4,6-ジメチルピリミジン-2-イルカルバモイル)スルファモイル]-2-トリジン]-2-フルオロプロピル=メトキシセタート…0.30%、3-イソプロピル-2,1,3-ベンゾチアジン-4(2,2-ジメチル)-ナトリウム塩…20.0%	水和剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ネタリイ、ヘラオモダカ(東北)、ミズガヤツリ、ウリカワ、クワ(九州を除く)、オモダカ(九州を除く)、ヒルムシロ、セリ、コウキカラ(東北、関東・東山・東海、九州)	東北、北陸	壇土～壇土	1000g/10a、希釈水量100L/10a	移植後14日～ビエ4葉期(イネ4葉期～幼穂形成期前)但し収穫60日前まで	落水散布又はごく浅く湛水して散布	本剤の使用回数…1回、フルセトスルフロを含む農薬の総使用回数…1回、ペンタゾンを含む農薬の総使用回数…2回以内	石原産業、BASFジャパン(株)
						関東・東山・東海、近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯	砂壌土～壇土					
						九州の普通期及び早期栽培地帯	壇土～壇土		移植後14日～ビエ4葉期(イネ4葉期～幼穂形成期前)但し収穫60日前まで			

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	登録会社
カフエントロール・ダイムロン・ピラゾキシフェン・ベンゾビシクロン粒剤	トビキリ1キロ粒剤	N,N-ジエチル-3-メチルスルホニル-1H-1,2,4-トリアゾール-1-カルボキサミド・・・2.1%, 1-(α , α -ジメチルベンジル)-3-(ハートリル)尿素・・・4.2%, 2-[4-(2,4-ジクロロベンゾイル)-5-イルオキシ]アセトフェノン・・・10.0%, 3-(2-クロロ-4-メチルベンゾイル)-2-フェニルチオビシクロ[3.2.1]オクタ-2-エン-4-オン・・・2.0%	粒剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバ、オタロイ、ヘラオモダカ(北海道、東北)、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ウリカワ(関東・東山・東海を除く)、ヒルムシロ、アオシロ・藻類による表層はく離(関東・東山・東海)	東北、北陸	砂壤土～埴土	1kg/10a	移植後3日～バエ2葉期 但し移植後30日まで	湛水散布	本剤の使用回数・・・1回、カフエントロールを含む農薬の総使用回数・・・1回、ダイムロンを含む農薬の総使用回数・・・3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)、ピラゾキシフェンを含む農薬の総使用回数・・・2回以内、ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数・・・2回以内	石原産業㈱
ピラゾキシフェン・ベンゾビシクロン粒剤	ブレキー1キロ粒剤	2-[4-(2,4-ジクロロベンゾイル)-1,3-ジメチルピラゾール-5-イルオキシ]アセトフェノン・・・10.0%, 3-(2-クロロ-4-メチルベンゾイル)-2-フェニルチオビシクロ[3.2.1]オクタ-2-エン-4-オン・・・2.0%	粒剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバ、オタロイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ	東北	埴土～埴土	1kg/10a	移植後～移植4日前または移植直後～バエ1葉期 但し移植後30日まで	湛水散布	本剤の使用回数・・・1回、ピラゾキシフェンを含む農薬の総使用回数・・・2回以内、ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数・・・2回以内	石原産業㈱
インダノファン・ピラゾスルフロニエチル・ベンゾビシクロン粒剤	ゲキハ1キロ粒剤	(RS)-2-[2-(3-クロロフェニル)-2,3-エポキシプロピル]-2-エチルピラゾール-1,3-ジオン・・・1.2%, エチル=5-(4,6-ジメチルピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-1-メチルピラゾール-4-カルボキシアト・・・0.30%, 3-(2-クロロ-4-メチルベンゾイル)-2-フェニルチオビシクロ[3.2.1]オクタ-2-エン-4-オン・・・2.0%	粒剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバ、オタロイ、ウリカワ、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ヘラオモダカ(北海道)、ヒルムシロ、セリ、クロクワイ(北海道を除く)、オモダカ・アオシロ・藻類による表層はく離(北陸を除く)	全域(九州を除く)の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～埴土	1kg/10a	移植後5日～バエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	湛水散布	本剤の使用回数・・・1回、インダノファンを含む農薬の総使用回数・・・2回以内、ピラゾスルフロニエチルを含む農薬の総使用回数・・・1回、ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数・・・2回以内	大塚化学㈱
ピリミノバックメチル剤	ヒエクリン豆つぶ250	メチル=2-(4,6-ジメチルピリミジン-2-イルオキシ)-6-(1-メチルイミダゾール)ベンゾエト・・・4.8%	粒剤	移植水稲	バエ	東北、北陸	砂壤土～埴土	250g/10a	移植15日後～バエ4葉期 但し、収穫45日前まで	湛水散布又は湛水周縁散布	本剤の使用回数・・・1回、ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数・・・2回以内	クアイ化学工業㈱
クミルロン・ペンシルフロメチル・ベントキサゾン水和剤	石原ドウジガードフロアブル	1-(2-クロロベンジル)-3-(1-メチル-1-フェニルエチル)ウレア・・・22.1%, メチル= α -(4,6-ジメチルピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-オトルアト・・・1.4%, 3-(4-クロロ-5-シクロペンチルオキシ)-2-フルオロフェニル)-5-イソプロピリデン-1,3-オキサゾリジン-2,4-ジオン・・・7.2%	水和剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバ、オタロイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ(東北)、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオシロ・藻類による表層はく離(東北)	北海道	埴土～埴土	500mL/10a	移植直後～バエ1.5葉期 但し、移植後30日まで	原液湛水散布	本剤の使用回数・・・1回、クミルロンを含む農薬の総使用回数・・・2回以内、ペンシルフロメチルを含む農薬の総使用回数・・・2回以内、ベントキサゾンを含む農薬の総使用回数・・・2回以内	石原産業㈱、科研製薬㈱、丸紅㈱
クミルロン・ペンシルフロメチル・ベントキサゾン水和剤	石原ドウジガードフロアブル	1-(2-クロロベンジル)-3-(1-メチル-1-フェニルエチル)ウレア・・・22.1%, メチル= α -(4,6-ジメチルピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-オトルアト・・・0.94%, 3-(4-クロロ-5-シクロペンチルオキシ)-2-フルオロフェニル)-5-イソプロピリデン-1,3-オキサゾリジン-2,4-ジオン・・・7.2%	水和剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバ、オタロイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオシロ・藻類による表層はく離(北陸を除く)	全域(北海道、東北を除く)の普通期栽培地帯及び関東・東山・東海、九州の早期栽培地帯	埴土～埴土	500mL/10a	移植直後～バエ1.5葉期 但し、移植後30日まで	原液湛水散布	本剤の使用回数・・・1回、クミルロンを含む農薬の総使用回数・・・2回以内、ペンシルフロメチルを含む農薬の総使用回数・・・2回以内、ベントキサゾンを含む農薬の総使用回数・・・2回以内	石原産業㈱、科研製薬㈱、丸紅㈱

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	登録会社
デフリトリオン粒剤	ホクコーマイティワン1キロ粒剤	2-[2-クロロ-4-メシル-3-[(テトラヒドロフラン-2-イルメトキシ)メチル]ベンゾイル]シクロヘキサン-1,3-ジオン...3.0%	粒剤 移植水稲	水田一年生雑草(イネ科雑草を除く)、マツバ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ	関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯	壤土～壇土		1kg/10a	移植後15～30日まで	湛水散布	本剤の使用回数...1回、デフリトリオンを含む農薬の総使用回数...2回以内	北興化学工業㈱、全国農業協同組合連合会、ハイエルクロップサイエンス㈱
オキサジクロメホン・デフリトリオン粒剤	ホクコーエーワン1キロ粒剤	3-[1-(3,5-ジクロロフェニル)-1-メチルエチル]-3,4-ジヒドロ-6-メチル-5-フェニル-2H-1,3-オキサジン-4-オン...0.80%、2-[2-クロロ-4-メシル-3-[(テトラヒドロフラン-2-イルメトキシ)メチル]ベンゾイル]シクロヘキサン-1,3-ジオン...3.0%	粒剤 移植水稲	水田一年生雑草、マツバ、ホタルイ、ヘラオモダカ(北海道、東北)、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ウリカワ、ヒルムシロ(近畿・中国・四国を除く)、セリ(九州を除く)、クロクワイ(九州)、オモダカ(関東・東山・東海)	北海道、近畿・中国・四国、九州の普通期及び早期栽培地帯 東北、北陸、関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～壇土 壇土～壇土		1kg/10a	移植後5日～バエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	湛水散布	本剤の使用回数...1回、オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数...2回以内、デフリトリオンを含む農薬の総使用回数...2回以内	北興化学工業㈱、全国農業協同組合連合会
オキサジクロメホン・デフリトリオン粒剤	ホクコーエーワンジャンボ	3-[1-(3,5-ジクロロフェニル)-1-メチルエチル]-3,4-ジヒドロ-6-メチル-5-フェニル-2H-1,3-オキサジン-4-オン...2.0%、2-[2-クロロ-4-メシル-3-[(テトラヒドロフラン-2-イルメトキシ)メチル]ベンゾイル]シクロヘキサン-1,3-ジオン...10.0%	粒剤 移植水稲	水田一年生雑草、マツバ、ホタルイ、ヘラオモダカ(北海道)、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ(北陸、九州を除く)	全域の普通期及び早期栽培地帯	壇土～壇土		小包装(パック)10個(300g)/10a	移植後5日～バエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。	本剤の使用回数...1回、オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数...2回以内、デフリトリオンを含む農薬の総使用回数...2回以内	北興化学工業㈱、全国農業協同組合連合会
オキサジクロメホン・デフリトリオン水和剤	ホクコーエーワンフロアブル	3-[1-(3,5-ジクロロフェニル)-1-メチルエチル]-3,4-ジヒドロ-6-メチル-5-フェニル-2H-1,3-オキサジン-4-オン...1.2%、2-[2-クロロ-4-メシル-3-[(テトラヒドロフラン-2-イルメトキシ)メチル]ベンゾイル]シクロヘキサン-1,3-ジオン...6.0%	水和剤 移植水稲	水田一年生雑草、マツバ、ホタルイ、ヘラオモダカ(北海道、東北)、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ(北陸、九州を除く)	全域の普通期及び早期栽培地帯	壇土～壇土		500mL/10a	移植後5日～バエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	原液湛水散布	本剤の使用回数...1回、オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数...2回以内、デフリトリオンを含む農薬の総使用回数...2回以内	北興化学工業㈱、全国農業協同組合連合会
デフリトリオン・フェントラザミド粒剤	ボデーガード1キロ粒剤	2-[2-クロロ-4-メシル-3-[(テトラヒドロフラン-2-イルメトキシ)メチル]ベンゾイル]シクロヘキサン-1,3-ジオン...3.0%、4-(2-クロロフェニル)-N-シクロヘキシル-N-エチル-4,5-ジヒドロ-5-オキソ-1H-テトラゾール-1-カルボキサン...3.0%	粒剤 移植水稲	水田一年生雑草、マツバ、ホタルイ、ヘラオモダカ(北海道、東北)、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ(九州を除く)、クロクワイ(東北)、オモダカ(東北)	北海道、九州の普通期及び早期栽培地帯 全域(北海道、九州を除く)の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～壇土 壇土～壇土		1kg/10a	移植後5日～バエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	湛水散布	本剤の使用回数...1回、デフリトリオンを含む農薬の総使用回数...2回以内、フェントラザミドを含む農薬の総使用回数...1回	ハイエルクロップサイエンス㈱
デフリトリオン・メフェナセツト粒剤	ボッシンブル1キロ粒剤	2-[2-クロロ-4-メシル-3-[(テトラヒドロフラン-2-イルメトキシ)メチル]ベンゾイル]シクロヘキサン-1,3-ジオン...3.0%、2-ヘンゾチアゾール-2-イルオキシ-N-メチルアセトアニド...12.0%	粒剤 移植水稲	水田一年生雑草、マツバ、ホタルイ、ヘラオモダカ(北海道、東北)、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ウリカワ(東北を除く)、ヒルムシロ(北陸を除く)、セリ(九州を除く)、クロクワイ(東北)、オモダカ(東北)	北海道、九州の普通期及び早期栽培地帯 東北、関東・東山・東海、近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～壇土 壇土～壇土		1kg/10a	移植後5日～バエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	湛水散布	本剤の使用回数...1回、デフリトリオンを含む農薬の総使用回数...2回以内、メフェナセツトを含む農薬の総使用回数...2回以内	ハイエルクロップサイエンス㈱

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	登録会社
デフリトリオン・メフェナセット水和剤	ボッシュブルプロアブル	2-[2-クロロ-4-メシル-3-[[[テトラヒドロフラン-2-イルメトキシ]メチル]ベンゾイル]シクロヘキサン-1,3-ジオン...5.5%, 2-ベンゾチアゾール-2-イルオキシ-N-メチルアセトアミド...18.3%	水和剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘオモダカ(北海道、東北)、ミスカヤツ(北海道を除く)、ウリカワ、クログワイ(東北)、オモダカ(北海道、東北)、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤスカガサ(北海道)	全域(関東・東山・東海を除く)の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～塩土	500mL/10a	移植後5日～ヒエ3葉期 但し、移植後30日まで	原液湛水散布	本剤の使用回数...1回、デフリトリオンを含む農薬の総使用回数...2回以内、メフェナセットを含む農薬の総使用回数...2回以内	ハイエルクロップサイエンス㈱
デフリトリオン・メフェナセット粒剤	ボッシュブルジャンボ	2-[2-クロロ-4-メシル-3-[[[テトラヒドロフラン-2-イルメトキシ]メチル]ベンゾイル]シクロヘキサン-1,3-ジオン...6.0%, 2-ベンゾチアゾール-2-イルオキシ-N-メチルアセトアミド...20.0%	粒剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘオモダカ(北海道、東北)、ミスカヤツ(北海道を除く)、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ	北海道、近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯	塩土～塩土	小包装(パック)10個(500g)/10a	移植後5日～ヒエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。	本剤の使用回数...1回、デフリトリオンを含む農薬の総使用回数...2回以内、メフェナセットを含む農薬の総使用回数...2回以内	ハイエルクロップサイエンス㈱
デフリトリオン・フェントラザミド水和剤	ボデーガードフロアブル	2-[2-クロロ-4-メシル-3-[[[テトラヒドロフラン-2-イルメトキシ]メチル]ベンゾイル]シクロヘキサン-1,3-ジオン...5.8%, 4-(2-クロロフェニル)-N-シクロヘキシル-N-エチル-4,5-ジヒドロ-5-オキソ-1H-テトラゾール-1-カルボキサミド...5.8%	水和剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘオモダカ(北海道、東北)、ミスカヤツ(北海道を除く)、ウリカワ、クログワイ(東北)、オモダカ(北海道、東北)、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤスカガサ(北海道)	全域(関東・東山・東海、近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯)	砂壤土～塩土	500mL/10a	移植後5日～ヒエ3葉期 但し、移植後30日まで	原液湛水散布	本剤の使用回数...1回、デフリトリオンを含む農薬の総使用回数...2回以内、フェントラザミドを含む農薬の総使用回数...1回	ハイエルクロップサイエンス㈱
デフリトリオン・フェントラザミド粒剤	ボデーガードジャンボ	2-[2-クロロ-4-メシル-3-[[[テトラヒドロフラン-2-イルメトキシ]メチル]ベンゾイル]シクロヘキサン-1,3-ジオン...7.5%, 4-(2-クロロフェニル)-N-シクロヘキシル-N-エチル-4,5-ジヒドロ-5-オキソ-1H-テトラゾール-1-カルボキサミド...7.5%	粒剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘオモダカ(北海道、東北)、ミスカヤツ(北海道を除く)、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ	北海道、九州の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～塩土	小包装(パック)10個(400g)/10a	移植後5日～ヒエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。	本剤の使用回数...1回、デフリトリオンを含む農薬の総使用回数...2回以内、フェントラザミドを含む農薬の総使用回数...1回	ハイエルクロップサイエンス㈱
デフリトリオン・ピラクロニル粒剤	ゲットスター1キロ粒剤	2-[2-クロロ-4-メシル-3-[[[テトラヒドロフラン-2-イルメトキシ]メチル]ベンゾイル]シクロヘキサン-1,3-ジオン...3.0%, 1-(3-クロロ-4,5,6,7-テトラヒドロビラゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル)-5-[メチル(プロパ-2-イル)アミノ]ビラゾール-4-カルボニトリル...1.8%	粒剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスカヤツ(北海道を除く)、ヘオモダカ(北海道、東北)、ヒルムシロ、セリ	全域(東北を除く)の普通期及び早期栽培地帯	塩土～塩土	1kg/10a	移植後5日～ヒエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	湛水散布	本剤の使用回数...1回、デフリトリオンを含む農薬の総使用回数...2回以内、ピラクロニルを含む農薬の総使用回数...2回以内	日産化学工業㈱
デフリトリオン・ピラクロニル水和剤	ゲットスターフロアブル	2-[2-クロロ-4-メシル-3-[[[テトラヒドロフラン-2-イルメトキシ]メチル]ベンゾイル]シクロヘキサン-1,3-ジオン...6.0%, 1-(3-クロロ-4,5,6,7-テトラヒドロビラゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル)-5-[メチル(プロパ-2-イル)アミノ]ビラゾール-4-カルボニトリル...3.6%	水和剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスカヤツ(北海道を除く)、ヘオモダカ(北海道、東北)、ヒルムシロ、セリ(北陸を除く)	全域(東北を除く)の普通期及び早期栽培地帯	塩土～塩土	500mL/10a	移植後5日～ヒエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	原液湛水散布	本剤の使用回数...1回、デフリトリオンを含む農薬の総使用回数...2回以内、ピラクロニルを含む農薬の総使用回数...2回以内	日産化学工業㈱

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名	適用雑草	適用地域	適用土壌	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	登録会社
カルフェントラゾンエチル・フルセトスルフロン水和剤	ハードパンチDF	(RS)-エチル-2-クロロ-3-[2-クロロ-5-(4-シフルオロメチル-5-オキソ-1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)-4-フルオロフェニル]プロピオナート...20.0%, 1-[3-[(4,6-ジメチルピリミジン-2-イル)カルバモイル]スルファモイル]-2-ピリジール-2-フルオロプロピル=トキシアセタート...10.0%	水和剤	直播水稻	パエ	全域(北海道、九州を除く)	壤土～埴土	30g/10a、希釈水量100L/10a	乾田直播のイネ2葉期～パエ5葉期(入水前)但し収穫60日前まで	乾田状態で雑草茎葉散布	本剤の使用回数...1回、カルフェントラゾンエチルを含む農薬の総使用回数...2回以内、フルセトスルフロンを含む農薬の総使用回数...1回	石原産業㈱
カフェンストロール・カルフェントラゾンエチル・フルセトスルフロン・ベンゾビシクロン粒剤	フルイニング1キロ粒剤	N,N-ジエチル-3-メチルスルホニル-1H-1,2,4-トリアゾール-1-カルボキサミド...2.1%, (RS)-エチル-2-クロロ-3-[2-クロロ-5-(4-シフルオロメチル-5-オキソ-1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)-4-フルオロフェニル]プロピオナート...0.90%, 1-[3-[(4,6-ジメチルピリミジン-2-イル)カルバモイル]スルファモイル]-2-ピリジール-2-フルオロプロピル=トキシアセタート...0.22%, 3-(2-クロロ-4-メチルベンゾイル)-2-フルオロチオピリジン[3.2.1]オクサ-2-エン-4-オン...2.0%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ(北海道、東北)、ミズガヤツ(北海道、東北を除く)、ウリカワ(関東・東山・東海を除く)、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離(九州)	東北、北陸 北海道、関東・東山・東海、近畿・中国、四国の普通期及び九州の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～埴土 埴土～埴土	1kg/10a	移植後7日～パエ4葉期但し移植後30日まで 移植後7日～パエ3葉期但し移植後30日まで	落水散布	本剤の使用回数...1回、カフェンストロールを含む農薬の総使用回数...1回、カルフェントラゾンエチルを含む農薬の総使用回数...2回以内、フルセトスルフロンを含む農薬の総使用回数...1回、ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数...2回以内	石原産業㈱、石原バイオサイエンス㈱

農から生まれる笑顔の連鎖



NEW 石原の水稻除草剤

スウダチ® 1キロ粒剤

フルチャージ® 1キロ粒剤・ジャンボ

フルフォース® 1キロ粒剤

ナイスミドル® 1キロ粒剤

トビキリ ジャンボ

コンオールS 1キロ粒剤

グラスジンM ナトリウム

ワンベストフロアブル

キングダム フロアブル 1フロアブル

2,4-D剤/MCP剤

安全な農薬の使用をお願いします
使用法、注意、保管、廃棄方法
石原は「食の安全」を大切にします



石原産業株式会社
石原バイオサイエンス株式会社

〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目10番30号

ホームページアドレス <http://www.iskweb.co.jp/ibj/>

原稿(水稲以外)

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稲刈跡・畑作・野菜作・永年作物・非農耕地対象

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場所・ 適用土壌	使用量・ 散布液量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	会社名
エトキシス ルフロ ン水和 剤	MICグ ラッチェ 顆粒水和 剤	1-(4,6-ジメキシヒ ジン-2-イル)-3-(2-エ トキシフェノキシ)ホル 尿素…60.0%	水和 剤	日本芝	一年生 広葉雑 草	-	-	15～ 30g/10a、希 釈水量200～ 300L/10a	雑草発生前 (芝生育期)	散布	本剤の使用回数… 3回以内、エトキシス ルフロンを含む農 薬の総使用回数… 3回以内	三井化 学アグロ バ
					一年生 広葉雑 草、多 年生広 葉雑草			30～ 60g/10a、希 釈水量200～ 300L/10a	雑草生育初 期(3葉期ま で)(芝生育 期)			
					ヒメクダ、 ハマスゲ			45～ 75g/10a、希 釈水量200～ 300L/10a				
				西洋芝 (ベントグ ラス)、西洋 芝(ブルー グラス)	一年生 及び多 年生広 葉雑草			30～ 60g/10a、希 釈水量200～ 300L/10a				
					ヒメクダ、 ハマスゲ			45～ 75g/10a、希 釈水量200～ 300L/10a				
メスルフ ロンメチ ル水和 剤	サーベル DF	メチル-2-[3-(4-メキシ -6-メチル-1,3,5-トリア ジン-2-イル)クレイドスル ホル]ベンゾアト… 60.0%	水和 剤	日本芝	一年生 及び多 年生広 葉雑草	-	-	2～4g/10a、 希釈水量150 ～200L/10a	秋冬期雑草 発生始期～ 生育初期	雑草茎葉 散布	本剤の使用回数… 2回以内、メスルフ ロンメチルを含む農 薬の総使用回数… 2回以内	丸和バ イオ(株)、 デュボン (株)
				西洋芝 (ハレニアル ライグ ラス)、西洋 芝(ケンタ ッキーブ ルーグ ラス)				1～2g/10a、 希釈水量 200L/10a	秋冬期雑草 発生始期			
				樹木等		公園、庭園、 堤とう、駐車 場、道路、運 動場、宅地、 鉄道、のり 面等		5～10g/10a、 希釈水量100 ～150L/10a	雑草生育初 期	植栽地を除 く樹木等の 周辺地に雑 草茎葉散 布		
フルアジ ホップP・ DCMU・ 2,4-P A粒剤	ロングビ ーターA粒 剤	ブチル(R)-2-[4-(5- トリフルオロメチル-2-ヒ ジロキシ)フェノキシ]プ ロピオナート…2.4%、3- (3,4-ジクロロフェニル)- 1,1-ジメチル尿素… 4.8%、2,4-ジクロロフェ ニル酢酸ナトリウム水 化物…6.0%	粒 剤	樹木等	一年生 雑草、ス キナ	-	公園、庭園、 堤とう、駐車 場、道路、運 動場、宅地、 のり面、鉄 道等	7.5～ 15kg/10a	雑草発生前 ～生育初期 (草丈20cm 以下)	植栽地を除 く樹木等の 周辺地に全 面均一散 布	本剤の使用回数… 3回以内、フルアジ ホップPを含む農薬 の総使用回数…3 回以内、DCMUを 含む農薬の総使用 回数…3回以内、2, 4-P Aを含む農薬 の総使用回数…3 回以内	石原産 業(株)
					多年生 雑草			15～ 25kg/10a				
グリホ サートカリ ウム塩・M DBAカリ ウム塩液 剤	ダブルク ラッチ液 剤	カリウムN-(ホスホメチ ル)グリシナート… 25.0%、2-メキシ 3,6-ジクロロ安息香 酸カリウム…25.0%	液 剤	樹木等	一年生 雑草、 多年生 雑草	-	公園、庭園、 堤とう、駐車 場、道路、運 動場、宅地、 のり面、鉄 道等	1000～ 2000mL/10a、 希釈水量 100L/10a	雑草生育期	植栽地を除 く樹木等の 周辺地に雑 草茎葉散 布	本剤の使用回数… 3回以内、グリホ サートを含む農薬 の総使用回数…3 回以内、MDBAを 含む農薬の総使用 回数…3回以内	シンジェ ンタジャ バ(株)
グリホ サートカリ ウム塩・M DBAカリ ウム塩液 剤	除草王 シャワー S	カリウムN-(ホスホメチ ル)グリシナート…1.0%、 2-メキシ3,6-ジクロ ロ安息香酸カリウム… 1.0%	液 剤	樹木等	一年生 雑草、 多年生 雑草	-	公園、庭園、 堤とう、駐車 場、道路、運 動場、宅地、 のり面、鉄 道等	25～ 50mL/m ² (原 液散布)	雑草生育期 (草丈30cm 以下)	植栽地を除 く樹木等の 周辺地に雑 草茎葉散 布	本剤の使用回数… 3回以内、グリホ サートを含む農薬 の総使用回数…3 回以内、MDBAを 含む農薬の総使用 回数…3回以内	シンジェ ンタジャ バ(株)

原稿(水稲以外)

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場所・ 適用土壌	使用量・ 散布液量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	会社名
ターパシ ル水和剤	シンパー	3-(ターシャリーフチル-5- クロロ-6-メチルウラ シル...80.0%	水 和 剤	かんきつ	一年生 雑草	-	-	200～ 300g/10a、希 釈水量150～ 300L/10a	雑草発生前 及び雑草生 育期 但し、 収穫7日前ま で	土壌全面 散布	本剤の使用回数... 2回以内、ターパシ ルを含む農薬の総 使用回数...2回以 内	丸和パ イオ
				りんご (成木)				200～ 300g/10a、希 釈水量100～ 300L/10a		雑草茎葉 散布		
								5～10g/10a、 希釈水量100 ～150L/10a	雑草生育期 但し、収穫90 日前まで		本剤の使用回数... 1回、ターパシルを 含む農薬の総使用 回数...1回	
インウロ ン・DCB N・DCM U粒剤	Kワイド ウェイ粒 剤	3-(5-ターシャリーフチル -3-イソオキシソリル)- 1,1-ジメチル尿素... 1.0%、2,6-シクロオチオ ペンザミド...3.0%、3- (3,4-シクロプロフェニル)- 1,1-ジメチル尿素... 6.0%	粒 剤	樹木等	一年生 雑草、 多年生 広葉雑 草、スキ ナ	-	公園、庭園、 駐車場、道 路、運動場、 宅地、鉄道 等	10～ 20kg/10a	雑草発生前 ～生育初期	植栽地を除 く樹木等の 周辺地に全 面土壌散 布	本剤の使用回数... 3回以内、インウロ ンを含む農薬の総使 用回数...3回以内、 DCBNを含む農薬 の総使用回数...3 回以内、DCMUを 含む農薬の総使用 回数...3回以内	関白元
クレトジ ム乳剤	セレクト乳 剤	(±)-(2E)-[1-(3-クロ ロアリロキシイミノ)プロピ ル]-5-(2-エチルチオプロ ピル)-3-ヒドロキシシ ロヘキサ-2-エノン... 24.0%	乳 剤	あずき	一年生 イネ科雑 草(スズメ ノカタビラ を除く)	-	-	35～ 50mL/10a、希 釈水量 100L/10a	雑草生育期 (イネ科雑草3 ～5葉期)収 穫45日前ま で	雑草茎葉 散布	本剤の使用回数... 1回、クレトジムを含 む農薬の総使用回 数...1回	アリス タ イ フ サ エ ン ス
				いんげ んまめ	一年生 イネ科雑 草(スズメ ノカタビラ を除く)			50～ 75mL/10a、希 釈水量 100L/10a	雑草生育期 (イネ科雑草3 ～5葉期)収 穫60日前ま で			
				だいず	一年生 イネ科雑 草(スズメ ノカタビラ を除く)			50～ 75mL/10a、希 釈水量 100L/10a	雑草生育期 (イネ科雑草3 ～5葉期)収 穫50日前ま で			
				てんさい	一年生 イネ科雑 草(スズメ ノカタビラ を除く)			50～ 75mL/10a、希 釈水量 100L/10a	雑草生育期 (イネ科雑草3 ～5葉期)収 穫30日前ま で		本剤の使用回数... 2回以内、クレトジ ムを含む農薬の総使 用回数...2回以内	
				かんしよ	一年生 イネ科雑 草			50～ 75mL/10a、希 釈水量 100L/10a	雑草生育期 (イネ科雑草3 ～5葉期)収 穫100日前ま で		本剤の使用回数... 1回、クレトジムを含 む農薬の総使用回 数...1回	

原稿(水稲以外)

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場所・ 適用土壌	使用量・ 散布液量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	会社名
クレトジム 乳剤 つづき	セレクト乳 剤	(±)-(2E)-[1-(3-クロ ロアリロキシミノ)プロピ ル]-5-(2-エチルチオプ ロピル)-3-ヒドロキシシ クロヘキサ-2-エノン… 24.0%	乳 剤	キャベツ	一年生 イネ科雑 草	-	-	50～ 75mL/10a、希 釈水量 100L/10a	雑草生育期 (イネ科雑草3 ～5葉期)収 穫30日前ま で 雑草生育期 (イネ科雑草3 ～5葉期)収 穫40日前ま で 雑草生育期 (イネ科雑草3 ～5葉期)収 穫30日前ま で	雑草茎葉 散布	本剤の使用回数… 1回、クレトジムを含 む農薬の総使用回 数…1回 本剤の使用回数… 3回以内、クレトジム を含む農薬の総使 用回数…3回以内 本剤の使用回数… 1回、クレトジムを含 む農薬の総使用回 数…1回 本剤の使用回数… 2回以内、クレトジム を含む農薬の総使 用回数…2回以内	アリス タ イ フ サ イ ン ス 関
デスメディ ファム・ フェンメ ディファ ム・メトラ クロール 乳剤	ホクサン ベタダイ ヤA乳剤	エチル=3-フェニルカルバ モイルオキシカルバニラ ト…2.3%、3-メトキシカ ルボニル7-メチルフェニル N-(3'-メチルフェニル) カーバメート…10.0%、 2-クロロ-2'-エチルN- (2'-メキシ-1-メチルエチ ル)-6'-メチルアセトアニリ ド…12.0%	乳 剤	てんさい (移植栽 培)	畑地一 年生雑 草	北海 道	全土壌(砂 土を除く)	500mL/10a、 希釈水量50 ～100L/10a	移植活着後 の雑草発生 揃期(但し、 収穫90日前 まで)	散布	本剤の使用回数… 1回、デスメディファ ムを含む農薬の総 使用回数…2回以 内、フェンメディファ ムを含む農薬の総 使用回数…3回以 内、メトラクロールを 含む農薬の総使用 回数…1回	北海三 共働
グリホ サートイン プロピル アミン塩 液剤	ホクサン クサトリキ ング	イソプロピルアンモニウム =N-(ホスホノメチル)グリ シナート…41.0%	液 剤	果樹類 (クワイ フルーツ、パ イナップル を除く)	一年生 雑草	-	-	250～ 500mL/10a、 希釈水量:通 常散布50～ 100L/10a、少 量散布25～ 50L/10a	収穫7日前ま で(雑草生育 期:草丈 30cm以下)	雑草茎葉 散布	本剤の使用回数… 3回以内、グリホ サートを含む農薬 の総使用回数…3 回以内	北海三 共働
					多年生 雑草			500～ 1000mL/10a、 希釈水量:通 常散布50～ 100L/10a、少 量散布25～ 50L/10a				
				豆類(種 実、ただ し、だい ず、らっ かせいを 除く)	一年生 雑草			250～ 500mL/10a、 希釈水量:通 常散布50～ 100L/10a、少 量散布25～ 50L/10a	は種10日以 前(雑草生育 期)		本剤の使用回数… 2回以内、グリホ サートを含む農薬 の総使用回数…2 回以内	
				だいず					は種後出芽 前まで(雑草 生育期:草丈 30cm以下)			
				えだまめ					は種7日前ま で(雑草生育 期)		本剤の使用回数… 1回、グリホサート を含む農薬の総使 用回数…3回以内	

原稿(水稲以外)

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場所・ 適用土壌	使用量・ 散布液量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	会社名
グリホ サートイン プロピル アミン塩 液剤 つづき	ホクサン クサトリキ ング	イソプロピルアンモニウム =N-(ホスホノメチル)グリ シナート…41.0%	液 剤	小麦	多年生 イネ科雑 草、一 年生雑 草	—	—	250～ 500mL/10a、 希釈水量25 ～100L/10a	耕起前まで (雑草生育 期:草丈 30cm以下)	雑草茎葉 散布	本剤の使用回数… 1回、グリホサートを含 む農薬の総使用 回数…1回	北海三 共栄
					一年生 雑草				は種7日以 前又はは種 後出芽前(雑 草生育期)			
					多年生 雑草			500～ 1000mL/10a、 希釈水量 100L/10a	耕起7日前ま で(雑草生育 期:草丈 30cm以下)			
					麦類(小 麦を除く)、キャベ ツ			250～ 500mL/10a、 希釈水量 100L/10a	耕起7日前ま で(雑草生育 期)			
					はくさい			250～ 500mL/10a、 希釈水量:通 常散布50～ 100L/10a、少 量散布25～ 50L/10a				
					だいこ ん、はつ かだいこ ん			250～ 500mL/10a、 希釈水量 100L/10a				
					ねぎ、た まねぎ			250～ 500mL/10a、 希釈水量:通 常散布50～ 100L/10a、少 量散布25～ 50L/10a	定植後畦間 処理 但し、 収穫30日前 まで(雑草生 育期)		本剤の使用回数… 3回以内、グリホ サートを含む農薬 の総使用回数…3 回以内	
					水田作 物(水稲 を除く)、移植水 稲			250～ 500mL/10a、 希釈水量 100L/10a	耕起20～10 日前(雑草生 育期)		本剤の使用回数… 1回、グリホサートを含 む農薬の総使用 回数…1回	
					直播水 稲						本剤の使用回数… 1回、グリホサートを含 む農薬の総使用 回数…耕起栽培は 2回以内(耕起前は1 回以内)乾田不耕起 栽培は2回以内	
					水田作 物(水田 刈跡)		水田刈跡	250～ 500mL/10a、 希釈水量25 ～100L/10a	雑草生育期		本剤の使用回数… 1回、グリホサートを含 む農薬の総使用 回数…1回	
					多年生 雑草			500～ 1000mL/10a、 希釈水量25 ～100L/10a				

原稿(水稲以外)

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場所・ 適用土壌	使用量・ 散布液量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	会社名	
グリホ サートイン プロピル アミン塩 液剤 つづき	ホクサン クサトリキ ング	イソプロピルアンモニウム =N-(ホスホノメチル)グリ ホサート…41.0%	液 剤	水田作 物(水田 畦畔)	一年生 雑草	-	水田畦畔	250～ 500mL/10a、 希釈水量:通 常散布 100L/10a、少 量散布 25L/10a	収穫14日前 まで(雑草生 育期:草丈 30cm以下)	雑草茎葉 散布	本剤の使用回数… 2回以内、グリホ サートを含む農薬 の総使用回数…2 回以内	北海三 共興	
					多年生 雑草			500～ 1000mL/10a、 希釈水量:通 常散布 100L/10a、少 量散布 25L/10a					
				水田作 物、畑作 物(休耕 田)	一年生 雑草		休耕田	250～ 500mL/10a、 希釈水量:通 常散布50～ 100L/10a、少 量散布25～ 50L/10a	雑草生育期 (草丈50cm 以下)	本剤の使用回数… 1回、グリホサート を含む農薬の総使用 回数…2回以内			
					牧草			牧野、草地 (更新・造 成)			250～ 500mL/10a、 希釈水量 50L/10a		更新・造成の 10日以前(雑 草生育期)
											500～ 1000mL/10a、 希釈水量 50L/10a		
				一年生 及び多 年生雑 草	250～ 500mL/10a、 希釈水量:少 量散布25～ 50L/10a		は種10日前 ～は種当日 (耕起整地 後:雑草発生 掘期)						
				樹木等	一年生 雑草		公園、庭園、 堤とう、駐車 場、道路、運 動場、宅地、 鉄道、のり 面等	500mL/10a、 希釈水量:通 常散布 100L/10a、少 量散布 25L/10a	雑草生育期	植栽地を除 く樹木等の 周辺地に雑 草茎葉散 布	本剤の使用回数… 3回以内、グリホ サートを含む農薬 の総使用回数…3 回以内		
					多年生 雑草			1000mL/10a、 希釈水量:通 常散布 100L/10a、少 量散布 25L/10a					
					スギナ			2000mL/10a、 希釈水量:少 量散布25～ 50L/10a					生育盛期
				林木、畑 作物	竹類		林地、放置 竹林、畑地	原液、使用液 量5～15mL/ 本	夏～秋期	竹稈注入 処理	-		

原稿(水稲以外)

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場所・ 適用土壌	使用量・ 散布液量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	会社名
カルブチ レート・シ アナジン・ DBN粒 剤	マスター Z粒剤	3-(3,3-ジメチルウレ イド)フェニルエーテル・ チルカルバマート… 0.80%、2-(4-クロロ-6- エチルアミノ)-1,3,5-トリ アジン-2-イルアミノ)-2-メ チルプロピオノニトリル… 1.5%、2,6-シクロヘン ゾニトリル…1.5%	粒 剤	樹木等	一年生 雑草	-	-	10~20g/m ² 20~40g/m ²	雑草発生前 生育初期(草 丈20cm以 下)	植栽地を除 く樹木等の 周辺地に全 面土壌散 布	本剤の使用回数… 2回以内、カルブチ レートを含む農薬の 総使用回数…2回 以内、シアナジンを 含む農薬の総使用 回数…3回以内、D BNを含む農薬の 総使用回数…3回 以内	関日本 クリーン ア ン ト ガ ー デ ン、住 友化学 園芸関
アラク ロール・リ ニエロン 乳剤	日産ラク サー乳剤	2-クロロ-2',6'-ジエチ ル-N-(3-メチルフェニル)アセ トアニド…30.0%、3- (3,4-シクロフェニル)- 1-メキシ-1-メチル尿 素…12.0%	乳 剤	だいす どうもろこ し、飼料 用とうも ろこし、 いんげ んめ	一年生 雑草	全域	全土壌(砂 土を除く)	400~ 600mL/10a	は種後出芽 前(雑草発 生前)	全面土壌 散布	本剤の使用回数… 1回、アラクロール を含む農薬の総使用 回数…1回、リニエ ロンを含む農薬の 総使用回数…2回 以内(全面土壌散布 は1回以内、雑草茎 葉兼土壌散布は1回 以内)	日産化 学工業 関
フェンメ ディファム 水和剤	ホクサン ベタナ ールフロ アブル	3-メキシカルボニル フェニル-N-(3'-メチ ルフェニル)カーバメート… 14.5%	水 和 剤	てんさい (移植栽 培)	畑地一 年生広 葉雑草	北海 道	全土壌	400~ 600mL/10a、 希釈水量60 ~80L/10a	移植活 着後、中耕 後(雑草発 生前期)(但 し、収穫 60日前ま で)	雑草茎葉 散布	本剤の使用回数… 3回以内、フェン メディファムを含 む農薬の総使用 回数…3回以内	北海三 共関
デスメ ディファム ・フェン メディ ファム 乳剤	ホクサン ベタナ ード乳 剤	エチル=3-フェニルカル ボニル-N-(3'-メチ ルフェニル)カーバメート… 13.0%	乳 剤	てんさい (移植栽 培)	畑地一 年生雑 草	北海 道	全土壌	400mL/10a、 希釈水量50 ~100L/10a	移植活 着後の雑 草発生 前期(但 し、収 穫90日前 まで)	雑草茎葉 散布	本剤の使用回数… 1回、デスメディ ファムを含む農 薬の総使用回数… 2回以内、フェン メディファムを 含む農薬の総 使用回数…3回 以内	北海三 共関
カルブチ レート・ピ ラフル フェンエ チル水和 剤	ピラメイト フロアブル	3-(3,3-ジメチルウレ イド)フェニルエーテル・ チルカルバマート… 40.0%、エチル=2-クロ ロ-5-(4-クロロ-5-シ フル オロメキシ-1-メチルピ ラ ゾール-3-イル)-4-フル オロフェノキシセ ター ト…0.10%	水 和 剤	樹木等	一年生 雑草、 多年生 広葉雑 草	-	公園、駐 車場、運 動場、宅 地、堤 とう、道 路、の り面、庭 園、鉄 道等	1~2mL/m ² 、 希釈水量 100mL/m ²	雑草生育 初期(草 丈20cm 以下)	植栽地を除 く樹木等の 周辺地に雑 草茎葉散 布又は全 面土壌散 布	本剤の使用回数… 2回以内、カルブ チレートを含 む農薬の 総使用回数… 2回以内、ピ ラフルフェ ンエチルを 含む農薬 の総使用回 数…3回以 内	関エス ディー ・エ ス バ イ オ テ ク
デブチウ ロン・DC BN粒剤	レール ウェイ粒 剤	1-(5-tert-ブチル 1,3,4-チアジソール 2-イル)-1,3-ジメチ ル 尿素…1.0%、2,6-ジ クロロオベンザミ ド…2.0%	粒 剤	樹木等	一年生 雑草、 多年生 広葉雑 草、ス キナ	-	公園、庭 園、堤 とう、駐 車場、運 動場、宅 地、鉄 道等	10~20g/m ²	雑草生育 初期(草 丈20cm 以下)	植栽地を除 く樹木等の 周辺地に全 面土壌散 布	本剤の使用回数… 3回以内、デブ チウロンを含 む農薬の 総使用回数… 3回以内、DCBN を含む農薬 の総使用回 数…3回以 内	関日本 クリーン ア ン ト ガ ー デ ン
グリホ サートイ ンプロビ ルアミン 塩・プロ マシ ル・メコ プロップ Pカリウ ム塩液 剤	カマイラ ズ	イソプロピルアンモニウ ム=N-(ホスホメチル)グリ シナー…1.5%、5-ブ ロモ-3-セコグリフ チ ル-6-メチルウラシル… 0.75%、(R)-2-(4-ク ロ ロ-オトリルオキシ)プロ ピ オン酸カリウム…0.30%	液 剤	樹木等	一年生 及び多 年生雑 草	-	公園、庭 園、堤 とう、駐 車場、運 動場、宅 地 等	30~ 60mL/m ²	雑草生育 期(草 丈30cm 以下)	植栽地を除 く樹木等の 周辺地に雑 草茎葉散 布又は全 面土壌散 布	本剤の使用回数… 2回以内、グリ ホサートを含 む農薬の 総使用回数… 3回以内、プロ マシルを含む 農薬の総使 用回数…2回 以内、メコ プロップPカ リウム塩を 含む農薬の 総使用回数… 3回以内	丸和バ イオカ ル、ア ース製 薬関