

新登録除草剤・植物成長調整剤一覧

農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課
平成22年4月1日～平成22年10月31日

(1) 水稲作(移植・直播)

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作 物 名	適用雑草	適用地帯	適用土 壌	使用量	使用時期	使用 方法	使用回数	登録 会社	
ベントキ サゾン・ ACN水 和剤	クリア ホープフ ロアブル	3-(4-クロロ-5-シクロヘンチ ルオキシ-2-フルオロフェニ ル)-5-イソプロピリデン- 1,3-オキサゾリジン-2,4-ジ オン・・・4.0%、2-アミノ-3-ク ロロ-1,4-ナフトキノ・・・ 18.0%	水 和 剤	移植 水稲	水田一年生 雑草、マツバイ、 ホタルイ、ヘラオモ ダカ(北海道、 東北)、ミズガイ ツリ(北海道を除く)、アオド ロ・藻類による 表層はく離	北海道	砂壤土 ～埴土	500mL/ 10a	移植直後～ビエ1 葉期 ただし、移植 後30日まで	原液湛 水散布 又は水 口施用	本剤の使用 回数・・・1回、 ベントキサゾ ンを含む農薬 の総使用回 数・・・2回以 内、ACNを含 む農薬の総 使用回数・・・3 回以内	科研製 薬㈱、ア クロカネ ショウワ	
						東北・北陸、 関東・東山・ 東海の普通 期及び早期 栽培地帯	埴土 ～埴土	植代後～移植前4 日又は移植直後 ～ビエ1葉期 た だし、移植後30日 まで					
						近畿・中国・ 四国、九州の 普通期及び 早期栽培地 帯							
ビリブチ カルブ・ プレチラ クロール 乳剤	ホクサン シング乳 剤	O-3-tert-ブチルフェニル =6-メトキシ-2-ビリジル(メチ ル)チオカルバート・・・ 12.0%、2-クロロ-2',6'-ジ エチル-N-(2-プロポキシエチ ル)アセトアニド・・・8.0%	乳 剤	移植 水稲	水田一年生 雑草、マツバイ、 ホタルイ、ミズガイ ツリ(北海道)	全域の普通 期及び早期 栽培地帯(九 州を除く)	砂壤土 ～埴土 (減水深 2cm/日 以下、但 し早期 栽培は1 cm/日以 下)	500mL/ 10a	植代時～移植4日 前まで	原液湛 水散布	本剤の使用 回数・・・1回、 ビリブチカル ブを含む農薬 の総使用回 数・・・2回以 内、プレチラ クロールを含 む農薬の総使 用回数・・・2回 以内	北海三 共㈱	
						九州の普通 期及び早期 栽培地帯	砂壤土 ～埴土 (減水深 1cm/日 以下)						
						水田一年生 雑草、マツバイ、 ホタルイ、ミズガイ ツリ	北海道	埴土～ 埴土(減 水深 1.5cm/ 日以下)	300mL/ 10a(少 量散布)				植代時～移植4日 前まで(移植後に 使用する除草剤と の体系で使用)
						東北	砂壤土 ～埴土 (減水深 1.5cm/ 日以下)						
						北陸、関東・ 東山・東海の 普通期栽培 地帯	砂壤土 ～埴土 (減水深 2cm/日 以下)						
						近畿・中国・ 四国の普通 期栽培地帯	砂壤土 ～埴土 (減水深 1.5cm/ 日以下)						
						九州の普通 期栽培地帯	砂壤土 ～埴土 (減水深 1cm/日 以下)						

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作 物 名	適用雑草	適用地帯	適用 土壌	使用量	使用時期	使用 方法	使用回数	登録 会社
ビリブチカルブ・プレチラクロール乳剤 つづき	ホクサン シンシグ乳 剤	O-3-tert-ブチルフェニル =6-メキシ-2-ピリジノ(メチ ル)チオカルバマート... 12.0%, 2-クロロ-2', 6'-ジ エチル-N-(2-プロボキシエチ ル)アセトアニド...8.0%	乳 剤	移植 水稻	水田一年生 雑草、マツバイ、 ホタルイ、ミズカ ヤツリ	九州の早期 栽培地帯	砂壤土 ～埴土 (減水深 1.5cm/ 日以下)	300mL/ 10a(少 量散布)	移植時～移植4日 前まで(移植後に 使用する除草剤と の体系で使用)	原液湛 水散布	本剤の使用 回数...1回、 ビリブチカル ブを含む農薬 の総使用回 数...2回以 内、プレチラ クロールを含 む農薬の総使 用回数...2回 以内	北海三 共興
					水田一年生 雑草、マツバイ、 ホタルイ	北海道	埴壤土 ～埴土 (減水深 2cm/日 以下)		移植直後～移植 後5日(ビエ1葉期 まで)(移植後に使 用する除草剤との 体系で使用)			
						東北	砂壤土 ～埴土 (減水深 1.5cm/ 日以下)					
						北陸・関東・ 東山・東海の 早期栽培地 帯	埴壤土 ～埴土 (減水深 1cm/日 以下)					
						関東・東山・ 東海及び近 畿・中国・四 国の普通期 栽培地帯	砂壤土 ～埴土 (減水深 2cm/日 以下)					
						近畿・中国・ 四国の早期 栽培地帯	埴土 ～埴土 (減水深 1cm/日 以下)					
						九州の普通 期栽培地帯	砂壤土 ～埴土 (減水深 1cm/日 以下)					
ビリブチカルブ・プレチラクロール・ペンシルフロシメチル・メソトリオン 粒剤	アピロ トップM X1キロ 粒剤75	(RS)-7-(4,6-ジメキシピ リジン-2-イルチオ)-3-メチル -2-ペンゾフラン-1(3H)-オ ン...1.5%, 2-クロロ- 2', 6'-ジエチル-N-(2-プロ ボキシエチル)アセトアニ ド...4.5%, メチル=α- (4,6-ジメキシピリジン- 2-イルカルバモイルスルファ モイル)-o-トルアト... 0.75%, 2-(4-メシル-2-ニ トロベンゾイル)シクロヘキサ ン-1,3-ジオン...0.50%	粒 剤	移植 水稻	水田一年生 雑草、マツバイ、 ホタルイ、ウツカ ワ、ミズカヤツリ(北 海道を除く)、 ヘラモダカ、ヒル ムシロ、セリ、アミ ドロ、藻類によ る表層はく離	北海道、東北	埴土 ～埴土	1kg/10a	移植後5日～ビエ 3葉期 ただし、移 植後30日まで	湛水散 布	本剤の使用 回数...1回、 ビリブチカル ブを含む農薬 の総使用回 数...2回以 内、プレチラ クロールを含 む農薬の総使 用回数...2回 以内、ペンシル フロシメチル を含む農薬 の総使用回 数...2回以 内、メソトリ オンを含む農 薬の総使用回 数...1回	シンジエン タジヤハン 樹、シン ジエンタ シート(株)

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作 物 名	適用雑草	適用地帯	適用 土壌	使用量	使用時期	使用 方法	使用回数	登録 会社
ピリフタ リド・プレ チラク ロール・ ペンシル フロンメ チル・メ ソトリオン 粒剤	デピロ トップM X1キロ 粒剤51	(RS)-7-(4,6-ジメチルピリ ジジン-2-イルチオ)-3-メチル -2-ヘンゾフラン-1(3H)-オ ン...1.2%, 2-クロロ- 2',6'-ジエチル-N-(2-プロ ホキシエチル)アセトアニリ ド...4.6%, メチル=α- (4,6-ジメチルピリジジン- 2-イルカルバモイルスルファモ イル)-o-トルアート... 0.51%, 2-(4-メシル-2-ニト ロベンゾイル)シクロヘキサン- 1,3-ジオン...0.90%	粒 剤	移植 水稻	水田一年生 雑草、マツハイ、 ホタルイ、ウリカワ、 ミスガヤツリ、ヒル ムシロ、セリ(北陸 を除く)、アオミ ノ、藻類による 表層はく離	全域(北海道、 東北を除く)の 普通期及び 早期栽培地 帯	壤土 ～埴土	1kg/10a	移植後3日～ビエ 2.5葉期 ただし、 移植後30日まで	湛水散 布	本剤の使用 回数...1回、 ピリフタリドを 含む農薬の 総使用回 数...2回以 内、プレチラ クロールを含 む農薬の総 使用回数...2 回以内、ペン シルフロンメ チルを含む農 薬の総使用回 数...2回以 内、メソトリ オンを含む農 薬の総使用回 数...1回	シンジェ ンタジャパン ㈱、シン ジェン タシート㈱
プレチラ クロー ル・メント リオン粒 剤	マキシ ンMX1キ ロ粒剤	2-クロロ-2',6'-ジエチル N-(2-プロホキシエチル)アセ トアニド...4.2%, 2-(4-メ シル-2-ニトロベンゾイル)シ クロヘキサン-1,3-ジオン... 0.60%	粒 剤	移植 水稻	水田一年生 雑草、マツハイ、 ホタルイ、ウリカワ、 ミスガヤツリ(北 海道を除く)、 ヘラオモガ(北 海道、東北)、ヒ ルムシロ(北陸)	全域(九州を 除く)の普通 期及び早期 栽培地帯 九州の普通 期及び早期 栽培地帯	壤土 ～埴土 砂壤土 ～埴土	1kg/10a	移植直後～ビエ1 葉期 ただし、移植 後30日まで	湛水散 布	本剤の使用 回数...1回、 プレチラ クロールを含 む農薬の総 使用回数...2 回以内、メン トリオンを含 む農薬の総 使用回数...1 回	シンジェ ンタジャパン ㈱
テフリル クロ ン・ピラ クロ ニル粒 剤	ゲット スター ジャンボ	2-(2-クロロ-4-メシル-3- [(テトラヒドロフラン-2-イルメ チル)ペンゾイル]シクロ ヘキサン-1,3-ジオン... 10.0%, 1-(3-クロロ- 4,5,6,7-テトラヒドロピラゾ [1,5-a]ピリジン-2-イル)- 5-[メチル(プロパ-2-イル) アミノ]ピラゾール-4-カルボ ニル...6.0%	粒 剤	移植 水稻	水田一年生 雑草、マツハイ、 ホタルイ、ウリカワ、 ミスガヤツリ(北 海道を除く)、 ヘラオモガ(北 海道、東北)、ヒ ルムシロ、セリ(北 陸を除く)	全域の普通 期及び早期 栽培地帯	壤土 ～埴土	小包装 (パック) 10個 300g/ 10a	移植後5日～ビエ 2.5葉期 ただし、 移植後30日まで	水田に 小包装 (パック)の まま投 げ入れ る。	本剤の使用 回数...1回、 テフリルクロ ンを含む農薬 の総使用回 数...2回以 内、ピラクロ ニルを含む農 薬の総使用回 数...2回以内	日産化 学工業 ㈱
フェント ラザミド・ プロモ ブチド・ ペンシル フロンメ チル粒 剤	MICク サトリー DX1キ ロ粒剤7 5	4-(2-クロロフェニル)-N-シ クロヘキシル-N-エチル-4,5- ジヒドロ-5-オキソ-1H-テ トラゾール-1-カルボキサミ ド...3.0%, (RS)-2-プロモ -N-(α, α'-ジメチルベン ジル)-3,3'-ジメチルブチルア ミド...6.0%, メチル=α- (4,6-ジメチルピリジジン- 2-イルカルバモイルスルファモ イル)-o-トルアート...0.75%	粒 剤	移植 水稻	水田一年生 雑草、マツハイ、 ホタルイ、ヘラオモ ガ、ミスガヤツリ (東北)、ウリカワ、 クロタヱ(東 北)、オモダカ、ヒ ルムシロ、セリ、シ ズイ(東北)、ア オミノ、藻類に よる表層はく 離	北海道、東北	砂壤土 ～埴土	1kg/10a	移植時 移植直後～ビエ 2.5葉期 ただし、 移植後30日まで	田植同 時散布 機で施 用 湛水散 布	本剤の使用 回数...1回、 フェントラザミ ドを含む農薬 の総使用回 数...1回、プ ロモブチドを 含む農薬の 総使用回 数...2回以 内、ペンシル フロンメチル を含む農薬の 総使用回 数...2回以内	三井化 学アグロ ㈱
				直播 水稻	水田一年生 雑草、マツハイ、 ホタルイ、ヘラオモ ガ、ウリカワ		壤土 ～埴土		稲1葉期～ビエ2.5 葉期 ただし、収穫 90日前まで			

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作 物 名	適用雑草	適用地帯	適用 土壌	使用量	使用時期	使用 方法	使用回数	登録 会社	
フェント ラザミド・ プロモブ チド・ベン シルフ ロンメチ ル水和 剤	MICク サトリー DXフロ アブルH	4-(2-クロロフェニル)-N-シ クロヘキシル-N-エチル-4,5- ジヒドロ-5-オキシ-1H-テ トラゾール-1-カルボキサミ ド・・・4.0%, (RS)-2-プロモ -N-(α , α -ジメチルベン ジル)-3,3-ジメチルブチルア ミド・・・18.0%, メチル= α - (4,6-ジメチルピリミジン- 2-イル)カルバモイルスルファメ イル)- α -トルアート・・・1.4%	水和 剤	移植 水稲	水田一年生 雑草、マツバイ、 ホタルイ、ヘラオモ ダカ、ミズガヤツリ (東北)、ウリカワ、 クログワイ(東 北)、オモダカ、ヒ ルムシロ、セリ、シ ズイ(東北)、エ ゾノサヤヌカグサ (北海道)、アオ ドロ・藻類によ る表層はく離	北海道、東北	砂壤土 ～壇土	500mL/ 10a	移植時	田植同 時散布 機で施 用	本剤の使用 回数・・・1回、 フェントラザミ ドを含む農薬 の総使用回 数・・・1回、プロ モブチドを含 む農薬の総 使用回数・・・ 2回以内、ベン シルフロンメチ ルを含む農薬 の総使用回数 ・・・2回以内	三井化 学アグロ 例	
				直播 水稲	水田一年生 雑草、マツバイ、 ホタルイ、ミズガ ヤツリ				湛水直播の稲1葉 期～ β E2.5葉期 ただし、収穫90日 前まで	湛水散布			
フェント ラザミド・ プロモブ チド・ベン シルフ ロンメチ ル粒剤	MICク サトリー DXジャ ンボH	4-(2-クロロフェニル)-N-シ クロヘキシル-N-エチル-4,5- ジヒドロ-5-オキシ-1H-テ トラゾール-1-カルボキサミ ド・・・7.5%, (RS)-2-プロモ -N-(α , α -ジメチルベン ジル)-3,3-ジメチルブチルア ミド・・・15.0%, メチル= α - (4,6-ジメチルピリミジン- 2-イル)カルバモイルスルファメ イル)- α -トルアート・・・1.87%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生 雑草、マツバイ、 ホタルイ、ヘラオモ ダカ、ミズガヤツリ (東北)、ウリカワ、 クログワイ(東 北)、オモダカ、ヒ ルムシロ、セリ、ア オドロ・藻類に よる表層はく 離	北海道、東北	砂壤土 ～壇土	小包装 (パック) 10個 (400g)/ 10a	移植後3日～ β E 2.5葉期 だし、 移植後30日まで	水田に 小包装 (パック)の まま投 げ入れ る。	本剤の使用 回数・・・1回、 フェントラザミ ドを含む農薬 の総使用回 数・・・1回、プロ モブチドを含 む農薬の総 使用回数・・・ 2回以内、ベン シルフロンメチ ルを含む農薬 の総使用回数 ・・・2回以内	三井化 学アグロ 例	
ブタク ロール・ ベントキ サゾン乳 剤	シンウチ EW	2-クロロ-2',6'-ジエチル N-(7-トキシメチル)アセトアニ ド・・・12.0%, 3-(4-クロロ 5-シクロペンチルオキシ-2-ブ ルオロフェニル)-5-イソプロピ リデン-1,3-オキサゾリジン- 2,4-ジオン・・・4.0%	乳 剤	移植 水稲	水田一年生 雑草、マツバイ、 ホタルイ、ヘラオモ ダカ(北海道)、 ミズガヤツリ(北 海道を除く)、ク ログワイ(北海 道を除く)、コ キヤガラ(東北、 関東・東山・東 海、九州)	北海道	砂壤土 ～壇土	500mL/ 10a	移植直後～ β E1 葉期 だし、移植 後30日まで	原液湛 水散布	本剤の使用 回数・・・1回、 ブタクロール を含む農薬の 総使用回 数・・・2回以 内、ベントキサ ゾンを含む農 薬の総使用回 数・・・2回以 内	科研製 薬例	
				直播 水稲	水田一年生 雑草、マツバイ、 ホタルイ、ミズガ ヤツリ				全域(北海道、 東北を除く)				300mL/ 10a
ブタク ロール・ ベントキ サゾン粒 剤	シンウチ 1キロ粒 剤	2-クロロ-2',6'-ジエチル N-(7-トキシメチル)アセトアニ ド・・・5.0%, 3-(4-クロロ 5-シクロペンチルオキシ-2-ブ ルオロフェニル)-5-イソプロピ リデン-1,3-オキサゾリジン- 2,4-ジオン・・・1.5%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生 雑草、マツバイ、 ホタルイ、ヘラオモ ダカ(北海道、 東北)、ミズガヤ ツリ(北海道を 除く)、クログワイ (北海道、九州 を除く)、コキヤ ガラ(東北、関 東・東山・東 海、九州)	北海道	砂壤土 ～壇土	1kg/10a	移植直後～ β E1 葉期 だし、移植 後30日まで	湛水散 布	本剤の使用 回数・・・1回、 ブタクロール を含む農薬の 総使用回 数・・・2回以 内、ベントキサ ゾンを含む農 薬の総使用回 数・・・2回以 内	科研製 薬例	
									移植時				田植同 時散布 機で施 用
									全域(北海道 を除く)の普通 期及び早期 栽培地帯				
									移植時	田植同 時散布 機で施 用			

– 35 –

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作 物 名	適用雑草	適用地域	適用 土壌	使用量	使用時期	使用 方法	使用回数	登録 会社
オキサジ アルギ ル・プロ モブチ ド・ベン ゾフェ ナップ粒 剤	ホクサン ノバマー ル1キロ 粒剤	5-tert-ブチル-3-[2,4-ジ クロロ-5-(プロパ-2-イル オキシ)フェニル]-1,3,4-オ キサジアゾール-2(3H)-オ ン...0.50%、(RS)-2-プロ モ-N-(α , α -ジメチルベン ジル)-3,3'-ジメチルプロ ピル...6.0%、2-[4-(2,4- ジクロロ-m-トールイル)- 1,3-ジメチルピラゾール-5- イルオキシ]-4'-メチルアセ トフェノール...5.0%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生 雑草、マツバイ、 ホタルイ、ウリカワ (東北を除く)、 ミズカヤツリ(北 海道を除く)、 ヘラオモダカ(北 海道、東北)	北海道 全域(北海道、 九州を除く)の 普通期及び 早期栽培地 帯 九州の普通 期及び早期 栽培地帯	砂壤土 ～壇土 壇土 ～壇土 砂壤土 ～壇土	1kg/10a	移植直後～ビエ 1.5葉期 但し、移 植後15日まで	湛水散 布	本剤の使用 回数...1回、 オキサジアル ギルを含む農 薬の総使用 回数...2回以 内、プロモブ チドを含む農 薬の総使用 回数...2回以 内、ベンゾフェ ナップを含む 農薬の総使 用回数...2回 以内	北海三 共興
ウニコナ ゾールP 複合肥 料	コープ ショート 一発18	(E)-(S)-1-(4-クロロフェ ニル)-4,4'-ジメチル-2-(1H- 1,2,4-トリアゾール-1-イル) ベンゼン-1-エン-3-オール... 0.0040%	複 合 肥 料	水稲	節間短縮によ る倒伏軽減	-	-	22.5～ 30kg/ 10a	耕起～代かき時	全面施 用土壌 混和	本剤の使用 回数...1回、 ウニコナゾ ールPを含む農 薬の総使用 回数...2回以 内(種子浸漬 は1回以内、 本田では1回 以内)	コープケ ミカル樹
ウニコナ ゾールP 複合肥 料	側条用 コープ ショート 一発20	(E)-(S)-1-(4-クロロフェ ニル)-4,4'-ジメチル-2-(1H- 1,2,4-トリアゾール-1-イル) ベンゼン-1-エン-3-オール... 0.0030%	複 合 肥 料	水稲	節間短縮によ る倒伏軽減	-	-	22.5～ 30kg/ 10a	田植え時	側条施 用	本剤の使用 回数...1回、 ウニコナゾ ールPを含む農 薬の総使用 回数...2回以 内(種子浸漬 は1回以内、 本田では1回 以内)	コープケ ミカル樹
エスプロ カルブ ピラソ ルフロ ンエチ ル・ベ ノキス スラム ・ベン ゾビ シクロ ン粒 剤	フオー カード1 キロ粒剤	S-ベンジル=1,2-ジメチル プロピル(エチル)チオカルバ マート...12.0%、エチル=5- (4,6-ジメチルピリミジン- 2-イルカルバモイルスルファ イル)-1-メチルピラゾール- 4-カルボキシラート... 0.21%、3-(2,2-ジフルオ ロエチン)-N-(5,8-ジメチ リシジン-2-イル)- α , α , α - トリフルオロメチル-2-スルホ ンアミド...0.30%、3-(2-ク ロロ-4-メチルベンゾイル)- 2-フェニルチオビシクロ [3.2.1]オクタ-2-エン-4-オ ン...2.0%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生 雑草、マツバイ、 ホタルイ、ウリカワ、 ミズカヤツリ(北 海道を除く)、 ヘラオモダカ(北 海道、東北)、 オモダカ(北海 道、近畿、 中国、四国、九 州)、クダマ (北陸、近畿、 中国、四国)、ヒ ルムシロ(北陸を 除く)、セリ(北 陸を除く)	北海道、東北 北陸、関東・ 東山・東海の 普通期及び 早期栽培地 帯 近畿・中国・ 四国の普通 期及び早期 栽培地帯 九州の普通 期及び早期 栽培地帯	壇土 ～壇土 砂壤土 ～壇土 壇土 ～壇土 砂壤土 ～壇土	1kg/10a	移植後7日～ビエ 4葉期 ただし、移 植後30日まで	湛水散 布	本剤の使用 回数...1回、 エスプロカル ブを含む農薬 の総使用回 数...1回、ピ ラソルフロ ンエチルを含 む農薬の総 使用回数...1 回、ベノキス スラムを含む 農薬の総使用 回数...2回以 内、ベンゾビ シクロンを含 む農薬の総 使用回数...2 回以内	日産化 学工業 (株)

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物 名	適用雑草	適用地帯	適用土 壌	使用量	使用時期	使用 方法	使用回数	登録 会社	
イマゾス ルフロ ン・ピラ クロニ ル・ベン ゾピ シクロ ン 粒剤	忍ジャン ボ	1-(2-クロロイミダゾ[1,2-a] ピリジン-3-イルスルホニル)- 3-(4,6-ジメチルピリミジン -2-イル)尿素・・・4.5%、1- (3-クロロ-4,5,6,7-テトラヒ ドロピラゾ[1,5-a]ピリジン -2-イル)-5-[メチル(プロパ -2-ニル)アミ]ピラゾール- 4-カルボニトリル・・・10.0%、 3-(2-クロロ-4-メチルベンゾ イル)-2-フェニルチオピシクロ [3.2.1]オクタ-2-エン-4-オ ン・・・10.0%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生 雑草、マツバイ、 ホタルイ、ヘラオモ ダカ(東北)、ミズ ガヤツリ、ウリカワ、 ヒルムシロ、セリ、ア オミドロ、藨類に よる表層はく 離(北陸、近 畿・中国・四 国)	東北、北陸、 関東・東山・ 東海の普通 期及び早期 栽培地帯	壤土 ～埴土	小包装 (パック) 10個 (200g)/ 10a	移植直後～ルビエ 2.5葉期 ただし、 移植後30日まで	水田に 小包装 (パック)の まま投 げ入れ る。	本剤の使用 回数・・・1回、 イマゾスルフ ロンを含む農 薬の総使用 回数・・・2回以 内、ピラクロ ニルを含む農薬 の総使用回 数・・・2回以 内、ベンゾピ シクロンを含 む農薬の総 使用回数・・・2 回以内	住友化 学㈱	
						近畿・中国、 四国の普通 期栽培地帯	砂埴土		移植後5日～ルビエ 2.5葉期 ただし、 移植後30日まで				
						九州の普通 期及び早期 栽培地帯	壤土 ～埴土		移植後5日～ルビエ 2葉期 ただし、移 植後30日まで				
カフエン ストロー ール・カル フェント ランゾン エチル・フ ルセトス ルフロン ・ベン ゾピシク ロン粒剤	タンボ エース1 キロ粒剤	N,N-ジエチル-3-メチルスル ホニル-1H-1,2,4-トリア ゾール-1-カルボキサミド・・・ 2.1%、(RS)-エチル=2-クロ ロ-3-[2-クロロ-5-(4-シフル オロメチル-4,5-シヒドロ-3- メチル-5-オキソ-1H- 1,2,4-トリアゾール-1-イ ル)-4-フルオロフェニル]プロ ピオナート・・・0.90%、1-[3- [(4,6-ジメチルピリミジン -2-イルカルバモイル)スルファ モイル]-2-ピリジル]-2-フル オロプロピル=オキシアセター ト・・・0.22%、3-(2-クロロ- 4-メチルベンゾイル)-2-フェ ニルチオピシクロ[3.2.1]オク タ-2-エン-4-オ・・・2.0%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生 雑草、マツバイ、 ホタルイ、ヘラオモ ダカ(北海道、 東北)、ミズガヤ ツリ(北海道、 東北を除く)、 ウリカワ、クロクワイ (北陸、近畿・ 中国・四国)、 オモダカ(北陸、 近畿・中国・ 四国)、ヒルムシ ロ、セリ、コウキヤ ガラ(関東・東山・ 東海、九州)、 アオミドロ、藨類 による表層はく 離(九州)	北海道	全域(北海等 を除く)の普通 期及び早期 栽培地帯	壤土 ～埴土	1kg/10a	移植後7日～ルビエ 4葉期 但し移植 後30日まで	湛水散 布	本剤の使用 回数・・・1回、 カフエンスト ロールを含む 農薬の総使 用回数・・・1 回、カルフェン トランゾンエチ ルを含む農薬 の総使用回 数・・・2回以 内、フルセト スルフロンを含 む農薬の総 使用回数・・・1 回、ベンゾピ シクロンを含 む農薬の総 使用回数・・・2 回以内	小泉商 事㈱

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稲刈跡・畑作・野菜作・永年作物・非農耕地対象

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場 所・ 適用土 壌	使用量・ 散布液量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	会社名
エトキシスルフロ ン水和剤	MICグラツェ ン顆粒水和剤	1-(4,6-ジメチル ピリジン-2-イル)- 3-(2-エトキシフェ キシルホルニル)尿素 …60.0%	水和 剤	日本芝	一年生 広葉雑 草	-	-	15~30g/10a、希釈 水量200~ 300L/10a	雑草発生前 (芝生育期)	散布	本剤の使用回 数…3回以内、エ トキシスルフロ ンを含む農薬の総使用 回数…3回以内	三井化 学アグロ バ
					一年生 広葉雑 草、多年 生広葉 雑草			30~60g/10a、希釈 水量200~ 300L/10a	雑草生育初 期(3葉期ま で)(芝生育 期)			
					ヒメグサ、ハ マスグサ			45~75g/10a、希釈 水量200~ 300L/10a				
				西洋芝 (ヘントグ ラ、及び多 年生広 葉雑草 (ブルー グラス)	一年生 及び多 年生広 葉雑草			30~60g/10a、希釈 水量200~ 300L/10a				
					ヒメグサ、ハ マスグサ			45~75g/10a、希釈 水量200~ 300L/10a				
メスルフロメ チル水和剤	サーベルDF	メチル-2-[3-(4-メ トキシ-6-メチル- 1,3,5-トリアジン- 2-イル)オレイトス ルホルニル]ベンゾア ート…60.0%	水和 剤	日本芝	一年生 及び多 年生広 葉雑草	-	-	2~4g/10a、希釈水 量150~200L/10a	秋冬期雑草 発生始期~ 生育初期	雑草茎葉散 布	本剤の使用回 数…2回以内、メ スルフロメチルを 含む農薬の総使用 回数…2回以内	丸和パ イオ、デ ュボン
				西洋芝 (ヘニア ラ、イラ ス、西洋 芝(ケン タッキー ブルー グラス)				1~2g/10a、希釈水 量200L/10a	秋冬期雑草 発生始期			
				樹木等			公園、庭 園、堤と う、駐車 場、道 路、運動 場、宅 地、鉄 道、のり 面等	5~10g/10a、希釈 水量100~ 150L/10a	雑草生育初 期	植栽地を除 く樹木等の 周辺地に雑 草茎葉散布		
グリホサートイ ンプロビルアミン塩 液剤	クサトリナー	イソプロピルアミン 塩-N-(ホスホニル) グリホサート… 41.0%	液 剤	樹木等	一年生 雑草	-	公園、庭 園、堤と う、駐車 場、道 路、運動 場、宅 地、鉄 道等	500mL/10a、希釈水 量100L/10a	雑草生育期 (草丈50cm 以下)	植栽地を除 く樹木等の 周辺地に雑 草茎葉散布	本剤の使用回 数…3回以内、グ リホサートを含む 農薬の総使用回数… 3回以内	關エス ・デー・エ ス
					多年生 雑草			1000mL/10a、希釈 水量100L/10a	生育期(草丈 100cm以下)			
					ススキ			1000~ 2000mL/10a、希釈 水量25~50L/10a	生育期(草丈 100cm程度)			
					スギナ			2000mL/10a、希釈 水量25~50L/10a	生育期(草丈 20cm程度)			
					ササ類			1000~ 2000mL/10a、希釈 水量25~50L/10a	生育期(草丈 50cm以下)			
				林木	竹類		林地、放 置竹林	原液、使用液量5~ 15mL/本	夏~秋期	竹種注入処 理	本剤の使用回 数…、グリホサ ートを含む農薬の総 使用回数…	
プロマシル粉粒 剤	こっばS	S-プロモ-3-セン グリーフチル-6-メ チルグリシナート…1.0%	粉粒 剤	樹木等	一年生 雑草、多 年生雑 草	-	公園、庭 園、堤と う、駐車 場、道 路、運動 場、宅 地等	15~30g/m2	雑草生育初 期(草丈 20cm以下)	植栽地を除 く樹木等の 周辺地に全 面土壌散布 又は雑草茎 葉散布	本剤の使用回 数…2回以内、プ ロマシルを含む農 薬の総使用回 数…2回以内	レイホー 薬品
オリザリン水和剤	サーフラン15SC	3,5-ジニトロ N ⁴ ,N ⁴ -シフアルビ ルスルファニルアミ ド…15.0%	水和 剤	日本芝 (生産園 場、ゴルフ 場)	一年生 雑草	-	-	600~800mL/10a、 希釈水量200~ 300L/10a	秋冬期雑草 発生前	全面土壌散 布	本剤の使用回 数…2回以内、オ リザリンを含む農 薬の総使用回数…2 回以内	ユー・エ ル・ジヤ ン、丸和 パイオ ニ

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場 所・ 適用土 壌	使用量・ 散布液量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	会社名
MDBA粒剤	ホクサンバンベ ルーD粒剤	2-メキシ-3,6-ジ クロ安息香 酸...2.5%	粒 剤	日本芝	畑地一年生及 び多年生広葉 雑草	-	-	20kg/10a	雑草発生初 期～雑草発 生盛期	散布	本剤の使用回 数...3回以内、M DBAを含む農薬 の総使用回数...3 回以内	北海三 共研
				樹木等	一年生 及び多 年生広 葉雑草、 スギナ	-	公園、庭 園、堤と う、駐車 場、道 路、運動 場、宅 地、のり 面、鉄道 等	15～20kg/10a	雑草生育初 期(草丈 20cm以下)	植栽地を除 く樹木等の 周辺地に全 面均一散布		
グリホサートイ ンプロピルアミン塩 液剤	クサフージシャ ワー	イソプロピルアンモ ニウム-N-(ホスホノメ チル)グリナート... 1.0%	液 剤	樹木等	一年生 及び多 年生雑 草	-	公園、庭 園、堤と う、駐車 場、道 路、運動 場、宅 地、のり 面等	25～40mL/m ² <原 液散布>	雑草生育期 (草丈30cm 以下)	植栽地を除 く樹木等の 周辺地に雑 草茎葉散布	本剤の使用回 数...3回以内、グ リホサートを含む農 薬の総使用回 数...3回以内	ケンゲ園 芸(株)
					スギナ	-		80～100mL/m ² <原 液散布>				
				つつじ 類	一年生 雑草及 び多年 生広葉 雑草(ス ギナを除 く)	-		25～40mL/m ² <原 液散布>				
グルホシネート・ トリブジン・DC MU粉粒剤	草退治スピード 微粒剤	アンモニウム-DL-ホ モアラニン-4-イル(メ チル)ホスフィン ト...0.80%, 4-アミ ノ-6-ターシャリーブ ザル-3-(メチルチ オ)-1,2,4-トリアジ ン-5(4H)-オン... 0.40%, 3-(3,4- ジクロロフェニル)- 1,1-ジメチル尿 素...2.0%	粉 粒 剤	樹木等	一年生 雑草	-	公園、庭 園、堤と う、駐車 場、道 路、運動 場、宅 地、鉄道 等	10～20kg/10a	雑草生育期 (草丈30cm 以下)	植栽地を除 く樹木等の 周辺地に雑 草茎葉散布	本剤の使用回 数...2回以内、グ リホサートを含む農 薬の総使用回 数...3回以内、トリ ブジンを含む農 薬の総使用回 数...2回以内、DC MUを含む農薬の 総使用回数...3回 以内	住友化 学園芸 (株)
					多年生 広葉雑 草、スギナ	-		20～30kg/10a				
IPC乳剤	ホクサントロロIP C乳剤	イソプロピル-N-(3-クロロフェニル) カーバメート... 45.8%	乳 剤	麦類	スズメ アヅキ、ス ズメノカタ ビラ等冬 生イネ科 雑草、ハ ハ、のみ のふす ま、タネツ ケハナ、ミ チヤナギ、 タデ類等	-	-	100～150mL/10a、 希釈水量70～ 100L/10a	は種直後ま たは2～3葉 期	全面土壌散 布	本剤の使用回 数...1回、IPCを 含む農薬の総使用 回数...1回	北海三 共研
				たまねぎ		-		200～300mL/10a、 希釈水量70～ 100L/10a	定植活着後 または中耕 後 但し収穫 90日前まで		本剤の使用回 数...2回以内、IP Cを含む農薬の総 使用回数...2回以 内	
				てんさい		-			は種直後		本剤の使用回 数...1回、IPCを 含む農薬の総使用 回数...1回	
				ほうれん そう		-		無催芽種子100～ 150mL/10a、催芽種 子150～ 200mL/10a、希釈水 量70～100L/10a				
				いちご		-		150～200mL/10a、 希釈水量70～ 100L/10a	定植活着後 但し定植7日 後まで	株間土壌散 布		

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場 所・ 適用土 壌	使用量・ 散布流量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	会社名
IPC乳剤 つづき	ホクサンクロロIP C乳剤	イプロピル-N- (3-クロロフェニル) カーバネート… 45.8%	乳 剤	いんげ んまめ	スズメノ テッポウ、ス ズメノカタ ビラ等冬 生イネ科 雑草、ハコ ベ、のみ のふす ま、タネツ ケハナミ チヤナギ、 タデ類等			500～900mL/10a、 希釈水量70～ 100L/10a	は種直後	全面土壌散 布	本剤の使用回 数…1回、IPCを 含む農薬の総使用 回数…1回	北海三 共済
								500～600mL/10a、 希釈水量70～ 100L/10a	は種後5～ 15日(発芽 前)			
								500～ 600mL/10a(北海道 を除く)、 300mL/10a(北海 道)、希釈水量70～ 100L/10a	は種直後(除 高温時)			
								500mL/10a(北海道 を除く)、春播き200 ～300mL/10a(北海 道)、晩春播き200～ 400mL/10a(北海 道)、希釈水量70～ 100L/10a	は種直後			
				にんじん				150～300mL/10a、 希釈水量70～ 100L/10a	定植後 但し 収穫60日前 まで	株間土壌散 布		
				キャベツ				300～500mL/10a、 希釈水量70～ 100L/10a	定植1ヶ月以 上後 但し収 穫60日前ま で			
				はくさい				200～300mL/10a、 希釈水量70～ 100L/10a	は種後発芽 前	全面土壌散 布		
				だいず*				は種直後				
				あずき				150～200mL/10a、 希釈水量70～ 100L/10a	は種直後			
				とうもろ こし				300～500mL/10a、 希釈水量70～ 100L/10a	定植活着後 但し収穫60 日前まで	株間土壌散 布		
				レタス(移 植露地 栽培)、 非結球レ タス(移植 露地栽培)				200～300mL/10a、 希釈水量70～ 100L/10a	は種直後	全面土壌散 布		
				アスパラガ ス(苗床)				250～300mL/10a、 希釈水量70～ 100L/10a	培土後雑草 発生前 但し 収穫21日前 まで			
				アスパラガ ス(定植 畑)				150～200mL/10a、 希釈水量70～ 100L/10a	は種直後			
				デントコー ン				300mL/10a、希釈水 量70～100L/10a	植付後	株間土壌散 布		
				チュールッ プ				400～600mL/10a、 希釈水量200～ 300L/10a	秋期～春期 にかけて気 温が20℃内 外の時期 雑 草発生前～ 発生始期	全面散布	本剤の使用回 数…2回以内、IP Cを含む農薬の総 使用回数…2回以 内	
				日本芝 (こらい しば)、日 本芝(ひ めこらい しば)				スズメノ カタビラ等 冬生イネ 科雑草				

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場 所・ 適用土 壌	使用量・ 散布液量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	会社名
MDBA液剤	ホクサンバンベ ルーD液剤	2-メキシ-3,6-ジ クロ安息香酸ジ メチルアミン… 50.0%	液 剤	芝	一年生 広葉雑 草、多年 生広葉 雑草	-	公園、庭 園、場と う、駐車 場、道 路、運動 場、宅 地、のり 面、鉄道 線路等	100～200mL/10a、 希釈水量100L/10a	雑草生育初 期	雑草茎葉散 布	本剤の使用回 数…3回以内、M DBAを含む農薬 の総使用回数…3 回以内	北海三 共働
				樹木等	一年生 広葉雑 草			200～400mL/10a、 希釈水量100L/10a		植栽地を除 く樹木等の 周辺地に雑 草茎葉散布		
				牧草	キシギシ			75～100mL/10a、希 釈水量100L/10a	秋期最終刈 取後30日以 内	雑草茎葉散 布	本剤の使用回 数…1回、MDBA を含む農薬の総使 用回数…1回	
MCPP液剤	ホクサンMCP P液剤	α-(2-メチル-4-ク ロフェノキシ)プロ ピオン酸カリウム… 50.0%	液 剤	日本芝 西洋芝 (ブルーグ ラス)	クロー バー、畑 地一年 生広葉 雑草	-	公園、庭 園、場と う、駐車 場、道 路、運動 場、宅 地、のり 面、鉄道 等	500～1000mL/10a、 希釈水量100～ 200L/10a	雑草生育期	全面茎葉散 布	本剤の使用回 数…3回以内、M CPPを含む農薬の 総使用回数…3回 以内	北海三 共働
				樹木等	スギナ			750～1000mL/10a、 希釈水量100～ 200L/10a		植栽地を除 く樹木等の 周辺地に全 面茎葉散布		
メソリオン水和 剤	カリスト	2-(4-メチル-2-ニ トロフェノキシ)シク ロヘキサ-1,3-ジオー ン…9.1%	水 和 剤	どうも ろこし、 顔料用ど うもろこ し	一年生 広葉雑 草	北海道を 除く全域	-	150～200mL/10a、 希釈水量100L/10a	は種後出芽 前(雑草発生 前)	全面土壌散 布	本剤の使用回 数…3回以内、M CPPを含む農薬の 総使用回数…3回 以内	シンジェ ンタジャパン (株)
					一年生 雑草	全域		100～150mL/10a、 希釈水量100L/10a	どうもろこし2 ～4葉期(雑 草3葉期ま で)	雑草茎葉散 布		
グリホサートイソ プロピルアミン塩 液剤	クサストッパー	イソプロピルアンモニ ウムN-(ホスホノメチ ル)グリホサート… 1.0%	液 剤	樹木等	一年生 及び多 年生雑 草	-	公園、庭 園、場と う、駐車 場、道 路、運動 場、宅 地、のり 面等	20～40mL/m ² (原液 散布)	雑草生育期 (草丈30cm 以下)	植栽地を除 く樹木等の 周辺地に雑 草茎葉散布	本剤の使用回 数…3回以内、グ リホサートを含む農 薬の総使用回 数…3回以内	赤城物 産(株)、大 成農材 (株)、朝 ソー、エ ス、フロ ン、シー ズ、フォ ワード
エンドタールニ ナトリウム塩粒剤	ホクサンエンド タール粒剤25	(1R,2S,3R,4S)- 7-オキサビシクロ [2.2.1]ヘプタン- 2,3-シカルボン酸 二ナトリウム塩… 3.1%	粒 剤	西洋芝 (ブルーグ ラス)、西 洋芝(フェ スク)	スズメカ タビラ	-	-	5～10kg/10a	雑草生育期	散布	本剤の使用回 数…6回以内、エ ンドタールを含む 農薬の総使用回 数…6回以内	北海三 共働
エンドタールニ ナトリウム塩液剤	ホクサンエンド タール液剤	(1R,2S,3R,4S)- 7-オキサビシクロ [2.2.1]ヘプタン- 2,3-シカルボン酸 二ナトリウム塩… 1.85%	液 剤	日本芝 (こうらい しば)	スズメカ タビラ	-	-	8～12L/10a、希釈 水量200L/10a	雑草生育期 (芝休眠期)	散布	本剤の使用回 数…3回以内、エ ンドタールを含む 農薬の総使用回 数…6回以内	北海三 共働
				西洋芝 (ブルーグ ラス)		-	-		雑草生育期		本剤の使用回 数…6回以内、エ ンドタールを含む 農薬の総使用回 数…6回以内	
エンドタールニ ナトリウム塩液剤	ホクサンエンド タール液剤H	(1R,2S,3R,4S)- 7-オキサビシクロ [2.2.1]ヘプタン- 2,3-シカルボン酸 二ナトリウム塩… 18.5%	液 剤	日本芝 (こうらい しば)	スズメカ タビラ	-	-	800～1200mL/10a、 希釈水量200L/10a	雑草生育期 (芝休眠期)	散布	本剤の使用回 数…3回以内、エ ンドタールを含む 農薬の総使用回 数…6回以内	北海三 共働

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場 所・ 適用土 壌	使用量・ 散布液量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	会社名
シアナジン・DB N粒剤	リポート粒剤	2-(4-クロロ-6-エチルアミノ-1,3,5-トリアジン-2-イルアミノ)-2-メチルプロピオニトリル... 10.0%, 2,6-シクロペンゾニトリル... 4.0%	粒剤	樹木等	一年生 雑草、多 年生広 葉雑草、 スギナ	-	公園、庭 園、堤と う、駐車 場、道 路、運動 場、宅 地、のり 面、鉄道 等	10~20kg/10a	雑草生育始 期(草丈 20cm以下)	植栽地を除 く樹木等の 周辺地に全 面土壌散布	本剤の使用回 数...3回以内、シ アナジンを含む農 薬の総使用回 数...3回以内、DB Nを含む農薬の総 使用回数...3回以 内	アグロネ ショウ
シアナジン・DB N粒剤	フェアウェル粒剤	2-(4-クロロ-6-エチルアミノ-1,3,5-トリアジン-2-イルアミノ)-2-メチルプロピオニトリル... 3.0%, 2,6-シクロペンゾニトリル... 1.2%	粒剤	樹木等	一年生 雑草、多 年生広 葉雑草、 スギナ	-	公園、庭 園、堤と う、駐車 場、道 路、運動 場、宅 地、のり 面、鉄道 等	40kg/10a	雑草生育始 期(草丈 20cm以下)	植栽地を除 く樹木等の 周辺地に全 面土壌散布	本剤の使用回 数...3回以内、シ アナジンを含む農 薬の総使用回 数...3回以内、DB Nを含む農薬の総 使用回数...3回以 内	アグロネ ショウ
				日本芝 (こらい しば)	一年生 雑草、多 年生広 葉雑草	-	-	8~12kg/10a	芝生育期 雑 草発生前~ 発生始期	全面土壌散 布		
シアナジン・DB N複合肥料	クサビースグリー ン粒剤	2-(4-クロロ-6-エチルアミノ-1,3,5-トリアジン-2-イルアミノ)-2-メチルプロピオニトリル... 1.0%, 2,6-シクロペンゾニトリル... 0.50%	複 合 肥 料	日本芝 (こらい しば)	一年生 雑草	-	-	20~40g/m ²	春夏雑草発 生前~雑草 発生初期	全面土壌散 布	本剤の使用回 数...3回以内、シ アナジンを含む農 薬の総使用回 数...3回以内、DB Nを含む農薬の総 使用回数...3回以 内	㈱日本 グリーン システム ・住友化学 園芸㈱
トリアジブラム・D BN複合肥料	シバレンジャー	(RS)-N-(2-(3,5-ジメチルフェニル)-1-メチルエチル)-6-(1-フルオロ-1-メチルエチル)-1,3,5-トリアジン-2,4-ジアミン... 0.10%, 2,6-シクロペンゾニトリル... 0.50%	複 合 肥 料	日本芝 (こらい しば)	一年生 雑草	-	-	20~40g/m ²	春夏雑草発 生前~雑草 発生初期	全面土壌散 布	本剤の使用回 数...2回以内、ト リアジブラムを含 む農薬の総使用回 数...2回以内、DB Nを含む農薬の総 使用回数...3回以 内	㈱日本 グリーン システム ・レイン ボーン薬 品㈱
ダミノジッド水溶 剤	ビーナイン顆粒 水溶剤	N-(2-メチルアミノ)ス クニクミド酸... 80.0%	水 溶 剤	きく(切 花用)	節間の 伸長抑 制	-	-	1000~1500倍、50 ~150L/10a	生育期	葉面散布	本剤の使用回 数...4回以内、ダミ ノジッドを含む農薬 の総使用回数...6 回以内	日本曹 達㈱
				花首の 伸長抑 制					発蕾期~摘 蕾期		本剤の使用回 数...2回以内、ダミ ノジッドを含む農薬 の総使用回数...6 回以内	
				きく(ポッ マム)	節間の 伸長抑 制			200~400倍、5~ 10mL/5号鉢	摘心後10~ 7日又は定 植3日後から 発蕾初期		本剤の使用回 数...3回以内、ダミ ノジッドを含む農薬 の総使用回数...3 回以内	
				ポインセ ア				100~200倍、50~ 150L/10a	定植後3~ 30日		本剤の使用回 数...1回、ダミ ノジッドを含む農薬 の総使用回数...1 回	
				ハイトラン シア							本剤の使用回 数...2回以内、ダミ ノジッドを含む農薬 の総使用回数...2 回以内	
				はぼた ん					定植後3日 目		本剤の使用回 数...1回、ダミ ノジッドを含む農薬 の総使用回数...1	
				ベチューア					定植後2週 間目			

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤型	適用作物名	適用雑草	適用地帯	適用場所・ 適用土壌	使用量・ 散布液量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	会社名	
ダミノジッド水溶 剤 つづき	ピーナイン顆粒 水溶剤	N-(ジメチルアミノ)ス クシナト酸… 80.0%	水溶 剤	アサレア	節間の 伸長抑 制	-	-	150～200倍、50～ 150L/10a	播種後30～ 40日	茎葉散布	本剤の使用回 数…1回、ダミ ノジッドを含む農薬 の総使用回数…1 回	日本曹 達㈱	
					あさがお			節間の 伸長抑 制、着 蓄数増加	400～800倍、50～ 150L/10a		本葉5～7枚 の時		本剤の使用回 数…3回、ダミ ノジッドを含む農薬 の総使用回数…3 回
					しゃくな げ			75～100倍、 100mL/5号鉢	新梢伸長完 了期を1回 目として3回 処理(1ヶ月 間隔)				
グリホサートカリ ウム塩液剤	ラウンドアップ マックスロードA L	カラム-N-(ホスホ ニル)グリシナ ト…0.96%	液 剤	樹木等	一年生 及び多 年生雑 草	-	公園、庭 園、堤と う、駐車 場、道 路、運動 場、宅 地、のり 面等	15～30mL/m ² (原液 散布) 75～90mL/m ² (原液 散布)	雑草生育始 期(草丈 30cm以下)	植栽地を除 く樹木等の 周辺地に雑 草茎葉散布	本剤の使用回 数…3回以内、グ リホサートを含む農 薬の総使用回 数…3回以内	日産化 学工業 ㈱	
メトリブジン・DB N粒剤	クサワージ粒剤	4-アミノ-6-ターシャ リ-プロチル-3-(メチ ルチオ)-1,2,4-トリ アジン-5(4H)-オ ン…0.50%、2,6- ジクロロベンゾニリ ル…2.0%	粒 剤	樹木等	一年生 雑草	-	公園、庭 園、堤と う、駐車 場、道 路、運動 場、宅 地、鉄道 等	10～15kg/10a	雑草発生前 ～生育初期 (草丈20cm 以下)	植栽地を除 く樹木等の 周辺地に全 面土壌散布	本剤の使用回 数…2回以内、メ トリブジンを含む農 薬の総使用回 数…2回以内、DB Nを含む農薬の総 使用回数…3回以 内	ケンカ 園芸 ㈱	
					多年生 広葉雑 草、スギナ			15～30kg/10a	生育初期(草 丈20cm以 下)				
プロスルホカル ブ乳剤	ボクサー	S-ベンジル=ジプロ ピルチオカルハマー ト…78.4%	乳 剤	小麦(秋 播)、大 麦(秋播)	一年生 雑草	全域	-	400～500mL/10a、 希釈水量70～ 100L/10a	は種後～麦 2葉期まで (雑草発生前 ～雑草発生 始期)	散布	本剤の使用回 数…1回、プロス ルホカルブを含む 農薬の総使用回 数…2回以内	シンジ ン タ ン ヤ ン ㈱	
プロスルホカル ブ・リニエロン乳 剤	ムギレンジャー乳 剤	S-ベンジル=ジプロ ピルチオカルハマー ト…46.0%、3- (3,4-ジクロロフェ ニル)-1-メチル-1-メ チル尿素… 11.5%	乳 剤	小麦、大 麦	一年生 雑草	全域(北 海道を除 く)	全土壌 (砂土を 除く)	400～600mL/10a、 希釈水量100L/10a	は種後出芽 前(雑草発生 前)	全面土壌散 布	本剤の使用回 数…1回、プロス ルホカルブを含む 農薬の総使用回 数…2回以内、リ ニエロンを含む農 薬の総使用回 数…1回	丸和ハイ オ㈱	
ジメテナミドP乳 剤	フィールドスター P乳剤	(S)-2-クロロ-N- (2,4-ジメチル-3- チエニル)-N-(2-メ チル-1-メチルエチ ル)アセトアミド… 64.0%	乳 剤	キャベツ	一年生 雑草(カ サ科・ア ブラ科・ タデ科を 除く)	全域	砂土を 除く全土 壌	50～75mL/10a、希 釈水量100L/10a	定植後雑草 発生前(定植 後10日まで)	全面土壌散 布	本剤の使用回 数…1回、ジメテナ ミド及びジメテナ ミドPを含む農薬の 総使用回数…1回	BASF ジャパ ン ㈱	
					えだま め、だい ず、とう もろこ し、飼料用 とうもろ こし			75～120mL/10a、希 釈水量75～ 150L/10a	は種後発芽 前(雑草発生 前)				
					てんさい			75～120mL/10a、希 釈水量100L/10a	定植後また は中耕後 雑 草発生前 但 し収穫45日 前まで				
エスプロカルブ・ ジフルフェニカン 乳剤	パンパン乳剤	S-ベンジル=1,2- ジメチルプロピルエ チルチオカルハマー ト…60.0%、 2,4'-ジフルオロ- 2-(α , α , α -トリ フルオロ-m-トリオ キシ)ニコチンアミ ド…1.5%	乳 剤	小麦(秋 播)	一年生 雑草	北海道	砂土を 除く全土 壌	300～400mL/10a、 希釈水量100L/10a	は種後出芽 前(雑草発生 前)	全面土壌散 布	本剤の使用回 数…1回、エスプ ロカルブを含む農 薬の総使用回 数…1回、ジフル フェニカンを含む 農薬の総使用回 数…1回	日産化 学工業 ㈱	

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場 所・ 適用土 壌	使用量・ 散布液量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	会社名	
アシシラム液剤	グリーンアーザン液剤	N'-メチルカルボニルスルファニルプロピリウム...37.0%	液剤	日本芝	畑地一年生雑草	-	-	1000～1250mL/10a、希釈水量200～300L/10a	秋～春期(芝発芽前)	散布(茎葉兼土壌処理)	本剤の使用回数...3回以内、アシシラムを含む農薬の総使用回数...3回以内	保土谷UPL(株)	
					400～600mL/10a、希釈水量200～300L/10a			芝生育期(雑草生育初期)					
					樹木等			一年生雑草	1000～2000mL/10a、希釈水量100～200L/10a	雑草生育期			植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布
					多年生広葉雑草			2000～3000mL/10a、希釈水量100～200L/10a					
					多年生イネ科雑草			3000～5000mL/10a、希釈水量100～200L/10a					
					クサ			5000mL/10a、希釈水量100～200L/10a					
					すぎ(下刈り)			ススキ	20倍、300mL/株径30cmの株	6月			局所散布(茎葉処理)
					アレチノギク、カラムシ、シシトフ等の大型雑草			20倍、60L/10a	雑草発生前	散布(茎葉処理)			
					クサ			10倍、50L/10a	6～7月				
					S-メトラクロール乳剤			シバッチ乳剤	(S)-2-クロロ-2'-エチル-N-(2-メキシ-1-メチルエチル)-6'-メチルアセトアリド及び(2S)-2-クロロ-2'-エチル-N-(2-メキシ-1-メチルエチル)-6'-メチルアセトアリド...83.7%	乳剤			日本芝
グリホサートインプロピルアミン塩・プロマシル・メコプロップPカリウム塩液剤	アースカマイラズ	(S)-2-クロロ-2'-エチル-N-(2-メキシ-1-メチルエチル)-6'-メチルアセトアリド及び(2S)-2-クロロ-2'-エチル-N-(2-メキシ-1-メチルエチル)-6'-メチルアセトアリド...83.7%	液剤	樹木等	一年生及び多年生雑草	-	公園、庭、田舎、駐車場、運動場、宅地等	30～60mL/m ²	雑草生育期(草丈30cm以下)	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布又は全面土壌散布	本剤の使用回数...2回以内、グリホサートを含む農薬の総使用回数...3回以内、プロマシルを含む農薬の総使用回数...2回以内、メコプロップPカリウム塩を含む農薬の総使用回数...3回以内	アース製薬(株)	