

原稿(水稲)

新登録除草剤・植物成長調整剤一覧

農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課
平成22年11月1日～平成23年3月31日

(1) 水稲作(移植・直播)

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作 物 名	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使 用 量	使 用 時 期	使 用 方 法	使 用 回 数	登 録 会 社
ピリミスル ファン粒 剤	ベスト パート ナー1キ ロ粒剤	(RS)-2'-[(4,6-ジメチル ピリミジン-2-イル)(ヒドロキ シ)メチル]-1,1-ジフルオロ -6'--(メキシメチル)メタンス ルホンアニド・・・0.67%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生雑 草、マツハイ、ホ ルイ、ウリカワ、ミズ カヤツリ(北海道 を除く)、ヘラオモ ダ(北海道、東北)、 ヒルムシロ、セ リ、オモダ(東北、 北陸、九州)、ク グワイ(東北、北 陸、九州)、シスイ (東北)、コウキヤ グ(東北、九州)、 アオシロ・藻類に よる表層はく離 (北陸を除く)	全域の普通期 及び早期栽培 地帯	砂壌土～埴土	1kg/ 10a	移植後3日～ノ ビエ3葉期(砂壌 土は移植後7日 ～ノビエ3葉期) 但し、移植後30 日まで	湛水 散布	本剤の使用回数… 1回、ピリミスルファン を含む農薬の総使 用回数…2回以内	グアイ 化学 工業 ㈱
ピリミスル ファン剤	ベスト パート ナージャン ボ	(RS)-2'-[(4,6-ジメチル ピリミジン-2-イル)(ヒドロキ シ)メチル]-1,1-ジフルオロ -6'--(メキシメチル)メタンス ルホンアニド・・・2.7%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生雑 草、マツハイ、ホ ルイ、ウリカワ、ミズ カヤツリ、ヘラオモ ダ(東北)、ヒルム シロ、セリ(北陸を除 く)	北陸	砂壌土～埴土	小包装 (パック)10 個 (250g)/10a	移植後3日～ (但し、砂壌土は 移植後7日～ノ ビエ3葉期 但 し、移植後30日 まで	水田 に小 包装 (パック) のまま 投げ 入れ る。	本剤の使用回数… 1回、ピリミスルファン を含む農薬の総使 用回数…2回以内	グアイ 化学 工業 ㈱
ピリミスル ファン剤	ベスト パート ナー豆つ ぶ250	(RS)-2'-[(4,6-ジメチル ピリミジン-2-イル)(ヒドロキ シ)メチル]-1,1-ジフルオロ -6'--(メキシメチル)メタンス ルホンアニド・・・2.7%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生雑 草、マツハイ、ホ ルイ、ウリカワ、ミズ カヤツリ(北海道 を除く)、ヘラオモ ダ(北海道、東北)、 ヒルムシロ、セ リ(九州を除く)、ア オシロ・藻類に よる表層はく離 (九州)	北陸	砂壌土～埴土	250g/ 10a	移植後3日～ノ ビエ3葉期(砂壌 土は移植後7日 ～ノビエ3葉期) 但し、移植後30 日まで	湛水 散布	本剤の使用回数… 1回、ピリミスルファン を含む農薬の総使 用回数…2回以内	グアイ 化学 工業 ㈱
ピリミスル ファン・ フェントラ ザミド粒 剤	ヤイバ1キ ロ粒剤	(RS)-2'-[(4,6-ジメチル ピリミジン-2-イル)(ヒドロキ シ)メチル]-1,1-ジフルオロ -6'--(メキシメチル)メタンス ルホンアニド・・・0.50%、 4-(2-クロロフェニル)-N-シ クロヘキシル-N-エチル- 4,5-ジヒドロ-5-オキソ- 1H-テトラゾール-1-カルボ キサミド・・・3.0%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生雑 草、マツハイ、ホ ルイ、ウリカワ、ミズ カヤツリ(北海道 を除く)、ヘラオモ ダ(北海道、東北)、 ヒルムシロ、セ リ(九州を除く)、ア オシロ・藻類に よる表層はく離 (関東・東山・東 海を除く)	北海道、東北、 北陸	砂壌土～埴土	1kg/ 10a	移植直後～ノ ビエ3葉期(砂壌 土は移植後3日 ～ノビエ3葉期)但 し、移植後30日 まで	湛水 散布	本剤の使用回数… 1回、ピリミスルファン を含む農薬の総使 用回数…2回以内、 フェントラザミドを 含む農薬の総使用 回数…1回	グアイ 化学 工業 ㈱
ピリミスル ファン・ フェントラ ザミド剤	ヤイバ ジャンボ	(RS)-2'-[(4,6-ジメチル ピリミジン-2-イル)(ヒドロキ シ)メチル]-1,1-ジフルオロ -6'--(メキシメチル)メタンス ルホンアニド・・・2.0%、4- (2-クロロフェニル)-N-シクロ ヘキシル-N-エチル-4,5- ジヒドロ-5-オキソ-1H-テ トラゾール-1-カルボキサ ミド・・・12.0%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生雑 草、マツハイ、ホ ルイ、ウリカワ、ミズ カヤツリ(北海道 を除く)、ヘラオモ ダ(北海道、東北)、 ヒルムシロ、セ リ(北陸を除く)	関東・東山・東 海の普通期及 び早期栽培地 帯	砂壌土～埴土	小包装 (パック)10 個 (250g)/10a	移植後3日～ノ ビエ2.5葉期 但 し、移植後30日 まで	水田 に小 包装 (パック) のまま 投げ 入れ る。	本剤の使用回数… 1回、ピリミスルファン を含む農薬の総使 用回数…2回以内、 フェントラザミドを 含む農薬の総使用 回数…1回	グアイ 化学 工業 ㈱

原稿(水稲)

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作 物 名	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用 量	使用時期	使用 方法	使用回数	登録 会社
ピリミスルファン・フェントラザミド剤	ヤイ豆つぶ250	(RS)-2'-[(4,6-ジメチルピリミジン-2-イル)(ヒドロキシメチル)-1,1-ジフルオロ-6-(メキシメチル)メタン]ホルホンアニリド...2.0%, 4-(2-クロロフェニル)-N-シクロヘキシル-N-エチル-4,5-ジヒドロ-5-オキソ-1H-テトラゾール-1-カルボキサミド...12.0%	粒剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ヘオモダ(北海道、東北、九州)、ヒルムシロ、セリ(北陸を除く)、アオミドロ・藻類による表層はく離(近畿・中国・四国、九州)	全域の普通期栽培地帯及び関東・東山・東海、九州の早期栽培地帯	壤土～壇土	250g/10a	移植後3日～ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	湛水散布又は湛水周縁散布	本剤の使用回数...1回、ピリミスルファンを含む農薬の総使用回数...2回以内、フェントラザミドを含む農薬の総使用回数...1回	アイ化学工業(株)
ピリミスルファン・メフェナセツト粒剤	ムソウ1キロ粒剤	(RS)-2'-[(4,6-ジメチルピリミジン-2-イル)(ヒドロキシメチル)-1,1-ジフルオロ-6-(メキシメチル)メタン]ホルホンアニリド...0.50%, 2-ベンゾチアゾール-2-イルオキシ-N-メチルアセトアニリド...12.0%	粒剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ヘオモダ(北海道)、ヒルムシロ(北陸を除く)、セリ(北陸を除く)、アオミドロ・藻類による表層はく離(北海道)	全域(東北、近畿・中国・四国を除く)の普通期及び早期栽培地帯 東北 砂壤土～壇土	壇土～壇土	1kg/10a	移植後3日～ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで	湛水散布	本剤の使用回数...1回、ピリミスルファンを含む農薬の総使用回数...2回以内、メフェナセツトを含む農薬の総使用回数...2回以内	日本農薬(株)
オキサジクロメホン・ピリミスルファン粒剤	マイウェイ1キロ粒剤	3-[1-(3,5-ジクロロフェニル)-1-メチルエチル]-3,4-ジヒドロ-6-メチル-5-フェニル-2H-1,3-オキサジノン-4-オン...0.80%, (RS)-2'-[(4,6-ジメチルピリミジン-2-イル)(ヒドロキシメチル)-1,1-ジフルオロ-6-(メキシメチル)メタン]ホルホンアニリド...0.55%	粒剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ヘオモダ(北海道、東北、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離(近畿・中国・四国、九州))	東北 砂壤土～壇土	砂壤土～壇土	1kg/10a	移植後3日～ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで	湛水散布	本剤の使用回数...1回、オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数...2回以内、ピリミスルファンを含む農薬の総使用回数...2回以内	アイ化学工業(株)
オキサジクロメホン・ピリミスルファン剤	マイウェイジャンボ	3-[1-(3,5-ジクロロフェニル)-1-メチルエチル]-3,4-ジヒドロ-6-メチル-5-フェニル-2H-1,3-オキサジノン-4-オン...2.4%, (RS)-2'-[(4,6-ジメチルピリミジン-2-イル)(ヒドロキシメチル)-1,1-ジフルオロ-6-(メキシメチル)メタン]ホルホンアニリド...2.2%	粒剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ヘオモダ(北海道、東北、ヒルムシロ、セリ)	北陸、関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯 全域(北陸、関東・東山・東海を除く)の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～壇土 壇土～壇土	小包装(パック)10個(250g)/10a	移植後3日～ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。	本剤の使用回数...1回、オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数...2回以内、ピリミスルファンを含む農薬の総使用回数...2回以内	アイ化学工業(株)
オキサジクロメホン・ピリミスルファン剤	マイウェイ豆つぶ250	3-[1-(3,5-ジクロロフェニル)-1-メチルエチル]-3,4-ジヒドロ-6-メチル-5-フェニル-2H-1,3-オキサジノン-4-オン...2.4%, (RS)-2'-[(4,6-ジメチルピリミジン-2-イル)(ヒドロキシメチル)-1,1-ジフルオロ-6-(メキシメチル)メタン]ホルホンアニリド...2.2%	粒剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ヘオモダ(北海道、東北、ヒルムシロ、セリ)	北陸、関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯 全域(北陸、関東・東山・東海を除く)の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～壇土 壇土～壇土	250g/10a	移植後3日～ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	湛水散布又は湛水周縁散布	本剤の使用回数...1回、オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数...2回以内、ピリミスルファンを含む農薬の総使用回数...2回以内	アイ化学工業(株)
オキサジクロメホン・ピリミスルファン粒剤	マイウェイゼロ1キロ粒剤	3-[1-(3,5-ジクロロフェニル)-1-メチルエチル]-3,4-ジヒドロ-6-メチル-5-フェニル-2H-1,3-オキサジノン-4-オン...0.60%, (RS)-2'-[(4,6-ジメチルピリミジン-2-イル)(ヒドロキシメチル)-1,1-ジフルオロ-6-(メキシメチル)メタン]ホルホンアニリド...0.50%	粒剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ヘオモダ(北海道、東北、ヒルムシロ、セリ(北陸を除く))	北陸、関東・東山・東海、近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯 北海道、東北、九州の普通期及び早期栽培地帯 北陸、関東・東山・東海、近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯 北海道、東北	砂壤土～壇土 壇土～壇土 砂壤土～壇土 壇土～壇土	1kg/10a	移植時 移植直後～ノビエ2葉期 但し、移植後30日まで 移植直後～ノビエ1.5葉期 但し、移植後30日まで	田植同時散布機で施用 湛水散布	本剤の使用回数...1回、オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数...2回以内、ピリミスルファンを含む農薬の総使用回数...2回以内	アイ化学工業(株)

原稿(水稲)

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物 名	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用 量	使用時期	使用 方法	使用回数	登録 会社
イマノス ルフロ ン・フ ェント ラザミ ド・ブ ロモ ブチ ド粒剤	マクダス1 キロ粒剤	1-(2-クロロイミダゾ[1,2-a]ピリジン-3-イルスルホニル)-3-(4,6-ジメチルピリミジン-2-イル)尿素... 0.90%, 4-(2-クロロフェニル)-N-シクロヘキシル-N-エチル-4,5-ジヒドロ-5-オキソ-1H-テトラゾール-1-カルボキシド...3.0%, (RS)-2-ブロモ-N-(α , α -ジメチルベンシル)-3,3-ジメチルプロピルアミド...9.0%	粒 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ヘラオモダカ(北海道、東北)、ヒルムシロ、セリ、シズイ(東北)、クロクワイ(東北、関東・東山・東海、近畿・中国・四国)、コウキガラ(関東・東山・東海)、アオミドロ・藻類による表層はく離	全域の普通期及び早期栽培地帯	砂壌土～埴土	1kg/ 10a	移植時	田植同時散布機で施用	本剤の使用回数...1回、イマノスルフロンを含む農薬の総使用回数...2回以内、フェントラザミドを含む農薬の総使用回数...1回、ブロモブチドを含む農薬の総使用回数...2回以内	㈨日 本ク リー ンア ンド ガー デ ン
				直 播 水 稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、セリ	全域			稲1葉期～ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	湛水散布		
プロピ リス ルフロ ン粒 剤	ゼータ ワン1 キロ粒 剤	1-(2-クロロ-6-プロピルイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-3-イルスルホニル)-3-(4,6-ジメチルピリミジン-2-イル)尿素...0.90%	粒 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ヘラオモダカ(北海道)、ヒルムシロ、セリ(九州を除く)	全域の普通期及び早期栽培地帯	砂壌土～埴土	1kg/ 10a	移植後5日～ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布	本剤の使用回数...2回以内、プロピリスルフロンの総使用回数...2回以内	住友 化学 ㈨、協 友ア グリ ㈨
プロピ リス ルフロ ン水 和剤	ゼータ ワンフ ロア ブル	1-(2-クロロ-6-プロピルイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-3-イルスルホニル)-3-(4,6-ジメチルピリミジン-2-イル)尿素...1.7%	水 和 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ヘラオモダカ(北海道、東北)、ヒルムシロ、セリ(北陸、九州を除く)	東北 全域(東北を除く)の普通期及び早期栽培地帯	砂壌土～埴土 埴土～埴土	500m L/10 a	移植後5日～ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	原液湛水散布	本剤の使用回数...2回以内、プロピリスルフロンの総使用回数...2回以内	住友 化学 ㈨、協 友ア グリ ㈨
プロピ リス ルフロ ン粒 剤	ゼータ ワンジ ン ボ	1-(2-クロロ-6-プロピルイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-3-イルスルホニル)-3-(4,6-ジメチルピリミジン-2-イル)尿素...2.25%	粒 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ(北海道、東北)、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤカグサ(北海道)、オモダカ、クロクワイ(北海道を除く)、コウキガラ(関東・東山・東海、九州)	全域の普通期及び早期栽培地帯	砂壌土～埴土	小包装 (ハッ ク)10 個 (400g)/10a	移植後5日～ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	水田に小包装(ハック)のまま投げ入れる。	本剤の使用回数...1回、プロピリスルフロンを含む農薬の総使用回数...2回以内	住友 化学 ㈨、協 友ア グリ ㈨
ビラ クロ ニ ル・ブ ロビ リス ルフロ ン粒 剤	メガゼ ータ ジ ン ボ	1-(3-クロロ-4,5,6,7-テトラヒドロピラゾ[1,5-a]ピリジン-2-イル)-5-[メチル(プロパ-2-イル)-5-アミド]ピラゾール-4-カルボニル...5.0%, 1-(2-クロロ-6-プロピルイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-3-イルスルホニル)-3-(4,6-ジメチルピリミジン-2-イル)尿素...2.25%	粒 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ(北海道、東北)、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離(北陸、関東・東山・東海、近畿・中国・四国)	北海道 全域(北海道、九州を除く)の普通期及び早期栽培地帯 九州の普通期及び早期栽培地帯	埴土～埴土 砂壌土～埴土	小包装 (ハッ ク)10 個 (400g)/10a	移植後5日～ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	水田に小包装(ハック)のまま投げ入れる。	本剤の使用回数...1回、ビラクロニルを含む農薬の総使用回数...2回以内、プロピリスルフロンを含む農薬の総使用回数...2回以内	住友 化学 ㈨、協 友ア グリ ㈨

原稿(水稲)

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作 物 名	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使 用 量	使 用 時 期	使 用 方 法	使 用 回 数	登 録 社
ビラクロニ ル・プロビ リスルフロ ン水和剤	メガゼー タフロアプ ル	1-(3-クロロ-4,5,6,7-テ ラヒドロピラゾロ[1,5-a]ピ リジン-2-イル)-5-[メチル (プロパ-2-イル)アミ]ピ ラゾール-4-カルボニ ル...9.9%, 1-(2-クロロ- 6-プロピルイタゾ[1,2- b]ピリタジン-3-イルスルホ ニル)-3-(4,6-ジメチル ピリジン-2-イル)尿素... 1.7%	水 和 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑 草、マツバイ、ホ タテ、ウリカワ、ミ ズカヤツリ(北海道 を除く)、ヘラオ モグ(北海道、東 北)、ヒルムシロ、 セリ、エンノコ、サ ヤカサ(北海道、 東北)、シバ、オ モグ(北海道、東 北)、アオミドロ、 藻類による表層 はく離(関東・ 東北・東海、近 畿・中国・四国、 九州)	北海道 全域(北海道、 九州を除く)の 普通期及び早 期栽培地帯 九州の普通期 及び早期栽培 地帯	壤土～埴土 砂壤土～埴土	500m L/10 a	移植後5日～ ビエ3葉期 だ だし、移植後30 日まで 移植後5日～ ビエ2.5葉期 ただし、移植後30 日まで	原液 湛水 散布	本剤の使用回数... 1回、ビラクロニルを 含む農薬の総使用 回数...2回以内、プ ロビリスルフロ ンを含む農薬の総使用回 数...2回以内	住友 化学 ㈱、協 友アグ リ㈱
ビラクロニ ル・プロビ リスルフロ ン粒剤	メガゼー タ1キロ粒 剤	1-(3-クロロ-4,5,6,7-テ ラヒドロピラゾロ[1,5-a]ピ リジン-2-イル)-5-[メチル (プロパ-2-イル)アミ]ピ ラゾール-4-カルボニ ル...2.0%, 1-(2-クロロ- 6-プロピルイタゾ[1,2- b]ピリタジン-3-イルスルホ ニル)-3-(4,6-ジメチル ピリジン-2-イル)尿素... 0.90%	粒 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑 草、マツバイ、ホ タテ、ウリカワ、ミ ズカヤツリ(北海道 を除く)、ヘラオ モグ(北海道、東 北)、ヒルムシロ、 セリ、エンノコ、サ ヤカサ(北海道、 東北)、アオミ ドロ、藻類による 表層はく離(北 海道、東北を除 く)	北海道 全域(北海道、 九州を除く)の 普通期及び早 期栽培地帯 九州の普通期 及び早期栽培 地帯	壤土～埴土 砂壤土～埴土	1kg/ 10a	移植後5日～ ビエ3葉期 だ だし、移植後30 日まで 移植後5日～ ビエ2.5葉期 ただし、移植後30 日まで	湛水 散布	本剤の使用回数... 1回、ビラクロニルを 含む農薬の総使用 回数...2回以内、プ ロビリスルフロ ンを含む農薬の総使用回 数...2回以内	住友 化学 ㈱、協 友アグ リ㈱
シクロスル ファミロ ン・ベンゾ ビシクロ ン・ベント キサゾン 粒剤	半蔵1キ ロ粒剤	1-(2-[シクロプロピルカル ボニル]アミノ)スルホニル- 3-(4,6-ジメチルピリジ ン-2-イル)尿素... 0.50%, 3-(2-クロロ-4-メ チルベンゾイル)-2-フェニ ルチオピリジン[3,2,1]オク タ-2-エン-4-オン...2.0%, 3-(4-クロロ-5-シクロヘ ンチルオキシ)-2-フルオロ フェニル)-5-イソプロピル ピリジン-2-イル)-2,4-ジ オキシ...3.9%	粒 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑 草、マツバイ、ホ タテ、ウリカワ、ヘ ラオモグ(北海道、 東北)、ミズカヤツ リ(北海道を除く)、 ヒルムシロ、ア オミドロ、藻類による 表層はく離(北 海道、東北、東 海、関東、近畿・ 中国・四国)	全域(東北、近 畿・中国・四国 を除く)の普通 期及び早期栽 培地帯 東北、近畿・中 国・四国の普通 期及び早期栽 培地帯 全域(東北、近 畿・中国・四国 を除く)の普通 期及び早期栽 培地帯 東北、近畿・中 国・四国の普通 期及び早期栽 培地帯	壤土～埴土 砂壤土～埴土 壤土～埴土 砂壤土～埴土	1kg/ 10a	移植時 移植直後～ ビエ1.5葉期 だ だし、移植後30 日まで	田植 同時 散布 機で 施用 湛水 散布	本剤の使用回数... 1回、シクロスルファミ ロンを含む農薬の 総使用回数...1回、 ベンゾビシクロ ンを含む農薬の総使用 回数...2回以内、 ベントキサゾンを含む 農薬の総使用回 数...2回以内	BASF ジャパン ㈱
フェントラ ザミド・ブ ロモブチ ド・ベンソ ルフロ ン・ベン チル粒剤	イノーバ ト1キロ 粒剤51	4-(2-クロロフェニル)-N-シ クロヘキシル-N-エチル- 4,5-ジヒドロ-5-オキソ- 1H-テトラゾール-1-カルボ キサミド...3.0%, (RS)-2- プロモ-N-(α , α -ジメチ ルベンジル)-3,3-ジメチ ルブチルアミド...9.0%, メ チル- α -(4,6-ジメチルピ リジン-2-イル)カルボニ ルアミド...0.51%	粒 剤	移 植 水 稲	水田一年生雑 草、マツバイ、ホ タテ、ウリカワ、ヒ ルムシロ、セリ、 アオミドロ、藻 類による表層 はく離(北海道、 関東・東海、東 北、近畿・中国・ 四国)	北陸、近畿・中 国・四国の普通 期及び早期栽 培地帯 関東・東海・東 北、九州の普通 期及び早期栽 培地帯 北陸、近畿・中 国・四国の普通 期及び早期栽 培地帯 関東・東海・東 北、九州の普通 期及び早期栽 培地帯	砂壤土～埴土 壤土～埴土 砂壤土～埴土 壤土～埴土	1kg/ 10a	移植時 移植直後～ ビエ2.5葉期 だ だし、移植後30 日まで	田植 同時 散布 機で 施用 湛水 散布	本剤の使用回数... 1回、フェントラザミ ドを含む農薬の総使 用回数...1回、ブ ロモブチドを含む農 薬の総使用回数...2 回以内、ベンソルフ ロンを含む農薬の 総使用回数...2 回以内	バイエル クロップ サイエ ンス㈱

原稿(水稲)

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物 名	適用雑草	適用地域	適用土壌	使用 量	使用時期	使用 方法	使用回数	登録 会社
ピラゾ レート・ブ レチラク ロール・メ ソトリオン 粒剤	カミオン MX1キロ 粒剤	4-(2,4-ジクロロベンゾイ ル)-1,3-ジメチル-5-ピラ ゾリル-ポトルエンズルホネ ート...12.0%, 2-クロロ 2',6'-ジエチル-N-(2-ア ロホキシエチル)アセトアニリ ド...4.5%, 2-(4-メシル- 2-ニトロベンゾイル)シクロヘ キサ-1,3-ジオン... 0.90%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生雑 草、マツバ、イ、ホ タ、ウリカワ、ミズ カヤツリ(北海道 を除く)、ヘラオモ タ(北海道、東 北)、ヒルムシロ	北海道、関東・東 山・東海、九 州の普通期及 び早期栽培地 帯	壤土～埴土	1kg/ 10a	移植時	田植 同時 散布 機で 施用	本剤の使用回数... 1回、ピラゾレートを含 む農薬の総使用 回数...2回以内、ブ レチラクロールを含 む農薬の総使用回 数...2回以内、メソ トリオンを含む農薬 の総使用回数...2回 以内	シンジ ェン タ、 ジャ ン、 ベン (株)、 三井 化学 ア グロ 関
						東北、北陸、近 畿・中国・四国 の普通期及び 早期栽培地帯	砂壤土～埴土					
						北海道、関東・東 山・東海、九 州の普通期及 び早期栽培地 帯	壤土～埴土					
						東北、北陸、近 畿・中国・四国 の普通期及び 早期栽培地帯	砂壤土～埴土					
ペンスル フロメチ ル・ペン シクロ ン・ペント キサゾン 粒剤	ブレス テージ1 キログラ 75	メチル- α -(4,6-ジメチル ピリミジン-2-イルカルバモ イルスルファモイル)-オトル アート...0.75%, 3-(2-ク ロロ-4-メシルベンゾイル)- 2-フェニルチオピシクロ [3.2.1]オクタ-2-エン-4- オン...2.0%, 3-(4-クロ ロ-5-シクロペンチルオキシ 2-フルオロフェニル)-5-イソ プロピリデン-1,3-オキサゾ リジン-2,4-ジオン... 3.6%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生雑 草、マツバ、イ、ホ タ、ウリカワ、ミズ カヤツリ(東 北)、ウリカワ、ヒルム シロ、セリ	北海道	壤土～埴土	1kg/ 10a	移植時	田植 同時 散布 機で 施用	本剤の使用回数... 1回、ペンスルフロ メチルを含む農薬 の総使用回数...2回 以内、ペンシクロ ンを含む農薬の総 使用回数...2回以 内、ペントキサゾン を含む農薬の総使用 回数...2回以内	科 研 製 薬 (株)
						東北	砂壤土～埴土					
						北海道	壤土～埴土					
						東北	砂壤土～埴土					
ペンスル フロメチ ル・ペン シクロ ン・ペント キサゾン 粒剤	ブレス テージ1 キログラ 51	メチル- α -(4,6-ジメチル ピリミジン-2-イルカルバモ イルスルファモイル)-オトル アート...0.51%, 3-(2-ク ロロ-4-メシルベンゾイル)- 2-フェニルチオピシクロ [3.2.1]オクタ-2-エン-4- オン...2.0%, 3-(4-クロ ロ-5-シクロペンチルオキシ 2-フルオロフェニル)-5-イソ プロピリデン-1,3-オキサゾ リジン-2,4-ジオン... 3.6%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生雑 草、マツバ、イ、ホ タ、ウリカワ、ミズ カヤツリ、セリ	北陸、関東・東 山・東海、九州 の普通期及び 早期栽培地帯	壤土～埴土	1kg/ 10a	移植時	田植 同時 散布 機で 施用	本剤の使用回数... 1回、ペンスルフロ メチルを含む農薬 の総使用回数...2回 以内、ペンシクロ ンを含む農薬の総 使用回数...2回以 内、ペントキサゾン を含む農薬の総使用 回数...2回以内	科 研 製 薬 (株)
						近畿・中国・西 国の普通期及 び早期栽培地 帯	砂壤土～埴土					
						北陸、関東・東 山・東海、九州 の普通期及び 早期栽培地帯	壤土～埴土					
						近畿・中国・西 国の普通期及 び早期栽培地 帯	砂壤土～埴土					
クミル ロン・ペン スルフロ メチル・ペ ントキサ ゾン粒剤	ドウジ ガード1キ ログラ75	1-(2-クロロベンジル)-3- (1-メチル-1-フェニルエチ ル)ウレア...12.0%, メチル- α -(4,6-ジメチルピリミジ ン-2-イルカルバモイルスル ファモイル)-オトルアート... 0.75%, 3-(4-クロロ-5-シ クロペンチルオキシ-2-フル オロフェニル)-5-イソプロ ピリデン-1,3-オキサゾリ ジン-2,4-ジオン...3.9%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生雑 草、マツバ、イ、ホ タ、ウリカワ、ミズ カヤツリ(東 北)、ウリカワ、ヒルム シロ、セリ	北海道	壤土～埴土	1kg/ 10a	移植時	田植 同時 散布 機で 施用	本剤の使用回数... 1回、クミルロンを含 む農薬の総使用回 数...2回以内、ペン スルフロメチルを含 む農薬の総使用回 数...2回以内、ペ ントキサゾンを含む 農薬の総使用回 数...2回以内	石 原 産 業 (株)、科 研製薬 (株)、丸 紅
						東北	砂壤土～埴土					
						北海道	壤土～埴土					
						東北	砂壤土～埴土					

原稿(水稲)

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物 名	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用 量	使用時期	使用 方法	使用回数	登録 会社
グミルロ ン・ペン スル フロ ンメ チ ル・ベ ン ト キ サ ン 粒 剤	ドゥジ ガード1キ ロ粒剤51	1-(2-クロロベンジル)-3- (1-メチル-1-フェニルエチ ル)ウレブ...12.0%,メチル α-(4,6-ジメトキシピリミ ジ-2-イルカルバモイルス ルファミル)-オトルアト... 0.51%,3-(4-クロロ-5-シ クロベンチルオキシ-2-フル オロフェニル)-5-イソプロ ピリデン-1,3-オキサゾリ ジン-2,4-ジオン...3.9%	粒 剤	移植 水 稲	水田一年生雑 草、マツハ、イ、ホ ルイ、ヘラオモガカ (九州)、ミズガヤツ リ、ウリカワ、ヒルムシ ロ(関東・東山・東 海、近畿・中国・四 国、四国)、セリ	北陸、九州の普 通期及び早期 栽培地帯	壤土～埴土	1kg/ 10a	移植時	田植 同時 散布 機で 施用	本剤の使用回数... 1回、グミルロンを 含む農薬の総使用 回数...2回以内、ペン スルフロンメチルを 含む農薬の総使用 回数...2回以内、ベ ントキサゾンを含む 農薬の総使用回 数...2回以内	石原 産業 (株)、科 研製 薬(株)、丸 紅 (株)
						関東・東山・東 海、近畿・中国・ 四国の普通期 及び早期栽培 地帯	砂壤土～埴土					
						北陸、九州の普 通期及び早期 栽培地帯	埴土～埴土		移植直後～バ エ2.5葉期 だ だし、移植後30日 まで	流水 散布		
						関東・東山・東 海、近畿・中国・ 四国の普通期 及び早期栽培 地帯	砂壤土～埴土					
カフエンス トロー ル・ ダイ ム ロ ン・ ペン ス ル フ ロ ン メ チ ル・ ベ ン ト キ サ ン 水 和 剤	イネパ ン ティ ー エ フ ロ ア ブ ル	N,N-シエチル-3-メチル スルホニル-1H-1,2,4-トリ アゾール-1-カルボキサミ ド...3.9%,1-(α,α- ジメチルベンジル)-3-(ハ ラトリル)尿素...27.8%,メ チル=α-(4,6-ジメトキシ ピリミジ-2-イルカルバモ イルスルファミル)-オトル アト...0.94%,3-(4-クロ ロ-5-シクロベンチルオキ シ-2-フルオロフェニル)- 5-イソプロピリデン-1, 3-オキサゾリジン-2,4- ジオン...4.6%	水 和 剤	移植 水 稲	水田一年生雑 草、マツハ、イ、ホ ルイ、ミズガヤツ、 ウリカワ、ヒルムシ ロ、アオドロ、藻 類による表層 はく離(関東・東 山・東海)	関東・東山・東 海の普通期及 び早期栽培地 帯	砂壤土～埴土	500m L/10 a	移植直後～バ エ2.5葉期 だ だし、移植後30日 まで	原液 流水 散布	本剤の使用回数... 1回、カフエンス トロールを含む農薬 の総使用回数...1 回、ダイムロンを含む 農薬の総使用回 数...3回以内(育苗 箱散布は1回以内、 本田では2回以内)、 ペンスルフロンメ チルを含む農薬の 総使用回数...2回 以内、ベントキサ ゾンを含む農薬の 総使用回数...2回 以内	科 研 製 薬 (株)
						北陸、近畿・中 国、四国の普 通期及び早期 栽培地帯			移植直後～バ エ2葉期 だ だし、移植後30日 まで			
ベントキ サゾン水 和剤	ベアスフ ロアブル	3-(4-クロロ-5-シクロベン チルオキシ-2-フルオロフェ ニル)-5-イソプロピリデン -1,3-オキサゾリジン-2,4- ジオン...2.9%	水 和 剤	移植 水 稲	水田一年生雑 草、マツハ、イ	全域の普通期 及び早期栽培 地帯	砂壤土～埴土	500m L/10 a	移植時	田植 同時 散布 機で 施用	本剤の使用回数... 2回以内、ベントキ サゾンを含む農薬 の総使用回数...2回 以内	宇 都 宮 化 成 工 業 有 限 公 司
						近畿・中国・四 国、九州			植代後～移植 前4日または移 植直後～バエ 発生始期 だ だし、移植後30日 まで	原液 流水 散布 又は 水口 施用		
ベントキ サゾン粒 剤	ベアス1キ ロ粒剤	3-(4-クロロ-5-シクロベン チルオキシ-2-フルオロフェ ニル)-5-イソプロピリデン -1,3-オキサゾリジン-2,4- ジオン...1.5%	粒 剤	移植 水 稲	水田一年生雑 草、マツハ、イ	全域の普通期 及び早期栽培 地帯	砂壤土～埴土	1kg/ 10a	移植時	田植 同時 散布 機で 施用	本剤の使用回数... 2回以内、ベントキ サゾンを含む農薬 の総使用回数...2回 以内	宇 都 宮 化 成 工 業 有 限 公 司
						九州			植代後～移植 前4日または移 植直後～バエ 発生始期 だ だし、移植後30日 まで	流水 散布		
				い ぐ さ	水田一年生雑 草				植付後～生育 期(雑草発生前)			

原稿(水稻)

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作 物 名	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使 用 量	使 用 時 期	使 用 方 法	使 用 回 数	登 録 会 社
ピラゾキシ フェン・ペ ンゾビシク ロン水和 剤	プレキ プロア ブル	2-[4-(2,4-ジクロロベン ゾイル)-1,3-ジメチルピラ ゾール-5-イルオキシ]アセ トフェン...20.0%, 3-(2-ク ロロ-4-メチルベンゾイル)- 2-フェニルチオピシクロ [3.2.1]オクタ-2-エン-4- オン...4.0%	水 和 剤	移植 水 稲	水田一年生雑 草、マツハイ、ホ ルイ、ヘラオモダカ (東北)、ミズガヤツ リ、ウリカワ、ヒルムシ ロ	東北 北陸	砂壌土～壇土 壤土～壇土	500m L/10 a	移植後～移植4 日前または移植 直後～ビエ1葉 期 但し移植後 30日まで	原液 湛水 散布	本剤の使用回数... 1回、ピラゾキシフ ェンを含む農薬の総 使用回数...2回以 内、ペンゾビシクロ ンを含む農薬の総使 用回数...2回以内	石原 産業 ㈱
カフェンス トロール・ ダイムロ ン・ピラゾ キシフェ ン・ペンゾ ビシクロ ン水和剤	トビキリ フロア ブル	N,N-ジエチル-3-メチル スルホニル-1H-1,2,4-トリ アゾール-1-カルボキサミ ド...4.2%, 1-(α , α -ジ メチルベンゾイル)-3-(ハ トリル)尿素...8.4%, 2- [4-(2,4-ジクロロベンゾイ ル)-1,3-ジメチルピラゾ ール-5-イルオキシ]アセトフェ ン...20.0%, 3-(2-クロ ロ-4-メチルベンゾイル)-2- フェニルチオピシクロ[3.2.1] オクタ-2-エン-4-オン... 4.0%	水 和 剤	移植 水 稲	水田一年生雑 草、マツハイ、ホ ルイ、ヘラオモダカ (北海道、東 北)、ミズガヤツ リ(北海道を除 く)、ウリカワ、ヒルム シロ、アオミドロ・藻 類による表層 はく離(関東・東 山・東海、九州)	北海道、近畿・ 中国・四国の 普通期栽培地 帯、九州の普 通期及び早期 栽培地帯 東北・関東・東 山・東海の普 通期及び早期 栽培地帯 北陸	壇土～壇土 砂壌土～壇土	500m L/10 a	移植後3日～ノ ビエ2.5葉期 但 し移植後30日 まで 移植後3日～ノ ビエ2.5葉期 但 し移植後30日 まで	原液 湛水 散布	本剤の使用回数... 1回、カフェンス トロールを含む農 薬の総使用回数... 1回、ダイムロンを 含む農薬の総使用 回数...3回以内(育 苗箱散布は1回以 内、本田では2回以 内)、ピラゾキシフ ェンを含む農薬の 総使用回数...2回 以内、ペンゾビシ クロンを含む農薬 の総使用回数...2 回以内	石原 産業 ㈱
カフェンス トロール・ ダイムロ ン・ピラゾ キシフェ ン・ペンゾ ビシクロ ン粒剤	トビキリ50 0グラム粒 剤	N,N-ジエチル-3-メチル スルホニル-1H-1,2,4-トリ アゾール-1-カルボキサミ ド...4.2%, 1-(α , α -ジ メチルベンゾイル)-3-(ハ トリル)尿素...8.4%, 2- [4-(2,4-ジクロロベンゾイ ル)-1,3-ジメチルピラゾ ール-5-イルオキシ]アセトフェ ン...20.0%, 3-(2-クロ ロ-4-メチルベンゾイル)-2- フェニルチオピシクロ[3.2.1] オクタ-2-エン-4-オン... 4.0%	粒 剤	移植 水 稲	水田一年生雑 草、マツハイ、ホ ルイ、ヘラオモダカ , ウリカワ、ヒルム シロ	北海道	壇土～壇土	500g/ 10a	移植後3日～ノ ビエ2.5葉期 但 し移植後30日 まで	湛水 散布 又は 湛水 周縁 散布	本剤の使用回数... 1回、カフェンス トロールを含む農 薬の総使用回数... 1回、ダイムロンを 含む農薬の総使用 回数...3回以内(育 苗箱散布は1回以 内、本田では2回以 内)、ピラゾキシフ ェンを含む農薬の 総使用回数...2回 以内、ペンゾビシ クロンを含む農薬 の総使用回数...2 回以内	石原 産業 ㈱
アジス スルフロ ン・カフ ェンス トロール・ ピラゾ キシフェ ン・ペン ゾビシク ロン粒剤	ブロード カット1キ ロ粒剤	1-(4,6-ジメチルピリミ ジン-2-イル)-3-[1-メチル 4-(2-メチル-2H-テラ ゾール-5-イル)ピラゾール- 5-イルスルホニル]尿素... 0.12%, N,N-ジエチル-3- メチルスルホニル-1H- 1,2,4-トリアゾール-1-カル ボキサミド...2.1%, 2-[4- (2,4-ジクロロベンゾイ ル)-1,3-ジメチルピラゾ ール-5-イルオキシ]アセトフェ ン...10.0%, 3-(2-クロ ロ-4-メチルベンゾイル)-2- フェニルチオピシクロ[3.2.1] オクタ-2-エン-4-オン... 2.0%	粒 剤	移植 水 稲	水田一年生雑 草、マツハイ、ホ ルイ、ヘラオモダカ (北海道、東 北)、ミズガヤツ リ(北海道を除 く)、ウリカワ、ヒルム シロ、セリ(東北を 除く)、アオミドロ・ 藻類による表 層はく離(関東・ 東山・東海)	北海道、関東・ 東山・東海、九 州の普通期及 び早期栽培地 帯 東北、北陸、近 畿・中国・四 国の普通期及 び早期栽培地 帯	壇土～壇土 砂壌土～壇土	1kg/ 10a	移植後5日～ノ ビエ2.5葉期 但 し移植後30日 まで	湛水 散布	本剤の使用回数... 1回、アジススル フロンの総使用回 数...1回、カフ ェンストロールを 含む農薬の総使 用回数...1回、ピ ラゾキシフェン を含む農薬の総 使用回数...2回 以内、ペンゾビ シクロンを含む 農薬の総使用回 数...2回以内	石原 産業 ㈱
シメトリ ン・ペノ キスラ ム・MC PB粒剤	バイゴ ールSM1キ ロ粒剤	2-メチルチオ-4,6-ビス(エ チルアミノ)-s-トリアジン... 4.5%, 3-(2,2-シフルオ ロエチキ)-N-(5,8-ジメチ キ[1,2,4]トリアゾ)[1,5-c] ビリジン-2-イル)- α , α , α -トリフルオロエ ン-2-スルホナミド...0.30%, 2-メチル-4-クロロフェ ニルチオピシクロ エチル...2.4%	粒 剤	移植 水 稲	水田一年生雑 草、マツハイ、ホ ルイ、ウリカワ、ミ ズガヤツリ、ヘ ラオモダカ(東 北)、ヒルムシ ロ、アオミドロ・藻 類による表層 はく離(東北)	東北、関東・東 山・東海の普 通期及び早期 栽培地帯 近畿・中国・四 国の普通期裁 培地帯	壇土～壇土 砂壌土～壇土	1kg/ 10a	移植後15日～ノ ビエ3.5葉期 但 し移植後30日 まで	湛水 散布	本剤の使用回数... 1回、シメトリ ンを含む農薬の 総使用回数...2 回以内、ペノキ スラムを含む農 薬の総使用回数... 2回以内、MC PBを含む農薬の 総使用回数...2 回以内	北興 化学 工業 ㈱