

新登録除草剤・植物成長調整剤一覧

農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課

(1) 水稲作(移植・直播)

平成23年4月1日～平成23年10月31日

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作 物 名	適用雑草	適用地帯	適用 土壌	使用量	使用時期	使用 方法	使用回数	登録 会社
プロモブチド・ベン ンスルフロ ンメチル・ベン チオ カーブ・ メフェナ セット粒 剤	パワーウ ルフ1キ ロ粒剤7 5	(RS)-2-プロモ-N-(α , α -ジメチルベンジル)-3,3-ジメチルブチルアミド... 9.0%, メチル= α -(4,6-ジメキシピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-オートルアト...0.75%, S-(4-クロベンジル)-N,N-ジエチルチオカーバメート... 15.0%, 2-ベンゾチアゾール-2-イルオキシ-N-メチルアセトアニリド...4.5%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生 雑草、マツバイ、 ホタルイ、ウリカワ、 ミスガヤツリ(東 北)、ヘラオモダ カ、オモダカ(東 北)、クログワイ (東北)、シズイ (東北)、ヒルムシ ロ、セリ、アミド ロ・藻類による 表層はく離	北海道、東北	砂壤土 ～ 埴土	1kg/10a	移植直後～ 2.5葉期但し、移植 後30日まで	湛水散 布	本剤の使用 回数...1回、 プロモブチド を含む農薬 の総使用回 数...2回以 内、ベンスル フロンメチル を含む農薬 の総使用回 数...2回以 内、ベンチオ カーブを含む 農薬の総使 用回数...1 回、メフェナ セットを含む 農薬の総使 用回数...2 回以内	クマイ化 学工業 ㈱
				直播 水稲	水田一年生 雑草、マツバイ、 ホタルイ、ウリカワ、 ミスガヤツリ、ヘ ラオモダカ、ヒル ムシロ、セリ		埴土～ 埴土		イネ1葉期～ 2.5葉期 但し、収 穫90日前まで			
プロモブチド・ベン ンスルフロ ンメチル・ベン チオ カーブ・ メフェナ セット粒 剤	パワーウ ルフ1キ ロ粒剤5 1	(RS)-2-プロモ-N-(α , α -ジメチルベンジル)-3,3-ジメチルブチルアミド... 9.0%, メチル= α -(4,6-ジメキシピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-オートルアト...0.51%, S-(4-クロベンジル)-N,N-ジエチルチオカーバメート... 15.0%, 2-ベンゾチアゾール-2-イルオキシ-N-メチルアセトアニリド...3.0%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生 雑草、マツバイ、 ホタルイ、ウリカワ、 ミスガヤツリ、ヘ ラオモダカ(九 州)、オモダカ (関東・東山・ 東海、近畿・ 中国・四国、 九州)、クログ ワイ(関東・東 山・東海、近 畿・中国・四 国、九州)、コ キヤガラ(九 州)、ヒルムシ ロ、セリ、アミ ドロ・藻類による表 層はく離	全域(北海 道、東北を除 く)の普通期 及び早期栽 培地帯	砂壤土 ～ 埴土	1kg/10a	移植直後～ 2.5葉期但し、移植 後30日まで	湛水散 布	本剤の使用 回数...1回、 プロモブチド を含む農薬 の総使用回 数...2回以 内、ベンスル フロンメチル を含む農薬 の総使用回 数...2回以 内、ベンチオ カーブを含む 農薬の総使 用回数...1 回、メフェナ セットを含む 農薬の総使 用回数...2 回以内	クマイ化 学工業 ㈱
				直播 水稲	水田一年生 雑草、マツバイ、 ホタルイ、ウリカワ、 ミスガヤツリ、ヒ ルムシロ、セリ、アミ ドロ・藻類による表 層はく離	全域(北海 道、東北を除 く)			イネ1葉期～ 2.5葉期 但し、収 穫90日前まで			
ベンスル フロンメ チル・ベン チオ カーブ・ メフェナ セット粒 剤	クマイウ ルフエ ース 粒剤25	メチル= α -(4,6-ジメキシピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-オートルアト...0.25%, S-(4-クロベンジル)-N,N-ジエチルチオカーバメート...5.0%, 2-ベンゾチアゾール-2-イルオキシ-N-メチルアセトアニリド...1.5%	粒 剤	移植 水稲	水田一年生 雑草、マツバイ、 ホタルイ、ウリカワ、 ミスガヤツリ、ヘ ラオモダカ、ヒル ムシロ、アミド ロ・藻類による表層 はく離、エゾ/ナ ヤスカサ(北海 道)、シズイ(東 北)、セリ、オモ ダカ(東北)、クロ グワイ	北海道 東北	砂壤土 ～ 埴土 但し、移 植直後 ～移植 後4日の 砂壤土 は除く	3kg/10a	移植直後～ 2.5葉期但し、移植 後30日まで	湛水散 布	本剤の使用 回数...1回、 ベンスルフロ ンメチルを含 む農薬の総 使用回数... 2回以内、ベ ンチオカーブ を含む農薬 の総使用回 数...1回、メ フェナセット を含む農薬 の総使用回 数...2回以 内	クマイ化 学工業 ㈱
									移植直後～ 2.5葉期但し、移植 後30日まで			

(1) つづき

17-ア)

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作 物 名	適用雑草	適用地帯	適用 土壌	使用量	使用時期	使用 方法	使用回数	登録 会社
ペンシル フロント メチル・ベ ンチオ カーブ・ メフェナ セット粒 剤	クミアイ ウルフ エース 粒剤17	メチル=α-(4,6-ジメチル ピリジン-2-イルカルバモイ ルスルファモイル)-o-トルア ート・・・0.17%, S-(4-クロロベ ンジル)-N,N-ジエチルチオ カーバメート・・・5.0%, 2-ヘ ンゾチアゾール-2-イルオキシ -N-メチルアセトアニリド・・・ 1.0%	粒 剤	移植 水稻	水田一年生 雑草、マツバイ、 ホタルイ、ウリカワ、 ミスガヤツリ、クロ グワイ、オモダカ、 ヒルムシロ、セリ、ア オミドロ・藻類によ る表層はく離	関東・東山・ 東海、近畿・ 中国・四国、 九州の早期 栽培地帯	砂壤土 ～壇土 但し、移 植直後 ～移植 後4日の 砂壤土 は除く	3kg/10a	移植直後～ビエ2 葉期但し、移植後 30日まで	灌水散 布	本剤の使用 回数・・・1回、 ペンシルフロ ントメチルを含 む農薬の総 使用回数・・・ 2回以内、ベ ンチオカーブ を含む農薬 の総使用回 数・・・1回、メ フェナセット を含む農薬 の総使用回 数・・・2回以 内	グアイ化 学工業 ㈱
				直播 水稻	水田一年生 雑草、マツバイ、 ホタルイ、ウリカワ、 ミスガヤツリ、ヒル ムシロ、セリ、アオ ミドロ・藻類によ る表層はく離	北陸、関東・ 東山・東海、 近畿・中国・ 四国	壇土～ 壇土	イネ1葉期～ビエ2 葉期 但し、収穫90 日前まで				
ペンシル フロント メチル・ベ ンチオ カーブ・ メフェナ セット粒 剤	クミアイ ウルフ エース1 キロ粒剤 75	メチル=α-(4,6-ジメチル ピリジン-2-イルカルバモイ ルスルファモイル)-o-トルア ート・・・0.75%, S-(4-クロロベ ンジル)-N,N-ジエチルチオ カーバメート・・・15.0%, 2- ヘンゾチアゾール-2-イルオ キシ-N-メチルアセトアニ リド・・・4.5%	粒 剤	移植 水稻	水田一年生 雑草、マツバイ、 ホタルイ、ウリカワ、 ミスガヤツリ、ヘラ オモダカ、ヒルムシ ロ、クログワイ、セ リ、エゾノササカ グサ(北海道)、シズ イ(東北)、 オモダカ(東 北)、アオミドロ・ 藻類による表 層はく離	北海道 東北	砂壤土 ～壇土 但し、移 植直後 ～移植 後4日の 砂壤土 は除く	1kg/10a	移植直後～ビエ2 葉期但し、移植後 30日まで	灌水散 布	本剤の使用 回数・・・1回、 ペンシルフロ ントメチルを含 む農薬の総 使用回数・・・ 2回以内、ベ ンチオカーブ を含む農薬 の総使用回 数・・・1回、メ フェナセット を含む農薬 の総使用回 数・・・2回以 内	グアイ化 学工業 ㈱
								移植直後～ビエ 2.5葉期但し、移植 後30日まで				
ペンシル フロント メチル・ベ ンチオ カーブ・ メフェナ セット粒 剤	クミアイ ウルフ エース1 キロ粒剤 51	メチル=α-(4,6-ジメチル ピリジン-2-イルカルバモイ ルスルファモイル)-o-トルア ート・・・0.51%, S-(4-クロロベ ンジル)-N,N-ジエチルチオ カーバメート・・・15.0%, 2- ヘンゾチアゾール-2-イルオ キシ-N-メチルアセトアニ リド・・・3.0%	粒 剤	移植 水稻	水田一年生 雑草、マツバイ、 ホタルイ、ウリカワ、 ミスガヤツリ、クロ グワイ、オモダカ、 ヒルムシロ、セリ、コ ウキヤカラ(九 州)、アオミドロ・ 藻類による表 層はく離	全域(北海 道、東北を除 く)の普通期 及び早期栽 培地帯	砂壤土 ～壇土 但し、移 植直後 ～移植 後4日の 砂壤土 は除く	1kg/10a	移植直後～ビエ 2.5葉期但し、移植 後30日まで	灌水散 布	本剤の使用 回数・・・1回、 ペンシルフロ ントメチルを含 む農薬の総 使用回数・・・ 2回以内、ベ ンチオカーブ を含む農薬 の総使用回 数・・・1回、メ フェナセット を含む農薬 の総使用回 数・・・2回以 内	グアイ化 学工業 ㈱
				直播 水稻	水田一年生 雑草、マツバイ、 ホタルイ、ウリカワ、 ミスガヤツリ、ヒル ムシロ、セリ、アオ ミドロ・藻類によ る表層はく離	全域(北海 道、東北を除 く)	壇土～ 壇土	イネ1葉期～ビエ 2.5葉期 但し、収 穫90日前まで				

(1) つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物 名	適用雑草	適用地帯	適用 土壌	使用量	使用時期	使用 方法	使用回数	登録 会社
ビリスルファン・フェントラザミド粒剤	ゴール1キログラム	(RS)-2'-[(4,6-ジメチルピリジン-2-イル)(ヒドロキシメチル)-1,1-ジフルオロ-6'-(メキシメチル)メタン]スルホンアミド...0.50%, 4-(2-クロロフェニル)-N-シクロヘキシル-N-エチル-4,5-ジヒドロ-5-オキソ-1H-テトラゾール-1-カルボキサミド...3.0%	粒剤	移植 水稲	水田一年生雑草、マツバ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ(北海道を除く)、ヘラオモダカ(北海道、東北)、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ(北海道を除く)、シズイ(東北)、コウキヤガラ(東北・関東・東山・東海、九州)、アオミドロ・藻類による表層はく離	全域(九州を除く)の普通期及び早期栽培地帯 九州の普通期及び早期栽培地帯 全域の普通期栽培地帯及び関東・東山・東海、近畿・中国・四国の早期栽培地帯	砂壤土～壇土 壇土～壇土	1kg/10a	移植直後～ヒエ3葉期(砂壤土は移植後3日～ヒエ3葉期)但し、移植後30日まで 移植直後～ヒエ3葉期(早期及び砂壤土は移植後3日～ヒエ3葉期)但し、移植後30日まで 移植時	湛水散布 田植同時散布機で施用	本剤の使用回数...1回、ビリスルファンを含む農薬の総使用回数...2回以内、フェントラザミドを含む農薬の総使用回数...1回	パイエルロップサイエンス(株)
オキサジクロメホン・ピラクロニル・ピラゾスルフロネチル・ベンゾビシクロン粒剤	シリウスエグザ1キログラム	3-[1-(3,5-ジクロロフェニル)-1-メチルエチル]-3,4-ジヒドロ-6-メチル-5-フェニル-2H-1,3-オキサジノン-4-オン...0.40%, 1-(3-クロロ-4,5,6,7-テトラヒドロピラゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル)-5-[メチル(プロパ-2-イル)アミノ]ピラゾール-4-カルボニトリル...2.0%, エチル=5-(4,6-ジメチルピリジン-2-イル)カルバモイルスルファモイル)-1-メチルピラゾール-4-カルボキシレート...0.30%, 2-(2-クロロ-4-メチルベンゾイル)-2-フェニルチオビシクロ[3.2.1]オクタ-2-エン-4-オン...2.0%	粒剤	移植 水稲	水田一年生雑草、マツバ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ(北海道を除く)、ヘラオモダカ(北海道、東北)、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離(関東・東山・東海、近畿・中国・四国)	北海道、九州の普通期栽培地帯 東北、北陸、関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯、近畿・中国・四国の普通期栽培地帯 北海道、九州の普通期栽培地帯 東北、北陸、関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯、近畿・中国・四国の普通期栽培地帯	壇土～壇土 砂壤土～壇土 壇土～壇土 砂壤土～壇土	1kg/10a	移植時 移植直後～ヒエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	田植同時散布機で施用 湛水散布	本剤の使用回数...1回、ビリスルファンを含む農薬の総使用回数...2回以内、フェントラザミドを含む農薬の総使用回数...1回	日産化学工業(株)
ビリスルファン・ベンゾビシクロン粒剤	ザンテン1キログラム	(RS)-2'-[(4,6-ジメチルピリジン-2-イル)(ヒドロキシメチル)-1,1-ジフルオロ-6'-(メキシメチル)メタン]スルホンアミド...0.67%, 3-(2-クロロ-4-メチルベンゾイル)-2-フェニルチオビシクロ[3.2.1]オクタ-2-エン-4-オン...2.0%	粒剤	移植 水稲	水田一年生雑草、マツバ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ(北海道を除く)、ヘラオモダカ(北海道、東北)、ヒルムシロ、セリ	北陸、関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯 全域(北陸、関東・東山・東海を除く)の普通期栽培地帯及び九州の早期栽培地帯	砂壤土～壇土 壇土～壇土	1kg/10a	移植後3日～ヒエ3葉期 但し、移植後30日まで	湛水散布	本剤の使用回数...1回、ビリスルファンを含む農薬の総使用回数...2回以内、ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数...2回以内	クアイ化学工業(株)、(株)エス・デー・エス・バイオテック
ピラゾレート・プロピリスルフロネチル粒剤	キクンジャーZ1キログラム	4-(2,4-ジクロロベンゾイル)-1,3-ジメチル-5-ピラゾール-p-トルエンスルホンアミド...15.0%, 1-(2-クロロ-6-プロピルイミダゾ[1,2-b]ピリジン-3-イル)スルホン-3-(4,6-ジメチルピリジン-2-イル)尿素...0.90%	粒剤	移植 水稲	水田一年生雑草、マツバ、ホタルイ、ヘラオモダカ(北海道、東北)、ミスガヤツリ(北海道を除く)、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ(関東・東山・東海、九州)	関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯 全域(関東・東山・東海を除く)の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～壇土 壇土～壇土	1kg/10a	移植後5日～ヒエ3葉期 但し、移植後30日まで	湛水散布	本剤の使用回数...1回、ピラゾレートを含む農薬の総使用回数...2回以内、プロピリスルフロネチルを含む農薬の総使用回数...2回以内	三井化学(株)

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稲刈跡・畑作・野菜作・永年作物・非農耕地対象

平成22年11月1日～平成23年10月31日

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場所・ 適用土壌	使用量・ 散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	会社名
1-メチルシクロプロペンくん蒸剤	スマートフレッシュくん蒸剤	1-メチルシクロプロペン…3.3%	くん蒸剤	りんご	収穫果実の熟期抑制	-	倉庫等施設内	68mg/立方m	収穫直後～6日後	本剤の所定量をあらかじめ水を入れた容器に入れ、有効成分を発生させてくん蒸する	本剤の使用回数…1回、1-メチルシクロプロペンを含む農薬の総使用回数…1回	ロートアンド・ハースジャパン ㈱
				なし、かき				34～68mg/立方m	収穫直後～2日後			
S-メトラクロール乳剤	デュアールゴールド	(S)-2-クロロ-2'-エチル-N-(2'-メキシ-1-メチルエチル)-6'-メチルアセトニリド及び(2S)-2-クロロ-2'-エチル-N-(2'-メキシ-1-メチルエチル)-6'-メチルアセトニリド…83.7%	乳剤	とうもろこし、飼料用とうもろこし	一年生雑草	全域	-	70～130mL/10a、希釈水量70～100L/10a	は種後発芽前(雑草発生前)	全面土壌散布	本剤の使用回数…1回、メトラクロール及びS-メトラクロールを含む農薬の総使用回数…1回	シシエンタージャパン ㈱
				かんしよ					播苗後 但し、収穫90日前まで(雑草発生前)			
				えだまめ、だいず、つつみせい					は種後発芽前(雑草発生前)			
				いんげんまめ、さやいんげん		北海道、東北						
				てんさい(移植栽培)		-		70～100mL/10a、希釈水量70～100L/10a	定植後 但し、収穫90日前まで(雑草発生前)			
				キャベツ		全域		40～60mL/10a、希釈水量70～100L/10a	定植直後～定植15日後まで(雑草発生前)	畦間株間土壌散布		
				ばれいしよ		東北		100～130mL/10a、希釈水量70～100L/10a	播付後萌芽前(雑草発生前)	全面土壌散布		
				こんにゃく		全域			播付後又は培土後萌芽前(雑草発生前)			
アトラジン・S-メトラクロール水和剤	ゲザンゴールド	2-クロロ-4-エチル-6-ニトロプロピルアミド…27.8%、(S)-2-クロロ-2'-エチル-N-(2'-メキシ-1-メチルエチル)-6'-メチルアセトニリド及び(2S)-2-クロロ-2'-エチル-N-(2'-メキシ-1-メチルエチル)-6'-メチルアセトニリド…26.4%	水和剤	とうもろこし、飼料用とうもろこし	一年生雑草	-	-	140～260mL/10a、希釈水量70～100L/10a	マルチ前・は種前(雑草発生前)	全面土壌散布	本剤の使用回数…1回、アトラジンを含む農薬の総使用回数…1回、メトラクロール及びS-メトラクロールを含む農薬の総使用回数…1回	シシエンタージャパン ㈱
									は種後発芽前(雑草発生前)			
									生育期(とうもろこし2～4葉期)			
				ソルガム					は種直後			
デスメディファム・フェンメディファム・S-メトラクロール乳剤	ベタダイヤS乳剤	エチル-3-フェニルカルバマールオキシカルバネート…2.3%、3-メチルカルバマール-2-フェニル-N-(3'-メチルフェニル)カルバネート…10.0%、(S)-2-クロロ-2'-エチル-N-(2'-メキシ-1-メチルエチル)-6'-メチルアセトニリド及び(2S)-2-クロロ-2'-エチル-N-(2'-メキシ-1-メチルエチル)-6'-メチルアセトニリド…7.5%	乳剤	てんさい(移植栽培)	一年生雑草	北海道	全土壌(砂土を除く)	500mL/10a、希釈水量60～100L/10a	移植活着後の雑草発生播期但し、収穫90日前まで	散布	本剤の使用回数…1回、デスメディファムを含む農薬の総使用回数…2回以内、フェンメディファムを含む農薬の総使用回数…3回以内、メトラクロール及びS-メトラクロールを含む農薬の総使用回数…1回	ホクサン ㈱
シアナジン・DCBN粒剤	カルコーンDX粒剤	2-(4-クロロ-6-エチルアミノ)-1,3,5-トリアジン-2-イルアミノ-2-メチルプロピオニル…5.0%、2,6-シクロプロチオヘンサミド…2.5%	粒剤	樹木等	一年生広葉雑草、スギナ	-	公園、庭園、堤どう、駐車場、道路、運動場、宅地、墓地等	10～20kg/10a	雑草生育初期(草丈20cm以下)	播栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布	本剤の使用回数…3回以内、シアナジンを含む農薬の総使用回数…3回以内、DCBNを含む農薬の総使用回数…3回以内	保土谷化学工業 ㈱
					一年生イネ科雑草			15～20kg/10a				
シアナジン・DCBN粒剤	HUPLカルコーンDX粒剤	2-(4-クロロ-6-エチルアミノ)-1,3,5-トリアジン-2-イルアミノ-2-メチルプロピオニル…5.0%、2,6-シクロプロチオヘンサミド…2.5%	粒剤	樹木等	一年生広葉雑草、スギナ	-	公園、庭園、堤どう、駐車場、道路、運動場、宅地、墓地等	10～20g/m ²	雑草生育初期(草丈20cm以下)	播栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布	本剤の使用回数…3回以内、シアナジンを含む農薬の総使用回数…3回以内、DCBNを含む農薬の総使用回数…3回以内	保土谷UPL ㈱
					一年生イネ科雑草			15～20g/m ²				

(2) つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場所・ 適用土壌	使用量・ 散布液量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	会社名
リニュロン水 和剤 つづき	ロロックス	3-(3,4-ジクロロフェニル)-1- ホキシ-1-ナチル尿素… 50.0%	水 和 剤	りんご、もも	一年生雑 草	-	-	300g/10a、希釈 水量70～ 150L/10a	雑草発生前～ 発生始期 但 し、収穫30日前 まで	全面土壌散布	本剤の使用回数…1 回、リニュロンを含む農 薬の総使用回数…1回	丸和ハイテミ カ4種、日本農 薬株式会社、オクサン 群
				なし				300g/10a、希釈 水量70～ 150L/10a	雑草発生前～ 発生始期 但 し、収穫90日前 まで			
				うめ					雑草発生前～ 発生始期 但 し、収穫60日前 まで			
				かき					雑草発生前～ 発生始期 但 し、収穫30日前 まで			
				にんにく				100～ 150g/10a、希釈 水量70～ 150L/10a	植付前(マルチ 前)(雑草発生 前)			
				ねぎ(本郷)					植付後(雑草発 生前)			
				あさつき					定植後 但し、 定植14日後ま で(雑草発生 前)	畦間土壌散布		
								150g/10a、希釈 水量70～ 150L/10a	植付直後～萌 芽前(雑草発生 前～発生始期)	全面土壌散布		
				にら				100～ 150g/10a、希釈 水量70～ 150L/10a	植付培土後及 び収穫後の2 回(体系)		本剤の使用回数…2回 以内、リニュロンを含む 農薬の総使用回数…2 回以内	
				セルリー					定植後 但し、 定植7日後まで (雑草発生前)	畦間土壌散布	本剤の使用回数…1 回、リニュロンを含む農 薬の総使用回数…1回	
				ソルガム				100～ 200g/10a、希釈 水量70～ 150L/10a	は種直後(雑草 発生前)	全面土壌散布		
				とうき				100g/10a、希釈 水量70～ 150L/10a	中耕・培土後 但し、収穫120 日前まで	畦間土壌散布	本剤の使用回数…2回 以内、リニュロンを含む 農薬の総使用回数…2 回以内	
				たらのき					中耕・培土後 (雑草発生前)			
				食用ゆり、 わさびだい いこん				100～ 150g/10a、希釈 水量70～ 150L/10a	植付後萌芽前 (雑草発生前～ 発生始期)	全面土壌散布	本剤の使用回数…1 回、リニュロンを含む農 薬の総使用回数…1回	
				べにばな いんげん				75～100g/10a、 希釈水量70～ 150L/10a	は種後出芽前 (雑草発生前)			
				みつば				100～ 150g/10a、希釈 水量70～ 150L/10a				
				らっきょう				150g/10a、希釈 水量70～ 150L/10a	種球植付後(雑 草発生前)	畦間土壌散布	本剤の使用回数…1 回、リニュロンを含む農 薬の総使用回数…2回 以内(種球植付後は1回 以内、生育期は1回以内)	
									生育期 但し、 収穫30日前ま で	全面土壌散布		
				おうぎ				100～ 150g/10a、希釈 水量70～ 150L/10a	は種後出芽前 (雑草発生前)	本剤の使用回数…1 回、リニュロンを含む農 薬の総使用回数…1回		
				桑				100～ 200g/10a、希釈 水量70～ 150L/10a	4～10月			

(2) つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場所・ 適用土壌	使用量・ 散布流量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	会社名
イマザビル 液剤	プロサルト 液剤	イゾプロピル・モノエタノール [(RS)-2-(4-イソプロピル- 4-メチル-5-オキソ-2-イタ ゾリン-2-イル)ニコチナート... 25.0%	液 剤	樹木等	一年生雑 草 多年生雑 草 クヌ、ササ類	-	鉄道、工場敷 地(タンクヤード 等)、道路	200～ 400mL/10a、希 釈水量60～ 100L/10a 600～ 1000mL/10a、 希釈水量60～ 100L/10a 1000～ 1400mL/10a、 希釈水量60～ 100L/10a	雑草生育期	播栽地を除く 樹木等の周辺 地に全面土壌 散布	本剤の使用回数...2回 以内、イマザビルを含む 農薬の総使用回数...2 回以内	麻理研ダグレン
グルホシ ネートPナ トリウム塩 液剤	ザクサ液剤	ナトリウム・L-ホモアラニン-4-イ ル(ザクサ)ホスフィレート... 11.5%	液 剤	果樹類(か んきつ、り んご、び わ、いちじ く、きょう ろづを除く)	一年生雑 草 多年生雑 草	-	-	300～ 500mL/10a、希 釈水量100～ 150L/10a 500～ 750mL/10a、希 釈水量100～ 150L/10a	収穫前日まで (雑草生育期: 草丈30cm以 下)	雑草茎葉散布	本剤の使用回数...3回 以内、グルホシネート及 びグルホシネートPを含 む農薬の総使用回 数...3回以内	明示製菓、 北興化学工 業有限
				かんきつ	一年生雑 草 多年生雑 草			300～ 500mL/10a、希 釈水量100～ 150L/10a 500～ 1000mL/10a、 希釈水量100～ 150L/10a	収穫21日前ま で(雑草生育 期:草丈30cm 以下)			
				りんご、き ょうろづ、び わ	一年生雑 草 多年生雑 草			300～ 500mL/10a、希 釈水量100～ 150L/10a 500～ 750mL/10a、希 釈水量100～ 150L/10a				
				いちじく(種 子)	一年生雑 草 多年生雑 草			300～ 500mL/10a、希 釈水量100～ 150L/10a 500～ 750mL/10a、希 釈水量100～ 150L/10a	収穫14日前ま で(雑草生育 期:草丈30cm 以下)			
				くり	一年生雑 草 多年生雑 草			300～ 500mL/10a、希 釈水量100～ 150L/10a 500～ 750mL/10a、希 釈水量100～ 150L/10a	収穫30日前ま で(雑草生育 期:草丈30cm 以下)			
				なす、トマト、 ミニトマト	一年生雑 草			300～ 500mL/10a、希 釈水量100～ 150L/10a	収穫前日まで (雑草生育期 定植前又は畦 間処理)			
				メロン					収穫30日前ま で(雑草生育期 定植前又は畦 間処理)		本剤の使用回数...2回 以内、グルホシネート及 びグルホシネートPを含 む農薬の総使用回 数...2回以内	
				キャベツ					収穫45日前ま で(雑草生育期 定植前又は畦 間処理)			
				ほうれんそ う					収穫7日前ま で(雑草生育期 は種前又は畦 間処理)			

(2)つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場所・ 適用土壌	使用量・ 散布液量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	会社名
グルホシ ネットPナ トリウム塩液 つづき	ザクサ液剤	ナトリウム-L-ホモアラニン-4-イ ル(メチル)ホスフィート... 11.5%	液 剤	水田作物	一年生雑 草	-	-	500mL/10a、希 釈水量 100L/10a	播種15日前ま で(雑草生育 期:草丈30cm 以下)	雑草茎葉散布	本剤の使用回数...1 回、グルホシネットPを含む 農薬の総使用回数...1 回	明治製菓、 北興化学工 業㈱
				水田作物 (水田畦 畔)	一年生雑 草、多年 生雑草	-	水田畦畔	500～ 1000mL/10a、 希釈水量100～ 150L/10a	収穫7日前ま で(雑草生育 期:草丈30cm以 下)	雑草茎葉散布	本剤の使用回数...2回 以内、グルホシネットP及 びグルホシネットPを含む 農薬の総使用回数...2回以内	
				樹木類	一年生雑 草	-	-	300～ 500mL/10a、希 釈水量100～ 150L/10a	雑草生育期(草 丈30cm以下)	雑草茎葉散布	本剤の使用回数...3回 以内、グルホシネットP及 びグルホシネットPを含む 農薬の総使用回数...3回以内	
				樹木等	多年生雑 草	-	公園、庭園、場 とう、駐車場、 道路、運動場、 宅地、のり面、 鉄道等	500～ 1000mL/10a、 希釈水量100～ 200L/10a 1000～ 2000mL/10a、 希釈水量100～ 200L/10a	植栽地を除く 樹木の周辺 地に雑草茎葉 散布	雑草茎葉散布	本剤の使用回数...2回 以内、イペサビルを含む 農薬の総使用回数...2 回以内	
DCMU水 和剤	ダイロンゾ ル	3-(3,4-ジクロロフェニル)- 1,1-ジメチル尿素...50.0%	水 和 剤	ばれいしょ	一年生雑 草	全城	-	100～ 200mL/10a、希 釈水量 100L/10a	植付後萌芽前 (雑草発生前～ 始期)	土壌散布	本剤の使用回数...2回 以内、イペサビルを含む 農薬の総使用回数...2 回以内	北興化学工 業㈱
				やまのいも	-	-	-	-	植付後萌芽前 (雑草発生前～ 始期(イネ科雑 草3葉期まで))	茎葉兼土壌散 布	本剤の使用回数...2回 以内、イペサビルを含む 農薬の総使用回数...2 回以内	
				だいず	-	-	-	150mL/10a、希 釈水量 100L/10a	は種後出芽前 (雑草発生前)	土壌散布	本剤の使用回数...2回 以内、イペサビルを含む 農薬の総使用回数...2 回以内	
				水田作物 (水田畦 畔)	-	北海道、 九州を除く全 城	水田畦畔	200～ 250mL/10a、希 釈水量 100L/10a	雑草発生前～ 生育初期(草丈 15cm以下)	茎葉兼土壌散 布	本剤の使用回数...2回 以内、イペサビルを含む 農薬の総使用回数...2 回以内	
メタミホップ 乳剤	グラスホップ	(R)-2-[4-(6-クロロ-1,3- ペンタキソギニル)-2-イルオ キシ]フェニル]-2'-フルオロ N-メチルプロピオンアミド... 10.0%	乳 剤	日本芝に うらいし(ゴ シキ)	一年生イ ネ科雑草	-	-	100～ 300mL/10a、希 釈水量100～ 200L/10a	春夏期雑草生 育期(芝生育 期)	雑草茎葉散布	本剤の使用回数...3回 以内、メタミホップを含む 農薬の総使用回数...3 回以内	住商アグロ ンターナシ ョナル ㈱、丸和バ イオ ケミカル
ホラムスル フロン水和 剤	トリビュート OD	1-(4,6-ジメチルピリミジン- 2-イル)-3-[2-(ジメチルカル バミル)-5-ホルムアルトフェ ニル]尿素...2.2%	水 和 剤	日本芝	一年生雑 草、多年 生広葉雑 草	-	-	200～ 250mL/10a、希 釈水量100～ 200L/10a 150～ 250mL/10a、希 釈水量100～ 200L/10a	春夏期雑草生 育期(芝生育 期) 秋冬期雑草生 育期(芝生育 期)	雑草茎葉散布	本剤の使用回数...3回 以内、ホラムスル フロンを含む農薬の総使用 回数...3回以内	バイエルクロ ップ サイエンス
エテホン液 剤	プロキシ液 剤	2-クロロエチルホスホニ 酸...21.5%	液 剤	西洋芝(ベ ントグラス)	スズメノカ タビラ出穂 抑制	-	-	1.0～1.5mL/ ㎡、希釈水量 100～200mL/ ㎡	スズメノカタ ビラ出穂前	雑草茎葉散布	本剤の使用回数...3回 以内、エテホンを含む農 薬の総使用回数...3回 以内	バイエルクロ ップ サイエンス
インダノファ ン水和剤	グラスガード フロアブル	(RS)-2-[2-(3-クロロフェ ニル)-2,3-エポキシプロピ ル]-2-エチルヘキサン-1,3-ジ オール...10.0%	水 和 剤	小麦(秋 播)	一年生雑 草	北海道を 除く全 城	全土壌(砂土 を除く)	300～ 500mL/10a、希 釈水量 100L/10a	は種後～小麦 2葉期(イネ科 雑草1葉期ま で)	雑草茎葉散布 又は全面土壌 散布	本剤の使用回数...2回 以内、インダノファ ンを含む農薬の総使用回 数...2回以内	日本農薬
				小麦(秋 播)	一年生雑 草				は種後出芽前 (雑草発生前)			
									は種後～小麦 2葉期(イネ科 雑草1葉期ま で)			

(2)つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場所・ 適用土壌	使用量・ 散布液量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	会社名
インダノファン・ジフルフェニカン水和剤	ガルシアフロアブル	(RS)-2-[2-(3-クロロフェニル)-2,3-エポキシプロピル]-2-エチルインタン-1,3-ジオール-2-(α, α, α -トリフルオロ-m-トリクロキシ)コチンアミド...4.0%	水和剤	小麦(秋播)	一年生雑草	北海道	全土壌(砂土を除く)	150~250mL/10a,希釈量100L/10a 100~200mL/10a,希釈量100L/10a	は種後出芽前(雑草発生前) 小麦出芽直前~小麦3葉期(雑草発生前~発生始期)	全面土壌散布 雑草茎葉散布又は全面土壌散布	本剤の使用回数...1回、インダノファンを含む農業の総使用回数...2回以内、ジフルフェニカンを含む農業の総使用回数...1回	お茶の間
グリホサートイソプロピルアミン塩液剤	クサクリア	イソプロピルアンモニウム-N-(ホスホノメチル)グリシナート...41.0%	液剤	果樹類(ハイチアップルを除く)	一年生雑草 多年生雑草	-	-	250~500mL/10a,希釈水量:通常散布50~100L/10a,少量散布25~50L/10a 500~1000mL/10a,希釈水量:通常散布50~100L/10a,少量散布25~50L/10a	収穫7日前まで(雑草生育期:草丈30cm以下)	雑草茎葉散布	本剤の使用回数...3回以内、グリホサートを含む農業の総使用回数...3回以内	宇都宮化成工業株式会社
				だいず	一年生雑草			250~500mL/10a,希釈水量:通常散布50~100L/10a,少量散布25~50L/10a	は種7日前まで(雑草生育期) は種後出芽前まで(雑草生育期:草丈30cm以下)		本剤の使用回数...2回以内、グリホサートを含む農業の総使用回数...2回以内	
				えだまめ					は種7日前まで(雑草生育期)		本剤の使用回数...1回、グリホサートを含む農業の総使用回数...3回以内	
				小麦	多年生イネ科雑草 一年生雑草 多年生雑草 一年生雑草			250~500mL/10a,希釈水量25~100L/10a 500~1000mL/10a,希釈水量100L/10a	耕起前又はは種前まで(雑草生育期:草丈30cm以下) は種後出芽前(雑草生育期)		本剤の使用回数...3回以内、グリホサートを含む農業の総使用回数...3回以内 本剤の使用回数...1回、グリホサートを含む農業の総使用回数...3回以内	
				麦類(小麦を除く)				250~500mL/10a,希釈水量100L/10a	排起7日前まで(雑草生育期)		本剤の使用回数...1回、グリホサートを含む農業の総使用回数...3回以内	
				かんしよ					排起又は排苗7日前まで(雑草生育期)		本剤の使用回数...1回、グリホサートを含む農業の総使用回数...1回	
				だいこん					排起又はは種7日前まで(雑草生育期)		本剤の使用回数...1回、グリホサートを含む農業の総使用回数...2回以内	
				キャベツ					排起又は定植7日前まで(雑草生育期)		本剤の使用回数...1回、グリホサートを含む農業の総使用回数...1回	
				はくさい				250~500mL/10a,希釈水量:通常散布50~100L/10a,少量散布25~50L/10a	定植後畦間処理 但し、収穫30日前まで(雑草生育期)		本剤の使用回数...3回以内、グリホサートを含む農業の総使用回数...3回以内	
				ねぎ								
				茶				250~500mL/10a,希釈水量:少量散布25~50L/10a	摘採7日前まで(雑草生育期)		本剤の使用回数...1回、グリホサートを含む農業の総使用回数...2回以内	

(2) つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場所・ 適用土壌	使用量・ 散布流量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	会社名		
グリホサート インプロビル アミン塩液 剤 つづき	クサクリア	イプロビルアンモニウム-N- (ホスホノメチル)グリシナート… 41.0%	液 剤	水田作物 (水稲を除く、移植水 稲)	一年生雑 草	-	-	250～ 500mL/10a、希 釈水量 100L/10a	播起20～10日 前(雑草生育 期)	雑草茎葉散布	本剤の使用回数…1 回、グリホサートを含む 農業の総使用回数…1 回	宇都宮化成 工業㈱		
					直播水稲						本剤の使用回数…1 回、グリホサートを含む 農業の総使用回数… 播起栽培は2回以内(播 起前は1回以内)、乾田不 播起栽培は2回以内			
				水田作物 (水田刈 跡)	一年生雑 草		水田刈跡	250～ 500mL/10a、希 釈水量25～ 100L/10a	雑草生育期		本剤の使用回数…1 回、グリホサートを含む 農業の総使用回数…1 回			
					多年生雑 草									
				水田作物 (水田畦 畔)	一年生雑 草		水田畦畔	250～ 500mL/10a、希 釈水量:通常散 布100L/10a、少 量散布25L/10a	収穫14日前ま で(雑草生育 期:草丈30cm以 下)		本剤の使用回数…2回 以内、グリホサートを含 む農業の総使用回 数…2回以内			
					多年生雑 草									
				水田作物、 畑作物(休 耕田)	一年生雑 草		休耕田	250～ 500mL/10a、希 釈水量:通常散 布50～	雑草生育期(草 丈50cm以下)					
					樹木類									
				樹木等	-		-	100L/10a、少量 散布25～ 50L/10a	雑草生育期		本剤の使用回数…4回 以内、グリホサートを含 む農業の総使用回 数…4回以内			
				樹木等	-		公園、庭園、堤 どう、駐車場、 道路、運動場、 宅地、のり面、 鉄道等	500mL/10a、希 釈水量:通常散 布100L/10a、少 量散布25L/10a		植栽地を除く 樹木等の周辺 地に雑草茎葉 散布	本剤の使用回数…3回 以内、グリホサートを含 む農業の総使用回 数…3回以内			
				-	多年生雑 草		-	1000mL/10a、 希釈水量:通常 散布100L/10a、 少量散布 25L/10a						
					スギ									
				林木	スギ、ササ 類、クサ等 の多年生 雑草		造林地(地ご らえ)	1000mL/10a、 希釈水量20～ 30L/10a	生育盛期以降	雑草木茎葉散 布				
					クサ									
プロピザミド 水和剤	カーブSC	3,5-ジクロロ-N-(1,1-ジメ チル-2-プロピニル)ベンズアミ ド…36.0%	水 和 剤	日本芝	一年生雑 草(ヤブ科 を除く)	-	-	0.4～0.6mL/ ㎡、希釈水量 200～300mL/ ㎡	芝生育期(雑草 発生前)	全面土壌散布	本剤の使用回数…2回 以内、プロピザミドを含 む農業の総使用回 数…2回以内	ダウケミカル日 本 ㈱		

(2) つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場所・ 適用土壌	使用量・ 散布液量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	会社名
ジチオビル 乳剤	ディメンシ ンEW	S,S'-ジメチル-2-ジフルオ ロメチル-4-イソプロピル-6-トリフ ロメチルピリジン-3,5-ジ カルボキシート...24.0%	乳 剤	日本芝	一年生イ ネ科雑草	-	-	0.1~0.2mL/ ㎡、希釈水量 200~300mL/ ㎡	春夏期雑草発 生前	全面土壌散布	本剤の使用回数...2回 以内、ジチオビルを含む 農薬の総使用回数...2 回以内	タウ・ダカ日 本薬
					一年生広 葉雑草			0.2~0.3mL/ ㎡、希釈水量 200~300mL/ ㎡	秋冬期雑草発 生前			
				西洋芝ブ ルーグラス	一年生雑 草			0.1~0.3mL/ ㎡、希釈水量 200~300mL/ ㎡	芝生育期(雑草 発生前)			
								0.1~0.2mL/ ㎡、希釈水量 200~300mL/ ㎡				
グリホサート イソプロピル アミン塩液 剤	ネコノキプロ ン液剤	イソプロピルアンモニウム-N- (ホスホリル)グリホサート... 41.0%	液 剤	樹木等	一年生雑 草	-	公園、庭園、堤 とう、駐車場、 道路、運動場、 宅地、のり面、 鉄道等	0.5mL/㎡、希釈 水量:100mL/㎡	雑草生育期(草 丈50cm以下)	植栽地を除く 樹木等の周辺 地に雑草茎葉 散布	本剤の使用回数...3回 以内、グリホサートを含 む農薬の総使用回 数...3回以内	レイナー薬品 ㈱
					多年生雑 草			1mL/㎡、希釈 水量:100mL/㎡				
					ススキ			1~2mL/㎡、希 釈水量:100mL/ ㎡	生育期(草丈 100cm以下)			
					スギナ			2mL/㎡、希釈 水量:100mL/㎡	生育期(草丈 20cm以下)			
					ササ類			1~2mL/㎡、希 釈水量:100mL/ ㎡	生育期(草丈 50cm以下)			
				林木	竹類		林地、放置竹 林	原液、使用液量 5~15mL/本	夏~秋期	竹稈注入処理	本剤の使用回数...、 グリホサートを含む農薬 の総使用回数...、	
ダミノジッド 水溶剤	家庭園芸用 ピーナイン 水溶剤	N-(ジメチルアミ)ダミノジ ド酸...80.0%	水 溶 剤	きく(切花 用)	節間の伸 長抑制	-	-	500~5000倍、 使用液量50~ 150mL/㎡	生育期	茎葉散布	本剤の使用回数...4回 以内、ダミノジッドを含む 農薬の総使用回数...6 回以内	日本曹達㈱
					花首の伸 長抑制			1000~1500倍、 使用液量50~ 150mL/㎡	発蕾期~摘蕾 期		本剤の使用回数...2回 以内、ダミノジッドを含む 農薬の総使用回数...6 回以内	
				きく(ポツマ ム)	節間の伸 長抑制			200~400倍、5 ~10mL/5号鉢	摘芯後10~7 日又は定植3 日後から発蕾 初期		本剤の使用回数...3回 以内、ダミノジッドを含む 農薬の総使用回数...3 回以内	
				ハドランジ ア				100~200倍、使 用液量50~ 150mL/㎡	定植後3~30 日		本剤の使用回数...2回 以内、ダミノジッドを含む 農薬の総使用回数...2 回以内	
				ボインセア							本剤の使用回数...1 回、ダミノジッドを含む農 薬の総使用回数...1回	
				はばたん					定植後3日目			
				ベチュニア					定植後2週間 目			
				アサレア				150倍、使用液 量50~150mL/ ㎡	摘芯後30~40 日		本剤の使用回数...1 回、ダミノジッドを含む農 薬の総使用回数...3回 以内	
								200~400倍、使 用液量50~ 150mL/㎡	摘芯後30~ 120日		本剤の使用回数...3回 以内、ダミノジッドを含む 農薬の総使用回数...3 回以内	
				あさがお				400~800倍、使 用液量50~ 150mL/㎡	本葉5~7枚の 時		本剤の使用回数...1 回、ダミノジッドを含む農 薬の総使用回数...1回	
				しゃくなげ	節間の伸 長抑制、 着蕾数増 加			75~100倍、使 用液量 100mL/5号鉢	新梢伸長完了 期を1回目とし て3回処理(17 日間隔)		本剤の使用回数...3 回、ダミノジッドを含む農 薬の総使用回数...3回	
トリフルラシ ン・IPC乳 剤	HCCシナ ジオ乳剤	α,α,α-トリフルオロ-2,6- ジニトロ-N-ジプロピル パラトリン...33.0%、イ ソプロピル-N-(3-クロロフェ ニル)カーバメート...11.0%	乳 剤	小麦	一年生雑 草(コナギ 科、カブ タ科、セ リ科、ア ザミ科を除く)	全域(北 海道を 除く)	全土壌(砂土 を除く)	300~ 400mL/10a、希 釈水量 100L/10a	は種後出芽前 (雑草発生前)	全面土壌散布	本剤の使用回数...1 回、トリフルランを含む 農薬の総使用回数...2 回以内、IPCを含む農薬 の総使用回数...1回	保土谷化学 工業㈱、タウ ケカル日本㈱
				大麦				300~ 400mL/10a、希 釈水量 100L/10a				

(2)つづき

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 作物名	適用 雑草	適用 地帯	適用場所・ 適用土壌	使用量・ 散布液量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	会社名
ジメチナミド P・プロマシ ル粒剤	かれるくん	(S)-2-クロロ-N-(2,4-ジメチル-3-チエニル)-N-(2-メトキシ-1-メチルエチル)アセトアミド...1.0%, 5-プロモ-3-セコナリブチル-6-メチルウラン...1.0%	粒剤	樹木等	一年生雑草、多年生広葉雑草	-	-	15~30g/m ²	雑草生育初期(草丈20cm以下)	植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布	本剤の使用回数...1回、ジメチナミド及びジメチナミドPを含む農薬の総使用回数...1回、プロマシルを含む農薬の総使用回数...1回	丸和ペイザミカル研、レインボ-薬品㈱
プロヘキサ ジオンカル シウム塩塗 布剤	ビビフル ペースト	カルシウム=3-オキシド-5-オキソ-4-プロピオニルシクロヘキサ-3-エンカルボキシレート...1.0%	塗布剤	日本なし	果実肥大促進	-	-	20~30mg/1果(シレリッパペースト剤との混合物として40~60mg/1果)	満開30~40日後	シレリッパペースト剤と等量混合して果梗部塗布	本剤の使用回数...1回、プロヘキサジオンカルシウム塩を含む農薬の総使用回数...1回	メダ化学工業㈱
グルホシ ネットPナ トリウム塩液 剤	東日本大震災により津波被害を受けた農地専用ザクサ液剤	ナトリウム-L-ホモアラジネ-4-イミド(メチル)ホスフィナート...11.5%	液剤	水田作物、畑作物(休耕田)	一年生及び多年生雑草	-	青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県内の東日本大震災により津波被害を受けた農地及びその農地に隣接する道路、のり面、堤とう等	4倍、使用液量2L/10a 8倍、使用液量4L/10a	雑草生育期	無人ヘリコプターによる雑草茎葉散布	本剤の使用回数...3回以内、グルホシネット及びグルホシネットPを含む農薬の総使用回数...3回以内	Meiji Seikaファルマ㈱
グリホサート イソプロピル アミン塩液 剤	東日本大震災により津波被害を受けた農地専用草枯らしMIC	イソプロピルアミン塩=N-(ホスホメチル)グリホサート...41.0%	液剤	水田作物、畑作物(休耕田)	一年生及び多年生雑草	-	青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県内の東日本大震災により津波被害を受けた農地及びその農地に隣接する道路、のり面、堤とう等	2倍、使用液量0.8L/10a 3倍、使用液量1.2L/10a	雑草生育期	無人ヘリコプターによる雑草茎葉散布	本剤の使用回数...2回以内、グリホサートを含む農薬の総使用回数...2回以内	三井化学アグリ㈱
グリホサート カリウム塩 液剤	東日本大震災により津波被害を受けた農地専用アップマップスロード	カリウム=N-(ホスホメチル)グリホサート...48.0%	液剤	水田作物、畑作物(休耕田)	一年生及び多年生雑草	-	青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県内の東日本大震災により津波被害を受けた農地及びその農地に隣接する道路、のり面、堤とう等	2倍、使用液量0.8L/10a	雑草生育期	無人ヘリコプターによる雑草茎葉散布	本剤の使用回数...2回以内、グリホサートを含む農薬の総使用回数...2回以内	日産化学工業㈱

*水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稲刈跡・畑作・野菜作・永年作物・非農耕地対象の新規登録薬剤は、前回第45巻第3号に平成22年11月1日～平成23年3月31日分の掲載を失念致しましたので、平成23年4月1日～平成23年10月31日分と併せて掲載致しました。