

平成23年度 水稻作関係除草剤試験判定結果

財団法人 日本植物調節剤研究協会

平成23年度水稻作関係除草剤試験成績中央検討会は、平成23年12月8日、9日の2日間、浅草ビューホテルにおいて、適1試験成績検討会は、これに先立ち平成23年10月13日 同じく浅草ビューホテルにて開催された。ここに、これら検討会における判定結果を報告する。

1) 第一次適用性試験(適1)は、北海道地域(植調北海道試験地)、東北地域(植調古川試験地)、北陸地域(植調新潟試験地)、関東地域(植調研究所)、近畿・中国・四国地域(植調岡山倉敷試験地)、九

州地域(植調福岡試験地)の全国6地域および砂壤土(植調霞ヶ浦試験地)で28薬剤(のべ156点)について実施した。その判定結果は、第2表のとおりである。

2) 第二次適用性試験(適2)は、のべ517剤(総点数2,323点)であり、その内訳を第1表にまとめた。これら適2の判定結果は第3表のとおりであり、「実・継」と判定された薬剤の使用基準を後に掲載した。

第1表 平成23年度適2試験実施点数

A-1 移植栽培(一発処理)	138 剤	1,240 点	A-4 特殊雑草対象 内訳		
A-2 移植栽培(体系処理:初期)	7 剤	70 点	エゾノサヤヌカグサ	13 剤	13 点
A-3 移植栽培(体系処理:中後期)	20 剤	177 点	オモダカ	87 剤	258 点
A-4 移植栽培(特殊雑草対象)	のべ 285 剤	638 点	クサネム	1 剤	2 点
B 直播栽培	66 剤	194 点	クログワイ	76 剤	217 点
C 畦畔	1 剤	4 点	コウキヤガラ	44 剤	81 点
			シズイ	41 剤	41 点
			ミズアオイ	13 剤	13 点
			SU 抵抗性ホタルイ	4 剤	7 点
			雑草イネ	6 剤	6 点

第2表 平成23年度 水稻関係除草剤適1試験 判定結果一覧

注) 総合評価欄、中央判定欄の記号については、◎:極めて有望、○:有望、□:可能性有り、△:再検討、×:見込みなし を表す。

No.	薬剤名・剤型 [委託者]	有効成分及び含有率	実施場所別総合評価							中央判定 [今後の検討課題]
			北海道	古川	新潟	植調研	岡山倉敷	福岡	霞ヶ浦(砂)	
1	BAH-1103-1kg粒 [BASF]	既知化合物A:0.4% 既知化合物B:4%	□	○	○	○	○	○	□	○ 体系処理(初期) [年次変動の確認]
2	BAH-1104-1kg粒 [BASF]	既知化合物A:0.5% 既知化合物B:6%	□	○	○	○	○	□	○	○ 一発処理 [年次変動の確認]
3	BAH-1118 シャンボ [BASF]	既知化合物A:1.67% 既知化合物B:20%	□	○	○	○	○	□	○	○ 一発処理 [年次変動の確認]
4	BCH-100-1kg粒 [バイエル]	トリアフェモン(BCH-100):0.5%		□	□				□	□ 体系処理(中後期) [効果の確認]
5	HOK-1101 シャンボ [北興]	テフルトリオン:10% イブフェンカルバゾン:8.33%	□	□	□	□	◎	□	△	□ 一発処理 [効果、葉害の確認]
6	HOK-1101 フロアブル [北興]	テフルトリオン:6.0% イブフェンカルバゾン:5.0%	□	△	△	△	◎	□	△	□ 一発処理 [効果、葉害の確認]
7	HOK-1101-1kg粒 [北興]	テフルトリオン:3.0% イブフェンカルバゾン:2.5%	□	△	△	△	◎	□	△	□ 一発処理 [効果、葉害の確認]
8	HOK-1102-1kg粒 [*北興,デュボン]	既知化合物A:a% 既知化合物B:b% 既知化合物C:c%	○	□						□ 一発処理 [効果、葉害の確認]
9	HOK-1103-1kg粒 [*北興,デュボン]	既知化合物D:d% 既知化合物E:e% 既知化合物F:f%			□	□	□	□	□	□ 一発処理 [効果、葉害の確認]
10	KPP-129-1kg粒 [科研]	既知化合物A:1.35%	△	□	□	△	○	○	△	□ 体系処理(中後期) [効果、葉害の確認]
11	KPP-506-1kg粒 [科研]	ベントキサゾン:4.5% 既知化合物B:2.0% 既知化合物C:2.5% 既知化合物D:0.75%	□	□						□ 一発処理 [効果の確認]
12	KPP-506(L)-1kg粒 [科研]	ベントキサゾン:4.5% 既知化合物B:2.0% 既知化合物C:2.5% 既知化合物E:0.51%			□	□	○	□	□	□ 一発処理 [効果の確認]
13	KPP-507 フロアブル [科研]	ベントキサゾン:4.0% 既知化合物B:14.0% (w/v)	○	○	□	□	□	□	□	□ 体系処理(初期) [効果の確認]
14	KUH-091-0.25kg粒 [*クミ化,SDS]	ヒリスルファン:2.7% ベンゾビシクロン:12.0%	○	◎	○	□	◎	□	□	○ 一発処理 [年次変動の確認]

No.	薬剤名・剤型 [委託者]	有効成分及び含有率	実施場所別総合評価							中央判定 [今後の検討課題]
			北海道	古川	新潟	植調研	岡山倉敷	福岡	鹿ヶ浦(砂)	
15	KUH-110-1kg粒 [クミ化]	KUH-110(新規):x%	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ 混合母剤として [混合化の検討]
16	KUH-111-1kg粒 [*クミ化, SDS]	カフェストール:3.0% ジメタトリン:0.6% ダイムロン:9.0% ベンゾビスシクロン:3.0%			☐	☐	☐	☐	☐	☐ 一発処理 [効果、被害の確認]
17	MIH-101(H)-1kg粒 [三井化学]	ピラゾレート:20.0% プロピリスフロロン:0.9%	☐							☐ 一発処理 [年次変動の確認]
18	MIH-111-1kg粒 [三井化学]	SW-065(新規):3.0% 既知化合物B:6.0% 既知化合物C:3.0%	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ 一発処理 [ノビエに対する効果、被害の確認]
19	MIH-112(H) フロアブル [SDS, デュボン, *三井化学]	フェントラサミド:6.0% ベンズルフロンメチル:1.5% ベンゾビスシクロン:4.0% (w/v)	☐	☐						☐ 一発処理 [年次変動の確認]
20	MIH-112(L) フロアブル [SDS, デュボン, *三井化学]	フェントラサミド:6.0% ベンズルフロンメチル:1.0% ベンゾビスシクロン:4.0% (w/v)			☐	☐	☒	☐	☐	☐ 一発処理 [年次変動の確認]
21	MIH-114-1kg粒 [三井化学]	既知化合物A:10.0% 既知化合物B:2.0% 既知化合物C:0.6%	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ 一発処理 [年次変動の確認]
22	NC-632 フロアブル [日産]	ダイムロン:20.0% ピラクロニル:4.0% メタゾスフロロン(NC-620):2.0%	☒	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☐ 一発処理 [年次変動の確認]
23	NC-634-1kg粒 [日産]	既知化合物P:15.0% 既知化合物Q:2.0% 既知化合物R:0.8%	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ 一発処理 [年次変動の確認]
24	NH-1101-1kg粒 [日農]	ベノキスラム:0.5% ベンゾビスシクロン:2.0%	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐ 体系処理(中後期) [効果、被害の確認]
25	S-9146-1kg粒剤 [住友]	イマゾスフロロン:0.9% プロモプチド:9.0% ピリミノバックメチル:0.6%	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐ 一発処理 [効果の確認]
26	S-9465-1kg粒 [住友]	イマゾスフロロン:0.9% ピラクロニル:2.0%				☐	☒	☐	☐	☐ 一発処理 [効果の確認]
27	S-9663-1kg粒 [住友]	既知化合物:2.5% 既知化合物:0.9% 既知化合物:9.0%	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ 一発処理 [効果の確認]
28	S-9696-1kg粒 [住友]	既知化合物:3.0% 既知化合物:5.0% 既知化合物:0.9% 既知化合物:9.0% 既知化合物:2.0%		☐	☐	☐	☐			☐ 一発処理 [年次変動の確認]

第3表 平成23年度 水稻関係除草剤適2試験 判定結果一覧

区 分	実・継		継	
A-1 一発処理	BAH-041-1kg粒	BCH-031-1kg粒	BAH-1104-1kg粒	BAH-1118シ'ャンボ'
	BCH-032-1kg粒	BCH-051シ'ャンボ'	HOK-1101シ'ャンボ'	HOK-1101フロアブル
	BCH-051フロアブル	* BCH-101-1kg粒	HOK-1101-1kg粒	KPP-506-1kg粒
	* BCH-105H-1kg粒	* BCH-105L-1kg粒	KPP-506(L)-1kg粒	KUH-091シ'ャンボ'
	HOK-0701Sシ'ャンボ'	HOK-0801(L)シ'ャンボ'	KUH-091-0.25kg粒	KUH-103シ'ャンボ'
	HOK-0801(L)フロアブル	HOK-0801(L)-1kg粒	KUH-103-0.25kg粒	KUH-111-1kg粒
	HOK-0801S-1kg粒	* HOK-1002シ'ャンボ'	MIH-101(H)-1kg粒	MIH-111-1kg粒
	* HOK-1002フロアブル	* HOK-1002-1kg粒	MIH-112(H)フロアブル	MIH-112(L)フロアブル
	* HOK-1002(L)シ'ャンボ'	* HOK-1002(L)フロアブル	MIH-113(H)シ'ャンボ'	MIH-113(L)シ'ャンボ'
	* HOK-1002(L)-1kg粒	KPP-398(L)フロアブル	MIH-114-1kg粒	NC-632フロアブル
	KPP-398(L)-1kg粒	KPP-406(L)フロアブル	NC-634-1kg粒	S-9146-1kg粒
	* KPP-505-1kg粒	KUH-021シ'ャンボ'	S-9465-1kg粒	S-9663-1kg粒
	KUH-041シ'ャンボ'	KUH-041-0.25kg粒	S-9696-1kg粒	
	KUH-041-1kg粒	KUH-072Dシ'ャンボ'		
	* KUH-072Dフロアブル	KUH-072D-0.25kg粒		
	KUH-072D-1kg粒	KUH-072Kシ'ャンボ'		
	* KUH-072Kフロアブル	KUH-074シ'ャンボ'		
	KUH-074-0.25kg粒	KUH-074L-1kg粒		
	KUH-091-1kg粒	* KUH-101シ'ャンボ'		
	* KUH-101-0.25kg粒	* KUH-101-1kg粒		
	* KUH-103-1kg粒	* KYH-1001フロアブル		
	* KYH-1001-1kg粒	MIH-101-1kg粒		
	* MIH-102フロアブル	* MIH-102(H)フロアブル		
	* MIH-103シ'ャンボ'	NC-385SB-1kg粒		
	NC-397-1kg粒	NC-609-1kg粒		
	* NC-626シ'ャンボ'	* NC-626顆粒水和		
	NC-626-1kg粒	NC-627フロアブル		
	* NC-627顆粒水和	NC-627-1kg粒		
	* NC-629シ'ャンボ'	* NC-629フロアブル		
	* NC-629-1kg粒	* NC-631シ'ャンボ'		
	* NC-631顆粒水和	* NC-631-1kg粒		
	* NC-632シ'ャンボ'	* NC-632-1kg粒		
	* NH-061シ'ャンボ'	* NH-061-0.25kg粒		
	NH-061-1kg粒	NH-071Dフロアブル		
	* NH-1001(H)シ'ャンボ'	* NH-1001(H)フロアブル		
	* NH-1001(H)-1kg粒	* NH-596シ'ャンボ'		
	NH-596フロアブル	NH-596-1kg粒		
	S-9058シ'ャンボ'	S-9058フロアブル		
	S-9058-1kg粒	S-9102粒		
	S-9421シ'ャンボ'	S-9421フロアブル		
	S-9421-1kg粒	SB-531フロアブル		

区 分	実 ・ 継		継	
A-1 一発処理 つづき	SB-564ｼﾞｬﾝﾎﾞ SB-564-1kg粒 SL-0601-1kg粒 * SL-0701ｼﾞｬﾝﾎﾞ SL-0701(RC)-0.5kg粒 SL-4902ﾌﾛｱﾌﾞﾙ SW-052ｼﾞｬﾝﾎﾞ * SW-064-1kg粒 SYJ-156Hｼﾞｬﾝﾎﾞ SYJ-157Hｼﾞｬﾝﾎﾞ * SYJ-223ｼﾞｬﾝﾎﾞ TH-501ﾌﾛｱﾌﾞﾙ TH-547(Z)ｼﾞｬﾝﾎﾞ TH-547(Z)-1kg粒 KUH-072K-0.25kg粒 KUH-883(L)-1kg粒	SB-564ﾌﾛｱﾌﾞﾙ SL-0601ｼﾞｬﾝﾎﾞ SL-0602-1kg粒 SL-0701-1kg粒 * SL-1001-1kg粒 SW-043-1kg粒 SW-062ﾌﾛｱﾌﾞﾙ SW-091-1kg粒 SYJ-157-1kg粒 SYJ-222-1kg粒 * SYJ-223-1kg粒 TH-501-1kg粒 TH-547(Z)ﾌﾛｱﾌﾞﾙ TH-601ｼﾞｬﾝﾎﾞ SYJ-219-1kg粒		
A-2 体系(初期)	HOK-0901ﾌﾛｱﾌﾞﾙ KPP-314ﾌﾛｱﾌﾞﾙ	HOK-0901-1kg粒 SB-531ﾌﾛｱﾌﾞﾙ(少量散布)	BAH-1103-1kg粒 MAT-159ｼﾞｬﾝﾎﾞ(少量散布)	KPP-507ﾌﾛｱﾌﾞﾙ
A-3 体系(中後期)	HOK-0721粒 KUH-983-0.25kg粒 * NC-630-1kg粒 * SL-0602-1kg粒 SL-0613顆粒水和(顆粒のまま散布) * SL-0701(RC)-0.5kg粒 SW-063-1kg粒 DASH-001SC	HOK-0802-1kg粒 * MIH-104-1kg粒 * SL-0601ｼﾞｬﾝﾎﾞ SL-0613顆粒水和 * SL-0701-1kg粒 SW-051-1kg粒 * SYJ-222-1kg粒 * KUH-104-1kg粒	BCH-100-1kg粒 NH-1101-1kg粒	KPP-129-1kg粒 SW-064-1kg粒
A-4 エゾノサヤヌカケサ	* SL-0604-1kg粒		MIH-102(H)ﾌﾛｱﾌﾞﾙ NH-1001(H)-1kg粒 S-9058ｼﾞｬﾝﾎﾞ S-9058ﾌﾛｱﾌﾞﾙ S-9421ｼﾞｬﾝﾎﾞ S-9421-1kg粒 TH-601ﾌﾛｱﾌﾞﾙ	NH-1001(H)ﾌﾛｱﾌﾞﾙ S-9058-1kg粒 S-9421ﾌﾛｱﾌﾞﾙ SYJ-222-1kg粒 TH-601-1kg粒
A-4 オモダカ	* BAH-041-1kg粒 * HOK-0301ﾌﾛｱﾌﾞﾙ * HOK-0721粒 * HOK-0801-1kg粒 * HOK-0801(L)ﾌﾛｱﾌﾞﾙ * HOK-0802-1kg粒 * KPP-398(L)-1kg粒 * KPP-501-1kg粒 * KUH-021-0.25kg粒 * KUH-041-0.25kg粒 * KUH-072K-1kg粒	BCH-085L-1kg粒 * HOK-0605ｼﾞｬﾝﾎﾞ * HOK-0801ｼﾞｬﾝﾎﾞ * HOK-0801(L)ｼﾞｬﾝﾎﾞ * HOK-0801(L)-1kg粒 * KPP-398-1kg粒 * KPP-406(L)ﾌﾛｱﾌﾞﾙ * KPP-501(L)-1kg粒 * KUH-041ｼﾞｬﾝﾎﾞ * KUH-072D-1kg粒 * KUH-074-0.25kg粒	BCH-105H-1kg粒 HOK-0801S-1kg粒 HOK-1002(L)-1kg粒 KUH-074ｼﾞｬﾝﾎﾞ KUH-101-1kg粒 MIH-101-1kg粒 MIH-102(H)ﾌﾛｱﾌﾞﾙ MIH-104-1kg粒 NC-627顆粒水和 NC-629ﾌﾛｱﾌﾞﾙ NC-631ｼﾞｬﾝﾎﾞ	BCH-105L-1kg粒 HOK-1002-1kg粒 KPP-505-1kg粒 KUH-091-1kg粒 KUH-103-1kg粒 MIH-102ﾌﾛｱﾌﾞﾙ MIH-103ｼﾞｬﾝﾎﾞ NC-626ｼﾞｬﾝﾎﾞ NC-629ｼﾞｬﾝﾎﾞ NC-629-1kg粒 NC-631顆粒水和

区 分	実・継		継	
A-4 オモダカ つづき	* KUH-074-1kg粒 * NC-606フロアブル * NC-626-1kg粒 * NC-627フロアブル * NH-596フロアブル * S-9421-1kg粒 * SB-556-1kg粒 * SW-052シ'ャンボ' * TH-501シ'ャンボ' * TH-501-1kg粒 * TH-601フロアブル * YH-650-1kg粒 SL-4903-1kg粒	* KUH-104-1kg粒 * NC-609-1kg粒 * NC-627シ'ャンボ' NC-627-1kg粒 * S-9421フロアブル * SB-556フロアブル * SW-043-1kg粒 * SW-061-1kg粒 * TH-501フロアブル * TH-601シ'ャンボ' * TH-601-1kg粒 DASH-001SC	NC-631-1kg粒 NC-632-1kg粒 NH-061-0.25kg粒 NH-1001(H)-1kg粒 NH-596-1kg粒 S-9058フロアブル S-9102粒 SL-0701シ'ャンボ' SW-091-1kg粒	NC-632シ'ャンボ' NH-061シ'ャンボ' NH-1001(H)フロアブル NH-1101-1kg粒 S-9058シ'ャンボ' S-9058-1kg粒 S-9421シ'ャンボ' SW-064-1kg粒 SYJ-222-1kg粒
A-4 クサネム			NC-627-1kg粒	
A-4 クロクワイ	* BAH-041-1kg粒 * HOK-0721粒 * HOK-0801(L)フロアブル * HOK-0802-1kg粒 * KPP-398(L)-1kg粒 * KPP-501-1kg粒 * KUH-041シ'ャンボ' * KUH-072K-1kg粒 * KUH-074シ'ャンボ' * KUH-074-1kg粒 * NC-609-1kg粒 * NC-618-1kg粒 * NC-626-1kg粒 * S-9421-1kg粒 SST-403シ'ャンボ' * SW-052シ'ャンボ' * TH-501シ'ャンボ' * TH-501-1kg粒 * TH-601フロアブル * SL-4903-1kg粒	BCH-085L-1kg粒 * HOK-0801(L)シ'ャンボ' * HOK-0801(L)-1kg粒 * KPP-314フロアブル * KPP-406(L)フロアブル * KPP-501(L)-1kg粒 * KUH-072D-1kg粒 * KUH-073-1kg粒 * KUH-074-0.25kg粒 * KUH-104-1kg粒 * NC-617SB-1kg粒 * NC-621-1kg粒 * S-9421フロアブル SL-0701-1kg粒 * SW-043-1kg粒 * SW-061-1kg粒 * TH-501フロアブル * TH-601シ'ャンボ' * TH-601-1kg粒	BCH-105H-1kg粒 HOK-0801S-1kg粒 HOK-1002-1kg粒 KUH-091-1kg粒 KUH-103-1kg粒 MIH-102フロアブル MIH-104-1kg粒 NC-629シ'ャンボ' NC-629-1kg粒 NC-631シ'ャンボ' NC-631-1kg粒 NC-632-1kg粒 NH-061-0.25kg粒 NH-1001(H)-1kg粒 NH-596フロアブル S-9058シ'ャンボ' S-9058-1kg粒 S-9421シ'ャンボ' SYJ-222-1kg粒	BCH-105L-1kg粒 HOK-1002(L)-1kg粒 KPP-505-1kg粒 KUH-101-1kg粒 MIH-101-1kg粒 MIH-103シ'ャンボ' NC-626シ'ャンボ' NC-629フロアブル NC-630-1kg粒 NC-631顆粒水和 NC-632シ'ャンボ' NH-061シ'ャンボ' NH-1001(H)フロアブル NH-1101-1kg粒 NH-596-1kg粒 S-9058フロアブル S-9102粒 SL-0701シ'ャンボ'
A-4 コウキヤガラ	* BAH-041-1kg粒 * BCH-033-1kg粒 * KPP-406(L)フロアブル * KUH-021-0.25kg粒 * KUH-104-1kg粒 * S-9421-1kg粒 SL-0401-1kg粒(1.5kg処理) * SL-0701-1kg粒 * SST-403シ'ャンボ'	* BCH-032-1kg粒 * KPP-314フロアブル * KPP-501(L)-1kg粒 * KUH-074シ'ャンボ' * S-9421フロアブル * SL-0401-1kg粒(1kg処理) * SL-0601-1kg粒 * SL-4902フロアブル SW-051-1kg粒	BCH-052フロアブル BCH-062シ'ャンボ' KPP-505-1kg粒 NC-632シ'ャンボ' S-9058シ'ャンボ' S-9058-1kg粒 S-9421シ'ャンボ' SW-063-1kg粒	BCH-053フロアブル BCH-063シ'ャンボ' KUH-101-1kg粒 NC-632-1kg粒 S-9058フロアブル S-9102粒 SL-0701シ'ャンボ' SYJ-222-1kg粒

区 分	実・継		継	
A-4 コウキヤガラ つづき	* TH-501シ'ャンボ'	* TH-501-1kg粒		
	* TH-547(Z)シ'ャンボ'	* TH-547(Z)フロアブル		
	* TH-601シ'ャンボ'	* TH-601フロアブル		
	* TH-601-1kg粒	YH-650-1kg粒		
	* YH-652フロアブル	* YH-652-1kg粒		
A-4 シズ'イ	* BAH-041-1kg粒	* KPP-398-1kg粒	BCH-031-1kg粒	BCH-033-1kg粒
	* KUH-073-1kg粒	* KUH-104-1kg粒	BCH-051シ'ャンボ'	BCH-051フロアブル
	* NC-606フロアブル	* NC-621-1kg粒	BCH-052フロアブル	BCH-053フロアブル
	* S-9421フロアブル	* SL-0601シ'ャンボ'	BCH-062シ'ャンボ'	BCH-063シ'ャンボ'
	* SL-0701-1kg粒	* SL-4902フロアブル	HOK-0605フロアブル	HOK-0605-1kg粒
	* SST-403-1kg粒	* TH-501-1kg粒	HOK-0721粒	HOK-0801フロアブル
	* TH-601フロアブル	* TH-601-1kg粒	HOK-0801-1kg粒	KPP-501-1kg粒
			KUH-041-0.25kg粒	KUH-091-1kg粒
			NC-606-1kg粒	NC-626-1kg粒
			NC-630-1kg粒	S-9058フロアブル
			S-9058-1kg粒	S-9421-1kg粒
			SL-0604-1kg粒	SW-061-1kg粒
			SYJ-222-1kg粒	TH-501シ'ャンボ'
			TH-601シ'ャンボ'	BCH-051シ'ャンボ'
A-4 ミズ'アオイ	* KUH-041-1kg粒	BCH-031-1kg粒	BCH-051フロアブル	MIH-102(H)フロアブル
			S-9058シ'ャンボ'	S-9058フロアブル
			S-9058-1kg粒	S-9421シ'ャンボ'
			S-9421フロアブル	S-9421-1kg粒
			SYJ-222-1kg粒	DASH-001SC
			MIH-102(H)フロアブル	BCH-031-1kg粒
			BCH-051シ'ャンボ'	BCH-051フロアブル
A-4 雑草イネ	* SYJ-167-1kg粒		BCH-031-1kg粒	BCH-032-1kg粒
			BCH-033-1kg粒	SL-0604-1kg粒
			SYJ-219-1kg粒	
B-1 直播(移植A-1剤)	* BAG-032シ'ャンボ'	* BCH-031-1kg粒	BCH-032-1kg粒	BCH-033-1kg粒
	BCH-044-1kg粒	* HOK-0605(L)フロアブル	BCH-051シ'ャンボ'	BCH-051フロアブル
	HOK-0605S-1kg粒	* HOK-0801-1kg粒	BCH-052フロアブル	BCH-053フロアブル
	* HOK-0801(L)フロアブル	* HOK-0801(L)-1kg粒	BCH-062シ'ャンボ'	BCH-063シ'ャンボ'
	KUH-021-1kg粒	NBA-101SBシ'ャンボ'	HOK-0801(L)シ'ャンボ'	HOK-223シ'ャンボ'
	NC-606シ'ャンボ'	* NC-627顆粒水和	KUH-021-0.25kg粒	KUH-091-1kg粒
	* NC-627-1kg粒	S-9146-1kg粒	KUH-101-1kg粒	MIH-101-1kg粒
	* SB-564フロアブル	* SB-564-1kg粒	NC-626-1kg粒	SL-0601シ'ャンボ'
	* SL-0601(RC)-0.5kg粒	* SL-0701-1kg粒	SL-1001-1kg粒	MY-100DC(L)-1kg粒
	* SL-0701(RC)-0.5kg粒	SST-404シ'ャンボ'	BAH-041-1kg粒	
	SST-404-1kg粒	* SW-052シ'ャンボ'		
	* SYJ-156-1kg粒	* TH-501-1kg粒		
	* TH-547(Z)シ'ャンボ'	* TH-547(Z)フロアブル		
	* TH-547(Z)-1kg粒	* TH-601シ'ャンボ'		

区 分	実 ・ 継	継
B-1 直播(移植A-1剤) つづき	* TH-601フロアブル * TH-601-1kg粒 HOK-0605(L)-1kg粒	
B-2 直播(移植A-2剤)	KUH-983-1kg粒 SL-0401-1kg粒 SL-4901フロアブル SL-4901フロアブル(少量散布) SW-751粒 SW-751粒(少量散布) * YH-650フロアブル(希釈して全面散布) * YH-650-1kg粒	KUH-983-1kg粒(少量散布)
B-3 直播(移植A-3剤)	NC-612-1kg粒 SL-0613顆粒水和 HOK-0721粒	HOK-0802-1kg粒 KUH-983-0.25kg粒 SL-0613顆粒水和(顆粒のまま散布)
B-4 直播(その他)	NC-331水和	
C 畦畔	* SB-211フロアブル	

注): 1) 本年度新規に使用基準が作成されたものは、薬剤名に「*」を記した。
 2) 本年度は「実」、「継?」及び「中止」と判定された薬剤はなかった。

平成23年度 水稻関係除草剤使用基準一覧表

A 移植栽培

A-1 一発処理

A-1

1

BAH-041-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ワカバ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始		○前～ 始※	○発生 期			+0～ノビエ1.5L	1kg	○	○
東北	○1.5	○	○始	○始	○始	○始	○始※	●前～ 始※	○発生 期		シズイ草丈3cm			○	○
北陸	○1.5	○	○始		○始	○始	○前～ 始※	○前～ 始※	○発生 期		○前			○	○
関東・東海	○1.5	○	○2		○始	○始	○始※	○前～ 始※	○発生 期		○前	コキヤガタ始		○	○
近・中・四	○1.5	○	○2		○始	○始	●前～ 始※	○始※	○発生 期		○前	コキヤガタ始		○	○
九州	○1.5	○	○始		○始	○始	●前～ 始※	●前～ 始※	○発生 期			コキヤガタ始		○	○

田植同時散布可能
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な後処理剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

4

BCH-031-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ワカバ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		○始	○発生 期	○再生 前～始	エゾノキヤガタ2L シズイ草丈2L	+5～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	タネムシ2L			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始 2	○始※	○始	○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ2.5L		○*	○
関東・東海	○2.5 3	○	○2 3		○2 3	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	タネムシ2L	+5～ノビエ2.5L3L (砂壌土は2.5Lまで)		○	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2	○始※	○始	○発生 期	○再生 前～始	タネムシ2L	+5～ノビエ3L		○	○
九州	○2.5 3	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	コキヤガタ始	+5～ノビエ2.5L3L (砂壌土は2.5Lまで)		○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な後処理剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: * 浅植え、植付け精度不良等で薬害を生じることがある。
セリは再生が早い場合は効果が劣る。(九州)
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。(東北、関東・東海)
オモダカ防除は有効な後処理剤または後処理剤との組み合わせで使用。(北海道、北陸、近・中・四、九州)
クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1

5

BCH-032-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ワカバ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		○始	○発生 期	○再生 前～始	エゾノキヤガタ2L シズイ草丈2L SU抵抗性2L	+5～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	シズイ草丈3cm			○	○
北陸	○3	○	○2		○2	○2	○始※	○始	○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ3L		○*	○
関東・東海	○3	○	○3		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	コキヤガタ始			○	○
近・中・四	○3	○	○3		○2	○2	○始※	○始	○発生 期	○再生 前～始				○	○
九州	○3	○	○3		○3	○3	○始※	○始	○発生 期	○再生 前～始	コキヤガタ始			○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な後処理剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の低温条件により強い生育抑制を受けることがある。(北海道)
*:浅植え、植付け精度不良等で薬害を生じることがある。
セリは再生が早い場合は効果が劣る。(九州)
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ・シズイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1 6

BCH-051 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始		○前～ 始※	○発生 期	○再生 前～始		エゾノキヤヌダグサ・2L	+5～ノビエ2.5L	30g×10コ	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始		○前～ 始※	○発生 期	○再生 前～始					○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始	○前～ 始	○始※	○発生 期						○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○始※	○前～ 始※	○発生 期	○再生 前～始						○	○
近・中・四	○2.5	○	○2 3		○2 3	○始	○始※	○発生 期	○再生 前～始						○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始						○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: セリは再生が早い場合は効果が劣る。(九州)

5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

オモダカ防除は有効な前処理または後処理剤との組み合わせで使用。(北海道、東北、関東・東海、近・中・四、九州)

オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。(北陸)

クログワイ防除は有効な前処理または後処理剤との組み合わせで使用。(北陸、近・中・四)

クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。(関東・東海、九州)

A-1 7

BCH-051 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始		○始※	○発生 期	○再生 前～始		エゾノキヤヌダグサ・2L	+5～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○前～ 始※	○前～ 始※	○発生 期	○再生 前～始					○	○
北陸	○3	○	○2		○2	○始	○始※	○始※	○発生 期				+5～ノビエ3L		○	○
関東・東海	○3	○	○3		○2	○2	○始※	○前～ 始※	○発生 期	○再生 前～始					○	○
近・中・四	○3	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始					○	○
九州	○2.5 3	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始			+5～ノビエ2.5L(砂 壌土は2.5Lまで)		○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

水口処理可能

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: セリは再生が早い場合は効果が劣る。(九州)

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

オモダカ防除は有効な前処理または後処理剤との組み合わせで使用。(北海道、東北、関東・東海、近・中・四、九州)

オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。(北陸)

クログワイ防除は有効な前処理または後処理剤との組み合わせで使用。(東北、北陸、近・中・四)

クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。(関東・東海、九州)

A-1 10

BCH-101-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●3	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始			+0～ノビエ3L	1kg		●
東北	●3	●	●3	●2	●3	●始			●発生 期	●再生 前～始					●	●
北陸	●3	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始						●
関東・東海	●3	●	●3		●3	●2			●発生 期	●再生 前～始					●	●
近・中・四 (昔)	●3	●	●3		●3	●3			●発生 期	●再生 前～始						●
九州	●3	●	●3		●3	●3			●発生 期	●再生 前～始						●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

浅植え、壁付け精度不良等で根が露出すると薬害を生じることがある。(東北)

コナギ多発田では早めに使用する。

A-1 11
BCH-105H-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツ	ウリカワ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始			+0～ノビエ2.5L	1kg		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始					●	●
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																
田植同時散布可能 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:																

A-1 12
BCH-105L-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツ	ウリカワ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道													+0～ノビエ2.5L	1kg		
東北																
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期							●
関東・東海	●2	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始						●
近・中・四 (普)	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●	●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始						●
田植同時散布可能 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。																

A-1 13
HOK-0701S シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツ	ウリカワ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道													+0～ノビエ2L	70g×10a		
東北																
北陸																
関東・東海																
近・中・四	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始					○	○
九州																
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。																

A-1 14
HOK-0801(L) シンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ワカバ	クロタ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 植土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	●前～ 始	●前～ 始	○発生 期	○再生 前～始		+0～ノビエ2.5L	50g×10コ	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●前～ 始※	○前～ 始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●前～ 始	○始	○発生 期	○再生 前～始				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●前～ 始※		○発生 期	○再生 前～始					○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足を生じることがある。
浅植え、植付け精度不良等で根が露出すると薬害を生じることがある。(九州)
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1 15
HOK-0801(L) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ワカバ	クロタ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 植土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始	●前～ 始		○発生 期	○再生 前		+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2 3		○2	○2	●前～ 始※	○前～ 始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●前～ 始	○始	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2	○始	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

田植同時散布可能
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 浅植え、植付け精度不良等で根が露出すると薬害を生じることがある。(九州)
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1 16
HOK-0801(L)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ワカバ	クロタ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 植土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始	●前～ 始		○発生 期	○再生 前		+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2 3		○始	○2	●前～ 始※	○前～ 始※	○発生 期	○再生 前～始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●前～ 始	○始	○発生 期	○再生 前～始				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○

田植同時散布可能
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 浅植え、植付け精度不良等で根が露出すると薬害を生じることがある。(九州)
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1 17

HOK-0801S-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始				○再生 前～始		+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始		+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は2Lまで)		●	○
近・中・四 (第)	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始		+0～ノビエ2.5L		●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○

田植同時散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1 18

HOK-1002 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ2L	30g×10 ²		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ2.5L		●	●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足を生じることがある。

A-1 19

HOK-1002 プロアフル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ2L	500ml		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ2.5L		●	●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

A-1 20
HOK-1002-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ネタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロガ ワ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	●2	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ2L	1kg		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ2.5L			●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

A-1 21
HOK-1002(L) シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ネタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロガ ワ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道															
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	30g×10コ	●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足を生じることがある。
浅植え、植付け精度不良等で根が露出すると薬害を生じることがある。(近・中・四、九州)
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1 22
HOK-1002(L) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ネタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロガ ワ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道															
東北															
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前 (藻類)	+5～ノビエ2.5L	500ml	●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●

全面散布(北陸)
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 浅植え、植付け精度不良等で根が露出すると薬害を生じることがある。(九州)
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1 23

HOK-1002(L)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クログ ワ	オモダカ	ヒルム シ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土 ～ 塩土
北海道														
東北														
北陸	●2.5	●	●2	●始	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前		+5～ノビエ2.5L	1kg	● ●
関東・東海	●2.5	●	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
近・中・四 (當)	●2.5	●	●2	●2	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●
九州	●2.5	●	●2	●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 浅植え、植付け精度不良等で根が露出すると薬害を生じることがある。(九州)

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1 27

KPP-398(L)フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クログ ワ	オモダカ	ヒルム シ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土 ～ 塩土
北海道														
東北														
北陸	○1.5	○	○始	○始	○始	○始		○発生 期	○再生 前～始	○前		+0～ノビエ1.5L	500ml	○ ○
関東・東海	○1.5	○	○始	○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前				○ ○
近・中・四	○1.5	○	○始	○始	○始	○始		○発生 期	○再生 前～始	○前				○ ○
九州	○1.5	○	○始	○2	○始	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前				○ ○

田植同時散布可能

※: クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1 28

KPP-398(L)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クログ ワ	オモダカ	ヒルム シ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土 ～ 塩土
北海道														
東北														
北陸	○1.5	○	○始	○始	○始	○前～ 始	○始	○発生 期	○再生 前～始			+0～ノビエ1.5L	1kg	● ○
関東・東海	○1.5	○	○始	○始	○始	●前～ 始※	○前～ 始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	ウツカヲ始			○ ○
近・中・四	○1.5	○	○始	○始	○始	●前～ 始	○始	○発生 期	○再生 前～始					○ ○
九州	○1.5	○	○始	○前	○始	○始	○前～ 始※	○発生 期	○再生 前～始		ウツカヲ始			○ ○

田植同時散布可能

※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クログワイ・ウツカヲ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1 29
KPP-406(L) フロアフル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツ	ウリカ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	○前～ 始		○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●前～ 始※		○発生 期	○再生 前～始	○前	○2.5ノビエ2.5L		○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●前～ 始	●前～ 始	○発生 期	○再生 前～始				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前	○2.5ノビエ2.5L		●	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ・ヨウキヤガ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1 30
KPP-505-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツ	ウリカ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北	●3	●	●3	●3	●3	●始			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ3L	1kg	●	●
北陸	●3	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始				●	●
関東・東海	●3	●	●3		●2	●3			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四	●3	●	●3		●3	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●3	●	●2		●3	●2			●発生 期	●再生 前～始					●

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1 33
KUH-021 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツ	ウリカ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道	○3	○	○3	○3		○2			○発生 期	○再生 前～始		+3～ノビエ3L	25g×10コ		○
東北	○3	○	○2	○2	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
北陸	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
関東・東海	○3	○	○3		○3	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
近・中・四	○3	○	○3		○3	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○
九州	○3	○	○3		○3	○3			○発生 期	○再生 前～始				○	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足を生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1 34

KUH-041 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウカワ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壌土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生 期	○再生 前～始		+3～ノビエ2.5L	25g×10コ	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	●前～ 始※		○発生 期	○再生 前～始				○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始	●前～ 始		○発生 期	○再生 前～始				○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足を生じることがある。

浅植え、植付け精度不良等で根が露出すると薬害を生じることがある。(九州)

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1 35

KUH-041-0.25kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウカワ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壌土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始		●前～ 始	○発生 期	○再生 前～始		+3～ノビエ2.5L	250g	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始		●始※	○発生 期	○再生 前～始				○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始				○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2	○始	○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前			●	○

灌水周縁部散布可能

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

灌水周縁部散布では藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足を生じることがある。

浅植え、植付け精度不良等で根が露出すると薬害を生じることがある。(九州)

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1 36

KUH-041-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウカワ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壌土
北海道	○3	○	○2	○2		○2		○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ3L(砂 壌土は+3～)	1kg	○	○
東北	○3	○	○3	○3	○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
北陸	○3	○	○3		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
関東・東海	○3	○	○3		○3	○3	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○3	○	○3		○3	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○3	○	○3		○3	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

田植同時散布可能

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1 37

KUH-072D ジェンボ'

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツ	ワカワ	クロダ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道																
東北																
北陸	○2.5	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始			+3～ノビエ2.5L	25g×10 ³	●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始					○	○
近・中・四 (昔)	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始					●	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始						○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足を生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1 38

KUH-072D フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツ	ワカワ	クロダ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道																
東北																
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始			+3～ノビエ2.5L	500ml	●	●
関東・東海	●2.5	●	●3		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始						●
近・中・四 (昔)	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始						●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始						●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1 39

KUH-072D-0.25kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツ	ワカワ	クロダ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道																
東北																
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始			+3～ノビエ2.5L	250g	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始					●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始					○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始						○

湛水周縁部散布可能(北陸～九州)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

湛水周縁部散布では藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足を生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1 40

KUH-072D-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始	●前～ 始	●始	○発生 期	○再生 前～始		+3～ノビエ2.5L	1kg	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●前～ 始※		○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●前～ 始	●前～ 始	○発生 期	○再生 前～始				○	○
九州	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始				●	○

※：クロクワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深：2cm/日以下
 使用上の注意： 浅植え、植付け精度不良等で根が露出すると薬害を生じることがある。(近畿・中国・四国、九州)
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クロクワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1 41

KUH-072K シェンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始		+3～ノビエ2.5L	25g×100		●
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始				○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深：2cm/日以下
 使用上の注意： 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足を生じることがある。

A-1 42

KUH-072K フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始		+3～ノビエ2.5L	500ml		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●2			●発生 期	●再生 前～始				●	●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深：2cm/日以下
 使用上の注意：

A-1 43
KUH-074 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツ	ウリカ	クログワ イ	オモダカ	ヒルム シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始		+3～ノビエ2.5L	25g×10コ		○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始				○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始	●前～ 始		○発生 期	○再生 前～始				○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	コキヤガラ始			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○

減水深：2cm/日以下
 使用上の注意： 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足を生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1 44
KUH-074-0.25kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツ	ウリカ	クログワ イ	オモダカ	ヒルム シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生 期	○再生 前～始		+3～ノビエ2.5L	250g		○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始		●前～ 始※	○発生 期	○再生 前～始				○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始		●前～ 始	○発生 期	○再生 前～始				○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※		○発生 期	○再生 前～始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○

湛水周縁部散布可能(北海道～北陸、近畿・中国・四国、九州)
 ※：オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深：2cm/日以下
 使用上の注意： 5cm程度の水深で散布する。
 湛水周縁部散布では藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足を生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1 46
KUH-074L-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツ	ウリカ	クログワ イ	オモダカ	ヒルム シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2	○	○始	○始		○始			○発生 期	○再生 前～始		+0～ノビエ2L	1kg	○	○
東北	○2	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始				○	○
北陸	○2	○	○2		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始				○	○
関東・東海	○2	○	○2		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始				○	○
近・中・四	○2	○	○2		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始				○	○
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○

田植同時散布可能
 減水深：2cm/日以下
 使用上の注意： 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1 49

KUH-091-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○3	○	○3	○3		○2			○発生 期	○再生 前～始		+3～ノビエ3L	1kg	○	○
東北	○3	○	○2 3	○3	○3	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○
北陸	○3	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始				○	○
関東・東海	○3	○	○3		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
近・中・四 (各)	○3	○	○3		○3	○3			○発生 期	○再生 前～始				●	○
九州	○3	○	○3		○3	○3			○発生 期	○再生 前～始				●	○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。															

A-1 50

KUH-101 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始			+3～ノビエ2.5L	25g×10 ³		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始						●
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始						●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始						●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始						●
減水深: 2cm/日以下																
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足を生じることがある。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。																

A-1 51

KUH-101-0.25kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始			+3～ノビエ2.5L	250g		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始					●	●
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始					●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2				●発生 期	●再生 前～始						●
近・中・四（併）	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始						●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始						●
湛水周縁部散布可能 減水深：2cm/日以下 使用上の注意： 5cm程度の水深で散布する。 湛水周縁部散布では藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足を生じることがある。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。																

A-1

52

KUH-101-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウツカ リ	クロク アイ	オモダカ	ヒルム シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤 土	壤土 ～ 植土
北海道	●3	●	●2	●3		●2			●発生 期	●再生 前～始			+3～ノビエ3L	1kg		●
東北	●3	●	●3	●3	●2	●2			●発生 期	●再生 前～始						●
北陸	●3	●	●2		●始											●
関東・東海	●3	●	●3		●3	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前				●	●
近・中・四（普）	●3	●	●3		●3	●2			●発生 期	●再生 前～始					●	●
九州	●3	●	●2		●3	●3			●発生 期	●再生 前～始						●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

55

KUH-103-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウツカ リ	クロク アイ	オモダカ	ヒルム シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤 土	壤土 ～ 植土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始			+0～ノビエ2.5L	1kg		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始						●
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始					●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始						●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2				●発生 期	●再生 前～始						●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始						●

田植同時散布可能

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1

57

KYH-1001 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウツカ リ	クロク アイ	オモダカ	ヒルム シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤 土	壤土 ～ 植土
北海道													+0～ノビエ2.5L	500ml		
東北																
北陸																
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始						●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始						●

田植同時散布可能

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1 58
KYH-1001-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クロタ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北															
北陸															
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前	+0～ノビエ2.5L	1kg	●	●
近・中・四 (普)	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●

田植同時散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1 59
MIH-101-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クロタ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○3	○	○3	○3		○2			○発生 期			+5～ノビエ3L	1kg		○
東北	○3	○	○3	○3	○3	○始			○発生 期					●	○
北陸	○3	○	○2 3		○2 3	○始 2			○発生 期	●再生 前～始				●	○
関東・東海	○3	○	○3		○3	○2			○発生 期	○再生 前～始	●前			○*	○
近・中・四	○3	○	○3		○3	○3			○発生 期	●再生 前～始				●	○
九州	○3	○	○3		○3	○3			○発生 期	○再生 前～始					○

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: *: 散布後の低温および急激な気温の上昇により薬害を生じることがある。
*: 浅植え、植付け精度不良等で根が露出すると薬害を生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1 61
MIH-102 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クロタ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北	●3	●	●2		●3	●2			●発生 期			+5～ノビエ3L	500ml	●	●
北陸	●3	●	●3		●2	●2			●発生 期						●
関東・東海	●3	●	●3		●3	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四	●3	●	●3		●3	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●3	●	●3		●3	●3			●発生 期						●

ノビエ3L処理は全面散布
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1 62

MH-102(H) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウツカワ	クロクワ イ	オモタカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道	●3	●	●2	●3		●2			●発生 期			+5～ノビエ3L	500ml		●
東北															
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

A-1 63

MH-103 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウツカワ	クロクワ イ	オモタカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道															
東北	●3	●	●3	●2	●3	●始			●発生 期			+5～ノビエ3L	50g×10コ	●	●
北陸	●3	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始				●	●
関東・東海	●3	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始				●	●
近・中・四 (番)	●3	●	●3		●3	●3			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●3	●	●3		●3	●3			●発生 期						●

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な被害や効果不足を生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1 70

NC-3855B-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウツカワ	クロクワ イ	オモタカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 壤土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性※ イ2L ミズライ2L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	SU抵抗性※ イ2L		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始	○始※	○始※	○発生 期					○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)		○	○

田植同時散布可能
※: オモタカ・クロクワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモタカ・クロクワイ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1 71

NC-397-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 堆土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+3～ノビエ1.5L	1kg		○
東北	○1.5	○	○始	○始	○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ1.5L		○	○
北陸	○1.5	○	○始		○始	○前				○再生 前～始		+0～ノビエ1.5L(砂 壌土は+3～)		○	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ1.5L		○	○
近・中・四 (第)	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始				○	○
九州															

田植同時散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

A-1 72

NC-609-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 堆土
北海道	○3	○	○2	○2		○2		○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ3L	1kg	○	○
東北	○3	○	○2	○2	○3	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	※77イ1L SL低減性オモ ダカ1L		○	○
北陸	○3	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	※ズ4:草丈3cm		○	○
関東・東海	○3	○	○3		○3	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
近・中・四	○3	○	○3		○3	○3	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○
九州	○3	○	○3		○3	○3	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始				●	○

田植同時散布可能
※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1 73

NC-626 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 堆土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始		+0～ノビエ2.5L	30g×10コ		●
東北	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始					●
北陸	●2.5	●	●2		●始	●2			●発生 期					●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足を生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1 74
NC-626 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クログ ワイ	オモダカ	ヒルム シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 植土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始		+0～ノビエ2.5L	80g(散布液 量500ml)		●
東北	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始				●	●
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期						●
関東・東海	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四 (管)	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●

顆粒のまま水口散布可能(専用袋使用)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。A-1 75
NC-626-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クログ ワイ	オモダカ	ヒルム シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 植土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		●前～ 始	○発生 期	○再生 前～始		+0～ノビエ2.5L	1kg		○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	●始※	●前～ 始※	○発生 期	○再生 前～始				○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始	●始※	●始	○発生 期	○再生 前～始				○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○始	●始※		○発生 期	○再生 前～始				○	○
近・中・四 (管)	○2.5	○	○2		○2	○2		●始	○発生 期	○再生 前～始				○	○
九州 (管)	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始					○

田植同時散布可能

※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1 76
NC-627 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クログ ワイ	オモダカ	ヒルム シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 植土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始		○始※	○発生 期	○再生 前～始	ミズアオイ2L SU抵抗性500 イ2L	+5～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始		○始※	○発生 期	○再生 前～始				○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2		○始※	○発生 期	○再生 前～始				○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2		○始※	○発生 期	○再生 前～始				○*	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2		○始※	○発生 期	○再生 前～始				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2		●始※	○発生 期	○再生 前～始				○	○

水口処理可能

※: オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: *: 散布後の低温条件により薬害を生じることがある。
セリは再生が早い場合は効果が劣る。(九州)
散布後著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。(北海道～近・中・四)

A-1 77
NC-627 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	80g(散布液 量500ml)		●
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期						●
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始				●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前			●	●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
顆粒のまま水口散布可能(専用袋使用)															
減水深: 2cm/日以下															
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。															

A-1 78
NC-627-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土	
北海道	○2.5	○	○2	○2				○始	○発生 期	○再生 前～始	ミズアオイ2L SL抵抗性オモ ダカ2L	+5～ノビエ2.5L	1kg	○	○		
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○2		○始※	○発生 期	○再生 前～始						○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2		○始	○発生 期	○再生 前～始						○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2		○始※	○発生 期	○再生 前～始						○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2		○始	○発生 期	○再生 前～始						○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始						○	○

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: セリは再生が早い場合は効果が劣る。(九州)

散布後著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1 79
NC-629 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	●3	●	●2	●3		●2			●発生 期	●再生 前～始		+3～ノビエ3L	40g×10コ		●
東北	●3	●	●3	●2	●3	●2			●発生 期	●再生 前～始				●	●
北陸	●3	●	●2		●始	●始			●発生 期						●
関東・東海	●3	●	●3		●始	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四	●3	●	●3		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●3	●	●2		●3	●3			●発生 期	●再生 前～始					●
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足を生じることがある。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。															

A-1 80
NC-629 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウツカ	クロタリ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 粘土
北海道	●3	●	●2	●3		●2			●発生 期	●再生 前～始		+3～ノビエ3L	500ml		●
東北	●3	●	●3		●3	●始			●発生 期	●再生 前～始					●
北陸	●3	●	●2		●2	●始			●発生 期						●
関東・東海	●3	●	●3		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四（普）	●3	●	●3		●3	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●3	●	●3		●3	●3			●発生 期	●再生 前～始					●

減水深：2cm/日以下

使用上の注意： 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1 81
NC-629-1kg粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウツカ	クロタリ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 粘土
北海道												+3～ノビエ3L	1kg		
東北	●3	●	●3	●2	●3	●始			●発生 期	●再生 前～始				●	●
北陸	●3	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始				●	●
関東・東海	●3	●	●3		●3	●始			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四	●3	●	●3		●3	●3			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●3	●	●2		●3	●3			●発生 期	●再生 前～始					●

減水深：2cm/日以下

使用上の注意： 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1 82
NC-631 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウツカ	クロタリ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 粘土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	30g×10 ²		●
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始					●
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期					●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●

減水深：2cm/日以下

使用上の注意： 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足を生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1 83

NC-631 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土	
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	80g(散布濃 度500ml)		●	
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始					●	●
北陸	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始						●
関東・東海	●2.5	●	●2		●始	●2			●発生 期	●再生 前～始						●
近・中・四（昔）	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始						●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始						●
顆粒のまま水口散布可能（専用袋使用）																
減水深：2cm/日以下																
使用上の注意： 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。																

A-1 84

NC-631-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	埴土 ～ 埴土
北海道															
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ2.5L	1kg	●	●
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始				●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始				●	
近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始				●	
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始				●	
減水深: 2cm/日以下															
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。															

A-1 85

NC-632 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉 マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離			処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道																	
東北	●3	●	●3	●2	●3	●2			●発生 期	●再生 前～始			+5～ノビエ3L	40g×10コ	●	●	
北陸	●3	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始					●	●	
関東・東海	●3	●	●3		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●		
近・中・四	●3	●	●3		●3	●3			●発生 期	●再生 前～始					●		
九州	●3	●	●2		●3	●2			●発生 期	●再生 前～始					●		
減水深: 2cm/日以下																	
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足を生じることがある。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。																	

A-1 87

NC-632-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘリオ タカ	ミズガ ヤツ	ウツカ リ	クログ ワ	オモガ カ	ヒルム シ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道															
東北	●3	●	●3	●2	●3	●始			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ3L	1kg	●	●
北陸	●3	●	●3		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始				●	●
関東・東海	●3	●	●3		●3	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四	●3	●	●3		●3	●3			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●3	●	●3		●3	●3			●発生 期	●再生 前～始					●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1 89

NH-061 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘリオ タカ	ミズガ ヤツ	ウツカ リ	クログ ワ	オモガ カ	ヒルム シ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道															
東北	●2.5	●	●2	●2	●2	●始			●発生 期	●再生 前～始		+3～ノビエ2.5L	25g×10コ		●
北陸	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始				●	●
関東・東海	●2.5	●	●2		●始				●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四(普)	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足を生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1 90

NH-061-0.25kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘリオ タカ	ミズガ ヤツ	ウツカ リ	クログ ワ	オモガ カ	ヒルム シ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道															
東北	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始		+3～ノビエ2.5L	250g		●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

湛水周縁部散布可能(東北)

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
湛水周縁部散布では藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足を生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1 91

NH-061-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	○3	○	○3	○2		○2		○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	エゾノキヤガラ・2L	+3～ノビエ3L	1kg	○	○
東北	○3	○	○3	○3	○2	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始					○	○
北陸	○3	○	○3		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始					○	○
関東・東海	○3	○	○3		○3	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始		コウキヤガラ・始			○	○
近・中・四	○3	○	○3		○3	○3	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始					○	○
九州	○3	○	○3		○3	○3	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始		コウキヤガラ・始			○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1 92

NH-071D フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道																
東北																
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始	○始	○始	○発生 期	○再生 前～始	○前		+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○前～ 始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コウキヤガラ・始			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始	○始	○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コウキヤガラ・始			○	○

田植同時散布可能

水口処理可能

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1 93

NH-1001(H) シンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始			+3～ノビエ2.5L	60g×10㎡		●
東北	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始						●
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足を生じることがある。

A-1 94
NH-1001(H) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウツカワ	クロダ ワ	オモダ カ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 礫 土	壤土 へ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始		+3～ノビエ2.5L	500ml		●
東北	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始				●	●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

水口処理確認(北海道,東北)
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

A-1 95
NH-1001(H)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウツカワ	クロダ ワ	オモダ カ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 礫 土	壤土 へ 埴土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2			●発生 期	●再生 前～始		+3～ノビエ2.5L	1kg		●
東北	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始				●	●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の低温および急激な気温の上昇により被害を生じることがある。(東北)
浅植え, 植付け精度不良等で被害を生じることがある。(東北)

A-1 96
NH-596 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウツカワ	クロダ ワ	オモダ カ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 礫 土	壤土 へ 埴土
北海道															
東北	●2.5	●	●2	●始	●2	●始			●発生 期			+3～ノビエ2.5L	50g×10コ	●	●
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な被害や効果不足を生じることがある。

A-1 97

NH-596プロアル(旧 SB-596プロアル)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期			+3～ノビエ2.5L	500ml	●	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始		●前～ 始※	○発生 期					○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期					○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生 期					○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期					○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期					●	○

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ防除は有効な前処理または後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1 98

NH-596-1kg粒(旧 SB-596-1kg粒)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期			+3～ノビエ2.5L	1kg	●	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始			○発生 期					○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始		●発生 期						●	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期					●	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期					●	○
九州	○2.5	○	○3		○2	○2			○発生 期						○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1 99

S-9058 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 堆土
北海道	○3	○	○3	○3		○2			○発生 期			+5～ノビエ3L	40g×10コ	●	○
東北	○3	○	○3	○3	○2	○2			○発生 期					○	○
北陸	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	●再生 前～始					○
関東・東海	○3	○	○2 3		○3	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○
近・中・四	○3	○	○3		○3	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○
九州	○3	○	○3		○3	○3			○発生 期	○再生 前～始				●	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足を生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1 100

S-9058 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウツカ リ	クロダ リ	オモガ カ	ヒルム シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壌土 ～ 埋土
北海道	○3	○	○3	○3		○2			○発生 期				+5～ノビエ3L	500ml	●	○
東北	○3	○	○3	○3	○2	○2			○発生 期						○	○
北陸	○3	○	○3		○2	○始			○発生 期	●再生 前～始					●	○
関東・東海	○3	○	○3		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始					●	○
近・中・四	○3	○	○3		○3	○3			○発生 期	○再生 前～始					●	○
九州	○3	○	○3		○3	○3			○発生 期	○再生 前～始					●	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1 101

S-9058-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウツカ リ	クロダ リ	オモガ カ	ヒルム シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壌土 ～ 埋土
北海道	○3	○	○3	○3		○2			○発生 期				+5～ノビエ3L	1kg	●	○
東北	○3	○	○3	○3	○2	○2			○発生 期						○	○
北陸	●3	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始						●
関東・東海	○3	○	○3		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始					●	○
近・中・四	○3	○	○3		○3	○3			○発生 期	○再生 前～始					●	○
九州	○3	○	○3		○3	○3			○発生 期	○再生 前～始					●	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1 102

S-9102 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウツカ リ	クロダ リ	オモガ カ	ヒルム シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壌土 ～ 埋土
北海道													+0～ノビエ2L	3kg		
東北																
北陸																
関東・東海	○2	○	○2		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始					●	○
近・中・四 (昔)	○2	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始					●	○
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始					●	○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1 104

S-9421 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 植土
北海道	○3	○	○3	○3		○2			○発生 期			+5～ノビエ3L	20g×10㎡		○
東北	○3	○	○2	○2	○3	○2			○発生 期					○	○
北陸	○3	○	○2		○2	○始			○発生 期					●	○
関東・東海	○3	○	○3		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始				●	○
近・中・四	○3	○	○3		○2 3	○2			○発生 期	○再生 前～始				●	○
九州	○3	○	○3		○3	○3			○発生 期	○再生 前～始				●	○

減水深：2cm/日以下
 使用上の注意： 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足を生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

A-1 105

S-9421フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 植土
北海道	○3	○	○3	○3		○2		●前～ 始	○発生 期			+5～ノビエ3L	500ml	●	○
東北	○3	○	○3	○2	○3	○2	●始※	●前～ 始※	○発生 期		シズク基本3cm			○	○
北陸	○3	○	○2 3		○2 3	○2	●始	●始	○発生 期	○再生 前～始				●	○
関東・東海	○3	○	○2		○3	○3	●始※	●始	○発生 期	○再生 前～始	コキヤガラ始			○	○
近・中・四	○3	○	○3		○3	○3	●始	●前～ 始	○発生 期	○再生 前～始				○	○
九州	○3	○	○3		○3	○3			○発生 期	○再生 前～始	コキヤガラ始			○	○

※：オモダカ・クロクワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深：2cm/日以下
 使用上の注意： 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 浅植え、植付け精度不良等で根が露出すると薬害を生じることがある。(北海道)
 オモダカ・クロクワイ・コキヤガラ・シズク防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1 106

S-9421-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 植土
北海道	○3	○	○3	○3		○2		●前～ 始	○発生 期			+5～ノビエ3L	1kg	●	○
東北	○3	○	○3	○3	○3	○2	●前～ 始※	●前～ 始※	○発生 期					○	○
北陸	○3	○	○2 3		○2	○2	●始	●始	○発生 期	○再生 前～始				●	○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2	●前～ 始※	●始	○発生 期	○再生 前～始	コキヤガラ始			○	○
近・中・四	○3	○	○3		○2	○3	●始	●前～ 始	○発生 期	○再生 前～始	コキヤガラ始			○	○
九州	○3	○	○3		○3	○3			○発生 期	○再生 前～始	コキヤガラ始			○	○

※：オモダカ・クロクワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深：2cm/日以下
 使用上の注意： 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 浅植え、植付け精度不良等で根が露出すると薬害を生じることがある。(北海道)
 オモダカ・クロクワイ・コキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1 110

SB-531 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウツカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 殖土
北海道	○2	○	○始	○始					○発生 期				+0～ノビエ2L	500ml	●	○
東北	○2	○	○2	○2	○2				○発生 期							○
北陸	○2	○	○2		○始											○
関東・東海	○2	○	○2		○2				○発生 期						●	○
近・中・四 (若)	○2	○	○2		○2				○発生 期						●	○
九州	○2	○	○2		○始 2				○発生 期							○

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1 111

SB-564 シンボン

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウツカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 殖土
北海道	○2	○	○始	○始		○始			○発生 期				+3～ノビエ2L	30g×10 ³	○	○
東北	○2	○	○2	○始	○2	○始	○始※	○始※	○発生 期						○	○
北陸	○2	○	○2		○始	○始			○発生 期						○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期				+0～ノビエ2L		○	○
近・中・四	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期				+0～ノビエ2L (砂壌土は+3～)		○	○
九州	○2	○	○2	○始	○2	○2		○始※	○発生 期				+0～ノビエ2L		○	○

※: オモダカ・クロクワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クロクワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1 112

SB-564 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミスガヤ ツリ	ウツカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 殖土
北海道	○2	○	○始	○2		○始			○発生 期			シマアオイ2L	+0～ノビエ2L(砂 壌土は+3～)	500ml	○	○
東北	○2	○	○2	○始	○始	○始	○始※	○始※	○発生 期			シズイ草丈3cm	+0～ノビエ2L		○	○
北陸	○2	○	○2		○始	○始			○発生 期						○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期			コウキヤガラ:始			○	○
近・中・四	○2	○	○2		○始	○始	○始		○発生 期						○	○
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期			コウキヤガラ:始	+0～ノビエ2L(砂 壌土は+3～)		○	○

田植同時散布可能

※: オモダカ・クロクワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用。
クロクワイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1 113

SB-564-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クログ ワイ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2	○	○始	○2		○始			○発生 期			シズイ草丈2L	+0～ノビエ2L(砂 壌土は+3～)	1kg	○	○
東北	○2	○	○2	○始	○始	○始	○始※	○始※	○発生 期			シズイ草丈3cm	+0～ノビエ2L		○	○
北陸	○2	○	○2		○始	○始			○発生 期						○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期			コキヤガラ・始			○	○
近・中・四	○2	○	○2		○始	○始	○始		○発生 期						○	○
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期			コキヤガラ・始	+0～ノビエ2L(砂 壌土は+3～)		○	○

田植同時散布可能
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・シズイ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。
クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1 114

SL-0601 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クログ ワイ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道																
東北	○4	○	○3	○4		○3	○草丈 10cm※	○始※	○発生 期	○再生 前～始		シズイ草丈3cm	+7～ノビエ4L	50g×10㎡	○	○
北陸	○4	○	○4		○2	○草丈 10cm	○始	○発生 期	○再生 前～始						○	○
関東・東海	○4	○	○4		○3	○草丈 10cm※	○始※	○発生 期	○再生 前～始		コキヤガラ・始				○	○
近・中・四	○4	○	○4		○3	○草丈 10cm	○始	○発生 期	○再生 前～始				+5～ノビエ4L(砂 壌土は+7～)		○	○
九州	○4	○	○4		○4				○発生 期	○再生 前～始	コキヤガラ・始		+7～ノビエ4L		○	○

一年生広葉雑草以外のSU抵抗性雑草は対象としない。
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1 115

SL-0601-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クログ ワイ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道																
東北	○4	○	○4	○4		○3	○草丈 10cm※	○矢じり 葉抽出 前※	○発生 期	○再生 前～始		コキヤガラ・始 シズイ草丈3cm	+7～ノビエ4L	1kg	○	○
北陸	○4	○	○3		○2	○草丈 10cm	○矢じり 葉抽出 前	○発生 期							○	○
関東・東海	○4	○	○4		○3	○草丈 10cm※	○矢じり 葉抽出 前※	○発生 期	○再生 前～始		コキヤガラ・始 SU抵抗性コ キガラ				○	○
近・中・四	○4	○	○4		○3	○草丈 10cm	○矢じり 葉抽出 前	○発生 期	○再生 前～始		コキヤガラ・始		+5～ノビエ4L(砂 壌土は+7～)		○	○
九州	○4	○	○4		○4				○発生 期	○再生 前～始	コキヤガラ・始		+7～ノビエ4L		○	○

一年生広葉雑草以外のSU抵抗性雑草は対象としない。
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1 116

SL-0602-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ワカ	クログ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	表土 へ 堆土	
北海道																
東北	○4	○	○3	○4	○4	○3	○草丈 10cm※	○矢じり 葉抽出 前※	○発生 期	○再生 前～始		コキヤガラ:草丈20 cm以下 シズイ:草丈3cm	+7～ノビエ4L	1kg	○	○
北陸	○4	○	○4		○3	○3	○草丈 10cm※	○矢じり 葉抽出 前※	○発生 期	○再生 前～始					○	○
関東・東海	○4	○	○4		○4	○3	○草丈 10cm※	○矢じり 葉抽出 前※	○発生 期	○再生 前～始		コキヤガラ:草丈20cm 以下 SU抵抗性オモダカ:3L			○	○
近・中・四	○4	○	○4		○4	○3	○草丈 10cm※	○矢じり 葉抽出 前※	○発生 期	○再生 前～始		コキヤガラ:草丈20 cm以下	+5～ノビエ4L(砂 壌土は+7～)		○	○
九州	○4	○	○4		○4	○4	○草丈 10cm※	○矢じり 葉抽出 前※	○発生 期	○再生 前～始		コキヤガラ:草丈20 cm以下	+7～ノビエ4L		○	○

一年生広葉雑草以外のSU抵抗性雑草は対象としない。

※:オモダカ・クログイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

一年生広葉雑草以外のSU抵抗性雑草は対象としない。

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1 117

SL-0701 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ワカ	クログ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壌土 堆土
北海道															
東北	●4	●	●3	●4	●3	●3			●発生 期	●再生 前～始		+7～ノビエ4L	50g×10コ	●	●
北陸	●3	●	●3		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始		+7～ノビエ3L			●
関東・東海	●3	●	●3		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始				●	●
近・中・四	●3	●	●3		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ3L(砂 壌土は+7～)		●	●
九州	●3	●	●4		●4	●4			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ3L			●

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な被害や効果不足を生じることがある。

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

A-1 118

SL-0701-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ワカ	クログ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壌土 堆土
北海道	○4	○	○3	○3		○3			○発生 期	○再生 前～始		+7～ノビエ4L	1kg		○
東北	○4	○	○4	○4	○2	○3		○矢じり 葉抽出 前※	○発生 期	○再生 前～始	シズイ:草丈3cm			○	○
北陸	○4	○	○4		○2	○3	○草丈 10cm	○矢じり 葉抽出 前※	○発生 期	○再生 前～始				○	○
関東・東海	○4	○	○4		○2	○3	○草丈 10cm※	○矢じり 葉抽出 前※	○発生 期	○再生 前～始	コキヤガラ:始	+7～ノビエ4L	1kg	○	○
近・中・四	○4	○	○4		○2	○3	○草丈 10cm※	○矢じり 葉抽出 前※	○発生 期	○再生 前～始	コキヤガラ:始	+5～ノビエ4L(砂 壌土は+7～)		○	○
九州	○4	○	○4		○3	○3	○草丈 10cm※	○矢じり 葉抽出 前※	○発生 期	○再生 前～始	○前	+5～ノビエ4L (砂壌土は+7～)	1kg	○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 移植後の低温および急激な気温の上昇により被害を生じることがある。(北陸)

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1 119

SL-0701(RC)-0.5kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北	○4	○	○2	○2		○3			○発生 期	○再生 前～始		+7～ノビエ4L	500g	○	○
北陸	○4	○	○3		○2	○2			○発生 期						○
関東・東海															
近・中・四															
九州															
均一散布 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:															

A-1 120

SL-1001-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	●3	●	●3	●3		●2			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ3L	1kg		●
東北	●3.5	●	●3	●3	●3	●2			●発生 期			+5～ノビエ3.5L		●	●
北陸	●3.5	●	●3		●2	●2				●再生 前～始		+5～ノビエ3.5L(砂 壌土はノビエ3Lま で)		●	●
関東・東海	●3	●	●3		●3	●2			●発生 期	●再生 前～始	●前	+5～ノビエ3L			●
近・中・四 (計)	●3.5	●	●3		●3	●3			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ3.5L			●
九州	●3	●	●3		●3	●3			●発生 期	●再生 前～始		+5～ノビエ3L			●
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。															

A-1 121

SL-4902 フロアフル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ タカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期		エゾノキキヤガラ・2L	+3～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期		シズイ草丈3cm			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期					○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期		○前 コウキヤガラ・始			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期		○前			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期		○前 コウキヤガラ・始			●	○
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。 コウキヤガラ・シズイ防除は有効な後処理との組み合わせで使用する。															

A-1 122

SW-043-1kg粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヒ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 塩土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		○始※	○発生 期		○前		+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○始※	○始※	○発生 期		○前	※アライシ			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始	○始※	○始※	○発生 期						○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期		○前				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○始	●前～ 始※	●前～ 始※	○発生 期		○前				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●前～ 始※	●始※	○発生 期		○前				○	○

田植同時散布可能
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1 123

SW-052 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヒ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 塩土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期		○前		+1～ノビエ2.5L	50g×10 ³	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始		●前～ 始	○発生 期		○前				○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	○前～ 始	○始	○発生 期		○前				○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○前～ 始※	○発生 期						○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	●始	●前～ 始※	○発生 期		○前				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●前～ 始※	○発生 期		○前				○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1 124

SW-062 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヒ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 塩土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始		○前～ 始	○発生 期			※アライシ	+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○始※	○前～ 始※	○発生 期						○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始	○始	○前～ 始	○発生 期						○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○前～ 始※	○発生 期						○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期						○	○
九州	○2.5	○	○2	○始	○2	○2			○発生 期						○	○

田植同時散布可能
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1 125

SW-064-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道																
東北																
北陸																
関東・東海	●1	●	●始	●始	●始				●発生 期				+0～ノビエ1L	1kg		●
近・中・四 (晋)	●1	●	●始	●始	●始				●発生 期						●	●
九州																
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意:																

A-1 126

SW-091-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始			○発生 期				+0～ノビエ1.5L	1kg	●	○
東北	○1.5	○	○始	○始	○始	○始			○発生 期				+0～ノビエ1.5L(砂 壌土は1Lまで)		○	○
北陸	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期				+0～ノビエ1.5L(砂 壌土は1Lまで)		●	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期				+0～ノビエ1.5L		●	○
近・中・四	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期						●	○
九州	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期						●	○
田植同時散布可能 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。																

A-1 127

SYJ-156H シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○3	○	○3	○3		○2			○発生 期	○再生 前～始			+3～ノビエ3L	50g×10コ		○
東北	○3	○	○3	○3	○3	○2			○発生 期	○再生 前～始					○	○
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な障害や効果不足が生じることがある。																

A-1 128

SYJ-157-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道															
東北															
北陸	○2.5 3	○	○2		○2	○2	○始	○始	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.53L	1kg	○	○
関東・東海	○2.5 3	○	○2 3		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	SU低活性フナギ:1L SU低活性ミズガヤ:1L		○	○
近・中・四	○2.5 3	○	○2 3		○2	○2	○始	○始	○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.53L(砂 壌土は+3～)		○	○
九州	○2.5 3	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○	○

田植同時散布可能
※:オモダカ・クロクワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クロクワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1 129

SYJ-157H シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道															
東北															
北陸	○3	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始		+3～ノビエ3L	50g×10 ⁷	●	○
関東・東海	○3	○	○3		○2 3	○2			○発生 期	○再生 前～始	●前			●	○
近・中・四 (皆)	○3	○	○3		○2	○3			○発生 期	○再生 前～始				●	○
九州	○3	○	○3		○3	○3			○発生 期	○再生 前～始				●	○

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 浅植え、植え付け精度不良等で根が露出すると薬害を生じることがある。(関東・東海)
5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
散布後の低温および急激な気温の上昇により薬害を生じることがある。(九州)

A-1 130

SYJ-222-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道															
東北	○4	○	○4	○3	○4	○3			○発生 期	○再生 前～始		+7～ノビエ4L	1kg	○	○
北陸	○4	○	○3		○3	○2			○発生 期	○再生 前～始				○	○
関東・東海	○4	○	○3		○2 3	○3			○発生 期	○再生 前～始				●	○
近・中・四 (皆)	○4	○	○4		○4	○4			○発生 期	○再生 前～始				●	○
九州	○4	○	○4		○4	○4			○発生 期	○再生 前～始				●	○

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
散布後の低温および急激な気温の上昇により薬害を生じることがある。(近・中・四、九州)

A-1 131

SVJ-223 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	埴土 ～ 埴土
北海道	●3	●	●2	●3		●2			●発生 期	●再生 前～始			+3～ノビエ3L	40g×10コ		●
東北	●3	●	●3	●2	●3	●2			●発生 期	●再生 前～始					●	●
北陸	●3	●	●2.5		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始					●	
関東・東海	●3	●	●3		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●	●
近・中・四（皆）	●3	●	●3		●3	●2			●発生 期	●再生 前～始					●	●
九州	●3	●	●3		●3	●3			●発生 期	●再生 前～始						●
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足を生じることがある。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。																

A-1 132

SVJ-223-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	埴土 ～ 埴土
北海道	●3	●	●2	●3		●2			●発生 期	●再生 前～始			+3～ノビエ3L	1kg		●
東北	●3	●	●3	●2	●3	●始			●発生 期	●再生 前～始						●
北陸	●3	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始					●	●
関東・東海	●3	●	●3		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始	●前				●	●
近・中・四	●3	●	●3		●3	●3			●発生 期	●再生 前～始						●
九州	●3	●	●3		●3	●2			●発生 期	●再生 前～始						●
減水深: 2cm/日以下																
使用上の注意: 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。 オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。																

A-1 133

TH-501 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	埴土 ～ 埴土	
北海道	○3	○	○3	○3		○2		○始※	○発生 期	○再生 前～始		エゾノチヌダツチ:2L シズアイ:1L	+5～ノビエ3L	500ml	○*	○	
東北	○3	○	○2	○3	○3	○始	●前～ 始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始		コウキヤガラ:始 シズアイ:電丈3cm				○	○
北陸	○3	○	○2		○2	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始						○*	○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2	●前～ 始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コウキヤガラ:始				○	○
近・中・四	○3	○	○3		○3	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前					○	○
九州	○3	○	○3		○3	○3	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コウキヤガラ:始				○	○
水口処理可能 ※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: * 浅植え、植付け精度不良等で薬害を生じることがある。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。 オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ・シズアイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。																	

A-1 134
TH-501-1kg粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログ ワイ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土 へ 塩土
北海道	○3	○	○3	○3		○2		○始	○発生 期	○再生 前～始		シズイ草丈1L エゾノキヤガラ等:2L	+5～ノビエ3L	1kg	○ ○
東北	○3	○	○3	○3	○3	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始		シズイ草丈3cm	+0～ノビエ3L		○ ○
北陸	○3	○	○2		○2	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前				○* ○
関東・東海	○3	○	○3		○3	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コウキヤガラ:始			○ ○
近・中・四	○3	○	○3		○3	○2	●始※	●前～ 始	○発生 期	○再生 前～始	○前	コウキヤガラ:始	+5～ノビエ3L		○ ○
九州	○3	○	○3		○3	○3	○始※	○始	○発生 期	○再生 前～始	○前	コウキヤガラ:始			○ ○

田植同時散布可能
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: * 浅植え、植付け精度不良等で被害を生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。
オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1 135
TH-547(Z) シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログ ワイ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土 へ 塩土
北海道	○3	○	○2	○2		○2		○始※	○発生 期	○再生 前～始		エゾノキヤガラ等:2L	+5～ノビエ3L	40g×103	○ ○
東北	○3	○	○2	○2	○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始					○ ○
北陸	○3	○	○2		○始	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始					○ ○
関東・東海	○3	○	○3		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コウキヤガラ:始			○ ○
近・中・四	○3	○	○3		○3	○3	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コウキヤガラ:始			○ ○
九州	○3	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コウキヤガラ:始			○ ○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1 136
TH-547(Z) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クログ ワイ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壤土 へ 塩土
北海道	○3	○	○3	○3		○2		○始※	○発生 期	○再生 前～始		エゾノキヤガラ等:2L	+5～ノビエ3L	500ml	○ ○
東北	○3	○	○2	○2	○2	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始		シズイ草丈3cm コウキヤガラ:始			○ ○
北陸	○3	○	○2		○始	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始					○ ○
関東・東海	○3	○	○3		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コウキヤガラ:始			○ ○
近・中・四	○3	○	○3		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コウキヤガラ:始			○ ○
九州	○3	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コウキヤガラ:始			○ ○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1 137

TH-547(Z)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツ	ウリカ	クログ ワイ	オモダカ	ヒルム シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 植土
北海道	○3	○	○3	○3		○2		○始※	○発生 期	○再生 前～始		エゾノササキ等: 2L	+5～ノビエ3L	1kg	○	○
東北	○3	○	○3	○3	○3	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始		コキヤガラ: 始 シズイ: 草丈3cm	+0～ノビエ3L		○	○
北陸	○3	○	○2		○3	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始					○	○
関東・東海	○3	○	○3		○3	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始		コキヤガラ: 始			○	○
近・中・四	○3	○	○3		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始		コキヤガラ: 始	+5～ノビエ3L		○	○
九州	○3	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始		コキヤガラ: 始			○	○

田植同時散布可能
※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ・コキヤガラ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1 138

TH-601 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツ	ウリカ	クログ ワイ	オモダカ	ヒルム シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 植土
北海道	●2.5	●	●2	●2		●2		●発生 期	●再生 前～始				+0～ノビエ2.5L	20g×10コ	○	●
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	●前～ 始※	●前～ 始	○発生 期	○再生 前～始					○	○
北陸	○2.5	○	○2		○始	○始	●始	●始	○発生 期	○再生 前～始	○前		+0～ノビエ2.5L(砂 壌土は+5～)		○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●前～ 始※	●前～ 始	○発生 期	○再生 前～始		コキヤガラ: 始	+0～ノビエ2.5L		○	○
近・中・四 (磐)	○2.5	○	○2		○2	○2	●始	●前～ 始	○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始		コキヤガラ: 始			○	○

※: クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足を生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ・コキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1 139

KUH-072K-0.25kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツ	ウリカ	クログ ワイ	オモダカ	ヒルム シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 植土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生 期	○再生 前～始			+3～ノビエ2.5L	250g	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始			○発生 期	○再生 前～始					○	○
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

湛水周縁部散布可能(北海道, 東北)
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 浅植え、植付け精度不良等で根が露出すると薬害を生じることがある。(東北)
5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

A-1 140

SYJ-219-1kg 粒

11-219-1R6 世															
地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 堆土
北海道	○2	○	○始	○始		○始			○発生 期			+0～ノビエ2L	1kg	○	○
東北	○2	○	○2	○始	○始	○始			○発生 期					○	○
北陸	○2	○	○2		○始	○始			○発生 期					○	○
関東・東海	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期					○	○
近・中・四	○2	○	○2		○2	○始			○発生 期					○	○
九州	○2	○	○2		○2	○2			○発生 期					○	○
田植同時散布可能 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。															

A-1 141

KUH-883(L)-1kg 粒

KOH-883(L)-11g Ⅲ																
地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 堆土	
北海道												+0～ノビエ2.5L(砂 壤土は+5～)	1kg			
東北																
北陸	○2.5	○	○2	○2	○2	○2		○始	○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期		○前				○	○
田植同時散布可能																
減水深: 2cm/日以下																
使用上の注意: 浅植え, 植付け精度不良等で根が露出すると薬害を生じることがある。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。 田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。 オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。																

A-2 体系(初期)

A-2 2

HOK-0901-1kg 粒

TOR-0901-1kg 粒															
地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○1	○	○始									+0～ノビエ1L 植代後～4, +0～ ノビエ1L	1kg		○
東北	○1	○	○始											○	○
北陸	○1	○	○始											○	○
関東・東海	○1	○	○前											●	○
近・中・四 (案)	○1	○	○始												○
九州	○1	○	○始												○
田植同時散布可能 一発処理剤型除草剤の前処理剤として使用する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 深水条件では被害を生じることがある。															

A-2 3
HOK-0901 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1	○	○始									+0～ノビエ1L	500ml		○
東北	○1	○	○始									植代後～4、+0～ ノビエ1L		○	○
北陸	○1	○	○始											○	○
関東・東海	○1	○	○前											●	○
近・中・四 (第)	○1	○	○始												○
九州	○1	○	○始												○

水口処理確認(関東・東海)
田植同時散布可能
一発処理剤型除草剤の前処理剤として使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 深水条件では薬害を生じることがある。

A-2 4
KPP-314 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道															
東北	○1	○	○始	○始			●前※					植代時(～4)植代 後～4、+0～ノビエ 1L	500ml	○	○
北陸	○1	○	○前											○	○
関東・東海	○1	○	○始				●前※				コナシガエ前			○	○
近・中・四 (第)	○1	○	○始											○	○
九州	○1	○	○始								コナシガエ前				○

田植同時散布可能
植代時は植代直後灌水処理(水深2～5cm、土壌湿潤はしない)土壌湿潤処理
※:クロクワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の高温により楊変・流れ葉などの薬害症状が助長され、強い生育抑制につながるがある。(九州)
深水条件では薬害を生じることがある。
クロクワイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-2 7
SB-531 フロアブル(少量散布)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○1.5	○	○始	○始								+0～ノビエ1.5L	300ml	●	○
東北	○1.5	○	○始	○始	○始							植代後～4、+0～ノビ エ1.5L(砂壌土は+0 ～)		○	○
北陸	○1.5	○	○始		○始							植代後～4、+0～ ノビエ1.5L		○	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始									●	○
近・中・四 (第)	○1.5	○	○始		○始									○	○
九州	○1.5	○	○始		○始							+0～ノビエ1.5L		●	○

田植同時散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

A-3 体系(中後期)

A-3 2

HOK-0721 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツ	ウリカ	クログ ワイ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道																
東北	○5	○	○5	○5	○5	○4	○生育 期(草丈 20cm以 下)※	●生育 期 (矢じり 葉1Lま で)	○生育 期				+20～+40(イネ5L 以降、ノビエ5Lま で)	3kg	○	○
北陸	○5	○	○5		○5	○4	○生育 期(草丈 20cm以 下)※	○生育 期 (矢じり 葉1Lま で)	○生育 期						○	○
関東・東海	○5	○	○5		○5	○5		○矢じり 葉抽出 前～矢 じり葉 1L※	○生育 期						○	○
近・中・四	○5	○	○5		○5	○4	●生育 期(草丈 20cm以 下)※	○矢じり 葉抽出 前～矢 じり葉 1L※	○生育 期						○	○
九州	○5	○	○5		○5	○5	○生育 期(草丈 30cm以 下)※	○矢じり 葉抽出 前～矢 じり葉 1L※	○生育 期						●	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。
 降雨などにより散布後2日間以上落水もしくは浅水状態が維持されないと効果が低下することがある。
 オモダカ・クログワイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3 3

HOK-0802-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツ	ウリカ	クログ ワイ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道																
東北	○3.5	○	○3	○3	○3	○3		●生育 期 (矢じり 葉1Lま で)※	○発生 期		○始		+15～+35(イネ5L以 降、ノビエ3.5Lま で)	1kg	○	○
北陸	○3.5	○	○3		○3	○2	●始～ 草丈10 cm	●生育 期 (矢じり 葉1Lま で)※	○発生 期	○再生 前～始	○始				○	○
関東・東海	○3.5	○	○3		○2	○3		●生育 期 (矢じり 葉1Lま で)※	○生育 期						○	○
近・中・四 (※)	○3.5	○	○3		○3	○3	●始～ 草丈10 cm	●生育 期 (矢じり 葉1Lま で)※	○発生 期		●始				○	○
九州																

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 暑い高温条件では葉害を生じることがある。
 散布後の低湿および急激な気温の上昇により葉害を生じることがある。
 オモダカ・クログワイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3 5

KUH-983-0.25kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガイ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	○4												+15～+35(ノビエ 4Lまで)	250g		○
東北	○4														○	○
北陸	○4														○	○
関東・東海	○4														●	○
近・中・四	○4														●	○
九州	○4															○
周縁部散布可能 減水深: 2cm/ 日以下 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。 湛水周縁部散布では藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足を生じることがある。																

A-3 6

MIH-104-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスギヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道	●4	●	●4	●4		●3			●生育 期	●生育 期			+20～ノビエ4L(幼 穂形成期まで)	1kg		●
東北	●4	●	●4	●3	●4	●3			●発生 期	●再生 前～始					●	●
北陸																
関東・東海	●4	●	●3		●4	●4			●発生 期	●再生 前～始			+20～ノビエ4L(幼 穂形成期まで)	1kg	●	●
近・中・四（管）	●3.5	●	●4		●4	●4			●発生 期	●再生 前～始						●
九州	●3.5	●	●4		●4	●4			●発生 期	●再生 期						●
減水深：2cm/日以下 使用上の注意： 前処理剤との組み合わせで使用する。																

A-3 8

NC-630-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスギヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 塩土
北海道												+13～+30(ノビエ 4Lまで)	1kg		
東北															
北陸															
関東・東海	●4	●	●4		●4	●3			●発生 期	●再生 前～始					●
近・中・四 (管)	●4	●	●4		●4	●4			●発生 期	●再生 前～始					●
九州	●4	●	●4		●4	●4			●発生 期	●再生 期					●
減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。															

A-3 12
SL-0601 シンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオ モダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカ	クログ ワイ	オモダ カ	ヒルム シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道																
東北	●4	●	●3	●4		●3	●草丈 10cm※	●矢じり 葉抽出 前※	●発生 期	●再生 前～始			+14～+35(ノビエ 4Lまで)	50g×10	●	●
北陸	●4	●	●4			●2	●草丈 10cm	●矢じり 葉抽出 前	●発生 期	●再生 前～始					●	●
関東・東海	●4	●	●4			●3	●草丈 10cm※	●矢じり 葉抽出 前※	●発生 期	●再生 前～始		コウキヤガラ始			●	●
近・中・四	●4	●	●4			●3	●草丈 10cm	●矢じり 葉抽出 前	●発生 期	●再生 前～始					●	●
九州	●4	●	●4			●4			●発生 期	●再生 前～始		コウキヤガラ始			●	●

一年生広葉雑草以外のSU抵抗性雑草は対象としない。
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-3 13
SL-0602-1kg粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオ モダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカ	クログ ワイ	オモダ カ	ヒルム シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道																
東北	●4	●	●3	●4	●4	●3	●草丈 10cm※	●矢じり 葉抽出 前※	●発生 期	●再生 前～始		コウキヤガラ:草丈20 cm以下 シズメ:草丈3cm	+14～+35(ノビエ 4Lまで)	1kg	●	●
北陸	●4	●	●4		●3	●3	●草丈 10cm※	●矢じり 葉抽出 前※	●発生 期	●再生 前～始					●	●
関東・東海	●4	●	●4		●4	●3	●草丈 10cm※	●矢じり 葉抽出 前※	●発生 期	●再生 前～始		コウキヤガラ:草丈20 cm以下 SU抵抗性ナ			●	●
近・中・四	●4	●	●4		●4	●3	●草丈 10cm※	●矢じり 葉抽出 前※	●発生 期	●再生 前～始		コウキヤガラ:草丈20 cm以下			●	●
九州	●4	●	●4		●4	●4	●草丈 10cm※	●矢じり 葉抽出 前※	●発生 期	●再生 前～始		コウキヤガラ:草丈20 cm以下			●	●

一年生広葉雑草以外のSU抵抗性雑草は対象としない。
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-3 15
SL-0613 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオ モダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカ	クログ ワイ	オモダ カ	ヒルム シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道																
東北	○5	○	○花茎 抽出始	○4	○5	○4	○生育 期(草丈 30cm以 下)※	○(草丈 30cm以 下)※	○生育 期	○生育 期		コウキヤガラ:草丈30 cm以下 シズメ:草丈30cm以 下	+14～+40(イネ4L以 降、ノビエ5Lまで)	1000g(散 布後量 100L)	○	○
北陸	○5	○	○4		○4	○4	○生育 期(草丈 30cm以 下)※	○(草丈 20cm以 下)※	○生育 期	○再生 前～始					○	○
関東・東海	○5	○	○5		○5	○5	○生育 期(草丈 30cm以 下)※	○(草丈 30cm以 下)※	○生育 期	○生育 期		コウキヤガラ:草丈30 cm以下			○	○
近・中・四	○5	○	○5		○5	○5	○生育 期(草丈 30cm以 下)※	○(草丈 30cm以 下)※	○生育 期	○生育 期					○	○
九州	○5	○	○花茎 抽出始		○6	○6	○生育 期(草丈 30cm以 下)※	○(草丈 30cm以 下)※	○生育 期	○生育 期					○	○

*:発生盛期～矢じり葉抽出期
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 移植後の低湿および急激な気温の上昇により薬害を生じることがある。(関東・東海)
前処理剤との組み合わせで使用する。
落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。
降雨などにより散布後2日間以上落水もしくは浅水状態が維持されない場合と効果が低下することがある。
オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3 16

SL-0613(顆粒のままの散布) 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガイ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壤土
北海道															
東北	○4	○	○4	○4	○3	○3			○生育 期	○生育 期		+14～+40(イネ4L以 降、ノビエ4Lまで)	1kg(顆粒の まま散布)	○	○
北陸	○4	○	○4		○3	○2			○生育 期	○再生 前～始		+14～+40(イネ 4L以降、ノビエ4L まで)		○	○
関東・東海	○4	○	○4		○3	○4			○発生 期	○再生 前～始				○	○
近・中・四	○4	○	○4		○4	○3			○生育 期	○再生 前～始		+14～+40(イネ4L以 降、ノビエ4Lまで)		○	○
九州															

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。
 降雨などにより散布後2日間以上落水もしくは浅水状態が維持されないと効果が低下することがある。

A-3 17

SL-0701-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガイ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壤土
北海道															
東北	●4	●	●4	●4	●2	●3		●矢じり 葉抽出 前※	●発生 期	●再生 前～始		+14～+35(ノビエ 4Lまで)	1kg	●	●
北陸	●4	●	●4		●2	●3	●草丈 10cm※	●矢じり 葉抽出 前※	●発生 期	●再生 前～始				●	●
関東・東海	●4	●	●4		●2	●3	●草丈 10cm※	●矢じり 葉抽出 前※	●発生 期	●再生 前～始	コキヤガ防除			●	●
近・中・四	●4	●	●4		●2	●3	●草丈 10cm※	●矢じり 葉抽出 前※	●発生 期	●再生 前～始				●	●
九州															

※: オモダカ・クロクワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 移植後の低温および急激な気温の上昇により葉害を生じることがある。(北陸)
 オモダカ・クロクワイ・コキヤガ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-3 18

SL-0701(RC)-0.5kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガイ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 へ 壤土
北海道															
東北	●4	●	●2	●2		●3			●発生 期	●再生 前～始		+14～+35(ノビエ 4Lまで)	500g	●	●
北陸	●4	●	●3		●2	●2			●発生 期	●発生 期					●
関東・東海															
近・中・四															
九州															

均一散布
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

19

SW-051-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオ ダカ	ミスガ ツリ	ワカワ	クログ ワイ	オモダ カ	ヒルム シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 植土
北海道																
東北	○3.5	○	○3	○3	○3	○3	○草丈 20cm※	○広縁 形葉4L ※	○発生 期	○再生 前～始		コキヤガラ:草丈15 cm シズイ:草丈10cm	+20～+30(ノビエ 3.5Lまで)	1kg	○	○
北陸	○3.5	○	○3		○3	○3	○草丈 20cm※	○広縁 形葉4L ※	○発生 期	○再生 前～始					○	○
関東・東海	○3.5	○	○3		○4	○3	○草丈 20cm※	○広縁 形葉4L ※	○発生 期	○再生 前～始		コキヤガラ:草丈15 cm			○	○
近・中・四	○3.5	○	○3		○3	○3	○草丈 20cm※	○広縁 形葉4L ※	○発生 期	○再生 前～始					○	○
九州	○3.5	○	○3		○4	○4			○発生 期						○	○

SU抵抗性雑草は対象としない。
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。
クログワイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。(東北・北陸)
クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。(関東・東海)
クログワイ防除は有効な前後処理剤との組み合わせで使用する。(近畿・中国・四国)
コキヤガラ・シズイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

20

SW-063-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオ ダカ	ミスガ ツリ	ワカワ	クログ ワイ	オモダ カ	ヒルム シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 植土
北海道	○5	○	○3	○4		○4		○※	○発生 期				+25～+40(イネ4L以 降、ノビエ5Lまで)	1kg	○	○
東北	○5	○	○花茎 抽出始	○4	○5	○2	○草丈 15cm	○※	○発生 期				+25～+40(ノビエ5L まで)		○	○
北陸	○5	○	○5		○4	○3	○草丈 30cm	○※	○生育 期	○生育 期			+20+25～+40(イネ 4L以降、ノビエ5Lま で)		○	○
関東・東海	○5	○	○5		○4	○4	○草丈 20cm	○※	○生育 期	○生育 期					○	○
近・中・四	○5	○	○5		○3	○4	○草丈 30cm	○※	○生育 期						○	○
九州	○5	○	○5		○5	○6	○草丈 30cm※	○※	○生育 期				+25～+40(ノビエ5L まで)		○	○

*: 発生盛期～矢張り葉抽出期(草丈30cm以下)
※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
オモダカ・クログワイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

22

SYJ-222-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオ ダカ	ミスガ ツリ	ワカワ	クログ ワイ	オモダ カ	ヒルム シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 植土
北海道																
東北	●4	●	●4	●3	●4	●3			●発生 期	●再生 前～始			+20～+40(ノビエ 4Lまで)	1kg	●	●
北陸	●4	●	●3		●3	●2			●発生 期	●再生 前～始					●	●
関東・東海	●4	●	●3		●2	●3			●発生 期	●再生 前～始						●
近・中・四 (皆)	●4	●	●4		●4	●4			●発生 期	●再生 前～始						●
九州	●4	●	●4		●4	●4			●発生 期	●再生 前～始						●

減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミスガツリには効果がある。

A-3 23

DASH-001 SC

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○5	○	○花茎 抽出始	○5		○4			○生育 期	○生育 期		+25～+40(イネ6L以 降、ノビエ5Lまで)	100m(敷布 枚数100L)	○	○
東北	○5	○	○花茎 抽出始	○4	○4	○4	○草丈 20cm※	○草丈 30cm※	○生育 期	○生育 期	シズイ生育期(草 丈20cm以下)			○	○
北陸	○5	○	○花茎 抽出始		○4	○5	○草丈 30cm	○草丈 30cm	○生育 期	○生育 期		+20+25～+40(イネ 6L以降、ノビエ5Lま で)		○	○
関東・東海	○5	○	○花茎 抽出始		○5	○5	○草丈 30cm※	○草丈 30cm※	○生育 期	○生育 期	ツキヤガラ生育期 (草丈5L以降)	+20+25～+40(イネ 5L以降、ノビエ5Lま で)		○	○
近・中・四	○5	○	○花茎 抽出始		○5	○5	○草丈 30cm	○草丈 30cm		○生育 期	ツキヤガラ生育期(草 丈20cm以下) ツキヤガラ生育期 (草丈20cm以下)	+20+25～+40(イネ 5L以降、ノビエ5L まで)		○	○
九州	○5	○	○花茎 抽出始		○6	○6	○生育 期(草丈 30cm以 下)※		○生育 期	○生育 期	ツキヤガラ生育期 (草丈20cm以下)	+20～+40(イネ5L以 降、ノビエ5Lまで)		○	○

※: オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 前処理剤との組合せで使用する。

落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。

オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

クログワイ・コウキヤガラ・シズイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3 24

KUH-104-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツ	ウリカ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道								●生育 期(矢張り 葉3Lま で)				+20～+40(イネ5L 以降)	1kg	●	●
東北							●生育 期(草丈 30cm以 下)※	●生育 期(矢張り 葉3Lま で)※			シズイ生育期(草 丈30cm以下)			●	●
北陸							●生育 期(草丈 30cm以 下)※	●生育 期(矢張り 葉3Lま で)				+25～+45(イネ5L 以降)			●
関東・東海							●生育 期(草丈 30cm以 下)※	●生育 期(矢張り 葉3Lま で)			ツキヤガラ生育期 (草丈30cm以下)	+20～+30(イネ5L 以降)			●
近・中・四 (替)							●生育 期(草丈 30cm以 下)※	●生育 期(矢張り 葉3Lま で)			ツキヤガラ生育期 (草丈30cm以下)	+20～+40(イネ5L 以降)		●	●
九州 (替)							●生育 期(草丈 30cm以 下)※	●生育 期(矢張り 葉3Lま で)※			ツキヤガラ生育期 (草丈30cm以下)			●	●

※: クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: クログワイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 特殊雑草対象(エンノサヤヌカグサ)

A-4 エンノサヤヌカグサ

SL-0604-1kg 粒

JL 0004 1kg 粒			
地域名	対象雑草： エノノサヤヌカグサ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	2L	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 特殊雑草対象(オモダカ)

A-4 オモダカ

BAH-041-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	○	前～始	※	1kg
東北	●	前～始	※	
北陸	○	前～始	※	
関東・東海	○	前～始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	●	前～始	※	
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

BCH-085L-1kg 粒

地域名	対象雑草： オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	○	始		
関東・東海	○	前～始	※	
近・中・四	○			
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

HOK-0301 フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	○	始	※	500ml
東北	○	前～始	※	
北陸				
関東・東海	○	前～始	※	
近・中・四	●	前～始	※	
九州	○	始	※	
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

HOK-0605 ジャンボ

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				50g×10 ²
東北	●	前～始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

HOK-080(L)-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸				
関東・東海	○	前～始	※	
近・中・四	○	始		
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

HOK-0802-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	生育期(矢じり葉1Lまで)	※	
北陸	●	生育期(矢じり葉1Lまで)		
関東・東海	●	生育期(矢じり葉1Lまで)		
近・中・四	●	生育期(矢じり葉1Lまで)		
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

KPP-398-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	前～始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

KPP-398(L)-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	○	始		
関東・東海	○	前～始	※	
近・中・四	○	始		
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

KPP-406(L)フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸				
関東・東海				
近・中・四	●	前～始		
九州				

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

KPP-501-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	前～始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

KPP-501(L)-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸		前～始		
関東・東海				
近・中・四	●	前～始		
九州				
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

KUH-021-0.25kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				250g
東北	●	前～始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

KUH-041 シャンボ

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				25g×10㎡
東北				
北陸	●	前～始		
関東・東海				
近・中・四				
九州				
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

KUH-041-0.25kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	前～始		250g
東北	●	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

KUH-072D-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	始		
関東・東海				
近・中・四	●	前～始		
九州				

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

KUH-072K-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	前～始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※: オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

KUH-074-0.25kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				250g
東北	●	前～始	※	
北陸	●	前～始		
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※: オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

KUH-074-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道	●	前～始		1kg
東北	●	前～始	※	
北陸	●	前～始		
関東・東海	●	始		
近・中・四	●	前～始		
九州				

※: オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

KUH-104-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道	●	生育期(矢じり葉3Lまで)		1kg
東北	●	生育期(矢じり葉3Lまで)	※	
北陸	●	生育期(矢じり葉3Lまで)		
関東・東海	●	生育期(矢じり葉3Lまで)		
近・中・四	●	生育期(矢じり葉3Lまで)		
九州	●	生育期(矢じり葉3Lまで)	※	

※: オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意:

A-4 オモダカ

NC-606 フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	●	始	※	
北陸	●	始		
関東・東海				
近・中・四	●	始		
九州	●	始	※	
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

NC-609-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	○	始	※	1kg
東北	○	始	※	
北陸	○	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	●	始	※	
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

NC-626-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	前～始		1kg
東北	●	前～始	※	
北陸	●	始		
関東・東海				
近・中・四	●	始		
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 オモダカ

NC-627 シャンボ

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	○	始	※	30g×10 ²
東北	○	始	※	
北陸	○	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	●	始	※	
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。(北海道～近・中・四)				

A-4 オモダカ

NC-627 フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	○	始	※	500ml
東北	○	始	※	
北陸	○	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	●	始	※	
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。(北海道～近・中・四)				

A-4 オモダカ

NC-627-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	○	始		1kg
東北	○	始	※	
北陸	○	始		
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始		
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

NH-59670アブル(旧SB-59670アブル)

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	●	前～始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な前処理または後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

S-9421フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	前～始		500ml
東北	●	前～始	※	
北陸	●	始		
関東・東海	●	始		
近・中・四	●	前～始		
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

S-9421-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	前～始		1kg
東北	●	前～始	※	
北陸	●	始		
関東・東海	●	始		
近・中・四	●	前～始		
九州				

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

SB-556フロアブル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	前～始		500ml
東北	○	始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な後処理剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: オモダカ防除は有効な前処理または後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
SB-556-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	●	前～始		1kg
東北	○	前～始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:オモダカ防除は、有効な後処理剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
SW-043-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	○	始	※	1kg
東北	○	始	※	
北陸	○	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	●	前～始	※	
九州	●	前～始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
SW-052 シンボ

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				50g×10 [□]
東北	●	前～始		
北陸	○	始	※	
関東・東海	○	前～始	※	
近・中・四	●	前～始	※	
九州	●	前～始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
SW-061-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	前～始	※	
北陸	○	前～始	※	
関東・東海	●	前～始	※	
近・中・四	●	前～始	※	
九州	●	前～始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ
TH-501 シンボ

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				40g×10 [□]
東北	○	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

TH-501 フロアフル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道	○	始	※	500ml
東北	○	始	※	
北陸	○	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

TH-501-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道	○	始		1kg
東北	○	始	※	
北陸	●	始		
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	●	前～始		
九州	○	始		

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

TH-601 シャンボ

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道				20g×10 ²
東北	●	前～始		
北陸	●	始		
関東・東海	●	前～始		
近・中・四	●	前～始		
九州				

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

TH-601 フロアフル

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道	○	始	※	500ml
東北	○	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

TH-601-1kg 粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による効果向上	使用量 /10a
北海道	○	始	※	1kg
東北	○	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	●	始	※	

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 オモダカ

YH-650-1kg粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道	○	前～始	※	1kg
東北	○	前～始	※	
北陸	○	前～始	※	
関東・東海	○	前～始	※	
近・中・四	○	前～始	※	
九州	○	前	※	
		前		
※:オモダカ防除は、有効な後処理剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。				
使用上の注意: オモダカ防除は有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用する。(北海道、東北、北陸、関東・東海、近畿・中国・四国) オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。(東北、北陸、近畿・中国・四国、九州)				

A-4 オモダカ

DASH-001 SC

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				100ml(散布液量100L)
東北	○	草丈30cm以下	※	
北陸	○	草丈30cm以下		
関東・東海	○	草丈30cm以下	※	
近・中・四	○	草丈30cm以下		
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。 落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。				

A-4 オモダカ

SL-4903-1kg粒

地域名	対象雑草: オモダカ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	前～始	※	
北陸	○	始		
関東・東海	○	前～始	※	
近・中・四	○	始		
九州				
※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 特殊雑草対象(クログワイ)

A-4 クログワイ

BAH-041-1kg粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	始	※	
北陸	○	前～始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	●	前～始	※	
九州	●	前～始	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

BCH-085L-1kg粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	○	前～始		
関東・東海	○	前～始	※	
近・中・四	○	始		
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

HOK-0721 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				3kg
東北	○	生育期(草丈20cm以下)	※	
北陸	○	生育期(草丈20cm以下)		
関東・東海				
近・中・四	●	生育期(草丈20cm以下)		
九州	○	生育期(草丈30cm以下)	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

HOK-0801(L) ジャンボ

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				50g×10 ²
東北				
北陸	●	前～始		
関東・東海	●	前～始	※	
近・中・四	●	前～始		
九州	●	前～始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

HOK-0801(L) フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸	●	前～始		
関東・東海	●	前～始	※	
近・中・四	●	前～始		
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

HOK-0801(L) 1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	前～始		
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	前～始		
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

HOK-0802-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	始～草丈10cm		
関東・東海				
近・中・四	●	始～草丈10cm		
九州				

使用上の注意: クログワイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

KPP-314 フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	●	前	※	
北陸				
関東・東海	●	前	※	
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-4 クログワイ

KPP-398(L)-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	○	前～始		
関東・東海	●	前～始	※	
近・中・四	●	前～始		
九州	●	前～始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-4 クログワイ

KPP-406(L) フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北				
北陸	○	前～始		
関東・東海	●	前～始	※	
近・中・四	●	前～始		
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-4 クログワイ

KPP-501(L)-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	前～始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-4 クログワイ

KPP-501(L)-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	前～始		
関東・東海	●	前～始	※	
近・中・四	●	前～始		
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-4 クログワイ

KUH-041 ジャンボ

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				25g×10 ²
東北	●	前～始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

KUH-072D-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	●	前～始		
関東・東海	●	前～始	※	
近・中・四	●	前～始		
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

KUH-072K-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	前～始	※	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

KUH-073-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	始	※	
北陸	○	始		
関東・東海	●	草丈10cm		
近・中・四	○	始		
九州	○	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 使用上の注意: クログワイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

KUH-074 ジャンボ

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				25g×10 ²
東北				
北陸	●	前～始		
関東・東海				
近・中・四				
九州				

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

KUH-074-0.25kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				250g
東北				
北陸				
関東・東海	●	始	※	
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

KUH-074-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	前～始	※	
北陸	●	前～始		
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	前～始		
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

KUH-104-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	生育期(草丈30cm以下)	※	
北陸	●	生育期(草丈30cm以下)	※	
関東・東海	●	生育期(草丈30cm以下)	※	
近・中・四	●	生育期(草丈30cm以下)	※	
九州	●	生育期(草丈30cm以下)	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

NC-609-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	始	※	
北陸	○	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	●	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

NC-617SB-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	始～草丈10cm	※	
北陸	○	始～草丈10cm		
関東・東海	○	始～草丈10cm		
近・中・四	○	始～草丈10cm		
九州	○	始～草丈10cm	※	

※:クログワイ防除は、連年施用することによりさらに効果が向上する。

使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。(関東・東海,九州)

A-4 クログワイ

NC-618-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	始～草丈10cm	※	
北陸	○	始～草丈10cm		
関東・東海	○	始～草丈10cm		
近・中・四	○	始～草丈10cm		
九州	○	始～草丈10cm	※	
※:クログワイ防除は、連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。(関東・東海、九州)				

A-4 クログワイ

NC-621-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	始	※	
北陸	○	始		
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	○	始		
九州	○	始		
※:クログワイ防除は、連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。(北陸、近・中・四、九州)				

A-4 クログワイ

NC-626-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	始	※	
北陸	●	始		
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始		
九州				
※:クログワイ防除は、連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

S-9421フロアブル

地域名	対象雑草： クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	●	始	※	
北陸	●	始		
関東・東海	●	始	※	
近・中・四	●	始		
九州				
※:クログワイ防除は、連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

S-9421-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	●	前～始	※	
北陸	●	始		
関東・東海	●	前～始	※	
近・中・四	●	始		
九州				
※:クログワイ防除は、連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

SL-0701-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北				
北陸	○	草丈10cm		
関東・東海	○	草丈10cm	※	
近・中・四	○	草丈10cm		
九州	○	草丈10cm	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

SST-403 シャンボ

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				40g×10 ²
東北	○	始	※	
北陸				
関東・東海	○	始	※	
近・中・四				
九州				

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

SW-043-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	始	※	
北陸	○	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	●	前～始	※	
九州	●	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

SW-052 シャンボ

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				50g×10 ²
東北				
北陸	○	前～始		
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	●	始		
九州	●	始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

SW-061-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	前～始	※	
北陸	○	前～始	※	
関東・東海	●	前～始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	前～始	※	

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理との組み合わせで使用する。

A-4 クログワイ

TH-501 シャンボ

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				40g×10㎡
東北	●	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	●	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

TH-501 フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	●	前～始	※	
北陸	○	始	※	
関東・東海	●	前～始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	●	始	※	
使用上の注意・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

TH-501-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	●	始	※	
九州	○	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

TH-601 シャンボ

地域名	対象雑草： クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				20g×10 [□]
東北	●	前～始	※	
北陸	●	始		
関東・東海	●	前～始	※	
近・中・四	●	始		
九州				
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

TH-601 フロアブル

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				500ml
東北	○	始	※	
北陸	●	始		
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始		
九州	○	始		
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

TH-601-1kg 粒

地域名	対象雑草： クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	始	※	
北陸	●	始	※	
関東・東海	○	始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	○	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理との組み合わせで使用する。				

A-4 クログワイ

SL-4903-1kg 粒

地域名	対象雑草: クログワイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	連年施用による 効果向上	使用量 /10a
北海道				1kg
東北	○	前～始	※	
北陸	○	前～始	※	
関東・東海	●	前～始	※	
近・中・四	○	始	※	
九州	●	始	※	
※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。 使用上の注意: クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 特殊雑草対象(コウキヤガラ)

A-4 コウキヤガラ

BAH-041-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四	●	始	
九州	○	始	
使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理との組み合わせで使用する。			

A-4 コウキヤガラ

BCH-032-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州	●	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

BCH-033-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州	●	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

KPP-314 フロアフル

KPP-314 フロアール

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北			
北陸			
関東・東海	●	前	
近・中・四			
九州	●	前	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

KPP-406(L) フロアフル

KPP-406(L)7677ル

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州	●	始	
使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理との組み合わせで使用する。			

A-4 コウキヤガラ

KPP-501(L)-1kg 粒

KPP-30(L)-1kg 型			
地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州	●	始	
使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理との組み合わせで使用する。			

A-4 コウキヤガラ

KUH-021-0.25kg 粒

KUH-021-0.25kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			250g
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州			
使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理との組み合わせで使用する。			

A-4 コウキヤガラ

KUH-074 シャンボ

KUHI-074 シヤンホ			
地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			25g×10 ⁻²
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四	●	始	
九州			
使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理との組み合わせで使用する。			

A-4 コウキヤガラ

KUH-104-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	生育期(草丈30cm以下)	
近・中・四	●	生育期(草丈30cm以下)	
九州	●	生育期(草丈30cm以下)	
使用上の注意:			

A-4 コウキヤガラ

S-9421 フロアブル

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州	●	始	
使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 コウキヤガラ

S-9421-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四	●	始	
九州	●	始	
使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 コウキヤガラ

SL-0401-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	○	草丈10cm	
北陸			
関東・東海	○	草丈10cm	
近・中・四	●	草丈10cm	
九州	○	始	
使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 コウキヤガラ

SL-0401-1kg(1.5kg/10a処理) 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1.5kg
東北	○	草丈15cm	
北陸			
関東・東海	○	草丈15cm	
近・中・四			
九州	○	始	
使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 コウキヤガラ

SL-0601-1kg 粒

SL-0601-1kg 型

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	○	始	
北陸			
関東・東海	○	始	
近・中・四	●	始	
九州	○	始	
使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 コウキヤガラ

SL-0701-1kg 粒

SL-0701-1Rg Ⅱ

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	○	始	
近・中・四	●	始	
九州	○	始	
使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 コウキヤガラ

SL-4902 フロアブル

SL-4902 7/17/19

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州	○	始	
使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 コウキヤガラ

SST-403 ジャンボ

SST-403 シャンホ

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北			
北陸			
関東・東海	○	始	
近・中・四	●	始	
九州			
使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 コウキヤガラ

SW-051-1kg 粒

SW-051-1kg 粒			
地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	○	草丈10cm～15cm	
北陸			
関東・東海	○	草丈10cm～15cm	
近・中・四			
九州	○	草丈10cm～15cm	
使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 コウキヤガラ

TH-501 シャンボ'

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			40g×10 [□]
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四	○	始	
九州	●	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

TH-501-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	○	始	
近・中・四	●	始	
九州	●	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

TH-547(Z) シャンボ'

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			40g×10 [□]
東北			
北陸			
関東・東海	○	始	
近・中・四	●	始	
九州	○	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

TH-547(Z) フロアブル

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北	○	始	
北陸			
関東・東海	○	始	
近・中・四	●	始	
九州	○	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

TH-601 シャンボ'

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			20g×10 [□]
東北			
北陸			
関東・東海	●	始	
近・中・四			
九州	●	始	

使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-4 コウキヤガラ

TH-601 フロアブル

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北			
北陸			
関東・東海	○	始	
近・中・四			
九州	●	始	
使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 コウキヤガラ

TH-601-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	○	始	
近・中・四	●	始	
九州	●	始	
使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 コウキヤガラ

YH-650-1kg粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	○	前	
近・中・四			
九州	○	前	
使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 コウキヤガラ

YH-652 フロアブル

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	始	500ml
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 コウキヤガラ

YH-652-1kg 粒

地域名	対象雑草: コウキヤガラ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	始	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意: コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 特殊雑草対象(シズイ)

A-4 シズイ

BAH-041-1kg 粒

地域名	対象雑草： シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	●	草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意： シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 シズイ

KPP-398-1kg 粒

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	●	草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意: シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 シズイ

KUH-073-1kg 粒

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	●	草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意: シズイ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 シズイ

KUH-104-1kg 粒

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	●	生育期(草丈30cm以下)	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 シズイ

NC-606 フロアブル

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北	●	草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意: シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 シズイ

NC-621-1kg 粒

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	●	草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意: シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 シズイ

S-9421 フロアブル

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北	●	草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意: シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 シズイ

SL-0601 シャンボ

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			50g×10㎡
東北	●	草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意: シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 シズイ

SL-0701-1kg 粒

地域名		対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道				1kg
東北		●	草丈3cm	
北陸				
関東・東海				
近・中・四				
九州				
使用上の注意: シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。				

A-4 シズイ

SL-4902 フロアブル

地域名	対象雑草： シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北	●	草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意： シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 シズイ

SST-403-1kg 粒

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	●	草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意: シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 シズイ

TH-501-1kg 粒

地域名	対象雑草： シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	●	草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意： シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 シズイ

TH-601 フロアブル

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			500ml
東北	●	草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意: シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 シズイ

TH-601-1kg 粒

地域名	対象雑草: シズイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北	●	草丈3cm	
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意: シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。			

A-4 特殊雑草対象(ミズアオイ)

A-4 ミズアオイ

KUH-041-1kg 粒

地域名	対象雑草: ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	●	始	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 ミズアオイ

BCH-031-1kg 粒

BCH-031-1kg 瓶			
地域名	対象雑草: ミズアオイ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道	○	4L 2L	1kg
東北			
北陸			
関東・東海			
近・中・四			
九州			
使用上の注意:			

A-4 特殊雑草対象(雑草イネ)

A-4 雑草イネ

SYJ-167-1kg 粒

SYJ-167-1kg 短			
地域名	対象雑草: 雑草イネ	処理時期(対象雑草の生育時期)	使用量 /10a
北海道			1kg
東北			
北陸			
関東・東海	●	前～始(精葉抽出期)	
近・中・四			
九州			
使用上の注意: 雑草イネ防除は有効な後処理剤との組合せで使用する。			

B 直播栽培

B-1 直播(移植A-1剤)

B-1

1

BAG-032 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
東北～九州	●2	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始		イネ1L～ノビエ2L	20g×10コ	●*	●

湛水条件で使用する。
土中直播で使用する。
*:砂壌土は乾田直播のみ。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B-1

2

BCH-031-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北陸～九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始		イネ1L～ノビエ 2.5L	1kg		●

湛水条件で使用する。
土中直播で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B-1

5

BCH-044-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
全域	○2.5	○	○2		○2	○始			●発生 期	●再生 前～始		イネ1L～ノビエ 2.5L	1kg	●	○

湛水条件で使用する。
土中直播で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B-1

12

HOK-0605(L) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北陸～九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始		イネ1L～ノビエ 2.5L	500ml		●

湛水条件で使用する。
土中直播で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B-1

13

HOK-0605S-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北陸～九州	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始		イネ1L～ノビエ 2.5L	1kg	●*	○

湛水直播
湛水条件で使用する。
土中直播で使用する。
*:砂壌土は乾田直播のみ。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B-1 14

HOK-0801-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道,東北	●2	●	●2	●前	●始					●再生 前～始			イネ1L～ノビエ2L	1kg		●
灌水直播 灌水条件で使用する。 土中直播で使用する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。																

B-1 16

HOK-0801(L) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北陸～九州	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始			イネ1L～ノビエ 2.5L	500ml	●*	●
灌水条件で使用する。 土中直播で使用する。 *: 砂壌土は乾田直播のみ。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。																

B-1 17

HOK-0801(L)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北陸～九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始			イネ1L～ノビエ 2.5L	500ml	●	●
灌水条件で使用する。 土中直播で使用する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。																

B-1 20

KUH-021-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
全域	○3	○	○2		○2	○2				○再生 前～始			イネ出芽後～ノビエ 3L	1kg		○
灌水条件で使用する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: 処理後に出芽したイネは生育抑制を受けることがある。 イネの根が露出する条件では薬害を生じる。 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。																

B-1 24

NBA-101SB シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
全域	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	●再生 前～始			イネ1L～ノビエ 2.5L	30g×10㎡	●*	○
灌水条件で使用する。 土中直播で使用する。 *: 砂壌土は乾田直播のみ。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。																

B-1 25

NC-606 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 〜 壇土
全域	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前〜始		イネ1L〜ノビエ 2.5L(砂壌土は2L まで)	30g×10	○	○

湛水条件で使用する。
土中直播で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B-1 27

NC-627 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 〜 壇土
東北〜九州	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前〜始		イネ1L〜ノビエ 2.5L	80g(散布 水量 500ml)		●

湛水条件で使用する。
土中直播で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B-1 28

NC-627-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 〜 壇土
東北〜九州	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前〜始		イネ1L〜ノビエ 2.5L	1kg		●

湛水条件で使用する。
土中直播で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B-1 29

S-9146-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 〜 壇土
全域	○3	○	○2		○2	○2			○発生 期	○再生 前〜始		+0〜ノビエ3L	1kg	○	○

播種同時散布可能
湛水もしくは湛土ごく浅水状態、乾田直播は入水後に使用する。
土中重播で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意:

B-1 30

SB-564 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 〜 壇土
東北〜九州	●2	●	●始		●始				●発生 期			イネ1L〜ノビエ2L	500ml	●*	●

湛水条件で使用する。
土中直播で使用する。
*: 砂壌土は乾田直播のみ。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B-1 31

SB-564-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロダ'ワ イ	オモダ'カ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
東北～九州	●2	●	●2		●始	●始			●発生 期			イネ1L～ノビエ2L	1kg	●*	●

湛水条件で使用する。
土中直播で使用する。
*:砂壌土は乾田直播のみ。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B-1 33

SL-0601(RC)-0.5kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロダ'ワ イ	オモダ'カ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
東北,北陸	●3	●	●3			●3			●発生 期	●再生 前～始		イネ1L～ノビエ3L	500g		●

均一散布
湛水条件で使用する。
土中直播で使用する。
一年生広葉雑草以外のSU抵抗性雑草は対象としない。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B-1 34

SL-0701-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロダ'ワ イ	オモダ'カ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
東北～九州	●3	●	●3		●2	●3			●発生 期	●再生 前～始		イネ1L～ノビエ3L	1kg		●

湛水条件で使用する。
土中直播で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B-1 35

SL-0701(RC)-0.5kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロダ'ワ イ	オモダ'カ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
東北,北陸	●3	●	●2			●2				●再生 前～始		イネ1L～ノビエ3L	500g		●

均一散布
湛水条件で使用する。
土中直播で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B-1 37

SST-404 シェンボ'

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミス'ガ'ヤ ツリ	ウリカワ	クロダ'ワ イ	オモダ'カ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
全域	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始		イネ1L～ノビエ 2.5L	40g×10㍓	●	○

湛水条件で使用する。
土中直播で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B-1 38

SST-404-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
全域	○2.5	○	○2		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始		イネ出芽始～ノビ エ2.5L(砂壌土は イネ出芽前)	1kg	●	○

湛水条件で使用する。
土中直播で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B-1 39

SW-052 シャンボ'

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
全域	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期			イネ1L～ノビエ 2.5L	50g×10コ	●*	●

湛水条件で使用する。
土中直播で使用する。

*: 砂壌土は乾田直播のみ。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B-1 40

SYJ-156-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道、東北	●3	●	●2						●発生 期	●再生 前～始		イネ1L～ノビエ3L	1kg		●

湛水直播

湛水条件で使用する。

土中直播で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B-1 41

TH-501-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道～近・中・ 四	●3	●	●2		●始	●始			●発生 期			イネ出芽始～ノビ エ3L	1kg	●*	●

湛水条件で使用する。

土中直播で使用する。

*: 砂壌土は乾田直播のみ。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B-1 42

TH-547(Z) シャンボ'

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
東北～近・中・四	●3	●	●2		●始	●始						入水5日後(イネ 3L以降)～ノビエ 3L	40g×10コ		●

乾田直播

湛水条件で使用する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意:

B-1 43

TH-547(Z) フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツ	ウリカワ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壌土 ～ 埴土
全域	●3	●	●2	●始	●始	●始			●発生 期	●再生 前～始			イネ出芽始～ノビ エ3L	500ml		●
湛水条件で使用する。 土中直播で使用する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。																

B-1 44

TH-547(Z)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツ	ウリカワ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壌土 ～ 埴土
全域	●3	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始			イネ1L～ノビエ3L	1kg		●
湛水直播 湛水条件で使用する。 土中直播で使用する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。																

B-1 45

TH-601 シャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツ	ウリカワ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壌土 ～ 埴土
東北～近・中・四	●2.5	●	●2		●2	●2			●発生 期	●再生 前～始			イネ1L～ノビエ 2.5L	20g×10コ		●
湛水条件で使用する。 土中直播で使用する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。																

B-1 46

TH-601 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツ	ウリカワ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壌土 ～ 埴土
全域	●2.5	●	●2		●始	●始			●発生 期	●再生 前～始			イネ出芽始～ノビ エ2.5L	500ml		●
湛水条件で使用する。 土中直播で使用する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。																

B-1 47

TH-601-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバイ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツ	ウリカワ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壌土 ～ 埴土
全域	●2.5	●	●2		●2	●始			●発生 期	●再生 前～始			イネ出芽始～ノビ エ2.5L	1kg		●
湛水条件で使用する。 土中直播で使用する。 減水深: 2cm/日以下 使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。																

B-1 50
HOK-0605(L)-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 堆土
北陸～九州	○2.5	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始		イネ1L～ノビエ 2.5L	1kg	○	○

湛水直播
湛水条件で使用する。
土中直播で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B-2 直播(移植A-2剤)

B-2 1
KUH-983-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 堆土
全域	○4											イネ3L～ノビエ4L	1kg	○	○

湛水条件で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B-2 3
SL-0401-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 堆土
全域	○4		○4			○3						イネ1L, 3L以降, ノ ビエ4Lまで (北海道, 九州はイ ネ3L以降, 九州は ノビエ3Lまで)	1kg	○	○

SU抵抗性雑草を対象としない。
湛水条件で使用する。
土中直播で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤もしくは後処理剤との組み合わせで使用する。
イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B-2 4
SL-4901 フロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 堆土
東北～近・中・四	○1	○	○始		○始	○始			○発生 期			代かき後～4, +0 ～ノビエ1L	500ml	○	○

播種同時散布可能(落水またはごく浅水で散布した場合は散布後速やかに湛水する)
湛水直播
湛水条件で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 後処理剤との組み合わせで使用する。

B-2 5
SL-4901 フロアブル(少量散布)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 堆土
東北～近・中・四	○1	○	○始		○始	○前			○発生 期			代かき後～4, +0 ～ノビエ1L	300ml		○

播種同時散布可能(落水またはごく浅水で散布した場合は散布後速やかに湛水する)
湛水直播
湛水条件で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 後処理剤との組み合わせで使用する。

B-2 6

SW-751 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロダワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
全域	○1.5	○	○始	○2		○2						+0～ノビエ1.5L (北海道～関東 および砂壤土はノ ビエ1Lまで)	3kg	○	○

播種同時散布可能(落水またはごく浅水で散布した場合は散布後速やかに湛水する)。
湛水直播
湛水条件で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 後処理剤との組み合わせで使用する。

B-2 7

SW-751 粒(少量散布)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロダワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
東北～九州	○1	○	○始									+0～ノビエ1L	1.5kg	○	○

播種同時散布可能(落水またはごく浅水で散布した場合は散布後速やかに湛水する)。
湛水直播
湛水条件で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 後処理剤との組み合わせで使用する。

B-2 8

YH-650 フロアブル(希釈して全面散布)

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロダワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道～近・中・ 四	●1.5	●	●始			●始			●発生期			+0～ノビエ1.5L	500ml(散 布水量 100L)		●

全面散布
湛水直播
イネ出芽前は落水条件で使用する。
土中直播で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 後処理剤との組み合わせで使用する。
イネ出芽時に湛水状態になると薬害を生じる場合がある。

B-2 9

YH-650-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロダワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
北海道～近・中・ 四	●1.5	●	●始			●始			●発生期			+0～ノビエ1.5L	1kg		●

湛水直播
イネ出芽前は落水条件で使用する。
土中直播で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 後処理剤との組み合わせで使用する。
イネ出芽時に湛水状態になると薬害を生じる場合がある。

B-3 直播(移植A-3剤)

B-3 3

NC-612-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスガヤ ツリ	ウリカワ	クロダワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壤土	壤土 ～ 埴土
全域	○3.5	○	○3		○3	○3			○発生期			イネ3L以降、ノビ エ3.5Lまで	1kg	●	○

湛水条件で使用する。
土中直播で使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
イネの根が露出する条件では薬害を生じる。

B-3
SL-0613 顆粒水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハエ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土
東北～九州	○5		○5		○4				○発生 期			イネ5L以降、ノビ エ5Lまで	1000g (散布液 量100L)	●	○

減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。
 降雨などにより散布後2日間以上落水もしくは浅水状態が維持されないと効果が低下することがある。

B-3
HOK-0721 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハエ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土
東北～近・中・四	○4	○	○4									イネ4L以降、ノビ エ4Lまで	3kg		○

湛水直播
 湛水条件で使用する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 落水もしくは浅水で散布し、2日間以上入水しない。
 降雨などにより散布後2日間以上落水もしくは浅水状態が維持されないと効果が低下することがある。

B-4 直播(その他)

B-4
NC-331 水和

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハエ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	クロクワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 埴土
関東・東海～九 州		○	○前		○前	○前			○発生 期	○再生 前～始		入水前10～2日 (イネ2L以降、雑 草草丈30cm以 下)	90～ 180g(散 布液量 100L)		○

乾田直播
 乾田条件で使用する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意:

C 畦畔雑草

B-1
TH-547(Z)-1kg 粒

地域名	対象雑草	処理時期	使用量(散布液量) /10a	適用土壌
全域	雑草全般	雑草生育期(草丈30cm以下)	500～1000ml(100L)	全土壌

使用上の注意: 水田内に流入または飛散すると被害を生じる。

使用基準の更新

以下の剤について、使用基準を策定した。

1. 過去の使用基準を元に現行の様式による使用基準を策定。
2. 過去の使用基準に特殊雑草対象の本年度判定結果を加え、使用基準を策定。

A 移植栽培

A-1 一発処理

A-1

BCH-033-1kg粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウラボ	クログ ワイ	オモダ カ	ヒルム シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2		○始	○発生 期	○再生 前～始		エゾノササガサリ・2L ミズアオイ・2L SU抵抗性ホタルイ	+5～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○3	○	○2	○2	○2	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始			+5～ノビエ3L		○	○
北陸	○3	○	○2		○2	○始	○始	○始	○発生 期	○再生 前～始					○	○
関東・東海	○3	○	○3		○2	○2	○始※	○始	○発生 期	○再生 前～始					○	○
近・中・四	○3	○	○3		○2	○2	○始	○始	○発生 期	○再生 前～始					○	○
九州	○3	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始		コキヤガサ始			○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の低温条件により強い生育抑制を受けることがある。(北海道)

セリは再生が早い場合は効果が劣る。(九州)

散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

A-1

HOK-0301 プロアール

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウラボ	クログ ワイ	オモダ カ	ヒルム シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始		○始※	○発生 期			エゾノササガサリ・2L	+5～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○始※	○前～ 始※	○発生 期						○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始	○始※		○発生 期						○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○前～ 始※	○発生 期		○前				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	●前～ 始※	○発生 期		○前				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期						○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。

オモダカ防除は有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用。

A-1

HOK-0605 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガイ ツツ	ウツカ	クログ ワイ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	+0～ノビエ2.5L	50g×10 ³	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○前～ 始※	●前～ 始※	○発生 期	○再生 前～始				○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。

オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

HOK-0801 ジャンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガイ ツツ	ウツカ	クログ ワイ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生 期	○再生 前～始		+0～ノビエ2.5L	50g×10 ³	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始	○前～ 始※	●前～ 始※	○発生 期	○再生 前～始				○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。

散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足を生じることがある。

オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

HOK-0801-1kg粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガイ ツツ	ウツカ	クログ ワイ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始			○発生 期	○再生 前～始		+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始		●前～ 始※	○発生 期	○再生 前～始				○	○
北陸															
関東・東海															
近・中・四															
九州															

田植同時散布可能

※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

KPP-398-1kg粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツ	ワカワ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壌土 ～ 堆土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始			○発生 期	○再生 前～始			+0～ノビエ1.5L	1kg	○	○
東北	○1.5	○	○始	○前	○始	○始	○前～ 始※	●前～ 始※	○発生 期	○再生 前～始			+0～ノビエ1.5L	1kg	○	○
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

田植同時散布可能

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

KPP-501(L)-1kg粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツ	ワカワ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壌土 ～ 堆土
北海道																
東北																
北陸	○1.5	○	○始		○始	○始	●前～ 始	●前～ 始	○発生 期	○再生 前～始	○前 (藻類)		+0～ノビエ1.5L	1kg	○	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	○始	●前～ 始※		○発生 期	○再生 前～始	○前 (藻類)	コキヤガラ始			○	○
近・中・四	○1.5	○	○始		○始	○始	●前～ 始	●前～ 始	○発生 期	○再生 前～始					○	○
九州	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前 (藻類)	コキヤガラ始			○	○

田植同時散布可能

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。

田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。

オモダカ・クログワイ・コキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

KPP-501-1kg粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツ	ワカワ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壌土 ～ 堆土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始			○発生 期	○再生 前～始			+0～ノビエ1.5L	1kg	○	○
東北	○1.5	○	○始	○始	○始	○始	●前～ 始※	●前～ 始※	○発生 期	○再生 前～始					○	○
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

田植同時散布可能

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

減水深: 2cm/日以下

使用上の注意: オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

KUH-021-0.25kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカワ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○3	○	○3	○3		○2			○発生 期	○再生 前～始			+3～ノビエ3L	250g	○	○
東北	○3	○	○3	○2	○3	○2		●前～ 始※	○発生 期	○再生 前～始					○	○
北陸	○3	○	○2		○2	○始			○発生 期	○再生 前～始					○	○
関東・東海	○3	○	○3		○3	○2			○発生 期	○再生 前～始	コウキヤガラ始				○	○
近・中・四	○3	○	○3		○2 3	○2			○発生 期	○再生 前～始					○	○
九州	○3	○	○3		○3	○3			○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○

湛水周縁部散布可能(北海道～九州)
 ※:オモダカ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 湛水周縁部散布では藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと部分的な薬害や効果不足を生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

KUH-072K-1kg粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカワ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始			+3～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	●前～ 始※	●前～ 始※	○発生 期	○再生 前～始					○	○
北陸																
関東・東海																
近・中・四																
九州																

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 浅植え、植付け精度不良等で根が露出すると薬害を生じることがある。(東北)
 オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

KUH-074-1kg粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウツカワ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 埴土
北海道	○3	○	○2	○2		○2		●前～ 始	○発生 期	○再生 前～始			+3～ノビエ3L	1kg	○	○
東北	○3	○	○2	○3	○3	○2	●前～ 始※	●前～ 始※	○発生 期	○再生 前～始					○	○
北陸	○3	○	○3		○2	○2	●前～ 始	●前～ 始	○発生 期	○再生 前～始					○	○
関東・東海	○3	○	○3		○3	○2	●始※	●始	○発生 期	○再生 前～始	コウキヤガラ始				○	○
近・中・四	○3	○	○3		○3	○3	●前～ 始	●前～ 始	○発生 期	○再生 前～始	○前 (藻類)				○	○
九州	○3	○	○3		○3	○3			○発生 期	○再生 前～始	○前 (藻類)	コウキヤガラ始			○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 浅植え、植付け精度不良等で根が露出すると薬害を生じることがある。(北陸、九州)
 移植後の低湿および急激な気温の上昇により薬害を生じることがある。(近畿・中国・四国)
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ・コウキヤガラは有効な後処理剤との組み見合わせで使用する。

A-1

NC-618-1kg粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダガ	ミズガヤ ツリ	ワカバ	クログ ワイ	オモダ ガ	ヒルム シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 堆土
北海道	○4	○	○4	○4		○3		○始～ 矢じり1L	○発生 期	○再生 前～始		+7～ノビエ4L	1kg		○
東北	○3.5	○	○3	○3	○4	○3	○始～ 草丈 10cm※	○始～ 矢じり1L	○発生 期	○再生 前～始	シズメ草丈3cm	+7～ノビエ3.5L			○
北陸	○3.5	○	○3		○3	○3	○草丈 10cm	○始～ 矢じり1L	○発生 期						○
関東・東海	○4	○	○4		○3	○3	○始～ 草丈 10cm	○始～ 矢じり1L	○発生 期	○再生 前～始		+7～ノビエ4L		○	○
近・中・四	○4	○	○4		○3	○3	○草丈 10cm	○始～ 矢じり1L	○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ4L			○
九州	○4	○	○4		○4	○4	○始～ 草丈 10cm※	○始～ 矢じり1L	○発生 期	○再生 前～始	○前 (藻類)			○	○

※:オモダガ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の低湿および急激な気温の上昇により薬害を生じることがある。(北陸)
 深水条件では薬害を生じることがある。(北陸)
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 オモダガ防除は有効な剤との組み合わせで使用。(東北～関東・東海)。
 クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。(関東・東海、九州)
 シズメ防除は有効な剤との組み合わせで使用。

A-1

NC-621-1kg粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダガ	ミズガヤ ツリ	ワカバ	クログ ワイ	オモダ ガ	ヒルム シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 堆土
北海道	○3	○	○2	○2		○2		○始	○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ3L	1kg	○	○
東北	○3	○	○2	○2	○3	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	シズメ草丈3cm			○	○
北陸	○3	○	○3		○2	○2	○前	○始	○発生 期	○再生 前～始				○	○
関東・東海	○3	○	○3		○3	○2	●始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始				○*	○
近・中・四	○3	○	○3		○3	○2	○始	○始	○発生 期	○再生 前～始				○	○
九州	○3	○	○3		○3	○3	○始	○始	○発生 期	○再生 前～始				○	○

※:オモダガ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: * : 散布後の低湿条件により薬害を生じることがある。
 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 オモダガ・シズメ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。
 クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。(北陸、近・中・四、九州)

A-1

NC-627シ'ンボ'

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハバ	ホタルイ	ヘラオモ ダガ	ミズガヤ ツリ	ワカバ	クログ ワイ	オモダ ガ	ヒルム シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壤土 ～ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始		○始※	○発生 期	○再生 前～始	ミズアオイ2L SU抵抗性30%: 2L	+5～ノビエ2.5L	30g×10コ	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○2		○始※	○発生 期	○再生 前～始				○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2		○始※	○発生 期	○再生 前～始				○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2		○始※	○発生 期	○再生 前～始				○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2		○始※	○発生 期	○再生 前～始				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2		●始※	○発生 期	○再生 前～始				○	○

※:オモダガ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: セリは再生が早い場合は効果が劣る。(九州)
 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
 散布後著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
 オモダガ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用。(北海道～近・中・四)

A-1

SL-4903-1kg粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスギヤ ツリ	ウツカ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期	○再生 前～始			+5～ノビエ2.5L (砂壌土は2Lまで)	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○始	○前～ 始※	○前～ 始※	○発生 期				+5～ノビエ2.5L		○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	○前～ 始	○始	○発生 期	○再生 前～始					○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●前～ 始※	○前～ 始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コウキヤガラ:始			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始	○始	○発生 期	○再生 前～始					○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●始		○発生 期	○再生 前～始		コウキヤガラ:始				○

※:オモダカ・クログワイ防除は、連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスギヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

SST-403シヤンボ

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスギヤ ツリ	ウツカ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道																
東北	○1.5	○	○始	○始	○始	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前		+0～ノビエ1.5L	40g×10a	○	○
北陸	○1.5	○	○始		○始	○前			○発生 期	○再生 前～始					○	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始		コウキヤガラ:始			○	○
近・中・四	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	コウキヤガラ:始			○	○
九州																

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 5cm程度の水深で散布する。
 散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な被害や効果不足が生じることがある。
 オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

SST-403-1kg粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミスギヤ ツリ	ウツカ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始			○発生 期	○再生 前～始	○前		+0～ノビエ1.5L	1kg	○	○
東北	○1.5	○	○始	○始	○始	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	シズメ草丈3cm			○	○
北陸	○1.5	○	○始		○始	○始			○発生 期	○再生 前～始	○前	コウキヤガラ:始			○	○
関東・東海	○1.5	○	○始		○始	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
近・中・四	○1.5	○	○始		○始	○始	○始※		○発生 期	○再生 前～始					○	○
九州	○1.5	○	○始		○始	○始	○始※		○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○

田植同時散布可能
 ※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスギヤツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ・シズメ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

SW-061-1kg粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 植土
北海道															
東北	○2.5	○	○2	○2	○2	○2	○前～ 始※	○前～ 始※	○発生 期			+5～ノビエ2.5L	1kg	○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始	○前～ 始※	○前～ 始※						○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	●前～ 始※	●前～ 始※	○発生 期		○前 (藻類)			○*	○
近・中・四 (昔)	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●前～ 始※	○発生 期					○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	●前～ 始※	●前～ 始※	○発生 期					○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: *:浅植え、植付け精度不良等で根が露出すると薬害を生じることがある。(関東・東海)
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

SYJ-167-1kg粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 植土
北海道	○1.5	○	○始	○始					○発生 期		ミズアオイ:1L	+0～ノビエ1.5L	1kg	○	○
東北	○1.5	○	○始	○始	○始									○	○
北陸	○2	○	○始		○始							+0～ノビエ2L		○	○
関東・東海	○2	○	○2		○始				○前		雑草は前～始 (種蒔抽出期)	+0～ノビエ2L(砂壌 土はノビエ1.5Lま で)		○	○
近・中・四	○2	○	○始		○始				○前					○	○
九州	○1.5	○	○始		○始							+0～ノビエ1.5L		○	○

田植同時散布可能
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
雑草イネ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

TH-501'ジャンボ'

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ウリカ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離	処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 植土
北海道	○3	○	○3	○3		○2			○発生 期	○再生 前～始		+5～ノビエ3L	40g×100	○	○
東北	○3	○	○2	○2	○2	○2	●始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始				○	○
北陸	○3	○	○2		○始	○始	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前			○*	○
関東・東海	○3	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コキヤガラ始		○	○
近・中・四	○3	○	○3		○3	○2	●始※	○始	○発生 期	○再生 前～始	○前	コキヤガラ始		○	○
九州	○3	○	○3		○3	○3	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始		コキヤガラ始		○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: *:浅植え、植付け精度不良等で薬害を生じることがある。
5cm程度の水深で散布する。
散布時に藻類・表層剥離などの浮遊物が多いと、部分的な薬害や効果不足が生じることがある。
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ・コキヤガラ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

TH-6017プロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ワカワ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壌土 ～ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始		○始	○発生 期	○再生 前～始		スアオイ:1L	+0～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始		シズイ:重丈3cm			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○始	●始	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始		コウキヤガラ:始			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前				○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始	●始※	○発生 期	○再生 前～始	○前	コウキヤガラ:始			○	○

田植同時散布可能
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

TH-601-1kg粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ワカワ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壌土 ～ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○始		○始※	○発生 期	○再生 前～始		スアオイ:1L	+0～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始		シズイ:重丈3cm			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	●始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始					○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始	○前 (藻類)	コウキヤガラ:始			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期	○再生 前～始		コウキヤガラ:始			○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	●始※	○発生 期	○再生 前～始		コウキヤガラ:始			○	○

田植同時散布可能
※:オモダカ・クログワイ防除は、有効剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 浅植え、植付け精度不良等で根が露出すると被害を生じることがある。(北陸)
散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ・シズイ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-1

YH-652 プロアブル

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダカ	ミズガヤ ツリ	ワカワ	クログワ イ	オモダカ	ヒルムシ ロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壌土 ～ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期			SU抵抗性:スクリイ:2L コウキヤガラ:始	+5～ノビエ2.5L	500ml	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○2	○始	○始※		○発生 期			SU抵抗性:スクリイ:2L			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始	○発生 期						○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期			SU抵抗性:スクリイ:2L			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○前※	○始	○発生 期						○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期		○前				○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
減水深: 2cm/日以下
使用上の注意: 散布後の著しい多雨条件により除草効果が低下することがある。
田植前に生育したミズガヤツリには効果が劣る。
オモダカ・クログワイ・コウキヤガラ防除は有効な剤との組み合わせで使用する。

A-1

YH-652-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダガ	ミスガキ ツリ	ウリカワ	クログ ワイ	オモダカ	ヒルム シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○2.5	○	○2	○2		○2			○発生 期			225kg/7.5ha	+5～ノビエ2.5L	1kg	○	○
東北	○2.5	○	○2	○始	○始	○始			○発生 期			SL抵抗性99%以上			○	○
北陸	○2.5	○	○2		○2	○2	○始	○始	○発生 期						○	○
関東・東海	○2.5	○	○2		○2	○2	○始※	○始※	○発生 期			SL抵抗性99%以上 SL抵抗性99%以上			○	○
近・中・四	○2.5	○	○2		○2	○2	○始	○始	○発生 期						○	○
九州	○2.5	○	○2		○2	○2			○発生 期						○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することにより効果が向上する。
 滅水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 散布後の暑い多雨条件により除草効果が低下することがある。
 田植前に生育したミスガキツリには効果が劣る。
 オモダカ・クログワイ・コウキセガツ防除は、有効な剤との組み合わせで使用する。

A-2 体系(初期)

A-2

YH-650-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダガ	ミスガキ ツリ	ウリカワ	クログ ワイ	オモダカ	ヒルム シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○1.5	○	○始	○始		○始		○前～ 始※	○発生 期				+0～ノビエ1.5L	1kg	○	○
東北	○1.5	○	○始	○始		○前		○前～ 始※	○発生 期			クサネム・本葉1L			○	○
北陸	○1.5	○	○始			○始		○前～ 始※	○発生 期						○	○
関東・東海	○1.5	○	○始			○始	○前※	○前～ 始※	○発生 期			クサネム・本葉1L ツリキカラ:前			○	○
近・中・四	○1.5	○	○始			○始	○前	○前～ 始※	○発生 期						○	○
九州	○1.5	○	○始			○始		○前※	○発生 期			ツリキカラ:前			○	○

田植同時散布可能
 ※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 滅水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: オモダカ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。(東北・北陸・近畿・中国・四国・九州)
 オモダカ防除は有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用する。(北海道・東北・北陸・関東・東海・近畿・中国・四国)
 クサネムが残草または後発生した場合は有効な後処理剤を散布する。
 クログワイ・コウキセガツ防除は有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

A-3 体系(中後期)

A-3

KUH-073-1kg粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツハヤ	ホタルイ	ヘラオモ ダガ	ミスガキ ツリ	ウリカワ	クログ ワイ	オモダカ	ヒルム シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌土	壤土 ～ 堆土
北海道	○3.5	○	○3	○3		○3			○発生 期		○始		+20～+35(イネ5L以 降、ノビエ3.5Lまで)	1kg	○	○
東北	○3.5	○	○3	○2	○3	○2	○始※	○始～ 広葉形 葉4L※	○発生 期		○始	シズイ草大3cm			○	○
北陸	○3.5	○	○3		○2	○2	○始		○発生 期		○始				○	○
関東・東海	○3.5	○	○3		○3	○3	●草丈 10cm	○始～ 広葉形 葉4L※	○発生 期		○前				○	○
近・中・四	○3.5	○	○3		○3	○3	○始		○発生 期		○前				○	○
九州 (早)	○3.5	○	○3	○2	○4	○4	○始※		○発生 期						○	○

※:オモダカ・クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する
 滅水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 暑い高温条件では薬害を生じることがある。
 散布後の低温および急激な気温の上昇により薬害を生じることがある。
 オモダカ・クログワイ・シズイ草防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

A-3

SL-0401-1kg 粒

地域名	ノビエ	一年生 広葉・ マツバ	ホタルイ	ヘラモ グサ	ミスガ ツリ	ウツリ	クログ ワイ	オモダ カ	ヒルム シロ	セリ	藻類・ 表層 剥離		処理時期	使用量 /10a	砂 壌 土	壌土 ～ 植土
北海道	○4		○4	○3		○4			○生育 期				+20～+35 (ノビエ4Lまで)	1kg	○	○
東北	○4		○4	○4		○3	○草丈 10cm※		○生育 期			シズメ草丈10cm コキヤガラ草丈10 cm	+7～+35 (ノビエ4Lまで)		○	○
北陸	○4		○4			○3			○生育 期						○	○
関東・東海	○4		○4			○3			○生育 期			コキヤガラ草丈10 cm			○	○
近・中・四	○4		○4			○4	○草丈 10cm		○生育 期			コキヤガラ草丈10 cm			○	○
九州	○4		○4			○3			○生育 期			コキヤガラ発生始			○	○

※:クログワイ防除は、有効な剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。
 減水深: 2cm/日以下
 使用上の注意: 前処理剤との組み合わせで使用する。
 クログワイ・コウキヤガラ・シズメ防除は有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

水稻関係除草剤使用基準の表示について

- 過年度、既に実用化の認められている適用草種・土壌条件に○を印した。
 (本年度の試験の結果、特に拡大のない場合も含む)
 草種欄の数字、字句で草種ごとの葉齢を示した。
 [例:○始(発生始)、○2(2葉期まで)]
 作期に限定がある場合は、地域名の後に適用作期を普通期:(普), 早期:(早)と記した。
 使用上の注意は別途一覧表に添って文章で備考欄に記載した。
- 本年度、新たに使用基準が作成された場合は、実用化可能となった適用草種・土壌に●を印し、
 処理時期及び使用量を記載した。
- 過年度の基準に適用条件拡大が可能となった場合、
 作 期 の 拡 大 : 作期の限定がなくなった場合、作期の記載を取消線で消した。(例: ~~(普)~~)
 草 種 の 拡 大 : 拡大された草種に●を印した。
 葉 齢 の 拡 大 : 拡大された葉齢に、アンダーラインを付した。(例: ○2.5)
 処理時期, 使用量の拡大 : 拡大部分にアンダーラインを付した。(例: +3～ノビエ2L, 100～150ml/10a)
 土 壌 条 件 の 拡 大 : 拡大された土壌に●を印した。
- 藻類欄の／は、表層剥離への効果が確認されるまで判定を保留したもの。