

2025 年度秋冬作芝関係 除草剤・生育調節剤試験判定結果

公益財団法人日本植物調節剤研究協会 技術部

2025 年度秋冬作芝関係除草剤・生育調節剤試験成績検討会は、2026 年 7 月 16 日（木）に埼玉スタジアム 2002 において開催された。

この検討会には、試験場関係者 25 名、委託関係者 24 名

ほか、計 58 名の参集を得て、除草剤 5 薬剤（47 点）について、試験成績の報告と検討が行われた。

その判定結果については、次の表に示す通りである。

2025 年度秋冬作芝関係除草剤・生育調節剤試験 判定結果

A. 除草剤

薬 剤 名 有効成分および 含有率(%) [委託者]	作物名	ねらい	判定	判定内容
1. ACN 水和 (旧名:KH-193) ACN:25% [アグロ カネショウ]	コウライシバ	適用性の検討 (コケ類発生初期) (低薬量・低水量拡大)	実・継	実) [(コウライシバ) 藻類、コケ類] ・藻類、コケ類の発生時 3～4g<200～300mL> 茎葉処理(全面) ・芝生育期、コケ類発生初期 1g<100～300mL> 3回 散布間隔は1週間を目安とする 茎葉処理(全面) [(ベントグラス) コケ類] ・芝生育期(秋)、コケ発生期 2～4g<200～300mL> 茎葉処理(全面) ・芝生育期、コケ類発生初期 1g<100～300mL> 3回 散布間隔は1週間を目安とする、 2g<100～300mL> 茎葉処理(全面)
	ベントグラス	適用性の検討 (コケ類発生初期) (低薬量・低水量拡大)		継) ・コケ類に対する薬量2g/㎡での効果、薬害の確認 (コウライシバ) ・ベントグラスの倍量薬害試験での確認
2. AKH-0044 フロアブル イマザキン:19% [アグロ カネショウ]	コウライシバ	適用性の検討(一年生雑草生育期)	継	継) ・効果、薬害の確認(コウライシバ、ノシバ)
		適用性の検討(ヒメクグ生育期)		
	ノシバ	適用性の検討(一年生雑草生育期)		
		適用性の検討(ヒメクグ生育期)		

A. 除草剤

薬 剤 名 有効成分および 含有率(%) [委託者]	作物名	ねらい	判定	判定内容
3. NC-656 SC イブトリアゾピリド(新規):9.1% [日産化学]	コウライシバ	適用性の検討 (一年生、多年生広葉雑草生育期)	実・継	(実) [秋冬作; (コウライシバ) 一年生雑草] ・ 芝生育期(生育休止期) 雑草生育期 ・ 0.15～0.45mL<100～200mL>/㎡ ・ 茎葉処理(全面) [秋冬作; (ノシバ) 一年生雑草、多年生広葉雑草] ・ 芝生育期(生育休止期) 雑草生育期 ・ 0.15～0.45mL<100～200mL>/㎡ ・ 茎葉処理(全面) [秋冬作; (バーミューダグラス) 一年生雑草] ・ 芝生育期(生育休止期) 雑草生育期 ・ 0.15～0.45mL<100～200mL>/㎡ ・ 茎葉処理(全面) 注) ・ 「芝生育期(生育休止期)」とは、茎葉の一部に緑色が残っていても、生育の停滞している時期を指す 継) ・ 多年生広葉雑草に対する効果の確認 (コウライシバ、バーミューダグラス) ・ 倍量薬害試験での確認 (コウライシバ、ノシバ、バーミューダグラス) ・ 連用試験での確認 (コウライシバ、ノシバ、バーミューダグラス) ・ 実証試験での確認 (コウライシバ、ノシバ、バーミューダグラス) ・ 緑化木への影響の確認
	ノシバ	適用性の検討 (一年生、多年生広葉雑草生育期) (一年生雑草優先)		
	ノシバ	適用性の検討 (一年生、多年生広葉雑草生育期) (多年生広葉雑草優先)		
	バーミューダグラス	適用性の検討 (一年生、多年生広葉雑草生育期)		
4. NHK-061 フロアブル (旧名:NHK-011) ピラフルフェンエチル:2.0% [ニチノー緑化]	ベントグラス	適用性の検討 (ベントグラスへの侵入コウライシバ生育期)	実・継	(実) [(コウライシバ) 一年生広葉雑草] ・ 芝休眠期、雑草発生初期(3葉期まで). ・ 0.15～0.2mL<100～200mL>. ・ 茎葉処理(全面) [(ベントグラス) 一年生広葉雑草] ・ 芝生育期(秋)、雑草発生初期(3葉期まで) ・ 0.1～0.15mL<100～200mL>. ・ 茎葉処理(全面) 継) ・ 実証試験での確認(コウライシバ、ベントグラス) ・ 侵入コウライシバに対する効果の確認(ベントグラス)
5. SL-950 乳 ニコスルフロン:4.0% [石原産業 石原バイオサイエンス]	コウライシバ	適用性の検討 (スズメノカタビラ生育期(出穂始期まで))	実・継	(実) [秋冬作; (ノシバ) スズメノカタビラ] ・ 芝生育期(生育休止期) 雑草生育期(出穂始期まで) ・ 0.1～0.15mL<100～200mL>/㎡ ・ 茎葉処理(全面) 注) ・ 「芝生育期(生育休止期)」とは、茎葉の一部に緑色が残っていても、生育の停滞している時期を指す 継) ・ 効果、薬害の確認(コウライシバ、バーミューダグラス) ・ 倍量薬害試験での確認(ノシバ) ・ 連用試験での確認(ノシバ) ・ 実証試験での確認(ノシバ) ・ 緑化木への影響の確認
	ノシバ	適用性の検討 (スズメノカタビラ生育期(出穂始期まで))		